



Joelis
Medicina








30462/8

2 vols in 1



A XXX Joe

39

550

VI Eg 12.

OPERA MEDICAL

OF THE

THEATRE OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE


OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE





Proefse

et

Prodesse

1721





Præfse FRANCISCI JOELIS *Prodesse*
Medic. Doct. & in Academiâ Gryphis-waldensi
Professoris celeberrimi

OPERA MEDICA,

Ante complures annos utilitatis publicæ
causâ in lucem edita,

Nunc

Revisa, emendata, Indicibusque necessariis
exornata.

Monrij B. M. V. Sac. Cist. Ord: ad S. Crucem Catalogo inscriptus.



N. i

AMSTELÆDAMI,

Apud JOANNEM RAVESTEINIUM,
Bibliopolam Civitatis & Illustris Scholæ Typo-
graphum Ordinarium.

c l o l o c l x i i i .

Printed by J. B. Lippincott & Co. Philadelphia
No. 7, North Second Street

OPERA HOUSE

4789

THE HISTORY OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION



Amplissimo, Spectatissimo, Clarissimoque

V I R O,

D. JOANNI ab HARTOGHVELT,

Medic. Doct. Experientissimo, Augusta Reipubl. Amstelodamensium Senatori, & Scabino gravissimo,

S. P.

QUOD præfens opus Medicum, omni tempore magni habitum, à Viro Celeberrimo, Dn. Francisco Joële, p. m. olim conscriptum, prælo meo subjicere, adeoque de novo publico exponere aggressus, non una mihi causa fuit; Primaria omnium, in rem literariam amor, & studia promovendi desiderium; sic enim multorum votis petitionibusque satisfieri posse confidebam, qui diu desiderato eo, in re Medicâ verè divino, opere, carere hæcenus, dum exemplaria alia deficiunt, debuere. Curam itaque habui, quam fieri potuit maximam, ut non solum omnia quæ unquam typis excusa repèriuntur, novâ hac editione continerentur, verum & ab infinitis, quibus priores scatebant, mendis purgata, correctâ, emendata; ne quid de typorum elegantia, chartæ nitore, libri formâ, indicis perfectione, similibusque, addam, Quæ ut efficerem, quibus modis potuit, & per occupationes plurimas licuit, imò conditio operis permisit, auxiliares mihi porrexit manus Vir quidam Clarissimus, Medic. Doct. & Professor publicus. Opus hoc magno Tuo Nomini, Vir inclyte, ut inscriberem, varia haud ita suadere, quam jubere videbantur. Publicos tuos privatosque honores considerans, quid non æstimationis inde, ad id quod exhibemus redundaturum animadverteret? quale patrociniū reperiet? Tu Patriæ clarissimum lumen, Te ægroti suum solamen, & sani tutum præsidium appellitant: Tibi jam iterum sua jura commisit Themis. Virtutibus Tuis debetur, quod non solum Practicis Reipubl. hujus præcipuis annumereris, sed & publica onera, eaque gravissima, subire debeas. Accedit, ne plura nominem, beneficiorum plurimorum, in me meosque collatorum, debita recordatio, quibus cum paria referre me neutiquam posse sciam, quo saltem ingrati nomen, quantum in me, removerem, & aliquod exstaret decentis gratitudinis signum, hoc quicquid est munusculi literarii in sinum tuum deponere volui, imò debui, spe illa fretus, Te haud adedò donum quam donantis animum respicere. Finio, petens ut hunc meum pertenuem laborem æqui bonique consulere, meque favoris Tui alis protegere pergas, qui maneo

Amplius. Tua

Devotissimus cultor & Cognatus

Amstelæd. 15 Martii,
Anni 1663.

J. à RAVESTEYN.



LECTOR BENEVOLE.

DE Authore, non est quod multa proponam : Quis & qualis fuerit, sequens Professorum Rostochiensium censura, ipsaque scripta, quantum satis est, declarant ; gratia debentur Clarissimis Viris D^{no}. Matthæo Backmeistero, Phil. & Med. Doct. ac Reipubl. Lunaburgensis Physico, & D^{no}. Francisco Ioëli, authoris nepoti, Aule Wolgastana Medico, & Universitatis Gryphiswaldensis Professori ordinario, quod nobis eorum, qua alias in obscuro permansissent, participes facere voluerint. Ita decet virum probum, etiam rem literariam pro viribus promovere. Editionis nostre causas dedicatio exhibet; ostendit eadem in quibus hæc à præcedentibus differat. Unicum hoc monere necessarium valde, in praxi summoperè observandum, in formulis Remediorum, nescio cujus incuria, loco Characteris ordinarii Drachma 3 poni signum tale 3, & loco ejus qui est semis S aut ʒ, poni 5. Reliqua ipse facile emendabis. V A L E.



ACADEMIA ROSTOCHIANA.



Uemadmodum omnes publico bono nati sumus; ita non im-
 meritò laudandi, qui omnes suos conatus, studia & consilia ad
 utilitatem publicam referunt: undè perpetuam sibi nominis
 gloriam, etiam post fata sua sibi acquisivit M. Vipsanius Agrip-
 pa, qui, Dione scribente, omnia sua opera publicæ utilitati po-
 tius destinare, quam privatis commodis servire voluerit. Huc
 etiam respiciens vir doctissimus Dn. Matthæus Bacmeisterus
 Phil. & Med. Doctor, Practicus apud nos per aliquot annos egre-
 gius, jam verò amplissimæ. Reip. Lunæburgensis Physicus ordinarius, amicus
 noster singularis, opus Medicum Theoricum & Practicum, præstantissimi ac expe-
 rientissimi Medici & Practici Francisci Joëlis, quondam illustris Academiae Gryphs-
 waldensis Professoris eximii, à multis hæctenus descriptum, & pro singulari the-
 sauro habitum, à pluribus verò magno cum desiderio expetitum, atque ab infinitis
 mendis, quæ multiplici descriptione irrepserant, repurgatum, publici juris facere, &
 in communem Medicinæ studioforum utilitatem typis mandare voluit. Adornave-
 rat quidem operis hujus editionem jam antè vir clariss. & excell. Dn. Franciscus
 Joël, itidem Med. D. & Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Dn. Dn. Philippi Julii
 Stetini ac Pomeraniæ Ducis &c. Archiater dignissimus, authoris filius; sed is im-
 matura morte Anno 1601 abreptus, quod sibi de paternis scriptis publicè commu-
 nicandis, proposuerat, effectui dare non potuit. Videbantur itaque cum isto viro,
 scripta hæc tam diu à multis expectata fermè intercidisse, nisi peculiaris studia Me-
 dica promovendi ardor & amor præfatum D. Bacmeisterum permovisset, ut opus
 hoc, in quo author, potissimum ad horum locorum Septentrionalium, in quibus
 annis plus minus 40. praxin Medicam summa fide & industria exercuit, homines &
 corpora respexit, ab interitu vindicaret, præsertim dum aliquem ex Joëliana familia
 adhuc superesse ignoret. Facto autem typographicorum operum initio, prodiit
 Franciscus Joël tertius, auctoris nepos, Medicinæ studiosus industrius, elegantibus-
 que moribus præditus adolescens, qui ut editionem non improbavit; ita suo etiam
 loco liberaliter communicando alia etiam avi sui paterni scripta, ut opus hoc quam
 perfectissimè lucem aspiceret, conatus hosce juvare voluit, & editionis hujus labores
 cum D. Bacmeistero partitus est. Quantus autem vir fuerit Franciscus Joël senior in
 praxi, testantur aliquot Illustr. Pomeraniæ Principes, Barones, nobiles, cives & infe-
 rioris etiam conditionis, non tantum in Pomerania, sed etiam in vicinis regionibus
 homines penè infiniti, qui feliciter ejus opera usi, ex pluribus gravissimis & sæpè de-
 speratis affectibus convalescerent! ut magno suo merito Pomeranorum Podalyrius à
 celeberrimo olim Poëta & Academiae nostræ Professore Nathane Chytræo in Epi-
 taphio, quod memoriæ ipsius dedicare voluit, sit appellatus. Quemadmodum vero in
 conversatione cum aliis fuit candidus, sincerus & apertus; ita quicquid longissimi
 temporis decursu, in frequentissima praxi observarat, libentissimè & liberaliter ad-
 modum discipulis suis communicavit, neque ullum medicamentum tam secretum &
 abscon-

absconditum habuit, quod quenkum eorum, qui id ab ipso petiit, celaret. Neque etiam laudem peculiarem in eo quaesivit, ut peregrinis & exoticis aliisque periculosis medicamentis, antea non satis expertis uteretur, sed domi nascentia ut plurimum usurpavit, idque felicissimo successu. Existimavit enim minus subesse periculi, si ea quae domi nascuntur, in usum medicum assumantur potius, quam si sub specie secretioris pharmaci, talia saepe aegris propinentur, quibus per morbos hominum non leve fiat periculum. Usque adeo autem accuratam omnium hisce in locis provenientium simplicium notitiam habuit, ut ferè nullum eorum ipsum lateret, cuius etiam certum experimentum non haberet, Dioscoridem imitatus, qui non ex aliorum narratione scripsisse se historiam suam plantarum, asserit, sed omnia suis vidisse locis, manibus tetigisse, viresque eorum diligentissimè investigasse. Dolendum profecto est, multos hodiè reperiri, qui Medici titulo superbiunt, & vix vulgatissimas norunt plantas, quamvis eas quotidie calcent pedibus. Longe aliter in simplicium cognitione versatus fuit hujus operis author, quod omnibus qui in ejus lectionem inciderint, & in Medicina vel mediocriter versati sint, satis proculdubio perspectum & cognitum esse poterit. Gratias igitur ingentes merito Joëli habendas censemus, quod & multa remedia utilia investigare; inventa communicare, & eorum genuinum & legitimum usum Medicinæ studiosis candidè demonstrare voluerit. Neque minores gratiæ debentur D. Bacmeistero, quod celeberrimi viri scripta à blattis & tineis vindicare, bonis ingeniis ad cognitionem & tractationem artis Medicæ adjumento esse, & horum editione plurimorum saluti consulere studuerit. Agnoscent Medicinæ studiosi hunc juvandi & promovendi litterarium conatum grata mente & animo, neque dubitabunt, quin Bacmeisterus noster, quod jam in alienis scriptis edendis præstitit, qua est insigni eruditione & peritia artis Medicæ præditus, id paulo post in propriis non minus utilibus sit præstiturus. Rostochii, 3. April. Anni 1616.



COMPENDII ARTIS MEDICÆ FRANCISCI JOELIS LIBER PRIMUS,

*Continens introductionem in subsequētia, & doctrinam
Physiologicam.*

SECTIO I.

DE MEDICINA IN GENERE.

I. Quo ordine & via discenda est Ars Medica?

Modus
ad discen-
di artem
Medicam.



METHODO. Sicut enim omnes reliquæ artes & scientiæ methodo sunt inventa & propagata, ita Ars Medica methodo certa commodissime discitur. Dna enim sunt res qua lucem & facilitatem cum in docendis tum in discendis artibus adferunt, Methodus & Sermonis perspicuitas.

2. Quid est Methodus?

Methodus est artificiosa & brevis ad discendum via, Veteribus ὁδὸς καὶ δόξα μὴ ἀπαντῶν καὶ γινώσκων καὶ μετῶν, id est, plana & compendiaria Via, qua nos in artibus ad cognitionem omnium particularium, omnesque Scopos ad quos pervenire desideramus, deducit. Galenus lib. I. cap. 4. Methodi Medendi, rationem & Viam ordinatam vocat, qua unaquaque Ars tradi & disci debeat, exordio à certo initio sumpto, & inde ad secundum, tertium & quartum, & deinceps ad reliqua omnia procedendo, donec Univerſa artis theſemata, & quicquid inter duos limites inter initium & finem artis continetur, inventa & explicata fuerint.

3. Methodus in artibus quot habet Species?

Methodus
triplex.

Galenus lib. I. Artis Medicinalis tres numerat species, Ἀναλυτικὴ, id est, Resoluti-

vam: Συνθετικὴ, compositivam; & Οὐκ-
σικὴ, definitivam.

4. Quid est Methodus Ἀναλυτικὴ;

Ἀναλυτικὴ, seu Via resolutiva est ordinata Resolutiva. Resolutiva.
tus progressus à fine versus principium, vel, ut Galenus loquitur, quæ à notione finis versus principium ordinatè progreditur, omnes artis partes resolvendo, majores in minores, donec ad minutissimas partes progressum est. Hac Methodo utitur Galenus in docenda arte Medica, & Aristoteles in suis Ethicis ad Nicomachum, & Justinianus in suis Institutionibus. Galenus enim in lib. de constit. artis Medicæ incipit doctrinam à sanitate quæ est finis Medicinæ, Sanitatem tandem resolvit in Actiones, Actiones rursum in Potentias, Potentias defluere dicit ex Spiritibus, Spiritus oriri ex Temperamentis, Temperamenta sita esse docet in Membris, Membra resolvit in Humores, Humores in Elementa, qua amplius resolvi non possunt. Hac Methodus aptior est ad inveniendas, quam ad discendas artes.

5. Quid est Methodus Συνθετικὴ;

Est ordinarius processus, initium sumens Compositiva.
ab Artis elementis & progrediens usque ad finem, subinde partes minutiones componendo. Hac Methodus aptissima est, & in scholis usitatissima. Ex partibus enim totum componit.

ex causis investigat Effectus, ex simplicibus composita elicit, ex prioribus posteriora nectit: Hac Methodo tradit Priscianus Grammaticam, Quintilianus Rhetoricam, & Avicenna artem Medicam, qui primum in constructione humana natura consideravit minutissimas partes, id est, Elementa, ex quorum convenienti resolutione exultat Temperamentum, ex temperamentis oriuntur humores, ex humoribus generantur partes, in partibus continentur Spiritus, Spiritus obviunt Potentias, Potentia excitant partes corporis ad certas actiones, qua inculcata dicuntur Sanitas, Sanitas autem sui preservationem aut restaurationem desiderat.

6. Quid est Methodus Ο'εσις, Ο'εσις sive Διαιρεσις, divisoria via est, que primum artis alicujus aut rei cujuscumque generalem definitionem quibusdam veluti capitibus omnes artis vel rei partes continentem proponit, quas partes singulas tandem ordine rursus dividit & subdividit & per definitionem explicat, nec à tali definitione & divisione prius desistit, donec omnia ad rem propositam spectantia declaravit. Hac Methodus aptissima est ad artes in compendium redigendas & memoria mandandas, Iuris consulti usitatissima in agendis causis. Ea usus est Cicero in officiis, Arist. in Physicis Auscultationibus, & Galenus in arte Medici, ubi primum definit Medicinam esse scientiam salubrium, morbosorum seu insalubrium, ac neutrorum, & deinde omnes partes subdividit & declarat.

7. Medicina quid est? Medicina est ars usu atque ratione constituta, corporis humani bonam Valetudinem conservandi, amissamque recuperandi. Non abhorret ab hac Medicina definitione ea, quam Hippocrates in libello de flatibus tradit, inquit, Medicina est adjectio & subtractio, adjectio quidem deficientium, subtractio vero eorum, qua in corporibus hominum redundant. Hanc definitionem valde predicat Galenus lib. 11. c. 12. Methodi Medendi. Extructa enim est ex celeberrimo axiomate, similia similibus servantur; contraria contrariis curantur.

8. Quis est finis Scopusque Medicinæ?

Finis & Scopus in hoc tantum differunt: Finis. Finis est terminus in quo acquiescit actio, Scopus autem est terminus in quem dirigitur actio. Est itaque finis Sanitas humani corporis. Omnia siquidem precepta omnesque actiones Medici & omnia salubrium remedium genera in hunc finem dirigitur nobis sunt monstrata & attributa; ut Sanitas humani corporis aut conservetur aut recuperetur amissa. Haec enim sunt summa artis differentia, υγεινή, id est Sanitatis conservatrix, & θεωρητική, id est sanitatis amissa instauratrix.

9. Quod est subjectum Artis Medicæ?

Corpus humanum sanabile, seu potius tota Subjecta natura humana: Semper autem in artibus subjectum copulatur cum fine, ideo additur, corpus sanabile. Est enim subjectum cui inhaerere possunt: Cum autem Sanitas & aggritudines humano corpori accidere possint, proprium Medicina subjectum corpus humanum existit, quatenus est sanabile.

10. Quot sunt partes Medicinæ?

Galenus lib. 1. de tuenda sanitate c. 1. differentiam sumens ab officio Medici, in duas partes maximas dividit Medicinam, quarum alteram Sanitatis tuenda, alteram morbi profligandi facultatem appellat. Idem in lib. ad Trafsybulum c. ultimo, ita inquit Hippocrates & omnes qui hoc tempore florent Medici, artis Medica duas maximas partes cognoverunt, curatricem scilicet & Sanitatis tutelarem. Verum in libello qui Medicus inscribitur c. 6. à materia circa quam Ars Medica versatur, universam Medicinam in quinque partes distribuit, quibus singulis Græci propria indiderunt nomina, qua & Latini propter vocabulorum inopiam retinere coguntur, quarum prima dicitur, φυσιο- φυσιο- γική, naturam & constitutionem hominis γική, inquit & de rebus naturalibus, ex quibus corpus humanum constat, disputat. Secunda nominatur υγεινή, qua naturam humanam & congenitam sanitatem tueri ac conservare docet, ac de iis rebus differit, quas res non naturales vocant, Galenus vero causas naturæ conservatrices & immutatrices nominat. Tertia appellatur Αιτιολογική sive παθολογία, qua γί-
Partes finales.
Partes materiales.

qua causas & differentias morborum & symptomatum investigat. Sunt autem causa morbifica, morbi & symptomata res contra naturam, quia è diametro pugnant cum natura humana. Quarta *ὁρμητικὴ* dicitur, quae ex certis signis artificiosa quadam conjectura, praeteritum, praesentem & futurum corporis nostri statum cognoscere ac praedicere potest. Quinta *θεραπευτικὴ*, quasi dicas Medica, trix, nominatur, quae rationem curandorum morborum & symptomatum praescribit, & quia omnis curatio per tria perficitur instrumenta, trifariam hac ipsa dividitur, in χειρουργικὴν, id est manualement curacionem, in αἰσθητικὴν, id est in curacionem per victus rationem, & in φαρμακευτικὴν, id est, medicamentorum administrationem.

II. Circa corpus sive humanam naturam quae res sunt consideratu necessariae?

Universa materia Medica, quibus Medici, tanquam medius, cum in conservacione,

tum in instauratione sanitatis utuntur, in classes sunt distributa, ad quas quasi locos communes quicquid ad artem spectat, referri debet, quae Medico studiosè sunt observanda, in Res Naturales, non Naturales & Res contra Naturam vocatas. Res Naturales, sunt ex quibus humana natura est extracta & compacta, quae φυσιολογικῇ prima parte artis Medicae explicantur. Res non Naturales, quas Galenus causas naturae conservatrices & alteratrices vocat, quae quidem in compositionem humanae naturae non ingrediuntur, attamen sine earum apta usurpatione natura conservari nequit: haec in ὑγιεινῇ secunda parte Artis enumerantur. Res contra naturam quae è diametro pugnant cum humana natura, eamque destruunt & opprimunt, quarum noticia ex tertia Medicinae parte παθολογικῇ petenda est. Sunt autem in universum haec res quasi objecta Medicorum XVI. ut sequens ostendit Tabella.

Tabella materiae Medicae, sive rerum circa hominis naturam versantium.

Res circa humanam Naturam consideranda sunt XVI. quarum alia dicuntur	Res Naturales,	Elementa, Temperamenta, Humores, Partes corporis, Spiritus, Potentia, Actiones.
	Res non naturales,	Aër ambiens, Cibus & potus, Somnus & vigilia, Motus & Requies, Excretio & Retentio.
	Res contra naturam,	Animi παθήματα, Causa morbifica, Morbi, Symptomata.

12. Quid vocant Medici naturam?

Natura vocabulum varia obtinet significata; Nonnunquam enim significat ipsam Temperiem, ut Natura aetatis est calida & sicca: quandoque significat ὁρμητικὸν impetum,

& propensionem animi, ut Ajax est natura iracundus: aliquando significat peculiarem constitutionem sive ιδιοσυγκρασίαν id est proprietatem, ut quidam naturam abhorrent ab usu vini: nonnunquam significat calorem in-

natum seu virtutem naturalem, ut natura e-
patis est generare sanguinem. Sed generalissime
significat universam substantiam ex mixtura
elementorum productam, attestante id Galeno
lib. 3. cap. 8. de temperamentis, ubi inquit,
Naturam cum dico universam substantiam
ac temperiem, qua ex primis elementis con-
flatur calido, frigido, humido & sicco, signi-
fico.


SECTIO II.

De

ELEMENTIS.

I. Quid est Elementum?

Elementum, juxta Autorem definitio-
num Medicarum cap. 2. est, ex quo pri-



Elemen-
ta secun-
daria.

Posteriora duo Elementorum genera & se-
cundaria & sensu perceptibilia dici possunt,
quia ex primis & communibus mundi Ele-
mentis suam habent essentiam. Porro quatuor
humores, Sanguis, Pituita, Flava & Atra
bilis, ideo Medicis Elementa animantium san-
guine praditorum vocantur, quia hi humo-
res in semine parentum potentia insunt, &
ex his quasi ex elementis omnes partes in utero
conservantur. Similares verò partes, ossa,
cartilagines &c. eam ob causam Elementa
corporis nostri vocant, quia omnia reliqua

mo & simplicissimo omnia corpora facta sunt,
& in quod simplicissimum rursum omnia re-
solvuntur: vel secundum Galenum lib. 8.
de Hippocratis & Platonis placitis, est mini-
ma pars ejus rei cujus est Elementum.

2. Quot sunt Elementorum genera apud
Medicos?

Galenus lib. 1. cap. 4. de Elementis, tria Elementa
enumerat Elementorum genera, Elementa triplicia.
mundi, sive omnium rerum communia:
Elementa animantium sanguine pradito-
rum: & Elementa corporis nostri pro-
pria, qua in sequenti Tabella comprehen-
duntur.

membra organica ex his sunt composita, & si
resolvantur dissecando, in easdem resolvun-
tur.

3. Elementa quid differunt à principiis?

Trifariam differunt Elementa à principiis. Differen-
I. Principia, videlicet Materia & Forma, in-
corporea sunt, qua singula per se vixime con-
sistunt, concursione autem sua, corpora sim-
plicia seu elementa constituunt. Est enim ma-
teria prima omnium elementorum subjectum,
cui si accedat forma, id est summa caliditas,
ignem; si summa humiditas, aërem; si sum-

ma frigiditas, aquam; si autem summa siccitas, terram constituunt. Elementa autem sunt corpora simplicissima, quatuor summis qualitatibus imbuta. Nihil enim calidius igne, nil humidius aëre, nil frigidius aqua, nil siccius terra. II. Differunt, quia materia est ingenerabilis & incorruptibilis. Elementa verò generantur, alterantur & corrumpuntur. III. Materia non est ejusdem generis cum eo cuius est materia, sed elementa sunt partes ejusdemque generis cum eo cuius sunt Elementa.

4. Cur Medici non à principiis, quemadmodum Physici, suam ordiuntur doctrinam?

Medici sunt artifices sensitivi, & circa sensibilia tantum versantur. Idè exiles de principiis disputationes, utpote cuius nulla sit utilitas, nec ad conservationem, nec ad instaurationem sanitatis, negligunt, & ab Elementis qua in humano corpore sensibilibiter percipiuntur, suam auspiciantur doctrinam. Id quod Galenus lib. 5. de Hippocratis & Platonis placitis disertè testatur, inquit: Hippocrates ne elementa quidem nominavit, sed tantum ex eorum concursu & confusione corpora oriri asserit, nilque ultra hac, cum nulla id postularet necessitas, sibi progrediendum putavit, quippe qui activam solum, speculativam minimè tractaret. Satis esse igitur judicavit ad sanitatis conservationem, morborumque medelam, si cognoscamus ex calidi, frigidi, humidi & siccici temperatura sanitatem effici, ex horum contrà intemperie morbos animalibus accidere. Avicenna prima Fen. lib. I. Vtrum, inquit, sint vel non sint principia, non interest Medico, sed debet in hac parte credere Physica sapientia.

5. Possuntne sensu deprehendi Elementa in corpore humano?

Elementa quatenus sunt pura & simplicissima corpora, sensu dejudicari non possunt, nec talia in corporibus mixtis reperiuntur, sed quatenus sunt inter se confusa & mixta, ex eorum qualitatibus sensu tactus facile deprehenduntur. Caliditas enim & levitas ignem; humiditas & penetrabilitas aërem, frigiditas & maditas aquam, siccitas & gravitas ter-

ram in corporibus inesse arguit. Sincera tamen esse uspiam Elementa, ex quibus hac impura sive mixta profluxerunt, minime negandum est.

6. Quæ qualitates sunt singulis Elementis propriæ?

Indidit Deus in prima creatione singulorum Elementorum substantiis binas qualitates, propriam & excellentem unam, qua speciem corpori Elementari largitur, & communem ac remissam alteram, per quam quodlibet Elementum faciliè transmutatur in vicinum. Igne inest extrema caliditas, & remissior siccitas: in aëre inest summa humiditas & remissa caliditas: aqua inhaeret excellentissima frigiditas & remissior humiditas: terra verò est siccissima, sed remissa frigida. Igne Nexus e- & aëri communis est caliditas: aëri & aqua humiditas; aqua & terra frigiditas; terra & igni siccitas. Per eas communes qualitates facilis fit unius Elementi in alterius vicini naturam transmutatio, qua causa est generationis & corruptionis. Difficile verò conjunguntur & transmutantur Elementa qua ambobus qualitatibus inter se pugnant; ut ignis & aqua pugnant inter se caliditate & frigiditate, siccitate & humiditate, aër & terra humiditate & siccitate & frigiditate.

7. Elementa quomodo constituunt corpus humanum?

Mixtione. Ex convenienti enim quatuor Mixtio quid. Elementorum commixtione, ut alia omnia, ita etiam corpus humanum constituitur, & per resolutionem in eadem resolvitur. Est autem mixtio diversorum Elementorum, seu rerum missibilium per alterationem & confusionem in unum corpus concretio. Fit autem mixtio quando Elementa alterata & contemperata & ad mediocritatem ac certam proportionem mutua actione & passione qualitatum reducta sunt, & ex eis pro ratione mixtionis unum aliquod singulare corpus, quod nec ignis, nec aëris, nec aqua nec terra formam refert, producitur. Oportet autem Elementa miscibilia qualitatibus paribus quodammodo concurrere & inter se certa mixtione pugnare.

8. In mixtione Elementorum & productione corporis humani, substantiæ Elementorum an qualitates tantum totis totæ miscentur, & utrum manent substantiæ Elementorum in corpore humano?

Elementa
quomodo
in mistis.

Variant sententia Autorum in hac questione; sed doctissimi quique Medici, inter quos est Fernelius & Montanus, substantias quidem Elementorum in minutissimas partes quas in farinam per alterationem distrabi, & inter se continua appositione connecti, sed totas totis misceri minime posse ajunt, qualitates vero eorum totas totis consummatissime permisceri & per totius compositi molem aqualiter distendi afferunt. Manent itaque in corporibus Elementorum substantia, sed in minutissimas partes & quasi in farinam contracta, & rursus sibi invicem apposita & unita ac quasi intercepta mutata qualitatibus pugnantiæ, ita ut pristinas suas vires exerere minime queant. In corporibus enim nostris nec ignis urit, nec aqua refrigerat, sed sola potentia in mixtis remanet.

9. Quam utilitatem præstat Medico doctrina de Elementis?

Utilitas
Elementorum.

Ut inde cognoscat quæ sint principia corporum.

ris humani, & ad legitimam ac convenientem Elementorum in corpore temperaturam, consequi sanitatem, ex eorum vero vitiosa & depravata mixtione morbos accidere.

SECTIO III.

De TEMPERAMENTO.

Secunda res Naturalis sive quæ ad constitutionem humanam natura requiritur, est Temperamentum, quod soboles, & propago est mixtorum inter se Elementorum.

1. Quid est Temperamentum.

Keioris, Temperies seu Temperamentum sive complexio est conveniens quatuor Elementorum, seu calidi, humidi, frigidi & sicci commixtio: Si ve potius est harmonia quatuor primarum qualitatum ex convenienti Elementorum mixtione orta.

Temperamentum
quid.

2. Ex quatuor Elementorum commixtione in corporibus quot oriuntur Temperamentorum species?

Ex elementorum aptâ analogâ commixtione novem in universum oriuntur temperamentorum differentia, unum temperamentum, & octo distemperata, ut sequens tabella ostendit.

Temperamenti
prima
differentia.

Tabella I. Temperamentorum.

Ex mixtione 4. elementorum, 9. resultant temperamentorum species,	Unum Temperatum, quod est temperatum ad pondus, seu secundum aliquam mensuram qualitatum ad justitiam seu naturam corporum convenientiam.	
	4. sunt simplicia,	Calidum, Frigidum, Humidum, Siccum.
		Calidum & humidum, Calidum & siccum, Frigidum & humidum, Frigidum & siccum.
	Octo Distemperata, quorum 4. sunt composita,	

Tabella II. Temperamentorum.

Corpora humanum	Calida, Humida, Frigida, Sicca,	duobus modis dicuntur,	I. Absolutè, id est ad nullum corpus collata, sed per se considerata.
			II. Per collationem ad alia corpora ejusdem vel alterius generis ac speciei.

3. Humanum corpus quot modis dicitur temperatum?

Corpus temperatum, Græcis ὁμοιογενὲς & ὁμοιομεγέθες, duplici ratione dicitur, temperatum ad pondus.

Temperamentum
ad
pondus.

tum ad pondus, & temperatum ad iustitiam. Temperata ad pondus dicuntur corpora, in quibus prorsus aequalis est omnium quatuor qualitatum mensura, nec alia qualitas excellit aliam. Sed tale corporis Temperamentum cogitatione potius imaginari potest, quam quod revera existat, momentaneum est tantum teste Galeno lib. I. de Temperament.

Temperata ad iustitiam.

Temperata ad iustitiam sive ad naturam convenientiam dicuntur corpora in quibus non est præcisè aequalis qualitatum mensura, sed talis est proportio in mixtione, qualis singulorum rerum corporibus convenit, non obstante, si alia qualitas aliam excedat, modo talis sit harmonia earum, ut natura corporum convenientes edere queat actiones. Et ita homo temperatus dicitur, si sanitate illa se fruatur & partes singulae corporis suas operationes inculpate perficiant. Sic serpens animal frigidissimum, si inculpate serpat, temperatus est ad iustitiam, quia exuberans ejus frigiditas natura serpentis convenit. Et si itaque omnium hominum corpora ab aequali pondere Temperamenti recesserunt, alia magis, alia minus, & alia in caliditate, alia in frigiditate, humiditate, siccitate, excellent, tamen donec salubria sunt & inculpata edunt actiones, temperata ad iustitiam sunt & dicuntur. Illa tamen magis sunt temperata, & magis salubria, quae propinquius accedunt ad Temperamentum aequalitatis.

4. Quot sunt Temperamenta distemperata, & quot modis dicuntur corpora distemperata?

Temperamenta distemperata 8.

Octo sunt temperamenta corporum quae distemperata dicuntur, quatuor simplicia, calidum, frigidum, humidum & siccum: & quatuor composita, calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum: ex quarum qualitatum distemperantia, omnia corpora omnium hominum temperamenti sui denominationem habent, ut alia calida, alia frigida, alia humida, alia sicca, dicantur; Bifariam autem talia dicuntur corpora, absolute, id est, per se considerata, & per collationem cum aliis corporibus ejusque generis & speciei,

ut corpora masculorum calidiora sunt corporibus foeminarum.

5. Corporisne universi, aut partium tantum Temperamenta Medico sunt cognoscenda?

Primum totius corporis idcirco cognoscenda, id est propria & congenita temperies, deinde & principalium ac similarium partium Temperamenta Medico futuro sunt probe cognoscenda, qui velit artificiose sanitatem similibus conservare, & morbos contrariis fugare, & singulis partibus convenientia pharmaca applicare, congenitam verò singularum partium Seriem sequens proponit Tabella.

Tabella III. Temperamentorum.

Calida,	Cor,
	Caro,
Frigida,	Epar,
	Lien,
Humida,	Renes,
	Adeps,
Sicca,	Pinguedo.
	Cerebrum,
Cutis partium corporis temperatissima ad illam, alia sunt comparate	Spina medulla,
	Membrana,
Humida,	Nervi,
	Vena,
Sicca,	Arteria,
	Ligamenta,
Humida,	Cartilago,
	Ossa.
Sicca,	Cor,
	Caro,
Humida,	Epar,
	Lien,
Sicca,	Renes,
	Pulmo,
Humida,	Cerebrum,
	Spina medulla,
Sicca,	Testes,
	Pinguedo.
Humida,	Nervi,
	Vena,
Sicca,	Membrana,
	Tendines,
Humida,	Ligamenta,
	Cartilago,
Sicca,	Ossa.

Similarium partium temperamenta.

Orga-

Organica-
rum par-
cium tem-
peramen-
ta.

Organicarum compositarumque partium temperamenta, ex similarium, è quibus sunt constructa & commoderata, temperamento a-
stimanda erunt: Ut ventriculus & intestina sunt temperamento frigida & sicca, quia magna ex parte constant ex membranis & nervis. Musculorum temperamentum est calidum & humidum, quia constant ex carne & venis: Aures & nares sunt temperamento frigida & sicca, quia constant magna ex parte ex cartilagine & membranis.

6. Ex quibus indiciiis Temperamentum totius corporis est cognoscendum?

Triplex
iudicium
tempera-
menti
corporis.

Primum ex cutis constitutione; ἡ ὁμοεικότως enim, id est optimè temperatum corpus cutem habere debet medio modo constitutam, qua neque sit densa, nequerara, neque dura, neque mollis; nec hirsuta nec prorsus glabra, & qua apta est ad externas injurias tolerandas. Secundo ex inculcata actione; Temperatum enim corpus aptissimum est ad omnia munia & officia peragenda. Tertiò ex moribus, Temperata siquidem corpora moribus sunt quoque temperatissimis & amabilibus. Qua verò corpora à puncto temperati temperamenti, vel in caliditate, vel frigiditate, humiditate vel siccitate longius recesserunt, id vel ex tactu vola manus deprehendere licet, vel ex habitu corporis: ἡ ὁμοεικότως enim siue carnosa corpora calida sunt, obesa & pingua frigida, gracilia & tenuia calida & sicca: Vel ex motu & actionibus; Celeritas enim in motu calidam, tarditas & segnities frigidam corporis intemperiem ostendit, humiditas hebetat actiones, caliditas verò acuit: Vel ex humoris in corpore exuberantia; Sanguinea enim corpora calida sunt & humida; pituitosa, frigida & humida; biliosa, calida & sicca; melancholica, frigida & sicca. A colore autem corporis, redundantia potius humoris in corpore quam ipsum temperamentum ostenditur.

Vide Ga-
leni ar-
tem Me-
dicina-
lem.

7. Ex quibus indiciiis principalium partium temperies est iudicanda?

Signa
tempera-
menti
partium

Principalium partium, cerebri, cordis, epatis, ventriculi, adeoque omnium organorum ὁμοεικότως seu bona temperies ex propriis functionibus dignoscitur. Qui enim bene ra-

tiocinatur ac iudicat & omnes sensus habet principia inculpatos, is cerebri bonam habet temperiem. pum.

Sic bona concoctio & transmutatio alimenti in chylum, ventriculi; & chyli proba conversio in sanguinem, epatis demonstrat convenientem temperiem: ita & de aliis organis ex inculcata actione est iudicandum.

8. Potestne congenita Temperies corporum immutari?

Et si Temperamenta corporum subinde à variis causis à sua commoderatione decedant & immutentur, tamen insita cuiusque temperamenti reliquia semper manent in corporibus; & ex quavis levi occasione ad eam rursus redire corpora possunt. Hinc est quod Hippocrates secundo Aphorismis. 25. dicit, per morbos minus periclitari eos quorum natura id est. Temperamento morbus convenit, quam quibus non convenit.

9. Quibus potissimum ex causis immutantur Temperamenta corporum congenita?

A nativo temperamento recedunt & immutantur saepe corpora variis ex causis tum internis tum externis, in quibus sunt, victus ratio, animi perturbatio, aëris ambientis constitutio, genus vitae seu exercitium, regionum diversitas, anni partium constitutio & aetas. Nam à pleniore cibo & vini assidua potione, ab exandescencia, ab aestu ambientis aëris, à laborioso vita genere, calidiora evadunt corpora etiam si sint frigidiora, & ex contrariis causis refrigerantur calidiora; qua tamen temperamenti mutatio facile rursus redit ad congenitam temperiem.

Qua tem-
peramen-
tum red-
dunt cali-
dus &
frigidus.

Verum quae ex constitutione partium anni, ex regionum natura, & ex humoris cuiuspiam in corpore redundantia oritur temperamenti mutatio, durabilior est. Omnium autem stabilissima & permanens sit Temperamenti mutatio, quae per aetatem differentias in corpora irrepit, adeo ut ea nulla arte nullaque industria rursus in priorem statum congenitè temperamenti reduci queat.

10. Quomodo mutantur Temperamenta corporum per partes Anni?

Quatuor sunt anni partes temperamenti Anni inter se differentes, Ver, Galeno temperatum, pora ut aliis

immutent
corporis
tempe-
riem.

aliis calidum & humidum, *Æstas calida & sicca, Autumnus frigidus & siccus* sed inaequaliter, *Hyems frigida & sicca*. Corpora itaque in vere sunt temperata: in *Æstate* vero exteriores corporis partes sunt calida, interna vero frigida: in *Autumno* sunt intemperata ad frigiditatemque magis declinantia: in *Hyeme* contrario modo habent quam in *æstate*. Externa enim partes frigent, interna vero sunt calida.

II. Quomodo mutantur corporum Temperamenta per Regionum varietatem?

Homi-
num tem-
peramen-
ta pro lo-
corum va-
rietate
immutan-
tur.

Temperamenta corporum mutantur & per varietatem regionum, idque potissimum ratione constitutionis aëris. In regionibus Temperatis, veluti sunt *Asia, Gracia & Italia*, corpora sunt magis temperata, & ideo, teste *Hippocrate*, omnia nascuntur majora & pulchriora & hominum mores sunt mitiores & ingenia ad studia literarum aptiora. In frigidis autem regionibus quales sunt *Gallia, Germania & loca Septentrionalia*, hominum corpora sunt frigidiora, mollia, alba, & glabra, quorum exteriora facile frigent, interiora vero intense calent. Hinc homines ibi sunt moribus ferociiores & animosiores. In calidis vero regionibus quales sunt *India, Aethiopia*, corpora sunt calidiora & torridiora, parva, gracilia, aspera, nigra, & crispâ, *Hippocrates* in lib. de Aëre loc. & aq.

12. Quomodo mutantur Temperamenta corporum ex redundantia humoris cuiuspiam?

Corpora in quibus redundat sanguis, calida sunt & humida; in quibus bilis flava, calida & sicca; in quibus putuita, frigida & humida; in quibus melancholicus humor, frigida & sicca.

13. Per ætates quomodo mutantur corporum Temperamenta?

Ætatis
mutatio
tempera-
mentum
immutat.

Ætas, id est vita curriculum usque ad extremum Spiritum per suas partes manifeste humani corporis constitutionem per se suoque motu mutat, & nec impediri, nec prior constitutio vel temperies corpori ulla arte restitui potest. Sunt autem hominum corpora à primo ortu humidissima & moderate calida, qua

humiditas in corporibus usque ad ultimam senectam sensim decrescit, eique siccitas major atque major succedit. Calor vero primogenitus usque ad consistentem ætatem crescit & augetur & ab ætate rursum ad vitæ terminum paulatim decrescit, cui succedit augeturque frigiditas. Et ita in Exordio vitæ corpora sunt humidissima & calida, in decrepita vero ætate sunt siccissima & frigida, donec mors irrepit. Sunt autem ætatum differentia siue partes, quæ singula diversos gradus temperamenti corporibus inducunt, si rectè perpendantur vel ex *Galenii* sententia numero 9. I. Infantia, Gracis νηπιότης τῆς νεότητος, quæ durat à primo ortu usque ad quartum annum, in qua corpora sunt humidissima & moderate calida. II. Est pueritia, Gracis ἰλιξία παιδων, quæ durat ad decimum quartum usque annum, in qua corpora sunt paulo calidiora & paululum humidiora quam in Infantia. III. Est Pubertas, Gracis ἡβη. Hæc durat ab anno decimo quarto ad decimum octavum usque annum, constituta corpora in ea ætate sunt minus humida, sed calidiora quam in præcedentibus ætatibus. IV. Est Adolescentia, Gracis πρὸς ἡβη, quæ protrahitur ab anno decimo octavo usque ad vigesimum quintum: in eâ corpora sunt calidiora, sed minus humida quam erant in Pubertate. V. Est Iuventa, Gracis ἀκμὴ νεότητος, unde & ἀκμὴ, id est florens & vigens ætas, quæ ab anno vigesimo quinto incipit & durat ad annum trigessimum quintum: in eâ calidiora sunt & minus humida corpora quam in præcedentibus. VI. Est constans, subsistens & media ætas, Gracis ἡγεμονία, quæ durat à 35. anno, usque ad 50. corpora in ea sunt in humiditate & siccitate temperata, sed caliditas paulo excellit frigiditatem, in fine huius ætatis vires decrescere incipiunt. VII. Est ætas ingravescens, Gracis ἀνενεργότης, quæ protenditur ab anno 50. usque ad 60. in ea constituta corpora moderate frigida sunt & sicca. VIII. Est senectus, Gracis γερωνία seu νεκροβυτία, quæ incipit à 60. & durat ad 70. usque annum: corpora in eo constituta jam sensibilibiter frigida sunt & sicca. IX. Et postrema ætas, Decrepita durat à 70. anno usque ad finem

Vide Gal.
l. 2. de
Tempe-
ram.

finem vita, in eo constituta corpora sunt frigidissima & siccissima.

14. Temperamenta Corporum habentne aliquam vim in regendis motibus?

Mores sequi corporis temperamentum.

Galenus disertè docet lib. cui Titulum fecit, Quod animi mores sequantur corporis Temperiem, & bonos & vitiosos mores oriri ex corporis Temperie, ita enim inquit, Quemadmodum ex cibo & potu & quotidianis exercitationibus bonam corporis conciliamus temperiem, sic etiam ex bona temperie ad virtutem animi comparandam plurimum emolumenti acquirimus. Nam & Plato humiditatem cerebri amentia siccitatemque prudentia causam esse dicit. Et paulo post: Ex vitioso corporis habitu agrotare animam lucet clarius in Melancholica insania & furoribus apparet.


SECTIO IV. De HUMORIBUS.

Humores in corpore humano sunt *tertia* Natura res quæ ad constitutionem humana natura requiruntur, quos Hippocrates contenta vocat. Totam enim naturam humanam ex tribus constare ait, ex continentibus, contentis, & motum sive impetum facientibus. Per continentia intelligit solidas corporis partes, per contenta humores, & per motum sive impetum facientia Spiritus & animam, lib. 6. c. 8. Epidemiorum, t. 19.

1. Quid sunt Humores?

Quicquid in corpore humano liquidum profluensque continetur, id omne ὑγρὸν, latinis humor nominatur. Differunt autem inter se humores corporis in genere & specie, ut tabella subjuncta ostendit.

TABULA HUMORUM CORPORIS HUMANI.



Humorum in corpore humano tria

habent

habentur
genera:
sunt enim
vel

II.

Alimentarii,
qui ex ali-
mentis in-
tra corpus
assumptis
generantur:
& sunt aut

{	Natura- les in ve- nis con- fusi, &	{	Sanguis,	{	Ex natu- ralibus humori- bus ante quam fiat instru- mentum, sunt se- cundarii humores,	{	Sine nomine, seu o- leaginosus, Roridus, Gluten, Cambion.
	sanguini- nis no- mine continen- tur: ut		Pituita, Flava bilis, Atra bilis.		instru- mentum,		

Prater-
natura-
les &
morbifi-
ci: ut

{	Sanguis	{	Putrescens Serosus Pituitosus Bilius	}	in venis.
{	Pituita	{	Acida Salsa	}	in venis,
{	Bilis flava	{	Cruda in cerebro, Vitrea Gypseae	}	in Articulis.
{	Bilis atra	{	Adusta Pallida Vitellina Porracea Æruginosa Cærulea	}	in Epate,
{	Bilis atra	{	Sanguinis Flava bilis Atra bilis	}	per aduersionem in ortu.

III.

Excrementi-
tii, qui ex
alimenta-
riis secer-
nantur, &
sunt aut

{	Vtiles,	{	Bilis flava in propria vesicâ, Bilis atra in liene, Saliva in tonsillis & faucibus, Lac in mammis.	}	
{	Inutiles,	{	Sudor, Urina, Mucus narium, Sanguis menstruus, Pituitosa excrementa, colle- cta in	}	Cerebro. Ventriculo, Intestinis.

2. Quot sunt humorum Genera in cor-
pore humano?

Tria Humorum genera continentur in cor-

pore humano, humores Elementares, A-
limentarii & excrementitii.

3. Quid sunt Humores Elementares? Humo-
Humores Elementares sunt purissima par-
tes

tes seminis ex elaboratissimo alimentariorum humore orti & in semen commutati: continentur enim in semine parentum una cum spiritu & calido innato quatuor humores, Sanguis, Pituita, Flava & Atra bilis; quatuor Elementis natura respondentes ex quibus tanquam ex elementis omnes corporis partes à natura in utero conformantur. Ex aërea enim seminis portione generantur partes Sanguinea, ut Caro, Cor, Epar, Pulmo, Lien, Renes; ex aquea parte conformantur partes pituitosa, cerebrum, spinalis medulla, nervi, vena, Arteria, membrana; ex terrestri autem seminis parte generantur partes corporis melancholica, ossa, cartilagines, ligamenta & tendines; verum ex ignea seu biliosa parte seminis nullum membrum producitur, sed ejus usus est, ut tenui humiditate ejus, post partium conformationem, omnes particulae illa poliantur & abstergantur.

4. Quid est humor congenitus sive humidum Radicale?

Humidum radicale.

Humidum primigenium seu Radicale Galenus ὕγρον πρῶτον καὶ ἰσχυρὸν φέρεται vocat, & nihil aliud est quam purissima post partium corporis in utero informationem, humorum Elementarium reliquia per totas substantias omnium partium instar purissimi olei diffusa ac dispersa, quae subiectum & pabulum caloris & spiritus innati. Calor autem & spiritus innatus & humidum radicale ab invicem sine interitu animantis separari nunquam possunt. Hujus humidi diminutio est causa senii, consumptio autem causa mortis. Rigatur & foetet humidum radicale humorum secundariorum reliquis, ut audiemus.

Tabella Humorum Alimentariorum & secundariorum.

In venis mixti habentur,	Sanguis,
	Pituita,
	Atra bilis,
	Flava bilis.
Extra venas prolapsi fiunt secundarii humores,	Oleagineus,
	Roridus,
	Glutinosus,
	Cambion.

Mutantur in partium substantias per { Appositionem, Agglutinationem, Assimilationem.

5. Quid sunt Humores Alimentarii?

Alimentarii humores sunt, qui ex assumptis intra corpus alimentis à calore nativo generantur, & simul mixti in venis sub nomine sanguinis eoque visu non nisi sanguis apprehendatur, continentur. Non est enim sincerus sanguis in corpore, sed constat ex quatuor humoribus, substantia, Temperamento & usu differentibus, sanguine, pituita, bile flava, & bile atra. In hac massa & confusione humorum maxima pars sanguis est. Sanguine minor pituita, pituita minor atra in sanguine, omnium minima flava bilis, nutritioni ineptissima. Ex his Humoribus extra venas in partium substantias elapsis, fiunt secundarii humores, oleagineus, roridus, glutinosus, & Cambion, qui triplici ordine per appositionem, agglutinationem & assimilationem transeunt in substantiam partium corporis.

Proportio humorum in sanguine nea massa.

9. Quid sunt humores Secundarii?

Humores secundarii ipsissimi alimentarii Secundarii humores exactissime à nativo calore concocti & ex orificiis venarum prolapsi, partibusque nutriendis appositii, qui, quia antequam in partium substantiam convertantur, quater mutant suam formam, à sanguinis forma: Avicenna, quatuor peculiaria nomina uni & eidem substantia indidit, & humorem sine nomine, Ros, Gluten, & Cambion appellavit. Purissimis reliquiis secundariorum humorum post nutritionem rigatur ac foetet humidum Radicale, & ex iisdem generatur semen in vasis spermaticis.

7. Quae est natura, temperamentum & usus humorum alimentariorum, & quos suo incremento efficiunt mores?

Alex, Sanguis est prior pars sanguinea Humorum massa in venis contenta, temperamento moderate calidus & humidus, aërea natura, colore rubens, sapore dulcis, usus ejus est partes sanguineas nutrire, & vitali spiritui materiam praebeere. In quibus corporibus sanguis excelsit,

Sanguinei
simplices. excellit, in iis efficit mores moderatos ridibun-
des, & reddit homines ingenio simplices &
candidos, corpore autem venustos & floridos.

Φλέγμα, Pituita nihil est aliud quam cru-
dior pars sanguinis quæ apta est ut in sangui-
nem convertatur, temperamento frigida &
humida, aquæ naturam præferens, colore
alba, sapore inspida: usus pituita est ut nu-
triat pituitosas partes, & sit materia sangui-
nis puri, quæ si excellat in venis, efficit ho-
mines segnes, somnolentos, obesos & cito ca-
nescentes, ingenia reddit tarda & hebeta,
cutem corporis albam.

Χολή ζαυρή, bilis flavâ tenuissima & cali-
dissima pars sanguinea massa, temperamento
est calida & sicca, igni respondens, colore fla-
va, sapore amara, usus ejus est ut sanguineam
massam calidiorem retineat & à putrefactio-
ne arceat. (Non enim nutrit bilis.) Quæ si
copia sua naturalem mensuram in venis ex-
cedat, homines efficit cito excandescentes, quo-
rum tamen ira statim mitescit & evanescit,
ingenia sagacia ad artes inveniendas apta
reddit, corpora verò macilentia & hirsuta
efficit.

Μέλαινα χολή sive μέλαινα χυλός, atra bilis
sive succus melancholicus, est crassior sangui-

nea massa pars, temperamento frigida & sicca
terra natura respondens, colore subnigra, sapo-
re acida. Usus ejus est terrestres corporis partes
nutrire & sanguinem & spiritus stabiliores
reddere, quæ si moderatè excellat in venis est
causa sapientia & constantia, sed reddit ho-
mines rigidiores, subtristes & semper alta
meditantes, corpus afficit subnigro colore.

Melan-
cholici sa-
pientes.

8. Qui sunt Humores Præternaturales
& vitiosi in corpore humano?

Vitiosi & præternaturales adeoque morbi-
fici humores, sunt omnes alimentarii humo-
res, & in venis & in aliis corporis meatibus;
si vel naturalem suam qualitatem, id est temperiem
amittant, & calidiores, frigidiores, fluidiores,
liquidiores, densioresque justo evadant, putridique
efficiantur, vel ubi quantitate ultra justam natura-
que sua convenientem proportionem augentur vel
omnes simul, vel singuli per se, quorum si u-
nicus excedat naturalem quantitatem & mensuram,
corpus efficit κακὸν χυμὸν, id est κακὸν χυμὸν
mali succi: si omnes simul increcant, cor-
pus reddit πολλὸν χυμὸν, id est humoribus re-
dundans. Præternaturalium humorum diffe-
rentias & in quibus generentur locis, sequens
tabella proponit.

Humores
morbifici.

Tabula Humorū vitiosorum.

Humores præ- ternatura- les	Sanguis	{	Putrescens	}	in venis.		
			Serosus				
			Pituitosus				
			Biliosus				
			Melancholicus				
	Pituita	{	Acida	}	in venis.		
			Salsa				
			Cruda	}		in cerebro.	
			Vitrea				
			Gypsea				}
Flava bilis	{	Pallida	}	in Epate.			
		Vitellina					
		Adusta					
		Porracea	}		in ventriculo.		
		Æruginosa					
Carulea	{	Sanguinis	}	in venis per adustionem.			
Atra bilis						Flava bilis	
						Atra bilis	

B 3

Humores
excre-
mentitii.

Qui sunt excrementitii Humores?
Excrementitii humores sunt, qui ab hu-
moribus alimentariis in purificatione eo-
rum, veluti superfluitates in peculiaria re-

ceptacula segregantur, ac deinde virtute ex-
pulsiva partium ex corpore excutuntur,
quorum differentias sequens tabella ob ocu-
los ponit.

Tabella Humororum excrementitiorum.

Humores Ex- crementitii sunt aut	Uiles,	<p>Bilis flava in viscula fells,</p> <p>Atra bilis in splene,</p> <p>Saliva circa tonsillas,</p> <p>Lac in mammis.</p>
	Inutiles,	<p>Sudor,</p> <p>Urina,</p> <p>Pituitosum excrementum in</p> <p>Sanguis Menstruus.</p>

cerebro,
ventriculo,
intestinis.

SECTIO V. DE PARTIBUS COR- PORIS HUMANI.

Quarta res naturam humanam consti-
tuens, sunt partes humani corporis, qua ut
paulo ante dictum est, in conformatione nostri
ex humoribus Elementariis, qua in paren-
tum semine potentia continentur, in utero ge-
nerantur ac succrescunt, & sua connexion-
e integrum corpus constituunt.

1. Pars humani corporis quid est?

Pars quid
Mig. pars, membrum, locus, orga-
num, synonyma sunt: Est autem pars huma-
ni corporis, corpus toti cohaerens communique
vita conjunctum ad totius corporis usum
& ad aliquam actionem perficiendam compa-
ratum. Proinde nec sanguis nec humores re-
liqui in venis, nec spiritus vitales in arteriis,
nec adeps, nec pili, nec unguis proprie partes
dici possunt, Fernelio auctore.

Vide Scal.
exerc. 280
d. 2. qui
spiritus
Partes esse
vult.

2. Corpus humanum quotuplitter di- viditur in suas partes?

Univerſum corpus tripliciter in suas partes
dividitur. Primum dividitur in partes simi-
lares seu simplices, & dissimilares seu compo-
sitas seu organicas. Secundo dividitur in
partes principales, & partes principalibus
subservientes. Tercio dividitur in tres ma-

gnas cavitates seu capacitates & Artus sive Partium
extremitates. primæ
differen-
tia.

3. Quæ sunt partes similes & quæ dis- similares?

Partes similes sive simplices, Græcis ομοιο-
μετεις, quas Galenus sensibilia corporis E-
lementa vocat, sunt quæ in similes sibi partes
semper dividuntur, id est, quarum singula si
in partes dissecantur, qualibet particula ean-
dem habet substantiam, naturam, & appel-
lationem cum suo toto. Dicuntur & prima
partes, quia hæc in corporis conformatione pri-
mum ex semine producuntur, & tandem ex
earum compactione omnes alia dissimilares
partes generantur. Sunt autem partes simila-
res in universum numero decem, Vena, Ar-
teria, Nervi, Ligamenta, Tendines, Mem-
brana, Cartilagines, Ossa, Caro, Cutis. Dis-
similares sive compositæ partes, Græcis ετερο-
μετεις & ἀεργαίαι μετεις, id est diversi gene-
ris & instrumentales partes sunt omnes reli-
quæ corporis partes quæ ex similibus enu-
meratis sunt compositæ, quæ non possunt dis-
secari in similes sibi ipsis partes, neque reti-
nent naturam ac nomen totius cum dissecan-
tur, ut manus, pedes, facies &c. quæ si di-
vidantur, earum partes non sunt nec dicun-
tur manus, pedes, facies &c.

Partes si-
miles.


Dis-simila-
res.

4. Quæ sunt partes principales, & quæ eisdem ministrantes?


Partium instrumentalium quatuor sunt
princi-

Principales, ut Cerebrum, Cor, Epar & Testes, quibus alia quatuor quasi administrant subseruiunt, Nervi, Arteria, vena & vasa spermatica. Cerebrum est principium & sedes Anima ratiocinatrix spiritus animalis & potentiarum, Intellectiva, Locomotiva & Sensitiva, cui nervi ex eodē orti subseruiunt. Per nervos enim ex cerebro deferuntur Spiritus Animales ac vis movendi & sentiendi in omnes corporis particulas. Cor est principium ac fons vitæ & spirituum vitalium sedes, quod per arterias quæ ex corde originem ducunt tanquam administrans, omnes corporis particulas calefacit, fovet, vivificat, & spiritui vitali perfundit. Epar est principium & domicilium spirituum naturalium & potentia vegetativa, officina sanguinis, ex quo producantur vena in omnes corporis partes distributa, per quas Epar sanguinem tanquam per canales ad irrigandas & nutriendas omnes corporis partes distribuit. Testes sunt præcipua organa generationis, ideo iure inter partes principales numerantur; in his enim elaboratur & conficitur semen, sine quo nequit fieri speciei propagatio. His subseruiunt vasa spermatica, quæ nihil aliud sunt quam vena & Arteria simul conjuncta & ad utrumque testiculum protensa, quæ oriuntur ex majusculis ramis vena cava & arteria magna renibus implantata, & quasi ministra, deferunt elaboratissimum & Spiritu repletum sanguinem ad testes, qui est materia seminis.

1. Tabella partium corporis humani divisionis primæ.



2. Tabella partium secundæ divisionis.



3. Ta-

3. Tabella partium tertiæ divisionis.

Corpus humanum dividitur in quatuor summas & maximas partes, reliquas omnes in se complectentes,

Caput,
Thoracem,
Ventre[m],
Artus.

4. Tabella subdivisionis quatuor maximarum partium humani corporis.

Capitis partes

Exteriores,

Caput,
Vertex,
Sinciput,
Occiput,
Tempora,
Frons,
Facies,
Gena,
Oculi,
Palpebrae,
Cilia,
Supercilia,
Nasus,
Aures,
Labia,
Os,
Mentum.

Interiores,

Pericranion,
Calva,
Sutura,
Meninges,
Cerebrum,
Cerebellum,
Ventriculi cerebri,
Plexus retiformis,
Vena choroides,
Nervi & processus
inferiores,
Palatum,
Fauces,
Lingua,
Columella,
Tonsilla,
Maxilla,
Dentes,
Gingiva.

Thoracis partes

Exteriores,

Cervix,
Thorax,
Dorsum,
Spina dorsa,
Vertebrae,
Os sacrum,
Lumbi,
Iuguli,
Scapulae,
Sternum,
Mammilla granata,
Costae.

Interiores,

Larynx,
Gula,
Aëria arteria,
Pulmo,
Pericardium,
Cor,
Arteria,
Mediastinum,
Diaphragma,
Pleura.

Ventris partes

Exteriores,

Abdomen,
Venter,
Umbilicus,
Ilium,
Inguina,
Pubes,
Testes,
Pudendum.

Ventris

Ventricis
partes

{ Interiores,

Peritoneum,
Omentum,
Intestina,
Ventriculus,
Mesenterium,
Pancreas,
Iecur,
Cystis fellis,
Splen,
Renes,
Vreteres,
Vesica,
Vterus,
Coryledones,
Vasa seminaria.

Artuum
partes,

{ Manuum,

Manus,
Humerus,
Brachium,
Cubitus,
Ulna,
Brachiale,
Summa manus,
Digiti,
Vngues.

{ Pedum,

Pes magnus,
Coxa,
Femur,
Genu,
Poples,
Patella,
Sura,
Crus,
Tibia,
Malleoli,
Talus,
Pes minor,
Calcaneum,
Planta pedis,
Digiti.

stantiam, quantitatem, figuram, situm,
connexionem, numerum, temperamentum &
usum.

6. Da breuem explicationem similium partium.

Φλέβες, vena sunt corpora rotunda & instar canalis cava substantiam suam ex unica fibrosa tunica habentia. Venarum in corpore quatuor sunt genera origine & officio differentia: Vena cava, vena porta, vena arteriosa, & vena umbilici. Vena cava ex confluxu venarum capillarium, quibus substantia Epatis est referta, ex convexa parte Epatis oriitur, & instar trunci arboris exsurgit, & prodiens ex Epate primum duos insignes ramos, ad singulos renes unum, qui vena emulgentes dicuntur, extendit, ex quibus vasa seminaria dicta oriuntur.

Deinde reliqua pars trunci vena cava septum transversum perforans ad cor ascendit, in ejusque dextrum thalamum ramum magnum & conspicuum infigit, ac tandem sursum ad jugulos repens iterum in duos ramos scinditur, quorum alter recurvatur per spinam dorsusque ad plantam pedis deorsum repit, in omnesque partes dorso & interiores & exteriores innumerabiles surculos distribuit: Alter vero ramus circa jugulum rursum in plures propagines divisus partim in caput, partim in brachia, partim in pectus & in pectore contenta viscera surculos suos mittit; harum officium & utilitas est sanguinem ex Epate ad omnes partes sibi coherentes vehere.

Secundum venarum genus est vena porta, Vena porta similis est trunco radicum arboris; hac ex concava parte Epatis ex confluxu venarum capillarium prodiit ac deorsum tendens ramos omnibus visceribus infra diaphragma contentis, veluti sunt ventriculus, omentum, intestina, Lien &c. communicat. Earum officium est sanguinem in partes subjectas vehere: verum surculi vena porta qui in mesenterium & intestina sunt distributi & implantati, & qui vena Mesaraica dicuntur, praeterquam quod sanguinem vehunt, id quoque est earum officium ut χυλόν, materiam sanguinis

Observanda in singulis partibus.

5. In consideratione partium quae sunt observanda?

In partium corporis humani tam Exteriorum quam Interiorum contemplatione observabunt Tyrones singularum partium sub-

Mesaraicae.

guinis ex ventriculo & intestinis ad Epar deferant.

Vena arteriosa.

Tertium genus est vena Arteriosa, quae nullam habet cognitionem cum reliquis venis, sed ex dextro cordis thalamo orta suos ramos in solius pulmonis substantiam distribuit, illique alimentum, elaboratissimum in corpore sanguinem, subministrat; differt à reliquis venis, quia prater aliarum venarum naturam constat duabus tunicis.

Vena umbilicalis.

Quartum venarum genus est vena umbilicalis, quae planè est accidentalis ex alieno corpore in nostrum defixa. Hae siquidem ex venis uteri materni orta, per umbilicum fatus in corpus ejus intrat, & in Epar fatus inseritur, per quam toto gestationis tempore fatus sanguine materno nutritur, cujus in infantibus natis nullus amplius est usus, ideo in progressu temporis in corpore emarcescit & in nervum ligamentum degenerat.

ARTERIÆ.

Αρτηραι sunt canales venis similes, reteres & concavi, quarum substantia constat ex duabus fibrosis tunicis, quarum exterior crassitie est similis venarum tunicis, sed interior quintuplo est crassior. Tribus autem canalium generibus tribuitur Arteriarum appellatio, Arteria magna, quae & levïs dicitur Arteria, Arteria venosa, & Arteria Aspera, quae inter se & substantia origine & officio differunt plurimum.

Aorta.

Arteria magna Gracis Aorta, est tanquam truncus arteriarum, quae ex sinistro cordis ventriculo oritur, & ramos suos venarum ramis quasi conjuges jungit, & per omnes corporis partes distribuit. Harum usus & officium est, spiritum vitalem vita flammulam una cum tenuissimo sanguine ex corde in omnes corporis partes vehere ac diffundere; haec vivente homine semper ad cordis motum pulsant.

Arteria venosa.

Arteria venosa ex concursu ramorum Arteriarum aspera in Pulmone oritur, & in cordis sinistro thalamum figitur; quae prater naturam aliarum arteriarum ex una constat tunica: ejus officium est, aërem à pulmone per asperam arteriam attractum & præparatum

tanquam pabulum spiritus vitalis subministrare, quo & astus cordis mitigatur.

Aspera Arteria, ἀσπείρα ἀρτηρία ex membranis & cartilagineis orbibus & senioribus constat, & fistula figuram refert: ejus caput λαγύνη, id est, guttur nominatur, quae initium sumit à faucibus & per anteriorem cervicis partem in pulmonem descendens ramos duriusculos per substantiam pulmonis distribuit. Ejus usus est, & aërem per respirationem attractum pulmone afferre, & vocis organum esse.

NERVI.

Νόχοι sunt instar venarum & arteriarum oblonga, alba & mutosa corpora, quae duabus tenuissimis membranis ex meningibus ortis sunt vestita. Nervorum duplex est differentia, sunt enim aut molles aut duri, & in universum 37. paria in infinitos ramos dissecta numerantur, quorum 7. paria quae molliora sunt ex cerebro, 30. autem paria duriora ex spinali medulla ortum ducunt. Primum par eorum qui ex cerebro oriuntur, omnium sunt mollissimi & soli carvi esse deprehenduntur, qui in oculos diriguntur, & hinc Nervi optici nominantur. Secundum par ramos suos in oculorum musculos spargit. Tertium par gingivis, dentium radicibus, labris & naribus suos ramos communicat. Quartum par per palati tunicam dispergitur. Quintum par in foramina aurium fertur, & in tenuissimam tunicam extenditur, quae est organum auditus. Sextum par suos ramos in ventriculum, in cor, in pulmonem & thoracis musculos distribuit. Septimum par in lingua musculos divisum est. Reliquorum 30. parium ex foraminibus vertebrarum ortorum rami in omnes proximas sibi partes sparguntur. Omnium nervorum usus & officium est motum & sensum singulis partibus impartiri, id quod Galenus lib. 5. c. 8. de usu partium his verbis testatur: Tres scopi naturæ in nervorum distributione fuerunt; Primus quidem ut instrumentis sensoriis sensum imperaret; Alter ut motoris motum; Tertius ut omnibus partibus quæ sibi dolorem inferunt, sensum suppeditaret.

7. Paria nervorum cerebri. Hisceneo-terici octavum par addunt, quod infertur in processum mammillares, & odoratorii nervi dicuntur. 30. Paria spinæ dorsalis.

Nervorum triplex usus.

7. Quot modis inter se differunt Venæ, Arteriæ & Nervi?

Et Vena & Arteria & Nervi canales sunt totius naturæ humanæ ministrantes, & communi appellatione Vasa nominantur. Differunt tamen inter se trifariam, origine, usu & substantia: Origine; Vena enim ex Epate, arteria ex corde, nervi ex cerebro & spinali medulla oriuntur: Officio & usu; Vena vehunt sanguinem & spiritum naturalem, arteria spiritum vitalem cum tenuissima parte sanguinis, nervi vehunt spiritum animalem: Substantia; Vena constant ex unica fibrosa tunica, arteria ex duabus, nervorum autem mucosa est substantia, duabus tunicis inclusa. Venas Germani vocant *Bluthadern*, Arterias *Pulshadern*, Nervos *Sehnadern*.

Quando Nervi vel tendines in aliquo articulo corporis præcisi sunt, tum membrum vel articulus amittit motum, quia nervi & tendines non consolidantur.

TENDONES.

Tενόνες, Galenus *Δυνευστοές* & chordas vocat; constant ex tenuibus nervorum & ligamentorum fibris, & nihil aliud sunt quam cauda nervosa musculorum, quibus musculi ossibus & cartilaginibus alligantur. Omnis enim musculus juxta suam originem excipit in se nervos & ligamenta, quæ deinde per carnosam musculorum substantiam in infinitas fibras dividuntur, & hæc circa fidem musculi rursus conflunt, & in unam quasi caudam coalescunt, quæ tendo sive cauda musculi nominatur, eo quod eorum officium est musculos tendere & contrahere, ad quam extensionem moventur articuli ossium, per hoc enim colligati sunt musculi articulationibus ossium.

LIGAMENTA.

Ligamenta seu vincula *σύνδεσμοι* sunt corpora tendonibus paulo duriora, flexibilia tamen ex cartilaginibus inter coarticulationes ossium sitis exorta: Usus eorum est articulos ossium inter se firmiter connectere, ne in vehementioribus motibus ossa ab invicem dimoveantur ac luxentur.

MEMBRANÆ.

Membrana *μῆνβρα*, vel tunica, *χιτώνες*, si-

ve *συνέπικρυτα*, tegumenta, sunt nervosa partes, tenues ac lata, quæ extendi & contrahi possunt. Membrana plerumque cognominationem habent à partibus quas vestiunt, ut meninges sunt membrana cerebrum tegentes, pericranion membrana calviam tegens, pericrion membrana ossa ambiens &c. Membranae omnium officium est tegere, vestire, continere; & ab aliis partibus suo interventu separare partes. Nulla enim est pars in toto corpore, quæ non sit aliqua membrana vestita, fulsa, alligata & comprehensa.

CARTILAGINES.

Cartilagines *χόνδροι* sunt quasi imperfecta & non satis indurata ossa. Ossium extremitates & coarticulationes cartilagine sunt obducta & oblinita; quæ ideo lenes & lubrica sunt, ut ossa in motibus ab attritu immunes sint.

O S S A.

Ossa, *ὀστέα*, sunt partes corporis ex terrestriori parte seminis in utero generata, omnium partium quas cutis tegit siccissima & durissima. Ossa omnia membranis venosis sunt obducta quæ *περίονα* dicuntur, & per eas nutriuntur ossa. Vniuersum corpus, Vesalio teste, constat 307. ossibus. Utilitas ossium est, fulcire & gestare totum corpus. Quod enim in tentorio præstant pali, id præstant in animalium corporibus ossa. Galenus libro i. capite 2. de administratione anatomica.

C A R O.

Caro, *σὰρξ*, est pars corporis similis substantia mollis & rubicunda, quæ ex sanguine extra venas prolapsa & fibris nervorum adhærescente & condensato generantur. Et si autem maxima pars corporis nostri caro sit, tamen nulla simplex caro in corpore deprehenditur, sed semper intertexta est fibris, & ideo non caro, sed musculus potius nominatur. Tres autem sunt species carnis in corpore, caro muscosa quæ omnibus musculis inest; Membranosa quæ membranis est adnata, veluti sunt carnes diaphragmatis, ventriculi, matricis &c. caro viscerum, veluti sunt pulmonis; Cordis, Epatis, Splenis, Renum, quæ Medicis non caro sed *παγεσσοί*, id est, assusiones dicuntur. Usus & officium carnis est cum

tuunt, linguam & penem firmant.

Clariss. Pavius 253. ossa in universis corporibus observavit.

In gingivis & glandulis caro simplex reperitur. Caro triplex.

Parenchymata singula, Peculiores sunt partes si-

milares; nontamen commu-
nes, sed u-
ni parti
propria.
Musculi
abdominis
sunt 2.
frontis u-
nus, duo
lacerti, o-
culorum
7. Maxil-
lae 4. la-
biorum 4.
qui 8. mo-
tus effi-
ciunt.
Musculo-
rum tanta
est multi-
tudo ut
difficile
admodum
sit eos nu-
merare,
Gal. l. i. c.
de motu
musculo-
rum.

fibris musculum constituere & carva corporis paria opplere.

MUSCULI.

Musculi, pedes, sunt partes corporis organicae ex carne simplici & fibris nervorum ramulisque venarum & arteriarum composita, & membranis tenuissimis obducta. Omnis musculus tres habet partes, caput, ventrem, & caudam. Caput est principium musculi ubi nervi & ligamenta ei inferuntur. Venter est crassior ejus pars, ubi nervi & ligamenta tenuissima fila sunt divisa; cauda est finis musculorum, ubi nervorum & ligamentorum fibrae conflunt & coalescunt & in tendinem desinunt. Figura musculorum similis est aut muribus aut lacertis aut planis illis piscibus quos passeret vocant. Vfus est partes corporis pro voluntatis imperio movere. Nullus enim motus voluntarius sine ope musculorum perficitur.

FIBRÆ.

Fibra, ὕψος, villi & stamina, sunt fila quadam nervosa, non tantum musculis sed omnibus partibus ex semine congenita qua naturalium actionum, attractionis, retentionis & expulsionis sunt organa. Tria enim sunt fibrarum genera, recta, transversa & obliqua. Recta servantur attractioni, Transversa expulsionioni, obliqua retentioni.

CUTIS.

Cutis, δερμα, est totius corporis nativum tegumentum. Quantum ad cutis substantiam attinet, Galeno lib. i. c. ultimo, de Temperam. teste, nihil est aliud quam nervus sanguine praditus. Cutis in prima corporis conformatione ex semine concrevit, & primo quod continuum est, sed paulo post ab infinitis extremitatibus Venarum, arteriarum & nervorum, qua in cutem desinunt perforata redditur, qua caca & minus visibilia foramina cutis Græci πύλοι nominantur, per quos natura pilos producit, sudorem excernit, & totum corpus perspirabile reddit. Cutis enim corporis crassities equorum aut boum tergoribus similis est, Vesalio teste.

8. Da brevem explicationem partium capit.

CAPUT.

Partes ca-
pitis.

Varro caput dici tradit, quod sensus &

motus ex eo initium capiant. Est enim caput domicilium anima ratiocinatricis, & fons sensuum ac motus voluntarii. Ideo Plato in Timæo caput esse dicit membrum divinissimum omniumque reliquorum membrorum principem, cui totum corpus connexum Dii subesse & parere jusserunt, ejusque figuram ad rotunditatem cali finxerunt. Figura capitis naturalis est Sphæra oblonga utrinque leniter compressa similis, à qua qua discedit ut acuminata quam ποζὶν vocant, & quibus vel eminentia antica, vel eminentia postica deest, aut qua undique rotunda est; præternaturalis habetur, & distortam significat naturam.

VERTEX.

Vertex, κορυφή, est suprema pars & centrum capitis, circa verticem; namque plerumque in gyrum contorquentur pili.

SYNCIPUT.

Synciput, βέρυξα, est antica pars capitis, supra frontem ad Verticem usque Synciput: in infantibus plerumque usque ad septennium membraneum est, quod processus temporis in os convertitur.

OCCIPUT.

Occiput, ὀπίω, est postica capitis pars, fronti è regione posita.

TEMPORA.

Tempora, ὤτοι, sunt partes capitis utrinque inter oculos & aures: per tempora irruunt in cerebrum plurima vena & arteria qua καρόνδεις, id est Soporifera dicuntur. Hinc est quod ictu aut percussu per tempora facillime extinguantur obstructis meatibus spirituum: per tempora applicantur pharmaca somnifera.

Vulnera
tempo-
rum cur-
periculo-
sa.

FRONS.

Frons, μέτωπον, est pars superior faciei ab oculis usque ad productionem pilorum.

FACIES.

Facies, ὁ πρόσωπον, est tota pars anterior capitis à syncipite usque ad collum porrecta, cujus partes sunt frons, supercilia, palpebra, oculi, gena, nasus, bucca, maxilla, labia & mentum.

GENÆ.

Genæ sive Mala, μᾶλα, sunt rotundiores

res & eminentiores partes faciei, sub oculis inter aures & nasum, qua in pudore plerumque rubore suffunduntur.

O C U L I.

Oculi, ὀμματα, seu ὀφθαλμοὶ, sunt Visionis organa, qui veluti speculatores altissimum locum sub fronte obtinent. Plato oculos duces esse ait, ut divina propius agnoscamus. Constant oculi, juxta Vesalium, ex septem tunicis & tribus humoribus; Tunicarum nomina sunt Ἐπιπεφυκία, id est, adnata: κερατοειδής, id est, cornea: ραγοειδής, id est, uvea: Ἀραχνοειδής, id est, ara-

nea, qua tunica anteriorem oculorum partem constituunt, quibus ab intro opponuntur Σκληροτοειδής id est dura; Χοροειδής id est secundina similis, & Ἀμφιβληστροειδής, id est retiformis. Humorū verò in oculis existentium nomenclatura sunt, Ὑδατοειδής, id est aqueus, qui inter corneam & uveam tunicas continetur; Ὑαλοειδής, id est vitreus, in cujus centro continetur splendidissimus humor; Κρυσταλλοειδής id est Crystallinus, propriissimum Visus instrumentum. His oculorum partibus una aut pluribus vitiatīs corrumpitur visio.

Humores.

Tabella partium ocularium.

Oculi sunt organa Visus & constant ex	Tunicis 7. quarum partes	Exteriores nominantur	Ἐπιπεφυκία, id est Adnata,
			Κερατοειδής, id est cornea,
	Interior- res sunt		Ραγοειδής, id est Uvea,
			Ἀραχνοειδής, id est Aranea.
Humoribus tribus, quorum nomina sunt,			Σκληροτοειδής, Dura,
			Χοροειδής, secundina similis,
			Ἀμφιβληστροειδής, Reticularis.
			Ὑδατοειδής, id est Aqueus, albumini ovorum similis,
			Ὑαλοειδής, Vitreus, vitro fuso subalbo similis,
			Κρυσταλλοειδής, Crystallinus, instar Crystall; pellucidus.

PALPEBRÆ.

Palpebra, βλέφαρα, sunt tegumenta Visus; sunt autem cutes musculosæ claudentes oculos, quibus fixa sunt cilia. Vfus earum est in somnis oculos claudere.

C I L I A.

Cilia, βλεφαρίδες, sunt pili in extremitatibus palpebrarum fixi. Eorum usus est in prospiciendo dirigere per rectam lineam radios visus.

SUPERCILIA.

Supercilia, ὀφρύες, sunt pili supra oculorum cavitatem frontem terminantes.

N A S U S.

Nasus, ῥίς, seu ῥῖν, est propugnaculum organorum olfactus, ejus foramina μυρρίδες, id est nares nominantur.

A U R E S.

Aures, ὦτα, sunt propugnacula instrumentorum auditus in temporibus sita, quorum sinuosa foramina per temporum ossa πόροι ἀκοῆς, id est meatus auditorii nominantur.

L A B I A.

Labia, χεῖλα, labra sunt opercula oris ex permobilibus mirabilibusque musculis constituta.

O S.

Os, στόμα, est rima & tota cavitas inter labra & maxillas, linguam inter se continens universale organon locutionis.

M E N T U M.

Mentum, γένιον, est extuberans & rotunda pars maxilla inferioris, sub inferiori labro sita.

C 3

Inter

Tunica
oculi.

Nasi usus
est ut in-
serviat
formatio-
ni vocis
respiratio-
ni, olfa-
ctui, &c
expurga-
tioni ce-
rebrī.

Partes capitis interiores.

Inter partes interiores capitis quæ visu prehendi non possunt, numerantur; ΠΕΡΙΚΡΑΝΙΟΝ.

Περίκρανιον est membrana calvæ extrinsecus undique tegens, quæ ex crassa meninge per suturas producitur.

CALVA.

Calva, κρανιον, est receptaculum & osium tegumentum totius cerebri: Univerſa calva ex 8. ossib. per suturas inter se junctas extructa est.

SUTURÆ.

Sutura, σάβδος, sunt commissura seu conſuſiones ossium capitis, ubi ossa instar duarum ferrarum inter se coeunt. Quinque autem in clavis nudatis conspiciuntur Sutura, per Saturas enascitur membrana, & extrinsecus dicta; per suturas irrepunt venarum & articularum surculi intra Calvæ, per easdem exhalant fuliginosi Vapores intra κρανιον collecti.

MENINGES.

Meninges sunt dua membrana exterior & interior sive crassa & tenuis, totum cerebrum ambientes & intersepientes. Crassa seu exterior meninx à recentioribus dura mater nominatur, quæ fibris quibusdam futuris clava infixis firmissimè clava est alligata. Interior autem sive tenuis meninx, quæ pia mater nominatur, cerebrum immediate ambit, idque stabilis & contegit, Venasque & arterias cerebrum forvientes & nutriendes excipit, & sese in omnes cerebri partes insinuat, & cavitates cerebri sublinat ac vestit.

CEREBRUM.

Cerebrum, ἐγκεφαλον, est quasi medulla capitis, domicilium animæ ratiocinatricis, fons potentiarum sensitivæ & locomotivæ: Constat cerebrum substantia aërea, alba & coagulata aut spuma instar. Dividitur & intersecatur cerebrum per tenuem meningem in anteriorem partem, quæ propriè cerebrum, & posteriorem, quæ cerebellum nominatur.

CEREBELLUM.

Cerebellum, πνευριον, est posterior pars cerebri sita in occipitio à cerebro interuentu meningum divisa, quod durius & decuplo minus est cerebro: Ex cerebello per fora-

men occipitis quasi rivus defluit spinalis medulla. Cavitates seu ventriculi cerebri quatuor conspiciuntur in substantia cerebri, membranæ à meninge ortis undique sublinati, quorum duo in anteriori parte cerebri circa frontem oblongi sunt & instar novæ lunæ incurvati: Inter hos extenditur & tertia cavitas, per rectitudinem à fronte in occiput instar oblongi calami, qui protenditur usque in cerebelli cavitationem. Quartus in ipso cerebello circa occiput, qui instar ovi rotundus est. Hæ quatuor cavitates cerebri vivente homine semper pleni sunt spiritibus animalibus, tenuissimis flammulis similibus, quorum beneficio intelligimus, sentimus ac movemur. In duobus anterioribus Ventriculis cerebri fit imaginatio seu sensus communis, id est formarum à sensibus exterioribus oblatarum perceptio. In medio sive tertio Ventriculo fit ratiocinatio, id est rerum perceptarum & dijudicarum retentio.

PLEXUS RETIFORMIS.

Plexus retiformis recentioribus rete mirabile, est artificiosa instar retis piscatorum ex quamplurimis arteriarum surculis textura. Per collum enim arteria plurima in articulum cerebri protenduntur, quæ circa basin cerebri in infinitos ramos dividuntur, & inter se rursus complicantur, in quibus quasi in labyrintho spiritus vitales ex corde per arterias in cerebrum delati elaborantur, ut aptior fiat materia spirituum animalium.

Vena καρότις; id est Soporifera, sunt surculi venarum jugularium, quæ per tempora in cerebrum protenduntur.

Processus sensuum organa communia omnium sensuum sunt nervi ex cerebro orti, quorum qui ad oculos protenduntur soli conspicuam habent cavitationem, & nervi optici nominantur; qui vero ad aures diriguntur, ii ante foramina aurium in pelliculam expanduntur, sicuti ii, qui ad linguam descendunt & nervi gustatiles nominantur, per substantiam linguæ in pelliculam dilatantur, sed odoratus instrumenta revera nervi non sunt, sed sunt duo peculiare processus mollissimi, medulla similes, ex ventriculis cerebri orti & usque ad nares protensi.

Spiritus animalis usus.

Nervi sensorii. Observantur tamen anatomici etiam nervos molliſsimos à spinalis medullæ initio ad processum odoratorioſ protenſos.

PALA-

PALATUM.

Palatum, ὀφθαλμός, Galenus ἑρμηνεύει id est partem coelum vocat. Est autem Palatum totius oris superior cavitas, qua incipit à dentibus superioris maxilla & instar arcus incurvatum definit ad radices lingua. Palati utilitas est saporis non secus ac lingua percipere, una enim & eadem tunica sunt obducta, & vocem sonoram reddere: foramen est in palato, per quod purgatur cerebrum. FAUCES φάρυγξ, est illud spatium oris circa radicem lingua, ubi gula & aspera arteria initium sumunt & in thoracem inde descendunt.

LINGUA.

Lingua γλῶττα est caro rara & fistulosa ex novem musculis constans, duabus vestita membranarum, cujus radix faucibus ligamentis est connexa. Lingua, ut palatum, est saporis perceptrix, vocis explanata & distincta effectorix, & voluntatis nuncia.

COLUMELLA.

Columella vel columna ραχηδόν gurgulio perperam uvula vocatur, est particula carnosae, oblonga & fungosa à summo palato propendens. Solis hominibus & quarundam avium modulantium generibus gurgulio inest. Ejus usus est ut sit plectrum vocis & organon modulationis.

TONSILLÆ.

Tonsilla Ἀμυγδαλῆς recentioribus glandula & amygdala sunt duae carunculae spongiosae circa faucium angustias utrinque sitae, quarum usus est salivam in se recipere eaque linguam madesfacere.

MAXILLÆ.

Maxilla ἄνω seu ὀφθαλμός sunt duo ossa mandibula, superior & inferior, quibus dentes sunt infixi.

DENTES.

Dentes ὀδόντες sunt ossa substantia sed multis modis differunt à reliquis ossibus; Primo quia soli dentes inter omnia ossa sunt sensu pradii; Secundo soli dentes inter ossa nudi conspiciuntur; Tertio omnia ossa nobiscum nascuntur, dentes vero septimo mense post natiuitatem nasci incipiunt; Quarto dentibus elapsis alii subnascuntur, quod reliquis ossibus non contingit. Sunt autem hominibus dentes

numero 32. singulis maxillis 16. pulchro ordine instar choreae collocati.

GINGIVA.

Gingiva, ἔλας, est caro venosa ac nervosa circa dentes super maxillas adnata, cui dentes tanquam vallo pali infixi sunt: Gingiva usus est ut dentes confirmet in suis praeseptis ossa maxillarum tegat ac vestiat, & edentulis sit loco dentium.

9. Da brevem explicationem partium Thoracis.

Thorax, θώραξ, Galen. 6. cap. 1. de usu partium, est quod à jugulo ad diaphragma pertingit, qui costis utrinque & thoracis vertebrae circumscribitur: in summa quicquid inter fauces & diaphragma comprehenditur id omne in thorace esse dicitur. Usus & utilitas thoracis est, ut sit septum praevalidum tutela gratia, cordi & pulmone circumdatum.

COLLUM.

Collum, τράχηλος, est pars qua inter petus & caput interjecta est.

CERVIX.

Cervix, ἀντή, est pars posterior colli qua constat ex 7. vertebrae.

DORSUM.

Dorsum, ὠσθον, vel μετὰ φέρων, est posterior pars thoracis pectori appositae, constans ex 12. vertebrae.

SPINA DORSI.

Spina dorsi, ῥάχαις, est series & integra compositio vertebrarum à capite usque ad nates, in ea quasi in canali spinalis medulla continetur, hinc & ἰσχυροσπονύς id est sacra fistula nominatur. Tota spina ex 24. vertebrae constat, & dividitur in quatuor regiones, Cervicem, Thoracem, Lumbos & Os sacrum.

VERTEBRÆ.

Vertebra σπονδυλοὶ, sunt 24. ossa spinae dorsi rotunda & intus carva, processus quosdam habentia, & inter se interventu cartilaginum & membranarum coarticulata. Lumborum infima vertebra est omnium maxima, reliquae quanto magis ab ea ascendendo discedunt, tanto sunt minores, sed earum foramina contrario modo se habent. Superioris enim Vertebrae cervicis foramen amplissimum est, reliquarum postea descendendo magis magisque constringuntur.

LUM

Fauces.

In singulis
maxillis
sunt 4. in-
ciferes, 2.
canini, 8.
molares,
& 2. sero-
tini.

LUMBI.

Lumbi, ὀσφύες pars sunt spinae dorsae regione ventris inferioris, ex quinque constans validissimis vertebrae.

OS SACRUM.

Huic annexum est infima ex 6. latis ossibus inter se connexis consociata, quod est velut fundamentum spinae dorsae.

JUGULI.

Juguli κλειδές id est claves, sunt duo officula rotunda & cava, suprema inter ossa pectoris, quae transversaliter inter supremas costas & scapulas quasi fulcra sunt posita, quae digito facile contrectari possunt.

SCAPULÆ.

Clavitulæ. Scapulae, ὠμοπλάται, sunt duo lata ossa, utrinque posteriori thoracis parti incumbentia & vertebrae ac costas inter ventu musculorum copulata.

PECTUS.

Pectus, στήθος, est anterior pars thoracis à jugulis usque ad diaphragma demissa.

OS PECTORIS.

Os pectoris, στήθιον quod unicum esse contrectanti videtur, tamen non unum est, sed ex 7. constat ossibus, cuius superior pars circa jugulos furcula nominatur, inferior autem pars ἐνφοειδής, id est ensiformis dicitur. Cavitas autem circa ἐνφοειδὴν ubi ventriculi orificium est situm, Malum granatum vocatur.

MAMMÆ.

Mamma, τίθον seu θηγάδι ubera seu mamillae dua sunt in pectore, instar semi globi extuberantes, quarum substantia est rava & spongiosa, qua officina sunt lactis & instrumenta foetuum nutritioni servientia.

PAPILLÆ.

Papilla, θήλη, est tuberculum mammarum, tenerum & molle & substantia persimilis labris infantium.

COSTÆ.

Costa, πλεύρα sunt 24. ossa oblonga & incurva ex 12. vertebrae thoracis in utroque latere 12. orta, & transversim in thorace ad στήθιον sive os pectoris per interstitia porrecta, quarum 7. superiores cum osse pectoris in utroque latere coarticulantur, & costa γνήσια id est, perfecta & legitima nominantur, reli-

qua vero 5. inferiores in utroque latere ad pectoris os non pertinent, sed in Thoracis lateribus desinentes suarum cartilaginum sinibus connectuntur, quia quia & breviores & molliores sunt, costa πρόσθεν, id est, spuria & mendosa nominantur.

LARINX.

Guttur λαρυγξ est initium & caput aspera arteria faucibus adnexam estque principalissimum vocis organum. Constat guttur ex tribus magnis cartilaginibus quarum maxima scuti figuram refert quae in collo protuberat ita ut tactu deprehendi queat, quae nobis deglutientibus sursum fertur, hac alias duas cartilagines intra suam cavitatem complectitur quarum uno annulo sigillatorio, altera rostro cantari fusorii similis est, in cuius medio rima fistularum rima similis conspicitur, per quam fit modulatio & soni vocisque variatio. Tota λαρυγξ operculo cartilagineo clauditur, quod ἐπιγλωττις nominatur, hac dum respiramus aut loquimur, sursum erigitur, & aperitur λαρυγξ, dum vero edimus aut bibimus, incumbit & claudit Laryngem ne aliquid ex cibo aut potu illabatur in asperam arteriam & inferat suffocationem.

ASPERA ARTERIA.

Τερχεία ἀρτηρία est fistula, cuius caput λαρυγξ est quae à faucibus per anteriorem colli partem ad pulmonem protenditur in eoque in multos ramos dividitur, similitudinem referens arbori inversa, quae ante ingressum in pulmonem constat ex circulis cartilagineis, quorum quarta pars est resecta qui inter se membranis cohaerent & vestiuntur, rami vero ejus in pulmone ex integris circulis cartilagineis sed longè minoribus sunt exstructi. Usus & utilitas aspera arteria est ut sit via aeris per respirationem attracti.

GULA.

Gula, οισοφάγος, est fistula cibalis seu via quam per cibum & potum ex ore in ventriculum deferitur. Gula aut aspera arteria à faucibus incipit, & sub aspera arteria vel in posteriori colli parte & vertebrae thoracis, quibus membranis est alligata, recta deorsum fertur & diaphragma perforans in ventriculum implantatur, substantia ejus constat ex duabus mem-

Pomum
Adami
vulgus vocat.

brancis nervosque tunicis instar fistula tere-
tibus & carvis.

PULMO.

Pulmo, πνεύμων, est principale respirationis
organum. Pulmonis substantia est caro pecu-
liaris, aërea, rara, mollis, levis & spongiosa,
ad hauriendum concipiendumque aërem a-
ptissima: ejus substantia plurimis ramis aspe-
ra arteria, furculis vena arteriosa arteriaque
venosa intertexta est, & ejus tota superficies
tenuissima membrana est obducta ac vestita,
qua si perumpatur, φθίσις inducit: totam fe-
rè thoracis anteriorem partem complet pulmo:
figura ejus est ungula bubula similis. Dividi-
tur autem in dextram & sinistram partem
interventus membrana thoracem interse-
pientis.

PERICARDION.

Capsula cordis, ὁ κελὶς τοῦ καρδίου, est quasi cista
membranea crassa & dura, in qua Cor tan-
quam in suo domicilio liberum, & nusquam
eam attingens, sed indique aequaliter ab ea
distans, pendet: hujus membrana basis qua-
tuor foraminibus est pervia per qua vasa cor-
dis, ramus videlicet vena cava, arteria
magna, vena arteriosa & arteria venosa
transeunt, quibus vasibus hac capsula validis-
simè adnata est. Præterea hac ipsa tunica par-
te sua posteriori mediastino membrana adha-
ret, anteriori vero tunica costas succingente.
Mucrone autem suo ἀφ' ὧν πύλον alligata
est, in hujus capsula fundo tenuissima conti-
netur aqua cordis irrigationi serviens.

COR.

Cor, καρδιά, est fons vite, sedes spirituum
vitalium calorisque nativi, & domicilium
omnium affectuum. Cordis substantia carnea
est, à musculorum carne, & duritie & colo-
re & fibrarum genere longe dissimilima. Fi-
gura ejus pyramidalis est & nuci pinea simi-
lis; situm est cor sub στήθος sive esse pectoris,
cujus basis seu caput ad quintam costam con-
cedit, mucro vero infra laram pupillam
continetur. In cordis consideratione diligenti
observatione animadverti debent duo thala-
mi sive sinus Cordis & vasa sive canales in
Cor ipsum defixa. Cordis thalami sunt due
ampla cavitates ad latera cordis sita, dextra

& sinistra. Dextra similis est crescenti Luna,
sinistra vero pyramidalem habet figuram, cu-
jus basis in basin cordis incidit & in conum
desinit: utraque cavitas tenui membrana
est sublimita; in dextro thalamo elaboratur &
purificatur sanguis arteriarum qui est vehi-
culum & subjectum spirituum vitalium, ex
cujus sanguinis portione nutritur pulmo, in
sinistro thalamo generantur spiritus vitales,
qui tanquam rivuli in totum corpus per arte-
rias defluunt. Vasa sive canales cordis qua-
tuor sunt, quorum duo ex cordis thalamis e-
nascuntur, duo vero alii in eisdem implan-
tantur, Arteria magna, vena Arterialis,
ramus vena cava, & arteria venosa. Ar-
teria magna ex sinistro cordis thalamo exo-
ritur, & ramos suos in totum corpus distri-
buit. Vena arterialis ex dextro cordis sinu
pronaescitur & in pulmones implantatur; ra-
mus vena cava in dextrum sinum cordis inse-
ritur, Arteria venosa ex pulmone oritur & in
sinistrum cordis ventriculum figitur.

Vasa cor-
dis.

ARTERIA MAGNA SEU
AORTA.

Arteria magna, Ἀόρτη, est truncus omnium
arteriarum, de qua supra in explicatione par-
tium similarium dictum est.

SEPIMENTUM THORACIS.

Sepimentum Thoracis aliis Mediastini ἀφ' ὧν
πύλῳ, sunt due membrana à spina dorsi
orta, & versus pectoris os protensa, dua tho-
racem secundum longitudinem à jugulis usque
ad diaphragma, & secundum latitudinem à
vertebris dorsi usque ad pectoris os subdivi-
dunt, qua circa dorsum conjuncta sunt, sed
tandem paulatim ab invicem dehiscunt &
quasi tres cavitates sive cameras in thorace
constituunt, intra quarum media situm est
Cor, & in aliis duabus naturalibus pendent
pulmones.

Mediasti-
num.

MEMBRANA COSTAS SUC-
CINGENS.

Membrana, costas succingens, Grace μεμβράνη
τῶν πλευρῶν, est membrana tenuis à verte-
brarum ligamentis orta, plurimis furculis ve-
narum & arteriarum confersa, quæ omnes
costa & universa cavitas thoracis, ac superior
facies septi transversæ est sublimita & munica.

D

SE-

Ventricu-
li cordis.

SEPTUM TRANSVERSUM.

Diaphragma.

Septum transversum, *Ἀφρογυμῶν*, Plinio præcordium, est musculosum & valde crassa tunica dividens thoracem ab infimo ventre, qua in anteriore corporis parte adnata est termino ossis pectoris per latera costis mendoſis circa dorsum vertebriſ lumborum.

Tria hac tunica habet foramina, per unum transit vena cava ab epate ad cor protensa, per alterum transit gula à faucibus ad orificium ventriculi descendens, per tertium transit arteria magna una cum vena sine pari. Diaphragma ſervit reſpirationi, & excrementorum adjuvat expulſionem, & excludit halitus à membris vitalibus ex membris nutritionis elevatos.

DE PARTIBUS INFIMI VENTRIS.

10. Da brevem explicationem partium infimi ventris.

Abdomen, *ἐντρίχιον*, est totius ventris exterior pars qua manibus contrahi potest, constans ex cute, adipe, octo musculis & peritonæa membrana.

VENTER.

Venter, *γάστρον*, est tota anterior pars inter diaphragma & pubem sita: Aristoteles lib. I. de historia animalium; venter, inquit, infra pectus est, parte priore, cujus centrum umbilicus est.

UMBILICUS.

Umbilicus, *ὀμφαλόν*, est radix ventris & totius hominis. Est autem umbilicus terminus & vestigium vasorum uteri post partum abscissorum, per qua nutritur factus in utero.

ILIA.

Ilia *λαγέβες*, sunt partes ventris laterales utrinque costis carentes.

INGUINA.

Inguina *βυβόνες* sunt partes glandulosa utrinque inter femora & radices pudendi quibus in locis tumores præternaturales, quos de *Phagedrose* & bubones pestilenciales vocant, suboriri ut plurimum solent.

PUBES.

Pubes, *ἐπίχριον*, est locus super pudendum situs, pilis vestitus.

TESTES.

Testes, *ὄρχεις*, qui à numero binario & *ἑνδύμοι* nominantur, sunt partes principales inter partes generationi ſervientes, sita inter inguina, rotunda & propendula.

VIRGA.

Virga, *κρύδης*, colis, penis, mentula, cauda, pudendum, est membrum virile, organum generationis.

GLANS.

Glans, *βάλανος*, est extrema pars virga cuticula obrecta qua præputium nominatur.

PERITONÆUM.

Peritonæum, Græcis *περιτναίον* & *κότον* id est peritonai tunica, Avicenna *siphac* dictum, est membranea amplissima crumena in ventris inferioris capacitatem contenta, ex simplicissima tenui, firma tamen membrana constans, & figuram ovi anserini referens, omnia viscera inferioris ventris intra se concludens, & ne loco moveantur continens. Hac pera circa inguina duobus foraminibus est pervia, qua transitum præbent vasis ſeminariis ad testes procedentia. Hac membrana sæpe rumpitur præſertim in infantibus circa inguina, quam affectionem Græci *κρίλιν* id est ramicem & rapturam vocant, den *Hill* und *Bruch* nostrates.

OMENTUM.

Omentum, *ἐπίπλουν*, Arabibus *ſeyrbus*, nobis *dag* & *Schmer* / est duplicata tunica, multa adipe intertexta, cui ventriculus & intestina innatant, eorumque nativum calorem conservant ac fovent.

VENTRICULUS.

Ventriculus est culina totius corporis & officina *χυλῶν*, id est cibi ac potus assumpti, in succum cremori ptisana similem conversio nis. Situs est ventriculus in corporis fere medio, cui à dextro latere incumbit Epar, à sinistro Lien, superne tegitur diaphragmate, inferna ejus pars innatat omento, anteriorem ejus partem tegunt musculi abdominis, posteriorem verò musculi lumborum, & ita ventriculus undique quasi levi igne calidis partibus circumſepitur ac fovetur. Figura ventriculi rotunda est, sed propter duorum canalium gula & pylori in ejus orificia inſertionem oblonga

Orificia. oblonga est ea rotunditas, & in sinistro latere
Stoma- multo amplior & magis prominulus cernitur:
chus. deinde versus dextrum vergens in angustum
cogitur graciliorque redditur. Duo habet ori-
ficium. quorum superius $\pi\epsilon\pi\epsilon\chi\theta\epsilon$, id est ori-
ficium ventriculi dicitur, quod situm est sub
malo granato sive Cartilagine ensiformi ubi
inferitur gula: per hoc excipit cibum ac po-
tum. Alterum vero orificium in dextro ven-
Pylorus. triculī apice locatum Græcis $\pi\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$, Latinis
janitor dictum. Hoc cibi ac potus alterati &
in chylum conversi intestina transmittendi
causa est fabricatum; huic connatum est duo-
denum intestinum.

Utilitates ventriculi sunt $\chi\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$ id est ci-
bi ac potus in succum conversio, item cibi ac
potus desiderium. Substantia ventriculi tri-
bus fibrarum generibus est intertexta, recta-
rum beneficium attrahit, obliquarum retinet,
transversarum expellit.

INTESTINA.

Intestina, $\epsilon\upsilon\pi\epsilon\gamma\epsilon$, vel intestinum, u-
nicum enim est corpus, sed à varietate fi-
gura in diversas species distinguitur, est
canalis teres & oblongus ex pyloro sive in-
fimo ventriculi orificio enatus, multipli-
cibusque spiris ad anum usque protensus.
Ejus à varietate forma, quasi plura essent
intestina, sex enumerantur à Medicis: tria
videlicet gracilia, totidemque crassiora. In-
testina gracilia sunt $\delta\omega\delta\epsilon\kappa\omicron\delta\iota\kappa\tau\upsilon\lambda\omicron\varsigma$, id est
Duode- duodenum, $\eta\gamma\gamma\epsilon$, id est jejunum, & $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\varsigma$,
num. id est tenue: Crassiora $\tau\upsilon\phi\lambda\omicron\varsigma$, id est cæcum,
Jejunum. $\kappa\acute{\omega}\lambda\omicron\varsigma$, id est crassum, $\alpha\pi\omega\theta\upsilon\mu\epsilon\mu\delta\omicron\varsigma$, id est re-
ctum. Duodenum intestinum longitudine 12.
digitos aequat, & est prima pars intestini nul-
lis orbibus implicata, exoritur à pyloro. Cir-
ca finem hujus intestini meatus flavam bilem
deferens inseritur intestinis. Jejunum est se-
cunda pars intestini, ubi primum in gyros in-
cipiunt circumvolvi intestina. Ex hoc pri-
mum rapiunt chylum vena Mesaraica & in
Epar deferunt, & ideo semper vacuum esse
Ileum. conspicitur. Tenue tertia pars intestini qua
pluribus quam reliqua partes, spiris, mesente-
rio implicata & circumvoluta est, hoc um-
bilicum attingit. Cæcum est quarta pars in-
testini & est quasi extuberantia quadam in-

ter tenue & $\kappa\acute{\omega}\lambda\omicron\varsigma$ intestina, in animantibus
sacco & ventriculo similis est. Colon sive Colon.
crassum intestinum est quinta pars intestini,
quod situm est sub jecoris cavitate & bilis ve-
siculam attingit. Rectum intestinum & ul-
tima & infima pars intestini, quod usque ad
anum porrigitur, nullis circumvolutum
orbibus.

MESENTERIUM.

Mesenterium, $\mu\epsilon\sigma\epsilon\upsilon\tau\epsilon\epsilon\iota\omicron\upsilon$, quasi dicas me-
dium fulcrum intestinorum, est membrana
duplicata, multa pinguedine & glandulis re-
ferta, quod ex vertebriis lumborum una cum
peritoneo originem ducit. Ejus utilitas est, ut
intestina inter se colliget & contineat, &
venas mesaraicas fulciat.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ.

$\Pi\acute{\alpha}\gamma\kappa\epsilon\alpha\varsigma$ & $\kappa\epsilon\lambda\lambda\iota\kappa\epsilon\alpha\varsigma$, id est pulcra caro, Focus hic
est glandulosum corpus vertebriis lumborum
adnatum, quod centrum est totius mesenterii.
capè lati-
tat febrim-
um.

JECUR.

Iecur, $\eta\pi\epsilon\gamma$, est membrum principale & or-
ganum sanguificationis, ac omnium venarum
radix, fons spiritus naturalis: Substantia
ejus similis est sanguini concreto, referta exi-
libus instar pili venulis, & tenuissima mem-
branula vestita. Figuram habet falcata lu-
na similem, extrinsecus gibbum est, intrin-
secus vero concavum. Suum iecur in dextro
hypochondrio sub diaphragmate, & cava sua
parte incumbit ventriculo. Ejus usus est ut
convertat chylum attractum in sanguinem,
ut separet virtute sua specifica purum sangui-
nem ab excrementitiis humoribus, ut sit ra-
dix omnium venarum, utque sit fons spiritus
vitalis.

VESICULA BILIS.

Vesicula bilis, $\kappa\acute{\upsilon}\varsigma\tau\iota\varsigma$ $\chi\omicron\lambda\lambda\delta\epsilon\chi\theta\epsilon$, id est ca-
psula fellis, est receptaculum bilis flavæ, qua
nihil est aliud quam ignea sanguinis pars;
substantia hujus vesicula est membrana sim-
plex, robusta tamen, qua situm habet in ca-
va parte Epatis, qua Epar dextrum ventri-
culi latus complectitur. Figuram habet ob-
longo pyro-similem. Usus & utilitas vesicula
bilis est in sanguinis purificatione ferventio-
rem & amariorem partem sanguinis, quam
bilem flavam vocant, in se recipere & ubi
vesicula

vesicula repleta est, rursum intestina exonerare.

LIEN.

Lien, σπλην, est receptaculum melancholici humoris, qui est feculentior terrestriorque pars sanguinea massa, ex chylo in epate confecta. Substantia splenis spongiosa & laxa subnigraque, est caro ex feculento sanguine concreta: situm habet lien in sinistro hypochondrio è regione epatis, qui, ut epar, sua cava parte sinistrum ventriculi latus amplectitur. Figuram habet splen oblongam & prope modum speciem lingua bubula referens: usus & utilitas Lienis est in purificatione sanguinea massa melancholicam & feculentiorē sanguinis partem assurgere, & ventriculi calorem fovere.

RENES.

Renes, νεφροί, sunt 2. receptacula aquosioris partis sanguinea massa qua in epate ex chymo segregata est, per venas emulgentes ad renes delata. Substantia Renum est caro dura & compacta, qualis est & cordis substantia. Renes Aristoteles lib. 3. c. 17. de historia animalium, inter omnia viscera maxime pinguescere dicit, quo commodius attractam aquosiorē sanguinis partem retinere & concoquere queant. Figura Renum est oblongiuscula, omnique ex parte aequaliter crassa, extrinsecus gibba, interna vero sua parte, qua venam cavam respiciunt contorta & incurvata, in quam incurvationem excipiunt venas emulgentes. Habent renes intra se satis amplam cavitatem tenui membrana interseptam, per quam urina percolatur, & in ureteres destillat; in hac cavitate plerumque concrecere solent calculi renum. Sicut sunt renes utrinque circa lumborum vertebrae, sed dexter semper elatiorem occupat locum quam sinister. Usus Renum est aquosiorē partem sanguinis per venas emulgentes in se trahere, ejusque benigniorē partem in suam substantiam convertere, puram vero aquam & ab omni sanguine separatam, per sua cavitatis membranam & per ureteres pellere. Sunt autem venae emulgentes duo insignes rami vena cava, qua statim in exortu vena cava ex epate sub diaphragmate exoritur & utrin-

que ad renes propensa, ejusdem incurvationibus inferuntur. Vreteres vero sive vena urinaria, quas Celsus venas albas vocat, ed quod non ut reliqua vena sanguinem sed aquam vehant, sunt duo canales venosi ex cavernis renum orti, qui circa incurvationem eorum, ubi vena emulgentes implantantur prodeuntes deorsum protensi utrinque vesicae lateribus infiguntur; per hos canales confluunt urina ex renibus in vesicam.

VESICA.

Vesica urinaria, κύστις, est aquea superfluitatis in renibus à sanguine separata quam urinam vocant, receptaculum. Substantia vesicae, Fallopio teste, ex tribus constructa est membranis, duabus propriis, & una à peritoneo orta. Sita est vesica inter os pectinis & rectum intestinum, cujus cervix in pudendum immittitur. Utilitas vesicae est ut sit receptaculum urinae.

UTERUS.

Uterus, μήτρα Matrix, sive κύστις, est tamquam nostra propagationis hortulus: substantia constat simplici tunica, sed crassa satis & carnosā. Figuram habet rotundam instar vesicae, & sita est inter vesicam & rectum intestinum, intra capacitatem coxendicis. Utilitas ejus est semen concipere, conceptum retinere, retentum in foetum conformare, & justo tempore in lucem edere.

COTYLEDONES.

Acetabula, κηλιδόνες sunt orificia venarum & arteriarum in capacitatem uteri desinentium, qua singulis mensibus dilatantur & aperiantur in magnitudinem lentis, ut per ea menstruus mulierum sanguis ex toto corpore in uterum defluat, & inde foras excernatur.

VASA SEMINARIA.

Vasa seminaria, ἄλγεια ἀρεμῆτικα, sunt duo canales, dexter & sinister, quorum uterque constat ex una grandi vena & arteria simul complicatis & colligatis; & dexter quidem oritur ex caudice vena cava & arteria magna, sinister vero oritur ex vena sinistra emulgente, & ex subiecta huic vena arteria; hac duo vasa à suo ortu deorsum ad pubis ossa descendunt, ibidemque peritonaeum perforantes

emulgentes ex trunco aortae. Vreteres.

Femini sita est inter rectum & rectum intestinum.

In gravidis vasa umbilicalia foetus in hac acetabula desinunt ut inde foetus nutrimentum hauriat.

Non tamen adeo oblongam in homine habet figuram ut in brutis, sed crassior & brevior est.

Renes cur facile pinguescant.

Venae emulgentes habent adjuntas arterias

tes in interiorē tunicā testiculorum, de-
xtrum in dextrā, sinistram in sinistram
implantantur. Eorum utilitas est ut Sangu-
inem purissimum & elaboratissimum & simul
Spiritus vitalem materiam seminis attra-
hant, alterent, & ad testes deferant.

Artus. II. Da brevem explicationem Artuum.

Artus sunt quasi nodi ex trunco eminen-
tes: ita manus & pedes propriè artus nomi-
nantur, quia ex corporis trunco enata sunt.

HUMERUS.

Humerus, ὤμων, est superior pars totius
manus inter scapulas & brachium unico con-
stans osse magno, cuius caput superius scapu-
la inferiur.

BRACHIUM.

Brachium, βραχίον, Galenus brachium
Celf. l. 8. & humerum idem esse docet, sed Celsus pro
cubito usurpat, inquit, Brachium ex duo-
bus constat ossibus radio & cubito.

CUBITUS.

Cubitus, πήχυς, quandoque pro toto bra-
chio sumitur, quandoque vero pro majori Os-
se brachii, quod & ulna nominatur. Dici-
tur autem cubitus à cubando quod eo inniti-
mur cubantes.

ULNA.

Ulna, πτερυγίον, est minus os cubiti, quod
& radius dicitur.

BRACHIALE.

Brachiale, κέρας, Arabibus brasseta, est
iunctura sive articulus quo extrema manus
cubito coarticulatur.

MANUS.

Manus, χεῖρ. Galenus lib. 3. c. 2. de admi-
nistratione Anatomica, cum sine appendice,
inquit, manus dicimus, totum membrum à
scapula usque ad apices digitorum intelligimus.
Cum adfectione autem ut ἀγκύρα summa vel
extrema manus eam manus partem signifi-
cat, quæ à carpo usque ad digitos expansa est.
Sunt autem manus instrumenta apprehensio-
nis & tactus.

VOLA.

Vola, ἔνθα vel ἡγίλον & χεῖρς, est inter-
na cavitās summa manus, multis monticulis
& variis lineamentis interfecta. Sed voca-

bulum ἔνθα chiromanticis pro monte pollicis
usurpatur.

DIGITI.

Digiti, δάκτυλοι, singularum manuum
quinque sunt digiti inter se inaequales, quo-
rum medius reliquis longior est. Omnes con-
stant ex ternis ossibus. Digitorum nomina
sunt, Pollex ἀντίχρ, Index ἰνδακτύλος, Medius
μέσος, Annularis πνεύμας, Minimus μι-
νός, qui & auricularis.

COXA.

Coxa, ὀστέον, & coxendix, sunt ossa grandia
natum, utrinque ossi sacro subiecta, in qua
femorum capita inarticulantur: horum os-
sum superior pars dicitur os ilium; media, u-
bi femoris caput inarticulatur, dicitur os co-
xendicis; infima pars ἐπίχον, id est, pubis
sive pectinis os nominatur.

NATES.

Nates, γλῆνα, lumbis subjacent, quibus
totum corpus inter sedendum innititur. Con-
stant nates ex capite femoris validissimis mu-
sculis obducto. Horum rotunda & extube-
rantes partes clunes nominantur, die Hæn-
den.

PES.

Pes sive Crus, σκέλη, est totum membrum
à coxendicis osse usque ad extrema digitorum
pedis.

FEMUR.

Femur, μηρὸς, est superior pars magni pedis,
unico constans osse, cuius Os est omnium os-
sum totius humani corporis maximum.

GENU.

Genu, γόνυ, est iunctura sive coarticulatio
femoris cum ossibus tibia, cuius iunctura an-
terior pars genu, posterior autem poples no-
minatur.

PATELLA.

Patella, μύλα, id est mola, est os rotundum
instar disci, articulationi tibia & femoris
præpositum: usus ejus est ne femur in flexu ti-
bia in anteriora luxetur.

CRUS.

Crus, σκέλη, Galenus pro toto ma-
gno pede, femore videlicet & tibia usur-
pat.

TIBIA.

Tibia, *κνήμη*, est universa pars qua inter genu & talum posita est, constans duobus ossibus oblongis, quorum anterior totius membri nomine *κνήμη*, id est os tibia & radius nominatur, exterius autem & gracilius *περόνη*, id est fibula nuncupatur.

MALLEOLI.

Malleoli, *ῥαχίδες*, sunt infirma partes sive extuberantes partes processus ossis tibia & fibula qui foris gibbi, intus carvi cernuntur.

TALUS.

Talus, *ἄστρον*, & *ῥαχίς*, Latinis os balista, sunt ossa nuci balistae formam referentia, inter tibiam & calcem posita.

PES.

Pes, *πῦς*, absolute minorem pedem significat. Est autem parvus pes quicquid maleolis subjacet.

CALCANEUM.

Calcaneum, *ῥαχίς*, est os inter ossa minoris pedis maximum, ima ejus pars proxima est terra qua fit incessus, postica ejus pars rotunda est.

PLANTA PEDIS.

Planta pedis, *πῶς*, sunt quinque ossa quinque digitorum ossibus praeposita.

SECTIO VI.

De

SPIRITIBUS.

Quinta res naturalis qua ad constitutionem humana natura requiritur, est spiritus, qui nunquam in corpore est solitarius, & perpetuo cohaeret cum humido primogenio & calido innato.

I. Quid est Spiritus?

Spiritus est aërea substantia, calida & humida, seminibus omnium rerum, tam animantium quam stirpium divinitus indita, qua in formatione corporum una cum humido primogenio & calido innato per totam corporis substantiam est sparsa & diffusa.

2. Suntne unius aut diversarum substantiarum, spiritus, calidum innatum & humidum primogenium?

Hac tria diversa sunt substantia, tamen in corporibus ita inter se sunt confusa & mixta, ut non, nisi cogitatione ab invicem separari possint. Et horum quidem trium simul ope & beneficio omnia vivencia tam animata quam stirpes formantur, vegetantur, vivunt, sentiunt, moventur & conservantur: & durant hac tria in corporibus per totam vitam, inter qua humidum primogenium subiecti, calidum innatum causa efficientis, spiritus autem instrumenti rationem obtinet.

Spiritus, calidum innatum Humidum primogenium, quomodo inter se cohaereant.

3. Humidum primogenium quid est?

Humidum primogenium sive Radicale est substantia aërea, pinguis, instar purissimi olei primum è semine deducta & omnibus membris insita. Galenus vocat *σπέρμα* & *ὄρνις*. in hoc humido tanquam in subiecto consistit calor innatus & spiritus.

4. Quid est innatus Calor?

Calidum innatum Galenus *ἐμφυλὸν θερμὸν* vocat; est autem Calor innatus qualitas caliditas, suavis & temperata, non urens ut Elementaris caliditas, cujus caloris beneficio foveantur & vivunt omnia. Obtinet hic Calor rationem efficientis causa. Excitat enim spiritum ut vehat potentias ad membra; eaque excitet ad actiones.

5. Quomodo se habet Spiritus in humido Radicali?

Spiritum naturalem Galenus *φυσικὸν πνεῦμα* nominat, qui à Calore caelesti nativo in humido primogenio extitatur, & ut diximus rationem instrumenti obtinet. Hic spiritus naturalis in seminibus est causa formatrix, post conformationem partium alteratur in principalioribus membris, epate, corde & cerebello, & ut diversas edit actiones, ita diversa sortitur nomina.

6. Quot sunt species Spirituum in corpore humano?

Tres sunt spiritus tribus potentiis animae servientes, Naturalis, Vitalis & Animalis.

Tabella Spirituum Corporis humani.

Spiritus in corpore humano sunt tres,	{ Naturalis, Vitalis, Animalis: }	quorum fontes sunt	{ Epar, Cor, Cerebrum: }	Vehunt in partes, potentias	{ Naturales, Vitales, Animales.
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

7. Spiritus Naturalis quid est?

Spiritus Naturalis quid.

Ejus nutrimentum.

Spiritus Naturalis, πνεῦμα φυσικόν, est caelestis quidam halitus à calore nativo in humido radicali excitatus, quo naturales potentia in formatione & generatione partium gubernantur, ac tandem hic spiritus in omnibus corporis partibus dispersus fovertur, conservatur & nutritur vapore sanguinis in epate genito, qui vapor etiam communi appellatione spiritus naturalis nominatur, & una cum sanguine per venas ad omnes partes nutriendas deferitur, ac in substantiam predicti spiritus Naturalis tanquam materia propria convertitur.

Hinc quidam spiritum naturalem tenuem sanguinis vaporem definiunt: sed revera vapor sanguinis non est spiritus naturalis, sed ejus tantum comes & materia. Itaque spiritus naturalis omnium primus, & materia quadam reliquorum spirituum: Spiritus naturalis gubernat potentias Anima Generatricem, Formatricem, Austicem, Nutritivam, Attractivam, Retentivam, Alterativam & Expulsivam.

8. Cur Philippus in Libello de anima negat esse spiritum naturalem in corporibus viventium?

An sit spiritus naturalis.

Imo Gal. l. 5. de simpl. med. fac. c. 9. ex. presse asserit esse innatum spiritum omnium naturalem actionum opificem.

Deceptus est Philippus quorundam Medicorum recentium autoritate, Manardi & Fuchsii, qui negabant spiritum naturalem corporibus viventium inesse, auti hisce falsis rationibus.

I. Quia nulla sit cavitas in epate, ubi generari possit spiritus.

II. Quia nulli sunt peculiare canales vehendo spiritui naturali destinati.

III. Quia spiritus in suo loco semper pulsatur, sed in venis nullus sentitur pulsus.

IV. Quia Galenus nusquam asserit esse spiritum naturalem. Sed revera nihil magis pugnat cum principiis Philosophia, quam di-

cere in viventium corporibus non esse spiritum naturalem, cujus solius beneficio, Theophrasto teste, non animantia tantum sed & stirpes vegetantur, crescunt, vivunt & conservantur, quin & impossibile est sanguinem crassum & grave corpus sursum ad cor & cerebrum elevari sine propulsione spiritus naturalis.

9. Quid est spiritus vitalis?

Spiritus vitalis est aërea substantia instar flammæ calidæ in cordis thalamis primum ex spiritu naturali genita, & hinc per arterias ad omnes corporis partes diffusa.

Spiritus vitalis.

10. Quomodo generatur spiritus vitalis?

In prima formatione sicut reliqua omnes corporis partes, ita & cor, his tribus est imbutum, Humido radicali, calore Nativo, & spiritu Naturali, simul confusus. Calor itaque nativus in humido radicali in cordis substantia existente, excitat spiritum Naturalem, qui collectus in thalamos cordis specifica virtute cordis preparatur & in flammeam substantiam convertitur, quæ spiritus vitalis dicitur. Augetur ac fovetur vitalis in viventibus vapore sanguinis in dextro ventriculo cordis preparato tanquam proprio suo alimento. Ejus autem fervor & aestus subinde mitigatur & refrigeratur aëre per respirationem & per transpirationem attracto. Deferitur hic spiritus vitalis ex sinistro cordis ventriculo per arterias in omnes corporis partes, quas vivificat, fovet ac calefacit; in corde autem subinde excitat varia pathemata sive affectuum genera.

Vitalis spiritus nutrimentum.

11. Quid est spiritus animalis?

Spiritus Animalis est aër instar lucis splendidissimus & atheræ substantia in cavitatibus cerebri contentus, qui in hominibus divinam habet originem. Hic enim est ille spiritus de quo Gen. c. 2. scribitur: Inspiravit in naves ejus spiraculum vitæ: huic spiritui miscet se Spiritus Sanctus, & gubernat mentes & actio-

Spiritus animalis origo divina.

Et actiones piorum; estque principalissimum Organum prestantissimarum in vita actionum intellectus, voluntatis, sensus & motus, & gubernator omnium virtutum. Conservatur spiritus Animalis ac nutritur spiritu vitali, qui ex sinistro cordis thalamo per arterias in cerebri ventriculum defertur, virtuteque cerebri purificatur, & in lucidissimam substantiam radiis solaribus similem convertitur, & Animalis, quasi nutrimentum fomentumque commiscetur. Spiritus Animalis ex cerebri cavitatibus per nervos in omnes corporis partes, qua sensu ac motu indigent, defertur, ventilatur, purificatur & refocillatur hic spiritus aëre per nares attracto.

SECTIO VII.

De

POTENTIIS ANIMÆ
HUMANÆ.

Potentia Anima sunt sexares qua ad perfectionem humana natura requiruntur.

I. Quid sunt potentia Animæ?

Δυνάμεις, Potentia, vires, Facultates & virtutes Synonyma sunt. Sunt autem Poten-

Omnes potentia Anima sedem ha- bent aut in	{ Epate, Corde, Cerebro: }	Quas Plato vo- cat	{ επιθυμη- τις, θυμη- τικὴ, λογιστικὴ. }	Medi- ci vo- cant	{ Natura- lem, Vitalem, Anima- lem: }	Aristo- teles nomi- nat	{ Vegetativ. Appetitiv. Sensitiv. Locomotiv. Intellectiv. }
--	----------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	---	----------------------------------	---

3. Naturalis potentia quid est?

Naturalis potentia, qua in conformatione humana natura prima est, reliquas omnes precedit, est vis quadam & qualitas omnium viventium seminibus primum divinitus implantata. In homine vero post ejus conformationem in Epate quasi proprio domicilio constituta. Ejus potentia ope ac beneficio omnia viventia ex semine conformatantur, nutriuntur, augmentantur, & speciem sibi similem produciunt: ac quia hac naturalis potentia tres insignes ad natura conservationem necessarias producit actiones, ideo eam Aristote-

lia Anima qualitates quadam effectrices omnium humanarum actionum. Est enim Anima hominis prima & principalis causa sit actionum, tamen sine potentis non agit Anima. In hoc autem differunt potentia ab ipsa Anima substantia, quod potentia augmentum & decrementum suscipiunt & cessare possunt, Anima vero substantia neque augetur neque diminuitur & per aternitatem durat. Cum itaque unica Anima complures edat actiones, variis ad eas utitur potentis.

2. Quot sunt genera Potentiarum animæ hominis?

Plato in Timao & omnes Medici potentiarum differentias à sedibus sive fontibus quibus ipsa delitescunt, sumentes, tria potentiarum genera constituent, Naturalem, Vitalem & Animalem. Aristoteles vero qui Anima substantiam totam per totum corpus diffusam esse docet, neglectis sedibus Anima, ab actionum generibus differentiam sumit, & quinque potentiarum genera statuit, vegetativam, appetitivam, sensitivam, locomotivam, & intellectivam: non tamen propterea Medici & Aristoteles inter se dissentiant, quia Galenus sub Animalis potentia sensitivam, locomotivam & intellectivam completitur, ut sequens ostendit tabella.

Scal. I. 1.
de plant.
Anima
simplex
substantia,
multiplex
potestate.

Vnde de-
sumantur
differen-
tiæ poten-
tiarum.

Naturalis
potentia
opera.
Subdivi-
sio poten-
tiæ natu-
ralis.

les in tres precipuas subdividit potentias, videlicet in Generatricem, Nutricem, & Nutricem, qua singula per vita nostra periodum certo temporis spatio tantum durant. Dum enim fatus in utero geritur, omnes ha tres suas exerunt actiones, magis tamen dominatur Generatrix sive Formatrix, deinde edito in lucem partu Generatrix quiescit, agentibus Nutrice & Altrice. Post ætate vero, qua est annus 25. cessat Altrix, Nutrix vero usque ad finem vita durat: hujus naturalis potentia fons & sedes est Epate.

4. Suntne

4. Suntne aliæ potentie Naturales præter has in corpore humano?

Potentie naturales ministrantes reliquis. Præter Generativam, Nutritivam & Augmentativam potentias Naturales, quæ in Epate sedem habent, indidit Deus omnium partium fibris, quatuor potentias naturales

tribus jam dictis subservientes, Attractivam, Retentivam, Alterativam, & Expulsivam, quæ propriè naturales potentie dicuntur, eò quod nec Generativa, nec Nutritiva, nec Augmentativa citra earum quatuor auxilium actiones suas exercere possunt, ut sequens ostendet tabella.

Tabella potentiarum Naturalium.

Potentie naturales, quarum fons est Epas, sunt	Generativa, Nutritiva, Augmentativa:	Quibus subserviunt 4. naturales potentie,	Attractiva, Retentiva, Alterativa, Expulsiva:	Quæ si- ta sunt in par- tium	Fibris rectis, Fibris obliquis, Calido innato, Fibris transver- sis.
--	--------------------------------------	---	---	---------------------------------------	--

5. Generativa Potentia quæ est?

Est vis naturalis seminibus omnium viventium à Deo insita, quæ qualibet possunt similem sibi speciem generare.

6. Nutritiva potentia quæ est?

Nutritiva potentia est vis naturalis, quæ omnia viventia alimenta assumpta in suam substantiam convertere possunt.

7. Augmentativa potentia quæ est?

Est vis naturalis quæ omnes solida partes per omnes dimensiones extenduntur.

8. Attractiva potentia quæ est?

Est vis omnium partium fibris rectis naturaliter insita, quæ singula membra in nutritione sibi similia & familiaria ex cibo & potu assumpto attrahunt.

9. Retentiva potentia quæ est?

Est vis natura insita omnium partium fibris obliquis, quæ attractum ex alimento succum in se tantisper continent, donec perfecta ejus fiat alteratio.

10. Alterativa potentia quæ est?

Alterativa sive concoctrix facultas est vis sita in calore innato, quo singula membra sunt imbuta, quæ alimenta attracta & retenta concoquuntur, novam formam recipiunt & in corporis nostri substantiam convertuntur.

11. Expulsiva potentia quæ est?

Est vis singularum partium fibris trans-

versis naturaliter insita, quæ partes omnia noxia & supervacanea, naturamque molestantia à se expellunt & excernunt.

12. Quæ est secunda Animæ potentia?

Vitalis, quam Plato *ψυγείδης*, Galenus irascentem sive affectuum generatricem vocat, quæ est vis quadam cordis, quæ vivificus calor spiritusque vitalis ex corde per arterias in universum corpus transfunditur, eoque fovetur ac vivificatur & ejus agitatione omnes affectus & perturbationes concitantur. Est autem vitalis potentia reliquarum potentiarum omnium conservatrix ubi ea intercipiatur veluti sit in syncope, statim & reliqua cessant in suis actionibus.


Vitalis potentia.

13. Quæ est tertia Animæ potentia, & quot sunt ejus species?

Animalis Potentia Platoni *λογιστική* & Aristoteli Intellectiva dicitur, & in cerebro locum obtinet. Est autem potentia Animalis, vis quadam in cerebro sedem habens, quæ homo ratiocinatur, sentit ac movetur, quæ ex cerebro per nervos, unâ cum spiritu Animalis in totum corpus & omnes ejus partes sensus ac motu indigent, diffunditur. Galenus itaque tres animalis facultatis species constituit: Intellectivam, Sensitivam & Locomotivam.

Animalis potentia.

Tabella Animalis Potentiæ.



SECTIO VIII.

De

ACTIONIBUS HUMANIS.

Septima res in natura humana existens sunt Actiones, quæ si sint inculcata, sanitatis; si vitiosa, morbi sunt indices.

1. Quid est Actio?


Actio sive functio, Græcis ἐνέργεια, est motus activus sive efficiens ab una trium prædictarum potentiarum productus. Id vero

quod actionem consequitur, ἔργον, id est opus nominatur, ut à potentia vegetativa oritur actio, qua nutritio dicitur, & relinquit opus videlicet sanguinem, & sanguinis assimilationem substantiis partium.

2. Humanarum actionum quot sunt genera?

Quemadmodum tria sunt & spirituum & Potentiarum in corpore nostro genera, ita omnes actiones humana ad tria genera, tresque illas potentias tanquam causas efficientes referuntur; suntque actiones omnes aut naturales, aut vitales, aut animales, veluti sequens ob oculos ponit tabella.

Tabella actionum humanarum.



3. Quæ sunt Actiones Naturales?

Actiones naturales sunt quæ ex potentiis naturalibus producantur, veluti sunt Generatio, partium conformatio, nutritio, augmentatio, sanguificatio, assimilatio, quibus subserviunt naturales propriæ actiones dictæ, attractio, retentio, concoctio, alteratio & expulsio, quibus & cibi potusque naturalis appetentia, quam famem sitimque appellamus, addi potest.

4. Quæ sunt Actiones vitales?

Sunt quæ ex corde per potentiam Animæ vitalem sive irascentem proferuntur, veluti sunt motus cordis qui duplices sunt, pulsus nimis & affectus. Pulsus cordis constat ex duplici motu, *Διγσολῇ* una id est dilatatione, & *συσσολῇ* id est constrictione cordis, quo motu & arteria omnes pulsantur. Affectus sive Animi perturbationes sunt motus cordis turbulentissimi ab objectis bonis aut malis orti, in quibus cor non tam agit, quam patitur: hinc Græcis Affectus *παθήματα* nominantur. Affectuum species sunt Latitia, Tristitia, Spes, Confidentia, Desperatio, Metus, Amor, Odium, Misericordia, Invidentia, Verecundia, Pudor, Humanitas, Morositas, Modestia, &c.

5. Quæ sunt Actiones Animales?

Actiones Animales sunt quæ à Potentia Animali in cerebro existente excitantur,

quæ triplicis sunt differentia. Alia enim sunt Inorganica & fiunt in cavitatibus cerebri, quæ solis hominibus sunt propria, veluti sunt sensus communis sive Receptio qualitatuum sensibilium in abstracto, Imaginatio, Ratiocinatio seu Dijudicatio & Memoria, his annumerari possunt somnus & vigilia, quæ passiones potius, quam actiones cerebri dici debent. Alia sunt organica, hominibus communes cum brutis, quæ extra cerebrum per nervos & propria instrumenta perficiuntur, veluti sunt actiones sensuum exteriorum, visus, auditus, odoratus, gustus & tactus. Alia sunt in omnibus corporis partibus, quemadmodum sunt actiones motus voluntarii, ut ambulatio, apprehensio, & partium extensio ac contractio.

6. Fiuntne alii motus locales in corpore, qui à voluntate non gubernantur?

Fiunt, sed quia à morboficis & violentis oriuntur causis, non inter actiones Animales, sed Passiones potius numerantur: tales sunt tremor, horror, escitatio, pandiculario, jectigatio, singultus, tussis, vomitus, cordis palpitatio, &c. Quid autem sint singula actiones & quomodo quibusque organis & in quem finem in vita perficiantur, ex libro de anima & ex doctissimi Ferneli Medicina sunt addiscenda.

Motus corporis morbofi & depravati.

Affectus animi.

COMPENDII

ARTIS MEDICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER SECUNDUS,

De sex rebus non naturalibus.

I. Quæ est secunda Medicinæ pars, & quænam res in ea tractantur?



SECUNDAM Medicinæ partem Græci vocant *ὕγιεινν*, id est sanitatis naturæque ex jam enumeratis rebus exstructa conservanda rationem. Docet enim hæc

Medicina pars de iis rebus sive objectis artis, citra quarum quotidianum usum natura humana subsistere minimè potest, & quarum moderata & convenienti usurpatione sanitas & longævitæ conservatur, & natura in meliorem constitutionem convertitur: de contra earum abusu & illegitima applicatione in morbos & exitum præcipitatur. Hinc Galenus eas res causas conservatrices & alteratrices, Recentiores autem res non naturales, eò quod non sint partes essentielles humanæ naturæ, veluti sunt septem res prædictæ, nominant.

Sunt autem Res non naturales numero sex, Aër, cibis & potus, somnus & vigilia, Exercitium & Quies, Retentio & Excretio, Animi affectiones.

SECTIO I.

DE AERE.

Octava res quæ circa humanam naturam consideranda venit, & quæ prima numeratur inter Res non Naturales sive causas conservantes & alterantes naturam, est Aëris corpus nostrum ambientis constitutio.

1. Cur Aëre nobis ad conservationem naturæ est opus?

Aëris nostrum corpus ambientis tanta est Aëris necessitas omnibus animantibus ad vitam necessitas conservandam, ut sine eo, momento quidem vivere nequeant. Nulla enim ratione evitare possumus, sed etiam invitis nobis hauriendus est aër. Per magna igitur habenda est ratio aëris, docente Galeno, qualisnam sit aëris corpus nostrum ambientis constitutio, substantia & qualitas, sine quo nec curari morbi, nec tueri sanitas potest.

2. Quot modis attrahitur Aër ambiens in corpus nostrum?

Duplici ratione haurimus aërem ambientem intra nostrum corpus, per os naresque, & per poros cutis. Per os & nares haurimus inspirando, per poros vero perspirando. Per Inspirationem os qui attrahitur Aër, primum per asperam Arteriam in pulmones ducitur, & in sinistrum cordis thalamum: qui verò per nares hauritur, is partim in cerebrum, partim ad fauces deferitur: qui vero per poros cutis attrahitur, is per Arterias totius corporis permeat.

3. Quot & quæ utilitates sunt Aëris intra corpus nostrum hausti?

Dux sunt præcipuæ utilitates hausti aëris, utilitates videlicet vita conservatio, & natura alteratio. Vita conservatio per aërem attractum fit tali ratione; spiritus vitalis in corde & arteriis, & spiritus Animalis in cerebro, hausto per respirationem & per expirationem aëre, nutritur & fruitur & simul purgatur atque purifi-

purificatur. Cum maxima enim parte hausti aëris, fuliginosi & astuantes halitus, tanquam excrementa spirituum per expirationem & pororum cutis dilatationem exhalantur & evectuntur, & minima tantum pars, eaque purissima cedit in nutrimentum spirituum. Excludo itaque aëre & cohibita respiratione suffocantur animantia, & cohibita spiratione putrescunt humores in corporibus.

4. Alteratio naturæ quot modis & quomodo fit per aërem ambientem?

Duplici ratione alterare potest corpora nostra Aër ambiens, Essentia videlicet & qualitate. In alteratione primum omnium spiritus in corporibus ab Aëre hausto immutatur, quorum alterationem statim comitatur & Animi & corporis & Temperamenti adeoque totius naturæ immutatio. Essentia itaque Aëris temperata, serena & pura reddit puros & agiles spiritus. Hinc est quod homines cælo sereno sunt hilares, agiliores & ad actiones omnes peragendas habiliores; & è contra in turbida & nebulosa aëris constitutione subtristiores & languidiores sunt. Ita quoque pestilens, crassus, fatidus & corruptus aër sua substantia statim insicit spiritum vitalem, & extinguit in nobis flammam vitæ. Simili ratione Aër excessu sua qualitat

alterat corpora nostra. Calidus enim calefacit, frigidus refrigerat, humidus humectat, & siccus arefacit & squalidiora reddit. Quin & mores & ingenia hominum aër ambiens fingit & alterat. Quod enim Asiatici molles sunt, effeminati & imbelles, & Europæi & septentrionalium locorum incolæ fortes & bellicosi, id constitutioni Aëris tribuit Hippocrates, & ob hanc causam necessaria est tyronibus Medicina cognitio Astronomia & Geometria, ex quibus discunt aëris & ventorum naturam. Aër enim alteratur pro diversitate regionum, partium anni, & pro ortu ac occasu syderum.

Mores aë-
tis natu-
ram se-
quuntur.

Hipp. I. de
aëre loc.
& aq.

5. Qualis constitutio aëris cuilibet corpori ad naturæ suæ conservationem convenit?

Quantum ad Essentiam attinet, purus & amœnus aër omnibus corporibus convenit: & vice versa crassus, fatidus & pestilens omnibus hominibus est perniciosus. Sed quantum ad qualitatem aëris attinet, temperatus aër temperatis solum corporibus convenit, secus verò habentibus contrariatur, ut calidus frigidus, frigidus calidus, siccus humidus, humidus siccus: in quibus & salubrius & diutius vivere possunt, & sequenti tabella conspiciuntur.

Tabella constitutionis Aëris.

Aëris corpus nostrum ambientis observare oportet	{	Essentiam, an sit	{ Purus, Amœnus: }	{ est saluberrimus.		
			{ Pestilens, Crassus, Nebulosus, Fatidus: }		{ est perniciosus.	
	{	Qualitatē, an sit	{ Temperatus qui temperatis convenit. Calidus, Frigidus, Humidus, Siccus, }	{ conve- nit }	{ Frigidis Calidis Siccis Humidis }	{ corpori- bus.

SECTIO II. DE CIBO ET POTU SIVE ALIMENTIS.

Nonum obiectum circa quod ars Medica versatur, siue secunda Res non naturalis est nutrimentum siue cibus & potus intra corpus assumptus. Dicitur autem cibus quicquid in sicciori, potus vero quicquid in humidiori substantia intra corpus assumitur.

Cibus & potus quid.

1. Cibus & potus assumptus quid præstat in corpore nostro?

Cibi utilitas.

Cibus potusque intra nostrum corpus ingessus, triplicem producit in natura effectum. Primum conservat corporis integritatem & corroborat corpus nutriendo, teste Lucretio, qui inquit; propterea capitur cibus, ut suffulciat artus, cum enim tota corporis moles perpetuo fluori siue absorptioni per caloris naturæ actionem sit subiecta, natura minime subsistere posset, nec robur corporis tueri, nisi subinde cibi potusque assumptione id quod defluxit per nutritionem restauraretur. Secundo Cibus & potus assumptus alterat corpora nostra, id est, immutat temperiem corporum. Calida enim alimenta calefaciunt, frigida refrigerant, sicca desiccant, & humida humectant nostra corpora. Tertio cibus & potus immutat formatque mores & ingenia. Corporis enim temperiem sequuntur hominum mores, Galeno & Platone in Timæo testibus. Qualis enim est cibus assumptus, talis erit & sanguis nutriendus, qualis sanguis tales sunt & ingenia.

Gal. l. 1. de san. tuend. Bona vitæ ratio moris quoque bonos reddit.

2. Quomodo fit nutritio?

Nutritio est alimenti assumpti in corporis nostri substantiam conversio & assimilatio. Verum fames nutritionem semper præcedit. Est autem fames appetentia cibi, sicut sitis est appetentia potus, vel ut Galenus definit, Fames est sensus suctionis venarum. Membra enim omnia ad restitutionem eorum qua in eis sunt assumpta, sugunt sanguinem ex venis in sese contentis, qua rursus sugunt sanguinem ex venis maioribus proximis; ille iterum ex vena cava, vena cava exhausta tra-

Fames quid. Quomodo appetitus excitetur.

hit sanguinem ex Epate, Epas trahit χύλον ex venis Mesaraicis, vena Mesaraica ex intestinis, intestina ex ventriculo per pylorum, ventriculus autem ex attractione corrugatur, moventur nervi ex cerebro in ventriculum dispersi, qui dolorem siue appetentiam cibi & potus, qua fames sitisque nominatur, excitat & cogit hominem ad quarendum & assumendum alimentum. Nutritio itaque tali modo & ordine fit. Alimenti assumpti primum in ore fit quadam præparatio & comminutio, quod tamen gula excipit & ventriculo defert. Ventriculus autem assumptum alimentum artissimè complectitur, & innato suo calore concoquit & specifica virtute transmutat in succum cremori præparatam similem, quem Græci χύλον vocant, succo exactè concocto aperitur πύλας, id est inferius orificium ventriculi & in intestina profunditur, ex quibus benigniorem huius succi partem sugunt vena Mesaraica, quarum orificia inserta sunt intestinis, crassior autem & terrestrior huius succi pars deicitur per alvum.

Modus concoctionis ventriculi.

Porro suavior pars chyli per venas Mesaraicas attracta deferitur in Epas, ibidemque secundo concoquitur, & specifica Epatis virtute convertitur in massam sanguineam, qua massa exactè concocta purificatur & ab Elementaribus superfluitatibus segregatur. Quicquid enim ignea superfluitatis massa sanguinea inest, vesicula bilis excipit & fugit, terrestriorem feculentiorique ejus partem rapit ad se lien; aquosiorum vero Renes, purior autem sanguis cogitur in venam cavam, unde per venarum ramos in universum corpus & omnes partes nutriendas deferitur & distribuitur; qui ubi è venarum orificiis in substantiam partium instar rovis elabatur, primum fit appositio, secundo agglutinatio & tertio assimilatio, qua finis est nutritionis.

Sanguificatio in epate.

3. Alimenta & Medicamenta intra corpus assumpta quomodo inter se differunt?

Assimilatio in solidis partibus.

Omnia qua intra corpus assumuntur aut sunt alimenta aut medicamenta, qua in hoc tamen inter se differre ait Galenus l. 4. cap. 2. de simplicium facultatibus; Quod alimenta alterantur in corpore & transeant in partem nutriendam substantiam: Medicamen-

Alimentorum differentia.

ta vero alterant corpus. Porro alimentorum alia sunt absolute alimenta, quae semper alterantur & in substantiam corporis convertuntur, veluti sunt panis, caro, cerevisia, lac & similia. Alia sunt alimenta medicamentosa, quae partim alterantur in corpore, partim alterant ipsum corpus, ut lactuca, pruna, Vinum &c. Simili ratione Medicamentorum alia sunt absolute Medicamenta, quae semper alterant corpora nostra, talia sunt omnia pharmaca fortiter purgantia & deleteria; alia sunt Medicamenta alentia, ut sunt mel, vinum &c.

4. Circa delectum alimentorum quae sunt observanda?

Observanda in usu alimentorum. Sanitatis studiosis octo sunt consideranda, circa cibi potusque electionem, veluti sunt:

I. Substantia. II. Quantitas. III. Qualitas. IV. Consuetudo utentis. V. Suavitas. VI. Mundities. VII. Ordo ingerendi. VIII. Tempus conveniens.

Substantia alimentorum. I. Substantia alimentorum diligenter est consideranda, quae alimenta sunt tenuia, quae crassa, quae & ὀνυχία, quae & ἄρσενος, id est ex quibus aut purus aut praeus generetur sanguis. Ex boni enim succi cibi optimus producit sanguis & replet corpus & ἰσχυρὰ. Debet itaque cibi & potus eligi qui substantia sit mediocris, & boni succi. Crassiorum enim alimentorum usu obstructions viscerum generantur.

Quantitas. II. Quantitas sive mensura ingerendorum, quae tanta esse debet ut vires reficiat non opprimat. Vbi enim plus alimenti ingeritur quam natura exigit, & conficere potest, morbos facit teste Hippocrate 2. Aphorif. 17. Memoria itaque tenenda est saluberrima Hippocratis sententia 6. Epidemiorum Sectione IV. Ἀσθενὲς ὕμνην ἀνέχιν τοσοῦτος ἀσθενὲς πόνος, id est, studium sanitatis est non satiari cibis & impigrum esse ad labores.

Qualitas. III. Qualitas, qualis videlicet cibi potusque cuiuslibet corporis natura conveniat. Temperatis enim naturis temperata alimen-

ta, frigidis vero calida, calidis frigida, humidis sicca, siccis humida magis idonea sunt.

IV. Consuetudo, consueta enim etsi paulo deteriora sunt insuetis salubrioribus sunt praefenda, teste Hipp. I. Aphorif. 17. & Galen. l. 5. c. 8. de tuenda sanitate disertè docet, consuetudinem etiam pravam in assumendis alimentis non temere esse mutandam, nisi urgente aliquo periculo.

V. Suavitas. Nam quae cum voluptate assumuntur, melius & citius in ventriculo concoquuntur. Rectè itaque suadet Hippoc. 6. Aphorif. 38. inquit; Parum deterior cibi & potus, suavior tamen, melioribus sed minus suavis est antefendus.

VI. Mundities, ne videlicet quis sine delectu alimenta sordida sit obducta & ab iis qua foris incidere possunt non abluta alimenta ingerat, unde tandem prurigne, scabie, & venenosus qualitatibus afficitur corpus.

VII. Ordo ingerendi, ut nimium cibi molles & concocti faciles praemittantur cibis durioribus & concocti difficilioribus.

VIII. Tempus id est hora prandii & coena: Tempus est autem opportunissimum assumendi cibi & potus, ubi appetentia cibi, id est fames adest, & quando ante assumpta alimenta exactè sunt digesta & alvus ab excrementis est exoneratus.


Plurimum autem facit ad tuendam valetudinem, si corpus moderatè exercèatur ante assumptionem cibi, juxta Aphorismum Hippoc. Labores cibos praecedant.


5. Communia familiariaque alimenta quae sunt & unde sumenda?

Omnia alimenta natura humana convenientia sumuntur aut à terra nascentibus, veluti sunt radices, olera, frumenta, legumina; aut sumuntur ex arboribus, ut sunt fructuum genera; aut ex animantibus vel pedestribus vel volucris, vel aquatilibus, qualia sunt Lac, butyrum, caro & ova, quorum usitatoria sequens tabella complectitur.

Tabella

Tabella Alimentorum usitatorum.





Radices
esculentæ.

6. Quæ sunt temperamenta & facultates
Alimentorum ex Radicibus sum-
ptorum.

Rapum, ραπίδιον, **grosse Rüben** / ca-
lidum est & humidum in primo gradu, saginat
& crassum gignit sanguinem, & flatus gene-
rat. Diosc. lib. 2. cap. 104.

Napus, βυνάς, **Stechrüben** / calidus
est in primo, parum nutrit, flatus generat &
Venerem excitat. Diosc. lib. 5. cap. 105.

Cepa, κρόμμυον, **Zypollen** / calida
est & humida, valde mordax, parum nutrit,

melancholicum generat sanguinem, flatus gi-
gnit, visum debilitat, tumultuosum somnum
parit. Diosc. l. 2. c. 145.

Porrum, πτερίον, est ex ceparum genere &
easdem habet facultates.

PETROSELINVM, σέλινον, est a-
pium hortense calidum & siccum, parum nu-
trit, tenuem gignit sanguinem, urinam &
menstrua movet, flatus discutit.

CAROTA vel fiser, σίσαρον, **gelbe
Rüben oder Mohrrüben** / calidum est
moderate, probe nutrit, ventriculum cor-
robo-

roborat, & bonum generat sanguinem. Diosc. lib. 2. c. 107.

PASTINACA, calida est & humida, crassum generat sanguinem, probe nutrit, Venerem excitat, urinam & menses promouet, semen ejus ventres mulierum ex flatu tumentes tollit. Diosc. lib. 3. c. 53.

7. Quæ sunt Temperamenta & facultates Olerum quæ in alimentum veniunt?

Olera.

Olus est generis vocabulum & significat omnia alimenta quæ sumuntur ex herbaceis generibus.

BRASSICA, καρότι, Kohli / durum est generum, Crispa seu foliata, & brassica capitata, Trabbus odet weiskohli / omnia autem brassicarum genera calida sunt & moderatè sicca, parum nutriunt, crassum & melancholicum gignunt sanguinem; oculis obsunt. Diosc. l. 2. c. 113.

LACTUCA, Σελδα, Lactuche / frigida est & humida, parum nutrit, sitim arceat & somnum conciliat. Diosc. l. 2. c. 129.

BETA, τεύκλον, Berthe / calida est & humida, parum nutrit, crassum gignit sanguinem, stomachum mordicat, & alvum ad excretionem prorit. Diosc. l. 2. c. 116.

SPINACVLA, σπινάκια, est olus & species atriplicis sativa, frigida & humida, parum nutrit, ventrem lenit. Diosc. lib. 2. c. 112.

CEREFOLIVM, περισδίων, utilissima est stomacho, moderatè calida & sicca, temperatum gignit sanguinem. Diosc. lib. 2. cap. 121.

Frumenti genera.

8. Quæ sunt Temperamenta & facultates Frumentorum quibus vescimur?

TRITICVM, πορὸς, Weige / calida est & humida moderatè. Panis ex tritico confectus plenissimè nutrit, optimum temperatumque gignit sanguinem. Diosc. lib. 2. c. 83.

SILIGO, ἄλυσ, Roggen / calida est & humida. Panis siliginis minus nutrit quam triticeus, bonum gignit sanguinem. Diosc. l. 2. c. 84. Dicitur etiam hoc genus frumenti, secale.

HORDEVUM, κριθή, frigidum & sic-

cum est. Ex hordeo varia genera tum esculentorum tum potulentorum parantur. Panis autem ex hordeo parum nutrit & prævum sanguinem gignit, sed zythum quod cerevisiam vocant ex hordeo coctum probè nutrit bonumque gignit sanguinem. Hordeum à cortice superiori mundatum quod ptisana & nobis Gerstegruppen nominatur, probe nutrit bonumque gignit sanguinem; qua ptisana, si crassiusculè confringatur, κρημνός, nobis Gerstgrünze nominatur, quod & ipsum optime nutrit & bonum gignit sanguinem. Quæ autem hordei non excorticati sed usque ad crepaturam cocti, item cremor ptisana ex confracta ptisana coctus, quod nobis gerstweilgen / refrigerat, sitim sedat, humectat & asperitates lenit, ideo febricitantibus commodissimè exhibetur. Diosc. l. 2. c. 79.

Cerevisia.

Ptisana.

Deco-

ctum

Hordei.

AVENA, βρώμη, Haber / calida & sicca est moderatè. Fit ex avena tosta & excorticata crassiusculeque trita κρημνός, Habergrünze / ex quo conficitur pulmentum & cremor qui optime nutrit, bonum gignit sanguinem & asperitates non secus ac cremor ptisana lenit. Diosc. l. 2. c. 87.

ORYZA, ὀρύζα, Reis / calida & sicca est in primo gradu, mediocriter alit, & bonum gignit sanguinem, sed alvum constringit nisi corrigatur saccharo. Diosc. l. 2. c. 88.

Ex Frumentis varia conficiuntur panis genera, veluti sunt similaceus Weißbrodt / siliginis Roggenbrodt / panis bis coctus vel nauticus Zwebachen / Panis hordeaceus Gerstenbrodt / Panis furfuraceus Hundebrodt / Panis elorus Weggen item Viringeln: Panis autem à pascendo nomen habet, Nonio teste. Alii autem à πᾶς, id est omne, quod omnia obsonia sine pane sint insipida.

Panis genera.

9. Quæ sunt Temperamenta & facultates leguminum quæ in alimento usurpantur?

Legumina esculenta.

PISVM, πῖον, Erbsen / frigidum est & siccum, bonum gignit sanguinem, sed parum nutrit, & flatu generat, calculumque movet. Galen. lib. 1. cap. 27. de Aliment. facult.

FABA, ῥυάκη, Bonen / frigida est & sic-

Et sicca, crassum gignit sanguinem, mediocriter nutrit, inflationes plurimas excitat. Faba decocta cum corticibus, earum jusculum prodest dysentericis. Farina ejus cutis sordes detegit. Diof. lib. 2. cap. 98.

MILIVM & PANICVM, Græcis *κίχνης*, Herse / frigidum est & siccum, parum nutrit, nec sanguinem bonum generat, ventris fluxum sistit. Diof. l. 2. c. 97.

Lens, *φάκας*, Linsen / sicci sunt & frigidi lentes & crassum ac melancholicum sanguinem generant, alvum astringunt, oculorum aciem obtundunt, & tumultuosa somnia inducunt. Diof. lib. 2. c. 100.

CICER, *ἰκέρβανος*, Itichern / calidum est & siccum. Cicera copiose nutriunt, bonum gignunt sanguinem, lac & semen plurimum augent, menses morvent & calculos Renum comminuunt. Diof. l. 2. c. 97.

10. Quæ sunt Temperamenta & Facultates fructuum usitatorum.

Mala, *μήλα*, *ἔππελ*. Malorum infinita ferè sunt genera, sed Galenus à saporibus sumens differentias ad tria tantum genera refert; Dulcia, Acida & Austera. Omnium autem ferè mala frigida sunt & humida, sed acida dulcibus sunt frigidiora, parum nutriunt & crudum generant sanguinem, putrefactionique obnoxium. Diof. l. 2. c. 131.

PIRA, *ἄπια*, Birn. Vt malorum ita & pirorum multa sunt genera, temperamento humida & frigida, sed stomacho grata sunt propter astringendi facultatem, parum nutriunt. Alsa & cocta meliorem gignunt sanguinem quam cruda. Pira ante cibum sumpta alvum constringunt, sed post cibum laxant. Diof. l. 2. c. 132.

PERSICA MALA, *περσικά μήλα*, humida sunt & frigida, citissime in ventriculo corrumpuntur & putrescunt, nil nutriunt, prævum generant sanguinem, & solis aestuantibus stomachis prosunt, semper itaque ante alios cibos sumenda. Nuclei ejus urinam morvent & calculos constringunt. Diof. lib. 1. c. 131.

FICI, *σῆκος*, calidi sunt & humidi, bene nutriunt, crassum generant sanguinem, are-

nulas ex renibus purgant, alvumque solvunt. Diof. l. 1. c. 137.

PRUNA, *κρυόμυηλα*, Pflaumen. Omnia prunorum genera frigida sunt & humida, alvum solvunt, & cruda quidem pituitosum generant sanguinem, sed in furno siccata medicamentosum præbent alimentum. Alvum enim leniunt, præsertim dulcia, & interim nutriunt corpus, præsertim Hungarica & Bohemica, quæ Schwetschen & Ungersche Pflaumen nominantur. Diof. l. 3. c. 137.

CERAS A, *κέρσια*. Cerasorum varia sunt genera, sed præcipua sunt parva & dulcia, majora & acida, quæ frigida sunt & humida, ventriculoque aestuanti convenientissima, dulcia alvum laxant & pituitosum sanguinem gignunt. Diof. l. 1. c. 129.

IVGLANDES, *κίερα βασιλικά*, nuces regia, Wallnüsse. Calida sunt & sicca & colericum gignunt sanguinem, difficulter concoquantur, pectus obstruunt, nocent stomacho, tussim excitant & capitis dolorem inferunt, nisi sint recentes & cum sale edantur. Diof. l. 1. c. 141.

AVELLANÆ, *κάρνα πορνικά*, calida sunt & sicca, bene nutriunt & obesa reddunt corpora & sanguinem colericum generant. Diof. l. 1. c. 142.

AMYGDALÆ. Duo sunt amygdalarum genera, dulces & amara, ambo calida & sicca. Dulces optimè nutriunt & laudabilem gignunt sanguinem. Amara arcent ebrietatem & crassos pituitososque humores expectorant. Diof. l. 1. c. 139.

CASTANEA, *κάστανεα*, frigida est & sicca, crassum gignit sanguinem, optime nutrit, alvum sistit, flatum gignit & Venerem concitat. Diof. l. 1. c. 123.

UPÆ, *επιφύται*, temperata sunt, optimè nutriunt, bonum gignunt sanguinem, sed alvum turbant. Diof. lib. 5. c. 3.

OLIVA, *ἐλαία*, fructus est olea arboris, ex quibus exprimitur oleum. Oliva immatura sale conduntur, quæ frigida sunt & sicca, parum nutriunt, ventriculum corroborant, & appetentiam excitant. Diof. l. 1. cap. 120.

II. Quæ res ex animalibus sumuntur in alimenta hominum, & quæ sunt singularum temperamenta & vires?

Ova. Ex volucribus ova, ex quadrupedibus lac, butyrum, caseus, & ex omni genere animalium caro in cibum veniunt hominibus, quarum temperamenta & vires hæc sunt. Ovum, ὄν, Ovorum usitatorum præstantissima sunt ova Gallinarum recentia, postea anserina, his pejora consentur anatina. Ova porro inter alia alimenta temperatissima sunt. Habent autem ova duas in se partes, albumen quod frigidius est, & vitellum quod paulo calidius existit. Ex ovis recentibus purissimum generatur sanguis, & copiosissimum præbent nutrimentum, sed pro ratione coctura alia aliis salubriora sunt, Ova enim sorbilia uberimè nutriunt, post illa ova tremula, **Wei- che Eper.** Dura verò, sive in duriciem cocta difficulter concoquuntur, parum nutriunt, crassum generant sanguinem & album suppressunt. Omnium autem in saluberrima sunt ova in sartagine frixa, **Eperfladen.** Ova sorbilia, **die nur halb gahr sind/** præterquam quod probe nutriunt, gutturis pectorisque asperitates leniunt, tussi, pleuritidi, hæcticis, sanguinem spuentibus conferunt, vocis raucedinem & anhelitus compressionem auferunt. Diosc. l. 2. c. 43. Galenus l. 3. de Facult. Alimentorum.

Optimum nutrimentum.

Frixa in salubria.

LAC, γάλα, est purissima pars sanguinis, mammularum temperamento in substantiam albam conversa. Lac ex tribus substantiis constat, videlicet butyrosa, caseosa, & serosa, qua per longam concussionem lactis ab invicem separata, varium consequuntur temperamentum. In alimentum autem in hisce borealibus regionibus veniunt, lac caprinum, vaccinum & ovinum. Lac caprinum temperamento est frigidum & siccum. Vaccinum paulo humidius & calidius est, ovillum autem insimul in bonitate habet locum. Item lac dulce calidius est, acidum autem magis refrigerat & humectat. Lac autem coctum optimum est alimentum. Probè enim nutrit & bonum generat sanguinem, sed non omnibus corporibus convenit. In frigido enim ventriculo citò acescit & acidus ructus edit. In cali-

Lacticia esculentia.

do autem corrumpitur, & halitus nidorosos excitat. Non est itaque utile caput dolentibus, febricitantibus & calculosis omnibusque pituitosis lac præbere. Convenit autem atate consistentibus, sensibus natura calidis, Phthisicis, & macie laborantibus.

BUTYRUM, βούτυρον, est pinguior & Butyrum. magis aërea substantia à lacte separata, quod temperamento calidum est & humidum, plurimum nutrit, bonum generat sanguinem, pectoris & pulmonis asperitates lenit. Diosc. l. 2. c. 66.

CASEVS, τυγός, est terrestrior pars lactis à sero expressa. Caseus recens & salis expers frigidus est & humidus & minus noxium præbet alimentum. Vetustior autem calidus & siccus evadit, parum nutrit & pessimum generat viscosumque sanguinem, lecur obstruit & in renibus calculum gignit, quamquam consuetudine, cui aliquid donandum suadet Hippocrates, receptum est, ut in omnium fere mensis pro concludendo stomacho caseis utamur. Diosc. l. 2. c. 65.

12. Quæ sunt Temperamenta & facultates carniū quibus in cibis vescimur?

CARO, σὰρξ vel κρέας. Carnes Animalium copiosius & salubrius alimentum præbent quam quodvis aliud edulium, Veterum pro diversitate & natura Animalium differentiæ sunt Temperamenti, & alia aliis, facilius difficiliusque concoquuntur, & alia magis alia minus nutriunt, alia item crassiorem, alia tenuiorem purioremque gignunt sanguinem. In universum autem in carnibus observandum venit juniorum & crescentium animalium carnes præstantiores esse quam veterum; Valde enim novellorum excrementosa sunt & veterum duriores & sicciores concoctaque difficiliore. Gal. lib. 3. c. 1. de aliment. facult.

VITULVS, βόσ, Caro vitulina temperata est, nonnihil tamen ad caliditatem & siccitatem vergens facile concoquitur, optime nutrit, & optimum generat sanguinem. Galen. l. 3. cap. 1. de alimentorum facult.

BOS, βός, Caro bovina calida est & Bovina sicca. Galen. 3. c. 1. de aliment. facult. car-

caro.

nem bovīnam prorsus damnat, crassique succi esse ait. At usus & experientia quotidiana docet carnem bovīnam juvenci, moderata pinguedine intertextam bene nutrire, & optimum generare sanguinem & ejus juscūlum ad virium restorationem utiliter exhiberi.

Cato suilla. SVS, ΠΟΡCΥS, χοῖρε. Caro suilla à Galeno loco præcitato mirificè commendatur.

Inquit enim omnium ciborum suum caro potentissimè nutrit, idque propter similitudinem cum humana carne, & ait optimum generare sanguinem. At Deus esum suilla vetat.

Levit. c. 11. sanitati populi Israëlitiçi consulens. Vescuntur enim sues alimentis impurissimis, & soli inter animalia lepra corripuntur.

Caro suilla temperamento calida est & humida & lentum ac crassum gignit sanguinem, difficulter concoquitur, sed optime nutrit, saturatque citissime: quæ de recentibus carnibus sunt intelligenda. Caro autem suilla salita,

gesalzen / & per annum fumo siccata, quales sunt apud nos succida, Sündenspeck / & perna, die Schinken / magis sunt calida & sicca & melius nutriunt, sed melancholicum gignunt sanguinem.

VERVEX, κερδος κατ' ἐλμυδρί, id est, Aries castratus ein Hammel. Caro vervecina calida & humida, probe nutrit, & bonum gignit sanguinem. In omni enim genere Animalium carnes castratorum sunt præstantiores non castratis. Gal. lib. 3. cap. 1. de aliment. facultat.

Ovis, οἷς vel ὄεβατον. Caro ovina ex ovis vetustiore calida est & humida & valde excrementosa. Parum nutrit & viscidum gignit sanguinem: sed bidens laudatur à Galeno loco præcitato.

Cato agnina infalubris. AGNVS, ἀγνός, quasi dicas purus & castus. Agni lactantis caro humidissima & valde mucosa est, ideo vituperatur à Galeno, sed agni semestris caro optimè nutrit, bonum gignit sanguinem, ideo & in sacris literis laudatur.

Carnes fœtina. LEPVS, λαγώς. Caro leporina calida est & sicca, agrè concoquitur, parum nutrit & melancholicum generat sanguinem; assata dysenteriacis prodest. Diosc. lib. 2. cap. 18.

CERVVS, ἐλαφός. Caro cervina frigida est & sicca, difficulter concoquitur, parum nutrit, crassum & melancholicum gignit sanguinem. Galen. lib. 3. cap. 1. de aliment. facult.

CAPREOLVS, δόξ. Capreolina caro temperata est, parum ad siccitatem accedens, facile concoquitur, bene nutrit, sed melancholicum efficit sanguinem.

APER, κῆας, porcus sylvestris. Caro aprina calida est & humida, facile concoquitur, bene nutrit, & inculpatum gignit sanguinem.

13. Carnes volucrum quibus Temperamentis sunt præditæ & quas habent facultates:

Gallina, ἀλεκτορίς. Caro gallinarum temperata est, facile concoquitur, bene nutrit & optimum gignit sanguinem. Gal. lib. 3. cap. 18. de aliment. facult.

CAPO, ἀλεκτρον ἀνορχίς, id est Gallus castratus. Caro caponum temperatissima est, facileque concoquitur, & optimum generat sanguinem, adeo ut nulla sit caro, quam caponum caro bonitate non superet. Ex carne caponum aqua destillata vires mirificè reficit delapsas, & restaurat. Gal. loco præcitato.

ANSER, χλὸν. Caro anserina calida est & humida, difficilis concoctionis, crassum generans sanguinem, bene nutriens. Anseres multis nominibus utiles sunt hominibus, plasma, carne, adipe, & stercore. Gal. lib. 3. cap. 19. de aliment. facult.

ANAS, νῆτλα. Caro Anatis juxta Avicennam est calidior omnium avium domesticarum, & difficulter concoquitur, excrementosum & melancholicum gignit sanguinem parumque nutrit. Galen. loco præcitato.

COLUMBVS vel COLUMBA, περισσέ. Caro columbina calida est & humida, moderatè nutrit, sanguinem gignit cholericum, ideo febricitantibus non convenit. Columba in turribus degentes domesticis salubriores sunt. Gal. de attenuante vict. cap. 6.

PERDIX, πειδίξ. Caro perdicum generosa est & temperatissima, facile concoquitur & sanguinem exquisitè temperatum generat, copiosè nutrit, Veneremque stimulat.

F 3 Galen.

Carnes volucrum domesticarum.

Caro caponum optima.

Carnes volucrum sylvestrium.

Galen. de cibis boni & mali succi, cap. 6.

CRGNVS, *κρύνος*, Olor, avis anseri cognata; caro ejus frigida est & sicca, ac difficilis concoctionis, excrementosum generat sanguinem & parum nutrit.

GRVS, *γρύνος*, Caro gruum frigida est & sicca, difficulter concoquitur, melancholicum generat sanguinem, parum nutrit. Lege Plin. lib. 10. cap. 27.

PALUMBES, *πάλμα*, Sylvestris columba. Caro palumbina frigida est & sicca, difficulter concoquitur, excrementitium gignit sanguinem, parum nutrit. Galenus de attenuante victu, cap. 7.

TVRTVR, *τρυών*, Caro turturum calida est & sicca, facile concoquitur, bonum gignit sanguinem, beneque nutrit. Galen. de Attenuante victu, cap. 7.

TVRDVS, *τιρδν*, **Ein Krambsvogel**. Caro Turdi calida est & sicca, optimum gignit sanguinem & bene nutrit. Hinc Martialis :

Inter aves Turdus, si quis me iudice certet;
Inter quadrupes gloria prima lepus.

Reliquarum parvarum avicularum carnes quando sunt pinguiore eo meliores, & montana ac silvestres iis quæ in planicie aut ad aquas degunt, preferuntur, quæ omnes ad caliditatem & siccitatem vergunt, optimeque nutriunt.

14. Quæ sunt Temperamenta & Facultates alimentorum ex piscibus sumptorum?

PISCES sunt animalia quæ in aquis degunt, natant ac nutriuntur. In universum autem fluviales pisces marinis & in stagnis, lacubusque degentibus, salubriores sunt, semper squamatici glabris, saxatiles limosiori loco degentibus, durioris carnis mollioribus, assati elixis, recentes sale conditis fumoque duratis sunt preferendi. Piscium porro omnia genera temperamento frigida sunt & humida, pro natura nimirum elementi in quo degunt, frigidumque ac humidum & lentum gignunt sanguinem. Piscium itaque esus solis biliosis & calidioribus naturis utilis est: Pituitosis autem plurimum obest. De piscium generibus lege Galen. lib. 2. de alim. fac. cap. 23.

Salubriores & sapore prastantiores pisces in

hisce terris sunt, lupus sive lucius einbrecht / Perca ein Barch / perca aculeata sive maculosa ein Kuhlbarck / Funduli Grun- deling / Gobius Schmerling / Trutta Paren / Salmo Tach / Sturio Stör.

Minus salubres consentur, Carpio Harpe / Ciprinus vel prassinus Brassem / Albutinum Blepe / Haringa Herinck / Carasius Karna / Plocinus Plöze / Rubeculus Rodoge / Balana Wels / Capito Dorsch / Saperda Haruge. His annumerari possunt, Passer Schullen / Flum- dern / Butten / significat enim omnes pisces planos, Salpa Rodtscher / Asellus Bergersfisch / item Stockfisch. Omnium autem insaluberrimi sunt Anguilla Nell / Congrus Kompanckten oder kleyn Nell / Tinca Schlep / Phoca Sehlhund / Cancer Krebß / Paguri vel Carabi Krabben : Enumerati pisces partim recentes, partim sale conditi, partim fumo aëreque durati in alimentum veniunt.

15. Alimentorum facultates & temperamenta quibus modis immutantur?

Omnium alimentorum facultates & temperamenta duplici ratione immutantur, preparatione & conditura; preparatione omnia assa elixis redduntur sicciora, omnia salsa & fumo durata recentibus redduntur calidiora & sicciora. Conditura autem omnia genera esculentorum, naturam & qualitatem rerum, quibus conduntur, in se recipiunt.

16. Quibus rebus potissimum condiuntur obsonia nostratia?

Sale, Pipere, Croco, Mace, Cynamomo, Cariophilis, Zinzibere, Melle, Aceto.

17. Condimentorum recitatorum quales sunt Facultates?

Sal, *ἅλς*. Optimum condimentum est sal, inquit Plautus. Sale enim nullum est condimenti genus preciosius, sine sale siquidem omnia esculenta sunt insipida. Sal commune ex salis aquis coquitur. Ejus usus est non tantum ut obsonia sapidiora reddat, verum etiam ut carnes piscesque à corruptione prævet. Sal calefacit & exsiccatur impensè, humiditates omnes superfluas & excrementicias

Pisces insalubres.

Avicularum carnes salubres.

Quinam pisces salubriores.

Preparatio alimentorum multum eorum facultates immutat.

Condimenta utiliora.

con-

consumit, & corporum substantiam contrahit. Diosc. lib. 5. c. 85.

PIPER, $\pi\iota\pi\epsilon\rho$. Grana piperis ad nos ex India adferuntur, ubi in frutice planta ribes vocata similiteracemati proventit. Calefacit piper & exsiccat validissime, crudos humores ventriculi concoquit, & rigores febriles haustum prohibet. Diosc. lib. 2. cap. 153.

CROCUS, $\kappa\rho\omicron\upsilon\kappa\omicron\varsigma$. Nascitur crocus in plerisque Germaniae locis in Austria maxime & Thuringia, qui ex fungosa radice circa hybernium solstitium folia oblonga instar angustioris graminis cum liliis caruleis protrudit, in quibus crocus pendet, qui temperamento calidus est & siccus. Usus moderatus croci mirifice cor corroborat, & spiritus agiles efficit, coloremque venustum reddit, ventriculo, epati, pectori, pulmonique prodest. Diosc. lib. 1. cap. 25.

MACIS, $\mu\alpha\kappa\iota\varsigma$. Muscatenblumen. Sunt enim Macis nucis Muscata odoratissima involucria, calefaciunt & exsiccant, ventriculorum & corroborant, & appetentiam excitant. De Mace propterea nihil scripserunt Graeci.

CINNAMOMUM, $\kappa\iota\upsilon\alpha\mu\omicron\upsilon\mu\omicron\nu\mu$, **Kantzell** / odoratissima & jucundi saporis cortex arboris Felicis Arabia, calefacit & exsiccat plurimum, cor, ventriculorum & cerebrum corroborat, spiritusque vitales rescit. Diosc. lib. 1. cap. 12.

CARYOPHILLON, $\kappa\alpha\rho\upsilon\phi\omicron\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$, sunt fructus arboris Indica praestantissimi & odoratissimi, temperamento calidi & sicci, cor & ventriculorum corroborant. Caryophyllorum una drachma, ein **Quentin** / in vino rubeo decocta & illud vinum haustum statim vomitum sistit. Serapio cap. 239.

ZINZIBER, $\zeta\iota\gamma\gamma\iota\beta\epsilon\rho$, radix est acris calida & sicca, ex Arabia adfertur, refrigerationi ventriculi utilissima est. Diosc. lib. 2. cap. 154.

SACCHARVM, $\sigma\alpha\chi\chi\alpha\rho$, est succus instar mellis crassus & dulcis, in calami arundinum, sui generis, in Arabia & India genitur, ubi calami certo anni tempore colliguntur, confringuntur, & succus ex eis exprimitur, & igne concoquitur, instarque sa-

lis induratur, unde & sal Indicum nominatur. Saccharum temperamento calidum est & humidum, multique usus tum structuris medicamentorum tum in alimentorum conduris. Diosc. lib. 2. cap. 75.

MEL, $\mu\epsilon\lambda\iota$. Mel est succus dulcissimus ab apibus ex rore & succis florum haustus ac comportatus in alveolis, maceratus & alteratus. Mel Atticum praestantissimum est, pro quo nos in ejus penuria Livonico utimur. Calidum est & siccum & citissime in bilem flavam convertitur, unde ejus usus pituitosis dumtaxat est utilis, biliosis vero noxius. Diosc. lib. 2. cap. 75.

ACETVM, $\alpha\kappa\epsilon\tau\omicron\upsilon\mu$, est vinum fatuum aut cerevisia fatua vel alterata. Acetum et si contrarias habet qualitates, refrigerat enim simul & calefacit, autore Galeno lib. 1. de simplicibus Medicamentis, tamen experientia testatur magis refrigerare acetum quam calefacere, & refrigerat quidem sua proprietate, sed paulo post calefacit irratione acrimonia, desiccant autem validissime, incidit ac penetrat. Acetum excitat appetentiam, corroborat ventriculorum, extinguit cholericum calorem, & haustum venena potentissime pellit, odoratu sistit sternutationum molestias, obest autem frigidis ventriculis & naturis Melancholicis. Diosc. lib. 5. c. 17.

18. Quid est Potus, & quæ sunt usitata potuum genera, quæque habent singula facultates?

Potus, Hippocrati $\epsilon\chi\upsilon\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma$, id est Vehiculum cibi dicitur, per potum siquidem fit distributio alimenti per totum corpus, & potus non secus ac edulia corpora nostra nutriunt & alterant. Sunt autem in hisce septentrionalibus oris quatuor usitatissima potuum genera, vinum, cerevisia, Hydromeli, Aqua.

VINVM, $\omicron\iota\upsilon\varsigma$. Vinum omne calefacit ac humectat, sed aliud magis, aliud minus, optime nutrit & laudatissimum generat sanguinem, generosos excitat spiritus, acuit ingenium, latificat Cor, refocillat ac restaurat omnes vires, & tollit animi maerores. Com-
Saporem, Odorem & natali solo. Colore alia sunt alba.

Potus generosa usitata.

alba qua minus nutriunt & urinam movent: Fulva qua concoctionem juvant & optime nutriunt; alia rubra qua plenissime nutriunt, sed quia ex terrestriori constant substantia, minus calefaciunt. Sapore alia sunt dulcia, qua plenissime nutriunt, & prosunt pectori, sed facile obstruunt lecur; alia austera qua ventriculo sunt grata, sed parum nutriunt; alia inter hac media, optima censentur. Odo- re, quanto enim vina sunt suavioris & Aro- matici odoris, tanto sunt praestantiora & ma- gis corroborant. Natali solo; Omnium salu- berrima & natura hominum convenientissi- ma vina sunt vina Rhemana, ut quae omni- bus hominibus & aetatibus moderatè tuto exhiberi queant, etiam ipsis natis recens infantibus, praesertim hisce septentrionalib- us locis. Quod autem Plato in 2. de legibus

Vini Rhe-
nani en-
comium.

Plato cur
vino inter-
dixerit
pueris.

vetat pueris usque ad duodevigesimum an- num, ne vino utantur, ibi Plato respexit vi- ni Graciani & corporum ejus regionis tem- periem; vina enim Graca, Cretica, Italica, Gallica & Vngarica calidiora sunt quam ut tuto eis quis quotidie pro alimento sine dilu- tione uti queat. Rhemana autem moderatè sunt calida & humida, & quia vita nostra in calido & humido consistit, ea vina ad vi- ta conservationem sunt commodissima. Et re- ctè dicit Plato Deum largitum esse hominibus vinum quasi auxiliare pharmacum adversus senectutis austeritatem, ut ejus moderato usu rejuvenescere queamus, & omnis maestitia nos obli- vio capiat. Immoderatum autem e- jus usum idem Plato cum omni aetate turpem ac pestiferum, tum verò adolescentia turpissi- mum & maximè perniciosum esse testatur. Variè enim afficit animos hominum, autore Aristotele sectione 20. problematum; Alios enim reddit loquaces praeter morem, alios ta- citurnos, alios misericordes, alios audaces & temerarios, alios timidos, alios iracundos; proinde rectè apud Athenaeum vinum Specu- lum ingenti esse dicitur. De vino lege Plato- nem lib. 2. & 3. c. 4. Meth. med.

Vinum in-
genii spe-
culum.

Cerevisia,
an vini
potus pra-
cedere de-
beat.

In contrariis ustatè quæritur, utrum potio à vini haustu vel cerevisia sit auspicanda? Ad questionem non potest simpliciter respon- deri, semper primum consideranda est natura

& temperies bibentis: Qui enim calidum E- par & Ventriculorum astuantem habent, iis praestat pralibare cerevisiam; quibus verò ventriculus & epar frigidum est, iis magis convenit à vino inchoare potionem.

CEREVISIA, Ζῶδιον, est potus salu- berrimus & quasi factitium vinum ex aqua, frumento maceratione & tostione preparato, & lupuli floribus coctus; Cerevisia vel Ζῶδιον pro potu utitur Germania, Bohemia, Polo- nia, Dania, Suecia, Livonia, & Gallia. Et Iohannes Manardus doctissimus Italus in suis Epistolis Medicinalibus corpora hominum septentrionalium ex cerevisia potu saluberrima, robustissima & pulcherrima reddi pra- dicat. Cerevisiarum alia calefaciunt impen- sè & humectant, probeque nutriunt & bo- num generant sanguinem. Et tales sunt cere- visia locorum maritimarum, quarum pra- stantissima sunt Dantiscana, Prussina / Hamburgensis, Rostochiana, Gryphisval- diana, & Pasovalcensis; alia minus calefa- ciunt & quasi refrigerare videntur, sed ma- gis humectant si moderatè bibantur, tales sunt Brunsvicensis, Munne / Zerv- stana qua inter hasce est optima, Embecensis, Friburgensis & Torgensis. Inter has media ef- se videntur Bahrdenensis & Tribbesensis qua plenissime nutriunt sed pectori nocent.

Cerevisia
quam
optimam.

MEDO, Hydromeli, aqua malsa, &c. Est potus ex melle & aqua confectus, calefa- cit & siccatur, parum nutrit & biliosum gene- rat sanguinem, adeoq; facillime in bilem con- vertitur, frigidis corporibus utilis est potus, sed biliosis periculosus. Praestantissimum hy- dromeli conficitur in Lituania, Polonia, & in oppido Vvitlandia, Egra & Eger. Diosc. lib. 15. cap. 13.

ΑQUA, ὕδαρ, est potus vetustissimus, quam aliqui putant dici quasi sine qua homi- nes esse nequeant. Tanti enim aqua est usus in hac vita, ut nec homines, nec alia ani- mantia ea carere queant. Ideo non abs re canit Pindarus in Olympica, Od. 1. Ἄεσσον ὕδρ' ὕδαρ ὁδὸν ἁγίων. Aqua autem potabilis tem- peries est frigida & humida, qua per se non nutrit, sed nutrimentum temperat & deferit. Optima autem aqua tum ad cibos elixandos,

Aqua an
nutriat?
Galen.
comm. 3.

tum

in Hipp. tum ad sitim sedandam est eligenda, qua ni-
t. 17. ne miram nullo alieno colore, odore & sapore est
gat: pau- imbuta, sed est pura, limpida, levis & qua
lo post cito calefit & vicissim cito refrigeratur. Dio-
tamen af- scorid. lib. 5. cap. 18.

SECTIO III.

DE SOMNO ET VI-
GILIA.

Somnus & vigilia oppositæ actiones facul-
tatis Animalis, inter causas naturam no-
stram alterantes & conservantes iertium lo-
cum obtinent, & sunt decimum objectum
circa qua Ars Medica occupata est: Anima-
lis enim facultas, id est potentia intellectiva,
sensitiva & locomotiva, quiete & intermis-
sione à suis actionibus indigent. Quod enim
caret alterna requie durabile non est. Talis
autem quies ex somno et contingit.

I. Quid est somnus, & quæ sunt ejus
causæ, quæ affectus?

Somni
natura.

Somnus est actionum Animalium, id est
Ratiocinationis, sensuum & motus voluntarii
ac cerebri defatigati quies, qua actiones in
somno intermittuntur; interum autem natu-
rales Actiones & vitales, veluti sunt conco-
ctio, alimentorum alteratio, sanguificatio,
Nutritio, Respiratio, pulsusque cordis longè
sunt validiores quam in vigilia, eo quod ca-
lor natus in somno ab externis actionibus
ad interiora viscera colligatur & perfectius

Causa so-
mni.

agat. Causa instrumentalis somni est ipsum
cerebrum; Efficiens est calor natus visce-
rum, suaviores ac tenuiores vapores ex ali-
mento ad cerebrum evehens; Materialis est
vapor humidus, mitis & suavis, cerebrum
instar roris madefaciens; Formalis est ipsa
dormitio sive cessatio animi à Ratiocinando,
Sentiendo & liberè movendo; Finalis causa
est salus & conservatio Naturæ. Effectus sive
moderati somni commoda somni; si moderatus est somnus,
corpus humectat, nutrit, pinguefacit, calo-
rem nativum intendit, cibos humoresque
concoquit, dolores lenit, lassitudines tollit,
intentia laxat, indurata emollit, animi per-
turbationes sedat, rationem vitiatam emen-
dat, defluxiones sistit, tenues humores increas-

sat, & omnium partium vires restaurat,
easdem ad suas actiones agiles & vegetas red-
dit; Et contra, immoderatus somnus multa
secum adfert incommoda, segnitiam, capitis
gravitatem, sensuum omnium hebetudinem,
caloris nativi diminutionem, colorisque fa-
ditatem.

laimode
rati in-
commo-
da.

2. Quomodo fit somnus?

Somnus fit cum ab assumpto alimento
suavior & benignior vapor à calore nativo
per venas & alios meatus ad cerebrum sur-
sum elevatur, isque cerebrum instar roris
madefacit & nervorum initia plenissimè ob-
struit, cursumque spirituum animalium ex
ventriculis cerebri ad sensoria & organa mo-
tus voluntarii intercipit & cohibet, actio-
nesque eorum intercludit.

3. In somno quæ sunt observanda?

Duplici modo consideratur somnus: Vno
insalubriter degentibus; altero modo in agro-
tantibus. Circa hominum salubriter degen-
tium somnum quinque sunt observanda: cir-
ca agrotantium verò quatuor, ut sequens o-
stendit tabella.

Circa somnum sanorum obser- vantur	{	Mensura sive quantitas,
		Tempus,
		Forma decubitus,
		Locus,
Circa agrotan- tium, &c.	{	Somnia.
		Qualitas,
		Forma decubitus,
		Insomnia,
		Accidentia à somno.

MENSURA sive quantitas somni tempe-
ranter viventibus satis erit spatium septem
aut octo horarum; qui autem exactam victus
rationem servare nequeunt, iis tantisper est
dormiendum, donec perfecta alimentorum fiat
concoctio, id quod ex ventris contractione &
urina colore deprehenditur. Urina siquidem
mane projecta, si aqua instar alba exstat, cru-
ditatis est signum; at si instar auri fulva sit,
perfectam esse jam concoctionem indicat, si-
cuti ruffa initium assationis ostendit, ita &
ructus acidus à somno cruditis est indi-
cium.

Mensura
somni in
sanis.

TEMPUS somno convenientissimum est Tempus
nocturnum tribus ad minimum à cena horis: somni.

G

Nox

Somnus
diurnus
quibus
conve-
niat.

Nox enim sua natura mortales ad somnum invitatur, tum quia tranquilla, tum quod obscura, frigida & humida sit. Diurnus autem somnus omnibus ferè hominibus est perniciosus, exceptis iis, quibus vel natura, vel interpestivis vigiliis ac lucubrationibus siccissimum redditum est cerebrum, quibus diurnus somnus humectat & in temperiem redigit cerebri siccitatem. In genere autem memoria tenenda est sententia Hipp. in Coac. præf. t. 497. Interdium vigilare, noctu verò dormire oportet.

FORMA DECUBITVS in somno salubris est in alterutro latere, sed præstat somnum auspiciari à dextro latere, quo cibus in fundum ventriculi commodius subsideat, ac paulo post se in sinistrum latus vertere, ut calore Epatis ventriculo incumbentis juvetur ventriculi concoctio. Supinus autem decubitus semper est perniciosus. Non enim caret metu suffocationis, incubi, & apoplexia.

LOCVS ubi dormitur sit obscurus & à radiis tum Solaribus tum Lunaribus immunis. Nihil enim pestilentius est quam dormire sub radiis Lunæ, unde sæpe homines in Epilepsiam incidisse observatum est. Cavendus quoque est locus præter naturam aut calidus aut frigidus.

INSOMNIA naturalia studiosè semper sunt observanda. Sunt autem insomnia imagines quadam vel simulacra in cerebro dum quiescimus observantes, quemadmodum Claudianus in præfat. Panegy. Honorii:

Omnia quæ sensu voluntur vota diurno,
Tempore nocturno reddit amica
quies.

Quamquam enim somnus prorsus nullis turbatus somniis est suavissimus & saluberrimus, tamen sæpe etiam obijciuntur sanis somnia, vel eorum quæ vigilantes gesserunt, vel ex redundantia humorum in corporibus. Biliofi enim ignes, incendia, rixas, pugnas: Pituitosi aquas, imbres, nives, balnea, navigationes & navigationes: Melancholici fumos, tenebras, ruinas: Sanguinei choreas, comestiones: Putridis humoribus redundantes, sterquilinia & fetorem: Spiritu naturali a-

Insomnia
denotant
tempera-
mentum.

bundantes, volitationes, saltationes & cursitationes somniant.

4. Circa somnum ægotantium quæ sunt consideranda?

Circa ægotantium somnum quatuor sunt diligenter observanda, Qualitas, Decubitus forma, Insomnia, Accidentia à Somno.

QUALITAS. Quanto Somnus ægotantium est placidior & suavior, tanto major est spes convalescentia; ac quanto turbulentior somnus ægotantium est extra calorem febrilem, tanto est periculosior. Periculosus quoque est somnus, si æger præter consuetudinem sterit, aut ore hiat, aut oculis nictitet, aut semipertus oculis dormiat.

Aph. 2.
lib. 2.
Hippoc.

DECUBITVS FORMA ægotantium decumbentium, si sit in alterutro latere, est salutare signum, supinus autem artubusque omnibus expansis decumbere, virium debilitatem ostendit, & ægoti vigilantes si per alterutrum latus decumbant, aut supini jaceant contractis tamen pedibus & elevatis genibus, salubre signum est.

INSOMNIA ægotantium, ut paulo ante de Sanorum somniis diximus, humoris in corpore redundantis speciem & naturam declarant.

ACCIDENTIA à somno diligenter sunt consideranda. Si enim æger à somno expergefactus, levius aut saltem non deterius se habere sentiat, salutare est signum & convalescentia. At si à Somno æger deterius habeat, in certissimo vita discrimine versatur, teste Hippocrate l. 2. Aph. 1. qui ita inquit: In quo morbo somnus laborem adfert, lethale est; si vero juvat, lethale non est.

5. Vigiliæ quid, quæ earum causæ, quæve commoda & incommoda?

Vigiliae sunt extensi motus facultatis Animalis in cerebro existentis, ejusdemque liberae actiones in ratiocinando, sentiendo, & motu locali, quæ in somno quasi vinculo erant confictæ ac ligatæ.

Vigiliæ.

Causa vigiliarum est siccitas cerebri: quam per accidens etiam halitus impense calidi & acres, cerebri temperiem turbantes, vigilias inferant.

Vigilantibus calor internus debilior est, quia

quia ad externas partes est diffusus. Veluti autem somnus perpetuo humectat, ita vigilia semper siccora reddunt corpora. Utilitates & commoda moderatarum vigiliarum sunt:

Utilitates
vigiliarum
modera-
tarum.

- I. Superflua in corpore per habitum digerere.
- II. Alvi excrementa ad egestionem propellere.
- III. Appetentiam provocare.
- IV. Languorem minuere & robur corpori & animo adferre.

Immoderatarum autem vigiliarum noxa & incommoda sunt:

Incom-
moda im-
modera-
tarum vi-
giliarum.

- I. Turbare concoctionem.
- II. Cruditates in visceribus augere.
- III. Cerebri temporiem labefactare.
- IV. Totum corpus exsiccare, gracile & aridum reddere.
- V. Pallorem faciei & tremorem omnibus partibus inferre & universum sanguinem biliosorem reddere. Tenenda est itaque mediocritas in somno & vigiliis, nam ut sapienter Hippoc. monet, l. 2. Aphor. 3. Somnus atque vigilia; utraque modum excefferit, malum, id est; natura permittosum.

SECTIO IV.

De

MOTU ET QUIETE.

Vndecimum obiectum artis Medica est motus sive exercitium & quies corporis, quod quartum locum obtinet inter causas conservatrices & alteratrices humana natura.

I. Exercitatio quid est?

Sape hac vocabula Exercitatio, Motus & Labor apud Medicos confunduntur: Sed proprie nec labor omnis, nec quivis corporis motus exercitatio dici potest, sed tantum paulo vehementior motus & agitatio corporis, in qua alteratur anhelitus sive respiratio. Plurimum autem moderata corporis exercitatio & Animi extensio conducit ad tuendam sanitatem; & de contra ocium & quies diuturna vehementer labefactat naturam. Id quod luculenter testatur Plato in Theæteto, inquit,

corporis habitus quiete & ocio corrumpitur, exercitiis & motibus magna parte conservatur. Idem Anima habitus, institutione & meditatione doctrinas consequitur, servatur, evaditque melior; ocio autem neque discit quicquam, & si qua didicerit, obliviscitur.

2. Exercitiorum differentia & usitiores species quæ sunt, & quibus corporibus quæ magis conveniunt?

Exercitiorum corporis quatuor sunt principia differentia, quarum usitiores species in sequenti comprehenduntur tabella.

Exercitia corporis sunt aut	Levia,	Navigatio,
		Vectio,
	Medio- cria,	Deambulatio.
		Declamatio,
		Friccio,
		Equitatio,
		Venatio.
		Saltatio,
	Valida,	Luctatio,
		Palestra,
		Parva pileus,
		Curfus,
	Labo- riosa,	Disci aut lapidis proje- ctio.
		Fossio,
		Trituratio,
		Ligni dissectio,
		Demessio.

3. Quæ sunt commoda & utilitates moderati Exercitii?

Exercitia moderata in genere tres insignes utilitates ad tuendam sanitatem necessarias corporibus nostris præstant.

I. Moderata exercitia totum corpus validum & articulos robustiores efficiunt, obstructions viscerum reserant, humores corporis à putrefactione reserant; & in summa, moderata corporis agitatio & corpus & animum alit & tuetur, ocium vero utrumque torpore corrumpit.

Moderat
exercitii
commo-
da.

II. Naturæ calorem excitant & ad actiones suas validiorem reddunt: unde post exer-

Exercita-
tionis uti-
litas.

citationem corporis alimenta melius concoquantur, crassiores humores extenuantur, digeruntur, & tota nutritio commodius perficitur.

III. Spiritus omnes in corpore vegetiores & subtiliores ab exercitio evadunt, qui tamen omnia organa habiliora & promptiora ad proprias actiones efficiunt; per eosdem pori cutis aperiuntur, & excrementitia superfluitates serosa, halitiosa & fuliginosa ultima concoctionis à corpore discutuntur, diffantur, & omnes putrefactiones arcentur.

Exercitia
quænam
singulis
conve-
niant.

Porro in specie levia exercitia omnia, veluti sunt Navigatio, Vectio, & Deambulatio languidis, senibus & à morbis convalescentibus & valde calidis naturis commodiora sunt. Calida enim corpora à vehementioribus motibus magis inflammantur. Mediocria exercitia, ut Equitatio, Venatio, vociferatio, omnibus aequè prosunt, qui inter debiles & robustos medium obtinent. Et quidem Equitatio stomachum & intestina corroborat, spinam dorsi & femora firmat, sed thorace laborantibus obest.

VENATIO equestrium est exercitium quæ animus oblectatur & corpus sufficienter agitur. Venationis Encomium extat apud Xenophontem.

DECLAMATIO organa vocis, pulmones, thoracis musculos corroborat, & arterias purgat.

Frictio-
nis utili-
tas.

FRICTIO olim utilissimum exercitii genus, hodie in tuenda sanitate per desuetudinem exolevit, & in balneis tantum sudorificis retinetur, & in quibusdam morbis, ut capitis obstructionibus ac crassis excrementis, ea utimur. Et tamen experientia testatur, frictionem vel totius vel partium aliquarum plurimum prodesse sanitati: Sunt autem frictionum genera: DURA, quæ solidas corporis partes collidit, MOLLISSIMA laxat, Multa extenuat, Mediocris augmentat, Aspera ad superficiem humores ejicit, Tenuis retinet.

VALIDA exercitia robustis & adolescentibus æquè constitutis utilia sunt, inter quæ saltatio crura & Articulus pedum firmat, & excretionem prorit, sed thoracis affectibus est noxia.

LVCTATIO validum spiritum efficit,

musculos & nervos robustos efficit, & sensus exacuit.

PALÆSTRA, seu umbratile armarum exercitium omnes corporis partes aqualiter agitat, nervos & musculos corroborat.

PARVÆ pila excussio, quod genus exercitii Galenus mirificè commendat, easdem fere facultates habet quas palastra.

CVRSVS corpus quidem calefacit, sed inæqualiter stomacho prodest, at habitum corporis extenuat, ideo vituperatur à Galeno.

DISCI aut lapidis projectio, Brachiorum, spina dorsi, & thoracis articulos confirmat.

Laboriosa & Rustica exercitatio robustis & ad eos labores assuetis tantum conveniunt, veluti sunt rustici, nauta, bajuli, operarii, fossores, qui merito sanitatem suam laboribus acceptam referunt. Quicquid enim in eorum corporibus crudioris succi est collectum, id per sudorem excernunt, & tam est in ipsis calor natus efficax, ut etiam ex cibo malo optimum elaboret sanguinem. Et hinc laboriosi, etiamsi duris alimentis & concoctis difficultus alantur, salubriores tamen sunt, quam ociosi exquisitis alimentis enutriti.

Cut ope-
rarii fe-
dentariam
vitam a-
gentibus
sint sanio-
res.

4. Circa exercitia & corporis & Animi quæ sunt observanda?

In agitatione seu exercitio corporis duo potissimum sunt observanda, Tempus conveniens & Mensura seu Terminus.

Tempus exercitationi convenientissimum est una aut altera hora ante prandium & cœnam, Hippocrate Edid. quarto teste, qui inquit; Labores, id est exercitia cibos antecedant. Et Celsus lib. 1. c. 2. Exercitatio semper cibos antecedere debet, post satietatem nihil agendum, idque post excrementorum alvi & vesicæ evacuationem. Tum enim motus corporis calorem nativum excitat, & crudioris alimenti reliquias in totum concoquit, & appetentiam acuit. Statim autem post cibum corpus exercere, is qui non sunt ad labores assuescit, veluti sunt literarum studiosi & in officiis civilibus, magistratusque constituti maxime est perniciosum. Alimentum enim adhuc crudum aut semicoctum à calore

Tempus
exercitii
conve-
niens.

A cibo
moveri
valde no-
xium.

calore concitato per venas in viscera propellitur, ibidemque obstructions generat, quas putrefactio, putrefactionem rursus febres & alii morbi comitantur.

Terminus
exercitii.

Mensura exercitii debet esse moderata, juxta præceptum Hippocratis, qui §. Aphor. 6. inquit: labor, cibus, potio, Somnus omnia mediocritia. Immoderata enim exercitia & corporis agitationes vires prosterunt, corpus languidum reddunt, & calorem nativum extinguunt, & appetentiam debilitant. Cessandum itaque est ab exercitio statim, ubi aut lassitudo sentitur, aut sudor prorumpere incipit, aut caloris nativi venustas immutatur. Simili ratione modus mensuraque & tempus conveniens servandum est in Animi exercitiis. Intempestiva enim studia & nocturna lucubrationes, mirum in modum frangunt valetudinem, & omnem generosum corporis succum exhauriunt, concoctionem impediunt & calorem viridum extinguunt.

Lucubra-
tiones no-
xiz.

Carvenda itaque sunt nocturna lucubrationes & literarum studia statim à prandio & cœna inchoata. Oportunissimum autem studiorum tempus est Aurora, quæ Musarum amica dicitur, & hora antemeridiana omnes, & ex pomeridianis tres, quatuorve quæ cœnam præcedunt.

§. Quies quid, & quæ moderatæ quietis utilitates, ac immoderatæ incommoda?

Quietis
necessitas.

Quies est exercitii intermissio seu à laboribus vacatio, qua ad conservationem valetudinis pernecessaria est, quæ si modum excedat, otium, torpor, & desidia nominatur, pestis perniciofa vitæ. Quietis autem moderatæ utilitates Ovidius hisce versiculis eruditè complexus est:

Quod caret æterna requie durabile non est,

Hæc reparat vires, fessaque membra levat.

Cui ad stipulatur Hippoc. 2. Aphor. 48. & in lib. 2. de natura humana sect. 4. inquit: Qui morbi ex immoderatis motionibus & laboribus fiunt, quiete curantur, & quos otium morbos creavit, iis exercitium remedium est. Laboribus itaque, exercitiis & studijs fati-

gatis & iis qui sunt natura calidi & sicci, omnibusque cibo ac potu distentis, quiescendum est: ocii verò & desidia incommoda idem Poëta ita describit:

Cernis ut ignavum corrumpant ocia corpus,

Ut capiant vitium nî moveantur a quæ.

Et Galenus ocium ac desidiam in lib. 2. de causis morborum, multorum frigidorum morborum causam esse dicit. Refrigerat enim ocium, & crudelitatem parit, multisque vitiosis humoribus corpus complet.

SECTIO V.


DE EXCRETIONE ET RETENTIONE, VEL DE PLENTUDINE SEU REBUS IN NATURA REDUNDANTIBUS, EARUNDEMQUE EVACUANDI RATIONE.

Plenitudo quæ in corpore ex rerum naturalium abundantia accidit, & perpetuo, nisi evacuetur, naturam ledit, est duodecimum objectum, circa quod Medicina est occupata, & inter res non naturales sive causas naturæ alteratrices quintum obtinet locum. Sunt autem repletio & evacuatio oppositæ actiones, quarum altera alterius vitia tollit, teste Hippocr. 2. Aphorif. 21. qui inquit: Quicunque morbi ex repletionem fiunt, hos curat evacuatio; & quicunque ex evacuatione, repletio.

1. Plenitudo quid est, & quot ejus differentiarum, & quæ sunt materiæ plenitudinis?

Plenitudo seu redundantia in corpore, Plethora quam Græci πλεθωρία vocant, est ubi aut unde. vasa universi corporis, vel capacitates organorum, vel ipsa partium substantia, aut excellenti aliqua qualitate aut humoribus, sive naturalibus, sive vitiosis aut excrementitiis superfluitatibus ultra mensuram naturalem replentur, & corpus, aut universum, aut partes quasdam sensibilibus molestant. Plenitudinis autem differentias, species & materiam sequens complectitur Tabella.

Plethora
differen-
tiæ.



2. Corpora repleta quibus nominibus appellantur?

Corpora repleta Gracis aut πληθωξ, id est, vitioso san-
guine redundantia nominantur.

Corpora
plethori-
ca.

Πληθωξ, id est plena dicuntur, quan-
do corpus univcrsum ultra naturalem men-
suram sanguinea massa quatuor humoribus
simul in venis mixtis redundat, & vena ita
turgent, ut periculum sit ne rumpantur.

Cacochy-
mica.

Κακοχymia dicuntur quando ex his qua-
tuor humoribus in venis contentis unicus dun-
taxat supra naturalem mensuram aut exube-
rat aut corruptus est, veluti est in licticia
bilis flava, in scorbutico morbo melancholicus
humor, in hydropo aquosus sanguis.

3. Quot modis accidit corporibus ple- nitude?

Redundantia seu plenitudo corporis duobus
modis fit, & dicitur aut plenitudo ad vasa,
aut plenitudo ad virtutem sive vires.

Plethora
ad vasa.

Plenitudo ad vasa est quando materia ple-
nitudinis adeo exuberat in vasis vel capacita-
tibus corporis, ut in venis, arteriis, Venti-
culo, ut earum capacitatum vasorumque tu-

nica distendat, & turgidas reddat, ut nihil
amplius in se recipere queant, sine earum ru-
ptione.

Plenitudo ad vires sine respectu potentia- Plethora
rum naturalium est, quando materia pleni- ad vires.
tudinis non quidem sua copia vasa & capa-
citates distendit, sed cum plus inest aut ea vi-
tiosa qualitate est imbuta, ut eam natura
nec concoquere, nec alterare, nec in corporis
substantiam convertere queat. Omnis autem
repletio sive sit universalis, sive particula-
ris, sive πλεθωξ, sive κακοχymia, sive
qualitatis sive humorum, nisi maturè eva-
cuetur & alteretur, semper morbos generat.

4. Evacuatio quid, & quæ ejus diffe- rentia, quæve species?

Evacuatio est plenitudinis molestantis & Evacuatio
corpore remoto; vel est eorum qua præter na- quid.
turam in corpore continentur, expulsio, sive
ea sint halituosi spiritus, sive humores, sive
excrementa corpus gravantia. Omnis enim
superfluitatum retentio periculosa est. Vacua-
tionis porro differentias & species sequens
complectitur tabella.

Tabella

Tabella Evacuationum genera & species comprehendens.

Evacuatio- num diffe- rentia quin- que sunt,	Spontanea, est cum citra ullam medicationem quippiam cor- pore effunditur, qua fit, aut	<div> <div>A natura robusta expellente noxia, & est salutaris.</div> <div>A natura imbecilla nequientis regere ma- teriam vitiosam.</div> </div>	
	Artificiosa, qua externi præsidiū ope suscitatur, qua est aut	<div> <div>Ordinata & utilis, noxia tantum ex- pellens,</div> <div>Illegitima, utilia ex- pellens:</div> </div>	Vitæque pendet à peritia & imperitia Medici.
	Universalis, qua communiter ab u- niverso corpore plenitudinis ma- teriam detrahit, veluti sunt	<div> <div>Vena sectio, Purgatio, Cucurbitula, & Opse/ Balnea sudorifica.</div> </div>	
	Particularis, qua partem duntaxat aliquam e- vacuat, veluti sunt	<div> <div>Sputi per palatum destillatio; Muci per naves emunctio, cerebrum; Tussis & excreatio, thoracem & pulmones; Sanguinis & puris mixtio, renes & vesicam; Balanus aut clyster, intestina.</div> </div>	
	Mixta, qua primum par- tem duntaxat, deinde si diutius persistit, per consecutionem univer- sum corpus evacuat, ut	<div> <div>Purgatio seu alvi subductio, primum intestina, deinde totum corpus evacuat; Vomitio, primum ventriculū deinde totum cor- pus; Sanguinis è naribus eruptio, primum caput, deinde & reliquas partes; Sanguinis menstrui profluvium, primum ute- rum, deinde totum corpus evacuat.</div> </div>	

5. Venæ sectio quomodo evacuat, &
quis ejus usus?

Phleboto-
mia. Vena sectio est universalis evacuatio. De-
trahit enim & diminuit sanguineam massam
in venis contentam per consecutionem ex uni-
verso corpore, cujus præcipua utilitas est in
morbis venæ sectio, id est plenitudine ad vasa, & o-
mnibus affectionibus ex sanguine ortis, velu-
ti sunt febris continua, Synochus, phrenetis,
ophthalmia, parotis, angina, pleuritis, pe-
ripneumonia, inflammationes epatis, splenis,
ventum, uteri, pudendorum, inguinum, a-
larum, brachiorum, crurum, articularum,
adeoque omnium tum exteriorum tum inte-
riorum partium calidi tumores, quos Græci
φλεγμονάς vocant; item in spūto sanguinis,

& sanguinis vomitione, & in tumoribus
quos carbunculos & furunculos vocant.

6. Quot sunt fines mittendi san-
guinis?

Tres sunt præcipua causa mittendi sangui-
nis, Evacuatio, Revulsio & Derivatio.

Evacuatio est redundantis massæ sangui-
nea in universo corpore diminutio & detra-
ctio.

Revulsio, Græcis ἀντίστροφος, est sanguinis Revulsio.
ex laborante parte in oppositam attractio. Ta-
lis autem revulsio perpetuo debet fieri & ἔξω
vel ἔξω, id est, è directo, sive è vena e-
jusdem lateris in quo sita est pars affecta, ut
in inflammatione epatis ex dextri lateris; in
lienis, ex lateris sinistri vena sanguis est re-
vellendus,

vellendus, vel ad superiores vel inferiores partes.

Derivatio, ἀγωγὴ τοῦ αἵματος, est sanguinis ē laborante parte in vicinam tractio.

7. Quæ venæ in singulis partium affectionibus, & quibus in morbis sunt secandæ?

Quando venam secandam invenire non potes, tum secato vicinam conspectam, quam sectam comprime, & elicies sanguinem ex aliis venis occultatis.

Usitatissima vena qua hac tempestate inciduntur, sunt vena

Interna,
Externa,
Media,
Saphena,
Frontis,
Lingua.

Interna
quando
secanda.

Interna seu basilica qua & jecoraria in dextro cubito, & lienaria in sinistro nominatur, secanda est ubi partes, qua infra cervicem continentur, aut inflammatione, plenitudine, aut aliis vitiis sunt affecta.

Cephalica.

Externa Vena, qua & humeralis & cephalica dicitur, incidenda est in affectioni-

bus partium qua supra collum continentur, ut sunt caput, facies, oculi, aures, nares, &c.

Media, qua & communis, nigra & mediana appellatur, aperienda est, ubi non satis certo constat, qua pars potissimum affecta est. Cum itaque hac vena communicet Epatica & Cephalica, ex omnibus partibus supra umbilicum constitutis aequaliter evacuat.

Saphena seu Vena poplitis aut malleolorum incidenda est, ubi partes infra umbilicum sita, veluti sunt Renes, Vterus, infra malleolos, infra pedem, ē regione pro sciatica & arthritide secetur, Vesica, &c. vel plenitudine vel inflammatione sunt affecta, *hinnen Fusseß / ausserhalb Fusseß.*

Vena frontis incidenda est, in plenitudine frontis externa (intra cutem & cranium) capitis & venae faciei, & in posteriori parte capitis affecta, ut monet Hip. 5. Aph. 68. iniquens: Dolenti parte capitis posteriore in fronte recta vena incisa prodest.

Vena lingua sunt dua conspicua ac livida Ranulae. Vena sub lingua, qua in lingua, palati, columella, tonsillarum, inflammationibus, tumoribus sunt secanda.

Tabella incidendarum venarum usum continens.

Vena secanda in affectionibus	Universalibus,	Πληθὺς,	}	Iecoraria dextra.
		Habitu corporis bilioso,		
		Febri syncho,		
		Febri ardente,		
		Tertiana;		
	Particularibus,	Habitu corporis melancholico,	}	Iecoraria sinistra vel lienaria.
		Febri quariana;		
		Capitis,		
		Faciei,		
		Dentium,		
		Aurium;	}	Vena cephalica.
		Cordis,		
		Pulmonis;		
		Pectoris,		
		Thoracis,		
		Laterum,	}	Iecoraria partis dolentis.
		Diaphragmatis;		
		Iecinoris, Iecoraria dextra;		
		Lienis, Iecoraria sinistra.		

Vteri, mensium & hamorrhoidum fluxionem cohibet lecoraria secta, suppressam autem fluxionem proritat saphena aperta. Vesica, pudendi, Inguinum, si absit virus pestilens, primum jecoraria, deinde malleoli vena est incidenda.

Porro jecoraria vena ramos suos dirigit inter minimum & annularem digitum, qua in cubito secta uberius evacuat, tardius autem levius inter digitos. Cephalica ramos suos porrigit inter pollicem & indicem, qua in cubito secta largius & citius, circa pollicem vero imbecillius & tardius evacuat. Saphena in poplite secta copiosius, circa malleolos segnius attrahit.

Salvatella. Externæ hæ venæ magis in revulsione aperiuntur.

In venæ sectione observanda.

8. Circa venæ sectionem quæ sunt observanda?

In venæ sectione sedulo sunt observanda, primo virium robur. Natura enim robustis auidacter & copiose, ubi necessitas efflagitat, sanguis derivari potest. At in agrotantium corporibus circa venæ sectionem exquisita fieri debet collatio inter morbum & vires, & constantibus adhuc viribus largius est sanguis auferendus, minus validis, parcius: viribus vero prostratis aut nihil est detrahendum, aut exiguum, idque per reiterationem.

Cels. lib. 1. c. 10. Firmus puer robustus senex, & prægnans valida tutior venæ sectione uti possunt. Sicque vires magis quam anni respiciendi. Observandum tamen aliud esse tempus electionis, aliud necessitatis.

11. Ætas est perpendenda. Decrepitis post 70. annum, & pueris ante pubertatem, iuxta Galenum l. 13. Meth. med. nisi summa urgeat necessitas, ut pestilens febris, & dysenteria, & angina, non est temere vena secanda. Quamquam Rhafes seni decrepito in pleuritide, & Avenzoar filio trimo in peste utiliter se venam secasse affirmet.

111. Anni tempus. In Vere abundat sanguis in corporibus, Ver itaque convenientissima pars anni est detrahendi sanguinis, Hippocr. 6. Aphor. 46. teste, qui inquit; Quibus sanguinem mittere confert, iis Vere detrachere oportet. Post Ver, convenientior est autumnus, hyems minus apta autumno, omnium ineptissima vena sectioni est æstas. In morbis

verò partes anni non semper observari possunt, sed ubi necessitas efflagitat, statim in principio constantibus adhuc viribus vena est incidenda.

IV. Diei hora. Dies quidem secunda vena idoneus est, in quo Sol lumine est serenus & tenuis; hora vero aptissima est matutina, à Solis exortu tertia vel quarta; tum enim sanguis in corporibus à Sole suscitatur & extenuatur. In morbis vero sanguis est mittendus in die intermissiois, vel quando morbus mitescit. In paroxysmis enim & exacerbationibus morborum periculosa est vena sectio.

Vbi tamen materia turgit, non est differenda venæ sectio.

V. Corporis preparatio, cavendum est enim in sectione vena, ne aut alvus sit adstricta, vel ventriculus semicollis cibus refertus. Primum itaque alvus & vesica sunt exoneranda, aut ope natura, aut clysteribus balnisque subjectis. Et si vitiosis humoribus obfessa sunt viscera, aut primaria vena, proderit eos convenienti medicamento prius expurgare.

VI. Mensura seu quantitas sanguinis detrahendi: Cujus ratio sumenda est ex collatione virium & morbi, ut paulo ante dictum est. Sumitur præterea ratio mensura à coloris sanguinis immutatione, ut cum sanguis niger in rubicundum, aut crassus in subtilem, aut aquosus in spissum mutatur, statim supprimenda est vena. At coloris mutatio in sanguine non semper expectari potest. Sape enim in imbecillioribus naturis, si vel vires deficiant, vel oculi suffundantur, vel accedat oscitatio, aut nausea, aut pallor in facie, protinus à missione sanguinis est desistendum.

Terminus venæ sectionis.

VII. Luna qualitas & constitutio in certis Zodiaci signis. Etenim

Lunæ motus considerandus.

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna requirit.

Et Astrologi in sanis corporibus vetant secare venam in ipsa conjunctione in signo membrum respiciente.

VIII. Sanguine emisso quid faciendum sit. A sanguinis missione ab omni vehementiori corporis motu & perturbationibus animi abstinendum est, & sedendo aut supine decumbendo quiescendum, atq; una aut duabus horis post emissionem sanguinis alimentum boni succi

Crapula
& satietas
noxia à
venæ se-
ctione.

ci & facilis concoctionis est assumendum, nec eo die usque ad saturitatem edendum. Post sumptum autem cibum una aut altera hora, si modo urgeat natura, obdormiscere nihil vetat, si vero somnus non ultro irrepit, satius est vel Musica, vel suavioribus colloquiis totum diei tempus fallere.

9. Quæ evacuationum genera vim habent venæ sectionis?

Inter particularium Evacuationum genera qua supra in tabella evacuationum sunt enumerata,

Vena sectionis vim habent	{	Sanguinis eruptio spontanea è	Naribus,
		Scarificatio	Hæmorrhoidibus,
		Hirudines	Menstruis.

Scarifica-
tio.

Hirudi-
nes.

Sanguinis è naribus effluxio caput evacuat: Sanguis ex venis hæmorrhoidibus profluens, lienem evacuat & podicem, & à quartana febre tutos reddit: Menstruus sanguis profluens ex utero evacuat. Scarificatio cum cucurbitulis, (schreppfen) ex partibus quibus applicantur cucurbitula, & sanguinem & fluitantes spiritus evacuat & ad superficiem cutis attrahit. Hirudines qui oblongi sunt & nigri lumbrici, in cænostis aqueis degentes, parti affecta appositus morsus suo trisidum vulnus infligunt, sanguinem potentissime exugunt, saturati spontè procidunt. Utillissime applicantur in suppressis hæmorrhoidibus, & iis partium potissimum vitiis qua in summa sunt cute, ut scabie, impetigine (Flechten) rubore narium, tuberculisque faciei.

Porro spontanea sanguinis eruptio, siue id fiat è naribus, siue ex utero, siue ex venis hæmorrhoidibus, si lentè parcèque emanat, nihil affert iuvamenti, sed tantum ostendit artificiosam evacuationem per venæ sectionem esse molendam. Si vero assatim copiosè que effluat, morbum plerumque finit & partem affectam demulcet. Cavendum autem est, ne venæ sectio adhibeatur in cruciatibus ventriculi, in lienteria, in dolore colico, in scirro lienis, in cholera, & hydropè, neque morbis ullis ex κακὸν χυμῶν partium oriis.

Quando
venæ se-
ctioni nul-
lus est lo-
cus.

Purgatio est humorum vitiosorum excrementitiorum superfuitatum, qua vel vitiosa sua qualitate aut pondere corpus corporisque partes gravant, evacuatio. Sicut enim venæ sectio in πληθὺς id est plenitudine, ita purgatio in κακὸν χυμῶν est accommodatissima curandi ratio. Et per venæ quidem sectionem omnes simul humores in sanguinea massa commixti tam sinceri quam vitiosi detrahuntur. Per purgationem vero artificiosam, soli vitiosi humores evacuantur, relictis in corpore utilibus. Differentias purgationis sequens tabella complectitur.

Tabella differentias purgationum complectens.

Purga- tio est aut	Spontanea, qua à natura fit & sua sponta corpus à noxiis humoribus purgat, de qua Hippocrates lib. 1. Aphorif. 2. In perturbationibus ventris & vomitionibus spontè factis, si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert & leviter fecunt, sin minus, contrà.	Universalis, qua ex universo corpore humorem vitiosum evacuat.
	Artificiosa, qua arte & medicamentorum purgantium opè fit, qua κακὰ, id est medicatio nominatur, qua est aut	Particularis, qua ex una aliqua parte corporis, ut cerebro, pectore, intestinis &c. vitiosum & molestantem humorem expurgat.

10. Circa vitiosorum humorum expurgationem quæ sunt observanda? Observanda in purgantium usu.

Circa purgationes humorum vitiosorum, LX.

1. Status & constitutio temperiesque corporis. Corporibus enim integra sanitate fruentibus

tibus non est temere purgans pharmacum exhibendum, juxta dictum Hippoc. 2. Aphor. 36. ubi inquit: Sana corpora per medicamenta purgata celeriter exsolvuntur. Et 4. Aphor. 16. Quæ corpora bene se habent, hæc purgare periculosum est. Præterea ex siccis corporibus pauca, ex humidis multa detrahi possunt. Item corpora densa & obstru-
tionibus obnoxia difficilius, mollia & laxa facilius purgantur; robusta laboribus assuefacta ociosis & mollioribus validioribus egent pharmacia.

Humoris
consisten-
tia.

II. Humorum molestantium species & natura. Serosi enim humores & flava bilis facile, pituita & melancholia pigre diffiunt. Similiter sicca & retorrida aut lenta & glutinosa excrementa difficilius purgantur, & validioribus egent remediis.

Remedio-
rum con-
venientia.

III. Aptæ remedium genera, quæ quos specifica virtute subtrahant humores, quorum alia sunt simplicia, ut Rhabarbarum, Agaricus, & sena folia; alia composita, ut electuarium lenitivum, de succo rosarum, & diaphanicon. Alia præterea purgantia pharmacia sunt benigna, alia vehementiora. Quæ autem hac tempestate usitatoria sunt remedium purgantium genera, & quæ in officinis extant omnia, & quos singula purgent humores, item quæ singula quantitate & quali forma sint exhibenda, infra in principio Therapeutices, id est curandorum morborum ratione in brevissimis tabellis proponemus & enumerabimus.

Loci affe-
cti distan-
tia.

IV. Pars seu locus unde vitiosus humor sit expurgandus. Expedita enim facilisque purgatio fit à ventriculo & intestinis, tardior è venis Mesaraicis, è lecore & Liene difficilior est, è venis autem majoribus & partibus longe à ventriculo distitis, omnium difficilima. Inde autem medicamenta validiora sunt exhibenda, aut quantitas eorum augenda.

An semel
vel toties
purgan-
dum.

V. Mensura evacuandi humoris. Cujus ratio sumitur à virium robore & copia humoris vitiosi. Si enim vires constant & humor vitiosus paucus est $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\upsilon\lambda\alpha\varsigma$, simul & semel est expellendus. Reliquia enim recidivos plerumque faciunt morbos. Imbecillioribus autem viribus non tantum multa sed & pau-

ca $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\upsilon\lambda\alpha\varsigma$ pars est expurganda.

VI. Tempus anni, dies & diei hora. Convenientissima purgationi pars anni est Ver, deinde Autumnus, teste Hippocrate, 6. Aph. 47. ubi inquit: Quibus medicamentum purgans confert, hos verno tempore purgari convenit. Æstiva autem purgationes, nisi summa urgeat necessitas omnino cavenda sunt. Id quod idem Hippocrates 1. 4. Aphor. 5. innuere videtur, inquit: sub cane & ante canem difficiles sunt purgationes. Dies autem purgationis aptus est austrinus humidus; Aquilone enim flante non tam feliciter cedit purgatio. Hora convenientissima est matutina, quæ ventriculus à cibis est vacuus. In agitudinibus vero quibus nec tempus protrahi, nec dies deligi potest, eligendum tamen est tale tempus, quo signa conjecta materia vitiosa in urinis & aliis excrementis apparent, monente Hippocrate lib. 1. Aphor. 22. concocta, inquit, medicari oportet, non cruda. At si agritudo est maligna & periculosa, veluti sunt $\pi\alpha\lambda\lambda\alpha\iota\tau\iota\varsigma$ & angina, humor vitiosus est aut venenatus, aut in ali-quod generosum irruat membrum, & virium prostratio, expurgandus est humor venenosus, & tamen si fieri potest, non ipsa morbi exacerbatione, sed in die mitigati morbi & hora quæ nonnihil vires recollecta videntur: In febribus tribus aut quatuor horis ante accessionem felicissimè exhiberi possunt purgantia pharmacia.

Quando
purgan-
dum.

Austrina
constitu-
tio aquilo-
nari præfe-
renda.

Tempore
intermis-
sionis vel
remissio-
nis purgan-
dum.
Quando
in febribus
intermit-
tentibus.

VII. Ætas. Pueri enim, prægnantes & decrepiti non temere sunt purgandi. At si necessitas efflagitet, eis benigniora remedia, qualia sunt casta fistularis pulpa, & rhabarbari macerati liquor, manna, &c. sunt exhibenda.

Quibus
imbecil-
iores pur-
gandi.

VIII. Preparatio corporis & humorum. Ante purgationem corpus preparatur, seu prius fluidum redditur, vel sumpto jusculo prunorum coctorum, vel aliis emollientibus alimentis, ne videlicet meatus & via per quas fit expurgatio, sint obstructa. Humores vitiosi sunt lenti, crassi & tenaces, ad expurgationem sunt inepti, & præparationem posulant. Nam tenues humores non egent præparatione. Crassi itaque ante purgationem sunt

Emollien-
tia & præ-
parantia
præmit-
tenda.

incidendi & extenuandi liquore decoctarum herbarum ac radicum, quales sunt hyssopus, Marrubium, radix petroselinii, &c. aut syrups convenientibus, quorum catalogum & utendi rationem infra docebimus.

Ab assumpto pharmaco quid agendum.

IX. Quid tempore purgationis & post purgationem sit agendum. Primo purgans medicamentum, si potionis formam habet, calidum est hauriendum, non frigidum aut tepidum. Secundo quibus à sumpto pharmaco nausea & vomendi cupiditas oboritur, panis tostus & aceto conspersus ad odorandum est offerendus. Tertiò post summptionem pharmaci una hora in lecto sine somno est quiescendum. Quarto ubi operatio medicamenti incipit, tum surgendum & leniter obambulandum. Quinto à sumpto medicamento, eoque à cibo & potu est abstinendum, donec universa operatio est peracta, id quod plerumque sex horarum spatio conficitur.

In quibusdam tamen naturis jusculum aliud quod calidum assumendum, ad juvandam purgationem.

II. Quæ Evacuationum species vim habent purgationis?

Quinque evacuationum genera vim habent purgationis particularis, quæ tamen per accidens etiam universum corpus evacuant, Vomitus, Clyster, Glandis subjectio, urina expulso, & sudoris eruptio.

12. Vomitus quid, & quæ corpora ad evomendum apta aut inepta, quæve adfert vomitus utilitates & noxas?

Vomitus.

Vomitus est rejectio facta impetu ventriculi; seu est evacuatio eorum quæ in ventriculo continentur noxia per superiora. Et est quidem vomitus motus evidentissimus natura in ventriculo; quo ventriculus violenter conatur expellere, vel cibos corruptos venenososque aut vitiosos humores, quales sunt pituitosa colluvies ventriculi tunicis adhærens, aut præsina bilis (die grüne Galle) in ventriculo ex cibis mali succi generata, aut immoderatum potum aut lumbricos in eum reptantes.

Proclives & apti ad vomitum.

Corpora alia facillime & salubriter, alia difficillimè & periculosè evomere possunt. Qui enim lato sunt pectore & crassâ cervice, ventriculumque habent frigidiorem, aut quibus ex cerebro pituita per gulam destillat, aut bilis flava ex vesica in ventriculum defluit, ii sunt ad vomitionem aptissimi, & si moderatè

& singulis anni quadrantibus ea utuntur, Nonnullis saluberrima est eis purgatio. Illuviem enim omnem ventriculi exonerat, & humores omnes vitiosos ex visceribus ventriculo adjacentibus & prae cordis facillimè evacuat, & per consequutionem & caput, & reliquas longinquas partes pondere levat, & plurimorum morborum, veluti prostrata appetentia, nausea, crebrarum vomitionum, februm, lètericia, hemicrania, epilepsia &c. fomitem expellit.

Difficillimè & cum violentia adeoque cum salubritatis mensura vomunt ii, quibus angustum est pectus & cervix gracilis. Omnium autem perniciosissima est vomitio tabidis, asthmaticis & prae cordiorum inflammatione laborantibus. Iis siquidem ex vomitione metuenda est aut suffocatio, aut vasorum ruptio & cruenta exipuitio. Omnis enim difficilis & laboriosa vomitio prae cordia & adjacentia viscera valida concussione convellit & debilitat. Cum verò vomitus symptoma sit, qua ratione vomitionis materia sit preparanda & ventriculus ad vomitum concitandus, & immoderata vomitio compescenda, infra in morborum curandarum ratione dicemus.

13. Clyster quid, & quibus ex membris evacuet, quæve ejus sunt commoda?

Clyster est liquor ex herbis decoctis expressus & cum oleo, subducentibusque medicamentis & momento salis, aut pro ratione morbi aliis rebus convenientibus commixtus, & per syringa in rectum intestinum tepens vacuo ventriculo infusus.

Clyster saluberrimè adhibetur: Primò in omnibus intestinorum praefertim crassiorum vitiis. Quot enim sunt intestinorum vitia, tot sunt & Clysterum genera. Alii enim dolorem leniunt, ut in colico morbo; alii humores acres mitigant & eluunt, ut in dysenteria, alii ulcera detergant & consolidant, ut in abrasione intestinorum; alii flatum discutunt; alii crassam pituitam extenuant; alii feces duras emolliunt; alii vitiosos humores ex venis mesaraicis, Epate, liene & renibus eliciunt & expurgant; alii vapores ex ventriculo ad cerebrum sursum repentes detrahunt. Quare per consecutionem Clysteris beneficio

omnia

Inepti ad vomitum. Quibus vomitus pernitiosus.

Clyster quid.

Clysteris usus quando conveniens. Clysterum differentia.

omnia superiora viscera & prae cordia pressa levantur.

14. Quid est Glans?

Suppositoria.

Glans, quem in officinis suppositorium vocant, est ex melle ad duriciem cocto, sale & pulvere colocinthydos in massulam teretem oblongam digiti longitudine, crassitie vero calami arundinacei, conformatum medicamentum, quod per anum recto intestino, apiranda obstructionis & secum induratarum proliciendi gratia, induitur.

15. Urina quid, & per urinæ propulsio-nem unde fit evacuatio?

Quæ partes per urinam commodè evacuari possint.

Urina est excrementum aquosum vel serum sanguinis. Urina autem projectio seu excretio merito inter evacuationum genera refertur. Sape enim natura per urinam noxios humores excernit, & ope medica per exhibitionem diureticorum medicamentorum vitiosi humores ex variis partibus purgari possunt, præsertim ubi redundantia humorum circa renes, circa vesicam, aut circa gibbam partem Epatis obstructionem facit. Ha enim partes per nullos meatus commodius quam per urinæ vias evacuari possunt. Id quod Galenus lib. 7. cap. ultimo. Methodi medendi luculenter testatur, inquit; sicut jecoris cavum per alvum purgatur, ita gibba ejus pars per ea quæ urinæ movent. Porro urinam promoventia medicamenta, quæ infra enumerabimus, nunquam sunt exhibenda renibus aut Vesica inflammatione aut ulceribus laborante.

16. Sudor quid & unde evacuat?

Sudores Critici.

Sudor frigidus & symptomaticus valus.

Sudor est serosum excrementum sanguinis in venis minoribus per universum corpus contentum, qui quandoque à natura valida per poros cutis è venis minoribus propellitur & spontè erumpit, nonnunquam & arte medicinaque ope elicitur. Naturalis sudoris profusio fit à calore nativo, qualis contingit in febribus, qui febriles sudores salubres sunt, si aut in diebus decretoriis (quando decrescunt febres) calida erumpant, aut febrem totam auferant, aut si è toto corpore emanant & morbum mitigant. Sed pessimi sunt si frigidi & qui circa caput faciem & cervicem tantum & non per totum corpus proruant. Fit autem per sudorem universalis evacuatio tali

ordine, ut primo serum sanguinis erumpat ex habitu corporis seu venis subcutaneis: deinde ex venis & arteriis majoribus: & postremo ex visceribus ipsis. Artificiosa sudoris provocatio fit per motum vehementiorem seu exercitium, per aeris astum, per laconica balnea, & per medicamenta diaphoretica sive sudorifica.

Sudor quibus provocatur.

Sudor medicamenti tunc potissimum eligendus est, quando viscera interna aut humoribus aut halitibus venenosis sunt obessa, veluti contingit in febribus pestilentialibus.

Sudor quando provocandus.

17. Suntne his plura evacuationum genera?

Sunt quidem, sed quæ partim insensibiliter humores vitiosos expurgant, ut insensilis evaporation, inedia, balneum; partim per accidens evacuant, ut exercitium, fames &c. Sed nisi modum excedant in alteranda natura, non tanti sunt momenti ut hic recenseri debeant. Sunt etiam habenda inter evacuationum particularium genera, tussis, quæ pulmo & thorax à suis excrementis levatur, item narium emunctio & per palatum excretio, quibus cerebri excrementa evacuantur: sed quæ hæc sint & symptomata, in curandorum morborum ratione dicitur.

Evacuaciones relliquas.

SECTIO VI.

De

AFFECTIBUS SIVE PERTURBATIONIBUS ANIMI.

Animi inordinati motus, qui in alteranda natura humana magnam habent violentiam, sextum obtinent locum inter causas naturam alterantes, & sunt tredecimum obiectum circa quod ars Medica occupata est.

1. Affectus sive perturbationes Animi quid sunt, quomodo generantur,

& quæ sunt eorum causæ?

Affectus sive perturbationes, passionēs seu accidentia animi, Græcis παθήματα & πάθη, sunt turbidi concitatique motus cordis vel, ut Gregorius Nyssenus definit, sunt impetus animæ appetitiva & sentientis, aut ex

Affectuum natura.

contactu objectorum, aut ex imaginatione boni vel mali objecti orti. Appetitiva enim potentia objectum est aut bonum aut malum sensibile, siue id revera, siue opinione tantum sit tale, & objecti boni primus effectus est delectatio, mali vero objecti dolor, ad quos duos effectus omnes animi affectiones refert Plato in Timao. Generantur autem in Animo affectus siue passiones, quando imagines objectorum per sensoria in sensum communem deferuntur, aut quando in sensu communi sit cogitatio de objectis absentibus: qua imaginatio primum movet spiritus Animales, moti Spiritus per nervos vibrant in corde spiritus vitales, qui rursus cordis substantiam aut dilatant, ut in letitia; aut constringunt & dolore afficiunt, ut in tristitia.

Quomodo excitentur affectus.

Causæ affectuum.

Causa itaque affectionum animi sunt, Materialis quidem, rerum objectarum imagines: Efficiens est cogitatio de imagine objecti: Formalis est motus & constitutio cordis praternaturalis: Finalis est fuga vel apprehensio objecti: Instrumentales sunt sensoria, nervi & cor; ovalinaeque, sunt humores & temperies corporis.

2. Quot sunt primariæ species affectuum Animi, quive earum effectus?

Præcipui affectus.

Sex à Medicis numerantur præcipue species perturbationum siue affectuum Animi, Timor, Tristitia, Ira, Letitia, Agonia & Verecundia; ad has reliquæ omnes referri possunt, veluti sunt Spes, Misericordia, Odium, Invidentia, Zelus, &c. Et omnes quidem animi perturbationes si modum excedant, naturam humanam mirum in modum offendunt & debilitant. Etiam si quoque moderata sint, nullus tamen fere earum omnium est usus, præter gaudii.

Affectus omnes noxii.

Gaudium moderatum solum sanitati conducit. Timor.

Timor est motus cordis quo cor constringitur, ortus à cogitatione objecti mali futuri; effectus Timoris Galen. l. 2. c. 1. de symptomatum causis, teste, quod timor intro ad cor tum spiritum tum sanguinem, unâ cum refrigeratione externarum partium deducit. Species Timoris sunt, terror, tremor, pavor, verecundia, erubescencia: quæ ratione remissionis & extensionis tantum differunt. Contrarius Timori affectus est audacia, qua

Cognati affectus.

Audacia.

ex objecti boni consequendi opinione, aut mali superantis spe oritur, & ut in Timore cor constringitur, ita in Audacia dilatatur & turgescit. Timor pudorem, Audacia Impudentiam parit.

Tristitia, Mæror, & mæstitia gradibus remissis & extensis inter se tantum differunt. Est autem Tristitia motus cordis quo cor constringitur & paulatim flaccescit, & ex iisdem causis oritur cum Timore, & eosdem habent uterque effectus, in hoc tamen differunt quod in Timore semel & confertim sit sanguinis & spirituum recursus ad cor, cum refrigeratione externarum partium; In tristitia autem id paulatim contingit. Tristitia corpus gracile reddit & exsiccat, juxta illud, spiritus tristes ossa exsiccat. Plures ex tristitia & animi mærore extinctos fuisse testatur Plinius l. 7. c. 26.

Tristitia.

Effectus tristitiæ.

Ira, excandescencia & furor gradibus tantum differunt. Est autem Ira motus cordis qui oritur ab objecto malo cor offendente. Et sane nihil aliud est ira quam fervor Caloris, spiritus & sanguinis in thalamis cordis existens, qui excitat appetentiam ultionis. In tali enim motu & fervore cordis ex vesiculis attrahitur vapor biliosus, sanguineque & spiritibus in corde contentis admiscetur, qui simul ebullientes, ex corde ad faciem oculos & cerebrum effunduntur, ibidemque spiritum Animalem inficiunt, quo & ratio turbatur & turbulenti motus partium corporis excitantur. Ex iracundia etsi nemo mortuus sit, teste Galeno lib. 2. c. 5. de symptomatum causis: tamen plurimos in Epilepsiam, Ampoplexiam & alios mortiferos morbos, & in furorem egit ac coniecit, & fama existimationisque jacturam multis attulit. Danda itaque opera est ut iram concoquere ac frangere discamus.

Ira.

Tandem etiam mors ex hisce morbis sequitur.

Gaudium, Letitia & Exultatio gradibus inter se differunt. Est autem gaudium motus cordis contrarius ei qui in tristitia contingit, & oritur ex objecto bono, & amata presentis rei imaginatione, ut cum id quod amamus & prius appetebat animus, jam adest & arripitur potest: huiusmodi rei presentis fruitio Gaudium dicitur. In Letitia siue Gaudio cor turgescit

Gaudium.

Gaudio
nimio
nonnulli
extincti
subito.

get & dilatatur, caloremque & spiritum vitalem ad exteriora profundis. Hinc non paucos praenimia latitia corde spoliato calore & spiritu mortuos esse legimus, quorum exempla recitat Plinius l. 2. c. 5. 2. Valerius Maximus l. 9. c. 12. & Aulus Gellius lib. 3. cap. 15. Gaudii moderati utilitates sunt, quod eo exhilaratur Cor, & natus calor in omnibus partibus excitatur, sanguisque in corpore extenuatur & purificatur.

Agonia.

Agonia est mixtus motus cordis, constans ex timore & ira, quo Animus angitur & excruciat, sibi ipsi irascens, & futurum malum metuens. Est autem affectus animi periculosissimus qui nisi superetur auxilio Spiritus Sancti & consolatione verbi divini, ejus finis desperatio est.

Verecundia.

Verecundia & pudor gradibus differunt, & est mixtus cordis motus constans ex Timore & moderata ira. In verecundia autem fit reciprocos motus sanguinis. Primum enim calor internus & sanguis ad interiora fugit, sed statim à spiritu vitali rursus ad exteriora repellitur. Contrarius autem motus quoque sanguinis fit in verecundia & Timore. In verecundia enim (Aristotele in problemat. teste) sanguis ad exteriora diffunditur & cutis rubescit. In timore autem ab exterioribus intro pellitur, cutisque pallefcit. Oritur autem verecundia sive pudor Galeno lib. 2. c. 5. de symptomatum causis teste, derepente homini nihil mali speranti. Verecundia contrarius affectus est Impudentia.

Spes.

Spes est mixtus motus cordis ex amore & gaudio compositus. Ac constat immoderata dilatione cordis qua contingit ex objecti boni futuri acquirendi imaginatione. Spes autem perpetuo comes est bona conscientia, teste Platone in l. de Rep. Et Pindarus inquit: Quicunque justè sanctèque vitam exigit, dulcis eum spes comitatur, cor nutrens. Item Nazianzenus: Nihil nos magis exhilarare consuevit, quam spes & conscientia bona.

Amor.

Amor est motus & dilatio cordis, qua cor turgit, fervore spirituum & sanguinis in corde contenti, quo motu cor objectum alienum expetit sibi adjungi cupit. Plato in l. de Amore, Nullam voluptatem amore po-

tentorem esse dicit. Amoris autem gradus plures sunt, alius enim est honestus, alius turpis, alius moderatus, alius vehemens, alius remissus.

Odium est filia ira, neque differt ab ira nisi temporis duratione. Ira enim breviori tempore concoquitur, odium autem durat diutius. Et ira Melancholicorum plerumque terminatur in odium. Ira vero biliosorum instar flamma cito deflagrat & evanescit, nec in odium terminatur.

Misericordia est mixtus motus cordis constans ex tristitia & dolore, quo cor moderatè constringitur, qua oritur ex aliena calamitate, quasi ex proprio objecto malo. Misericordia est proprius affectus Dei, Angelorum & Filiorum Dei.

Invidentia est mixtus motus cordis ex dolore & tristitia constans. Oritur hac ex alieno felici successu. Invidia quoque ut ira comes est odium.

Zelus est motus mixtus cordis constans ex amore & ira seu sollicitudine, ut cum quis ita amat ut sit sollicitus, & metuat ne alius aliquis amata rei us fruatur, vel qui nullum fert in amore rivalem, qui Zelotes dicitur: ἐπιζήλωσις est motus cordis & affectio prorsus vitiosa & diabolica, cum videlicet quis latatur calamitatibus & afflictionibus proximi.

2. Quomodo gubernandi sunt affectus?

Affectus sunt omnium tum virtutum tum vitiorum causa, & ita natura hominum insiti, ut ex ea nullo modo evelli queant. Moderatè autem, & eos juxta normam rationis gubernare, ne suos cancellos excedant, solius Sancti Spiritus auxilio & verbo Dei possumus, juxta illud Gen. 4. sub te erit appetitus tuus. Quomodo autem sint gubernandi, in eo praecepta omnia Decalogi, tota Philosophia Moralis, & universa iuridica facultas occupata est. Plura de Affectibus eorumque gubernatione extant apud Ciceronem lib. 3. c. 4. Tusculanarum questionum, & apud Lactantium in Divina institutione lib. 7. c. 14. usque ad 20. & Erasmus de Milite Christiano.

Odium.

Melancholici ad odium proclives. Biliosorum ira brevis. Misericordia.

Invidia.

Zelus.

Quomodo affectus sine moderantibus.

COM-

C O M P E N D I I

A R T I S M E D I C Æ

F R A N C I S C I J O E L I S

L I B E R T E R T I U S ,

De rebus præternaturalibus, Causis morbificis,
morbis & Symptomatis.

S E C T I O I.

D E M O R B O R U M C A U S I S .

I. Quæ est artis Medicæ tertia pars, & quibus de rebus tractat?



Tertia pars artis Medicæ quam Græci ἀπολογικὴν seu παθο-
λογικὴν vocant, est qua tra-
dit earum rerum cognitio-
nem, qua cum humana na-
tura & salubritate cum ani-

mi tum corporis è diametro pugnant, eamque
destruunt & labefaciunt, & cum quibus na-
tura & ministro natura Medica, subinde
præliandum est: qua res Medicis præternatu-
rales & cum natura pugnant dicuntur, Ga-
leno Ἀλλοείας, id est affectus præter naturam,
& πάθος atque πάθησις id est passio dicitur.

Res præ-
ternatu-
rales 3.

Sunt autem numero tres: I. Causa morbifica.
II. Morbi. III. Symptomata. In hac itaque
tertia Medicinæ parte causarum genera, mor-
borum symptomatumque naturas & differen-
tias breviter explicabimus.

2. Causa morbifica sive efficiens causa
morborum quid est, & quæ sunt
causarum morbificarum
genera?

Causa
morbifica
quid.

Causa morbifica sunt decimum quartum
objectum circa quod Ars Medica est occupata.
Est autem causa morbifica, qua suapte natu-
ra ei, qui sit morbo aliquam suæ generationis
partem confert, sive qua quocunque modo al-
iquid ad morbi constitutionem confert, mor-

bumque excitat. Cum autem sine causarum
cognitione, morbi ipsi nec præcaveri nec cura-
ri possint, in omni morborum genere diligenti
observatione investiganda sunt morborum
causæ efficientes quæ semper antecedunt mor-
bum. Porro causarum morbificarum genera
in hac comprehenduntur tabella.

Tabella causarum morbificarum.

Causarum mor- bificarum 4. sunt genera,	{	Περιογενητική, externa,	Genera causæ morbifi- cæ.
		Περιογενεῖν, interna,	
		Continens, Sine qua non.	

Harum causarum morbos excitantium po-
strema dua, continens & sine qua non, ad
priora duo genera referri possunt.

Περιογενητική id est externa causa, Celso Evidens
evidens seu manifesta, aliis primitiva dici- & exter-
tur, & est qua extrinsecus naturam offen- na causa
dit, vel qua corpori in corporeque contentis qualis.
extrinsecus vim infert. Ha autem evidentes
sive externa causa excitant in corpore causas
περιογενεῖν ad morborum procreationem,
ut in asthma flatus australis est περιγε-
νητική sive evidens causa, qua excitat causam
περιογενεῖν, videlicet copiam excremento-
rum in cerebro, ut defluat per arterias in pul-
mones

Externa-
rum cau-

mones eorumque obstruat meatus & mor-
bum, videlicet difficilem respirationem gene-
rat. Ad *αἰσθητικὰς* sive primitivas cau-
sas referuntur rerum externarum abusus &

immoderata earum qualitas & quantitas, farum dif-
ferentia. quarum omnium alia vitari non possunt &
necessario naturam offendunt, alia autem for-
tuita sunt & vitari possunt.

Causa externa qua

Vitari non possunt, sunt

Vitari possunt, sunt

Aëris constitutio,
Cibus & potus,
Somnus & vigilia,
Labor & Quies,
Excretio & Retentio,
Animi *παθήσεις*.
Gladii ictus,
Bestiarum Morsus,
Fumus,
Gravis odor,
Lapsus ex alio,
Pharmaca venenosa,
Æstuarii caliditas, & similes for-
tuiti casus.

Interna
antecedens.

Προγενέδον, Interna causa morbifica, quam
Celsus abditam, alii Medici antecedentem
vocant, est qua in corpore consistit, & mor-
bos aut mediata aut immediate gignit, auget
& conservat, ut in pleuritide, *αἰσθητικὴ*
ἐνέργεια sive evidens & primitiva causa est ci-
bus & potus immoderatus, *αἰσθητικὴ* sive
antecedens est copia sanguinis defluentis ad
intercostales membranas, ibidemque tumo-
rem praternaturalem generantis. Duplex au-
tem est causa Antecedens, mediata aut im-
mediata, ut in pleuritide sanguinis collectio
circa costas est causa mediata *παροξυσμική*.
Immediata autem sive continens causa est pu-
trefactio ejusdem. Ad causas *αἰσθητικὰς*
referuntur spiritus, sanguis, humores, excre-
menta, omniaque in corpore vitiosa conten-
ta, & vel qualitate vel quantitate peccan-
tia. Item partium instrumentalium situs, fi-
gura, numerus & connexio vitiosa & pra-
ternaturalis: Item meatuum obstructio, laxi-
tas, asperitas, & laevis. Continens sive
conjuncta causa est quidem causa & species
αἰσθητικὴ, qua in corpore sita morbo proxi-
me adhaerescit & connexa est ac immediate
morbum efficit, ut diximus, in pleuritide
αἰσθητικὴ est immoderatus cibus & po-
tus, *αἰσθητικὴ* mediata est sanguinis colle-

ctio circa costas. Continens causa sive imme-
diata antecedens morbum, est putrefactus
sanguis, adhaeret morbo & dolorem ac fe-
brim immediate excitat. Causa sine qua non,
ἀνὰ τὴν ἀνάγκην, est qua visus & per se non effi-
cit morbum, sed tamen ab efficiente causa se-
parari nequit, & est quasi *συνεχόμενος*, id est
adjuvans sive concausa, ut in morbo arti-
culari causa *αἰσθητικὴ* est aëris frigida
constitutio, *αἰσθητικὴ* est defluens ex cere-
bro humor ad articulos, continens est ejus-
dem humoris vitiosa qualitas: causa sine qua
non est imbecillitas articularum non valens
vincere affluentem humorem. Ad causas si-
ne qua non referuntur Locus, Tempus, In-
strumentum. Porro haec causa omnes morbifi-
ca continuatione quadam & serie inter se
connexa sunt, & prima quidem est semper
αἰσθητικὴ, postrema vero continens,
media sunt antecedentes mediata. Minime
autem omnis morbus necessario ex his simul
omnibus causis oritur, sed alias ex duabus,
alias ex una tantum.

Conti-
nens.

Sine qua
non.

Auctor
continen-
tem hic
pro con-
juncta ac-
cipit, abs-
que ullo
discrimi-
ne.
Ordo cau-
sarum.

SECTIO II. DE MORBIS.

Secunda res contra naturam vel è diame-
tro pugnans cum natura, sunt ipsi morbi, &
I nume-

Differen-
tia causa
antecedens.

Conjuncta
causa.

numerantur inter objecta artis Medica decimo quarto loco.

I. Quid est morbus, & quæ consideranda circa morbi definitionem?

Morbi definitio
examinatur.

Morbus est *Διάθεσις* sive affectus contra naturam, à quo primum & per se vitatur actio, autore Galeno de differentiis symptomatum cap. I. In hac definitione quinque sunt præcipue consideranda.

Διάθεσις.

I. *Διάθεσις* hoc loco Galeno significat idem quod *ἕξις*, id est dispositio sive affectus corporis aut partium ejus habitualis, stabilis & perseverans; hinc bona corporis *Διάθεσις* sanitas, mala vero morbus dicitur.

Differentia inter
res contra
& præter
naturam.

II. Omnis morbus est *Διάθεσις* sive affectus contra naturam, quia primum & per se vim naturam infert & ledit actiones. Differunt autem res in corpore contra naturam & res præter naturam, ut morbus & symptomata sunt res contra naturam quia lidunt actiones, res præter naturam non lidunt actiones etiam si sunt molesta. Tales sunt squalor corpori inusus à sole, fœdus corporis color in lèthetia, asperitas cutis &c.

Cujus partis actio
latur à morbo.
Subiectum morbi.

III. Per morbum semper aut vitatur aut latur, aut prorsus tollitur actio partium, quibus morbus insidet.

IV. Omnis affectus sive *διάθεσις* hæret & consistit aut in partium substantiis, qua consistant ex solis partibus spiritibus & calido innato inter se confusis: aut in contentis, veluti sunt spiritus flatulenti, sanguis, humores & excrementa, aut in actionibus.

Differentia inter
morbum
& causam
morbificam.

V. Sola autem *διάθεσις* sive affectus vitiosus, qui in partibus corporis similaribus aut organicis consistit, verè & propriè morbus dicitur, quia is tantum primum & per se actiones latur. Is vero affectus sive vitiosa *διάθεσις* qua in contentis, id est spiritibus, sanguine, humoribus & excrementis reperitur,

morbus propriè non est, quia non primum nec per se actionem latur, sed interventu suo afficit partes, & est tantum causa morifica. Ad causarum itaque generalis affectus referri debet, ut humores in venis putrescentes per se non lidunt actiones nisi sua contagione partes inficiant. Affectus autem sive vitiosa *διάθεσις* in actionibus, velut qua læsam actionem comitantur, non morbi sed symptomata sunt.

2. Quot modis morbo afficiuntur partes corporis?

Duobus modis partes corporis afficiuntur, & liduntur earum actiones. Per se primum, quæ affectio Græcis *ιδιωματικὴ*, id est propria affectio, & *ἑννοματικὴ* nominatur, quæ parti insidet partisque actiones latur, & non ex alterius partis morbi communicatione oritur.

Secundo partes afficiuntur per consensum, Per consensum quæ affectio Græcis *συμπνευτικὴ* dicitur, quæ consensum affectio non per se inest parti, sed alterius partis vitio ei impertitur; ut cum caput vitatur ex vaporibus è ventriculo sursum elevatis, & mens aut sensus hebetantur aut vitiantur; vel cum ex obstructione spina dorfi fit crurum resolutio, & sensus motusque amissio. Et talis affectio dicitur & *δευτερονομιατικὴ*.

3. Quot & quæ sunt summa primaque morborum genera.

Morbus omnis in aliqua corporis parte consistit. Pars autem omnis prima divisione est aut similis aut organica, unde constat omnes in universum morbos habere aut in partibus similaribus, aut organicis, aut simul in utriusque.

Tria itaque erunt prima morborum genera, denominationem à partium generibus sortita, ut sequens ostendit tabella.

Tabella

Tabella morborum summa genera complectens.

Morbus o- mnis est aut	Similaris, qui parti- bus simila- ribus acci- dit ex pra- ternatura- li intem- perie	Simplici,	Calida, Frigida, Humida, Sicca.	Viraque est aut	Sola, aut nuda qualitas a- ctione ladens. Adjuncta vi- tioso humori, actionem la- dens & sub- stantiam par- tium corrup- pens.
			Composi- ta,		
	Instrumentalis, qui oritur in partibus instrumentariis, qui est quadruplex, generatur e- nim aut ex vitiosa		Calida & sicca, Calida & humida, Frigida & sicca, Frigida & humida.		
			Conformatione, ut convexitas capitis: Magnitudine, ut lingua brevis: Numero, ut sex digiti: Situ, ut artuum luxatio.		
	Communis, quo & similes & organica par- tes laduntur, qui continui sive unionis so- lutio dicitur, & per se quidem est morbus in- strumentalis, per accedens autem similis, & nominatur in				Osse, fractura: Nervis, punctura: Venis, sectio: Membranis, ruptura: Carne, vulnus, &c.

4. Qui sunt morbi similes?

Morbi si-
milares.

Similes morbi, Græcis νοσώδες δυνάμει, id est morbosa intemperies, sunt qui in similibus partibus consistunt, cum videlicet aut in ossibus aut cartilaginibus, aut ligamentis, aut tendonibus, aut membranis, aut nervis, aut arteriis, aut venis, aut carne, aut cute praternaturalis & excellens, aut caliditas, aut frigiditas, aut humiditas, aut siccitas; aut juxta earum combinationem, caliditas & siccitas simul; caliditas & humiditas, frigiditas & siccitas, frigiditas & humiditas, insidet, & actiones ladit, & hæc quidem qualitates nonnunquam sunt nuda & solitaria. Quandoque autem adjuncta sunt humoribus vitiosis, venenatis & contagiosis, & tum non modo actiones ladunt, sed & substantias similiarum partium corrumpunt, & morbum communem, unionis solutionem videlicet eis inferunt.

5. Qui sunt morbi instrumentales?

Morbi in-
strumentales.

Instrumentales morbi sunt qui in ipsis partibus organicis consistunt, nec aliud sunt quam mala constitutiones partium. Ut enim adifi-

cium rectè exstructum dicimus, cum omnes partes ejus pulchro ordine, aequali magnitudine, convenienti situ, sunt inter se connexa: ita ubi pars aliqua in corpore instrumentalis vel vitiosam habet conformationem sive figuram, aut in convenientem magnitudinem numerumque, aut pravam dispositionem ac situm, quicquid tale acciderit partibus organicis, id morbus est, & ladit earum actionem. Sunt itaque quatuor genera morborum instrumentaliū.

Primum genus est quod accidit in figura seu conformatione partis, veluti sunt vitiosa capitis figura, acuminata vel penitus rotunda, pupilla oculi dilatatio, varitas crurum, id est quibus extra vel intro contorta sunt crura, item meatus alicujus laxitas, restrictio & obstructio.

Secundum genus est indecens magnitudo aut parvitas, cum videlicet aliqua pars ordinis.

Tertium morbi instrumentarii genus accidit in

di in numero partium, quando nimirum partes aut pauciores aut plures sunt, quam natura exigit, ut sex digiti in manu, aut ubi digitus aut manus cuiuspiam est amputata, aut monocolus.

Situs.

Quartum genus morbi, accidit partibus instrumentariis in situ seu positione, connexionneque. Tales sunt articulorum luxatio.

6. Qui sunt morbi & similibus & instrumentariis partibus communes?

Solutio
continui
in simila-
ribus.

Continui sive unionis solutio, omnibus, cum similibus, tum organicis partibus communis est morbus, qui quidem morbus in similibus partibus varias habet denominationes. In osse enim ὀστέου, fractura, & eiusdem erosio τρεῖς, id est caries; in carne ἔλκος, id est ulcus, τραύμα, id est vulnus; in membranis ῥήγμα, id est ruptura; in nervis νόκος, id est punctura & ῥάκτις, id est contusio; in venis ἑδῶς, id est incisio dicitur.

In organi-
cis.

Unionis autem solutio qua fit in instrumentariis partibus, non habet peculiare vocabulum, sed communiter omnis solutio unitatis διασπασμός, id est divulsio nominatur.

7. Suntne plures morborum differentiae?

Sumuntur & alia morborum differentia à toto & partibus corporis, veluti sunt, alii universales, qui sese per universas corporis partes extendunt, ut sunt febres; alii particulares, qui in unica tantum particula consistunt, capitis & oculorum affectus, de quibus paulo post. Reliqua autem differentia ferè omnes ab accidentibus morborum sumuntur, quorum praecipua in sequenti tabella comprehenduntur.

Differentiae morborum.

Morborum alii sunt	{	Simplices,
		Compositi,
		Acuti,
		Breves,
		Longi,
		Communes,
		Vulgares,
		Populares seu patrii.
		Maligni,

Lethales,
Vehementes,
Legitimi,
Spurii,
Erratici,
Recidivi.

Simplices Morbi sunt, qui ex unica & eadem causa in una eademque corporis parte simplices, suboriuntur, ut ventriculi intemperies aliqua simplex vel renum obstructio.

Compositi sunt qui cum alio morbo vel pluribus etiam aliis in uno corpore conjunguntur, ut calculus & inflammatio renum. ti & mi-
xii.

Acuti sunt qui intra 14. dies vel ad mortem vel ad sanitatem terminantur propter vehementiam: talis est Pleuritis.

Peracuti sunt qui ultra quartum diem non extenduntur, ut Angina, Apoplexia.

Breves sunt qui cito terminantur. Breves autem sunt omnes acuti & peracuti morbi. Et omnes breves morbi oriuntur ut plurimum à calidis humoribus, sanguine & bile.

Longi seu χρονικοί vel diuturni morbi sunt qui ultra 45. diem extenduntur; velut febris quartana. Et longi quidem morbi omnes à crassis humoribus, pituita videlicet & atrabile ortum ducunt.

Communes morbi sunt, qui multos homines eodem tempore in iisdem locis corripunt. Communium autem morborum alii sunt vulgares & pestilentes, Gracis ἐπίδημοι, velut est pestilens contagio. Alii sunt patrii seu populares, Gracis ἐθνικοί, qui semper in quibusdam regionibus sunt familiares, veluti in hisce maritimis locis est scorbutus morbus; alii sparsi, Gracis σποράδιοι, qui eodem tempore eadem corporis loca in ejusdem temperiei corporibus apprehendunt.

Maligni, Gracis κακὰ, qui gravia inferunt symptomata, & se contumaciter curari patiuntur.

Lethales sunt qui semper interficiunt, ut plerumque sunt peracuti morbi.

Vehementes seu graves sunt qui vehementer naturam affligunt & vires vehementer prosterunt & periculose afficiunt.

Legitimi sunt qui & veri & sinceri dicuntur,

Compositi
ti & mi-
xii.

Acuti.

Peracuti.

Breves

Interdum

enim e-

tiam ex

crassis hu-

moribus

obstruen-

tibus, ut

apoplexia,

catarrhus

suffocati-

vus.

Chronici.

Nisi imbe-

cillitas

visceris

cujusdam

fit ex præ-

cedente

morbo a-

cuto & ca-

lido.

Epidemiæ.

Sporadici.

Genere

diversi hi

morbi, &

separatim

singulos

corrip-

piunt.

Maligni.

Graves.

Legitimi.

tur, qui ex simplici humore ortum ducunt & facile dijudicantur, ut tertiana legitima, quæ ex mera bile generatur, aut pleuritis consistens, quæ ex confluxu sanguinis oritur.

Nothi. Spurius seu morbi legitimis contrarii sunt, qui videlicet non ex simplici aut unico humore, sed ex plurium commistione generantur, vel non perseverant ad terminum suæ naturæ convenientem, velut est πυρεσμός, quæ etsi ut legitima πυρεσμός latus punctura afficit, cito tamen post remedium applicationem evanescit.

Ordinati morbi sunt qui statim certisque temporibus invadunt, ut tertiana & quartana.

Erratici qui incerto tempore & per incertas periodos corripunt, veluti sunt febres erraticæ.

Recidivi. Recidivi sive recurrentes morbi sunt qui aliquantisper remittunt & moderatiores sunt, rursus postea exacerbantur, hos Hippocrates πρὸς ἐξάκρυνον vocat.

8. Qui sunt Morbi universales, & qui particulares?

Universales morbi imprimis sunt febres, quæ universales ideo dicuntur, quia totum corpus occupant & calore præternaturali afficiunt. Particulares autem morbi sunt, qui in quibusdam partibus hærent & earum functiones laedunt, quorum nomenclaturas post symptomatum tractationem enumerabimus.

SECTIO III.

DE FEBRIBUS.

I. Febris quid est, & quæ sunt febrium genera & differentię?

Febris natura. Febris, πυρετός, est calor præternaturalis, qui in corde initium sumens per arterias &

venas in universum corpus diffunditur, ejusdemque actiones laedit, calorem nativum qui autor est omnium actionum & salutis, corrumpit. Rigor enim & horror qui febrem antecedit, revera non est, nec dici potest febris (nulla enim febris est frigida) donec præternaturalis calor in corde accendatur & in totum corpus diffundatur.

Febrium tria sunt genera, { Simplex,
Putrida,
Pestilens. Febrim differentia.

Simplex febris est nativi caloris paulatim in igneum conversio: talis est ἐφύμεγε in spiritibus, πυρετός in sanguine, & ἐκτρε in solidis partibus.

Putrida est cujus calor ex colluvie putridorum humorum emerfit: talis est continua putrida, & intermittentes.

Pestilens est quam venenata & perniciose expiratio intulit. Harum differentia in sequentibus tabellis proponuntur. Consistit autem Febris materia omnis febris tanquam in propria materia tercia, & subiecto, aut in spiritibus, aut humoribus, aut solidis partibus.

Subiecta febrium sunt tria, { Spiritus,
Humores,
Solida partes.

Qualis febris in spiritibus accenditur?

In spiritibus vitalibus simplex febris accenditur, quæ ἐφύμεγε id est diaria, quia unico causa, dumtaxat die durat, dicitur. Oritur hac plerumque à πνευματικαῖς causis, videlicet à solis fervore, laboribus vehementioribus, potu vini meracioris &c. Et hominem repente apprehendit sine antecedente rigore, sine cibi fastidio, & sine oscitatione, quæ reliquas febres antecedunt.

Tabella febrium in humoribus hærentium.

		Sine putredine, in totâ massâ sanguineâ, & generatur Cubox, id est continens non putrida.				
Humores accen- duntur aut	Intra venas,	Putrescentes, ut si putrescat tota massa sanguinea, fit Cubox, putrida. Bilis flava si putrescat, genera- tur Cubox seu tertiana continua: Si pituita, gene- ratur quotidiana continua: Si atra bilis, fit quartana continua.				
	Extra venas in aliqua corpo- ris capacitate putrescentes, suntque vel	<table><tr><td>Bilis flava,</td><td rowspan="3">} Quæ ge- nerat</td><td rowspan="3">} Tertianam intermit- tem, Quotidianam intermit- tem: Quartanam intermittē.</td></tr><tr><td>Pituita,</td></tr><tr><td>Atra bilis:</td></tr></table>	Bilis flava,	} Quæ ge- nerat	} Tertianam intermit- tem, Quotidianam intermit- tem: Quartanam intermittē.	Pituita,
Bilis flava,	} Quæ ge- nerat	} Tertianam intermit- tem, Quotidianam intermit- tem: Quartanam intermittē.				
Pituita,						
Atra bilis:						

Febres ex Si bili flava putrescenti admixta sit pitui-
militis hu- ta, generatur tertiana spuria; si admixta sit
moribus. pituita dulcis, generatur quotidiana inter-
mittens; si vero commistionem habeat pitui-
ta vitrea, generatur Epiala.

Tabella febrium in partium substantiis hærentium.

Calor accensus in solidis { Hæticam,
substantiis partium ge-
nerat, vel { Marasmm.

Da brevem explicationem Febrium.

Ephemera. Ephorus, Latinis Diaria, est febris sim-
plex in spiritu vitali consistens à causa aliqua
externa, Solis ardore, vehementiori com-
motione corporis, vini meracioris potatione,
& similibus orta, qua & citò sudore mado-
reque exhalatur, & uno ut plurimum die
durat.

Synochus simplex. Synochus simplex sine putredine est febris
qua in sanguine effervesceat & suo vapore cor
& totum corpus excalefaciat. Hac una acces-
sione continua & sine intermissione naturam
fatigat donec dissipetur. Oritur hæc ex causis
externis veluti & diaria, potissimum autem
ex sanguinis redundantia & pororum cutis
obstructione & nimia constipatione. In hac
febre facies vehementer rubet.

Synochus Est alia species cubox qua putrida dicitur,

estque febris continua ex putrescente in venis
sanguinea massa orta. Hac similiter unica ac-
cessione invadit & durat donec terminetur.
In hac febre sanguis à venis detractus foetidus
& putridus apparet & non concrevit.

Kais, Tertiana ardens est febris conti-
nua, & oritur ubi flava bilis sola in massa
sanguinea exuberat & putrescit. Causus.

Quotidiana continua generatur ubi san-
guinea massa in venis nimium est pituitosa, &
ipsa pituita putrescit. Continua
alix putri-
da.

Quartana continua generatur ubi humor
melancholicus in venis seu in massa sanguinea
redundat & putrescit. Et hæc quidem species
febrium omnes sunt continua, & in humori-
bus intra venas putrescentibus consistunt. Inter-
mittentes autem febres, id est quæ certas, in
pluresque accessiones & remissiones habent, in
hisce locis sunt magis familiares. Oriuntur
autem & hæc ex iisdem putridis humoribus, Intermit-
tentes.
Focus in-
termittē-
cium.

Tertiana itaque intermittens generatur ex
putrescente & excrementicia flava bile extra
venas collecta, qualis est bilis flava in vesicu-
la sua vel bilis vitellina aut porracea in ven-
triculo congesta. Hac febris unum diem in-
termittit & tertio rursum redit. Quod si ve-
rò bili

ro bili flava putrescenti extra venas admixta sit pituita, tertianam spuriam gignit.

Quotidia-
na.

Quotidiana intermittens fit quando pituita vel mucus extra penas, qualis in ventriculo, intestinis, & circa prae cordia & diaphragma plurimum colligitur, putrescit. Ha singulis diebus semel recurrit & intermit.

Epiala.

Epiala febris est species quotidiana, qua ex pituita vitrea putrescente generatur. Hac febre laborantes per uniuersum corpus simul & eodem tempore & rigent & astant vehe-
menter.

Quarta-
na.

Quartana intermittens ex atra bile excrementitia & extra venas effusa, qualis est qua in liene colligitur putrescente suboritur, qua duos integros dies intermit, & quarto die rursum redit.

Maligna.

Pestilens febris est ex febrium putridarum genere, qua ut plurimum ex venenati aeris inspiratione exoritur, & humores in corpore inficit ac putrescere facit, & tota sua substantia aduersatur spiritibus vitalibus.

Lipytia.

Sunt praeter hac & alia febrium genera, ut λειπυτια, qua ex visceris alicujus interni inflammatione oritur, in qua intus in visceribus vehemens calor & in externis partibus vehemens sentitur frigus.

Sudorife-
ta.

Τυφώδης id est humida, est febris in qua corpus perpetuo sudore exsoluitur, & tamen febris à sudore nihil remittitur.

Differen-
tia fe-
brium in-
termitten-
tium à
modo in-
vasionis.

Omnium febrium intermittentium & accessiones & remissiones, aut sunt typica, id est ordinata, in quibus accessio & intermissio, statim ac certis accidunt vicibus; aut sunt Erratica in quibus nullus servatur ordo aut temporis certitudo accessionis & remissionis.

Febres qua in solidis partibus consistunt, sunt Hectica & Marasmus.

Hectica.

Hectica id est habitum corrumpens febris, aut est in uniuerso corpore qua proprie Marasmus dicitur, in qua cor primum, deinde uniuersum corpus calore flagrat & absimitur; aut est particularis, qua primum alicujus partis substantia insidet, ut Ventriculi, Iecoris, Lienis aut pulmonis, ac primum quidem ejus partis substantiam incendit & absomit, deinde & per totum corpus humidum radicale depascitur & Hectica dicitur, Die

Atrophia
etiam
die
durre
dicitur
quod ma-
cilentum
reddat
corpus.

Schwindsucht. Est namq; febrium inter-
mittentium materia & sedes humor excremen-
titius putrescens, tertiana quidem, bilis flava,
qua in fellis vesicula colligitur. Hinc fit, quod
in tertiana semper afficiatur Epar. Epati enim
appensa est vesicula bilis; quartana bilis a-
tra à liene attracta: Vnde quartana laboran-
tes, semper molestias & dolores sentiunt in
liene, sub sinistro hypochondrio. Quotidiana
mucosa pituita, qua vel in ventriculo, vel
circa diaphragma & partibus ventriculo ad-
haerentibus collecta est. Hinc fit, quod quoti-
diana laborantes potissimum ventriculi imbe-
cillitate & praecordiorum doloribus infe-
stentur.

3. Quae sunt causae frigoris, rigotis, horro-
ris & aestus in febribus intermittentibus?

Frigus, rigor & horror, extensione tantum
& remissione differunt. Frigore enim summa
corporis infrigescunt: rigore vero totum cor-
pus contremiscit, adeoque vehementer con-
cutitur, ut vix cohiberi queat; horrore ve-
ro leniter tantum idipsum concutitur. Om-
nium horum accidentium eadem similisque
est causa, nempe frigidi aut calidi, aeris, va-
poris materiaeque pungentis vehemens incursio
& motus in corporis sentientes partes, quales
sunt membrana & nervi praecordiorum, epa-
tis, & lienis. Putris enim humor in quouis loco
corporis existens quandiu conquiescit, corpus
nec horrore, nec rigore, nec frigore, aut calore
exagitat, donec fermenti instar, turgescens è
loco suo erumpat, & vehementi suo impetu
vicinas partes feriat ac pungat, tunc tandem
horrorem, rigorem & frigiditatem excitat, si-
cut & aeris frigidioris aut aquae exterius oc-
cursus eadem accidentia in corpore excitare
solet. Vbi itaque putrescens humor paucus est,
& acrimonia levis, motusque lentus, tunc
solam frigiditatem in corpore excitat: Si ve-
ro copiosior & acrior extiterit, & concita-
tius, vehementiusque erumpat, statim te-
trum ac crassum vaporem in omne corpus ef-
fundit & horrorem rigoremque parit, ac po-
stea ubi putridus hic vapor ipsum cor occupa-
vit, una cum spiritibus vitalibus incenditur,
& instar flammae per arterias in totum corpus
diffunditur, qui calor febrilis dicitur, & eo
usque

Intermit-
tentium
sedes in a-
liquo vi-
scere.
Gal. l. 1.
art. curat.
cap. 5.

Sympto-
matum fe-
brilium
causae.

Causa ri-
goris mo-
tus humo-
rum pu-
trescen-
tium.

Causa ca-
loris & æ-
stus febrilis.

usque flagrat hic vapor, donec extenuatus impellente natura dissolvatur.

4. Quæ est causa circuituum febrilium?
Cur putrescens pituita quotidie, bilis flava tertio, melancholia quarto quoque die erumpat, impetum faciat, & paroxysmos febriles generet, variè disputatur, variaque adferuntur huius rei rationes, inter quas ea maximè probatur, quod nimirum natura tum demum partes vitiosis humoribus obsessas, ad expulsiorem molestantium humorum stimulet, quando humores vitiosi & sua copia & putrida ac acri sua qualitate partes gravant ac molestant. Tanta autem copia pituita quotidie colligi potest, bilis autem flava non nisi tertio, & melancholia quarto die eam acquirit mensuram, & in eam excrescit copiam, ut naturam gravet, nec eorum fermentatio & putrida qualitatibus eruptio ante hos terminos perfici possunt, ut naturam ad expulsiorem stimulent, ideo nec ante id tempus circuitum efficiunt: Sed de his exactius & ex professo in libro nostro de Febris, sect. 1. ubi tractatur illa Quæstio: Quæ sint Causæ quod Paroxysmi febrium intermittentium alii quotidie, alii tertio, alii quarto die recurrant.

Humores
cur certis
ac statis
tempori-
bus move-
antur. &
accessio-
nes febriles
exci-
tent.

SECTIO IV. DE SYMPTOMATIS.

Tertia res pugnans cum natura humana est symptoma, quod ultimum & 16. locum inter objecta artis Medicæ obtinet. Ut autem causa morbifica perpetuo antecedunt morbos, ita symptomata perpetuo eos comitantur, & sensibus nostris sunt conspicua. Omne enim symptoma simul signum est alicujus morbi.

Sympto-
mata sunt
simul si-
gna.

1. Quid est symptoma, & quomodo differt à morbo?

Sympto-
matis na-
tura.

Omnis defectus & actionum noxa in corpore, quæ nec causa est nec morbus ad symptoma referri debet. Est itaque symptoma, quod à verbo συμπτῶμα, id est, simulcado, vel simul coincido derivatur, affectus præter naturam, qui cum morbo coincidit, morbumque veluti umbra corpus necessario sequitur; ut morbum pulmonis & aspera arteria semper sequitur tussis, & sternutatio cerebri morbos

comitatur. Differt autem symptoma à causis morbificis & morbo, eo quod omnis morbus actionem primum & per se laedit, causa vero morbifica per accidens; sed symptoma est affectus præter naturam ex morbo profectus.

Eius differe-
ntia à
reliquis
rebus præ-
ternatu-
ralibus.

Secundo quod morbus semper in parte aliqua corporis consistit, causa vero in contentis, id est in spiritibus, humoribus aut excrementis: Symptoma vero in utrisque contingit, & simul in actionibus. Ex eodem autem morbo sæpe plura oriuntur symptomata, ut ex frigida ventriculi intemperie, quæ morbus est, oritur symptoma, videlicet cruditas. Ex eadem oritur & aliud, nimirum lienteria & crudorum humorum in totum corpus distributio. Et ita ex symptomatibus sunt morbi, & symptomata sunt causæ morborum.

Ex uno
morbo
plura sym-
ptomata.

2. Quot & quæ sunt symptomatum genera?

Sympto-
ma unius
potest esse
causa alte-
rius mor-
bi.

Tria sunt summa symptomatum genera: alia enim sunt actionum noxa, alia sunt corporis simplices affectus, alia excrementorum vitia.

Sympto-
matum
genera
summa.
Triplex a-
ctionum
læsis.

Symptomata quatenus sunt actionum noxa, sunt cum actiones vel animales, ut Ratiocinatio, Judicatio, Memoria, aut sensus & motus voluntarius, vel actiones naturales, veluti sunt appetentia, attractio, retentio, alteratio, expulsio, concoctio, distributio, &c. hebetantur aut depravantur, aut prorsus amittuntur per morbum.

Symptomata corporis simplicis affectus, sunt vitia, quæ in corpore & partibus corporis & morbo aliquo contingunt, quæ sensibus nostris sunt subiecta, ut color foedus cutis in lètheria, odor foetidus oris, tinnitus aurium, stridor dentium, oris amaror, scabries squallorque cutis, in summa omnis qualitas sensibilis præternaturalis in corpore existens.

Qualita-
tes sensibiles
seu affe-
ctus cor-
poris.

Symptomata excrementiciorum humorum sunt, quæ ex vitiosis contentis, veluti sunt excrementa & humores vitiosi proveniunt, quorum alia tota substantia sua sunt vitiosa, ut calculus, arena, lumbrici; aut vitiosa sunt qualitate, veluti color & odor foedus, aut vitiosa quantitate, veluti est sudor immodicè profluens. Porro omnium morborum ac symptomatum Nomenclaturas & Latinas & Græcas in sequentibus tabellis enumerabimus.

Excreta
& retenta
præter na-
turam.

3. Qui-

3. Quibus Nomenclaturis insigniuntur morbi ac symptomata?

Morborum nomina unde desumpta.

Vetusitas morbis nomina indidit, partim à parte cui morbus insidet, ut pleuritis, nephritis, peripneumonia &c. Partim à materia efficiente, ut melancholia, cholera, calculus, &c. Partim à vehementi symptomate, ut apoplexia, Epilepsia, Paralysis, &c. Partim ab externarum rerum similitudine, ut Elephas, Cancer, polypus, &c. Et quidem has Nomenclaturas & recens atas retinuit, quas breviter in hisce tabellis commemorabimus.

1. Morbi & symptomata capitis, quæ accidunt

Meningibus:

Kεφαλαλγία, Arab. Soda, dolor recens capitis.

κεφαλαία, dolor capitis inveteratus. ημικεραία, Dolor mediam partem capitis infestans.

Cerebri substantiæ, quæ rationem perturbant:

Φρενitis, inflammatio cerebri furiosa. Melancholia, mentis alienatio cum mœsticia.

μωρία, furor vel insania furiosa. μνήμη ἀπολέψις, memoria abolitio. κώλη, sopor.

λήθαργος, veternus.

Cavitationibus cerebri:

σκόπημα, vertigo, τώχρυμα.

ἐπιληψία, morbus sacer.

ἀποπληξία, attonitus morbus.

παρέλυσις, membrorum resolutio.

σπασμός, convulsio.

τρεμός, tremor.

ἐφιδάτης, incubus.

Cuti & subcutaneis partibus:

Catharri desillatio.

ἀλωπηκία, capillorum defluviium.

φαλάκρωμα, calvities.

πυρελαπς, porrigo.

Φθελαπς, pediculatio.

ἀκρωες, ulcera capitis saniosa.

τρυμνα, vulnus capitis.

ἀμύρωσις, caligo seu visus obscuritas. ὀφθαλμία, lippitudo.

πτερυγιον, unguis oculi, der Star.

τρώπιον, sugillatio vel macula oculorum.

τρώχυσις, suffusio, cataracla.

ἐπιφορὰ, lachryma spontanea.

mata oculorum:

ἕλκος ὀφθαλμῆ, ulcus oculorum.

λολωμα, albugo sive cicatrix oculorum.

Φλύκθαινα, pustula oculorum.

νοκταλὰς, nocturna cecitudo.

πρόπτωση, procidentia oculi.

ψωροφθάλμια, scabies palpebrarum.

κροθί, grando seu hordeolum.

ὀπταλγία, aurium dolor.

δυσσηχία, difficultas auditus.

κώφωσις, Surditas.

3. Morbi & symptomata aurium:

Τελαργός ἢ βομβός, tinnitus seu strepitus aurium.

πυορρεν τοῦ ὠτός, purulentia aurium.

Vermiculi, aut alia accidentia in aures.

Παρωτίς, tumor inflammatus circa aures.

4. Morbi & symptomata narium:

βλάση ὀσφίσιος, olfactus diminutio.

δυσωδία ἢ ῥινός, fator narium.

αἱμορρογία, sanguinis è naribus eruptio.

Κέρυς, gravedo.

ὄζωμα, ulcus in naribus.

πολύπες, tumor & excrecentia carnea in naribus.

5. Symptomata faciei:

ἐφελκς, pustula faciei, die Pinnen.

Rubor & decoloratio faciei.

Φακός, lentigo, sprütlig.

6. Symptomata labiorum:

σπασμός κωικός, distentio seu contorsio oris.

Fissura labiorum.

ὀδοναλγία, dentium dolor.

ἀμωδία, stupor dentium.

Nigrities dentium.

Vacillatio dentium.

Erosio dentium.

ἐλατωλαδωρ, gingivarum excrecentia.

πύρελς, gingivarum inflammatio seu tumor.

7. Symptomata ac morbi dentium ac gingivarum:

Fator oris.

ἀφθαι, ulcuscula per oris superficiem & linguam exorta, die Schwämmen.

βάτταχ, ranula, tumor sub lingua puerorum.

παρελυσ, lingua tumor & scabries lingua.

Gustus depravatio.

8. Oris & in ote contentarum par-

K

ἀντιάδες,

tium
morbi
& sym-
ptomata:

9. Thora-
cis morbi:

10. Asperæ
arteriæ
morbi:

11. Pul-
monis
morbi:

12. Cordis
morbi:

13. Mam-
marum
morbi &
sympto-
mata:

14. Gulæ
morbi:

15. Mor-
bi &
sympto-
mata ori-
fici ven-
triculi:

16. Mor-

ἀντιδός, tonsillarum exulceratio.
κίον, seu γαστρεῶν χαλασός, colu-
mella seu uvula laxitas & elongatio.
ἡνιόγη, Angina, tumor in faucibus
viam respirationis cibi potusque pra-
cludens.

πλευρῆς, lateralis dolor.
ἐμπύημα, puris in capacitate thoracis
collectio.

βρόγχος, raucoedo vocis.
βήξ, tussis.

ἀετιπνευμία, pulmonis inflammatio.
ἐμφυγῆς πνεύμων, obstructio pulmo-
nis.

ἀσθμία, anhelitus difficultas.
δυσπνοία, difficultas & non nisi recta cer-
vice respiratio.

ὑπόπνευμα πνεύμων, vomica pulmonis.
φθίσις, tabes, pulmonis exulceratio.
αἰμόπτυσις, cruenta excretio.

Συνορητή animi deliquium.
παλμός καρδίας, cordis palpitatio.
Tumor cordis.

Intemperies cordis calida vel frigida.
σπασμωδὸς, tumor & inflammatio
mammarum.

Lactis redundantia.
θρομβώσις, lactis in grumos concrescientia.
Lactis defectus.

Intemperies calida } In affectione gu-
aut frigida. } la dolor semper
Tumor œsophagi. } in spina dorsi
sentitur.

Καρδιαλγία, oris ventriculi affectio.
ἔγκαισις & πυρετός, ardor stomachi,
die Sode.

ὀξυγυμία, acida eructatio ventri-
culi.

ἀνορεξία, cibi fastidium, siue appeten-
tia prostratio.

κυνώδης ὄρεξις, canina appetentia.
βέλμη, vehemens fames.

ἰσμία, pica, appetentia à natura abhor-
rentis alimenti.

ἀπεψία, cruditas ventriculi.
ναυτία, nausea.

ἔμετος, vomitus.

bi & sym-
ptomata
ventricu-
li:

17. Mor-
bi & sym-
ptomata
intestino-
rum:

18. Morbi
& sympto-
mata ani:

19. Epa-
tis morbi
& sympto-
mata:

20. Lienis
morbi &
sympto-
mata:

ἀιματώδης ἔμετος, cruenta vomitio.
λυγμός, singultus.

φλεγμονή & κοιλίας, inflammatio ven-
triculi.

πνεύματος γαστρός, sufflatio ven-
triculi.

διψήσιος σφοδρὸν, immodica seu vehemens
sitis.

χολίκα, bilis supra infraque eruptio.

λεντερία, intestinorum leuitas.

ἀλγίπνοια, alvi profluvium.

δυσπτεία, cruenta alvi defectio cum
torminibus.

τηνεμὸς, tenesmus assidua, inanis ta-
men excernendi cupiditas.

κολικὴ, coli intestini dolor.

εἰλὸς, volvulus, ilei intestini crucia-
tus.

ἐλμυνδες, lumbrici intestinorum.

ραγάδες, fissura podicis.

κορύδαμος, ficus, tumor durus in a-
no.

αἰμορροΐς, fluor sanguinis ex venis a-
peritis in ano.

ἡπατις ἀτονία, intemperies & imbecillitas je-
cinoris & qua oriun-
tur } cacochymia,
cachexia.

ἀφροδῆς ἐστὶς ἡπατις, corruptio sub-
stantia epatis.

ἐμφυγῆς ἡπατις, obstructio epatis.

φλεγμονή ἡπατις, inflammatio epa-
tis.

σκληρὸς ἡπατις, durus tumor epatis.

έλκος ἡπατις, exulceratio epatis.

ἰκτερος, ictericia, morbus regius.

ὑδρωψ, aqua intercus.

ἀποφία, nutritionis frustratio.

ἀτονία & ἀσλῆνος, imbecillitas lie-
nis.

ἰκτερος μέλανος, ictericia nigra, cu-
jus species est scorbutus, Melan-
cholia hypochondriaca, reliqui mor-
bi & symptomata, veluti sunt ἡ-
χεξία, ὑδρωψ.

ἡχοχυμία, φλεγμονή, communia sunt
cum epatis vitiiis.

21. Re-

21. Re-
num mor-
bi & sym-
ptomata:

νεφρίτις, *renum dolor.*
φλεγμονή τῶ νεφρῶν, *inflammatio re-
num.*
ἐμφραξίς τῶ νεφρῶν, *obstructio renum.*
ψαμμεώδης νεφρῶν, *arenula renum.*
λιθίασις τῶ νεφρῶν, *calculus renum.*
Διευνήτης, *est quando renes statim as-
sumptum potum expellunt, quem
morbum suis vehemens comitatur.*
ἀιμορραγία τῶ νεφρῶν, *exulceratio re-
num.*
δυσουρία, *urina difficilis projectio.*
ιχθυρία, *urina suppressio.*
σπρωγία, *urina stillicidium cum do-
lore.*
ἄεσις ἀπικρήσθαι, *urina incontinen-
tia.*
πυώδης ἄεσις, *micthio purulenta.*

22. Morbi
& sympto-
mata vir-
gæ:

λιθίασις τῆ κύστεως, *calculus vesicae.*
φλεγμονή τῆ κύστεως, *inflammatio vesicae.*
ἐλκυσίς τῆ κύστεως, *exulceratio vesicae.*
γυνόρροια, *seminis involuntarium pro-
fluvium.*
πυαπιορροία, *tentigo vel pudendi ex-
tentio.*
σπινθηρία, *pudendi cum tensione pal-
pitatio.*
καύλη ἐλκῶ, *virga interna exulcera-
tio.*
ἀδυναμία ἀφοδοτισμοῦ, *Veneris impo-
tentia.*

23. Mor-
bi & sym-
ptomata

βελών, *tumor adenarum, circa ingui-
na, Pestilens schwel.*
κήλη, *ramex vel hernia, wenn ei-
ner gebrochen ist /* *cujus tres
sunt species.*

scroti &
ingui-
num:

βελονοκλή, *tumor inguinum.*
ἐντεροκήλη, *ubi intestina in scrotum de-
labuntur.*
ἐπιπλοκήλη, *omenti ramex.*
σπερμακήλη, *durus & carnosus tumor
testium.*
ὕδρωκήλη, *aquosa hernia.*
ἐξομφαλῶ, *prominentia umbilici.*

24. Morbi
& sympto-
mata ute-
ri:

φλεγμονή τῆ μήτῃ, *uteri inflam-
matio.*
ἐλκυσίς ὑστερική, *exulceratio uteri.*
σκληρῶ τῆ μήτῃ, *durus tumor u-
teri.*
μύλη, *mola,*
ἐμβρυον ἀκαρπεν, *inutilis conceptus, eint
Aborkind.*
ὕδρωψ ὑστερική, *hydrops uteri.*
ρίζαδες τῆ μήτῃ, *scissura labiorum
matricis.*
πνίξ ὑστερική, *suffocatio matricis.*
ἀμέτῃ κίνωσις μηνῶν, *immodera-
ta mensium purgatio.*
ἐπίχσις μηνῶν, *suppressio mensium.*
ῥῶς γυναικῶ, *fluxus muliebri.*
προπτώσις τῆ μήτῃ, *procidencia u-
teri, sterilitas.*
δυστοκία, *difficilis partus.*
ἐκλειψίς τῆ χωρίς, *secundina relictā.*
Abortus.

25. Mor-
bi & sym-
ptomata
articulo-
rum:

ἀρθρίτις, *morbus articularis.*
χειρῶν, *manuum articulos infestans
dolor.*
ποδάργα, *pedum articulos obsidens do-
lor.*
ιχθίς, *dolor circa coxendicem & na-
tes.*

26. Cutis

Tumoribus, quorum qua-
tuor summa genera sunt, ex
quatuor humorum vitiis orta;

φλεγμονή, *inflammatus & fervens tumor à
sanguine, Blutschwer.*
ἐγροπίλας, *ignis sacer, das heftige dinck.*
ὀιδῶδες, *aqueosus vel flatulentus tumor.*
σκληρῶς, *durus & contumax tumor. Ad hac 4.
tumorum genera & sequentia referri pos-
sunt, ut*

afficitur
aut

Tuperculis sive pustulis, uti
sunt

Vlceribus. Ad ulcera refe-
runtur

Vulneribus, quæ dicuntur

ἀνθράξ, carbunculus.

φύζελον, tumor inflammatus adenarum in
quocunque loco.

ἑρπης, herpes,

καρκίνωμα, cancer, tumor durus ac rubicun-
dus.

μυρραινα, verruca, die Wratten.

χοιρῶδ', seruma, glandula indurata.

ἐξάνθημα, morbilli, vel variola, **Masseln
und Rinderpocken.**

ὑπόστημα, abscessus, est ubi tumor aliquis in san-
niem est conversus.

ζάγχρωνα ἢ σφάκελ', partis mortificatio à
tumore.

ἕλκ', ulcer in genere.

ψώρα, scabies.

ἐλεφαντίασις, lepra, **Ausatz.**

λεχλώ, impetigo, **Flechtefehr.**

στέφυλ', Fistula.

φαγεδαίνα, ulcer excedens, lupus.

φλύκταινα, pustula similes ab aqua ferventi
excitata.

Morbus vel scabies Gallica, die **Franzosen.**

In cute & carne, vulnus.

In osse, fractura.

In membranis, ruptura.

Vulnus
quid.

Τεῦμα, vulnus, solutio est continui, qua
in cute vel mollioribus partibus accidit, vio-
lenterque infertur. Vulnus enim omne aut
casu infertur, aut punctione, aut plaga,
aut contusione, aut morfu, aut ustione. Vul-
nus autem aut solutio continui in durioribus
partibus, ut in osse fractura, in membranis
ruptura nominatur.

4. Quæ sunt propria symptomata Fe-
brium?

Febris nulla, incomitata aliis vitiiis appa-
ret; semper enim febres symptomata secum ad-
ferunt, non secus laborantibus molesta, quam
ipsa febris: sunt autem febrium sympto-
mata:

Sitis vehemens,

Lingua ariditas & scabrities,

Deglutiendi difficultas,

Gustus depravatus,

Cibi fastidium,

Nausea,

Vomitio,

Alvi profluuium.

Æstus immodicus,

Corporis jactatio,

Singultus.

Capitis gravis dolor,

Vigilia,

Delirium,

Rigor vehemens,

Sudor exuperans,

Animi deliquium,

Συγκοπή.

18. Sym-
ptomata
febrium;

COMPENDII

ARTIS MEDICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER QUARTUS.

De Signis Morborum & Affectuum præternaturalium tam diagnosticis quam prognosticis.

SECTIO I.

DE SIGNIS IN GENERE.

I. Quæ est quarta pars artis Medicæ, & quibus de rebus docet ?

Summa
totius do-
ctrinæ
σημειω-
της.



Quarta Medicina pars, Graecis σημειωτική, id est signorum contemplatrix nominatur. Docet enim ea quæ ratione ex certis & sensibus manifestis signis & salubris

& morbosa corporis constitutio, omnes denique morbi & causa interna morbifica latentesque item morborum species, qualitates & quantitates, quæ denique pars corporis potissimum sit affecta, percipi ac dignosci debeant. Verum in hoc compendio Artis, omisiss signis salubribus, ut quæ & idiotis ipsis nota sunt, ea tantum tradituri sumus, ex quibus in genere causa morbifica & morbi latentes, locaque morborum percipi ac dignosci queant. Omnis enim morbus internus & causa morbifica ἀνενεργητὴν ex signis sensibus nostris objectis dignoscitur. Omnis autem causa ενεργητικήν sive externa simul & signum est & causa. Ita omnia symptomata perpetuo signa sunt simul & symptomata suorum morborum.

2. Quid est signum medicum & quotuplex ?

Signi natura & differentia.

Σημεῖον παθολογικόν, id est signa insalubria seu morbos indicantia, sunt nota in corpore humano apparentes, & sensibus nostris ob-

jecta, quæ nos ad latentium in corpore causarum & morborum notitiam ducunt, & partes sive loca affecta monstrant, quæ semper aut sunt morbis propria & perpetuo connexa, velut sunt symptomata & causa ενεργητική, aut sunt communia & accidentalia signa. Sunt autem signorum insalubrium genera duplicia, Δεγγραμικά, i. e. Demonstrativa, quibus præsens indicatur corporis constitutio, & Προγνωτικά id est præsentia, quibus futuri morbi prævidentur ac prædicuntur.

3. Quid potissimum servandum est in signis morbificis ?

Tria potissimum ex signis παθολογικῶς signa sunt petenda Medico, causa morbifica πᾶσι quid de- γνῶσθαι, morbi species, & pars, seu locus affectus in corpore.

4. Unde & quibus ex rebus sunt sumenda signa παθολογικά ;

Variis ex rebus & accidentibus corporis signa petuntur morborum à Medicis, quæ vel fontes. affectum locum, vel causas morbificas, vel morbi speciem nobis ob oculos ponunt, velut sunt omnes excrementorum species, ut mucus, sputum, sanguinis è naribus effluxio, sudor, vomitus, alvi defectio; aut sumuntur ex actione laesa, aut ex coloris specie ac

De quibus
signis hic
potissi-
mum age-
re velit.

situ. Sed cum nos singulorum morborum cau-
sarumque morbificarum & partis affectu pro-
pria signa in $\pi\epsilon\pi\epsilon\pi\tau\iota\chi\eta$, id est, curandi ra-
tione apposituri sumus, hoc loco generalissima
tantum morborum signa, quæ ex motu &
pulsatione arteriarum, & ex contemplatione
urina, item quæ ex alvi excrementis & cruo-
ris & venis detracti qualitate sumuntur, bre-
vissimè commemorabimus.

SECTIO II.

D E

PULSIBUS CORDIS ET ARTERIARUM, EORUMQUE CAUSIS, DIFFERENTIIS ET SIGNIFICATIO- NIBUS.

Veluti Sol inter Sydera est nobilissimum
corpus, quod suo calore vivifico per radios &
motus salubres omnia inferiora fovent, vivi-
ficat & conservat: ita cor in homine $\mu\epsilon\tau\epsilon\pi\alpha\kappa\epsilon\iota\tau\epsilon$
(quod est nobilissima pars corporis, quæ suo
innato calore & motu vitali per Arterias u-
niversum corpus fovet, vivificat & conser-
vat, omnesque omnium partium actiones dis-
pensat & gubernat. Ut autem antea dixi-
mus, tribus generibus motuum afficitur cor,
uno proprio, pulsu videlicet, de quo hic ser-
mo erit: & duobus praternaturalibus, affe-
ctibus & palpitatio.

Cordis
motus di-
versi.

I. Quid est pulsus, & quæ ejus utilitas?

Pulsus na-
tura & u-
sus. $\Sigma\phi\upsilon\gamma\mu\acute{o}s$, pulsus est motus proprius cordis
primum, secundo arteriarum, constans ex $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$,
 $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$, id est dilatatione seu elevatione, & $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$,
 $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$, id est contractione, comprehensione seu
submissione, & his utrisque interveniente
quiete, qui excitatur & gubernatur ab $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\gamma\epsilon\iota\alpha$
 $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\gamma\epsilon\iota\alpha$ seu specifica virtute cordis, ad nativi ca-
loris contemplationem spirituumque genera-
tionem & fuliginosorum vaporum expulsi-
onem ordinatus.

2. Da brevem explicationem definitio- nis pulsus.

In hac definitione pulsus motus est genus,

quod autem additur, proprius cordis, con-
stans ex dilatatione & contractione, est dif-
ferentia. Sunt enim & alii motus in corde, ut
motus naturales, videlicet attractio alimen-
ti, retentio, alteratio & assimilatio, qui
communes sunt & aliis partibus, sed motus
qui constat ex $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$ & $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$, cordi & ar-
teriis tantum est proprius, sola enim virtute
cordis substantia innata peragitur. Quod au-
tem in definitione additur cordis primum,
secundo arteriarum, ostendit pulsum cordi
& arteriis non simili ratione inesse, quemad-
modum nec lux Soli & ejus radii simili ra-
tione inesse. Pulsus enim excitatur vivifica
cordis facultate, sed arteriis non est insitus, Quo-
modo
verum defluit in earum tunicas ex corde. do pulsus
Complectitur tandem hac definitio pulsus &
causas precipuas, & primum quidem forma-
lem, ubi dicitur, constans ex $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$ & $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$,
arteriis in-
fit.
& his utrisque interveniente quiete.

Est enim aut $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$, id est dilatatio for-
ma motus quæ cor & arteria sese quoquo-
versum diffundunt ac dilatant, & tenuissi-
mum ambientem aërem per poros hauriunt; $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$
 $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$ vero, id est contractio est forma motus, quæ
quæ cor & Arteria in seipsas undique consi-
dent & submituntur, quo fuliginosos spiri-
tus expellant. Hi duo motus cordis cum inter
se sint prorsus contrarii, quietem intercedere
necesse est, quæ gemina est, una superna quæ
 $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$, altera inferna, quæ $\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$ ter-
minat. Quies itaque non secus ac ipsa motus
partes diligenter est in pulsus consideranda.
Complectitur hac definitio & causam efficien-
tem, ubi dicitur; Qui excitatur & guber-
natur ab $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\gamma\epsilon\iota\alpha$, i. e. insita virtute cordis,
quam vitalem facultatem vocamus. Ad-
duntur & instrumentales causa, quæ sunt
cor ipsum & Arterix ex corde originem du-
centes.

Adduntur postremo & duæ causa finales, in
quibus usus, utilitas & necessitas pulsus com-
prehenditur. Prima causa finalis est necessitas
 $\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$ seu dilatationis arteriarum. Per
eam enim tenuissimus frigidusque ambiens
aër attrahitur, quo cordis & spirituum vi-
talium æstus temperatur, ventilatur ac refri-
geratur, & cujus portio purissima sit pabu-
lum

Causa na-
turalis
pulsus.

Quomo-
do pulsus
arteriis in-
fit.

$\Delta\gamma\epsilon\sigma\lambda\eta$
qualis mo-
tus.

$\sigma\upsilon\sigma\tau\alpha\lambda\eta$

Quies in-
termedia.

Utilitas
pulsus.

lum spiritus vitalis & animalis. Secunda finalis causa est $\sigma\upsilon\sigma\alpha\lambda\eta$, id est compressio Arteriarum, qua fuliginosi & excrementicii spiritus ac vapores per poros cutis discutuntur & expelluntur. Eadem autem sunt utilitates & causa finales respirationis, ut suo diximus loco.

3. Qua in parte corporis, & quomodo explorandus est arteriarum pulsus?

Vbi pulsus arteriarum manifestior. Quomodo pulsus in carpo explorandus.

Pluribus in corporis partibus arteria pulsare sentiuntur, sed evidentissime omnium in temporibus capitis, in carpo manus, & in tarso si ve pectine paulo infra digitos pedis. Sed in his honestissime & magis commode exploratur pulsus constitutio, in carpo, spacio duorum aut trium digitorum latitudine infra pollicis radicem, nisi forte ea arteria alicui sit praecisa, in qua arteriam contrectare volumus, debet habere naturalem situm: ita ut pollex sursum, minimus digitus deorsum spectet, sitque ab omni compressione libera, non elevata, non demissa neque nimium extensa: quin nec digiti ejus manus sint aut in pugnum contracti, nec in palmam extensi, sed moderate contracti: Applicanda autem sunt carpo trium aut quatuor tantum digitorum extrema pulpa ex objecto unguium sita, qua quantum fieri potest, debent esse molles & temperatissima. (Pulpa vocantur extrema carnosae partes digitorum.)

Triplex exploratio pulsuum.

Triplex est autem omnis digitorum applicatio, suspensa, comprimens & moderata. Suspensa dicitur quando superficie tenus arteriis imponuntur, nihil eas comprimentes. Ea applicatione utimur in arteriis eminentibus, quales sunt in macilentiorum corporibus.

Comprimens applicatio dicitur ubi digitis arteria profundius deprimuntur, qua utimur in mollioribus & in profundo delitescentibus arteriis pulsuque debiliore. Moderata vel media inter illas est qua deprimitur quidem Arteria digitis, sed moderate & non ita profunde ut in comprimente. Utimur illa in arteriis temperatis & pulsibus moderatis.

Sanorum pulsus co-

gnoscere, & feliciter ex iis morbos dijudi-

care valeat; primum exercere se debet in cognoscendo pulsu moderato, aequali & $\iota\sigma\upsilon\beta\epsilon\upsilon\mu\epsilon\upsilon$, qualis deprehenditur in corporibus temperatis & exquisita sanitate praeditis. Et talis quidem pulsus debet esse regula & quasi lapis lydius omnium reliquorum pulsuum. Collati enim ad moderatum pulsum facillime dignoscuntur, quantum à mediocritate & naturali constitutione recesserint, & utrum aucti & diminuti sint.

Secundo exercere se plurimum debet in communitatibus pulsuum, idque tam in salubribus quam in agrotantibus corporibus. Voco autem communitates pulsuum, ea pulsuum genera qua communia sunt pluribus individuis ejusdem sexus, ejusdem aetatis, ejusdem temperamenti, ejusdemque habitus, & qui iisdem laborant morbis. Alium enim pulsum habent viri, alium mulieres, alium denique juvenes, alium ac proprium, qui sunt temperamento calidi, frigidi, humidi & siccis, item alius est gracilibus, alius obesis pulsus, alius denique febricitantibus, alius apoplecticiis, &c.

Pulsuum communitates & proprietates.

4. Unde & quibus ex rebus sumuntur differentiae, & quae sunt communiores pulsuum species?

Praecisus obscurioribus & nostris sensibus abstrusis pulsuum differentiis, ac infinitis fere eorum speciebus, veluti sunt pulsus plenus, vacuus, tenuis, crassus, gravis, levis, calidus, frigidus, &c. qua tactu minime sentiri possunt, de quibus Galenus prolixissime disputat, ea tantum genera & species proponemus, quae sunt cognitae utilia & tactu perceptibilia, quorum primum genus est eorum, quorum differentia sumitur ex virtutis vitalis constitutione: Secundum ex arteriarum qualitate: Tertium à tempore seu mensura $\Delta\epsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$ si ve dilatationis: Quartum quantitate $\Delta\epsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$. Quintum à tempore seu mensura $\sigma\upsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$ si ve intervalli inter duos ictus $\Delta\epsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$. Sextum à $\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}$ si ve à proportionem aequali aut inaequali inter $\Delta\epsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$ & $\sigma\upsilon\sigma\alpha\lambda\eta\varsigma$, quorum species in sequenti Tabella ostenduntur.

Vnde pulsuum praecipuae differentiae desumantur.

Tabella communiores pulsum differentias & species
complectens.

Pulsum differen- tia su- muntur	A virtutis vitalis constitutione, ut	{ Vehemens, Languidus, Moderatus.
	Ab Arteriarum qualitate, ut	{ Durus, Mollis, Moderatus.
	A tempore $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$, ut	{ Celer, Tardus, Moderatus.
	A quantitate $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$, ut	{ Magnus, Parvus, Mediocris.
	A tempore $\sigma\upsilon\sigma\lambda\eta\varsigma$, ut	{ Creber, Rarus, Moderatus.
	A $\rho\upsilon\theta\mu\omega$ seu propor- tione $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ & $\sigma\upsilon\sigma\lambda\eta\varsigma$, qua est aut	{ Aequalis & $\epsilon\upsilon\epsilon\upsilon\theta\upsilon\mu\sigma$, Consonus, Inaqualis, cu- jus species sunt { Deficiens, Intercidens, Myurus, Caprizans, Dicrotus, i. e. bis feriens, Vndosus, Vermiculans, Serratus, Tremens.

Quales sunt recitatae pulsum species, &
quae singulorum causae?

Causae pul-
sum.

Generales omnium pulsum causa tres
sunt. Efficiens quidem est vitalis facultatis
cordi insita robur & constitutio: instrumen-
tales sunt Cor & arteria: finalis autem siue
impulsiva est ipsa necessitas attrahendi aeris
frigidi & expellendi fuliginosos vapores.

A vitalis facultatis constitutione oriuntur
pulsus Validus, Languidus & Moderatus.

Validi. Validus seu vehemens pulsus dicitur qui
tangens manus valde sensibilibus pulsat ac
ferit. Ejus causa est robur virtutis vitalis
& copia spirituum vitalium.

Languidi. Languidus seu debilis pulsus est, qui de-
bile & imbecilliter digitos tangens ferit. E-

jus causa est vitalis facultatis imbecillitas spi-
rituumque vitalium diminutio.

Moderatus est qui inter validum & lan-
guidum mediam proportionem obrinet, qui à Moderati.
mediocri vitalis facultatis & moderata copia
spirituum vitalium originem habet.

Ab arteria qualitate oriuntur pulsus Du-
rus, Mollis, Moderatus.

Durus pulsus dicitur quando arteria pul-
sans justo durior ac siccior instar rigidi corii
digitis esse apprehenditur.

Duri pulsus causa sunt aut nimia siccitas, Causae du-
aut vehemens frigiditas, aut tensio, aut con-
trictio pulso arteriarum.

Mollis pulsus dicitur, in quo arteriarum Mollis.
tunica mollis & lenis instar carnis mollioris
esse

esse sentiuntur. Causa mollis pulsus est humiditas arteriarum, quæ oritur à vita delicatioris genere, frequentibus balneis & somno immodico, & ab humidioribus morbis, veluti sunt hydrops & pituitosa defluxiones.

Moderatus.

Moderatus est qui inter durum & mollem medio modo sese habet, causam temperatam in siccitate & humiditate.

Amenfura temporis $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ sive elevationis Arteriarum oriuntur pulsus Celer, Tardus & Moderatus.

Pulsus celerioris causæ. Spiritus in corde unde incallescant.

Celer pulsus est in quo $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta$ seu dilatio Arteria brevi ac modico tempore perficitur. Causa ejus sunt, æstus spirituum vitalium & cordis refrigerationem ventilationemque exposcens. Incallescunt autem spiritus in corde, aut à calida intemperie, aut ab æris calida constitutione, à balneis vaporariis, aut à vino, aut à vehementi exercitio, aut ab ira, aut ab humorum putredine, velut in pedibus.

Tardus.

Tardus pulsus est, in quo arteria longiori tempore dilatationem suam absolvit. Causa tardi pulsus est cordis, spirituumque vitalium refrigeratio & facultatis vitalis imbecillitas, item durities arteria. Refrigerantur autem spiritus vitales, aut ab intemperie frigida, aut à morbis ex frigidis qualitativis & humoribus ortis.

Moderatus est qui nec ultra naturam convenientem modum celerior aut tardior existit, à temperie spirituum vitalium & caloris nativi efficitur.

A quantitate $\Delta\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ oriuntur pulsus Magnus, Parvus & Mediocris.

Causæ pulsus magni.

Magnus pulsus dicitur, ubi arteria in omnes dimensiones in longum, latum & profundum, motu suo se expandit. Fit magnus pulsus aut à virtutis vivificæ robore, aut à redundantia caloris nativi & fervore spirituum vitalium. Incallescunt autem spiritus in corde variis ex causis tum externis, tum internis, ut diximus in celeris pulsus explicatione.

Parvi.

Parvus pulsus contrarius magno, dicitur qui adeo est diminutus, ut nec in longitudinem nec latitudinem, nec profunditatem arteria se extendere sentiatur. Ejus causa sunt

virtutis vitalis imbecillitas, caloris nativi extinctio, & spirituum vitalium dissipatio. Ex iisdem causis oriri diximus languidum & tardum pulsus.

Mediocris pulsus inter magnum & parvum est, qui ex moderatione causarum magni ac parvi pulsus producitur.

Amenfura temporis $\sigma\upsilon\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ seu submissio- nis arteria oriuntur pulsus Creber, Rarus & Mediocris.

Creber sive frequens pulsus est, ubi breve temporis intervallum inter duos ictus sive elevationes arteriarum intercedit, vel quando breve tempus conceditur contractioni arteria. Causa crebri pulsus sunt eadem qua diximus esse celeris & magni pulsus, videlicet æstus cordis, & vitalium spirituum, refrigerationem postulantium, & vitalis facultatis robur.

Causæ pulsus frequentis.

Rarus pulsus est in quo diutius durat tempus contractionis arteria quam dilatationis. Causa rari pulsus est refrigeratio, sicut & Rari tardi.

Moderatus est qui aequalem servat proportionem inter crebritatem & raritatem.


A $\rho\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$ oriuntur duo pulsuum genera

$\epsilon\upsilon\epsilon\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$ & $\epsilon\chi\epsilon\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$.

Vocabulum $\rho\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$, quod concinnitatem seu consonantiam significat, à Medicis usurpatur pro dijudicatione pulsuum, & translatum est à Musicis concentibus. Est itaque $\rho\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$ apud Medicos, temporum quæ in pulsu sunt ad invicem proportio seu convenientia, & aequalitas temporis $\delta\iota\alpha\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ & temporis $\sigma\upsilon\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$. Quilibet enim motus, teste Aristotele, fit in tempore, quanquam Galenus $\rho\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$ ad motus qualitatem, id est celeritatem & tarditatem potius conferat quam ad tempus: Sed in idem coincidunt. Et celeritas enim & tarditas pulsus tempore metiuntur. Vbi itaque rythmus duorum temporum $\delta\iota\alpha\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ & $\sigma\upsilon\sigma\sigma\lambda\eta\varsigma$ pari & aequali proportionem constant, pulsus $\epsilon\upsilon\epsilon\upsilon\theta\mu\epsilon\iota$ dicitur, qui in sanis corporibus semper esse deprehenditur. Causa Eurhythmorum pulsuum sunt facultatis vitalis concinnitas, cordis temperies & caloris nativi moderatio, & mediocris arteriarum constitutio, adeoque totius corporis salus & temperies.


Causæ pulsus Eurhythmici.

Eurythmos.



"Ευρύθμος sive ἑυρύθμος est inconcinnitas & inaequalitas temporum dilatationis &

submissio arteria in pulsu, ut videre est in his Musicis notulis.



Causa pul-
sus inae-
qualis.

Causa ἰσχυρὸς sive inaequalitatis pulsus est aut virtus vitalis districta, aut intemperies aliqua cordis, aut contentorum in Arteriis vitiosa qualitas, veluti sunt sanguinis crassities principium arteriarum obstruens, aut spiritus fuliginosus, aut arteria compressione similibusque causis laesa. Inaequalium praecipuae species sunt Intercidens, deficiens, μύσγος, caprifans, διχότος, undosus, vermiculans, formicans, serratus, vibrans & tremens.

Deficien-
tis.

Deficiens pulsus inter inaequales primo loco numeratur, & est cum duorum aut plurium ictibus praetermissis iterum agitari incipit arteria, cuius causa est oppressio virtutis vitalis.

Intercidens finitima est deficiente. Estque cum οὐσολή, seu quies in pulsu longissime durat, in cuius durationis medio aliquando ictus supervacaneus intercidit. Fit quoque à vitalis facultatis resolutione, & est periculosus pulsus.

Myuri.

In quibus
pulsus
myurus.

Μύσγος, q. d. cauda muris, est cuius pulsus magnitudini continuè aliquid detrahatur in ictu, sicut fit in cauda foricis, quae clumibus usq. ad apicem sensim gracilescit: ita hic pulsus sensim imminuitur donec ad quietem recedat, ac tamen rursus priorem ordinem ac magnitudinem repetit. Myuri causa est virtutis vitalis sensim dissipatio. Contingit talis pulsus ut plurimum in tabescentibus.

Caprifans pulsus dicitur qui post dilatationis ictum, antequam in systolem desinat, celeriore prior alterum conficit ictum, instar caprae, quae inter saliendum antequam se in terram demittat, secundum saltum prior celeriore molitur: duplicatus ictus in uno

pulsu dici potest. Oritur ut plurimum ex caprifan-
lore putrescentium februm, & fuliginoso-
rum vaporum copia. tis causa.

Διχότος id est bis pulsans, διπλὸς δὲ καὶ διπλός, quod Graecis bis pulsare significat, est quando arteria bis dilatatur, antequam semel contrahatur, non secus ac malleolus ab incude resiliens. Oritur ab inaequali temperie cordis & duplicat. arteriarum, à spiritibusque fumosis in eis contentis.

Undosus pulsus est ubi arteria non universa simul dilatatur, sed primum ejus pars prima versus pollicem, secundo secunda, mox tertia & quarta motu manente continuo, instar fluctuantis aquae, ubi fluxus se per fluctum excipit. Oritur ex redundantia humiditatis in arteriis, à viribus vitalibus gravatis & arteriarum mollietie.

Vermiculans pulsus similis & verminum reptationi sive progressui. Oritur autem ubi Vermiculans. vitalis facultas ita est gravata, ut arterias dilatare vix queat. Est itaque signum dissipatorum spirituum vitalium; vermiculans pulsus non nisi diminuta magnitudine differt ab undoso.

Formicans est quando arteria vix elevari sentitur, sed instar formicae tantum moveri. Hic pulsus est omnium languidissimus, minimus & creberrimus. Ejus causa est extrema Formican-
dissolutio spirituum vitalium, mortem praecedens. tis.

Haec tres pulsum species, undosus, vermiculans & formicans ex iisdem causis proveniunt, & non nisi extensione & remissione motus differunt, & inter moriendum ut plu- Motien-
rimum

cium pul- *rimum undosus pulsus mutatur in vermicu-*
sus qualis. *lansē, & vermiculans transit in formicantem.*

Serrans sive serratus pulsus est ubi pars ar-
teria sub uno digito dilatari, sub alio verò se-
cundo & tertio minime dilatari percipitur,
nimirum propter duritiem & tensionem arte-
ria. Oritur enim ex duritie ac tensione ada-
uctoque calore. Serratus pulsus semper comes
est, ubi nervosa aliqua pars inflammatione
afficitur.

Serrati
pulsus cau-
sa.

Vibrans pulsus dicitur in quo alia partes
arteria sursum, alia deorsum instar jaculi eo-
dem tempore celerrimè feruntur. Cujus cau-
sa sunt, durities arteria, robur vitalis facul-
tatis, & sumosi caloris copia.

Vibrantis.

Tremens vel palpitans pulsus est, in quo
arteria ad cordis palpitacionem & tremorem
tremit ac palpitat, quancumque sapè usu ve-

An palpi-
tatio cor-
dis in arte-

niat, ut pulsante corde arteria non palpitans, riis perci-
& tremantibus arteriis cor nihil tale sen-
tiat.


Causa tremantis pulsus est vapor crassus Tremantis
& venenosus, in cordis thalamis aut ejus ca-
pula collectus, aut in ipsis arteriis sanguini
admixtus. Tremens pulsus cum cordis palpitacione in periculosis agitudinibus citam mor-
tem minatur. Postrema ac finis pulsuum est
ἀσφύγια, id est, pulsus abolitio, qua ipsa
mors est.

6. Quibus ex causis alteratur Arteria- rum pulsus?

Varia sunt causa, quibus naturalis & pro-
pria pulsuum constitutio cum in sanis, tum in
morbosis corporibus immutari consuevit,
quarum precipuas sequens complectitur Ta-
bella.

Causa pul-
sum im-
mutans.

Tabella causas immutationis pulsuum complectens.



Sunt & alia causa qua per accidens im-
mutant pulsuum, veluti sunt saturitas, lar-
gior vini potio, qualitates temporum anni,
exercitium, balnea, vehemens evacuatio,
Venus, somnus, &c. qua nos consilio prater-
imus.

Pulsus varietas ratione ætatis.

Puerorum pulsus magnus est, celer & cre-
ber, juvenum magnus & vehemens; senum
parvus, tardus, rarus & debilis.

Ratione Sexus.

Pulsus virorum sunt majores & vehe-
mentiores quam Fæminarum. Causa sunt,
quia viri sunt calidiores & sicciores fæminis.

Ratione intemperiei.

Temperati moderatum & ἐν μέτρῳ habent Naturalis
pulsuum. Calidiores autem magnum, celerem
& crebrum. Frigida autem corpora contra-
rium, parvum, tardum & rarium; sicca
vehementem & durum; humida parvum,
frequentem & undosum.

Ratione habituum corporis.

Gracilia corpora habent pulsus magnos,
vehementes & raros ac duros. Sine enim im-
pedimento distenditur arteria. Obesa autem
& pingua qua semper sunt frigidiora, ha-
bent pulsuum parvum, languidum & mollem.

Ratione perturbationum Animi.

Ira facit pulsuum magnum, celerem & ve-
hementem.

Amotis
pulsus.

hementem, latitia efficit pulsum moderatum ad magnitudinem & raritatem declinantem. Tristitia pulsus est parvus, rarus & languidus. Pavoris est celer & inaequalis. Amor efficit inaequales & inordinatos pulsus, id est, jam parvos, jam magnos, nunc rursus crebros, nunc tardos, nunc vehementes, nunc languidos. Constat enim Amor ex contrariis affectibus, tristitia & gaudio atque sollicitudine; hinc Ovid.

Res est solliciti plena timoris Amor.

Facile itaque oculis flamma amoris ex pulsu deprehenduntur, si quis pulsum contingat, & adamatam amicam homini vel monstret vel mentionem ejus faciat.

Facinorosi
per pulsum
cognos-
cendi.

Ita & facinoris alicujus autores ex mutatione pulsus cognoscere licebit, si ex insperato subiecti hominis arteria contrectentur, facinorisque mentio fiat. Si enim sibi conscius est, pulsus in naturali & priori constitutione statim mutatur, & inaequalis & inordinatus redditur.

Ratione Morborum & Symptomatum.

Quemadmodum infinita fuerunt causarum morbificarum, morborum & symptomatum species, ita & pulsum magna est multitudo; periculosiorum autem morborum pulsus recensere, ad quos reliqui omnes collati sine magno labore dignosci & deprehendi possunt.

7. Quales sunt periculosiorum morborum Pulsus?

Dolor ve-
hemens
qualem
faciat
pulsus.

Dolor vehemens in principio facit magnum, vehementem & celerem pulsum, in processu vero parvum, languidum & celerem, at si diutius duret & vires prosternat, efficit parvum, tardum, languidum, & postremo in formicantem desinit.

Inflam-
mationis
pulsus.

Φλεγμὴν seu inflammatio seu inflammatus tumor, efficit pulsum vehementem, magnum & crebrum, ac deinde serrantem ac vibrantem: E contra omnis refrigeratio inducit pulsum parvum, languidum & tardum.

Pleuriti-
dis.

Πleurητικὸς pulsus est durus, celer & serratus.

Empye-
maticus.

Εμπυρεμικὸς, id est suppurationis pulsus est inaequalis, tardus, rarus & languidus.

Marasmi id est ariditatis ex frigida causa, Marasmi parvus, rarus, languidus: Ex caliditate vero parvus, celer, languidus.

Φθίσις, parvus, creber, languidus & hecticus, id est, in eadem forma perseverans.

Πεπρωδὸς pulsus, magnus, celer, creber & saepe intermittens.

Peripneu-
monia.

Lethargicorum magnus, tardus ac rarus.

Morbo-
rum capi-
tis.

Phrenitidis, parvus, creber, celer & tremens.

In apo-
plexia ta-
men ali-
quando

Spasmi siue convulsionis, vibrans & durus.

magnus
est pulsus
ubi pletho-
ria est
corpus.

Paralyseos, parvus, tardus & languidus.

Epilepsia, parvus, tardus, languidus.

Apoplexia, parvus, tardus, languidus.

Angina, durus, celer, & serrans.

Orthopnea, languidus, creber, & deficiens.

Vteri suffocationis, parvus, tardus & rarus, quandoque & ἀσφυκία adest.

In suffoca-
tis ab ute-
ro plane

Hydropicorum pulsus, praesertim ejus speciei, qua Anasarca vocatur, mollis & undosus: Ascites autem est parvus, creber & durus.

interdum
ad sensum
intermittit.

Morbi Gallici pulsus est parvus, tardus & languidus.

Hydro-
pis.

Reliquorum morborum & symptomatum pulsus pro causarum varietate ex collatione eorum qui jam sunt recitati facile dignosci possunt.

Luis Vene-
rea.

8. Partium principalium ac praecipuarum affectarum quales sunt pulsus?

Hic primum est observandum, pulsum totius corporis non immutari ex parte affecta priusquam cordi communicetur lesa partis affectio. Cor autem cum sit principalissimum organum pulsus, ejus affectio omnium primum ex pulsu deprehenditur. Cordis itaque substantia inaequali intemperie affecta, efficit pulsum inaequalem, δνροτον. Sed plus justo cor refrigeratum efficit pulsum parvum, rarus & languidus: similiter si contentus in corde spiritus aut sanguis refrigeratus sit, edit pulsum parvum, rarus & tardum.

Quando
demum in

morbis
pulsus im-
mutetur.

Cordis
primario
affectu

pulsus.

Cordis autem substantia plus justo recalcata, pulsum efficit parvum, crebrum, celerem & languidum. Spiritus vero vitalis aut sanguis in corde contentus astuans, efficit

cit

Febrium
pulsus.

cit magnos, celeres & crebros pulsus. Cor sic-
cum edit duros, & magnos pulsus: Humidum
vero molles & tremantes. Cum autem febres
sint affectiones cordis, omnis febris putrida in
paroxysmo pulsus reddit magnum, celerem
& crebrum.

Pulmonis
affecti.

Pulmo recalescens efficit pulsus ma-
gnum, celerem & crebrum, refrigeratus ve-
ro producit parvum, tardum ac rarum, exic-
catus duros, humectatus autem molles.

Pleuræ.
Epatis.

Tunica costas succingens affecta perpetuo
densos facit & duros pulsus. Epar Phlegmo-
ne laborans magnos & duros efficit pulsus, si-
militer & in Scyrrho epatis & lienis pulsus
sunt duri & convulsi.

Ventricu-
li.

Stomachi tumor magnos & duros edit
pulsus.

Vteri.

Vterus intumescens magnos & molles effi-
cit pulsus.

Cerebri.

Cerebri calida intemperies magnos & cre-
bros edit pulsus, frigida parvos & raros,
humida molles ac tardos, sicca duros &
crebros.

Reliquarum partium affectuum pulsus ex
precedentibus æstimare licet.

9. Quæ sunt pulsuum generales signifi- cationes?

Pulsus
signifi-
cationes in
sanis & æ-
gris.

Magnus pulsus robur vitalis facultatis si-
gnificat in sanis corporibus, & caloris nativi
ac spirituum vitalium copiam.

In agrotis autem ostendit ignei & præter-
naturalis caloris redundantiam.

Parvus pulsus in sanis facultatis vitalis
imbecillitatem, caloris & spirituum vitalium
inopiam, & corporis crassitiem demonstrat.
In morbis autem agritudinem ex frigidityte
ortam, præsertim si adsit simul raritas &
tarditas.

Celer pulsus in sanis caloris nativi redun-
dantiam, facultatis vitalis robur, & spiri-
tum tenuitatem; in agrotis vero morbum
ex causa calida ortum ostendit. Celer pulsus
plerumque adjunctus est magno pulsui.

Tardus pulsus plurimum comes est parvo,
& significat in sanis imbecillitatem virtutis
vitalis spirituumque vitalium & caloris na-
tivi diminutionem. In morbis si tardus pul-

sus simul sit & languidus, virium prostratio-
nem & morbos frigidos ostendit.

Creber pulsus in corporibus sanis caloris
nativi redundantiam: in agrotis vero mor-
bos calidos & redundantiam fuliginosorum
vaporum demonstrat.

Rarus, contrarius crebro, in sanis frigidam
corporis intemperiem, in agrotis morbos ex
frigida causa ortos ostendit. Raro pulsui si si-
mul adsint parvitas & tarditas, est pernicio-
sus. Significat enim ingentem cordis refrige-
rationem & caloris nativi dissipationem. Ta-
lis plerumque deprehenditur esse morientium
pulsus.

Vehemens pulsus in bene valentibus robur
vitalis facultatis significat, & in agrotis spem
sanitatis pollicetur.

Languidus debilitatem & resolutionem
virium demonstrat, & perpetuo est suspectus.

Mollis pulsus in sanis corporibus humorum
redundantiam & arteriarum humectatio-
nem, in agritudinibus vero ostendit morbum
ex humiditate ortum. Molles pulsus in hydro-
pe sunt & œdemate viscerum &c.

Durus pulsus in sanis duritiem arteriarum,
ex laboribus aut gracilitate corporis, in agro-
tis vero morbos siccos significat, qua siccitas
semper est comes aut congelationis aut intem-
periei calida: fit & durus pulsus in humori-
bus calidis.

Ex enumeratorum pulsuum generibus in Pulsus pe-
morbis periculosiores significationes habent, riculario-
res.
primum languidus, deinde tardus, post hunc
rarus, & postremo durus, id est qui ex in-
flammatione est ortus.

10. Quæ sunt significationes inæqualium secundum Rythmos?

Æquos pulsus ex caloris nativi tempe-
rie, æquos vero ex ignei & fumosi caloris
redundantia excitatur, & perpetuo morbum
significat.

In Rythmo autem pulsuum, celer systole si-
ve contractio, & tarda diastole, id est dissen-
sio, significat caloris nativi diminutionem
sed ignei augmentum & fumosorum vapo-
rum copiam; è contra tarda contractio &
celer dissenso nativi caloris copiam, & ignei
vaporumque fuliginosorum paucitatem de-
cla-

clarat, & regulariter celer diffensio robur caloris nativi, & celer contractio redundantiam ignei caloris & fuliginosorum vaporum ex humorum putredine ortum commonstrat; tarda diffensio naturalis caloris perfrigerationem, tarda vero contractio ignei & fuliginosi caloris frigiditatem significat & diminutionem.

Inæqualis
pulsus si-
gnificatio-
nes.

Omnis pulsus ex quibus & inæqualis morbum significat, aut ex obstructione Arteriarum, aut ex vitiosa aliqua qualitate contentorum in Arteriis spiritus & sanguinis, aut virtutis vitalis gravitatem & molestiam.

Ex inæqualibus pulsibus prædictos, id est diminutus & sensim ingravescentis pulsus, virtutis vitalis sensibilem diminutionem & labescentiam significat. Talis est in hecticis & tabescentibus.

Intermit-
tentis.

Intermittens pulsus majorem adhuc quam prædictos, & deficiens majorem quam intermittens virtutis vitalis prostrationem significat. Intermittens pulsus si duorum pulsum temporum intermittendo transeat, est exitiale signum, præsentem enim mortem denunciat.

Deficiens pulsus & ipse est exitialis. Vires enim vitales à morbo superatas arguit.

Interce-
dents.

Intercurrens sive intercedens copiam humorum vitiosorum aut vaporum fuliginosorum in Arteriis vel cordis cavitatibus ostendit, quos naturam expellere conatur; ubi nondum sunt vires lapsæ, salutare est signum.

Caprisan-
tis.

Caprisans fuliginosos vapores redundare, eosque naturam dissipare ostendit, ceteris paribus caprisans pulsus est salutare signum.

Dicroti.

Διχοτος, id est bis pulsans cordis inæqualis temperiem & fuliginosorum putridorumque vaporum conferentium copiam monstrat.

Vndosi.

Vndosus pulsus nimia humiditate gravare virtutem vitalem significat; si undosus pulsus alteretur post sudorem, salutis spem promittit; si vero mutetur in vermiculantem, est signum perniciosum.

Vermicu-
lans quid
enotet.

Vermiculans pulsus virtutum vitalium prostrationem & dissipationem spirituum declarat. Hic pulsus præter alias causas, vehementes cujuscunque generis evacuationes, ut alvi profusum, aut sanguinis è naribus eruptionem plerumque comitatur.

Formicans periculosior est vermiculante & Formicans. omnibus pulsum inæqualium generibus. Extremam enim virtutis dissipationem ostendit, & certissimus est significator mortis, nisi accidat in deliquio animi ex repentinis causis, quod emendari potest.

Serrans pulsus in laboriosis agnitudinibus Serrans. est signum perniciosum. Inflammationes enim & tumores viscerum ostendit.

Vibrans pulsus in sanis corporibus non est Vibrans. adeo perniciosus, sed tamen agnitudines futuras ostendit. In magnis autem inflammationibus & tenacioribus obstructionibus naturam cum morbo dubio Marte decertare significat.

Tremens pulsus futura syncope est nuncius, Tremens. & si perseveret, mortis certissimus index, Quomodo cordis motus paulatim deficiat. morte imminente cor paulatim viribus vitalibus destituitur & primum conus cordis, deinde media ejus pars, ac tandem basis cordis à motu conquiescit solis articulis sese distendentibus, quarum ultima diffensio est interitus vita.

Terminus pulsum omnium æquæque ipsa mors est.

SECTIO III.

De

SIGNIFICATIONIBUS URINARUM.

Omnia ferè agnitudinum genera oriuntur in corporibus aut ex aliqua intemperie aut ex corruptela humorum. Intemperies autem omnis aut vitiosa qualitas hæret, & quasi in proprio subiecto insidet, aut in spiritibus, aut in solidis partibus.

Morbi itaque qui ex corruptela humorum Quinam morbi ex urina cognoscantur. originem habent, ex urinarum constitutione exactius cognoscuntur.

2. Pulsuum an urinarum significationes de morbis sunt certiores?

Ut generalior & universalior, ita longè Vrinarum certior est urinarum quam pulsum signifi- significatio. Pulsus enim Arteriarum de cordis intemperie & vitalium spirituum constitutione tantum indicium præbet, & insuper pulsum, in

in uno genere morbi sapissimè & levibus occasionibus immutatur; ac urina cum de toto corpore immediatè à sanguine decedat, de omnibus totius corporis, & omnium partium sanguine præditarum morbis illustria exhibet indicia. Quasunque enim partes corporis urina attingit, (attingit autem omnes eas quæ venas habent & sanguine nutriuntur) earum omnium affectiones, intemperiem & vitiosas constitutiones unà cum humoris in sanguinea massa redundantis qualitate luculentissimè ostendit, neque ut pulsus, in eodem morbo mutatur, nisi cum nutritione morbi; unde constat significationes urinarum certiores & universales esse quam pulsum.

2. Ex urina constitutione possuntne omnium partium affectiones aqualiter dignosci?

Quarum affectionum urina indicium præbeat. Omnium quidem partium venosarum affectiones ex urina constitutione dignosci possunt, verum non aquè manifestè, sed aliarum partium exactius, aliarum obscurius. Omnino enim manifesta & certissima indicia in urina deprehenduntur concoctionis & crudittatis in ventriculo, Epate, in venis majoribus; item manifestum quoque indicium præbet urina, quis humorum in sanguinea massa redundet; postea ostendit luculentissimè affectiones Epatis, Lienis, Renum & vesicæ, & partium venosarum omnium: sed obscurius ostendit morbos cerebri, cordis, pulmonis, artuum & extremarum partium: nimirum, quia excrementa earum partium non per venas, cum seroso sanguine ad renes deferuntur, sed per alias vias, veluti per naves respirando, per asperam arteriam tussiendo, per palatum exscreando, per poros cutis evaporando ac persudando propelluntur.

Febris pestilentialis ex urina non lijudicatur. In febris materiam febris urina manifestè ostendit, sed qualitas febris ex pulsus dignoscenda est. Verum in febris pestilentialibus fallacissimum est indicium ex urina sumptum. Vt plurimum enim in peste inculcata apparet & sana similis urina, eo quod materia pestis non in sanguine, cuius excrementum est urina, sed in spiritu vitali consistit.

3. Quid est Urina?

Urina. Οὐρῆς sive ὕδατος ἐστὶν ἀέριον, ἢ δια-

χρῆμα ὑγρὸν, id est, urina est excrementum sive superfluitas excrementi humida usus.

Vel aquosa, ex potu & humiditate alimentorum in secunda concoctione nata, alterata & segregata, ut sit ὀκρῆμα τρωχὺς, id est vehiculunt alimentis sive sanguinis defecati, & serviat ἀναδοσὶ, id est distributioni sanguinis per totum corpus, quæ tandem virtute renum per venas emulgentes attrahitur & per ureteres in vesicam percolata pro voluntatis arbitrio excernitur.

Fernelius brevius ita definit, Urina est serum vehiculumque sanguinis, renum viscretum. Variæ definitiones urinae.

Adhuc succinctius Galenus lib. 3. Epidem. Urina est serum humorum in venis contentorum. Hic definitionibus non discrepat ea quam Isaac quidem, qui dicit urinam esse colamentum sanguinis, & ceterorum humorum naturalibus actionibus concoctum & separatione natum.

4. Quæ sunt causæ urinae, & quomodo generatur?

In priori definitione genus est excrementum humidum seu humor excrementitius, de quo supra in doctrina de humoribus dictum est.

Causa Materialis Urina est potus & alimentorum humiditas. Materia urinae.

Efficiens causa est calor natus Epatis, qui in secunda concoctione secernit aquosam superfluitatem.

Instrumentales causæ sunt Epas, Renes & Vena.

Formalis est aquositas sanguinis.

Finalis vero est ut sit vehiculum sanguinis, serviatque distributioni per universum corpus & penetrationi ejus per angustias venarum.

Generatur autem Urina hoc modo: In nutritione secunda Concoctio in Epate, quæ ἀέριωσις id est sanguificatio dicitur, ubi alimentum in sanguineam massam convertitur primum, deinde purificatur, & aquea quidem sanguinis pars bifariam dividitur; sero-

sior enim & crassior ad Renes attrahitur, tenuior autem & aquosior purificato sanguini commiscetur & unà cum sanguine in totum corpus. Hinc apparet urinam esse excrementum

& tertia
conco-
ctionis.

corpus distribuitur; & sit sanguinis propter tenuitatem quasi vehiculum, quæ ubi perfecta est suo officio, per sudorem excernitur, aut novo effluente alimento per compressionem rursum in venam cavam repellitur, ac inde per venas emulgentes à renibus attrahitur, ex quibus rursum per ureteres in vesicam sensim destillat, à cuius aut copia aut acrimonia si vesica molestetur, per colem à natura expellitur, non tamen sine voluntatis arbitrio.

Quare u-
rina præ-
beat uni-
versale in-
dicium af-
fectionum
morbofa-
rum.
Tria indi-
cat urina.

Non enim è jecinore tantum per renes urina defluit, sed ex omnibus venis totius corporis; & hinc est quod urina universale indicium præbeat, primo concoctionis & cruditatis, idque scitu pernecessarium est; quia proba concoctio alimenti seu sanguinis est fundamentum sanitatis, sicut è contra cruditas est metropolis infinitorum morborum. Ostendit præterea urina quis humorum in massa sanguinea excellat aut redundet. Tercio monstrat quoque omnium partium quas urina attingit (attingit autem omnes, quæ sanguine nutriuntur) qualitates & affectiones; Quod autem ex omnibus venis urina in vesicam derivetur, sensu deprehendi potest, si quis per biduum parum aut nihil biberit. Verum est itaque distichon Ægidii:

Ut de lacte serum se lymphidus eliquat
humor;

Sic liquor urinæ de massa sanguinis
exit.

5. In excipiendo & colligendo Lotio, ex quo iudicium ferre volumus, quæ sunt observanda?

Regulæ in
excipien-
do lotio
observan-
dæ.

Octo Regula siue conditiones circa urina collectionem, ex qua morbi, causæque & earum differentia prædici debent, sunt observanda.

I. Tota urina simul est excipienda, & quidem à somno, ubi perfecta est alimenti concoctio, quod matutino tempore fieri consuevit.

II. Prospiciendum est sedulo, ut matula, in quam urina excipitur, sit munda & tersa, ex vitro albo & pellucido constata, figuram vesica oblongam & rotundam referens.

III. Matula in qua est excepta urina,

studiosè est cooperiendâ, & in tepido loco collocanda, ad quem nec aëris frigiditas, nec ventorum flatus, nec radii solares pertingere queant.

IV. Quo commodius in urina contenta siue natantia ab invicem separari & faculentiora subsidere queant, per unam aut alteram horam non est commovenda, nec ultra sex horas urina contemplatio est differenda.

V. Si urina intra præscriptum tempus vel ab infusa qualitate, vel ab externa aliqua occasione conturbetur, corrumpaturque; matula cum urina in aquam moderatè calidam est imponenda, eo usque donec propriam formam & constitutionem recipiat.

VI. Inspicienda est urina in loco claro & perspicuo, qui nec obscuritate nec nimio splendore visum decipiat.

VII. Cavendum est ne urina excipiat, aut post vini meracioris ingurgitationem, aut post esum croci, aut post assumptionem pharmacorum, imprimis rhubarbari vel cassia. Mutant enim hæc & alterant, tum colorem, tum substantiam urina, & fallax reddunt iudicium.

VIII. Medicus urinam contemplaturus ex opposita parte matula opponat palmam manus per spatium latitudinis palma, ut aëris radii lucidi in umbra manus colligantur, & in matula, tanquam in speculo collecti exactius contenta in urinis ostendant.

Urina ad iudicandum excepta in quot regiones est dividenda?

Quemadmodum universum corpus humanum supra in tertia divisione partium, in tres magnas capacitates est divisum, in caput, thoracem & infimum ventrem: ita tota urina in matula contenta, in tres regiones, tribus illis corporis capacitatibus respondentes, videlicet in superficiem, quæ sumpto vocabulo ex meteorologicis ὑψίον, id est nubes appellatur, ex cuius constitutione affectiones cerebri deprehenduntur: In mediam regionem, quæ ἐν μέσῳ, i. e. sublime seu suspensum nominatur, cuius constitutio ut plurimum partium in thorace contentarum vitia commonstrat. In fundum siue infimam regionem, δῶνις, id est subsidientia siue sedimentum.


Urinæ tres
regiones.

ὑψίον,
nubecula.

ἐν μέσῳ,
suspensum.

δῶνις,
sedimen-
tum.

mentum vocatur, ex cuius consistentia & forma, morbi partium nutritionis servientium in infimo ventre contentarum ostenduntur. Ha tres urinae regiones in sequenti pictura proponuntur.



vesicula,
cisterna,
pelvis.

7. In urina excepta sive collecta quæ qualitates sunt considerandæ?

In contemplatione urinae quinque qualitates sive adnexa seu perpetua accidentia studiose sunt consideranda, quæ in sequenti tabella proponuntur.

Tabella urinarum qualitates & perpetuo adherentia complectens.

In urina consideranda	Xύματος liquor an sit	Moderatus,
		Tenuis,
		Crassus,
		Turbidus,
		Perस्पicuus,
Color,	aut ex his intermedius.	Clarus,
		Obscurus.
		Rubeus,
		Aureus,
Odor,		Albus,
		Niger.
		Carens odore,
		Suavis,
Quantitas,		Moderatus,
		Fœtidus.
		Moderata,
		Multa,
Contenta si-		Pauca.
		Corona,
		Spuma,
		Bulla,
da ve-		Granula,

niunt

ve liquor
admixta,
veluti
sunt

Pinguedo,*
Atomi,
Pili,
Squamula,
Furfures,
Filamenta,
Semen,
Sanguis,
Pus,
Caruncula,
περὶ τοῦ
Cinis,
Arenula,
Vermes.

De horum omnium causis, differentiis & significationibus sigillatim ordine pro compendii ratione fideliter docebimus.

8. Χύματος urinae quid, quæ ejus differentia, causæ & significationes generales?

Χύματος seu substantia urinae est totus liquor seu aqua materia in matula contenta, in qua tanquam in subiecto harent & conspiciuntur reliqua urinae qualitates & accidentia, videlicet color, odor, quantitas, contenta seu immanantia. In χύματι sive substantia urinae spectanda imprimis sunt secundae qualitates, ex quibus quinque sumuntur liquoris differentia, ita ut urina dicatur aut tenuis, aut crassa, aut perspicua, aut turbida, aut inter has mediocris & moderata. Primo itaque intuitu prudenti judicio discernenda est, utrum urina liquor sit tenuis, crassus, perspicuus, turbidus aut moderatus, quarum qualitarum causa & significationes haec sunt.

9. Tenuium urinarum significationes & causæ quæ?

Tenuis urina perpetuo hisce coloribus est imbuta, albo, spiceo, aureo, croceo & rubro. In reliquis enim coloribus urina nunquam apparet tenuis. Tenuis fit urina vel à caloris nativi inopia, aut ab obstructione meatuum, & perpetuo cruditatis est indicium. Omnis enim tenuis urina cruda est, & omnis cruda tenuis. Gradus autem cruditatis à presenti colore dignoscere licet. Urina enim

Tenuem quid reddat urinam. Quid denotet urinam tenuis.

Cruditatis indicium. *nim tenuis & instar aqua lympha alba, extremam significat cruditatem; paulo minorem spicua; & adhuc minorem cruditatem,*

Ingurgitationis.

si tenuis urina aureo & subrubro colore sit tincta. Aquea, tenuisque conspicitur urina, inter belluandum & potandum projecta. Tenuis sit urina & ex viscerum videlicet Epatis,

Obstructionis viscerum.

Lienis, Renum & ureterum obstructionibus, qua nihil crassi praterlabi sinunt. Qua autem harum partium obstructa sit, à loci affecti dolore dignoscitur. Si enim dolor sentitur sub dextra hypochondrio Epar, si sub sinistro Lien, si circa vertebrae lumbi Renes esse obstructos significat. Qui diuturno morbo exhausti sunt, aut qui fascinati tabescunt, eorum urina perpetuo tenuis conspicitur cum

Contabescenz.

spiceo aut aureo colore. Urina tenuis & paulo post in matula turbata, significat aut turbam concoctionem prostratque caloris nativi inopiam, aut flatuosos spiritus in Renibus contentos, qui cum urina projecti eam agitando conturbant, veluti fieri cernimus in musto fervere incipiente; aut (quod etiam in sanorum urinis contingit) turbatur urina tenuis ab externo frigore calorem nativum in urina extinguente, ut nequeat fieri separatio contentorum, quod in loco tepido nunquam contingit.

10. Crassarum urinarum significationes & causæ quæ?

Crassa urina.

Crassa urina tenui opponitur. Dicitur enim crassa, qua corpulenta & densa est; si ve ea sit perspicua, veluti sunt vina & cerevisia crassa; si ve sint obscura, veluti oleum & pinguedo liquida.

Differentia inter crassum & turbidum.

Sæpe autem confunduntur à Medicis crassi & turbidi vocabula, qua sic in hoc discernuntur, quod crassa urina undique sibi similis est, & quandoque subobscura, veluti oleum & albumen ovi: Turbida semper est obscura. Ita ejus contenta si ve innatantia visu discerni nequeunt, sed confusa sunt per totam liquoris substantiam, ut paulo post de turbidis urinis declarabimus. Crassa urina omnibus coloribus imbuatur, tum qui ad albedinem, tum qui ad nigredinem tendunt. Crassa redditur urina ex crudorum humorum in ve-

Crassitie urinae causæ.

nis & meatibus contentorum copia, aut crassescit propter laxitatem meatuum, & imbecillitatem retentiva facultatis in visceribus, aut ubi calor nativus non sufficit, ut copiam crudorum humorum concoquat. Crassa namque urina perpetuo cruditatem significat, non quidem ut tenuis ex imbecillitate caloris ortam, sed ex redundantia crudorum humorum gravante calorem nativum generatam. Quis autem humorum in corpore redundet, ex colore crassitie adjuncto dignosci potest. Crassa enim & alba pituita, crassa & nigra atrabilis, crassa & flavida simul pituita & bilis flavida, crassa & rubea sanguinis adusti, crassa & viridis venenosorum humorum, crassa & foetida putrescentium humorum redundantiam significat. Crassa vero & instar olei lenta, qua oleaginosa nominatur, aut hecticam, phthisimque aut hydropem significat. Reliqua qua ad declarationem crassa urina pertinent, in explicatione turbida urina commemorabuntur.

Crassa urina qualem denotet cruditatem.

Oleaginosa.

11. Perspicuæ splendentisque urinae significationes & causæ quæ?

Perspicuam & claram urinam vocamus, cujus substantiam visus nostri acies facile penetrat. Perspicua urina plerumque sub iis coloribus, albo, aureo & rubro conspicitur. Causa urinam perspicuam reddentes, & ex ea significationes, per adjunctum coloremprehenduntur. Perspicua enim & instar aqua alba urina, oritur aut in calculo, aut ex obstructione meatuum urina, aut ex prostratione caloris nativi, & ea quidem aut cruditatem ostendit, aut in acutis febribus delirium. Totam enim bilem qua tingere debeat urinam ad cerebrum delatam esse ostendit. Perspicua urina & rubea ex igneo & prater naturali calore oritur, & febrem sanguineam demonstrat. Clara autem & perspicua cum aureo colore, & nativi coloris ubertate & benignitate generatur, estque omnium saluberrima. Significat enim exactam & integram concoctionem humorumque omnium mediocritatem & bonitatem. In tali urina semper remanet vis caloris nativi, qua in matula dicitur discernitur.

Perspicua & instar aquæ alba.

Perspicua & rubea.

Clara & aurea saluberrima.

12. Tur-

12. Turbidarum urinarum causæ & significationes quæ?

Turbida.

Turbida seu obscura & confusa urina dicitur, per cuius medium visus noster non penetrat, & cognata est crassa urina. Ex iisdem enim causis ferè oriuntur & easdem ferè habent significationes.

Vnde urina reddatur turbida.

Turbatur autem urina aut à violentia externi frigoris, quæ in aqua tepida collocata in pristinam reddit formam: aut ab exulceratione renum, ureterum & cervicis vesicæ: aut à laxitate meatuum urina, nequeuntis retinere humores crudos: aut à copia crudorum humorum irrudente in renes.

1. A frigore externo.

Urina quæ à frigore externo turbatur, est densa & obscura, quæ lentore albo matulam inficit, quæ cisi aqua caliditate restaurari queat, tamen ut plurimum est fallacis significationis.

2. Ex puris commixtione.

Urina vero quæ ex puris commixtione turbida facta est, in ea multa cernuntur corpuscula, sordes, sanies & pus, quæ quiete paulo post in fundo matula subsident cum hypostasi crassa. Reliqua autem urina quodammodo clavior redditur, veluti contingit in vinis & cerevisiis faculentioribus. Talis urina per calorem aquæ pristinam formam non recipit. Perpetuo itaque huiusmodi urina significat renum aut vesicæ exulcerationem, quod & dolor earum partium testabitur, cui plerumque & foetor accedit.

3. Ex crudorum humorum permixtione.

Urina à crudorum humorum in venis aut visceribus contentorum redundantium permixtione conturbata, nec ipsa calore aquæ resoluitur, & significat innati caloris à crudis humoribus oppressionem, quo minus eos conficere queat, etiamsi maxime adnitatur, unde & diuturnitas morbi & contumacia deprehenditur. Quis autem humorum in corpore redundet, ostendit color turbiditati adjunctus.

4. Similis equina.

Urina turbida si simul sit lenta & crassa, qualis est vaccina aut equina, capitis dolorem demonstrat, teste Hippocrate, qui inquit; Quibus urina turbida, qualis jumentorum,

iis capitis dolor vel adest, vel aderit.

Turbida urina in febrium diebus criticis facta, aut in tumoribus abscessibusque viscerum, in morbis lienis aut epatis, morbi solutionem & spem sanitatis pollicetur. Apertionem enim meatuum & copiosam eruptionem humoris peccantis monstrat.

Turbida urina & per totum confusa ac febricitans, humorum in venis contentorum putrefactionem ac confusionem monstrat, & semper est maligna.

Porro urina turbida aut mingitur turbida & crassa permanet turbida: aut projicitur turbida, & post quietem subsidet, ejusque liquor inclarescit. Quæ itaque turbida mingitur & permanet turbida, copiam humorum opprimentium calorem nativum, ut dictum est, ostendit: quæ autem turbida projicitur & postea subsidet, flatulentos & adulterinos spiritus, quorum reliquia profuxerunt cum urina, quæ crudos humores agitant, demonstrat. Alias quæ turbida mingitur, & tandem subsidet, ostendit conatum & robur nativi caloris, qui & concoctionem & separationem humorum crudorum, sed imperfectam est aggressus, & morbum brevi solutum iri ostendit.

13. Moderata seu Mediocris urinæ substantia qualis, quæ ejus causæ & significationes?

Mediocris dicitur urina substantia, quæ neque est præter modum tenuis ut aqua, neque crassa ut oleum, nec turbida ut mustum, nec splendida & rutilans ut flamma, sed vincti Rhenani veteris consistentiam repræsentat. Moderata autem urina substantia sub his tribus tantum coloribus conspicitur, subaureo, aureo & citrino. Talis substantia urina produciitur ex nativi caloris robore & copia, & humorum in corpore iusta proportionem, & significat exquisitas concoctiones, tum ventriculi, tum jecinis, & venarum, humorum benignitatem, & totius corporis salubritatem.

In diebus criticis salutaris.

Febricitans.

Turbida permanens quid denotet. Turbida mox subsidens.

Moderata urina subaurea saluberrima.

DE COLORIBUS
URINÆ.14. Circa colores urinarum quæ sunt
observanda?

Circa colores urinarum { Causa,
tria sunt consideran- { Differentia,
da, { Significationes.

Quæ & quot sunt causæ colorum, & quas
singulæ produciunt colorum differen-
tias, quæve generales eorum
significationes?

Color in urinis est visibilis qualitas & per-
petuum accidens; Vt enim nulla corporea sub-
stantia, ita nulla urina sine colore conspici po-
test. Fernelius duas tantum effectrices colo-
rum causas in urinis constituit, calorem scili-
cet corporis, humorum affluentium permi-
xtionem: sed nos clarioris doctrina gratia,
eadem causas in septem ordines resolvemus.

7. Causæ
diverso-
rum in u-
rinis colo-
rum.

Sunt itaque causæ colorum in urinis: I. Na-
tivi caloris moderata temperies. II. Nativi
caloris per gradus remissio, & ad frigidam
intemperiem declinatio. III. Caloris Nativi
extinctio per frigidam intemperiem. IV. Na-
tivi Caloris extensio & per gradus in i-

gneum commutatio. V. Caloris Nativi per
adustionem absumptio. VI. Humoris alie-
ni cum urina permixtio. VII. Meatum ob-
structio.

I. Calor natus corporis & viscerum 1. Caloris
temperatus, qualis est in corporibus sanis, u-
rinam tingit colore aut Citrii mali aut aurei. 2. Caloris
Calor autem declinans ad temperiem frigi-
dam, vel deficiens plures habet gradus; sic-
uti & auctus extensusque & ad igneum de-
clinans, secundum quos gradus variis urinarum
inscit coloribus. Simili ratione & humores 2. Humo-
cum urina effluentes suo colore urinarum cin-
gunt. Obstructio autem meatum privat u-
rinam suis coloribus, & aqua tantum colo-
rem relinquit, veluti fit in liquoribus ex re-
bus coloratis chymica arte destillatis. Colo-
rum autem qui in urinis spectantur commu-
niores differentia & species sunt viginti, ad
quas omnes reliquis referri possunt. Inter eos
vero unus est medius & supremus saluber-
rimusque, Aureus videlicet; & duo extre-
mi, Albus & Niger. Reliqui omnes quotquot
sunt intermedii nominantur. Quæ autem
causarum prædictarum, quos efficiant & ge-
nerent in urina colores, & quæ singulorum
sint generales significationes, sequens tabella
completitur.

Tabella

Tabella Colorum in urinis,
Causas, differentias & significationes comprehendens.

CAUSÆ.

DIFFERENTIÆ.

Colores urinarum proveniunt vel ex	Caloris nativi	Moderatâ temperie,	Citrinus,	Similis	Citreis malis,	a
			Subaureus,		Auro Rhenano,	
		Aureus,	Auro Ungarico,		b	
		Flavus,	Ovi luteo deluto;			
		Refrigeratione per gradus,	Spiceus,		Spicis maturefcentibus;	c
			Charopus,		Pilis Leporinis;	
			Glaucus,		Cornu pellucido;	e
		Lacteus,	Lacti seroso;		f	
		Aqueus,	Aqua pura;			g
		Extinctione per frigiditatem,	Venetus,		Vvis nigris,	
Lividus,	Plumbo depicta macula,		i			
Croceus,	Croci floribus recentibus;	k				
Flammeus,	Candenti ferro;		l			
Intentione per gradus,	Rubeus,	Vino rubeo;		m		
	Rosaceus,	Rosis purpureis;	n			
Purpureus,	Epatis bovino;	o				
Passeus,	Cerasis subnigris;		p			
Extinctione per adustionem,	Oleaceus,	Olivarum fructibus;		q		
	Viridis,	Ærugini aut gramini;	r			
Niger,	Carboni extincto;					
Admissione humorum,	Unde tingitur colore	Sanguinis serosi,	Rubeo perspicuo;	f		
		Cruoris,	Rubeo turbido;			
		Sanguinis menstrui,	Passeo crasso;			
		Pituita,	Albo crasso;			
		Bilis flava,	Flavo perspicuo;			
		Bilis atra,	Nigro crasso;			
		Saniei sive puris,	Flavo crasso;			
		Seminis,	Glaucio;			
Obstructione meatuum, unde red- ditur vel	Similis	Aquea,	Aqua pura;	r		
		Lactea,	Serosi lactis;			

Reliquum hujus Tabulæ, quod ex adversum huic parti respondere debebat, vide paginâ subsequenti.

SIGNIFICATIONES.

- gnificat {
- a Caloris nativi temperiem perfectam & corporis salubritatem.
 - b Concoctionem perturbatam & pituita copiam.
 - c Concoctionis debilitatem à frigida intemperie.
 - d Dominium mucoſa pituita.
 - e Cruditatem inſignem à refrigeratione.
 - f Aut obſtructionem aut pituitam.
 - g Extremam cruditatem.
 - h Caloris nativi extinctionem à frigida intemperie.
 - i Bilis effuſionem, quandoque lèteritiam.
 - k Epatis inflammationem & febrim.
 - l Sanguinis ebullitionem & febrim.
 - m Rubra bilis cum ſanguine ebullitionem.
 - n Epatis inflammationem & rubra bilis effuſionem.
 - o Epatis obſtructionem, fervorem & lèteriam.
 - p Humorū confuſionem & totius corporis colliquationem & mortem.
 - q Caloris nativi aduſtionem & mortificationem.
 - r Vitalium ſpirituū extinctionem & mortem.
 - s Eorum humorū, quorum colorem reſerunt, copiam & effuſionem: & tum urina vel turbida ſimul eſt, vel copioſum habet ſedimentum.
 - t { Calculum; aut
Pituitam auctiorem.

15. Quænam ſunt obſervationes de urina nigra, crocea, purpurea & paſſea ſingulares?

Nigra quando lethalis. Nigra urina, quam præceſſit vitidis, extinctionem caloris nativi per aduſtionem; quam vero præceſſit livida vel veneta, per extremam refrigerationem ſignificat, & ſemper eſt lethalis.

Nigra interdum ſalubris. Urina nigra in morbis melancholicis lienis obſtructionibus & tumoribus, quartanaque febrī, ſi poſt alios colores inopinatè erumpat, & præſertim poſt criſin, ſalutem pollicetur; tum enim apertas eſſe obſtructiones, & naturam noxios humores expellere, & brevi morbum ſolvi ſignificat.

Urina crocea vel roſea quid. In Urina Crocea, Purpurea aut paſſa ſi linteolus tinctus inſiciatur colore croceo, lèteriam, roſaceo, ſanguinis ebullitionem; ſi ſanguineo, Epatis corruptionem ſignificat.

DE ODORIBUS.

16. Circa urinæ odores quæ ſunt ſpectanda, & quid ex iis prædicendum?

Ex odoribus urinarum, qui ſæpe, etiam nobis invitis nares feriunt, non contemnenda de morbis eorumque cauſis indicia ſumi poſſunt. In odoribus itaque urinarum, veluti de coloribus diximus, tria ſunt ſpectanda; I. Differentia. II. Cauſa. III. Significationes.

Differentia Odorum in urinis quatuor ſunt: Differentia enim urina aut eſt inodora, id eſt, carent odorē, aut modorata olet, aut ſuaviter refolet, aut eſt fœtida.

Urina odore carens oritur ex frigidityte, Inodora & ſignificat inſignem refrigerationem Epatis & Renum, & concoctionis fruſtrationem, unde ſemper urina inodora alba eſt colore & ſubobſcura.

Moderatè olens urina, id eſt, qua nec ſuaviter ſpirat, nec tetrum odorem præſe fert, & co-

Et colore est aurea, corporis exactam salubritatem monstrat.

Suavis odoris urinæ non fit nisi à commestione aromatum rerumque odoratarum, quales sunt gariophylli, radix angelica, moscus, terrebinthina, &c.

Verum neque ex iis rebus contingit fragrans urina nisi in sanis corporibus: qui enim corpora habent foetidis humoribus repleta, et etiam res odoratas assumentes emingunt tamen urinam foetidam.

Fœtida in sanis. Fœtida redditur urina in sanis quidem corporibus ex rerum foetidarum commestione, veluti sunt Allium, Castoreum Bebergeil / Asa foetida.

Fœtida in ægris putredinem humorum arguit. Corruptio nem viscerum. Vlcus in meatibus. In corporibus autem morbo sis fœtida urina aut ostendit copiam putridorum humorum, & tum urina est rubra, crassa & turbida, qualis est in febris putridis: aut significat corruptionem alicuius interni visceris, ut Epatis, Lienis & Renum, & tum urina est tenuis cum crassa & turbida aut ostendit ulcus in renibus aut pudendo, & tum simul crassa & alba est urina cum purulento sedimento.

Fœtida urina in die critica id est pugna naturæ & morbi, si copiose projiciatur, naturæ victoriam adversus morbum ostendit & statim agro succedit levamen.

DE QUANTITATIBUS URINÆ.

17. Circa mensuram seu quantitatem urinæ quæ sunt observanda, & quid ex iis prædicendum?

Diligenter animadvertendum est in emissa urina, utrum ejus quantitas sit Mediocris, Multa, aut Pauca, & quæ sint earum quantitatum causa & significationes. Urina quantitate seu mensura Mediocris dicitur, quæ proportionem respondet iis quæ ebibita sunt. Regulare enim est, ut qui multum biberint, & humidioribus usi fuerint alimentis, multam; qui paucum potu & siccis alimentis vescuntur, paucam emingant urinam. Moderata itaque

Mediocris urinæ salubritatem corporis ostendit.

Multa & Multa autem & pauca urina, nisi ex præ-

dictis causis proveniant, semper sunt præter-naturale signum, & corporis constitutionem insalubrem monstrat. Multa itaque urina in sanis corporibus mingitur, aut ob largiorem potionem maxime vini tenuioris, aut ob pharmacorum diureticorum assumptionem. In adversa vero valetudine multa urina projicitur aut propter nimiam caliditatem renum & meatuum laxitatem, veluti fit in Aqueo morbo, id est assidua & copiosa urina profusione: aut propter totius corporis insignem humiditatem, quemadmodum fit in hydrope: aut propter alvi siccitatem, ita testante Hippocrate 4. Aphor. 38. qui inquit, Mictio noctu copiose facta exiguum alvi dejectionem significat.

PAUCA urina insalubriter degentibus redditur, propter abstinentiam potus, siccorum alimenterum usum, aut propter vehementem corporis exercitationem, quæ corporis humiditates exsiccare solet. In morbis autem pauca prodit urina post largam sudoris profusionem, aut æsum totius corporis febrilem absorbentem humiditates in corpore, aut propter alvi fluorem, ut in Lienteria, aut ob meatuum urina obstructionem, veluti fit in calculo.

Pauca urinæ causa.

Vnde pauca urina in ægris.

DE CONTENTIS URINÆ.

18. Contenta seu liquori urinæ admixta materię quid & quæ circa ea sunt consideranda, quotve eorum species?

Contenta, Græcis μεσισταμνα dicuntur omnes materia, quæ liquori urinæ commiscetur, sive hæc in superficie urina fluent, sive in media regione immanent, sive fundo matula subsideant.

In contentis urinarum consideranda veniunt materia, species, causa, & significationes. Contenta omnia in superficie urina fluitantia ut plurimum ex cerebro desunt: Quæ in medio ejus innatant ex partibus in thorace contentis; quæ vero fundo matula insident ex membris nutritioni servientibus & sub diaphragmate contentis procedunt. Contentorum porro præcipua species in hac tabella comprehenduntur.

Quænam in urinæ contentis sint consideranda. Contentorum urinæ locus partem affectam denotat.

Tabella

Tabella contentorum urinæ.

Contenta urina sunt in	Superficie,	Corona seu circuli, Nubecula, Spuma, Bulla, Tela Araneorum.
	Media regione,	Granula, Atomi, Squamula, Sperma, Ramenta seu Filamenta, Pili, Caruncula, Sanguis purus, Vermiculi.
	Fundo,	Œgulus, Furfures, Arenula, Mucus, Pus, Cinis, Hypostasis.

In hisce contentis omnibus seu materiis urina permixtis, consideranda veniunt Color, substantia, & significationes, quorum omnium causas & significationes in subsequen-
tibus Tabulis proponemus.

Tabella Judiciorum ex copulatione substantiæ colorum & contentorum urinæ desumptorum.

19. Quale iudicium præbet urina aurea?

Aurea fa-
lubris.

AVREA, subaurea, Citrina, substantia mediocri, cum hypostasi alba, saluberrima est, inculpatas omnes concoctiones significat. Quantum autem aliqua urina ab hac declinabit ad alterutrum extremum colorem, Albedinem per frigidam intemperiem, vel Rubedinem Nigredinemque per igneam calorem, tantum ab inculcata temperie & salubritate discessisse corporis constitutionem ostendit.

20. Urinæ pallidæ sive spicæ quid significant?

PALLIDA seu spicæ est quæ ab aureo in

primo gradu recessit, quæ inchoatam, nondum tamen perfectam, concoctionem monstrat.

Et nonnihil turbida, ventriculi aliam quam frigiditatem, & facultatis concoctricis imbecillitatem notat.

Tenuis & perpauca, pituita serosa copiam in venis esse commonstrat. Valde spumosa & ad lividitatem vergens, status, rugitus & alvi tormina ac fluxionem innuit.

Crassa, cum corona purpurea, Epatis tumorem & obstructionem, ac per consensum capitis dolorem indicat.

Crassa instar olei cum cinerea hypostasi phthisin & præsentem mortem minatur.

21. Albæ urinæ quid portendunt?

Albarum urinarum in genere plurima sunt. Urina alba differen-

perspicua
periculo-
sior est
crassa.

differentia, quarum alia magis, alia minus, alia obscurius, alia clarius sunt alba, omnes tamen recesserunt in secundo gradu ab Aurea, & quanto magis intensus est albus urina color, & qua perspicua & clara sunt, crassissunt magis permittosa. Omnium autem albarum urinarum causa efficiens est frigida intemperies cum pituitosi humoris redundantia, & perpetuo significat morbos ex frigiditate ortos, veluti sunt Arthritis, Colica, catarrhus, Epilepsia, Apoplexia, ventriculi imbecillitas, vermes intestinum &c.

Species al-
barum u-
rinarum.
Albarum
urinarum
variarum si-
gnifica-
tiones.

Albarum vero urinarum precipua species sunt, Caropa, Glauca, Aquea & Lactea.

Tenuis cum alba & crassiore hypostasi, articularum morbos ex crassa pituita ostendit.

In febre quartana quampræcessit urina alius coloris, febrim brevi solutam iri ostendit.

Ad lividum colorem declinans, carens hypostasi, caloris nativi extinctionem, & citam mortem prædicat.

Cum nigris resolutionibus instar crassarum arenarum in fundo, matricis obstructionem, & mensum cohibitionem docet.

Tenuis cum granulis seu bullis in superficie natantibus capitis destillationem, & articularum dolores portendit.

Alba Tenuis multa & perspicua pulmonis exulcerationem ex destillatione salsa pituita monstrat.

Tenuis cum corona livida, aut viridi ventriculorum, cerebri obstructionem & inde apoplexiam monstrat.

Crassa & viscida lenta, pituita crassa, lentorumque humorum copiam in corpore monstrat.

Crassa & purulenta ad lividitatem tendens, abscessum sive apostematissruptionem in urinariis vasibus ostendit.

Et instar olei pinguis, præsentis mortis est nuncia.

Crassa, factida, in febribus putridos humores redundare & delirium inde natum commonstrat.

Glauca, id est cornu pellucido similis, pituita mucosa redundantiam, & crudelitatem ostendit.

Caropa pilis Leporinis vel cineri similis, pituita & cerosa pituita copiam, Epatis obstructionem & inde hydropem commonstrat.

22. Lactea urina quas habet significationes?

Urina sero lactis similis dicitur, qua in tertio gradu discessit ab aureo colore per refrigerationem. Lactez significationes variae.

Crassa redundantiam crassa pituita in venis ostendit.

Lactea Tenuis in acutis febribus, aut citam mortem, aut febris in phthisi commutationem minatur.

Crassa pauca obstructionem meatuum urina ex mucosa pituita significat.

Tenuis in puerulis calculum vel nephriticos dolores significat.

23. Aquea urina quas habet significationes?

Urina aqua pura sive cristallo similis, nisi ex nimia ingurgitatione excernatur, extremam crudelitatem & vehementem viscerum nutritioni servientium refrigerationem monstrat.

Tenuis cum dolore hypochondriorum, aut lecoris, aut Lienis obstructionem, refrigerationemque & inde hydropem significat.

Aquea Tenuis cum dolore Lumborum, renum obstructionem & calculum notat.

Tenuis in febribus phrenitidem deliriumque declarat.

Tenuis in hydropem, sanguificationis frustrationem propter nativi caloris extinctionem monstrat.

Tenuis in licteria, commutationem licteria in hydropem demonstrat.

24. Rubæ urinæ quas habent significationes?

Rubea-
rum signi-
ficationes.

Calor in-
tensus qui-
bus colo-
ribus tin-
gat urinas.

Quemadmodum *urina aurea* per certos gradus ad extremam albedinem recedit per frigidam intemperiem, aut admixtionem frigidorum humorum, ita eadem per certos gradus ab aureo colore ad rubedinem, & ex ea ad nigredinem secedit, ex ignei caloris intensione aut æstuantium humorum commixtione. Ut autem albarum urinarum, ita & rubearum usque ad nigredinem plures sunt differentia, veluti sunt *Flava*, *Crocea*, *Flammea*, *Rubea*, *Purpurea*, *Rosacea*, & *Passea*, quas sequuntur *Veneta*, *Livida*, & *Nigra*.

Rubearum urinarum usque ad extremum colorem multa sunt differentia, quarum alia in secundo gradu, alia in tertio discesserunt ab aurea per igneum calorem.

Ut *flamma* & tenuis qua & ignea & flammea dicitur, ardentem febrem Epatisque inflammationem monstrat.

Flammea, crassa cum corona livida & granulis innatantibus, bubonem circa inguina & capitis dolorem ostendit.

Flammea cum nigra hypostasi & dolore hypochondrii sinistri, splenis abscessum monstrat.

Vino rubro similis, plethoram & sanguinis ebullitionem notat.

Diluto sanguini similis in fundo non subsidens reentricis facultatis imbecillitatem in renibus ostendit.

Diluto sanguini similis qua paulo post in fundo matula grumescit, renum exulcerationem indicat.

Instar boli armeni & perspicua, lecoris inflammationem & ardentem febrem commonstrat.

Epatis colorem referens, crassa & obscura, inflammationem & corruptionem Epatis ostendit.

Qua mediocris est substantia cum alba hypostasi, febris morbiq; solutionem pollicetur.

Ru- Instar lixivii perspicua, in hydropse

bea

mortem præsentem minatur.

In superficie alba, capitis cruciatibus & mentis alienationem ostendit.

Crassa, foetida, cum hypostasi nigra, putrefactionem sanguinea massa & mortem præsentem minatur.

Crassa, in acutis febribus, Capitis & lecinoris dolores ostendit.

Tenuis & spumosa & munda purpuram monstrat.

Rosa purpurea colorem referens, Epatis apostema notat.

Purpurea, crassa qua commota spumam croceam edit, Ictericia est index.

25. Flavæ & crocæ urinæ quas habent significationes?

Flavam urinam vocamus, qua ovorum luteis dilutis est similis; Croceam vero qua floribus croci vel liquoris copiosa croco imbuta assimilatur, qui colores in primo gradu per igneum calorem discesserunt ab aureo.

Urina rubra bilis confusionem in massa sanguinea notat.

Crassa & turbida, humorum ebullitionem & appetentia prohibitionem commonstrat.

Flava Tenuis & subobscura morsum præcordiorum & in mulieribus ovum notat.

Cum crassa hypostasi & superficie tenui cum bullis, thoracis vitia & pulmonis obstructions indicat.

Tenuis & perspicua, calidam Epatis intemperiem & obstructionem notat.

Crocea Crassa, bilis vitellina in Epate regurgitationem & Ictericiam ostendit. Cum spuma ejusdem coloris, semper Ictericia & flatulentorum spirituum circa præcordia index.

26. Passearum urinarum significationes quæ?

Passea urina subnigris seu passillis similis, Passæ discessit ab aureo colore per extremam caliditatem in tertio gradu.

Pas-

Significa-
tiones.Pas-
sa

Qua antea erat rubra, exassatio-
nem & in adustam bilem conver-
sionem significat.
Qua agitata producit flavam spu-
mam, Epatis inflammationem &
Ictericam notat.

27. Livida, Veneta & Nigra urina
quas habet significationes?

Livida u-
rina cau-
sa.

Livida urina qua plumbi aut plaga vio-
lenta vestigii colorem refert, & veneta, qua
colorem habet urvarum nigrarum, & Nigra,
qua Carboni extincto est per similis, intensio-
ne inter se differunt, & in quarto gradu dis-
cesserunt, ab Aureo per adustionem ignei ca-
loris, qua in specie significationes habent.

Significa-
tiones va-
rie.

Urina quandoque ruinam ex alto,
vel acceptas plagas circa lumbos
significat, quandoque extinctio-
nem nativi caloris, & adustio-
nem humidi radicalis ostendit.

Cum tumore ventris, hydropem &
ex ea presentem mortem minatur.

Cum granulis in medio urina natan-
tibus, vomicae sive tumorem in
thorace, & respirationis difficul-
tatem monstrat.

Livi-
da

Cum carunculis innatantibus, arti-
culares morbos & diuturnam po-
dagram indicat.

In mulierum urinis cum nigris reso-
lutionibus, mensum obstructionem
notat.

In phrenitide & cordis palpitatione
presentis mortis est nuncia.

Cum dextri hypochondrii dolore, E-
patis, & sinistri Lienis tumorem
& morbificationem monstrat.

Cum furfurea hypostasi, Renum aut
vesicae exulcerationem ostendit.

Sicut & livida facit, caloris nativi
extinctionem & humidi vitalis
in cinerem conversionem signifi-
cat.

Vene-
ta

Tenuis, Lienis obstructionem & re-
dundantiam atrae bilis monstrat.

Crassa, caloris vitalis absorptionem
& bilis atrae commixtionem por-
tendit.

NIGRA VRINA sicut & alba vel aquea, Nigrarum
est extremi coloris & discessit à colore Aureo
in quarto gradu. Ejus autem, ut & alba
plures sunt differentia; Alia enim colorem
cornu nigri, alia fuliginis, alia atramenti,
alia carbonis restincti colorem pra se ferunt.

Causa nigrarum urinarum veluti & carbo-
num, est ignea & adurens caliditas, aut ex-
trema refrigeratio partium nutritioni ser-
vientium, aut humoris atrii, veluti sunt hu-
mor Melancholicus & menstruus sanguis a-
dustus, permixtio; qua causa his notis dis-
cernuntur: Si urina effecta sit nigra ex adu-
rente calore, nigredinem praecessit aut rubens
aut viridis color, & semper est mortalis; si
ab extrema partium refrigeratione facta sit
nigra, tum pressit aut lividus aut venetus
color, qua & ipsa perpetuo est perniciofa. Si
vero ex permixtione atrorum humorum nigra
est effecta, tum nigredo paulo post in fundum
residet, & superficies urina fusca redditur,
qua non modo non est perniciofa, sed etiam
salutaris, ut in sequentibus ostendemus.

De nigrarum urinarum generationibus &
significationibus hi versiculi Aegidii sunt ob-
servandi:

Nigrorem urinæ faciens incommoda fe-
bris

Quartanam solvit: mortem portendit,
& urit.

Si niger ad fundum residens se deprimat
humor,

Matrix purgatur multi sentina cruoris:

In febre fert mortem quæ nigra est pau-
cula

Vesicæ vitio Renum profususque remo-
tæ.

Urina cum nigricante spuma, pulmonis in-
flammationem & respirationis difficultatem
ob fuliginosos vapores ostendit.

1. In febribus si sudor per caput &
collum erumpit, presentis mortis
est indicium.

2. Crassa, foetida cum purulenta
materia, abscessum seu ruptum a-
postema in renibus ostendit.

Urina nigra 3. Cum spuma crocea, Ictericia ni-
gra, id est scorbuti est index.

Nigrarum
differen-
tiæ.3. Causæ
nigrarum
urinarum.Signa di-
versarum
causarum
nigredi-
nis.Quænam
urina ni-
gra sit fa-
lubris.

4. In agnitudinibus, quibus ager ex insperato esurit, cibumque appetit, est signum mortale.

28. Viridis urina quas habet significationes?

Viridis & oleagineus urina colores, sunt compositi ex albo, croceo, & rubeo. Non itaque possunt ad duos extremos colores veluti reliqui intermediis remissione & extensione referri: eorum tamen causa effectrices sicut & reliquorum, sunt aut exurens calor, aut extrema frigiditas, aut permixtio bilis prassina aruginosa, aut venenum assumptum; omnis autem urina viridis est perniciofa.

Viridis urinae causa.

Prassina aut aruginosa bilis ex ventriculo in Epar attracta copiam ostendit.

Quam rubea praecepsit, confusionem & ebullitionem pituita & flava bilis ab igneo calore & mortem portendit.

Corpore intumesciente cum anxietate & dolore ventriculi, hausti veneni est indicium.

Urina viridis

In mulierculis & puerulis πικρὸν ac spasmus propter extinctionem caloris nati vi notat.

In febribus, vitalem calorem ab igneo esse extinctum & mortem imminere docet.

In phrenitide, semper mortis est praenuntia.

Cum sulphurea hypostasi, virulentum ulcus renum aut vesicae monstrat.

29. Oleaginearum urinarum significationes quae?

Oleaginea vel oleacea urina, quantum ad colorem, paulo remissior est viridi, nonnihil ex viridi ad album tendens, veluti sunt fructus olivarum conditi, **Olivæ.**

Oleaginea urinae significatio. Quantum vero ad substantiam, crassa, lenta & pinguis est, veluti Olea, qua ipsa ut plurimum perniciofa censetur.

Cum colore tum substantia urina oleaginea aut pinguedinis totius corporis aut circa renes existentis colliquationem & phthisin o-

stendit. In acutis febribus quarto die à morbi initio apparet, septimo die moriturum agnum nunciat.

Cui ramenti simile, aut carniū lotura quid admixtum est, aut phthisin, aut colicum dolorem significat.

Tabulae iudicandorum morborum ex contentis urinae, sive rebus in urina fluitantibus.

Contenta urina, ut supra monuimus, dicuntur omnes materia & corpuscula quae in urina permixta conspiciuntur: sive ea in superficie innatent, sive in media regione fluitent, sive ad fundum matula subsideant.

Et talia quidem sunt Corona, nubecula, spuma, tela Araneorum, puncta oleacea, pinguedo, bulla, granula, atomi, filamenta, squamula, pili, coagula, Caruncula, vermiculi, sanguis concretus arenula, cinis, pulvis crassiusculus, furfures, pus, &c. in quibus potissimum consideranda veniunt, Materia, Color, causa & significationes.

30. Significationes Coronarum in urinis quae?

Corona est circulus in superficie urinae per interiorembitum matula visus, qua in salubri urina nunquam conspicitur sed in morbis, praesertim capitis, ut plurimum cernitur, colorem & substantiam diversam habens à totius urinae liquore. Corona autem duas habet generales significationes, primum siquidem ostendit, quis humorum in sanguinea massa redundet, secundo qua sit cerebri constitutio, & quali sanguine sit refertum.

Coronae in urinis duplex significatio.

Nam

Alba & tenuis, sanguinem seroso humore commixtum, & inde cataractum ostendit.

Alba & crassa pituitoso sanguine venas esse refertas, capitisque dolores ex obstructione à pituita notat.

Crocea, tenuis, biliosum sanguinem in venis contineri & capitis acerbissimos dolores ex biliosa evaporatione innuit.

Rubra vel flammea, sanguinis inflammationem & vehementes dolores

na

lores capitis in antica parte ostendit.

Purpurea crassa, occiput cruciari ex adustione sanguinis monstrat.

Livida, atra bile refertum cerebrum, & ex hac vel amentiam vel apoplexiam metuendam monet.

Veneta, sive plumbea & cārulea, extremam cerebri refrigerationem & apoplexiam minatur.

Nigra, cerebrum atra bile infarctum, & inde apoplexiam, & citam mortem prænunciat.

Viridis, phrenitida ex vaporibus a-ruginosa bilis & mortem præsentem portendit.

Trepidans post lentam commotionem urina Epilepsia est indicium.

31. Nubecularū urinæ significationes quæ?

Nubeculae
quid de-
notent,

Nubecula seu nubes sunt umbra quadam subobscura, quæ superficiei urinæ quasi incumbere instar nebularum visuntur, quarum causa est fumosa evaporatio ab æstuantibus partibus, epate videlicet aut pulmone, ad cerebrum elevata. Nubecula itaque perpetuo aut epatis inflammationem, aut peripneumoniam, ac anhelitus respirationisque difficultatem significant.

32. Spuma in urinis quas habet significationes?

Spumæ in
urinis si-
gnificatio-
nes variæ.

Spuma est ærea vel flatuosa pars in humoribus viscosis & tenacibus contenta, quæ aut per ebullitionem, aut vehementem agitationem humorum excitatur, & in superficiem urinæ aggregatur. Fit autem ebullitio ab igneo calore, agitatio autem à flatuosis spiritibus. Humoribus autem agitati tenuius & crassius ex spuma ita dignoscitur; spuma cito resoluta & evanescens humoribus agitati tenacitatem, diu vero perseverans tenacitatem ostendit.

Hic tamē
observan-
dum, ne
quem se-
ducatur uri-
na spumo-
sa propter

Multa citra commotionem urina innatans & perseverans, flatus plurimos in corpore vagari, ventriculūque & intestina distendi, & inde tormina, colicumque dolorem excitari docet.

ma

Inter menjendum prolapsa, renes & vesicam flatibus esse repletam arguit.

Alba pituita agitationem & à flatibus concussionem monstrat.

Citrina flavam bilem ebullire à calore Epatis & obstructionem splenis & melancholici humoris agitationem, lctericiamq; nigram demonstrat.

Viridis prassinam bilem in epat defluxisse, illudque inflammatum esse arguit.

Livida pulmonis obstructionem & inflammationem & difficultatem respirationis significat.

Exiguarum bullarum per totam coronam urinæ disposita, cephalalgiam, id est, dolorem totius capitis; at si per medietatem Coronæ tantum, hemisphericam commo-
strat.

33. Tela araneorum, superficiei urinæ obducta, quas habet significationes?

Sæpe tenuissima membranula tela araneorum similis, superficiem urinæ obtegit, idque variis & viridis coloris, quæ canosum & putrefactum sanguinem, adeoque morbum Gallicum, capitisque dolores significat.

Tela ara-
nearum
quid de-
notet.

34. Pinguedo urinæ innatans quas affectiones indicat?

Pinguedo instar tela araneorum in superficiei urinæ innatans, renem & pinguedinis circa renes absorptionem, & colliquationem monstrat.

Pinguedo.
Hipp. l. 2.
Prog. 1. 6.

35. Significationes bullarum in urina quæ?

Bulla, sicuti de spuma diximus, à flatibus seu spiritibus intra capacitatem viscerum occlusis & viscidos humores ibidem contentibus oriuntur. Bulla itaque in urinæ viscidorum humorum meatus obstructi & flatulentorum spirituum copiam significant. Verum bulla tantum hæc significati-
sunt, quæ post refrigeratam urinam permantent, non autem quæ ex violenta commotione urinæ oriuntur.

Non om-
nes bullæ
esse signi-
ficativas.

Magna in superficie urina perseverantes flatus in ventriculo & intestinis & inde vomitum, rugitum & ventris tormina denunciant.

Parva & exigua per totam coronam urina disposita capitis dolorem ex flatibus, per mediam autem coronam hemicranium ostendunt, & mitiorem quidem esse dolorem, si bulla fuerint alba, acriorem vero si fuerint flava.

Bulla Verfus centrum superficiei urina fluitantes, capitis dolores jam remitti ac solvi ostendunt.

Granis exiguis similes per coronam disposita, & si agitur urina, rursum ad coronam recedant, destillationem ex capite ad pulmonem vel in articulos delabentem significant.

In urinis in quibus pili infarcti esse cernantur, renum inflammationem & obstructionem notant.

In urina tenui & alba carentes hypostasi, renum à crassis humoribus obstructionem notant.

36. Granulorum in urina natantium significationes quæ?

Granulorum variaz significationes.

Granula sive grana sunt exigua bulla, seminibus papaveris, aut si majora sint, sinapi similes, quæ ut plurimum in Corona sive circulo urina conspiciuntur, & semper cerebri destillationem capitisque affectionem significant.

In mulierum urinis in media regione vel paulo infra superficiem submersa, gravidas eas ostendunt.

Infra mediam regionem & circa fundum innatantia, articulares morbos, & podagram ex destillatione pituita ad subjectas partes commostrarunt.

Grana Livida in infima regione urina, Lienis obstructionem ex pituita destillatione significant.

Majuscula in fundo matula ab invi-

cem pendentia & cohærentia in mulieribus mensium suppressionem notant.

37. Atomi sive pulvisculi in liquore urinae fluitantes quas habent significationes?

Atomi, id est, insecabilia corpuscula, similes sunt in jubare solis volitantibus, qui in hoc differunt à granulis, quod granula sunt exigua bulla instar granorum, quæ per superficiem ac potissimum in Corona innatant: atomi vero solidioris substantia sunt, & per omnes regiones urina feruntur.

Differentia inter grana & atomos. Atomi.

Acrida & pituitosa materia proveniunt, & generaliter articulares morbos demonstrant.

In fundo matula natantes podagram ex gipsea pituita significant.

In media regione urina pulmonis & musculorum thoracis obstructionem & respirationis difficultatem ostendunt.

In suprema regione urina fluitantes, cerebri obstructionem à frigida pituita & capitis dolores innunt.

In urinis sanarum muliercularum post urina commotionem apparentes, & qui per quietem subsidunt & viscosæ lana tenuissima efficiunt, eas gravidas esse certo ostendunt.

Hoc ut plurimum verum est, attamen Ioh. Nævii iudicium hic attendendum, qui admodum fallax iudicium esse existimat, ex urina præsentem prægnationem agnoscere, Scholz. in conf. Med. Filamenta quid denotent.

28. Filamenta in liquore urinae fluitantia quæ significant?

Filamenta sunt particulis filorum conceptorum similia corpuscula, & alba quidem, quæ & ipsa post commotionem urina in viro conspiciuntur. Filamenta ut plurimum ex membri generationi servientibus, vasis spermaticis & matrice profluunt, & ex seminis materia originem trahunt. Significant itaque seminis redundantiam & meatuum, vasorumque spermaticorum dilatationem, & ut plurimum post concubitum, & in mulieribus post albicantium mensium fluxum proveniunt.

Filamenta cum dolore lumborum γαυροπύκτων, id est seminis profluvium significant.

39. Squa-

39. Squamæ in urina natantes quid mali portendunt?

Squamæ.

Squama, Græcis πεταλάδες, piscium squamulis albicantibus aut fragmentis ovorum testis similes conspiciuntur, quæ cum febris apparentes solidarum partium ab igneo calore resolutionem, & inde tæbem & hæticam febrem significant.

Squama sine febris siccam scabiem plerumque portendunt.

40. Pili in urina quas habent significationes?

Pili quid significant.

Pili sive capillis similia filamenta, ubi in urinis apparent, perpetuo renum intemperiem calidam & siccam ostendunt, id quod & experientia universalis & Hippocratis dictum 4. Aph. 76. testatur, inquit; Quibus in urinis crassa existente veluti pili una exeunt, iis à renibus excernuntur. Generantur autem pili ex humoribus crassis, qui proveniunt ex alimentis concoctis difficilibus, veluti sunt caseus, pisa &c. ad renes diffinentibus, ubi à calore renum primum in fuliginem convertuntur, & per meatuum urinæ angustiam pilorum formam recipiunt. Itaque pilorum & calculi eadem est materia & causa efficiens, nisi quod renum calor in calculo extensor est.

41. Carunculae in urina quas habent significationes?

Carunculae.

Hipp. aph. 76. l. 6.

Caruncula vel exigua frustula carnis in urina natantia, perpetuo renum exulcerationem ostendunt, teste Galeno libr. 6. cap. 3. de locis affectis.

42. Vermiculi cum urina projecti quas habent causas?

Vermiculi in urina generantur.

Et sæpius, nonnunquam tamen vermiculi cum lotio excernuntur, quandoque instar lumbricorum oblongusculi, quandoque formicis, aliquando etiam iis qui in aqua caelesti volitare conspiciuntur, similes, qui ex putrefactione humorum in cavitatibus calidioribus partium urinatarum collectorum generantur, veluti sunt plica vesica, aut in ulceribus sordidis cervicis vesica. Non enim est absurdum, quemadmodum lumbricos in intestinis, & ascarides in musculis ani, sic & vermiculos in meatibus urinæ generari.

Sanguis in urina quid portendit?

Sanguis si recens per colem profuat, urina sanam suo semper tingit colore, & urina totus commiscetur. Si vero concretus projiciatur, tingit quidem urinam, sed ejus substantia in fundum matula subsidet.

Sincerus urina permixtus cum dolore dextri hypochondrii, venam in Epate ruptam; cum dolore lumborum, renum exulcerationem; cum dolore pectinis sive hypogastrii, musculorum cervicis vesicae exulcerationem esse testatur.

Purulentus semper aut renum aut vesicae exulcerationem ostendit, teste Hippocrate 4. Aph. 81.

In fundo matula in grumos concretus, crassius & niger in mulieribus mensum fluorem indicat.

43. Arenulae in urinis quas habent significationes?

Arenula generantur & excernuntur, urinaque commiscetur, aut ex renibus, aut ex vesica. Arena renum ut plurimum aut rubea sunt, aut flava, vesica vero albescunt. Ex arenularum collectione & invicem adhaesione calculi generantur.

Proveniunt autem arenula, aut propagatione hereditaria à parentibus calculosis, aut producantur ab usu ciborum crassi & glutinosi succi. Ex glutinosis enim cibis glutinosus oritur sanguis, qui ad renes defluens per igneum calorem renum, instar laterum in fornace coquitur & indurecit. De Arenularum generali significatione extat Aphorismus Hippocratis l. 4. Aphor. 49. inquit: Quibus in urina arenæ subsident, iis vel renes vel vesica calculo laborat.

Rubea & duriuscula cum dolore lumborum, calculum renum ostendunt.

Alba & dura cum dolore pectinis, dysuriam & calculum vesicae notant.

Rubea & molles, parietibus matulae adherentes, etsi simillima arenis videantur, revera tamen non sunt arenae, sed parietibus adherentes.

arena, sed assata partes sanguinis ex epatis inflammatione. Itaque aut praternaturalem epatis calorem, aut urentem febrem significant.

44. Cinis sive Cineritiæ resolutiones in fundo urinæ quas habent significationes?

Cineritium urinæ sedimentum.

Cinis sive Cineritiæ resolutiones sunt materia Cineri persimilis in fundo matula collecta, qua ut plurimum originem ducit ex adusto melancholico humore, & melancholicas affectiones, veluti sunt hamorrhoidum suppressiones, condylomata sive ficus ani, splenis obstructionem, &c. significant.

In fundo urinæ, melancholici adusti humoris redundantiam in venis significat.

In urina cum dolore sinistri hypochondrii, obstructionem ac tumorem lienis notat.

Cinis Cum dolore partium podicis, aut scum in ano, aut hamorrhoidum suppressionem ostendit.

In mulierum urinis ut plurimum mensium retentionem indicat.

Nigricans & fuligine permixtus in mulieribus mensium eruptionem, fluoremque docet.

45. Pulvis Crassus malè molito tritico similis, vel fursures quas habent significationes?

Furfuraceum sedimentum.

Pulvis crassus malè molito tritico similis, quem Græci *νεμενός*, & fursures, qui Græci *πύρεξ*, simul & exigua squamula, de quibus paulo ante dictum est, ex iisdem causis generantur & cum urina profluunt, videlicet ex igneo calore, aut in universo corpore solidas partes depascente, aut solum renum vesicæque substantiam adurentem; & quidem squama ex universi corporis consumptione, fursures autem & farina crassa similis materia ex renibus & vesica excernuntur, ac fursures quidem rubei coloris renum, albi vero vesicæ exassationem ostendunt, & perpetuò tales materia cum ardore urinæ excernuntur, & febres comitantur.

46. Semen, pituitosa materia, & pus in urina quomodo ab invicem discernenda, & quales singula habent significationes?

Hæc tria urina contenta, semen, chymus sive pituitosa materia & Pus, ut substantia ita & colore inter se finitima sunt, qua tamen tali ratione discerni possunt.

Semen quia spirituosum est & leve, in Seminis fundo matula non subsidet, sed semper innatat, & si agitur urina in matula, seminis materia in filamenta resolvitur. Pituita vero seu *χῆμα* subsidet quidem in fundum, & caret omni fœtore: pus autem semper fœtet & residet in fundum, sed concussum resolvitur in minutas partes per totam urinam, id quod chymus minimè facit, sed compactus cohaeret agitatus.

Σπέρμα sive semen urina innatans, aut *πυώδης*, aut concubitus antecedentem significat.

Pituitosa materia, sive *χῆμα*, instar Pituitosi mucii crassioris, & sine fœtore in fundum subsidens, concutitur licet projecta, vesica calculum & urinaria via obstructionem demonstrat.

Pituita sine dolore profluentis urinæ, abscissum ex renibus ostendit.

Pituita in superiore regione urinæ natans, ex catharrho pulmonis obstructiones & insuffim, respirationisque difficultatem indicat.

Pituitosi humores in media regione natantes, ventriculi & intestinorum dolores ex pituitosis humoribus innuunt.

Pus sive saniosa materia in matula fundo apprens, qua ex parte corporis profluat, ex dolore loci affecti dignoscitur.

Pus enim cum dolore pectinis cervicis vesicæ in viris & in feminis matricis exulcerationem notat.

Pus sanguine mixtum in urinis cum dolore dextri hypochondrii abscissum epatis significat.

Pus in *πλευριτιδὲ* & pleuritide abscissum seu apostematis in thorace contenti rupturam arguit & spem salutis pollicetur. Pus enim per venas ex thorace purgatur.

47. Ὑποστάσις Urinarum significationes
quæ?

Sedimen-
tum quod-
nam pro-
prie dica-
tur.
Vnde pro-
veniat in
sanis.

Ὑπόστασις, Latinis sedimentum, generali
significatione omne id significat quod in fun-
dum matula subsidet. Verum proprie & spe-
cialiter in sanorum urinis dicitur id, quod
ex reliquis alimenti in venâ, & recrementis
humorum cum urina excernitur, & à fundo
matula ut plurimum albescens elevatur.
Quod autem ab alimento hypostasis prove-
niat, argumento est, quia qui multum e-
dunt & bene concoquunt, quales sunt pueri
& ocio dediti, in eorum urina copiosa cer-
nitur hypostasis; sed in agrotantium urinis ex
redundantis humoris morbumque facientis
excrementis cum urina profluit, qua humo-
rum excrementa, non tantum hypostasin,
sed totam urinam sua qualitate & copia im-
buunt ac tingunt, sedimentumque urina aut
album, aut flavum, aut rubens, aut nigrum
reddunt, & tales quidem colores semper re-
dundantis, peccantisque humoris cruditatem
ostendunt, qui ubi concocti sunt, ejus ὑπόστα-
σις perpetuo alba evadit & laudabilis. Con-
stat itaque, ὑπόστασις in urinis agrotantium
semper praevalentis morbumque efficientis
humoris speciem, ejusdemque cruditatem &
concoctionem ostendere.

Sedimen-
tum cru-
ditatem
denotat.
Generalis
indicatio
sedimenti.

Ὑπόστασις saluberrima est alba, levis & a-
qualis, & continua, fundo matula non pro-
fus incumbens, sed pyramidaliter à fundo
sursum elevata, & talis quidem hypostasis
caloris nativi copiam, corporis aequalem tem-
periem, alimenti perfectam concoctionem, &
exquisitam sanitatem ostendit.

Vrina ca-
rens hy-
postasi
quid por-
tendat.

Hypostasi carens urina caloris nativi im-
becillitatem, cruditatem, meatuum urinae
obstructionem ostendit; & talis quidem uri-
na in morbis perpetuo est mala. In sanis au-
tem corporibus ex multa ingurgitatione talis
redditur.

Crassa, humorum in venis crassitiem
& cruditatem portendit.

Tenuis, caloris nativi inopiam &
concoctricis facultatis imbecillita-
tem arguit.

Divulsa

Hy-

Divulsa & non coharens, flatus in

pos-
sis

corpore, impeditamque concoctio-
nem docet.

hyposta-
sis.

Alba & lenta incumbens matula, Alba.
pituita in venis redundantiam
monstrat.

Flava, crocea, sive citrina, bilem Flava.
flavam in massa sanguinea exuberare nunciat.

Rubea & purpurea epatis inflamma- Rubea.
tionem, in massa sanguinis exassa-
tionem ac corruptionem innuit.

Nigra, veneta & livida pernicio- Nigra.
sa est. Extinctionem enim calor-
is nativi, sanguinis corruptionem aut
atra adustaque melancholiae exuberantiam arguit: Sed in mulie-
ribus menses praternaturaliter
fluentes significat.

Orobea, id est in qua apparent mate-
ria legumini, quod vitium dicitur,
similes, in febris totius corpo-
ris absorptionem: circa febrem
verò renum colliquationem mon-
strat.

Eurfurea sine febre, vesica exulce- Eurfura-
rationem, cum febre vero carno- cea hypo-
sarum partium absorptionem stasis.
marcoremque ostendit.

Squamea cum febre, hecticam & Squamea.
solidarum partium, quales sunt
venarum, arteriarum & ossis
substantia absorptionem indicat.
Fragmenta testis ovium similia ha-
bens, ossium à calore igneo abra-
sionem & hecticam notat.

Diversa substantia & coloris, hu- Diversi
morum pravorum varii generis coloris.
in venis confusionem significat.

48. Urinarum differentiae ad rectum judi-
cium unde sunt sumendae, & quomo-
do discernendae?

Ni Medicus differentias urinarum probe
cognitas habuerit, facillime in judicando ab-
errare, & ab impostoribus decipi potest. Im-
primis itaque & accuratè tenere debet Medi-
cus, utrum urina oblata sit hominis aut bru-
ti, viri aut mulieris, foemina impragnata aut
non

Differen-
tiae urina-
rum ratio-
ne a-
tatis &
tempera-
menti

ægrī dili-
genter
obseruan-
da.

Homīnis
urina
quomodo
à bruto-
rum dif-
cernen-
da.

Urina ju-
mento-
rum.

Ovilla.

Suilla.

Asinina.

Vaccina.

Equina.

Ex senti-
nana-
vium a-
qua ut ab
urina dif-
cernenda.

Virorum.

Mulie-
rum.

Pregnā-
tium pri-
mis men-
sibus.

Postremis
mensibus.

non imprægnata, infantis, juvenis aut se-
nis, hominis temperamento calidi, frigidi,
humidi aut siccī, quæ urinarum differentia
hac ratione ex suis qualitatibus discerni, di-
judicarique possunt.

HOMINIS urina quanto oculis propin-
quior est, tanto crassior; & quanto remo-
tior, tanto tenuior apparet, quod in brutis
minime contingit.

IUMENTORVM urina pro pabuli ra-
tione varias sortitur constitutiones, sed ta-
men omnes sunt hominis urina crassiores, tur-
bidiore & impuriore hypostasis: ex his o-
vium & porcorum urina non multum dissi-
milis est hominis urina; & ovium urina hy-
postasin habet amurca similem, suilla autem
foetet magis quam hominis. Asinorum uri-
na & vaccarum & equarum, butyro lique-
facto, vel oleo liquido flavī coloris similitudi-
nem refert cum crassa hypostasi. Impostores
sæpe ex navibus contractis aquam diu conten-
tam & ferè corruptam Medico inspiciendam
pro urina offerunt, quæ ex colore & odore ab
urina facile discernitur; picem enim redolet,
& à pice subnigra apparet.

VIRORVM urina semper colore exten-
sior ad aureum, & substantia tenuior ac pu-
rior & hypostasi levior conspicitur quam mu-
lierum.

Mulierum urina, etiamsi ipsa sit salubri
constitutione corporis, deficit tamen ab urina
viri, substantia siquidem paulo crassior &
turbidior, nec ita pellucida est, quia ma-
gis mulieres quam viri excrementitius humo-
ribus redundant, colore pallidior, hypostasi
copiosior & albidior conspicitur.

Mulierum prægnantium urina à primo
mense usque ad sextum gestationis colore est
subaurea, & substantia subnigra, cui in-
natant atomi, sive pulvisculi tenuis farina si-
miles, qui quiescente urina, non in fundum
matula resident, sed conglomerati paulo infra
mediam urina regionem viscosi consti-
tuunt, lana tenuissimè carpta similem, quæ
urina commota resolvuntur, & instar exi-
guorum granulorum aut atomorum sursum
deorsumque in urina feruntur. Circa septi-
mum mensem mutatur coloris bonitas, & si-

milis redditur aqua in qua pedes vitulini re-
center macerati sunt incocti. Appropinquante
vero partu rubicundior & turbidior evadit
urina. Verum hac signa urina etsi imprægna-
tionem ut plurimum ostendunt, tamen & in
suppressione mensum, & in mola matricis
fallunt.

Ne itaque Medicus aberret in judicanda Signa alia
imprægnatione, necesse est, ut diligenter inve-
stiget, utrum menses sint retenti, mulierque
salubriter degat, utrum labores per inter-
valla fastidio ciborum, & quandoque ha-
beat insusitatem appetitiam, item si sentiat in
cruribus languedinem, item si ex potu hydro-
mellis cubitum tens sentiat tormina ventris,
quæ omnia sunt imprægnationis certissima te-
stimonia, quæ non prægnantibus minime ac-
cidunt.

PER ÆTATES mutatur urina & Urinæ
colore & substantia. Nam quantum proce-
dit ætas ad æqualem sive virilem ætatem, tan-
tum intenditur urina color ab albo ad au-
reum, & diminuitur hypostasis; & quantum
procedit ætas ad æqualem usque ad senectam,
tantum remittitur ab aureo colore & proce-
dit ad albedinem.

Infantium urina seri lactis albedinem re-
fert propter humiditatis copiam & caloris na-
tivi obfuscationem.

Puerorum urina subaurea est, turbida
cum copiosa hypostasi.

Juvenum & ætate florentium urina fulva
est, instar purissimi auri, hypostasi levi, al-
ba & aquabili: Viget enim in eis calor nati-
vus plurimum.

Senum urina tenuis & alba est, cum pau-
ca hypostasi propter nativi caloris imbecillita-
tem.

Mutatur urina & secundum tempera-
menta seu qualitates excellentes in corpore, Urinæ
sicuti & secundum humoris redundantis in
corpore naturam. Corporis itaque immodera-
ta humiditas & pituita redundantia calo-
rem nativum obtundit, & urinam efficit te-
nuem & crudam. Caliditas & bilis redun-
dantia urinam reddit tenuem & colore im-
buit croceo: Siccitas urinam extenuat, colo-
rem inducit fulgentem & aureum. Melancho-
lia

Circa
tempus
partus.

Urinæ
mutatio
juxta æta-
tes.

Infan-
tium.

Pæro-
rum.

Juvenum.

Senum.

Urinæ
mutatio
juxta
tempera-
menta &
humores.

lia qua frigida est & sicca, urinam facit tenuem & albam, qua si urina commisceatur, fusco aut nigro eam colore tingit.

49. Impostorum dolus in iudicanda urina quibus rationibus est eludendus?

Quomodo impostorum dolus animadvertendus. Cum & color & substantia urina levissimis ex causis immutetur, ac inde Medicus in iudicanda urina absentium maximè agrotorum aberrare queat, & vulgus falso putet Medicum quasi Ariolum ex solius urina inspectione omnia posse augurari: quin & sæpe perfidi homines, ut in Medicos liberius invadere, eosque profcindere, & apud imperitos risui exponere possint, pro hominis urina offerunt veljumentorum, vel aliud genus liquoris, ut incautum Medicum decipiant. Quare cum tibi oblata fuerit urina absentis agroti, & ipsa urina sit corrupta & immutata, ita ut obscurissima indicia inde sumere possis, aut quando nuncii perversitias tibi sit suspecta, ne temere ex ea quicquam pronuntiabis, nisi prius per quæstunculas nuncio propositas, de agroti statu & morbi natura aliquid certi consecutus fueris. Propones itaque nuncio subsequentes quæstunculas.

Inquirenda ante iudicium ex urina. I. Virum urina sit viri aut mulieris, qui si nescire se dixerit, merito suspectum eum habebis, & perges in sciscitando.

II. Virum ager lecto decumbat aut adhuc obambulet, & utrum velit uti remediis, qui si responderit, non petere pharmaca, sed saltem velle se noscere morbi genus & causas, tum multo magis tibi suspectus erit, & consultum est, eum cum urina ad alium Medicum ablegare, ac pratendere tibi non satis oicii superesse, ut consideranda urina operam des, &c. Præstat enim exiguo precio care, quam huiusmodi hominibus gratificari & ludibrio se exponere.

De tempore morbi. III. Quo tempore primum decubuerit, vel quamdiu laboraverit morbo. In cujus quæstionis responsione ex serie orationis diligenter animadvertendus est articulus vel masculini vel fæminini generis quo utitur nuncius, inde enim & quod urina sit hominis & utrum sit masculi vel fæminæ deprehendes.

IV. Virum inculpate dormiat ager. Si enim dormire posse neget agrum, tuto pronunciare potes, caput ex vaporibus acrioribus, quibus est referum, dolere agrum.

V. Virum tussiat vehementius & frequentius. Tum enim pulmonem affici obstruque, pectusque aliquo morbo laborare.

VI. Virum ager edere ac bibere inculpate queat, qui si neget, tuto prædicere potes, ventriculū esse debilitatum, & totius morbi fontem.

VII. Virum siti vehementius prematur, multumque bibat, qui si siti premi agrotum ait, hinc epar & ventriculū inflammatum esse pronuntiabis.

VIII. Virum sentiat dolores aut punctiones in alterutro latere. Si enim in dextro hypochondrio doleat, epar; si in sinistro, lienem esse obstructum & affectum, certo prædicere potes.

IX. Virum tumeat vel toto corpore vel pedes. Quod si affirmet eum toto corpore intumuisse, epar laesum esse ac refrigeratum, ac metuendum esse hydropem; si vero pedes tantum tumeant, & agra sit mulier, qua nondum attigit annum quadragesimum, matrice eam laborare & menses esse suppressos dicito.

X. Virum sudet frequenter, quod si annuat, dicito morbum futurum diuturnum, totum enim corpus infarctum esse copiosis humoribus.

XI. Virum vomat crebro. Si enim assumpta statim evomat, flava bile infectum esse ventriculū dicito. Si vero pituitosam materiam, ventriculū pituita oppletum esse pronuntiabis.

XII. Virum satis virium adhuc habeat ager, utrumve suo Marte à lecto surgere & inambulare queat. Viribus enim adhuc medicriter constantibus, tutius & pharmaca evacuantia, & vena sectionem suadere ei potes. Prostratis autem viribus præstat à curatione prorsus abstinere.

Ad hæc quæstiones ubi ordine responderit nuncius, eum post horam ad te redire jubebis, antequam ex urina quicquam pronuncies, & interim urinam diligenter juxta traditas

regulas considerabis, & cum oratione nuncii ac responsionibus conferes & ita facileprehendes, & de genere morbi & de loco affecto, certumque iudicium sine reprehensione pronuntiare poteris.

SECTIO IV.

De

SIGNIFICATIONIBUS
EXCREMENTORUM
ALVI.

I. Excrementa alvi quid, & quæ eorum differentiarum?

Alvi excrementum est terrestris superfluitas ciborum potuumque assumptorum, in prima concoctione à chylis in intestinum segregata, & per anum à natura expulsa.

Excrementorum alvi duo sunt differentia: Alia enim sunt naturalia, & salubritatem corporis ostendentia; alia praternaturalia & affectiones partium significantia.

Naturalia excrementa sunt cum substantia neque sunt nimium liquida neque duriuscula aut sicca, & quæ consistentiam mellis referunt, suntque continua sive coherentia & aqualia, id est per omnes suas partes uniformia, colore moderate flavia, odore non vehementer foetida, & quæ consueto ac convenienti tempore, id est matutino post peractam concoctionem, sine difficultate sunt excreta; & talia quidem secundum naturam se habent, & inculpatam concoctionem, bonam victus rationem, & corporis salubritatem significant: omnia alvi excrementa ab hisce conditionibus descendunt, praternaturalia & vitiosa habentur, & affectionem aliquam significant. Etsi autem ut alia superfluitates omnes corporis, ita & excrementum alvi earum potissimum partium in quibus continentur & harent, affectiones commonstrent, veluti ea quæ evomuntur ventriculi, urina renum & vesicae, mucus narium cerebri, per tussim ejecta pulmonis, & alvi excrementa ventriculi & intestinorum: tamen, quia ventriculus & intestina cum ad-

Excrementa alvi naturalia.

Praternaturalium excrementa.

Quarum partium affectiones dignoscantur ex excrementis alvi.

jacentibus partibus magnam habent connexionem, communesque meatus, (connectuntur enim cerebro per nervos & membranas, epati & lieni per venas mesaraicas, &c. ex quibus humores in intestina perferuntur, & ex earum affectione excrementa alvi immutantur,) non erit absurdum ex excrementis alvi partium connexarum affectiones dignoscere.

2. Quæ sunt consideranda in excrementis alvi?

In contemplatione excrementorum alvi septem proprietates sunt consideranda. Consideranda in excrementis.

I. Substantia, utrum excrementum sit durum vel molle, siccum vel liquidum.

II. Consistentia, utrum cohereat vel sit divulgum, & utrum sit uniforme, vel unitarum partium.

III. Quantitas, utrum sit pauca vel multa.

IV. Color, utrum sit album, nigrum, rubeum, viride aut lividum.

V. Odor, utrum insolito foetidum.

VI. Temporis excretionis intervallum, utrum frequenter aut raro excernatur.

VII. Contenta utrum ei sint commixta sanies, sanguis, spuma, ramentum, pinguedo, vermes, &c.

3. Consistentia excrementorum alvi quas habet significationes?

Consistentia excrementorum alvi alia est moderata, alia liquida, alia dura sive sicca, vel coherens, alia dispersa ac divulgum. Consistentia excrementorum diversam quid denotet.

Mediocris & moderata consistentia convenienti tempore excreta, naturalis est & salubritatem significat.

Liquidum excrementum cum pituitosa materia mixtum, & spumatum; aut defluxum pituita ex cerebro, aut ventriculi intestinorumque refrigerationem & appetentia prostrationem ostendit. Liquidum & spumatum.

Liquidum instar chyli vel pulvis avenaceæ, aut obstructionem venarum mesaraicarum attracticis facultatibus in eis imbecillitatem & epatis refrigerationem significat, & talis quidem morbus caliacus nominatur. Chylisum.

Liquidum cum crudis & non alteratis alimentis defectum concoctricis virtutis abolitionem & ventriculi extremam refrigerationem

tionem arguit, qui morbus *adventicia*, id est, intestinorum levitas appellatur.

Sincrum
vel colo-
ratum.

Liquidum humoris alicujus sinceri colorem referens, ut pituita album, flava bilis flavum, melancholica nigrum excrementum sine vehementi dolore, *Διέσποιον*, id est alvi profluvium pituitosum, biliosum, melancholicum significat, & provenit ex redundantia ejusdem humoris & imbecillitate retentricis virtutis in intestinis.

Oleosum
& feci-
dum.

Liquidum lentum & pingue quasi oleo aut adipe perfusum ac fætidum corporis totius aut viscerum colligationem, & inde aut febrem hæcticam, phthisin, aut pestilentem febrem ostendit.

Cruentum
& pura-
lentum.

Liquidum ac cruentum cum torminibus ventris portendit dysenteriam. In quo morbo primum mucus & adeps intestinorum egeritur, deinde ramenta, id est tunica interioris intestinorum abraça partes, tertio caro sive substantia intestinorum cum cruore: est etiam purulenta simul materia qua excernitur in dysenteria, & ex acerbis & erodentibus humoribus in intestina defluentibus generatur.

Excre-
mentum
cruentum.

Cruentum excrementum sine dysenteria & tormentis sæpe ex apertis hæmorrhoidibus profluit, & tum sanguis non toti excremento mixtus est, sed per superficiem ejus tantum conspersus.

Subcruen-
tum.

Liquidum instar diluti sanguinis, vel quod simile est aqua in qua lora sunt carnes recentes, jecoris imbecillitatem arguit.

Grumo-
sum san-
guineum.

Grumus sanguinis cum excremento excedens sine dolore, sanguinem ex hæmorrhoidibus in rectum intestinum defluxisse, ibidemque coagulatum esse significat.

Divulsum
ac fæti-
dum.

Liquidum divulsum ac varium cum fæto- re insolito, humorum putrefactorum & confusorum adfluxum in intestina notat.

Liquidum
ac aquo-
sum.

Aquosum ac liquidum excrementum, ventriculi & epatis corruptionem, & conco- trictis virtutis extinctionem notat, & ut plurimum est mortale.

Viride.

Liquidum viride aut aruginosum, copiam aruginosa vel prassina bilis in ventriculo ex corruptis cibis generatam ostendit.

Duri ex-

Durum excrementum & siccum sit, aut

propter alimentorum siccitatem, ut fabarum, crementi castancorum, bis cocti *Zwiback*: aut propter vehementem corporis agitationem, humiditatem in corpore consumentem, aut propter urinæ crebram & copiosam profusionem, aut propter calorem igneum totius corporis, ut in ardentibus febribus, aut propter obstructionem intestinorum, expulsivæque virtutis imbecillitatem.

Subdurum excrementum post liquidum est bonum & salutare signum. Partium enim nutritivarum robur ostendit.

4. Colores excrementorum alvi quas habent significationes?

Naturalis excrementorum color flavus est sive citrinus. Tingitur enim à flava bile ex vesicula in intestina resiente. Omnes reliqui colores pravi sunt indicii.

Excrementum multa flava bile tinctum, Flavum. redundantiam bilis flava, & caliditatem epatis significat.

Croceum excrementum seu vitellinum, Croceum. rubra bilis redundantiam & epatis fervorem ostendit.

Flammeum, igneam epatis caliditatem & Flammeum. mortem præsentem ostendit.

Æruginosum bilis prassina copiam in ven- Ærugino- triculo generatam ostendit. sum.

Viridis excrementi color in pueris extinctio- Viridis. nem nati vi caloris, tam in ventriculo quam in epate ostendit, & tale quidem excrementum ex frigidityte ortum minimè fætet, neque cum dolore deicitur. Fit tamen aliquando & viride à vehementi adustione bilis vitellina, quod & multum fætet, & cum urente ac multum pungente dolore excernitur, & semper est mortale signum.

Nigra, aruginosa, virida & livida excrementa in morbis diuturnis perpetuo sunt Nigra. & livida, & fætida & mortalia.

Nigrum in ardentibus febribus adustio- nem humorum notat, & est signum perniciosum.

Nigrum quando cum dolore & punctione adurente excernitur, melancholici humoris adusti defluxum ad intestina, & ut plurimum mortem minatur.

Nigrum ad terram projectum si fermentet Nigrum
aut mortale.

aut ebulliat, & instar aceti terram erodat, atra bilis adustionem & praesentem mortem significat.

Nigrum feci vini simile, epatis corruptionem & hepaticum fluxum ostendit.

Nigrum
excre-
mentum
quando
salubre.

Nigrum sine molestia, vel in die critico, vel in principio morbi dejectum, quod sequitur morbi levatio, & rursus mutatur in flavum colorem, morbi melancholici solutionem ac salutem pollicetur.

Nigra egestio in lienis doloribus, apostematis vel obstructionis apertionem indicat, estque salutare signum.

Terreum.

Terreum excrementum lienis resolutionem & fluorem ad intestina denunciat.

Album.

Album & lentum pituita copiam & ventriculi refrigerationem monstrat.

Album & crassum meatus ex vesicula bilis in intestina protensi, obstructionem & bilis flava interceptionem & per consequens interitiam significat.

Purulentum.

Album purulentum & foetidum tumoris interni ruptionem, & abscessum commonstrat. Locū autem apostemate obsessum dolor indicat.

5. Contentorum sive renum commistatarum excrementis quae sunt significationes?

Contenta vel commixta excrementorum dicuntur omnia quae prater substantiam excrementi ei sunt admixta, veluti sunt sanguis, spuma, pinguedo, ramenta, lumbrici.

Sanguis
purus ex-
cretus per
alium.

Sanguis purus & multus repenti egestus cum dolore aut gravitate dextri hypochondrii, vel venam cavam obstructam esse, vel venulam in substantia epatis ruptam arguit.

Sanguis paucus excremento mixtus cum dolore hypogastrii, ulcus intestini alicujus monstrat.

Cruenta excrementa quid prater hac significent, diximus in quaestione de significationibus consistentia excrementi.

Spumofum
alvi excre-
mentum.

Spumofum excrementum & album defluxionem à cerebro & agitationem pituita in eo, & ut plurimum vertiginem significat.

Spumofum excrementum cum alis coloribus, ebullitionem commotionemque humorum à vehemente calore & flatibus intra intestina contentis, & inde colicum morbum aut ilion significat.

Furfuribus & lupini corticibus similis materia in excrementis conspecta, mortale est signum.

Pinguedo vel adeps per superficiem excrementi, aut in superficie aqua calida in quam dejectum est excrementum colligationem & absorptionem, aut totius corporis, ut in hecticis, aut pinguedinis circa mesenterium & in ipsis intestinis colligationem significat. Est pingue excrementum in febris ardentibus perpetuo mortale signum.

Futura-
cium
mortale.
Pinguedo
excre-
mento-
rum le-
thale si-
gnum.

Ramenta in excrementis liquidis & acrioris interioris tunica intestinorum abrasionem portendit.

Lumbrici in excrementis intestina caenosa & putrida colluvie referta esse arguunt.

SECTIO V. DE SIGNIFICATIONIBUS CRUORIS E VENA SE- CTA DETRACTI.

Vena sectio, ut supra diximus, est universalis evacuatio, tum quod per consecutionem ex universo corpore, tum quod omnes simul humores tam bonos quam vitiosos evacuet ac diminuet. Sanguis autem in venis ex quinque humoribus ut plurimum constare animadvertitur, scilicet sanguine, bile flava, bile atra, pituita & serosa humiditate: singuli in cruore à vena detracto manifeste conspiciuntur. Et si enim sanguis dum effluit & adhuc calore est imbutus, simplex & unicus humor apparet, tamen ubi defrixit & congelatus est, haec quinque partes ab invicem segregantur, & singula in suas regiones secedunt, ut bilis quidem flava sit sanguinis concreti superficies, melancholicus humor in fundum subsidet. Sanguis autem rubens, & pituita pallidior medium cruoris locum obtinet, & serum his omnibus supernatat.

Vena se-
ctio eva-
cuatio u-
niversa-
lis.
Partes
sanguinis

Ut autem varietas & vitium sanguinis commodius dignosci queat, sanguis in vena sectione non vulgato more in unam pelvim, sed ad minimum in tres pelviculas stanneas aut vitreas teras acundas excipiendus est, in primo videlicet, medio & ultimo profluxionis tempore. Primum enim sanguis exiit à vena sectione ex venis proximis, & si-
gnum.

Ut sanguis
excipien-
dus.

Quarum
partium
gri-

Indicium ex sanguine defumendum. *gnificat de partium incisarum tantum, & in eis contenti sanguinis constitutione. Qui autem in medio fluxu excipitur, sanguinis qualitatem in venis majoribus contenti ostendit. Qui vero ultimo loco excipitur, Viscerum, Epatis nimirum & Lienis crasin & constitutionem indicat.*

1. In cruore è vena secta profuso quas sunt consideranda?

Confideranda in cruore. *In cruore jam concreto consideranda veniunt, substantia, color, odor, sapor & admixta sive contenta.*

2. Substantia cruoris quas habet significationes?

Substantia cruoris è salubribus corporibus detracti, ubi concreverit, debet esse moderata, non crassa aut tenuis, non torrida siccave aut diluta, sed moderatè concreta, non divulsa, nec nimio sero perfusa, sed moderate tantum conspersa, colore rubea, nullo tetro odore imbuta, & sapore dulcis.

Sanguis retorridus quid significet. *Sanguis in superficie siccus & retorridus nulloq; prorsus humore perfusus, siccam corporis temperiem à præternaturali calore ostendit.*

Crassus & lentus. *Sanguis crassus, lentus ac tenax, pituita crassa ac viscida corpus refertum indicat, unde obstructions metuenda, quas comitatur putrefactio & febris.*

Non crescens. *Tenuis vel dilutus sanguis qui non concret, corpus corruptis humoribus repletum & omnes fibras in sanguine esse corruptas & disreptas.*

Sanguis qui non facile finditur, crassus est & tenax, & pituita lenta copiam monstrat.

Sanguis è contra qui facile finditur, tenuis est & plus justo aquosus.

Sanguis qui fissionem non patitur, sed statim ubi attingitur totus in partes disceperitur, putrescere omnes humores in venis ostendit.

3. Colores cruoris quas habent significationes?

Colores sanguinis varii. *Rubicundus & per superficiem aequaliter floridus color durescentis sanguinis boni & saluberrimi est index.*

Citrinus. *Citrinus color bilis flava exuberantiam in sanguinea massa notat.*

Albus. *Ad albedinem vergens color, pituita naturalis redundantiam ostendit.*

Lacteus. *Lacteus color sanguini admixtus nativi*

caloris extinctionem ostendit, & mortem præthalis.

Niger, lividus aut plumbeus color atram bitem exuperare in corpore notat & putrefactionem.

Varii coloris cruor variorum humorum confusionem in sanguinea massa ostendit, & si contactu cruor resolvatur in partes exiguas, extremam putredinem humorum in venis declarat.

Infima pars sanguinis ut plurimum nigra est. Fex enim & terrestris pars sanguinis subsidet, & quanto copiosior, eo feculentior est sanguis: eadem fex sanguinis variis coloribus, rubeo, lacteo, livido, nigro est imbuta, & easdem habet significationes cum prædictis coloribus.

4. Odor sanguinis quas habet significationes?

Sanguis in venis inodorus est, nisi forte à Sanguis fragrantibus assumptis, vehementer olentibus naturalis pharmacis, quales sunt moscus, Bisem & inodorus. asa foetida, aut continuus ejus alii, suo odore sanguinem imbuant. Vbi præter hac sanguis foetet, & gravius olet, putredinis depuratorum corruptionis humorum in venis est indicium.

5. Sapor sanguinis quas habet significationes?

Et si sanguis haud degustari soleat, tamen si cui in os fortè inciderit, aut aliquem juret sponte periculum facere, qualis sit sanguinis sapor, & ex sapore redundantiam humoris prædicere is noverit,

Dulcem saporem ostendere salubrem & naturalem sanguinem.

Amarus sanguis flava bilis redundantiam arguit.

Acidus aut sipticus, melancholici humoris dominatum monstrat.

Inspidus pituitam exsuperare arguit.

Salsus, pituita salsa cum sanguine mixtionem docet.

6. Admixta seu contenta in cruore quas habent significationes?

Admixta sanguini sunt serum, aqua citrina, spuma, bulla, grana arenosa, pinguedo, pellicula telis araneorum simili recta.

Serum (Waddicke) vel aqua albicans, Serum al-

con-bicans.

concreto sanguini innatans, vel epatis imbecillitatem & refrigerationem, ut in hydrope, vel renum attrahitricis facultatis debilitatem, obstructionemque, aut in calculo, aut multam potus ingurgitationem significat.

Citrina
aqua.

Aqua citrina cruori innatans, bilis flava ex sanguinea massa non sufficientem segregationem ab epate & praternaturalem epatis constitutionem arguit.

Spuma.

Spuma cruori concreto adhaerens, aut fervorem incendiumque, aut agitationem vehementem à flatulentis spiritibus in venis inclusis cum humorem cuius colorem refert, demonstrat, aut rubra spuma sanguinis, citrina bilis flava, alba pituita, livida & subnigra melancholia.

Bulla magna.

Bulla magna per superficiem cruoris, aduterinos spiritus in venis inclusos arguit.

Granula.

Granula aut arena si in fundo pelvium in cruore deprehendantur, lepram & elephantiasin, aut morbum Gallicum notant.

Pinguedo.

Pinguedo aut adiposa materia per summam partem cruoris diffusa, quae obducta est pellucula araneorum telis simili, in obesis corporibus nihil insoliti, in macilentis autem adipis colligationem & marcorem totius corporis innuit.

7. Observatio cruoris quas habet utilitates?

Utilitas
inspectio-
nis sangui-
nis.
Hoc in
morbis pe-
stilentiali-
bus ma-
luni est in-
diciam, in-
dicat nam-
que in spi-
ritibus esse
malignita-
tem.

Diligens observatio cruoris à vena missi magnam habet utilitatem in morbis curandis ab humoribus ortis. Inde enim facile dignosci potest, utrum corpus sit plethoricum aut cacochymicum. Nam si omnibus pelviculis aequè rubicundus & inculpatus cernitur sanguis, plethoram significat & uberiores exigit vena sectionem. Si vero vitiosus est sanguis, ægrius ostendit, & praevalens vitiosus humor ex colore sanguinis dignoscitur, qui expurgari propriis pharmacis postulat.

SECTIO VI. DE SIGNIFICATIO- NIBUS SUDORIS.

Sudor
quid.

Quemadmodum urina est serosior superfluitas sanguinea massa in epate generata à renibus attracta: ita sudor est aquosior portio san-

guinis in venis contenti & ad extremitates venarum in cutem desinentium propulsa, quam natura in morbis per cutis spiracula excernere consuevit, ex cuius constitutione & modo profluxionis non contemnenda iudicia sumi possunt de natura & terminatione morborum.

1. Sudores quibus facile aut difficile erumpunt, & quibus morbis sunt proprii?

Quibuscunque, epar aut lien calidus est & humidus, siue salubriter degant siue agrosent, iis ex quavis causa sudores facile defluunt. E contra quibus epar aut lien vel emarcuit aut scyrrho obduruit, aut vehementer est obstructus, veluti fit in hydrope, icteritia, & hæmorrhæia, iis sudor difficile aut arte elici aut natura propelli potest. Plurimis autem morbis adeoque omnibus febribus maxime ardentibus, sunt sudores proprii ac familiares, ac in febribus quidem aut solutionem aut commutationem febris significant.

2. In sudoribus quæ sunt consideranda, & quot sunt sudorum differentie?

In sudore consideranda veniunt Tempus, In sudore quo videlicet tempore morbi profuat. Modus, quomodo erumpat, an criticè vel symptomatice. Qualitas, ex qualitate enim sudoris humores vitiosi dignoscuntur. Explorandum itaque est utrum sudor sit calidus vel frigidus, mitis vel acer, tenuis vel crassus, foetidus aut suavis.

Sunt autem duæ sudorum differentie à modo desumptæ, alius enim est criticus, alius symptomaticus. Differentia sudoris.

Criticus sudor est qui in ætate natura propulsione, expultricisque facultatis robore propellitur, qui naturalis & salutaris est. Vt plurimum enim morbi levamen aut solutionem secum adfert: is qualitate calidus est, & incipit à capite, deinde à reliquis etiam partibus sensim & copiose emanat. Talis sudor fit in fine paroxysmorum febrilium & in criticis diebus.

Symptomaticus sudor omnis praternaturalis est & insalubris. Est autem symptomaticus qui alio quovis tempore ac modo quam in ætate procidit, ut cum in morbi initio aut ante

ante *vel* aut ante signum concoctionis, aut in una sola aliqua corporis parte sponte profuit. Talis enim & natura debilitatem & humoris peccantis exuberantiam & morbi diuturnitatem minuitur.

3. Qui sudores sunt boni & salubres, & qui è contra mali & insalubres?

Sudoris salutaris indices.

Sudores boni ac salutare in morbis sunt: I. Qui in die critico profuunt. II. Post signa concoctionis. III. Post alvi evacuationes. IV. Non frigidi nec ardentes. V. Non trassi aut tennes nimis. VI. Non intercepti, id est, modo apparentes modo evanescentes. VII. Ex toto corpore aequaliter profuunt. VIII. Non insolite fetidi. IX. Morbi levamen & febris solutionem adferentes.

4. Sudores mali ac insalubres qui?

Sudoris insalubris nota.

I. Omnes extra *vel* emanantes, ut in initio morbi sudores mali sunt. II. Nondum parata concoctione prodeuntes. III. Frigidi sunt pessimi; animi enim deliquium adferunt. IV. Qui circa caput, faciem & cervicem tantum erumpunt; hi enim in acutis febribus moris sunt indices; in morbis vero mitioribus morbi longitudinem arguunt. V. Fetidi sunt mali; humorum enim putredinem & corruptionem in venis ostendunt.

Videatur Hippocr. in prognost. lib. 1. cap. 11.

SECTIO VII.

DE SIGNIS ASTROLOGICIS IN ARTE MEDICA SCITU NECESSARIIS.

1. Ad morborum naturam & eventus cognoscendos, prodesse Medico observatio signorum Astrologorum?

Humores augeri & diminui juxta Lunæ motum & mutationem.

Cum universalis experientia luculenter testetur, juxta Lunæ incrementum & decrementum, non tantum in corporibus animalium, sed & in stirpibus & arboribus augeri & diminui humores, & juxta qualitatem signorum in quibus progreditur Luna, juxtaque naturam planetarum Lunam irradian-

tium; humores quoque alterari, nemo inficias ire potest, Astrologicas observationes non prorsus scrupulosas in morborum naturis & eventibus dignoscendis non modo utiles, sed & necessarias esse.

2. Quo tempore morbi signa cælestia sunt consideranda, & quot sunt morborum tempora?

* Morborum tempora siue ætates sunt partes morbi, quæ successione vicissitudine mutantur, augentur, ac diminuantur, quorum curatione observatio Medico in morborum agendi modum indicat, id quod Hippocrates 2. Aphor. 29. innuit, ubi inquit: Cum morbi incipiunt, si quid movendum videtur, move. Cum vero consistunt morbi ac vigent, quiescere melius est.

Morborum autem tempora quatuor constituntur à Medicis, principium, augmentum seu incrementum, à quæ id est status siue vigor, & declinatio.

Principium est morbi prima invasio, in qua primum caduntur actiones: Quod in morbis longis usque ad signa concoctionis extenditur.

Augmentum est in quo magis magisque lauduntur actiones & severiora redduntur symptomata.

Vigor, status, à quæ, est in quo ad extremam debilitatem redacta est natura, & quasi cum morte decertare videtur.

Declinatio est quando morbus remitti & natura robustior fieri conspicitur, signaque concoctionis manifesta apparent.

Nemo autem in declinatione, nisi vel errore Medici, vel præva victus ratione mortuus est. Finis declinationis, morbi solutio nominatur. Fit autem morbi declinatio ut plurimum post criticam aliquam evacuationem. Et hæc quidem sunt tempora universalis morborum; verum morbi periodici, id est, per circuitus redeuntes, veluti sunt febres omnes intermittentes, epilepsia, & quicunque certos recurrentes habent paroxysmos, id est, accessiones siue exacerbationes: Tales quoque morbi præter illa universalis tempora, sua habent & particularia tempora, in quæ singuli paroxysmi dividuntur, cum externa partes refrigerantur.

Tempora morborum observanda.

4. Morbi tempora.

Principium.

Augmentum.

Vigor.

Declinatio.

In declinatione nemo ordinatiè moritur.

Morbi periodici qui.

Morborum periodorum temporum particularia.

rari incipiunt, adest oſeſitatio & horror: augmentum eſt ubi frigus remittit, & calor febrilis accenditur. Status ſeu vigor eſt ubi flagrans aſtus totum corpus occupavit: declinatio eſt quando calor remitti ſentitur. Verum paroxyſmi vocabulum ſape ab autoribus pro tota duratione febris ab invaſione uſque ad remiſſionem caloris uſurpatur, ut apud Hippocratem, qui inquit: In paroxyſmis à cibo abſtinere oportet. Quamquam lethales morbi & peracuti, veluti ſunt peſtis & apoplexia, talia tempora non conſequentur, quantum ad ſenſum, ſed ſtatim in principio interimunt. In mitioribus autem morbis quoque ope medica impediſſe hac tempora poſſunt, vel ad pauciora redigi, ita ut neque augmentum neque ſtatum conſequantur.

Signa porro cum morboſorum ſupra recitata, tum Aſtologica ſubſequentia duobus poſſiſſimum temporibus morbi ſunt diligenter obſervanda, in morbi nimirum principio & in vigore ſive ſtatu, & omnium maxime in diebus criticis. Crifis autem ut plurimum in vigore ſit, ac tum certis ſignis deſignatio ſit, utrum moriatur ager vel ſanitatē recuperet.

3. Quid eſt κριſις, & quæ ſunt ſigna futura κριſις, & quæ critica evacuationes ea ſigna comitantur?

Crifis quid. Κριſις, iudicium, eſt vehemens & ſubitus motus morbi contra naturam, & natura contra morbum, ita ut ſubita fiat morbi mutatio vel ad ſanitatē vel ad mortem.

Quomodo continetur. Eſt itaque κριſις pugna & duellum inter naturam & morbum in qua Medicus ex certis ſignis iudicare & prædicere poteſt, utrum natura morbum vel morbus naturam ſuperet. In omni κριſις ſit turbatio totius corporis, quam ſubſequentur excretiones ſive naturales evacuationes, quas ſi comitetur morbi mitigatio, naturam viſſe indicio erit.

Signa futura κριſις in morbis & ea conſequentes evacuationes in hiſce Tabellis comprehenduntur.

Signa critica ſunt,

Reſpirationis difficultas, Signa maxime ſubſecutura crifis.
Perturbatio rationis,
Caligo & alieni coloris in oculis obſervatio,
Oculorum rubor,
Genarum inſolita rubedo,
Lacryma ſpontanea,
Dolor calidus & pulſans capitis,
Dolor cervicis,
Anxietas & inquietudo,
Labri inferioris tremor,
Somnus profundus,
Vehemens ſitus.

Evacuatio- nes critica ſunt aut per

Sudorem largum, Species evacuationum critica- rum.
Alvi copioſam dejectionem,
Vomitum inſignem,
Sanguinis fluorem de naribus,
Urina copioſam emiſſionem,
Menſium perruptionem,
Hamorrhoidum apertionem,
Tumorem ſeu abſceſſum,
Cutis effloreſcentiam,
Scabiem ſiccā.

4. Quibus in morbis tales contingunt critica evacuationes, & quæ earum ſalubres & pernicioſæ?

Non in omnibus morbis ſit crifis, ſed in iis Quando crifis exſpectanda.
duntaxat qui ex vitioſis generati ſunt humoribus, & in frigidis ac borealibus regionibus rariffimè exſpectantur critica exactè evacuationes. Vbi autem in aliquo morbo contingunt, juxta humorum varietatem & loci affecti naturam, variantur & ipſæ evacuationes, ut qui ſanguine copioſo reſerti ſunt, iis in morbis critica evacuatio contingit, aut per ſanguinis de naribus profluvium aut per phlegmonas, aut per cutis effloreſcentiam, & ex iis ut plurimum antecedunt ſigna, dolor capitis, oculorum, genarumque rubor, color rubeus aut ſplendidus oculis obverſans.

Qui flavæ bilis copia moleſtantur in morbis, Bilioſum crifis.
illis critica evacuatio contingit, aut per bilioſas alvi dejectiones, aut per bilioſum vomitum, aut per cutis totius pruritus ſcabiemque ſiccā.

Qui

Signatur
Larocum
et cetera


Species
variancia
nam cit
caum

Quod
ex
speculato

Quoniam
vultu
canit

Pluribus
conum
in quibus
etiam

Etiam
nam



**Pituitoso-
rum crisis.** Qui pituita vitiosa exuberantia laborant, eos evacuat natura in xxiij. aut per vomitum pituitosum, aut per tumorem pedum, aut per oedemata.

**Melan-
cholicorum crisis.** Qui vitiosa atra bile infestantur, iis in xxiij. fit evacuatio, aut per nigras alvi dejectiones, aut per hamorrhoides, aut per tumores lividos ac nigros.

**Seroso-
rum crisis.** Qui offenduntur serosa humorum superfluitate, iis in critico die copiosus sudor profuit.

**Qualis
contingat
crisis in
partium
quorundam
affectionibus.** Iuxta partis affecta quoque naturam ex capite per sanguinis è naribus eruptionem, ex ventriculo per vomitum, ex epate & splene per alvi dejectionem & urinam, ex renibus & vesica per solam urinam, ex utero per eruptionem mensium semper fit critica evacuatio.

**Duo in omni
crisi obervanda.** Porro in omni Crisi, criticaque evacuatione duo sunt potissimum consideratione digna: 1. Vires agrotantis, qua per pulsus Arteriarum: 2. Concoctionis signa, qua ex urina & excrementorum alvi constitutione discernuntur.

**Quando
bona crisis
speranda.** Viribus enim constantibus & signis concoctionis apparentibus, si critica evacuatio in morbo contingat, fiatque per vias convenientes pro natura partis affecta, certissima spes sanitatis promittitur.

**Quæ crisis
fit perniciosa.** E contra perniciofa & lethales sunt Critica evacuationes, quæ sunt viribus lapsis & prostratis, signis cruditatis apparentibus non per naturales vias prodeuntibus, & post quas nulla fit morbi mitigatio, fiatque cum difficili respiratione, rationis perturbatione, & naso acuto, oculisque concavis, genisque collapsis existentibus, quæ ferè omnia signa sunt præsentis mortis.

Facies. Hippocratica lib. 1. sing. c. 11. 5. Qui dies morborum habentur Critici, & quæ est causa cur aliis diebus magis minusque commoveantur humores.

**Dies critici qui-
nant.** Hippocrates & Galenus satis scrupulose morbi dies in tres septimanas dividunt, & primæ septimana attribuit 7. dies, secundam septimanam numerare incipiunt ab octavo die & numerant usque ad 14. sed tertiam septimanam non per successionem, ut priores duas à 15. die numerant, sed à fine secundæ septimane, videlicet die 14. numerant usque

ad 20. & ita finalem diem cuiuslibet septimane pro critico die constituunt. Sunt autem signales dies trium septimanarum 7. 14. & 20. & ita deinceps. Verum nullas addunt demonstrationes, & experientia testatur, sæpe non hisce diebus, sed 8. 15. & 21. criticas fieri evacuationes: longe autem certior est supputatio Ptolomæi, qui & certas rationes addit & cum experientia congruit. Causas autem dierum criticorum Ptolomæus refert ad motum Luna. Cum enim Luna sua insita virtute in corporibus animantis gubernet ac moderetur; Sol vero suo calore spiritus vitales regat, in conjunctione & oppositione quadratoque aspectu horum duorum corporum varia sunt mutationes & conturbationes humorum in corporibus nostris. Itaque in initio morbi primum ex Diario vel Ephemeridibus inspicendus est & locus Luna in quo nimirum signo progrediatur & signum huic oppositum, in quo perpetuo fit crisis. Opposita vero signa ex hoc versiculo cognosci possunt. Ar: Li: Tau: Scor: Ge: Sa: Can: Ca: Le: A: Vir: Pis: Signa enim opposita sunt critica.

Opposita autem signa attingit Luna suo motu circa 20. aut 21. diem. Similiter Luna ubi tria signa confecit, id est 90. gradus Zodiaci à signo in quo egrotare cepit, id quod septimo die vel octavo contingit, fit iterum crisis, quia ex quadrato irradiatur à Sole. Si autem morbus extendatur ab opposito signo rursus ad quadrantem, iterum crisis est expectanda. Summa primum quadratum Zodiaci conficit Luna septimo vel octavo die, secundum quadratum attingit 20. aut 21. die: Hac autem omnia in sequenti Schemate uno intuitu facile deprehendi possunt.

Hic inferendum Schema.

In præfenti Schemate dua continentur Tabula, inferior stabilis, & superior mobilis. In inferiori tabula habentur 4. circuli, quorum primus & extremus ex intervallis nigris & albis constans, gradus signorum continet. Secundus circulus numerum graduum cuiuslibet signi complectitur. Tertius

Ptolomæi
sententia
de diebus
criticis.

♂ & ♀
☉ & ☾
variè mu-
tant cor-
pora.

Causæ die-
rum criti-
corum A-
strologi-
corum.

Vfus præ-
cedentis
Tabulæ.

*Characteres signorum Zodiaci habet, quar-
tus qualitates signorum indicat. Superior &
mobilis Tabula qua pinnam habet eminen-
tem, & hæc ipsa quatuor circulos complecti-
tur, quorum exterior & primus ex albis &
nigris intervallis constans dies mensis, se-
cundus numerum dierum, tertius officia vel
affectus dierum, & quartus ac Medicus aspe-
ctus & dierum & signorum oculos ponit.
In principio itaque morbi inquirendus est in u-
satis diariis locus Luna, & pinnula superio-
ris Tabula ad hunc gradum signi, in quo
est Luna revolvenda, ac tandem pinnula seu
index membranæ ex centro superioris Tabula
protensa, eoque dirigenda, donec ad quadra-
tum aut oppositum signum Luna pervenerit,
ubi & dies & hora & minuta crisis se ultro
offerunt.*

6. Quid de morborum qualitate & eventu prælagiendum ex Lunæ in singulis signis Zodiaci constitutione & Planetarum irradiatione in principio morbi?

Vt juxta
Lunæ mo-
tum hu-
mores
movean-
tur.

Univerſalis experientia edocuit juxta qua-
litates ſignorum Zodiaci, in quibus Luna in
principio agnitudinis movebatur, morbos ex
humoribus poſſiſſimum ortos iſdem qualitati-
bus cum ſignis imbutos eſſe, & juxta oppoſi-
tiones, conjunctiones, quadraturas, maximas
morborum fieri mutationes, præſertim ſi Lu-
nam Planeta feliciter aut infortunatè fuerint
intuiti. Quid autem ex motu Luna in ſingu-
lis ſignis Zodiaci & naturis planetarum mali-
gorum Lunam afficiuntur ſit vaticinan-
dum, id ſequens tabula docebit.

Tabula de eventibus morborum, juxta
Lunæ motum in 12. signis Zodiaci.

Si quis agrotare ceperit, Luna existente in Ariete, & afficiente Solem vel Martem ex opposito vel quadrante aspectu, aut si fuerit Luna iisdem conjuncta, morbus erit in capite ex praternaturali calore ortus cum febre ardenti & praecordiorum inflammatione, siti vehementi, & mentis alienatione; ac nisi per vena sectionem & alia convenientia pharmaca auferatur causa morbi, morietur aeger, ubi Luna ad quadratum aut oppositum signum pervenerit.

At si Luna Saturno sit juncta vel Saturnus in ♄
eam opposito vel quadrato aspectu intueatur cum ♄ &
tr, morbi causa erit, aut refrigeratio cere- vel ☐ ♄.
bri, aut crassorum, frigidorumque humorum
in capite collectio, quam comitatur capitis
gravitas, catarrhus, tussis, lenta febres, &
intempestivi sudores: moritur aeger nisi a be-
nignis Planetis in opposito & quadrato signo
Luna fuerit septa.

Quicumque incidere in morbum, Luna in ♋
Taurum peragrans, ut plurimum partes in cum ♋
colo contenta hinc afficiuntur, & si in initio vel ☐ ♋
morbi Luna conjunctus, vel eam afficiat
quadrato aut opposito aspectu Mars, morbi
causa erit redundantia & ebullitio sanguinis,
ex qua concitatur continua febris, consti-
patio corporis & continua vigilia; cui nisi
tempestivè medica ope occurratur, aut in
quadrato opposito signo Lunam benigni Pla-
netæ feliciter intueantur, moritur ager ante
oppositionem aut novam conjunctionem Lu-
na cum Sole.

Si vero Luna in Tauro existente Saturnus in ♄ sit conjunctus vel eam ex opposito quadratoque respiciat, morbi origo erit ex crapula & cruditate, cruditatem sequitur putrefactio, putrefactionem febris cum dolore hypochondriorum & articularum, & si in quadrato vel opposito signo Mars Lunam intueatur, moritur ager. Sed si tum irradiata fuerit à benignis Planetis, ager periclitatus servabitur, tamen præsertim ubi accesserit Medici fortunati industria & fides.

Luna in Geminis initio morbi existente, si ei sit conjunctus vel eam opposito aut quadrato affectu feriat Mars, morbi causa erit bilis rubra effusio, quam comitatur febris tertiana, sius vehemens & vigilia; & si Luna non fuerit irradiata à benignis Planetis cum pervenerit ad quadratum locum aut oppositum, ejus loco in quo fuit initio morbi, moritur ager. Saturno vero conjuncta si fuerit Luna, vel ex opposito aut quadrato eam afficiat, universum corpus dolebit, & continuis vigiliis instabitur, splenisque dolores & tumores sentiet, & morbus erit diuturnus; ac nisi medicamentis succurratur, aut Luna in opposito loco for-

tunatis planetis conjungatur, occidit ager intra 30. dies.

Si quis inciderit in agritudinem Luna in Cancro progrediente, eique adjunctus sit Mars, vel eam ex opposito aut quadrante aspiat, morbum ex ebullitione exassationeque sanguinis & bilis flava effusione ortum esse ostendit, quam & febris & crebri vomitus subsequuntur, & nisi in sequenti quadratura aut oppositione, Luna à benignis Planetis illustretur, & certis prædiis medicis morbi causa removeatur, agrum succumbere necesse est; ubi autem Luna in Cancro existens à Saturno iisdem aspectibus irradiata fuerit, morbi causa erit vehemens refrigeratio vel ab aëris vel balnei intemperie, quam comitatur catarrhus ad thoracem defluens, & tussis dolorque ventriculi, qui morbus non caret periculo, si priusquam Luna attingat oppositum signum, à benignis Planetis circumseptum non fuerit.

Si quando Luna in morbi principio Leonis signum obtineat, & Martem sibi habeat aut adjunctum, vel ex opposito aut quadrato eam irradiata fuerit, morbi origo erit ab inflammatione sanguinis, & ager molestabitur continua & periculosa febre, fastidio ciborum & fluxione alvi, & si Sol simul jungatur Luna aut ei opponatur, cor & epas exardescunt & capitis cruciatus excitant, & si in sequenti oppositione aut quadrato à benignis Planetis Luna destituatur, agrotus interibit.

Si vero Saturnus Luna in Leone sit junctus, aut eam adversis radiis feriat, ager lienis obstructione & intemperie calida laborabit, cui & febris quartana succedit. Eventus autem morbi ex natura Planetarum, qui Lunam feliciter aut infeliciter irradiant, ubi pervenerit ad quadratum aut oppositum signum, dignosci & judicari potest.

Si quispiam decumbat vel agrotare incipiat dum Luna est in Virgine, & Mars ei conjunctus, vel eam aspectu opposito aut quadrato intueatur, tum ager alvi fluore, dysenteria & intestinorum exulceratione laborabit, & prostratam habebit appetentiam;

in opposito signo si Lunam aspexerint malitiosi Planeta, periclitabitur ejus vita; benigni autem planetis eam intuentibus, periclitatus tandem servabitur. Vbi vero in eodem signo Saturnus infaustus radiis Lunam feriat, morbi causa erit cruditas ventriculi, quam tormina sequentur intestinorum. De eventu vero morbi ex natura Planetarum in sequenti oppositione Lunam intuentium judicium est ferendum.

Luna ubi in principio agritudinis in Libra signo fuerit constituta, & Mars ei aut copuletur, aut ex opposito quadratoque signo eam intueatur, morbus ex ebullitione sanguinis ortum habebit, & intensa ac continua febris molestabitur. Adsumt & vigilia, & nisi sanguis detractione & medicamentorum convenienti applicatione tollatur agritudinis causa, moritur ager, ubi Luna pervenerit aut ad quadraturam aut ad oppositum signum. Saturno vero Luna conjuncto, aut eam hostiliter aspiciente, morbi causa ex helluatione, & nimia vini calidorumque potatione morbus fuit exortus, quam subsequuntur dolores capitis, oculorum rubedo, destillationes cerebri in pulmonem, & vehementes tusses; sed convalescet ager nisi erret in victus ratione, aut in opposito signo Mars Lunam hostiliter feriat.

Quicumque inciderit in morbum Luna in Scorpio progrediente, si prædictis aspectibus Lunam Mars aut Sol irradiet, morbi causa erit inflammatio putridorum humorum, seu febris putrida à vesica obstructione aut calculo. Evadet autem ager, nisi simul infausto intuitu Saturnus suum virum in Lunam infundat, ubi Luna ad quadratum vel oppositum signum pervenerit. Verum si Saturnus Luna sit conjunctus, aut teris radiis eam feriat, morbus erit aut bubo inguinum, aut inflammatio, aut exulceratio obsecnarum partium, aut hamorrhoidum apertio, qua affectiones ut plurimum contingunt ex putrefactione humorum, aut ex veneni haustu. Eventus morbi ex sequenti oppositionis constitutione & planetarum natura judicandus erit.

¶ in ♃
cum aspe-
ctu ♄.

Luna in principio morbi currente in Sa-
gittario, si Mars conjunctus ei sit aut qua-
drato oppositque aspectu eam intueatur,
morbus erit ex calida intemperie aeris, aut
balnei, aut ex crapula, cui accedit dolor ca-
pitis totiusque corporis, & vomitu fluxu-
que ventris ager infestabitur. Saturnus ve-
ro si fuerit Luna conjunctus aut oppositus,
morbus originem ducit ex acerbis & tenui-
bus cerebri destillationibus, & secum affert
febres, in quibus externa quidem frigent,
interna vero ardent & articularum do-
lores.

¶ in ♃
cum aspe-
ctu ♄.

¶ Vbi Luna in initio morbi Capricornum oc-
cupaverit, & ei conjunctus sit Mars, vel
eam ex opposito aut quadrato aspexerit, a-
ger ventriculi cruditate & bilis prassina vo-
mitione laborabit, cui accedit & ardens
febris, in quadratura aut oppositione fit mu-
tatio morbi, juxta naturam Planetarum,
qui tum aspicunt Lunam. At si Saturnus
in eodem signo Luna sit conjunctus aut ho-
stilitate eam feriat, morbus ortum habet ex
frigida intemperie, quam consequitur te-
nuium humorum destillatio ad thoracis par-
tes & inde tussis nocturna. Morbus erit diu-
ternus, convalescet tamen ager, si modo
benigni Planeta in opposito signo eam aspe-
xerint.

¶ in ♃
cum aspe-
ctu ♄.

In initio agitudinis si Luna in Aquario sit
collocata & eam Mars radiis suis infelicitate
feriat, ager laborabit aut icteritia, aut scor-
buto, tibiurumque calidis humoribus, si Lu-
nam benigni planeta aspexerint, ubi ea ad
oppositum signum progressa est liberaliter ager.
Saturnus vero Luna eodem signo conjunctus,
aut oppositus in initio morbi, tunc causa mor-
bi erit melancholici humoris redundantia,
aut lassitudo & defatigatio. Convalescet au-
tem ager antequam Luna oppositum signum
attingat.

¶ in ♃
cum aspe-
ctu ♄.

Luna si fuerit in piscibus in principio mor-
bi, & eam infelicitate intueatur Mars, mor-
bus originem ducit ex ebullitione sanguinis
& bilis flava, cujus primitiva causa erit
helluatio & crapula. Flagrabit ager, vigi-
liisque infestabitur atque siti, & moritur
ager ubi Luna oppositum attingit signum, ni-

si à benignis Planetis circumsepta fuerit. Sa-
turnus autem in piscibus Luna vel adjunctus,
vel in opposito signo collocatus, ostendit mor-
bum esse ex frigida intemperie natum, qui
cum capitis dolore & ventriculi imbecillita-
te est conjunctus, & nisi Lunam aspiciant be-
nigni Planeta, antequam in oppositura si-
gnum pervenerit, succumbet agrotus.

7. Unde sumuntur præcipua signa salutis
& mortis in gravioribus morbis?

Morbi graviore sunt similes ponderibus
seu oneribus molestissimis. Natura autem hu-
mana portatori seu bajulo onerum est similis.
Meta ad quas ferendum est onus, sunt vel dies
critici, vel oppositionis, conjunctionisque Solis
cum Luna à principio morbi. In signis itaque
salutis & morbis investigandis primum meta
sunt inspicienda.

Deinde morbi magnitudo & robur virium
considerandum est, quorum collatione facile
Medicus & de salute & de morte agroti ali-
quid certi vaticinari potest. Si enim vires a-
grotantis tanta sint, ut onus & violentiam
sustinere queant, ad dicta tempora convalescet
ager, ubi vires lapsa sunt aut impares ferenda
servitia morbi, mori agrotum necesse est. Suc-
cumbit enim sub pondere antequam ad metam
perveniat. Sumuntur autem signa cum salu-
tis tum mortis, I. A substantia morbi. Cum
enim morborum alii sint tuti, alii lethales
morbi, tuti & placidiores brevi supe-
rantur, vel à natura vel ab arte, & eva-
dit ager: Lethales autem morbi quales sunt
fortis apoplexia, semper sunt exitiales. II. A
causis morbi: Qui morbi à levioribus causis
oriuntur, quales sunt qui ex humorum redun-
dantia vel plethora ortum ducunt, & hi
vincuntur vel natura vel arte: Qui verò à
lethalibus causis generati sunt, veluti ex
veneno vel venenosis humoribus, exitiosi
sunt.

III. A loco affecto. Periculosi morbi sunt
hærentes in partibus principalioribus, ut in
corde, cerebro, diaphragmate, vesica & pul-
mone. Earum enim partium vulnera, exul-
cerationes & tumores duri, semper sunt le-
thales. In aliis autem minus principalio-
ribus partibus omnia sunt tutiora.

¶ in ♃
vel ♄.

Compara-
tio inter
naturam
& mor-
bum.

Signa e-
ventus
morbi un-
de desum-
mantur.

Morbi cer-
tarum par-
tium le-
thales.

IV. Ab

IV. Ab excrementis à corpore in vigore seu ἀκμῇ morbi. Nam, ut diximus, urina aut nigra aut livida, & nigra alvi excretionis, in ἀκμῇ vel crisi semper sunt pernicioſa.

V. A ſimilibus caſibus. Similes enim morbi ut plurimum conſimiles naſcuntur exitus.

VI. A geſtu ſeu forma decubitus. Geſtus enim in vehementia morbi ſimiles geſtum ſanorum ſalutem permittunt. Multum vero diſſimiles mortem ut plurimum denunciant. Item ſupinus decubitus manibus & pedibus diſſentis vel proclivis deſpecto verſus pedes corpore, lethalia ſunt

ſigna. Denudare pedes, manus diſpergere, diſpoſitione corporis & geſtibus, hianti ore dormire, muſcas fruſtra venare, feſtucas colligere, pilos de veſte incaſſum evellere, aut ſtipulas de pariete, omnia hac ſigna ſunt exitioſa. His annumerat Avicenna, faciem mortuorum faciei ſimilem, temporum collapſionem, oculorum profunditatem, palpebrarum contorſionem, naſi acumen, frigiditatem extremarum partium, viriditatem aut lividitatem unguinum, lachrymarum involuntariam profuſionem, & reſpirationem per nares frigidam. Item dentium præter conſuetudinem ſtridoremque omnia inter lethalia numerat ſigna.

Hippocratica facies Medicis dicitur. Videatur Hippoc. in prognosti-

COMPENDII

ARTIS MEDICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER QUINTUS.

ET ULTIMUS,

De generali methodo medendi, & remediis uſitatoribus.

SECTIO I.

DE CURATIONE MORBORUM

IN GENERE.

I. Quæ eſt quinta Artis Medicæ pars?



Quinta & poſtrema artis Medicæ pars, quam Græci ἰατρικὴ καὶ ἰατρικὴ, id eſt Medicatricem vocant, ea eſt quæ medendi optimam & legitimam rationem, id eſt morborum ac ſymptomatum, cauſarumque mortificationum per convenientia remedia ſublationem & ſa-

nitatis labefactata reſtaurationem præſcribit, ac docet, quæ præclariffima artis pars, finis eſt totius artis, propter hanc enim ſolum expeditur ars Medica.

2. Curatio ſeu Medicatio quid eſt?

Ἡ ἰατρικὴ, Curatio ſeu Medicatio eſt recta atque conveniens remedium in proſtigandis morbis uſurpatio. Eorum autem recta Remedio uſur-

Ἡ ἰατρικὴ, finalis Medicinæ pars.

rum rectus usurpatio est, cum recta ratione, idonea quantitate & legitimo modo corpori adhibentur.

3. Qualia debent esse morborum remedia?

Principale Remedia omnia ea dicuntur quaecunque morbum sive affectum corporis praternaturalem depellunt. Morbus autem omnis contrariis profligandus est. Contraria enim sunt Morborum remedia. Nugatur igitur Philippus Bombastus, qui se Theophrastum Paracelsum appellat, & ut totius Philosophia principia, ita & hoc certissimum aequum Medicum evertere conatur, & non contrariis contraria sed similia similibus curari contendit.

Rata enim & constans est Medicationis Lex, Non semper Morbos omnes contrariis curari. Quod enim per tamen quidam morbi aliquando per sibi similia curantur, & febres ardentes per calidam radi-

cem Rhabarbari, aut succum Scammonii, id opinione contingit non propter similitudinem febris & constans Rhabarbari, sed per contrarias actiones, auferendo causam febris: est itaque Rhabarbarum febris causa contrarium, & curat causam morbi per se, morbum autem ipsum per accidens. Sic lassitudo curatur pro exercitium, quia causa lassitudinis, qua est humor per musculos diffusus, per exercitium discutitur.

4. Quae qualitates Morborum & Medicamentorum sunt ad invicem contrariae?

Contraria vel contrarietas in arte Medica, non tantum de qualitatibus, sed & quantitate & actionibus dicuntur.

Præcipue autem contrarietates morborum & remedium in sequenti Tabella comprehenduntur.

Tabella contrariorum morbis Remediorum.

Morbis & causis mor-bificis	Contraria remedia sunt		
Frigidis,			Calefacientia:
Calidis,			Refrigerantia:
Humidis,			Exiccantia:
Siccis,			Humectantia:
Craffitiei,			Extenuantia:
Tenuitatis,			Incrassantia:
Duricie,			Emollientia:
Molliciei,			Indurantia:
Lenitatis,			Exasperantia:
Coarctationis,			Dilatantia:
Occlusionis,			Aperientia:
Plenitudinis,			Evacuantia:
Vacuitatis,			Replentia:
Humorum exagitationis,			Sedantia:
Humorum defluxionis,			Inhibentia:
Humorum lentoris,			Incidentia:
Humorum acrimonia,			Lenientia:
Humorum putredinis,			Alexipharmaca.

5. Quotuplex est morborum Curatio?

Curatio triplex per Medicorum celeberrimi qui que *ἰατρικὴν* seu curatricem Medicinam sumptis differentiis à materia Medica, qua in curandis morbis utuntur, in tres partes sive in tres curandi species dividerunt, *ἡ ἐξωτερικὴ* qua manuali operatione foris remedia applicat; *ἡ ἐνδοτικὴ* qua victus ratione morbo con-

traria medetur; & in *ἡ ἐνδοτικὴ* qua contraria morbo medicamenta & intus & foris adhibet.

Omnium autem harum curationum exempla in processu curationis, suis in locis ostendemus.

6. Quae Medicatio est laudatissima?

Ea curatio salutaris, & laudatissima est, qua

Citò.

Tutò.

Iucundè.

qua citò, tutò & iucundè perficitur. Oportet itaque Medicum citò curare quantum fieri potest. Longa enim dilatio & molesta est & periculosa agrotanti. Debet & tutò curare, ut iuret, aut saltem non noceat & periculosa excitet symptomata. Iucundè autem is curat, qui non excarnificat, sed blandè, benignè, & mississimè agrotantiem tractat. Id prestare est insigne Dei donum in Medico.

7. Quarum rerum noticia instructus esse debet Medicus ad curationem morborum accedens?

Sex sunt Medico morbos feliciter curaturo scitu necessaria.

Quæ Medico prænotoscenda ante curationem.

I. Noticia ponderum ac mensurarum medicinalium & characterum quibus ea in Medicorum libris depinguntur.

II. Noticia remedium uisatorum, quibus cum ad concoquendos vitiosos, tum ad expurgandos utimur, & qua cuiuslibet remedium sit dñs sive exhibendi quantitas.

III. Noticia remedium cum simplicium tum compositorum, qua principalioribus corporis partibus tota sua substantia medentur.

Quæ de re videatur Gal. I. 11. meth. c. 13.

IV. Via ac meatus corporis, per quos ex partibus principalioribus vitiosi humores commode per medicamenta evacuari possunt.

V. Noticia forma remedium compositorum in qua medicamenta usurpari solent in curatione morborum.

VI. Generalissima axiomata & regula in omni curatione observanda.

SECTIO II.

DE MEDICAMENTORUM PONDERIBUS ET MENSURIS.

I. Quæ & quot sunt pondera ac mensuræ medicinales, & quibus characteribus notulisque in Medicorum libris adnotantur?

De ponderibus & mensuris veterum vide Heur.

Veteribus Medicis longè plures fuerunt ponderum ac mensurarum species & notula, quibus brevitatis causa in suis scriptis utebantur. Hoc autem seculo 14. tantum notulis &

literis brevitatis causa utimur, quibus & nomenclaturæ, & abbreviatio-nes o-mnes significantur, qua in sequenti Tabella comprehenduntur.

Tabella characteres & nomenclaturas ponderum & abbreviationum Medicinalium complectens.

1. Gr.	Significant	Granum:
2. ꝰ.		Scrupulum:
3. Ꝓ.		Drachmam:
4. ꝓ.		Vnciam:
5. ℥.		Quadrantem:
6. ℥.		Libram:
7. M.		Manipulum:
8. P.		Pugillum:
9. s.		Semissem:
10. n.		Numerum:
11. R.		Recipe:
12. an.		Ana:
13. q. s.		Quantitatem sufficientem:
14. p. a.		Partes seu portiones aequales.

2. Quæ sunt significationes harum notularum, & quantum quodlibet pondus Medicinale pendet?

Gr. granum, λεπτον, ein Gran/est pondus Medicinale omnium minimum, & quamquam grano hordei in officinis aestimetur, tamen proprie granum numerarium, quo utuntur aurifabri, significat ein ꝑ.

ꝰ. Scrupulus, γραμμα, der dritte theil von einem Quintlein/ est tertia pars drachma, & est pondus continens in se 24. granorum numerariorum quantitatem vel mensuram.

Ꝓ. Drachma, δραχμή, ein Quintlein est octava pars uncie, & pendet tres scrupulos.

ꝓ. Vncia, ὀγγία, ein Unze oder zwey Loth/ & est duodecima pars medicinalis, & continet in se 8. drachmas.

℥. Libra sive pondo, λίτρα, ein Pfundt: Libra quidem Medicinalis ex 12. mercatorum vero ex 16. uncis constat: & hoc tempore in phar-

pharmacopoliis in consiciendis medicamentis & mensurandis liquoribus libra medicinali, id est 12. unciiis pro libra utuntur. In dividendis vero rebus aridis & aromatibus 16. uncias pro lb sumunt, quæ duplicata 32. semiuncias, quæ mercatoribus ein Loddit dicitur, pendunt.

℞. Quadrans, τετραρτηριον, ein Vier-
tel / est quarta pars libra, quæ constat in pon-
dere medicinali ex tribus, in mercatorum ex
4. unciiis.

M. Manipulus, χειροπηγισ, ein Hand-
voll. Herba & flores non pondere sed mani-
pulo seu fasciculo mensurantur: & est tanta
mensura, quantum manu complecti possumus.

P. Pugillus, δακτυλος, est quantum quatuor
summis digitis comprehendere possumus.

S. Semi vel media pars. Hac notula omni-
bus ponderibus vel per se, vel cum aliis nume-
ris adjici potest, & medietatem ejus ponderis,
cui additur significat, ut exempli gratia ℞ s,
3 i s, id est, scrupulus dimidiatus, dragma u-
na semis.

℞. Recipe. In scedulis medicatoriis, quas
Receptas vocant, semper est principalis litera,
& significat Recipe, accipe, sume, videlicet
rerum subsequentium.

Reperitur
etiam hæc
vox apud
Evange-
list. Matt.
c. 20. v. 9.
ibique sin-
gulos si-
gnificat.

An. Ana est vox Arabica, cujus notula
semper post duorum aut plurium medica-
mentorum enumerationem ante characteres
seu notulas ponderum inscribitur. Significat
autem ana aequales omnium prescriptarum re-
rum partes, & tantam portionem, quantam
subsequens ponderis numerus indicat.

℞ s. Quantitatem sufficientem. Ha dua
litera reperiuntur interdum in scedis medi-
catoriis & libris Medicorum, ubi certum pon-
dus aut mensura non exprimitur, sed phar-
macopæi arbitrio permittitur, convenientem
mensuram, quantam artificiosa conjectura
satis esse judicaverit, accipiendi.

P. a. Partes aequales cujusque supra scripti
sumendas indicat. Hac omnia exemplis illu-
striora sunt.

1. Potio crassos humores extenuans & concoquens, obstructosque mea-
tus aperiens.

Potio di-
gestiva.

℞. Rad. Feniculi,

Petroselini,

Apii an. ʒ iiii.

Asari.

Sem. Sileris montani,

Pastinacæ,

Anisi an. ʒ ii.

Herb. Srodii,

Cardui benedictæ,

Centaurei minoris an. M. s.

Conf. Boraginis,

Buglossæ an. ʒ s.

Vvarum passarum ℞ s.

Concidenda concidantur, & contundenda
contundantur, & decoquantur in aqua pura
q. s. ad tertias, colentur, colatura admi-
sceantur,

Syruporum de Calamintha,

de Eupatorio,

Oxymellis simplicis an. ʒ iiii.

Fiat potio.

2. Haustus bilem & Pituitam purgans.

Haustus
purgans.

℞. Fol. Senes Alex. ʒ i i.

Rhabar. ʒ i.

Cinam.

Spica Indica an. ʒ s.

Contusa macerentur in aqua Cichorei ʒ iiii.
per noctem.

Mane ebulliant leni ebullitione, & expres-
sa colentur, ac colato juscule admisceantur,

Elect: Lenitivi,

Diacatholici an. ʒ i.

Fiat haustus; exhibeatur tepidus in auro-
ra 6. horis ante prandium.

3. Pulvis ad corroborandum vetricu-
lum, Magen Pulver.

Pulvis
corrobo-
rans.

℞. Cinamoni,

Zinziberis,

Galangæ an. ʒ ii s.

Margaritarum preparatarum,

Coralliorum rubeorum preparatarum

ʒ iiii.

Saccari albi ʒ iiii.

Pulverisata misceantur, fiat tragea.

Haustus
sudorifi-
cus.

4. Haustus sudorificus, venenatos ha-
litus è corpore discutiens.

R. Theriaca Andromachi,
Mithridatii optimi an. 3s.

Pul. Zedoaria,
Angelica,
Scordii an. 3 s.

Aquæ Scordii 3 iii.
Aceti rosacei 3 i.
Misceantur, fiat haustus.

Pillulæ
capitales.

5. Pillulæ capitis excrementa purgantes.

R. Mas. pil. Aurearum,
Cochiarum,
Aggregativarum 3 i.
Trochiscorum de Agarico 3 s. cum a-
qua Najorana.

Formentur pillula numero quindecim,
deglutiantur in aurora.

Vnguen-
tum refri-
gerans.

6. Unguentum ad inflammationem &
punctiones Epatis.

R. Oleorum Rosacei,
Cytioniorum,
Mastichis,
Nymphae an. 3 ii.

Cera alba q. s.

Fiat linimentum, quod eluatur cum
aceto rosaceo, deinde admi-
sceantur pul. Mastichis 3 i.
Camphora gr. ii.

evacuandos vitiosos humores accommo-
data, & quæ est cujuslibet δῶσις;

Singulis quatuor vitiosis humoribus pecu-
liaria remedia sunt inventa, cum ad exte-
nuandos & præparandos, tum ad evacuan-
dos, quæ non tantum sua qualitate, sed &
specificis virtutibus humores vitiosos conco-
quere & evacuare possunt, quorum catalo-
gus & exhibendi mensura in sequentibus ta-
bellis comprehenduntur.

Tabella remediorum sanguinem vi-
tiosum emendantium.

Sangui- nem pu- rificant	Fumaria, fimsfern /
	Lupuli asparagi, junger
	Hopfe /
	Radices cicorea, Hindtloz
	beß wûrtzel /
	Fructus Thamarindi,
	Pruina Ungarica,
Manna,	
Pulpa cassia, cocta in sero lactis	
caprini, cujus δῶσις est	
3 i s.	

Potio sanguinem purificans.

Sangui-
nem puri-
ficantia.

R. Fumaria viridis M. i.

Rad. Cicorea 3 i.

Contusa coquantur in q. s. feri lactis capri-
ni, exhibeantur mane ac vespere 3 v.

Sanguis in corpore verno tempore redun-
dat, qui si quantitate peccet, nunquam per
medicamenta, sed per venæ sectionem detra-
hendus est. Mala vero ejus qualitas præscri-
ptis remediis commodè corrigi potest.

Venæ sec-
tio verno
tempore
convenit.

SECTIO III.

De

USITATIONIBUS RE- MEDIORUM FORMU- LIS AD CONCOQUENDOS ET EVACUANDOS HU- MORES MORBIFICOS.

i. Quæ sunt usitatoria remediorum genera
ad concoquendos, præparandos, &

Tabula Medicamentorum bilem flavam præparantium & evacuantium.

Bilem
temperan-
tia.

Flava bilis fer-
vorem miti-
gant,

{ Syr. Violarum,
Syr. Rosarum,
Syr. de Cicorea,
Syr. de Endivia,
Syr. Acetosatis ci-
trii,
Syr. Granatorum,
Syr. de Omphacis.

{ Δόσις syruporum pro
una vice est ℥ ii.
cum duplici mensu-
ra aqua aut deco-
ctionis

{ Hordei,
Endivia,
Cicorea,
Lactuca,
Boraginis,
Buglossa,
Acetosa,
Nymphaea.

Haustus fervorem bilis mitigans.

R. Syr. violarum,
Acetosatis citrii an. ℥ i.
Aq. Cichorea,
Endivia an. ℥ i i.
Misceantur, fiat haustus.

Exhibentur syrupi cum aquis stillatitiis vñs po-
aut præscriptarum herbarum decoctis, simul tionum
commixtis, ita ut dupla sit aquarum mensu- præparan-
ra ad syrupos, per tres aut quatuor dies mane tium.
ac vesperti, donec color urina immutetur: sem-
per autem tales potiones tepidas exhiberi con-
venit.

Cholago-
ga usita-
tiora.

Flavam bilem eva-
cuant

{ Pulpa cassia,
Rhabarbarum,
Hiera simplex,
Diaprunum solutivum,
Elect. de succo rosarum,
Elect. Lenitivum,
Pil. aggregativa,
Pil. de Rhabarbaro.

{ Quorum va-
lida dōsis est,

{ ℥ i s.
℥ i i.
℥ i.
℥ vii.
℥ vi.
℥ i.
℥ i.
℥ i.

Hæc pharmaca bilem evacuantia ut pluri-
mum in triplici forma exhibentur, haustus,
boli, & pillularum, semperque exhibenda
sunt diluculo sex ante prandium horis.

Bulus bilem evacuant.

Bulus.

R. Cassia recenter extracta ℥ i.
Pul. Rhabarbari ℥ i s.
Misceantur, fiat bolus.

Pillulæ bilem flavam educantes.

Pillulæ.

R. Massa pil. aggregativa.
de hyera simplici,
de Rhabarbaro an. ʒ i.
Diagridii gr. i i i.
Cum aqua absinthii formentur pillula, nu-
mero quindecim.

Haustus. Haustus biliosos humores evacuant.

R. Hyera simplicis ℥ i.
Elect. lenitivi ℥ s.
Aq. cichorea ʒ iv.
Misceantur, fiat haustus.

Tabella medicamentorum pituitam concoquentium & evacuantium.

Pituitam
præparan-
tia.

Pituitam con-
coquant &
extenuant

{ Mel Rosarum,
Oxymel simplex,
Syr. de calamentbo,
Syr. de stacade,
Syr. de Menta,
Syr. de Radicibus,
Syr. de Absinthio.

{ Quorum dō-
sis est ℥ ii.
cum aquis
stillatitiis
aut deco-
cto

{ Faniculi,
Hyssopi,
Betonica,
Salvia,
Ruta,
Absinthii,
Origani,
Menta,
Cardui benedicti,
Scordii.

Vfus dige-
rentium
in phle-
gmaticis.
Signa con-
coctionis.

In concoquendis & extenuandis humori-
bus pituitosis eousque exhibentur Syrupi tepi-
di diluculo & hora una ante Cœnam, donec
in urina signum concoctionis apparuerit: si-
gnum vero concoctionis perfecta est aureus u-
rina color, & hypostasis alba: imperfecta au-
tem suppalida & turbida urina. Δωσις Syru-
porum pro uno haustu est ʒ ii. cum duplici
mensura aquarum aut decocti.

Pituitam eva-
cuant

Folia sene,
Agaricus,
Turbitb,
Diaturbitb,
Diaphanicon,
Diacarthamum,
Elect. Indicum,
Benedict. laxativa,
Pill. aurea,
Pill. de Agarico,
Trochisci de Aga,
Trochi Albandali:

Pituitam evacuantiæ pharmaca ut pluri-
mum sub triplici forma exhibentur, potionis,
boli & pillularum, idque perpetuo in aurora,
sex ad minimum horis ante prandium.

HAUSTUS pituitam evacuans.

R. Diaphaniconis ʒ v.
Diaturbitb ʒ. ss.
Electuarii Indici Majoris ʒ i i.
Aq. Hyssopi,
Betonica an. ʒ i i.
Misceantur, fiat haustus.

ALIUS HAUSTUS ex infusio- ne paratus, pituitam evacuans.

R. Folia sene ʒ i i.
Agarici Trochiscati ʒ i.
Aq. Absinthii,
Menta an. ʒ i i i.
Mane ebulliant leniter, & expressa colen-
tur, colatoque iusculo admisceantur;

Haustus pituitam coquens.

R. Oxymelli simpl.
Mellis Rosarum,
Syr. de calamintha an. ʒ ii.
Aquarum Hyssopi,
Fœniculi,
Calamintha an. ʒ i v.

Misceantur, fiat potio, de qua exhaurian-
tur ʒ v i. pro una vice.

Quorum valida
δωσις est

ʒ vi.
ʒ i i.
ʒ i.
ʒ i v.
ʒ i.
ʒ i.
ʒ v i i.
ʒ v i i.
ʒ i.
ʒ i v.
ʒ i s.
ʒ s.

Diaphaniconis,
Elect. Ind. Majoris an. ʒ i s.

Fiat haustus.

BOLUS pituitam expellens.

Bolus.

R. Diacarthami ʒ i i i.
Diaphaniconis ʒ i i.
Pul. Turbitb ʒ s.
Zinziberis,
Mastiches,
Anisi an. ʒ s.
Misceantur, fiat bolus, & conspergatur sac-
caro albisimo.

PILLULÆ pituitam detrahentes. Pillula.

R. Mas. pil. Aurearum,
de Agarico an. ʒ i.
Trochiscorum albandali ʒ s.
Cum melle rosaceo conformentur pillula
numero quindecim, conspergantur pul. cina-
momi, & deglutiantur in aurora.

Tabella medicamentorum atram bilem coquentium & evacuantium.

Melan-
choli-
am
præparan-
tia.Atram bilem conco-
quentia,

Syr. de Thymo,
Syr. de Epithymo,
Syr. de Fumo terra,
Syr. de Boragine,
Syr. de Buglossa,
Oximel scylliticum,
Syr. de flacade,
Syr. de Lupulis:

Quorum dō-
tis est ʒ i i.
cum aquis
aut decocto

Fumaria,
Melissa,
Scolopendria,
Boraginis,
Buglossa,
Cetrach,
Cuscuta,
Origani,
Hyssopi.

Et hi syrupi mane & ante cenam ante e-
vacuationem tam diu sunt exhibendi, donec
signum concoctionis in urina apparuerit, quod
ut plurimum quarto aut sexto die contingit.

HAUSTUS melancholicum humorem
concoquens & ad evacuationem præ-
parans.

℞. Syr. de Epithymo,

de Fumo terra,
de Lupulo an. ʒ i i.

Aq. Boraginis,
Origani an. ʒ i v.

Misceantur, fiat potio, cujus exhibeantur præparan-
pro uno haustu ʒ v i. Tales potiones aliquo-
ties reiteranda sunt propter lentorem & con-
tumaciam melancholici humoris.

Præparan-
tia melan-
cholica
sæpius re-
iteranda.

Melana-
goga.Melancholicum hu-
morem evacuant,

Veratrum nigrum,
Folia sena,
Polypodii radix,
Epithymi,
Diasena,
Elect. Hamech.
Pil. de fumo terra,
Pil. de lapide Lasuli:

Quorum valida dō-
tis est,

ʒ i i.
ʒ v i.
ʒ s.
ʒ v i.
ʒ s.
ʒ i.
ʒ i.

Atram bilem evacuantia remedia ut plu-
rimum sub triplici forma administrari solent,
haustus, pulvis & pillularum.

Commisceantur, fiat pulvis subtilissimus,
& exhibeatur in haustu seri lactis aut juscu-
lo carnis pinguioris.

Haustus
melana-
gogus.HAUSTUS melancholicos humores e-
vacuans.

℞. Elect. Hamech. ʒ i i i.

Diacatolici ʒ s.

Diasena ʒ i.

Aq. Fumaria,

Boraginis,

Hyssopi,

Scolopendria an. ʒ i. aut loco aquarum
decocti earum herbarum ʒ i v.

Misceantur, fiat bolus.

Pulvis
Melana-
gogus.

PULVIS Melancholiam expurgans.

℞. Pul. Foliorum sena præparata ʒ i.

Rad. Elebori nigri præparati,

Cinamomi ʒ s.

PILLULÆ Melancholiam detra-
hentes.

Pillulæ.

℞. Mas. pil. de fumo terra,

de lapide Lazuli an. ʒ i.

pulveris Elebori nigri ʒ s cum syrupo
de fumo terra.

Formentur pillula numero quindecim, de-
glutiantur integra cum aliquo liquore.

Medicamenta melancholicos humores præ-
parantia & evacuantia crebrius sunt repe-
tenda, Melancholicus enim humor non faci-
le extenuatur, abstergitur, aut una vice e-
vacuatur propter crassitatem & lentorem. Est
enim liquida pici persimilis, quæ non facile
ablui, abstergeri potest.

2. SUNT.

2. **SUNTNE** præter hæc & alia medicamenta præparantia & evacuantia vitiosos humores?

Varia evacuantium remedium generum.

Præscripta quidem medicamenta sunt usitatissima quæ per alvum vitiosos humores evacuunt, sed præter hæc plurima sunt medicamentorum genera, sub diversis formis præparata, quæ ex diversis partibus, & per diversas vias evacuant, veluti sunt decocta, glandes, clysteres, gargarismata, potiones vomitum elicientes, errhina sudorem propellentia. Sunt item & alia forma, de quibus paulo post dicemus. Et omnium paradigmata in processu curationis docebimus.

3. **Δῶς** sive mensura purgantium medicamentorum debetne ea semper exhiberi quæ in tabellis est proposita?

Est enim cuiuslibet medicamento purganti sua definita mensura seu quantitas valida expressa, quam Græci δῶς vocant, minime tamen promiscue omnibus corporibus ea est offerenda, nam ut Galenus 3. Methodi medendi scribit, nihil artem Medicam æquæ conjecturalem efficit in agendo, quam cuiusque remedii quantitas. Ideo non nisi conjectura quadam vera δῶς exhibendi consequi potest, & ea nec dici, nec scribi, nec percipi potest, eodem Galeno de curandis per venæ sectionem teste.

Quantitas remediorum purgantium non potest ex æque determinari.

Conjecturare itaque oportet, Primum quantitatem exhibendi remedii ex humorum evacuandorum natura. Biliosis enim & ferolis humoribus evacuandis minor δῶς, pituitæ autem & melancholiæ major est exhibenda. Secundo ex corporum purgandorum constitutione. Corpora enim robusta, firma atque densa, non nisi valida δῶς purgantur. Et è contra quibus ex consuetudine liquida est alvus, non tanta indigent medicamenti quantitate. Semper itaque interrogandi sunt agroti qualem habeant constitutionem alvi. Tercio ex virium robore. Integris enim adhuc viribus maiorem δῶς agri facilius ferunt: qui autem viribus sunt destituti, à purgantibus pharmacis facile resolvuntur. Quarto ex ætate & sexu. Pueri enim & senes & femina tantam purgantis pharmaci quantitatem ferre non possunt, quantam viri; hique

juniores ac ætate consistentes. His rectè atque prudenter consideratis, facilitum est artificiosa conjectura vel augere vel minuire δῶς purgantium remedium.

SECTIO IV.

DE MEDICAMENTIS SINGULIS PARTIBUS FAMILIARIBUS.

1. Vitiosi humores peculiaribus partibus inhaerentes, debentne omnes per alvum evacuari?

Non: Qualibet enim pars principalis peculiarem à natura nata est canalem, per quam sua excrementa deficit. In evacuandis itaque partium vitiosis humoribus debet Medicus naturam sequi, & per proximos canales evacuare. Purganda itaque sunt excrementa cerebri, aut per nares ipsius seu nasalis, aut per palatum gargarismis & Apophlegmatismis, aut per alvum pillulis, potionibusque: Pectoris & pulmonis per asperam arteriam, bechicis medicamentis, tussiendo & exscreando: Iecinoris quæ in gibba vel superiori parte habent, item renum & vesicæ, per meatus urinæ diureticis, id est urinam morventibus medicamentis: Quæ autem in cavâ epatis parte continentur, ea per alvum commodius detrahuntur: Lienis per alvum: Ventriculi ea quæ in orificio ejus habent per vomitum vomitoriis pharmacis, quæ vero in fundum subsiderunt, per alvum commodius subducuntur: Intestinorum per alvum purgantibus remediis aut Clysteriis: Subcutanei humores evacuandi sunt per poros remediis sudorificis.

Quo natura vergit, eo ducere oportet.

Via & meatus per quos singulæ partes evacuantur.

2. Quæ sunt usitatiora remedium generum singulis principibus partibus accommodata?

Remedia omnia agunt in corporibus nostris, Medicamenta excitata à calore nativo viscerum, aut suis qualitatibus, aut oculis ac specificis virtutibus, quibus etiam cum partibus corporis nostri aut humoribus sympathetice habent. Quæ autem medicamenta usitatiora simplicia ex quibus tandem in variis formis composita exstruuntur.

exstruuntur, sua specifica proprietate, singulis partibus conducunt, sequentes Tabella ostendunt.

Tabella usitatorum remediorum capiti seu cerebro accommodatorum.

Cephalica.

Cerebro medentur,	Calida,	Salvia,
		Betonica,
		Majorana,
		Rosmarinus,
		Stachas,
		Ruta,
		Paonia,
		Serpillum,
		Lavendula,
		Cubeba,
	Frigida,	Carvi semen,
		Styrax calamintia,
		Succinum,
		Thus,
	Frigida,	Myrrha.
		Rosa,
		Viola,
		Nymphaea,
		Lactuca,
		Solanum,
		Hyoschiamos,
		Papaver,
		Sempervivum,
		Mandragora.

Tabella remediorum simplicium pulmoni opitulantium.

Pectoralia.

Pulmo-	Calida,	Hyssopus,
		Prassium,
		Origanum,
		Calamintha,
		Abrotanum,
		Scordion,
		Anisi semen,
		Vrtica semen,
		Carthami semen,
		Polypodii radix,
		Iridis Illyrica radix,
		Helenii radix,
		Angelica radix,
		Arum,

ni profunt,

Squilla,
Aristolocia utraque,
Gentiana,
Pimpinella,
Symphitum,
Pulmo vulpis.

Frigida,

Violarum flores,
Papaveris albi semen,
Lujuba fructus,
Sebesten fructus,
Ficus,
Cremor hordei,
Lac amygdalinum,
Capillus Veneris,
Glycyrrhiza,
Gummi Arabicum,
Tragacantum,
Tuissilago,
Pinearum nuclei,
Pistacia,
Vva passa,
Saccarum candidum.

Tabella remediorum simplicium cordi familiarium.

Cardiaca.

Melis σσφύλλον,
Doronici radix,
Zeduaris radix,
Dictamni radix,
Tomentilla radix,
Carduus benedictus,
Scabiosa,

Calida,

Ocymi semen,
Xiloaloës,
Cortices citrii,
Cariophylli,
Corcus,
Amomum,
Moscus,
Ambra.

Cor corroborantia,

Frigida,

Aurum,
Margarita,
Smaragdus,
Sigillata terra,
Bolus Armenus,
Camphora,

Succus

Succus mali citrii,
Succus granatorum,
Semen acetosa,
Borago,
Buglossa.

Tabella remedium ventriculo accommodatorum.

Stomachica.

Ventriculo conveniunt,

Calida, {
Menta,
Betonica,
Absinthium,
Sisimbrium,
Coriandri semen,
Corcus,
Galanga,
Maces,
Nuces muscatae,
Zinziber,
Cariophylli,
Cinamomum,
Lignum aloës,
Spica Indica,
Mastix,
Succinũ, Bernstein.

Frigida, {
Rosa,
Myrthi bacca,
Cydonia,
Olive fructus,
Coralli rubei,
Pyra moscatellina.

Tabella medicamentorum jecori medentium.

Hepatica.

Eupatorium,
Fumaria,
Lupulus,
Asparagus,

Calida, {
Apium,
Petroelinum,
Fœniculus,
Absinthium,
Chamadris,
Carduus Benedictus,
Scordion,
Centaureum minus,
Veronica,
Schanantus.

Jecori

medentur,

Frigida,

Rosa,
Graminis radix,
Cicorea,
Endivia,
Taraxicon,
Flores epatici,
Capillus Veneris,
Cucurbita semen,
Cucumeris semen,
Melonum semen,
Citrulli semen,
Lactuca,
Plantago,
Acetosa,
Corallium,
Ebur,
Spodium,
Sandali 3. species.

Hæc quatuor semina dicuntur semina frigida majora.

Tabella Medicamentorum lieni auxiliantium.

Lupulus,
Cassuta,
Cetrach,
Raphanus,
Apri radix,
Capparum radix,
Agni casti semen,
Chamadris,
Squilla,
Aristolochia rotunda,
Asarum,
Ruta,
Lacca.

Calida, {

Frigida, {
Viola purpurea,
Buglossa,
Scolopendrium,
Tamarisci cortex,
Cappari fructus.

Lieni auxiliantur,

Splenetica.

Tabella medicamentorum Renum ac vesicæ affectiones juvantium.

Petroselini semen & radix,
Fœniculi semen,
Daucus creticus,
Asari radix,

Calida, {

Renibus

R

ac

acres-
ca pro-
sunt,

Seselin,
Phu siue Valeriana,
Asparagus,
Genista semen,
Vrtica semen,
Raphani semen & ra-
dix,
Allium,
Ligustici semen,
Bacca lumiperi,
Pimpinella,
Bacca lauri,
Petonica,
Capillus Veneris,
Amygdala amara,
Cicer,
Chamamelon,
Therebintina,
Oleum vitrioli,
Glycyrrhiza,
Eryngion,
Ruscus,
Sabina,
Althea semen,
Milkum Solis.

Frigida,

4. Semina frigida ma-
jora,
Hordeum,
Graminis radix,
Parietaria semen,
Lapilli cancerorum,
Lapis iudaicus,
Alcekengi,
Portulaca semen,
Acetosa semen.

Tabella Medicamentorum uteri vitiiis
accommodatorum.

Chamamelium,
Betonica,
Parthenion,
Paonia radix,
Sampsuchus,
Origanum,
Melissophyllum,
Prassium,
Scordium,
Artemisia,

Ptero

Calida
mens
provo-confe-
runt,

cando,

Pulegium,
Ruta,
Calamintha,
Sabina,
Valeriana radix,
Asari radix,
Rubea radix,
Dauci cretici radix,
Seseli semen,
Aristolochia utraque,
Gentiana,
Myrrha,
Castoreum,
Sagapenum,
Bacca lauri,
Costi radix.

Frigida
mens
cohi-
bendo,

Nymphaea radix,
Balaustia,
Rhus culinaria,
Cornu cervi ustum,
Portulaca semen,
Plantaginis semen,
Bis toria,
Corallium,
Succinum, Weis-
bernstein.

Tabella remediorum vitiiis articulo-
rum succurrentium.

Helenii radix,
Iridis radix,
Chamapytis,
Herba paralytis,
Calamintha,
Centaurium minus,
Hemodactylus,
Lac vaccinum,
Stereus vaccinum,
Oesipus,
Thus,
Vrtica semen,
Nasturtii semen,
Opopanax,
Bdellium,
Ammoniacum,
Sagapenum,
Euphorbium,
Castoreum.

Calida,

Articu-
lorum
vitia

emen-

emen-
dant,Frigida
dolorem
miti-
gando,

Rosarum aqua,
Plantaginis aqua,
Solatri aqua,
Acetum,
Psillii semen,
Cotonii semen,
Althea semen,
Hioschyami folia,
Cicuta folia,
Semper viva,
Camphora,
Ovi candidum.

SECTIO V.
DE SIMPLICIBUS ME-
DICAMENTIS IN OMNI-
BUS OFFICINIS U-
SITATIS.

Tabella generalis nomenclaturas o-
mnium simplicium usitatorum,
quæ in Officinis prostant
comprehendens.

Simplicium Medicamentorum alia sumun-
tur ex stirpibus, veluti sunt folia, flores, fru-
ctus, radices, succi, resina, gummata, cortices,
ligna: Alia ab animalibus, veluti sunt San-
guis, adeps, pinguedo, lac, coagulum, ex-
crementa, pili, cornua: Alia ex terra visce-
ribus, ut sunt metalla, lapides, gemma, ter-
ra species: Alia ex mari & aquis, ut sunt
salia, spuma, &c.

HERBÆ USITATÆ.

Abrotanum, Borago,
Absinthium, Buglosson,
Acetosa, Calamintha,
Althea, Carduus Benedi-
Agrimonia, ctus,
Apium, Cassia,
Atriplex, Chamædris,
Artemisia, Chamæpitis,
Asplenion, Cicorium,
Betonica, Chelidonium,
Beta, Carduus Maria,
Branchaurisina, Ebulus,

Eupatorium, nici flos,
Endivia, Buglossa,
Euphrasia, Boraginis,
Faniculus, Chamemeli,
Fumaria, Croci,
Folia senæ, Epithymi,
Lauri folia, Genista,
Lactuca, Lavendula,
Lupulus, Liliorum alborum,
Malva, Lilii convallii,
Marrubium, Meliloti,
Majorana, Nymphae,
Melilotum, Prunella,
Melissa, Rosarum,
Menta, Rambuci,
Mentastrium, Verbasci,
Mercurialis, Violarum.

SEMINA USI-
TATORA.

Origani, Sem. Ameos,
Parietaria, Amomi,
Perfoliata, Acetose,
Plantago, Anethi,
Pulegium, Anisi,
Portulaca, Apis,
Rosmarinus, Aquilegii,
Ruta, Asparagi,
Sabina, Alcacengi,
Squinnantum, Basiliconis,
Sanicula, Carui,
Saturcia, Carthami,
Scabiosa, Ciceris,
Scolopendria, Citrii,
Scordion, Citrulli,
Serpillum, Coriandri,
Sisymbrium, Cotoniorum,
Semper vivum, Cucurbita,
Solatrum, Cucumeris,
Stoechas, Cymini,
Tussilago, Dauci,
Verbascus, Eruca,
Verbena, Faniculi,
Violaria, Foeni Graci,

FLORES USI-
TATI.

Flores Anethi, Hordei,
Anthos, Hyoschiami,
Balaustrium, mali pu- Lactuca,
Lentium,

Ligustici,
Lingua arvis, id est
fraxini,
Lini,
Malva,
Majorana,
Melonum,
Nasturtii,
Nigella,
Orobi,
Paonia,
Papaveris albi,
Petroselini,
Pastinaca,
Plantaginis,
Portulaca,
Raphani,
Sumach,
Rusci,
Ruta,
Santonici,
Saxifragia,
Seselii,
Staphisagria,
Mili solis,
Vrtica.
FRUCTUS USI-
TATI.
Amygdala dulces,
Amygdala amara,
Anacardi,
Bacca luniperi,
Bacca Lauri,
Berberis,
Carica, id est sicca fi-
cus,
Capparis,
Cubeba,
Carpobalsamum,
Caryophyllon,
Cassia fistularis,
Cydonia,
Dactyli,
Colocynthis,
Galla,
Injuba,
Glandes,
Malum punicum,
Mirobalani, quorum
quinque sunt ge-
nera,
Flavi,
Kebuli,
Emblici,
Bellirici & Indi,
Myrilli,
Sebesten,
Nuces Cupressi,
Nux Indica,
Nux moscata,
Nux vomica,
Nuces pinea,
Oliua,
Tamarindi,
Pistachie,
Pruna,
Vva passa.

RADICES USI-
TATÆ.

Acori,
Agarici,
Althea,
Angelica,
Aptj,
Aristolochia utriusq,
Asari,
Asparagi,
Asphodeli,
Been,
Bis torta,
Bryonia,
Borraginis,
Capparis,
Cardopatii,
Cichorei,
Costi,
Cyclaminis,
Cappari,
Dictamni,
Doronici,
Ebuli,
Elenii,
Eringii,
Hellebori utriusque,
Esula,
Endivie,

Filicis,
Feniculi,
Galanga,
Chariophyllata,
Gentiana,
Glycyrriza,
Hermodactyli,
Iridis Illyrica,
Lapathi,
Laserpitii,
Liliorum,
Mandragora,
Nymphaea,
Philipendula,
Paonia,
Pentaphylli,
Petroselini,
Pencedani,
Polypodii,
Polygonati,
Pimpinella,
Pyretrei,
Phupontici,
Rhapontici,
Rhabarbari,
Raphani,
Rubea,
Rusci,
Satyrii,
Scylla,
Scrophularia,
Symphiti,
Turbitb,
Tormentilla,
Zingiberis,
Zeduarina.

SUCCI USITATIORES.

Succus, $\chi\upsilon\lambda\omicron$, est liquor ex stirpibus re-
centibus contusus expressus, qui si lentorem ha-
buerit, non succus, sed mucago seu mucila-
go nominatur. Suocorum alii liquidi, alii in-
durati conservantur. Liquidi sunt succus

Citrui mali,
Cytoniorum,
Granatorum,
Endivie,
Mel,
Oleum,
Omphatium,
Rosaceus,
Violaceus,
Vinum, & aqua o-
mnes stillatitia.

Succi indurati habentur:

Acatia,
Aloë,
Asa foetida,
Cera,
Scamonia,
Euphorbium,
Glycyrrhize,
Hypocistis,
Ladanum,
Licium,
Opium,
Saccarum,
Sanguis Draconis.

GUMMATA USITA-
TIORES.

Ad succorum induratorum genera re-
ferri possunt & gummata, qua-
lia sunt,

Asa foetida,
Ammoniacum,
Bala-

BDCELLIUM,
Benzoi,
Colophonis,
Euphorbium,
Galbanum,
Gummi Arabicum,
Gummi hedera,
Myrrha,
Maslix,
Opeponax,
Olibanum,
Sagapenum,
Terebintina,
Sarcocolla,
Styrax calamitina,
Sandaraca,
Succinum,
Camphora.

CORTICES U-
SITATIORES.

Cortex Arantiarum,
Granatorum,
Mandragora,
Tamarisci,
Mediana sambuci,
Cinamomum,
Cassia aromatica.

LIGNA USITA-
TIORA.

Lignum Aloës,
Lignum Guajaci,
Lignum sandali, cu-
jus tres sunt spe-
cies, album, ru-
brum, & flavum,
Xylobalsamum,
Viscus quercinus, &
rhen hinster.

SIMPLICIA USI-
TATA QUÆ EX
ANIMALIBUS

SUMUNTUR.
Cancer,
Cancrorum lapilli,
Cranium hominis
suspensi,
Castoreum,
Coagulum leporis,
Cornu cervinum,
Cornu unicornis,
Ebur,
Fel tauri,
Fel leporis,
Genitale cervi &
tauri,
Iecur lupi,
Mumia,
Os è corde cervi,
Os sepia,
Pinguedo anatina,

Anserina,
Canis,
Gallinacea,
Humana,
Vrsina,
Vulpina,
Serum cervinum,
Caprinum,
Hircinum,
Medulla cervina,
Vitulina,

Pulmo vulpis,
Scincus,
Sanguis hirci,
Serum lactis,
Vipera,
Zibetum,
Moschus,
Cantharides, Galt-
Worme.

METALLICA
REMEDIA U-
SITATIORES.

Aurum,
Argentum,
Auripigmentum,
Ærugo,

Æsustum,
Æris squama,
Alumen,
Cadmia,
Calcanthum,
Chalcithis,
Calx,
Cerussa,
Chrysocolia,
Cinabaris,
Ferrum,
Gypsum,
Lytargyron,
Minium,
Nitrum,
Plumbum,
Pompholix,
Thutia,

Spodium,
Stribium sive Anti-
monium,
Sulphur,
Lapis Armenus,
Lapis Lasuli,
Lapis Hemathites,
Lapis Magnes,
Pumex,
Bolus Armenus,
Lemmia terra.
GEMMÆ USITA-
TIORES.
Rubinus,
Granatus,
Hyacinthus,
Saphyrus,
Smaragdus.

Remedia usitiora ex mari su-
muntur,

Asphaltus,
Succinum, Bern-
stein.
Sperma ceti,
Margarita,
Corallium,

Spongia,
Sal, cujus tres sunt
species, Factitius,
Marinus & Gem-
meus.

SECTIO VI.

De

COMPOSITIS MEDI-
CAMENTIS IN OFFI-
CINIS USITATIS.

1. Possuntne omnes morbi simplicibus re-
mediis curari?

Non omnes morbi simplicibus remediis cu-
rari possunt: Vt enim morborum, ita & me-
dicamentorum duplex genus statuitur, sim-
plex unum, compositum alterum: & simpli-
ces quidem morbi simplicibus, vel uno pluri-
busque ejusdem facultatis remediis curantur;
compositi vero composita requirunt phar-
maca.

R. 3

2. Com-

2. Composita medicamenta quibus in formis exhibenda, & quæ sunt formarum genera?

Causæ variarum compositionum medicamentorum.

Compositorum remedium genera alia intra corpus assumuntur, alia extra corpus forisque applicantur. Formarum autem quas composita medicamenta recipiunt, varia sunt genera, & magni refert, qua forma quodvis medicamentum administretur. Alios enim alia forma delectant: & alia forma ad partes affectas, alia ad morborum naturas accommodatiores sunt: & in aliis formis alia medicamenta sunt magis minusque efficaciora. Visitationes autem remedium hoc tempore forma, quæ in officinis extant, & quæ à Medicis præscribuntur, in sequenti Tabella comprehenduntur.

Forma remedium compositum	Intra corpus sumendorum,	Pulveres mixti seu species,
		Rotula,
		Electuaria,
		Pillula,
		Trochisci,
		Decocta,
		Syrupi,
		Loch,
		Conserve,
		Tragemata,
		Collyria,
		Errhina,
		Gargarismata,
		Clysteria,
		Pessi,
		Glandes.
	Extra corpus applicandum,	Epithemata,
		Olea,
		Linimenta,
		Unguenta,
		Cataplasmata,
		Emplasmata,
		Cerota,
		Sacculi.

Horum remedium omnium conficiendorum rationem partim ex libris Medicamentis, quos in officinis Dispensatoria vocant, par-

tim excusandorum morborum methodo addiscere possumus.

3. Pulveres compositi sive species usitiores quæ sunt?

Species hodie Medicis vocantur omnes pulveres compositi & inter se commixti. Extant autem in myropoliis sp. Aromatici rosati, sp. Diacymini, sp. Diacalamintbes, sp. Diatrion piperion, sp. Diagalanga, sp. Diambra, sp. Electuarii de geminis, sp. Diamargariti frigidii, sp. Dianeschi dulcis, sp. Latitia Galeni, sp. Diarhodon abbatis, sp. Diapenidii, sp. Diacurcuma, sp. Dialacca, sp. Pliris Arcoticon, sp. Lithontribon, sp. Diamaron, sp. pro Epithemate cordis, sp. pro epithemate Epatis, Pulvis ad præcipitatos, pulvis lumbricorum, pulvis contra pestem.

Species in officina usitata.

4. Rotularum seu tabellarum quæ sunt genera?

Rotula seu tabella conficiuntur ex speciebus seu pulveribus mixtis & saccharo in aliquo liquore resoluto, & rursus ad liquoris absorptionem cocto & tot Rotularum genera, quot & specierum: Et Medici hoc modo distinguunt à speciebus, quod addant vocabulum Rotula, ut

Rotularum compositio.

R. Aromatici rosati in rotulis.

Vbi vero pulveribus uti volunt, præscribunt,

R. sp. Aromatici rosati.

5. Quæ Electuaria usitata prostant in Myropoliis?

Electuaria dicuntur omnia medicamenta composita, quæ habent formam crassioris mellis. Conficiuntur autem ex variis speciebus ac pulveribus melle defecato, aut saccharo liquefacto mixtis. Electuaria autem alia sunt antidota, quæ veneno adversantur: alia narcotica sive opiatæ, quæ somnum conciliant & dolores mitigant: alia laxativa, quæ humores vitiosos è corpore pellunt: alia quæ robur corpori inferunt, quæ electuaria confortativa dicuntur.

Electuaria differentia.

Antidota sive Electuaria veneno adversantia usitata sunt:

Theriaca Andromachi,

Theriaca Diatesaron,

Mi-

Mithridatii Antidotum,
Aurea Alexandrina,
Elect. Liberantis,
Elect. de baccis lauri,
Diacafloweum.

Narcotica sive Opiata somni feræque usi-
tatoria sunt :

Philonium majus,
Requiens Nicolai,
Triphera magna.

Electuaria Laxativa usitatoria sunt :

Diacatholicon,
Confectio hamech,
Elect. de succo rosarum,
Elect. Indum majus,
Benedicta laxativa,
Diacarthamum,
Diaturbith,
Diaprunum simplex,
Diafena,
Electuarium,
Hierapicra Galeni.

Electuaria confortantia usitatoria sunt :

Diasatyrium,
Acorus conditus sive diacorum,
Diacytonitum & omnes fructus & ra-
dices condita, & conservarum genera.

6. Quæ pillulæ usitatiores prostant in
Myropoliis?

Pillulæ.

Pillula sive cataporia conficiuntur ex pul-
veribus simplicium rerum, qui interventu
Aloës & alicujus liquoris contundendo for-
mantur in massam duriusculam, ex qua tan-
dem, ubi usus postulat, certum pondus refor-
matur in exiguis globulos, ad deglutiendum
idoneos, qui pillula dicuntur. Vimur autem
pillulis, ut electuariis laxativis, ut plurimum
ad evacuandos humores vitiosos. Sunt au-
tem pillula usitatiores :

Alephangina,
Affajereih,
De agarico,
Aurea,
Aggregativa,
Arabica,
Masticbina,

Pillula *Cochia,*

Fœtida,
De fumo terra,
Sine quibus,
Stomachica,
Lucis majores,
De Rhabarbaro,
De Eupatorio,
De Hermodactylis,
De lapide Lasuli,
Arthritica.

7. Qui sunt Trochisci usitatiores?

Trochisci sive pastilli veluti pillularum
massa ex pulveribus cum aliquo liquore con-
tusis, conficiuntur & exsiccantur, quibus se
forma additur rotunda & compressa instar
exiguarum rotularum, nec eis ut pillulis Aloë
admiscetur : Earum usus per se est rarissimus,
sed ut plurimum aliis compositis remediis ad-
miscetur. Sunt vero usitatiores Trochisci :

De Absynthio,
De Rhabarbaro,
De Gallia Moschata,
Alipta Moschata,
De spodio,
De Myrrha,
De carabe,
De terra sigillata,
Diarrhodon,
De violis,
De Eupatorio,
De Berberis,
De capparibus,
Alhandal,
De Alcakengi,
De Agarico,
Bechici nigri & albi.

Trochisci
usitatio-
res.

Trochis

8. Quæ decocta habentur in Myro-
poliis?

Decocta dicuntur liquores in quibus ali-
qua simplicia, veluti radices, herba, flores,
semina, & fructus aut aromata sunt artifi-
cialiter incocta, sed prostant nulla in Myro-
poliis decocta, propterea quod facile corrumpantur.
Sed Medicus ubi necessitas urget, ex
tempore prescribit. Communissima autem de-
cocta sunt decoctum commune.

Deco-

Decoctum florum ac fructuum.

Aqua hordei,
Cremor ptisana,
Hydromeli.

9. Qui sunt Syrupi usitatiores?

Syrupi Arabibus, Græcis *σικερα*, formam habent liquidioris mellis. Confiuntur autem ex decoctis aut succis expressis & defecatis, ac melle vel saccharo. Eis utimur ad præparandos vitiosos humores ante purgationem. Raro autem solos merosque Syrupos exhibemus, sed dilutos cum aliquo liquore. Sunt autem usitatiores syrupi qui in officinis extant:

Mel rosarum,	de praffio,
Oxymel simplex,	de papavere,
Oximel scylliticum,	de Menta,
S. acetosus simplex,	de Absinthio,
Syr. Rosarum,	de calamintha,
Violarum,	de fumo terra,
de pomis,	de eupatorio,
de granatis,	de Epithymo,
de cinreis acidis,	de lupulo,
de agrestis,	de cicoreo,
de succo acetosa,	de 5. Radicibus,
de scolopendario,	de Arthemisia,
de stachade,	Byssanthinus,
de Iujubis,	de Endivia,
de capillis Veneris,	de Nymphaea,
de hyssopo,	de Cydoneis.

10. Qui Loch sive lambilia Electuaria sunt usitatiora?

Loch, Græcis *ἐλεγκμετα* sunt medicamenta qua lingendo assumuntur, liquiditate ab Electuariis differunt. Formam enim liquidi mellis paulo crassiorum quam syrupi habent. Confiuntur vero ex decoctis saccharo & pulveribus: sunt vero usicatoria *ἐλεγκμετα*.

Loch sanum & ex-	de Scilla,
pertum,	Diaconion,
de pulmone Vulpis,	Diamoron,
de pino,	Loch nucum seu dia-
de papavere,	carion.

11. Conservæ usitatiores quæ?

Conservæ. Conservæ sive flores condita, formam habent electuariorum, & constant ex concisis minutissime recentibus floribus, & saccharo simul commixtis; sunt autem usitatiores conservæ:

Conservæ Rosarum,	Melissa,
Violarum,	Nymphaea.
Boraginis,	Et cuiusvis herba in
Buglossa,	usum medicum rece-
Roris marini,	pta.
Salvia,	

Ad conservarum ordinem referuntur & Condita. fructus radicesque saccharo condita, veluti sunt Zinziber conditum, Enula condita, calamus aromaticus conditus, pyra muscatellina condita, juglandes condita, cidonia condita, nuces moscata condita, cortices & flores arantiorum conditi, rad. pimpenella condita.

12. Tragemata usitatiora quæ?

Tragemata sunt pulveres ex aromatibus Tragema- vel speciebus & saccharo commixti ad corro- ta. boranda viscera principaliora cerebri, cordis, ventriculi & epatis compositi: non prostant parati præterquam Tragea Imperatoris ex cinnamomo, Zinzibere & saccharo albissimo parata: ubi autem usus postulat, Medicus pro arbitrio ea ordinat ac præscribit.

13. Collyria usitatiora quæ sunt?

Collyria Latine dicuntur medicamenta o- Collyrio- cularia, quæ videlicet oculis induntur, quo- rum forma tres sunt; Alia enim sunt liqui- da, quæ ex liquoribus sive succis & simplici- um rerum pulvisculis tenuissimis constant. Alia sunt arida ex solis pulveribus unius aut plurium. Alia instar unguenti ex pulveri- bus, oleis aut succo aliquo conficiuntur. Ma- teria aridorum collyriorum ut plurimum Me- tallica sive mineralia sunt.

Raro in Myropoliis parata habentur collyria excepto unguento ex pompholyge, sed pro ocu- larium affectionum varietate, ut res exostu- lat, varie præscribuntur à Medicis, quorum paradigmata in curatione oculariorum mor- borum proponemus.

14. Errhina usitatiora quæ sunt?

Errhina dicuntur medicamenta, quæ na- Errhino- ribus inferuntur, quæ & ipsa aut arida sunt, ut pulveres & radices; aut liquida ut succi & decocta. Eorum usus est ad affectionem meatuum ex cerebro ad nares prodeuntium ad excitandam sternutationem & purgan- dum cerebrum per nares. Errhina ut pluri-

num ex radice Gentiana Beta, ex Majorana ejusque succo aut decocto, & beta succo, pulveribus quorundam simplicium, quarum paradigmata suis in locis ostendemus.

15. Gargarismata usitatoria quæ sunt?

Gagari-
smi.

Vt Errhinis per naves, ita Gargarismatis per palatum detrahuntur vitiosi humores ex cerebro. Vimur eis & in exulcerationibus faucium. Consciuntur autem Gargarismata ex decoctis aut aquis stillaticis, aut succis herbarum, quibus admiscuntur mel rosarum aut Diamoron aut Loch nucum pro varietate affectionum faucium; non prostant in Officinis, sed à Medicis pro varietate morbi ex tempore præscribuntur.

16. Clysteria quæ sunt usitatoria?

Clysterum
usus.

Κλυστήρ seu Ένψια, Latinis lavamen seu injectum significat, sed hujus temporis Medici & in Latina & in Germanica lingua retinent appellationem Græcam & Clyster nominant. Vimur autem clysteribus in ablucendis & abstergendis sordibus ac flatibus potissimum qui in intestinis continentur, quanquam per consecutionem & ex longinquiore partibus attrahant vitiosos humores. Componuntur clysteria ex decoctis herbarum aut juscule carniuium aut lacte, cui purgans aliquod medicamentum olea & modicum salis est admixtum. Non extant parata, sed ut necessitas postulat à Medico præscribuntur.

17. Pessi quid, & qui sunt usitiores?

Pessi.

Pessi sunt Medicamenta quæ uteris mulierum induntur instar glandis. Consciuntur autem pessi ex aridis pulveribus, fomentis & liquoribus simul mixtis, & ad justam duritiem redactis, ac in pollicis figuram conformatis, qui sindone involuti oblongo filo adpenduntur: ac ubi necessitas urget, osculo matricis induntur. Vimur eis ut plurimum aut ad provocationem aut retentionem mensum: aut ad emolliendos matricis tumores, aliaque ejusdem vitia.

18. Glandes usitiores quæ sunt?

Glandes, Græcis βάλανι, vulgus & officina suppositoria vocat; & sunt medicamentaria quæ podici aut ano inseruntur. Consciuntur suppositoria ex melle ad justam duritiem cocto, cui, antequam indurescat mel, admiscuntur pulvis colocynthidos aut Hiera simplicis & salis momentum & confunduntur in massulam digiti longitudinem & calami majusculi crassitiem aquantem. Vimur his in infantibus & aliis agrotantibus, ubi feces in intestino vehementius induruerint, & excerni nequeant, & semper extant venales in Miropoliis.

9. Epithemata quæ sunt usitatoria?

Epithemata medicamenta sunt liquida, Epithemata aut ex stillaticis aquis, aut ex siccis, aliis, que liquoribus & speciebus simul mixtis composita sunt, quæ aut panno aut duplicatis linteolis excepta, affectis corporis partibus, fronti videlicet, temporibus, cordi, Epati, carpo, pedibusque imponuntur & alligantur. Nulla autem prostant, sed ex tempore præparantur.

20. Quæ olea prostant usitatoria?

Olea chirurgia parti artis Medica dedicata sunt. Extra enim corpus manibus illiniuntur. Oleorum porro alia ex floribus & herbis, radicibusque in oleo olivarum maceratis, incoctisque parantur: alia ex fructibus, seminibus, aliisque materiis vi ignis eliciuntur. Sunt autem usitatoria quæ in Myropoliis habentur olea:

Ol. Absinthii,
Anethinum,
Camamelinum,
Rosarum,
Violarum,
Ricinum,
Liliorum alborum,
Irinum,
Sampuchinum,
Nymphaæ,
Cytoniorum,

S

Myr-

Myrrhinum,
Mente,
Rutaceum,
Nardinum,
Mastichium,
Hypericonis,
Ex cappare,
Ex Euphorbio,
Ex piperibus,
Vulpinum,
Lumbricorum,
De castoreo,
Scorpionum,
Laurinum,
Amygdalarum dul-
cium,
Amyg. amararum,
Ex baccis lunperi,
Terebinthina,
Tartari,
Vitrioli,
Anisi,
Cinamomi,
E nucibus Muscatis,
Petroleum,
Spica,
Carvi,
Cimini &c.

21. Quæ linimenta quæve unguenta pro-
stant usitatoria?

Linimen-
ta. Linimenta & unguenta sola duritie ac
mollitie inter se differunt, utraque enim com-
ponuntur ex oleis, cera aut resinis & pulve-
ribus. Unguenta paulo crassiora sunt. Plus e-
nim cera recipiunt, Linimenta vero molliora.
Linimenta nulla habentur in officinis parata,
sed ex tempore conficiuntur. Unguenta autem
usitatoria sunt:

Vnguenta
usitatoria. Vnguentum Arregon,
Agrippa,
Marciatum,
de Althea,
Populeum,
Aureum,
Ægyptiacum,
de Cerussa,
Diapompholygos,
Pectorale,
ad Scabiem,
Apostolorum,
Refrigerans Gale-
ni,
Pediculorum,
Rubeum potabile.

22. Quæ cataplasmata usitata prostant?

Catapla-
smata. Cataplasmata dicuntur quæ ex herbis, flo-
ribus, seminibus, farinis, aliarumque re-
rum pulveribus simul commixtis cum liquo-
ribus & oleis ad pulvis formam sunt cocta, quæ
instar Emplastri per pannum aut duplicatos
linteolos extensa affecto loco applicantur. Nul-
la cataplasmata extant, sed ex tempore pa-
rantur.

23. Quæ Emplastra & cerota habentur in
Myropoliis?

Empla-
stra. Emplastrorum ac cerotorum materia est
oleum, cera, gummata, & pulveres minera-

lium metallorum, aliarumque rerum, quibus
utimur in tumoribus, inflammationibus, vul-
neribusque partium, sunt autem usitatoria:

Emplast. Diachylon, De baccis lauri,
de Mililota, De crusta panis,
Oxyroceum, De lapide calami-
nari,
Gratia Dei, Album coctum,
Apostolicum, Viride.
Contra rupturam,

Cerota plus quam Emplastra cera reci- Cerota.
piunt, usitatoria sunt:

Cerot. Refrigerans Galeni,
Stomachicum,
Sandalinum.

24. Sacculi qui usitatiores?

Nulli sacculi prostant in Myropoliis parati, Sacculi.
sed ex arbitrio Medici ex tempore parantur.
Vimur autem sacculi in capitis doloribus,
in cordis affectionibus, in ventris tumoribus
ac doloribus, in sphyncterum prolapsis. Con-
ficiuntur autem sacculi ex herbis, floribus,
radicibus, seminibus inter se mixtis, & mi-
nutim concisis, atque in sacculum linteum
confutis.

SECTIO VII.

Et Ultima,

DE UNIVERSALIBUS REGULIS IN CURA- TIONE OBSERVAN- DIS.

I. In curandis morbis quæ axiomata &
regulæ generales sunt obser-
vandæ?

Regula ferè omnes, quæ in Medicationi-
bus morborum observanda sunt, habentur
in Aphorismis Hippocratis, qui dignissimi
sunt, à tyronibus Medicina ad unguem edi-
scantur; Verum præter eas sequentia axio-
mata semper ob oculos sunt habenda:

I. Contraria semper contrariis sunt curan-
da, & similia similibus conservanda, &
ut Galen. inquit lib. 13. meth. med. cap. 6.
Omnis intemperantia semper contraria re-
quiris.

Funda-
mentum
totius cu-
rationalis.

II. Qua-

II. Quaecunque sunt in corpore humano præter naturam, debent removeri; quæ vero secundum naturam, conservari: Galen. lib. 8. Meth. cap. 9.

III. Natura est curatrix morborum, Medicus vero est minister naturæ: Com. 5. in 6. Epid. t. 1.

IV. Affectiones & dispositiones magnæ, magnas causas habent.

V. Causa prius quam morbi semper debent præcidi ac removeri.

VI. Morbi semper prius sunt curandi quam symptomata, nisi talia sint symptomata, quæ vires prostermant: Tum enim curationem ad se convertunt.

VII. Viribus imbecillis, lenis lentaque curatio est necessaria: extrema autem morbis extrema remedia sunt adhibenda.

VII. Bona constitutio partium, bonarum, mala malarum est actionum causa, atque illa sanitas, hac morbus dicitur.

IX. Supervacanea quæ à valentioribus partibus expelluntur, semper ad partes imbecilliores procumbunt: Galenus com. aph. 33. l. 4.

X. Dolor & particula inflammata calor, fluxionis sunt causa. Quare tum purgandum est totum corpus, etiam si careat vitiosis humoribus: Galen. lib. 13. cap. 5. meth. medend.

XI. Medicamenta primum oblata, si paululum conferant, tamen si tardius curent, ea sunt usurpanda, nec temerè protinus ad aliud transendum: quæ autem noxia sunt statim removenda: aph. 52.

XII. Digerentia medicamenta, ubi redundantia humorum in toto corpore subest, si partibus affectis applicentur, implent potius quam vacuant. Iis itaque non nisi purgato corpore, aut parte illa, quæ excrementum ad locum affectum transmittit, utendum est: Gal. lib. 13. cap. ult. meth. medend.

XIII. Principibus partibus laborantibus nullum adferendum est remedium, quod immodicè vel refrigeret, vel calefaciat, vel aliqua aliena qualitate sit imbutum, & semper ei aliquid est admiscendum, quod corroborandi facultatem habet.

XIV. Quoties vim medicamento alicuius ad cerebrum exactè descendere velis, ad coronalem suturam in synepite id applicabis. Tenuissimum enim & rarissimum eo in loco est cranium. Omnes itaque infusiones ad hanc maximè partem applicantur: Gal. lib. 13. cap. 12. meth. med.

XV. Iecinori inflammatione laboranti, non debet imponi aut epithema aut fomentum aut cataplasma aëti frigidum: Gal. lib. 13. c. 12. meth. med.

XVI. Iecinori & lienis inflammationis, quæ foris applicantur remedia ea multè faciliatis, id est, astringentia simul & laxantia esse debent: Gal. lib. 13. cap. Meth. medend.

XVII. Gibba epatis per renes diureticis remediis expurgari debet, cava vero ejus pars per inferiorem ventrem. At lien nunquam per renes, sed per intestina evacuat; Galen. lib. 13. cap. 6. meth. med.

XVIII. Gula quæ propriè stomachus vocatur, & spina cervici adjacet, ac per collum & pectus in ventriculum deorsum protenditur, externa remedia veluti sunt cataplasmata & emplastra super spinam cervicis imponi debent, & non parti anteriori, quemadmodum etiam ubi orificium ventriculi est inflammatum: Gal. lib. 13. cap. 26. meth. med.

XIX. In quotidiana febre semper afficitur orificium ventriculi, in tertiana jecur, & in quartana lien, & ut plurimum ex eorum viscerum affectione generantur febres; Gal. lib. 1. cap. 5. de Art. curat. ad Glauc.

XX. De vena sectione in phlegmone oris & palati, item jecinoris, pectoris & pulmonis atque cordis semper interna cubiti vena est secanda: in angina autem primum interna cubiti, deinde hæc quæ sub lingua habentur. Qui vero circa occiput laborant, primo cubiti, deinde frontis est incidenda: Renibus vero, pudendo, vesica & utero affectis eam incidimus, quæ est sub directo loci affecti.

XXI. In jecinoris inflammatione dextra manus, in lienis sinistra vena cubiti est aperienda: Galenus libr. 13. capit. 11. Methodi medend.

Capitis remedia ubi applicanda.

In medicam. hepatices & splenetices observanda.

Lienis quoque pars sua modo purganda.

Oesophago ubi applicanda remedia.

Focus febrilium.

Quæ venæ in singulis partibus aperiendæ.

Ordo curationis.

Revulsio.

Non esse recedendum à bono, licet in eo tardaverit juvamentum vult Avicenna. In digredientium usu observanda.

Roborantia non negligenda.

Fluxiones
ut sisten-
da.

XXII. Fluxionis motum semper ad con-
trarium trahere oportet. Partibus itaque su-
perioribus inflammatis, per inferiora sanguis
est educendus, & contra inferioribus inflam-
matis, per superiora: Galenus lib. 2. capit.
2. de arte curativa ad Glauconem.

Cucurbi-
tula ut re-
cte adhi-
benda.

XXIII. De Cucurbitulis. Cucurbitula
autem evocant aut eximunt, eruntque aut
provocant, aut avertunt: Ad mammas af-
fixa sanguinem ex utero fluentem repellunt:
præcordiis applicata sanguinis fluxum è navi-
bus erumpentem cohibent: evocant autem &
proliciunt menses pubi & inguini affixa, oc-

cipiti applicata oculorum fluxiones avertunt,
vacuari tamen prius corpora quibus appli-
cantur oportet, alias enim replent partem,
cui applicantur, pravis humoribus: Gale-
nus libr. 13. cap. 18. meth. med.

XXIV. De purgatione humorum. Flava
quidem bilis evacuatio est facilis, pituita ve-
ro seu nigra bilis difficilior: quo magis pur-
gantis medicamenti ope indigent; Galen. lib.
12. cap. 17. meth. med.

Et tantum de Medicina generalibus sequentur
mox οὐδὲν Θεῶν particulares morbo-
rum curationes.

Purgantia
humori-
bus ac-
commo-
danda.

Compendii artis Medicæ

FRANCISCI JOELIS

F I N I S.



FRAN-

FRANCISCI JOELIS
 OPERUM MEDICORUM
 TOMVS SECVNDVS,

In quo

LIB. I. ET II.

De

MORBIS ET AFFECTIBUS CAPITIS,
 CEREBRI, ORGANORUM SENSUUM,
 FAUCIUM ET COLLI.

I. *Quæ sunt præcipuæ capitis affectiones?*



AFFECTUS morbi que capitis quaduplicis sunt differentia. Alii enim in Meningibus seu membranis cerebrum ambientibus; alii in ipsa substantia cerebri, alii in cavitatibus

meatibusque cerebri; alii in tegumentis & *git auctor* cutaneis partibus capitis oboriuntur, qui *lib. 2.* omnes in subsequenti tabella ordine comprehenduntur.

De sensu-
riorum af-
fectibus a-

in ipsa substantia cerebri, alii in cavitatibus

Tabella morborum & affectuum capitis.

Affectus
capitis in-
terni.

Morbi & affe-
ctus capitis alii
sunt

Affectus
pilorum
& cutis.

In Meningibus, ut	{ Cephalalgia, Cephalæa, Hemicrania.
In substantia cerebri, ut & ratiocinationem lædunt,	{ Phrenitis, Melancholica insania, Mania, Memoriæ læsio, Soporosi affectus.
In cavitatibus cerebri & sensum ac motum lædunt, ut	{ Vertigo, Epilepsia, Apoplexia, Paralysis, Convulsio <i>der Krampff</i> / Tremor, Incubus, Catarrhus.
In tegumentis & parti- bus cutaneis capitis, ut	{ Alopecia, Ophiasis, Capillorum defluvium, Phthiriasis, Acores, Vulnus Cranei.

S 3

SECTIO

SECTIO I. DE DOLORIBUS CAPITIS.

1. Cephalalgia & Cephalæa qui morbi sunt, & quæ earum affectionum causa?

Differen-
tia doloris
capitis.



Κεφαλαλγία & κεφαλαία sunt generalia dolorum capitis vocabula, quæ inter se non differunt, nisi doloris vehementia & durationis tempore. Cephalalgia enim, quæ Arabibus Soda dicitur, est dolor capitis non inveteratus nec adeo vehemens, sed Cephalæa est vehemens diuturnus & ægrè cedens capitis dolor, *Galen. lib. 3. cap. 9. de locis affectis teste.*

Causa do-
loris capitis
interna.

CAUSÆ doloris capitis complures sunt, quarum αἰτιολογία id est internæ causæ sunt, aut simplex aliqua qualitas calida, frigida, sicca &c. aut qualitas humori alicui, ut sanguini, bili flavæ, bili atræ, aut pituitæ juncta; aut flatuosi spiritus, qui in venis & arteriis intra caput contentis oclusi sunt; aut vapores fuliginosi, & acres ex ventriculo, epate, liene, utero & aliis visceribus elevati, membranas cerebri obidentes ac distendentes: αἰτιολογία verò causæ sunt, aut aëris ambientis vehemens caliditas, radii solares caput ferientes, frigiditas, crapula, & ictus. De causis dolorum capitis legatur *Galen. lib. 1. cap. 1. de compositione medicamentorum secundum loca.* Harum causarum singulæ per propria agnoscuntur signa, & singula peculiarem desiderant medicationem, ut in sequentibus ostendemus.

Causæ ex-
terna.

2. In doloribus capitis qui aphorismi sunt observandi?

Hi potissimum aphorismi in capitis doloribus observandi sunt.

I. Quibus febricitantibus Urinæ sunt perturbatæ, quales sunt jumentorum, iis dolor capitis vel adest vel aderit, *Hip. 4. Aph. 70.*

II. Quicumque circa distinctionem, indiscriminatimque doloris capitis auxilia adhibent, majus sæpe detrimentum quam emolumentum adferunt, *Galen. lib. 2. cap. 1. de Med. comp. secundum loca.*

Remedia
in dolore
capitis
caute &
cum pru-
dentia ad-
hibenda.

III. Caput dolenti & circumdolenti pus vel aqua vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens, morbum solvit, *Hip. 6. Aph. 10.*

IV. Posteriora capitis dolenti frontis vena incisa remedio est, *Hip. 5. Aph. 68.*

V. Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt ac sterunt, in septem diebus pereunt, nisi febris eos apprehenderit, *Hip. 6. Aphor. 51.*

VI. Lac dare caput dolentibus malum, *Hip. 5. Aphor. 64.*

VII. Si dolor capitis cum gravitate ad-est, humorum multitudinem ostendit; si cum mordicatione, humoris acredinem; si cum pulsu, inflammationem; si cum tensione spirituum flatulentorum copiam; si rursum tensio fiat cum pulsu, meningum inflammationem: si verò tensio fiat cum gravitate, humorum flatuumque copiam intra meninges contentam significat. Quæ signa omnia & causas & curandi modum indicat *Galen. lib. 1. cap. ultimo ad Glauconem.*

Signa di-
versarum
causarum
doloris ca-
pitis.

2. Cephalalgia sive dolor capitis ex nuda caliditate quibus ex causis oboritur, per quæ signa dignoscitur, & quibus remediis curatur?

Raro dolores capitis ex sola ac nuda intemperie citra præsentiam alicujus humoris fiunt; & quando fiunt non diu perdurant: Frequenter autem ubi est vel plethora vel κακὸν χυμὸν.

Dolor ca-
pitis ex in-
temperie
calida.

Causæ αἰτιολογία doloris capitis ex causa sola

Sola calida intemperie orti sunt, solis radii calorque caput feriens: aut aër ambiens æstuans, impenseque arte calefactus ut in hypocaustis, aut odor rerum calidarum, ut aromatum. *Hipp. aph. 28. lib. 5. suffitus aromatum capitis gravitatem facit.*

Signa. Signa calidæ intemperie sunt; Dolor capitis est vehemens, caput ad tactum manus calidum sentitur, Æger rerum frigidarum applicatione gaudet.

Curatio. Curatur hic morbus duobus instrumentis, victus ratione, & medicamentorum refrigerantium impositione.

Dieta. Victus ratio huic dolori convenit primum, ut utatur æger cibis refrigerantibus & boni succi, veluti sunt carnes pullorum, pisces squamati cum aceto conditi, item ova sorbilia, ptisana, lactuca, & bibat aquam hordei. Secundò versetur ac dormiat in loco frigidiusculo. Tertio, utatur somno longiori. Quarto caveat ne alvus constriungatur, & ubi constipata est, utatur esu prunorum Ungaricorum, cum quibus coctæ sunt foliorum senæ 3 ii.

Medicamentaria refrigerantia. Medicamenta sequentia illi conveniunt: Electuarium refrigerans.

℞. Conservæ Rosarum ʒ ii.

Manus Christi simp. ʒ s.

Pul. Margaritarum præparatarum ʒ r. cum q. f. Syr. Violarum. Fiat electuarium, de quo sumat æger mane ac vesperi quantitatem mediæ nucis juglandis.

Potio alterans ac refrigerans.

℞. Syr. Acetositis citri,

Violarum an. ʒ i.

Aquæ { Endiviæ,

Cicoreæ an. ʒ iiii.

Misceantur fiat potio, cujus una pars media mane, altera vesperi tepida exhauriatur.

Topica remedia foris applicanda.

Epithema alterans.

℞. Aq. Rosarum ʒ iiii.

Aceti rosarum ʒ s.

Olei rosarum ʒ ii.

Albumina ovorum n. 2. conquassata simul misceantur & duplicatis linteolis excepta syncipiti juxta coronalem suturam & temporibus applicentur.

Unguentem alterans.

℞. Olei Rosarum ʒ i.

Muscilag. Seminum psilii,

Et cottoniorum cum q. f. aquæ rosaceæ factæ ʒ i. ceræ albæ parum, liquefacta simul ad ignem, misceantur, fiat unguentum quo inungantur tempora & synciput.

Sacculus alterans capiti imponendus.

℞. Florum rosarum,

Violarum,

Nymphææ an. M. ii.

Verbenacæ,

Malvæ,

Chamæmeli an. M. i.

Pulv. Sandali rubei ʒ ii.

Camphoræ ʒ i. Concidentur crassiusculè, & in oblongum linteum sacculum instar fasciæ confuantur & intersuantur, quod postea irroretur cum aqua & aceto rosaceo, capitiq; & temporibus circumligetur. Utile quoque est, pedes fovere ac abluere in aqua calida in qua incoctæ sunt sequentes herbæ.

℞. Fol. Salicis,

Malvæ an. M. ii.

Flor. Chamæmeli,

Melliori an. M. i.

Capit. papaveris n. x. Coquantur in aqua q. f. per horam dimidiam.

3. *Cephalalgia ex nuda intemperie frigida quas habet causas, quibus dignoscitur signis, & quibus remediis est curanda?*

Causa doloris capitis ex nuda intemperie frigida orti sunt, aut intensâ aëris frigiditas caput nudum ambientis: aut perfusio capitis cum frigidior aliquo liquore.

Signa diagnostica doloris capitis ex frigiditate sunt, facies decolor & subalba, & ad tactum capitis nulla sentitur caliditas; insuper frigidorum admotione offenduntur.

Dolor capitis ex frigiditate nuda ortus duobus curatur instrumentis, victus ratione & medicamentorum usurpatione.

Victus ratio ei accommodata est, ut versetur in aëre vel loco calidiusculo, ac vitet frigidum aërem: à lactis, pisorum, carnis suillæ

Unguentum.

Sacculus capitalis.

Lotio pedum.

Causa.

Signa.

Curatio.

Dieta.

foillæ ac piscium esu absteineat, vescatur autem ovis recentibus ex iisque paratis jusculis, Esculenta ejus condiantur aromatibus, cinamomo, croco, Zinzibere ac pipere. Bibat vinum generosum sed moderatè: utatur & moderato corporis exercitio, ac fugiat longum somnum.

Medicamenta.

Medicamenta in tali dolore. conveniunt subsequencia.

Pulvis masticatorius.

℞. Diamoschi dulcis ʒ ii. in rotulis, ex quibus duas mane jejunus & vesperi devoret, in ore subsequentem pulverem obstruat naribus mane ac vesperi commasticabit.

℞. Cinamomi,
Cariophyllorum an. ʒ s.
Cubebæ an. ʒ i.
Macis ʒ i.
Carvi ʒ s.

Foliorum Majoranæ ʒ ii. concidantur simul crassiusculè & commisceantur, de quo pro una vice masticer æger quantum tribus digitis comprehendere potest, ex quo ubi sapor omnis evanuit, rursus expuat.

Topica remedia foris capiti applicanda.

L I N I M E N T U M.

Linimentum cerebri calfaciens.

℞. Olei trini,
Rutæ an. ʒ s.
Ceræ parum, liquefiant ac postea eluantur cum aqua Lavendulæ aut vino ardente, quibus effusus, admisceantur
Pul. Majoranæ,
Betonicæ,
Carvi an. ʒ i. fiat Linimentum, quo bis per diem inungantur tempora, nares, & futura coronalis in syncope.

S A C C U L U S.

Sacculus capitalis.

℞. Majoranæ,
Serpilli,
Betonicæ,
Mentæ an. M. i.
Flor. Lavendulæ,
Spicæ celticæ an. M. s.
Cariophyllorum ʒ ii.
Seminis carvi ʒ s. concidantur & in oblongum sacculum consuantur & intersuan-

tur, fiat sacculus capitalis, qui aqua Lavendulæ madefactus & per ferventes lateres calefactus, aut in vino Rhenano calido madefactus, rursusque manibus expressus capiti fasciis circumligetur. Manibus gestet fasciculum aut florum Lavendulæ aut Majoranæ, aut florum Cariophyllorum, aut pomum Ambræ in Myropolii vocatum, quod ex aromatibus est confectum, & ex his frequenter odorem naribus attrahat. Iturus cubitum foveat lavetque pedes in aqua calida, cui incoctæ sunt Salvia, ruta, absinthium, Serpillum, Melilotum, chamæmelum an. q. s.

Odoramenta.

Lotio pedum.

4. *Cephalalgia sive dolor Capitis ex sola siccitate quas habet causas, quæ signa, & quibus remediis curandus?*

Siccitas passiva est magis quam activa Dolor caliditas & perpetuè oboritur aut ex caliditate aut frigiditate & per se nullum efficit dolorem, Galeno lib. i. cap. 5. de causis symptom. teste.

Causa.

Causæ itaque proximæ siccitatis effectrices sunt aut caliditas aut frigiditas: Remotæ verò causæ quæ cerebrum exsiccant, sunt aer siccus & squalidus, continua & laboriosa exercitia, crebra Venus, vigiliæ continuæ, & animi moeror.

Signa arefacti cerebri sunt oculi concavi, Signa nares aridæ, nihilque humiditatis ex eis profluens, & continuæ vigilie.

Curatio exsiccati cerebri perficitur victus Curatio, ratione & pharmacis.

Dietæ.

Victus ratio huic convenit humida: versetur itaque æger in aëre aut natura aut arte humefacto. Vescatur cibus humidus & boni succi, veluti sunt ova sorbilia, pulli gallinacei &c. Vinum bibat tenue aut cerevisiam tenuem, somno utatur quam potest largissimo, sit ociosus, vitet Venerem, & omnes vehementes corporis motus, utatur & lavacris sive balneis aquarum tepidarum.

Remedia topica cerebrum humefactantia.

L I N I M E N T U M.

Linimentum cerebri humefactans.

℞. Olei violarum,
Nymphetæ,

Rosæ.

Rosarum an. ʒ s.

Pinguedinis Gallinæ,

Butyri salis experti an. ʒ i.

Aceti rosacei guttulas 4. Misceantur, fiat linimentum, quo inungat tempora & syn-
cipur, indat naribus guttulas aliquot olei ro-
sarum. Commodissimè uti potest & lotio-
ne pedum aquæ tepidæ in qua incocta sunt
Malva, violaria & chamæmelum.

Observandum in hac curatione. Nota tamen curationem siccitatis cerebri
variandam esse pro ratione caliditatis ut fri-
giditatis, cui siccitas est adjuncta, quarum
qualitatum curationem paulò ante tradi-
dimus.

5. *Cephalalgia sive capitis dolor ex nuda hu-
miditate quas habet causas, qua si-
gna, & curatione cu-
randus?*

Dolor capitis ex humiditate. Humiditas similiter ut siccitas est passiva
qualitas, & nuda per se nullum excitat dolo-
rem, sed adjuncta caliditati vel frigiditati sæ-
pe dolorem infert. Hoc loco humiditas non
est intelligenda de redundantia vitiosorum
humorum in cerebro, de quibus paulò post
dicemus, sed de ea, quæ ab externis cau-
sis in cerebro excitatur. Humidius autem
cerebrum redditur, aut ab aëre humido,
aut ab humectantium alimentorum ac me-
dicamentorum usu, aut ex assidua lotione
capitis cum aqua calida.

Causa. Signa humiditatis cerebri sunt, nares hu-
midæ & profluens mucus ex naribus, oculi
eminentes ac humidi, continua somnolen-
tia. Sed, ut dixi, humida constitutio cere-
bri, quatenus est nuda qualitas nullum ex-
citat dolorem, sed tantummodo gravitatem
capitis; si verò humiditas conjuncta est vel
caliditati, vel frigiditati, tum ad curationem
earum qualitatum recurrendum est. Ubi
verò vitiosis humoribus, sanguine, pituita,
flava aut atra bile refertum est cerebrum, &
inde exciterur dolor, ejus curandi rationes
in sequentibus docebimus.

Signa. Humiditas cerebri sola
potius stu-
piditatem
quam do-
lorem in-
ducit.

6. *Cephalalgia ex Sanguinis redundantia
in venis capitis, quas habet causas,
qua signa, & quibus reme-
diis curanda?*

Qui plethoricum habent corpus, id est

qui venas habent refertas sanguine inculpa-
to, sive qui natura sunt sanguinei, iis & ve-
nulas in cerebro ac capite repletas esse ne-
cessè est, & inde sæpe propter intensiorem
venarum, capitis gravitate & doloribus in-
festantur.

Causa. Causæ verò exuberantiæ sanguinis in ve-
nis sunt, otium ac quies, & alimentorum
boni succi uberius usus, & neglectus venæ
sectionis, ac aliarum tempestarum eva-
cuationum.

Signa. Signa doloris capitis ex sanguinis redun-
dantia sunt, tota facies rubicunda, vena-
rum in pedibus ac manibus & in fronte tu-
mor & sensibilis eminentia, urina crassa &
rubea, & dolor cum pravitatem capitis.

Curatur hic dolor tribus potissimum in-
strumentis, vel affectione, victus ratione,
& convenientibus pharmacis. Ante venæ
sectionem perpetuo in hujusmodi dolori-
bus subducenda est alvus, quod sequenti
clystere commodè fieri potest.

R. Fol. Malvæ,

Atharæ,

Violariæ,

Mercurialis an. M. i.

Prunorum Ungaricorum n. ro. De-
coquantur in aqua q. s. ad tertias, colati juris
hujus decocti ℥ i. cui admisce,

Cassie recentè extractæ,

Elect. lenitivi an. ʒ vi.

Sacchari cand. resoluti ʒ i.

Olei violacei ʒ i.

Salis communis ʒ i.

Fiat Clyster & infundatur per syringa in
rectum intestinum. Tribus horis post Cly-
stera incidatur vena communis, quæ Me-
diana dicitur.

Victus ratio hujusmodi præscribenda est
ægro. Versetur in aëre frigido & sicco, e-
sculenta ejus potius sint assata, quam elixa,
cum quibus addat esum lactuæ, & frequen-
ter utatur prisana, prunis Ungaricis & simi-
libus. Vitet autem ova forbilia & pullorum
gallinaceorum carnes, bibat aquam hor-
dei, à vino prorsus abstineat. Tandem ter-
tio die post venæ sectionem, utatur sequen-
ti bolo ad subducendam alvum.

*Enema al-
vum leni-
ter subdu-
cens.*

*Vena sectio
optimum
in hoc casu
remedium.*

Dieta.

*Bolus al-
vum sub-
ducens.*

T

℥ Pul-

℞ Pulpæ cassiæ recentē evulsæ ʒ x.

Conspersatur pulvere Cinamomi ʒ i.
& saccari albi q. s. Assumat una hora
ante prandium, sequenti verò die rursus
vena cubiti exterior, quam Cephalicam si-
ve capitis venam nominant, aperiatur.
Quod si autem ætas aut virium imbecillitas
venæ sectionem impedit, cucurbitulæ cer-
vici affigendæ erunt.

Topica remedia huic dolori convenien-
tissima sunt;

LINIMENTUM.

℞. Olei Chamæmelini,
Anetini,
Nymphææ,
Rosarum an. ʒ iir.

Ceræ parum. Fiat linimentum, quo
inungatur synipitur, tempora & nares: aut
utatur sequenti Epithemate.

Epithema
refrige-
rans.

℞. Succu Lactucæ,
Succi Fol. falicis an. ʒ iir.
Aq. Rosarum ʒ vi.

Aceti Rosarum ʒ i. Misceantur, &
cum duplicato linteolo excepta futuræ co-
ronali & temporibus applicentur.

7. Cephalalgia biliosa quibus ex causis
excitatur, quibusque ex signis de-
prehenditur, & quibus reme-
diis est curanda?

Dolor ca-
pitis ex bi-
lio.

Oritur frequenter acris & vehemens ca-
pitis dolor ex redundantia biliosi humoris,
sive is per totum corpus sit diffusus, sive in
venulis cerebri collectus, sive etiam ex in-
ferioribus visceribus biliosus vapor ad ce-
rebrum delatus. Familiaris est hic dolor iis
qui temperamento calidi sunt & sicci.

Causa.

Causæ autem ex quibus biliosus humor
& procreatur & augetur sunt, ira, sollicitu-
do, vigilæ, labores, inedia, vini meracio-
ris frequens potatio, & ciborum acrium
ac calidorum comestio.

Signa.

Signa biliosæ Cephalalgiae sunt pallor fa-
ciei, amaritudo oris, linguæ & foraminum
narium siccitas. Talis dolor capitis ut plu-
rimum est symptoma tertianarum febrium.

Curatio.

Curatur hic dolor tribus instrumentis,
venæ sectione, victus ratione, & medica-
mentorum usurpatione.

Si æger est juvenis & viribus adhuc con-
stat, vena ei incidatur humeraria interna
quam hepaticam vocant, vel mediana ejus-
dem lateris, sed parcius paulò sanguis de-
trahendus est quam in cephalalgia san-
guinea.

Vena secti-
cum caute-
la adhiben-
da.

Victus ratio debet esse causis doloris con-
traria, refrigerans nimirum & humectans.
Versetur itaque ægrotus in aëre moderatè
frigido & humido, qui si talis naturalis ha-
beri non potest, arte talis est efficiendus, cu-
biculi nimirum pavementum frigida aqua
conspargendo, aut folia falicis, junci, aut
graminum per solum cubiculi sternendo, &
radios solares è cubiculo excludendo. U-
tatur æger quantum fieri potest somno lon-
gissimo, cibis vescatur boni succi ac refri-
gerantibus & humectantibus, quales sunt
caro pullorum Gallinaceorum cum aceto
aut omphaciis cocta, item lactuca & ace-
tosa, & ex piscibus melanuri & lucii ac go-
bii, bibat aquam hordei, in qua pauxillum
cinamomi est incoctum, à vino & cerevisiis
fortioribus penitus abtineat, balneum a-
quæ dulcis omnibus biliosis naturis conveni-
entissimum est, modo absit febris.

Somnus
tamen lon-
gus in fe-
bribus bi-
liosis ca-
pitis replet
vaporibus:
Ideo in fe-
bribus hoc
remedium
non adeo
est tutum.

Medicamentis subsequenter tali utatur
ordine: Primo fervor & acris evaporatio
biliosi humoris mitigetur sequenti potione.

℞. Syr. Granatorum,
Acetositis citrii,
Violarum,
Nymphææ an. ʒ i.
Aq. Cicoræ ʒ iij.
Endiviæ,

Potio alte-
rans san-
guinem.

Acetosæ an. ʒ iiii. Commiscean-
tur ac fiat potio, quæ jejuno ventriculo per
quatuor vices ebibatur. Deinde purgetur fla-
va bilis uno ex subsequentibus pharmacis.

Potio bilem purgans.

Hausus
cholaga-
gus.

℞. Rhabarbari electi ʒ ii.
Fol. Senæ ʒ i.

Cinamomi optimi ʒ i. Contusa ma-
cerentur simul in aquis Cicoræ & Endiviæ
an. ʒ iiii. per spacium unius noctis, deinde
colentur, colatoque jusculo admisceantur,
Elect. Rosati Mesuræ ʒ i.
Pulpæ Cassiæ ʒ s.

Fiat

Fiat haustus. Exhibeatur tepida sex horis ante prandium, vel purgetur sequenti bolo.

Bolus.

℞. Pulvæ Cassiæ recentè extractæ,
Elect. lenitivi an. ʒ s.
Diagridii gr. v.
Cinamomi,

Anisi an. ʒ s. Misceantur, fiat bolus, qui conspergatur sacco, & devorandus ægrotto offeratur sex horis ante prandium: vel caput biliosis humoribus purgetur sequentibus pillulis.

Pillula.

℞. Pilæ aurearum, aggregatarum an. ʒ s. Reformetur pillulæ cum melle Rosaceo N. 27. & exhibeantur circa medium noctis.

Si verò biliosi vapores & acres humores à subjectis partibus eleventur, & cerebrum inficiant, sequenti clystere commodissime detrahi & evacuari possunt.

Clyster revellens à capite & simul alvum.

℞. Malvæ,
Althææ,
Violariæ,
Mercurialis,
Cicoræ an. M. i.
Hordei integri ʒ i.

Sem. Endiviæ,
Scariolæ,
Lactucæ,

Portulacæ an. ʒ iiii. Concisa & contusa coquantur in q. s. aquæ ad tertias & percolentur, colati juris ℞. ʒ xv. quibus admisce,

Pulvæ cassiæ ʒ i.
El. Hieræ simpl. ʒ s.
Ol. Violarum ʒ iiii.

Salis communis ʒ i. Misceantur, fiat enema, quod recto intestino infundatur & retineat æger intra se per dimidiam horam vel paulò amplius.

Topica remedia post biliosi humoris evacuationem sequentia sunt applicanda.

LINIMENTUM.

Linimentum refrigerans.

℞. Ol. Violarum,

Nymphææ an. ʒ ii.

Aceti Rosacei parum. Misceantur,

Epithema. quo inungantur tempora & coronalis fuitura.

EPITHEMA.

℞. Aq. Rosarum ʒ v.

Albuminum ovorum n. ii.

Succi Rosarum ʒ s.

Aceti Rosacei ʒ s. Misceantur ac

conquassentur, fiat Epithema ac fasciis duplicatis exceptum temporibus ac Syncipiti imponatur.

Naribus frequenter admoveatur Spongiola in aqua rosacea, in qua parum camphoræ est resolutum, madefacta, cujus odore refrigeratur cerebrum. Lavet pedes ac manus lavacro paulò ante in capitis dolore ex siccitate orto, descripto.

Si vigiliis supra modum infestetur æger, inungantur ei tempora, & narium foramina sequenti linimento.

℞. Unguenti populi ʒ ii.

Opii in pauxillo aceti rosacei resoluti gr. v. Misceantur, fiat Linimentum.

8. *Cephalalgia pituitosa quibus ex causis excitatur, quæ ejus signa, & quibus remediis curanda?*

Cum cerebrum pituitosis excrementis redundat, aut venulæ per meninges sparsæ pituitoso sanguine obstruuntur, varios in corpore excitant morbos, ut in catarrhi curatione ostendemus: Potissimum autem dolorem efficit, & gravitatem capitis.

Causæ augentes pituitam in cerebro sunt aër ambiens frigidus & humidus, frequens usus ciborum sanguinem frigidum & humidum procreantium, quales sunt lac, caseus, pisces, caro suilla recens. Item ocium & somnus meridianus.

Signa hujus doloris sunt, capitis gravitas cum dolore, somnolentia, pigritia, omnium sensuum inertia, & pituitosæ defluxiones per nares & palatum.

Curatur hic dolor duobus instrumentis, victus ratione, & medicamentorum usurpatione.

Victus ratio debet esse calefaciens & exsiccans. Versetur igitur æger in aëre calido & secco, qui, si temporis ratione talis natura esse non potest, arte talis est efficiendus,

ut igne luculento & suffumigationibus aromatum & rerum calidarum, veluti sunt flores Lavendulæ, baccæ Juniperi, Cariophyllum, Cinamomum, Succinum, thus, styrax calamitha & benzoi &c. vel sequentis pulveris odoratissimi in candentes carbones injecti fumigio.

*Pulvis pro
fumigio ad
cerebrum
exsiccan-
dum.*

℞. Benzoi,
Styracis calamithæ an. ʒ ii.
Cariophyllorum ʒ iiii.
Granorum Juniperi ʒ s.
Florum Lavendulæ ʒ ii. Contundan-
tur crassiusculè, fiat pulvis ad suffitum.

In cibo viter pisces, lac, suillam carnem, & omnia lentum ac crassum sanguinem generantia: aflata præferat elixis, elixa vero semper condiantur aromatibus calefacientibus & siccantibus, veluti sunt Piper, Zinziber, Cinamomum, Maces, Crocus, &c.

Potus.

Potus sit vinum generosum Rhenanum aut aromatibus conditum, quod claretum vocant aut hydromeli. Utatur quantum fieri potest validiori exercitio ac corporis motione, plusque semper vigilet, nec somno sit deditus.

*Somnus
enim hu-
medat.*

In Medicamentis exhibendis hujusmodi servetur ordo: Primum omnium excrementa pituitosa è toto corpore detrahantur sequenti clystere.

*Clyster pi-
tuitam
evacuans.*

℞. Malvæ,
Althææ,
Chamæmeli,
Mercurialis,
Betonicæ,
Serpilli,
Majoranæ,
Centaurii minoris an. M. s.

Fol. Senæ Alexandrinæ ʒ s. Concidan-
tur ac concoquantur in q. s. aquæ ad tertias,
colentur.

℞. Colati juris ʒ xv. quibus admisce
Hieræ simplicis ʒ s.
Diaphæniconis ʒ s.
Mellis Rosacci ʒ i.
Ol. Rutacei,
Chamæmelini an. ʒ i. s.
Salis communis ʒ i. Misceantur, fiat
enema, jejuno infundatur in rectum intesti-

num, ac retineat intra se per dimidiam ho-
ram aut paulò amplius.

Deinde concoquantur & extenuentur pi-
tuitosi humores sequenti potione.

℞. Rad. Fæniculi,

Petroselin,

Apii,

Peoniar an. ʒ s.

Sem. Anisi,

Fæniculi,

Sileris montani,

Carvi an. ʒ ii.

Herb. Majoranæ,

Betonicæ,

Salviæ,

Scordii,

Cardui Benedicti,

Serpilli an. M. s.

Fl. Stæchados Arabicæ,

Rorismarini an. ʒ i.

Cinamomi,

Maceris,

Zingiberis an. ʒ s. Herbar & flores

concidantur, reliquæ vero contundantur
crassiusculè, & simul commixta cantharo
stanneo imponantur & superfundantur aq.
t̃b iiii. **ein halß Strübechen.** Et tan-
dem junctura canthari seu operculum fer-
mento conglutinetur, & in lebetem aqua
plenum collocetur, ac per duas horas con-
tinuè coquatur, ac tandem postquam re-
frigit, coletur, colato juri admisceantur,

Syr. de Hysopo,

de Stæchade,

Oxymellis simplicis an. ʒ iiii. Fiat po-
tio, de qua æger & diluculo & una hora ante
coenam quotidie ebibat calefactæ ʒ v. uta-
turque ea tantisper donec in urina conco-
ctionis signum appareat. Vel loco hujus de-
cocti utatur sequentibus syrups.

℞. Oxymellis squilicici ʒ i.

Syr. de Stæchade ʒ s.

Aq. Majoranæ,

Betonicæ,

Apii an. ʒ i. Misceantur, fiat haustus.

Sumat hunc haustum diluculo, & una ante
coenam hora, & toties reiteret, donec con-
coctionis nota in urina conspiciatur. Post
sufficien-

*Potio con-
coquens &
alterans
pituitam.*

sufficientem pituitosi humoris concoctionem evacuetur detrahaturque uno ex sequentibus remediis.

Bolus pituitam egregie evacuans.

Bolus Phlegmagogus.

℞. Agarici Trociscati ℥ iiii.

Diaphæniconis 3 vi.

Diatholici 3 ii Misceantur, fiat bolus, qui conspergatur pulvere saccari albi & devoretur 6. horis ante prandium. Cum autem pituitosi humores ut plurimum tenaciores sint, quàm quod una vice in universum evacuari possint, necesse est bis rerve caput purgare, id quod sequentibus pillulis commodè fieri potest.

Pillula captales.

Pillula pituitam cerebri mirificè detrahentes.

℥ Mass. pill. cochiarum, Aurearum,

Alephanginarum an. ℥ i.

Agarici Trociscati ℥ ii.

Trociscor. Alhandali gr. v.

Mastiches,

Cinamomi,

Anisi an. gr. vi. Cum Aqua Majoranæ conformentur pillulæ ex singulis 3 n. xvii. ex quibus jejunos sumat 3 i. & utatur eis singulis mensibus.

Qui magis delectantur potabili pharmaco, is sequens potio commodè offertur.

Potio vel infusio pituitam evacuans.

Hauftus phlegmagogus.

℥ Agarici Trociscati 3 ii.

Zinziberis,

Anisi,

Cinamomi an. ℥ i. Contusa infundantur ac per noctem macerentur in aq. Majoranæ 3 iiii. manè levissimè ebulliant, ac fortiter exprimantur ac colentur, colato jusculo admisceantur Diaphæniconis 3 iiii. fiat haustus, qui ebibatur tepidus sex horis ante prandium. Probe purgato corpore, sequentia Topica remedia commodissimè adhiberi possunt.

Gargarium.

Gargarisumus reliquias pituitæ ex cerebro potenter proliciens.

℞. Rad. Pyrethri 3 s.

Sem. Erucæ 3 vi. Contusa coquantur in aquæ & aceti an. 3 x. simul mixtis ad medias, colentur, colato jusculo admisceantur

mellis rosati 3 iiii. fiat gargarismus, quo tepido jejunos utatur æger, ubi primò per semihoram caput calidis linteolis pleniter conficitur. Per nares attrahitur pituita commodissimè, si rad. Gentianæ instar calami arundinacei aptata foraminibus narium indatur, aut si succus radices betæ rubæ per nares sursum attrahatur, vel si excitetur sternutatio, id quod sequenti pulvisculo per nares attracto confici potest.

Errhina.

℞. Pul. Hellebori albi 3 s.

Piperis nigri 3 s.

Sternutamentum.

Majoranæ 3 i. Misceantur, fiat pulvisculus.

His omnibus peractis corroborandum est cerebrum sequentibus medicamentis; rantiæ. sumat æger singulis septimanis semel 3 i. Theriacæ Andromachi cum generoso vino solutam. Reliquis diebus utatur mane ac vesperti duabus rotulis aut Diamoschi, aut Diambæ, aut assumat hujus Elect. quant. semijuglandis.

ELECTUARIUM.

℞. Confer. Rorismarini 3 iiii.

Specierum diambæ,

Diamoschi an. 3 i. cum aq. Juniperi

& Syr. de Betonica q. s. Fiat Electuarius.

Electuarium ad corroborandum cerebrum pituita repletum.

9. Cephalalgia sive Capitis dolor Melancholicus unde excitatur, quibus indicis agnoscitur,

Qua ratione curatur?

Dolor capitis ex Melancholia, de quo hoc loco nobis sermo est, differt à Melancholia sive melancholica insania, de qua paulò post dicemus.

Dolor capitis ex melancholici humoris copia. Causa.

Causa autem Melancholici doloris in capite excitatur per vapores sive consensum ex melancholici humoris vaporibus, qui vel in liene vel matrice vel fundo ventriculi coacervatus est. Cum enim melancholicus humor valde sit flatuosus, sæpe dolorem in capite excitat sine Ratiocinationis turbatione.

Signa doloris melancholici petenda sunt ex constitutione corporis & ex moribus a-

Signa.

nimi. Qui enim natura sunt Melancholici, ex levi occasione capitis dolore melancholico instantur. Constitutio corporis Melancholica est gracilis, hirsuta & colore subnigra. Moribus autem Melancholici plerumque sunt morosi, subtristes, sed constantes & continuis meditationibus profundisque cogitationibus dediti, *teste Galeno in libello de Natura humana.*

Curatio.

Curandus est hic dolor sanguinis detractione, Victus ratione, & Melancholici humoris per convenientia medicamenta concoctione & evacuatione. Primum itaque in hujusmodi doloribus sæculentæ sordes ex alvo & venis mæfaraicis sequenti clystere sunt evacuandæ.

Enema melancholicam educens.

℞. Malvæ,
Althææ,
Violariæ,
Mercurialis,
Majoranæ,
Betonicæ,
Serpilli an. M. s.
Fol. Senæ ʒ s.
Rad. Polypodii,

Hellebori nigri an. ʒ ii. Concisa & confusa coquantur simul in q. s. juris carnis bovillæ non salitæ, ad tertias *biß der dritte theil ingesotten ist.*

℞. Hujus juris colati libram unam & semis, quibus admisce

Cassiæ noviter extractæ ʒ i.
Diacatholici ʒ vi.
Mellis rosati ʒ i. & s.
Olei chamæmalini ʒ iii.

Salis communis ʒ i. Misceantur, fiat enema, quod duabus horis ante prandium recto intestino infundatur. Deinde si æger est juvenis, & vires constant, vena ei secetur humeraria seu bafylica, inter digitos annularem & minimum ejusdem lateris, in quo æger plus molestiarum sentit.

Vena secio.

Dista.

Victus ratio in melancholico capitis dolore talis esto. Versetur æger in aëre calido & humido, cibis utatur moderatè calidis & humidis, quales sunt ova fortibilia, carnes Gallinarum & pisces saxatiles, vinum moderatè bibat album & tenue: balnea a-

quarum dulcium in hoc dolore convenientissima sunt, in quo concoquenda sunt Betonica, Serpillum, Chamæmelum, & Majorana; somnus quoque largior ei salutaris est; Porro mulieribus quarum uterus melancholico humore est repletus, iis non vena humeraria sed saphena, aut vena interna sub malleolis est secanda. Post venæ sectionem humor melancholicus sequenti potione est concoquendus.

℥. Cort. rad. Capparis,
rad. Apii,
Feniculi,
Petroselini,
Polypodii an. ʒ s.

Helebori nigri ʒ ii. Contusa mace-
rentur per noctem in aceto, altero die ad-
dantur sequentes herbæ:

℥. Melissæ,
Majoranæ,
Buglossæ an. M. i.
Lupuli,
Adianti an. M. s.
Flor. Stæchados Arabicæ,
Violarum,
Thymian. M. s.

Fol. Senæ ʒ s. Concidantur & una cum prædictis radicibus concidantur in cantharum, quibus adfundantur aquæ ʒ s. obli-
nitoque fermento canthari operculo collo-
centur in lebetem aqua ferventi plenam, ac
simul coquantur per tres horas, deinde co-
lentur, colato juri addatur libra s. sacchari al-
bi, ac rursus leniter ebulliant, & albumi-
nibus ovorum duorum clarificentur. Ex hac
potione bibat æger per octiduum diluculo
& una ante cœnam hora, ac singulis vicibus
exhauriat ʒ iii. semper tepidè. Post suffi-
cientem concoctionem & extenuationem
melancholicorum excrementorum evacu-
entur sequenti haustu.

℞. Diacatholici ʒ vi.
Confectionis hamech ʒ ii. -
Syr. Violacei,
Pulpæ cassiæ recentis an. ʒ s.

Aq. Fumariz ʒ iii. Misceantur, fiat
haustus, & tepidus exhibeatur sex horis ante
prandium. Tercio die post evacuationem
uratur

*Balneum
aqua dulcis
Melancholici con-
fert.
In feminis
qua vena
secanda.*

*Potio ad
digeren-
dam & e-
ducendam
Melancholiam.*

*Hauftus
melanage-
m.*

Sudorifica. utatur ærotus sequenti haustu sudorifico.
℞. Theriacæ Andromachi ʒ i.

Mitridatii ʒ s. Dissolvantur cum haustu vini generosi, & tepida diluculo exhibeantur, quo cum sudet æger per horæ spacium. Post hæc corroboretur cerebrum sequenti Electuario.

Corroborantia.

℞. Conservæ anthos,
Melissæ,
Salviæ,
Fumariæ an. ʒ s.
Specier. lætificantis Rhasis,
Diambæ an. ʒ i. cum Syr. de grana-

ris q. s. Fiat Electuarium, de quo assumat æger jejunos quantitatem mediæ nucis juglandis. Præter hæc commodè uti poterit æger capitis leniori frictione cum calidis linteolis, pulvere masticatorio, gargarismate, inunctione & capitis lotione, quæ omnia supra in Cephalalgia pituitosa sunt descripta.

10. *Cephalalgia ex Flatulentis spiritibus, quibus ex causis oboritur, per qua signa dignoscitur, & quibus instrumentis curatur?*

Dolor capitis ex flatibus. Oritur nonnunquam capitis intensissimus dolor ex flatibus crassisque spiritibus, vel intra vel extra calvam sub pericraneo coacervatis & conclusis.

Signa. Signa hujus Cephalalgia sunt, dolor pulsatilis & tumor capitis, præsertim ubi status inter calvam & pericranium inclusus est.

Curatio. Curatur hic dolor victus ratione & pharmacorum convenienti usu. In victus ratione vi-
Dieta. tet æger diligentissimè omnia status crassosque vapores generantia, veluti sunt cepæ, nuces, pisa, & alia leguminum genera. Alimenta autem ejus semper condiantur iis rebus, quæ status discutiant, veluti sunt cuminum *Pfeffer Wdm/carui, Gar Wdm/* cardomomum, majorana, &c.

Enema. Inter pharmaca status ex capite subtrahenda est sequens Clyster.

flatus educens. ℞. Malvæ,
Althææ,
Betonicæ,
Centaurei minoris,
Majoranæ,
Serpilli,

Flo. Anethi,
Chamæmelini an. M. s.

Sem. Carui,
Cymini an. ʒ s.

Furfuris filiginei M. i. Concisa co-quantur simul in q. s. aquæ ad tertias, postea colentur, colati juris accipe ʒ xvi. in quo dissolve, *In tenello tamen corpore sufficit liquorem lb.*

Elect. Indi majoris,
Benedictæ laxativæ an. ʒ s.

Hieræ simpl. ʒ i.
Olei chamæmelini,
Anethini an. ʒ i. & s.

Salis communis ʒ i. Misceantur, & duabus ante prandium horis jejuno applicentur. Deinde utatur æger singulis diebus mane ac vesperti rebus status discutientibus, potissimum ubi nullus adest febrilis calor. Sunt autem status discutientia:

SIMPLICIA.

Pul. Cymini præparati,
Baccarum lauri,
Carui,
Feniculi,
Anisi,
Anethi.

Carminativa seu status discutientia.

COMPOSITA.

Theriaca Andromachi,
Elect. de baccis lauri,
Ror. Diacymini,
Diacalaminthæ,
Diagalangæ.

Topica remedia huic dolori conveniunt, si dolori adjuncta est caliditas capitis.

℞. Olei rosacei ʒ s.
Aq. rosacæ,
Aceti rosati an. ʒ ii. Misceantur, & linteolis excepta temporibus & coronali futuræ applicentur. Si verò non adest notabilis capitis calor, inungatur caput sequentibus oleis.

Epithema.

℞. Olei Chamæmelini,
Anethini &
Ruthacei an. ʒ ii.
Aq. Juniperi ʒ i. Misceantur & inungantur.

*Experi-
mentum
singulare.*

gantur tempora ac synciput. Experientia comprobatum est, dolore tumoremque capitis ex flatulentis spiritibus ortum, statim discussum per inunctionem conficationemque temporum & futuræ coronalis cum allio contuso & aceto vini aut urina infantis commixto. Mirificè conducit & sequens sacculus capiti tepidus applicatus.

℞. Rutæ,
Majoranæ,
Serpilli,
Betonicæ an. M. i. & s.
Baccarum lauri,
Cymini præparati,
Carui an. ʒ i.

Amygdalarum amararum ʒ s.

Concisa & contusa consuantur in sacculum oblongum, & in q. s. aquæ & aceti ebulliant, & expressus sacculus à liquore tepidus applicetur syncipiti & temporibus.

II. Cephalalgia seu dolor capitis ex evaporante ventriculo ortus, quas habet causas, quibus signis deprehenditur, & quomodo curatur?

*Dolor ca-
pitii ex
ventriculo.*

Caput cum sit quasi operculum totius corporis, non tantum per *ιδιωνιδειαν*, id est, primariam ac propriam affectionem, sed crebrò etiam per *συμπνοιδειαν*, id est consensum ac communicationem laborat, quando videlicet inferiores partes, ut ventriculus, epar, lien & uterus affectæ, & ipsius caput per consensum simul laborare cogunt, qui capitis dolor propriè non morbus, sed symptoma est, & curari nequit, nisi prius affecta pars sit curata. Frequentissimè autem caput dolet, ubi ventriculi orificium hiat, ex quo acres ac fuliginosæ evaporationes instar fumi ad cerebrum exhalant ac deferuntur. Causæ hujus doloris sunt laxitas orificii ventriculi, quæ ex intemperie frigida & humida, aut ex biliosa materia aut corrupta pituita orificio ventriculi impacta evenit. Signa causatum hujus doloris sunt, cum dolori capitis simul adest & ventriculi acris ac mordicans dolor, signum est humoris tenuis & acris impacti in orificio ventriculi. Si verò humor impa-

Causa.

Signa.

ctus est pituitosus simul adest & nausea, & jejunos dolor magis affligit, à cibo verò sumpto mitigatur, teste Galeno lib. i. cap. ult. ad Glauconem, qui ita inquit: Si cui caput dolet, simulque fastidiat cibos, & ex fame sentiat in orificio ventriculi mordicationem, curandum est ut evomat: evomet autem vel pituitam, vel bilem, vel utramque simul. Curatio. ratur autem talis dolor capitis victus ratione & medicamentis. Victus ratio debet esse contraria causæ morbi: Si itaque orificio ventriculi inhæret pituita, victus ratio debet esse calida & sicca: si verò bilis, frigida & humida. Quæ autem talia sunt, paulò antè in Cephalalgia pituitosa & biliosa annotata sunt. Dieta.

Quantum ad medicationem spectat, hic Pharmacia. dolor potissimum curatur per vitiosi humoris ex ventriculo vacationem, quæ per vomitum commodissimè perficitur: ante vomitionem verò assumat æger sequentem haustum præparatorium.

℞. Oxymellis simpl. aut oxymellis Squillicici (si pituitosus humor inhæret ventriculo) ʒ ii.

Aq. Raphani ʒ iiii. Misceantur, fiat haustus, qui tepidus exhibetur jejuno hora dimidia ante vomitionem.

Aut evacuetur pituitosus humor sequenti Vomitorium.

℞. Radicum Raphani ʒ s.
Sem. Anethi,

Attriplicis an. ʒ ii. Coquantur Salu vi. in aceti & aquæ an. ʒ v. ad medias, quibus trioli Mercurii ali- admisceantur, quor grana idem præstant.

Oxymellis simpl. ʒ i.

Salis communis ʒ i. Misceantur, fiat haustus, quem eibat jejunos, & post quadrantem horæ proriter vomitum digitorum in fauces insertione.

At verò si æger ad vomitum sit difficilis & ineptus, utatur sequentibus pillulis.

℞. Massæ pil. de Hiera simp.
Asajereth an. ʒ s.

Agarici Troiscati ʒ i.

Ex iis simul contusis formentur pillulæ n. 27. de quibus per septimanam ter pro qualibet Pillula stomachi.

bet vice 9. iturus cubitum deglutiat, aut utatur sequenti haustu.

*Haustus
purgans.*

℞. El. Hieræ simpl. ʒ i.

Tab. Diaturbith ʒ iiii.

Cum aq. menthæ q. s. Fiat haustus, exhibeatur tepidus sex horis ante prandium.

*Vnguentum
stomachale.*

Topicum ei convenit sequens Linimentum.

℞. Olei Nardini,

Mastichini,

Menthæ an. ʒ ii.

Ceræ parum. Fiat linimentum, quo jejunos quotidie inungat orificium ventriculi ad ignem luculentum, actandem laminam tostii panis aceto irroratam super imponat.

Si verò biliosus humor infartus sit orificio ventriculi, post vomitionem sequenti utatur potione.

*Potio bilem in
ventriculo
alterans.*

℞. Syr. Rosarum ex infusione siccarum rosarum confecti,

Syr. de omphatidis, ex mirtillis an. ʒ i.

Aq. Absinthii,

Cicoreæ,

Cassutæ an. ʒ iiii. Misceantur, fiat potio, quam tepidam tribus vicibus per triduum diluculo exhauriat, vesperi vero iturus cubitum devoret tres rotulas Diatrion Sandalon, aut tria pira muscatellina condita, aut frustulum cytoniorum conditorum. Quarto verò die, si æger ineptus est ad vomitionem, purgetur bilis sequenti infusione.

*Haustus
bilem eva-
nuans.*

℞. Myrabalanorum citrinorum ʒ ii.

Rhabarbari electi ʒ ii.

Thamarindorum ʒ s. Contusa macerentur per noctem in aq. absinthii, cichorii an. ʒ iiii. manè leniter ebulliant, colentur & fortiter exprimantur, in eoque iusculo dissolvantur,

Elect. lenitivi ʒ s.

Syr. rosati solutivi ʒ vi.

Misceantur, fiat haustus, & exhibeatur in aurota sex horis ante prandium. Orificium ventriculi inungatur oleo rosarum, aut oleo cytoniorum. Porro ad occludendum ventriculi orificium, & cohibendas vaporum exhalationes, sequenti pulvere uti possumus.

PULVIS.

*Pulvis sto-
machalis,
orificium
ventriculi
claudens.*

℞. Coriandri præparati ʒ s.

Anisi,

Feniculi,

Cinamomi electi,

Carui an. ʒ i.

Zinziberis,

Galangæ an. ʒ s.

Maceris ʒ i.

Corallii rubei præparati ʒ i.

Cytoniorum siccatorum ʒ ii.

Saccari albi ad pondus omnium.

Hujus pulveris semper à pastu assumat æger ʒ i. & abstineat à potu post assumptum pulverem spacio unius horæ. Iturus cubitum corroboret ventriculum ʒ s. Diacytonii aut aut rotulis tribus Aromatici rosati.

Plura de ventriculi hiatu & imbecillitate infra de curandis ventriculi affectionibus dicemus.

12. *Cephalalgia ex crapula & ebrietate orta, quæ ratione curanda?*

Qui aut vinum meracius, aut cerevisiam validam, maximè in qua detestando dolo incocta maceratave est chamæpeuce, largius liberaliusque biberunt, iis ut plurimum è somno expergefactis, caput vehementius dolet, qui dolor pœna est ebrietatis. Ebrietas enim caput perpetuò crassis vaporibus replet, rationem turbat, sensus hebetat, & omnes animæ potentias labefactat. Causæ ebrietatis & signa manifesta sunt nec indigent explicatione. Curatur hic capitis dolor victus ratione & medicamentorum usurpatione. Quantum ad victus rationem attinet, ea varianda est pro ratione consuetudinis, alii enim abstinentia & longa inedia, alii nova repletionem faciliè curantur. Somnus autem longus & moderatum corporis exercitium universis convenit, sed omnium maximè opitulatur balneum aquæ calidæ. Quibus autem ventriculus est imbecillis, eis conveniunt in cibo cremor ptisanæ, ova forbilia, lactuca, pruna Ungarica, & uvæ passæ in aceto maceratæ.

*Dolor ca-
pitis ex
crapula.*

Curatio.

Balneum.

Vomitus.

Ubi itaque post ebrietatem in ventriculo adhuc fluitat materia cruda, & nondum est discussa crapula, statim per vomitum est exoneranda, assumpto prius haustu largiore aquæ tepidæ, cui admixtum est pauxillum oxymellis simplicis. Si verò nec post vomitionem dolor capitis remittat, topica remedia capiti sunt applicanda, qualia sunt sequens Epithema.

Epithemata.

℞. Aq. Rosarum ꝯ iiii.

Aceti rosacei ꝯ i.

Olei rosarum ꝯ s. Commisceantur, & duplicatis linteolis excepta coronali futuræ & temporibus imponantur, aut iisdem locis circumligentur Fol. Brassicæ, in aqua calida madefacta, aut Fol. Rutæ cum aceto rosaceo contrita & tepida applicata. Porro præservant ab ebrietate 15. amygdalæ amaræ ante compositionem commestæ, aut ꝯ i. cornu cervini pulverati assumpta. Similiter & brassica prægustata.

Experimenta singularia.

13. *Cephalalgia in febribus quas habet causas, quæ signa, & quæ ratione sedanda?*

Dolor capitis in febribus.

Febribus ferè omnibus capitis dolor perpetuum est symptoma. Cum enim in quotidiana semper afficiatur ventriculus, in tertiana epar, in quartana lien, per *omnes* simul & afficitur cerebrum.

Causa.

Causæ igitur doloris capitis in febribus sunt vapores ferventiores & acres, vel ex ventriculo, vel ex epate, vel ex liene, aliisque visceribus inflammatis ad cerebrum delati: aut est alvi obstructio. Acerbissimi autem omnium dolores capitis excitantur in febribus, ubi quis in paroxysmo biberit largius, præsertim lac ac aquam.

Prognostica.

Cessat autem hic dolor ut plurimum post aliquam criticam evacuationem, sanguinis è naribus eruptionem, aut vomitum, aut sudoris profusionem. Curata febre & hic dolor simul curatur. Pro causarum autem varietate, & hujus doloris curatio varianda est. Qui itaque ex alvi constipatione dolore capitis laborant, iis statim sequenti clystere alvus est subducenda.

Clyster alvum ad-

℞. Violariæ,
Mercurialis,

Betonicæ,

Majoranæ,

Centaurii minoris ana M. i.

Astrucam
solvens.

Pulpæ colocyntidos linteolo inclusæ ꝯ i. Herbarum concidantur & concoquantur in aquæ q. s. ad medias, in fine vero imponatur & colocynthis, & una ebullitione rursus coquantur, & postea colentur, colati juris accipe ꝯ xv. quibus admisce hieræ simp. ꝯ i. s. ol. viol. chamæm. an. ꝯ i. s. salis communis ꝯ i. fiat Enema, injiciatur jejuno stomacho in rectum intestinum. Altero die si ætas & corporis intemperies patitur, secetur vena brachii dextri, aut Mediana aut Epatica: & ubi dolor post septimum diem non remiserit, commodè & cucurbitulæ cervici affigi possunt. Topicis autem remediis, quibus dolor capitis in paroxysmis mitigari possit, sequentibus uti licebit.

Vena se-
ctio.

℞. Aq. Rosarum ꝯ vi.

Aceti rosati ꝯ i.

Albuminis unius ovi,

Epithema
refrige-
rans.

Olei rosacei ꝯ i. Ex his in unum conquassatis efficiatur Epithema, quod duplicatis linteolis exceptum syncipiti & temporibus applicetur. At ubi ægrotum simul cum dolore capitis continuæ vigiliæ infestarent, sequens cataplasma capiti est imponendum.

℞. Fol. pap. albi, aut loco eorum capiti-
tum papaveris cum feminibus exsic-
catorum, & in aqua calida macerato-
rum, Sempervivi majoris,

Catapla-
sma so-
mnum
conci-
lians &
dolorem
sedans.

Micæ panis an. M. ii. Contundantur simulque eis admisceantur ol. & aceti rosacei q. s. fiat cataplasma, quod temporibus & futuræ coronali applicetur. Cerebrum enim inflammatum intensè refrigerat & simul somnum conciliat.

Mirificam quoque sedandi dolorem capitis in febribus vim habent verberna mascula contrusa & cum aceto sufficiente mixta, & instar cataplasmatum temporibus & syncipiti applicata.

Verbena.

14. *Cephalalgia morbi Gallici quas habet causas, quæ signa, & quomodo curanda?*

Qui lue Venerea seu morbo Gallico infecti sunt,

Dolor capitis ex morbo Gallico.

Causa.

Ati sunt, præter alia sævissima symptomata perpetuo dolore capitis, etsi non acerbo & exquisito, tamen molestissimo infestantur. Causa hujus doloris est sæculentus, putridus, & venenosus sanguis in venulis meningum contentus, aut flatulenti spiritus in arteriis meningum.

Signa.

Signum hujus doloris est manifestum. Comitatur enim reliqua signa morbi Gallici & tumesculos per cutem capitis excitatos. Cessat hic dolor curato ipso morbo Gallico, cujus curandi rationem suo loco proponemus. Mitigatur autem hic dolor sequentibus remediis. Primum materia dolorem inferens sequenti clystere retrahenda est.

Enema revellens à capite.

℞. Betæ,
Althææ,
Mercurialis,
Rutæ,
Fol. Lauri,
Urticæ an. M. i.
Radic. polypodii ʒ i.
Cort. Genistæ,
Sem. Carthamiana ʒ s.
Flo. Stachados,
Chamæmeli an. p. i. Concidendis conficis & contundendis confusis coquantur in aq. q. s. ad medias colentur, colati juris accipe lib. i. suc. Iridis depurati ʒ i.
Elect. Hamech. ʒ i.
Hieræ simp. ʒ s.
Olei Rutacei,
de castoreo,
Anethini an. ʒ i.
Mellis ros. ʒ s.
Salis communis ʒ i. Misceantur, fiat

Enema, quod administretur jejuno ventriculo. Postea avertatur vitiosa materia ex cerebro, vel sanguinis missione, detracto sanguine ex vena cephalica, aut cucurbitulis ad cervicem affixis. Prodest quoque singulis septimanis uti sequentibus pillulis, quæ corruptos humores ex cerebro potentissime detrahunt.

Pillula.

℞. Mas. pil. foetid.
Arabicarum an. ʒ s.
Troc. alhandali gr. iiii. Cum aqua Majoranæ formentur pillulæ n. xv. quæ deglutiantur in aurora sex horis ante prandium.

Topica verò remedia hæc potissimum auxiliantur.

Topica.

℞. Ramentorum ligni Grajaci,

Salviæ,

Stachados,

Rutæ an. M. i.

Vini Rhenani optimi lib. s.

Olei veteris lib. i. Contusa coquantur donec vinum sit absumptum, colentur, cum quo oleo sæpiuscule inungatur caput, aut huic oleo admisceatur,

Parum ceræ & Pul. pulegii,

Serpilli,

Saturciæ,

Origani,

Salviæ,

Sabinæ an. ʒ ii.

Bac. lauri,

Olibani,

Costi,

Zinziberis,

Pyrethri,

Castorei,

Euphorbii an. ʒ i. Misceantur, fiat unguentum, quo inungatur caput, abasis prius crinibus.

Plurimum quoque emolumenti adfert huic dolori fæculorum calidorum ex Milio & sale confectorum capiti frequens applicatio, ac ubi probè caput incaluit sequentis linimenti inunctio.

℞. Ol. rutæ ʒ i.

Theriaceæ Andromachi,

Mitridat. an. ʒ s.

Aq. juniperi stillaticæ q. s. Fiat linimentum.

Experientia quoque comprobatum est sequens unguentum, quo brachia, ubi vena cephalica protenditur, inungenda sunt.

℞. Suc. Enulæ,

Brionæ,

Styracis liquidæ,

Therebinthinæ an. ʒ i.

Gummi Elemi ʒ s.

Thuris,

Iridis an. ʒ i. Ol. irini hypericon q. s. Fiat unguentum cui admisceatur argenti vivi in saliva jejuni hominis mortificati ʒ i. & fiat inunctio brachii singulis diebus.

V 2

15. Ce-

Dolor ca-
pitis ex
vulnere
vel contu-
sione.
Causa.

15. *Cephalalgia ex latione cranei pericranei, & cutis capitis orta, quas habet causas, quæ signa, & quæ ratione curanda?*

Dolor capitis nonnunquam ex violentis procatarctis causis excitatur, ex præcipiti casu videlicet lapsuque ab alto, ictu & percussione violenta, quibus ex causis aut vulneratur cutis, aut contunditur rumpiturque pericranium, aut confringitur cranium: quas capitis affectiones plerumque acerbus dolor comitatur.

Signa.

Signa harum affectionum sunt manifesta & sensibus nostris obvia. In vulnerato enim capite, ubi continuitas cutis solvitur, sanguis affatim profluit, in contusione intumescit cutis, & lividum acquirit colorem. Fracturam verò cranei pro ejus magnitudine & situ fractæ partis, potissimum ubi depressa est calva in menyngeas, gravissima subsequantur symptomata, vomitus, punctivus dolor, apoplexia, convulsio, turbatio rationis, & vocis interceptio, quæ plerumque mortalia sunt signa: quin aliquando sanguis solus per fracturam cranei destillat ad duram menyngeam, ibidemque corruptus eadem inducit symptomata.

Curatio.

Univerſa harum capitis affectionum curatio ad *χειρουργικὴν* refertur, & tribus hisce instrumentis perficitur, victus ratione, artificiosa manuali operatione, & topicorum remediorum applicatione. Victus ratio debet esse tenuis & moderata. Versetur itaque æger in aëre moderatè calido. Frigidus enim aër semper impedit curationem. In cibo utatur victu tenui, boni succi & concoctu facili: Vitet omnia acria, salsa & evaporantia statumque generantia, à vino meraciori & cerevisia plenior, quæ caput facillè tentare potest, in universum abſtineat. In cibo ipsi conveniunt pruna Ungarica, cremor pisanæ, ova forbilia, ex iisdemque parati jusculi, & lac amygdalinum, jusculumque gallinarum. Ubi autem æger calorem aliquem præternaturalem senserit, utatur in in potu aqua hordei, in qua concocta sunt semen coriandri & parum Cinamomi. Quies & corporis ocium, tranquillitas

que animi plurimum faciunt ad citam curationem. In toto porro curationis tempore cavendum est unice, ne alvus sit astricta, ac si id contingat protinus vel esu prunorum cum quibus coctæ sunt 3 i. fol. fenæ alvus lenienda erit, aut sequenti Clystere subducenda. R. Malvæ, Violariæ, chamæmeli, Melilori, Betonicæ, Majoranæ an. M. r. Concisa coquantur in lib. iiii. aq. medias; colati hujus juris accipe 3 xv. Quibus admisce,

Cassia extractæ 3 i. s.

Olei chamæmelini 3 ii.

Salis 3 i. Misceantur, fiat Clyster, infundatur alvo artificiosa applicatione.

In vulneribus capitis prima cura erit ut Vulnera sanguis effluens sistatur, secunda ut inflammatio & tumor arceatur, tertia ut vulnus conglutinetur. Sanguinem è vulnere effluentem sequens pulvis egregie sistit.

Pulvis sanguinem sistens.

R. Farinæ fabarum,

Lentium,

Volatilis, quæ molarum parietibus adhæret an. 3 i. s.

Sang. Draconis,

Thuris,

Myrrhæ,

Aloës an. 3 i.

Terræ sigillatæ,

Gypsi an. 3 i.

Pilorum leporis minutissimè concisorum 3 iii.

Telæ araneæ 3 ii.

Spongix adustæ 3 i. s.

Draganti 3 i. s. Commisceantur, fiat subtilissimus pulvis, quo ita uti licebit: Summe hujus pulveris 3 i. Commisce cum albuminibus 2. ovorum, & succo symphyti majoris & polygoni an. 3 s. Quæ cum ramentis à linteolis mundus decerptis, aut bombace carpta excepta, imponantur vulneri.

Ut autem inflammatio & tumor arceatur vulneri, imponendum est sequens Epithema.

Epithema tumorem arcens.

R. Ol. rosæ,

E mastice an. 3 i.

Aceti rosarum 3 ii. Commisceantur,

& te-

Pulvis egregius ad sistendum sanguinem, Blutstillung vocant Chirurgi.

Epithema, arcens tumorem.

& tepida linteolis excepta vulnere applicentur. Vulnus autem ut consolidetur, si necessitas exigit, primum labra vulneris artificiose confuenda sunt, & sequens Emplastrum vulnere imponendum.

Emplastrum.

R². Herb. Viridium Betonicæ,
Majoranæ,
Hyperici *S. Johana Viraudt* /
Matri sylvicæ *Möschke* nostrat.
Mille folii an. M. i.
Roris marini,
Salviæ,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Verbenæ masculæ,
Symphiti an. M. s.

Contusa simul omnia macerentur per octiduum in sole in vini generosi lib. iiii. quibus post octiduum admisceantur Terebintinæ claræ lib. i. s. Ol. Rosarum, Hypericonis an. ʒ v. de mastice ʒ i. s. coquantur simul ad vini absumptionem, deinde fortiter expressa colentur, quibus tandem addantur Resinæ pinæ liquefactæ, Gummi Elemi an. ʒ iiii. Ceræ albæ liquefactæ q. s. fiat Emplastrum sive cerotum juxta artem, cujus pars sufficiens extendatur super linteolum, & vulnere singulis diebus bis applicetur. Iisdem remediis feliciter curari possunt & contusio, inciso prius tumore si adest, ac mundificato cum melle rosaceo vulnere illito: & fractura levis. Ubi verò & dura meninx læsa est, prodest per fracturam cranei instillare succum calaminthæ, aut oleum mastichinum tepidum, aut subsequens Linimentum.

*In fractu-
ri qua do-
lorem se-
dens.*
R². Adipis suillæ recentis & salis expertæ,
Butyri recentis,
Olei rosacei an. ʒ s. Liquefiant ac commisceantur, tepidaque vulnere instillantur, quæ omnem solvunt dolorem.

Cephalaa.
16. Κεφαλαία quid, qua ejus causa, qua signa, & quomodo curanda?

Ut initio dictum est, κεφαλαία & κεφαλαλγία, capitis affectiones, sola intentione, diuturnitate & contumacia differunt. Est enim κεφαλαία diuturnus, contumax & æ-

grè cedens capitis dolor, qui ex facili occasione vehementes habet exacerbationes. Hic dolor fæminis quam viris est familiarior.

Causæ κεφαλαίας eadem ferè sunt quæ & κεφαλαλγίας, proinde & curatio pro causarum diversitate varianda erit.

Signa hujus doloris sunt, æger neque strepitus, neque clamores, nec latratus canum, neque lucis splendorem, nec vini positionem, neque corporis commotionem aut odores excellentes tolerare potest, sed in tenebris quietus decumbere exoptat. Acerbus est hic dolor, adeo ut ad oculorum radices usque protendatur, & caput malleolo percuti, frangi aut distendi videatur, & quandoque dolor est continuus, nonnuncquam autem per intervalla exacerbatur.

Curatur κεφαλαία quatuor potissimum mediis, victus ratione, venæ sectione, purgatione, & Topicorum applicatione.

Victus autem ratio, purgatio & loculium medicinarum adhibitio pro causarum varietate non alia est instituenda, quam in speciebus κεφαλαλγίας præscriptum.

In genere autem talis institui potest curandi methodus, si humores vitiosi aut vapores ad cerebrum delati causæ sunt κεφαλαίας, quemadmodum ut plurimum sunt, primum aliquo Clystere superius descripto detrahendi erunt: Deinde si vires & ætas ferunt, & caput vel universum corpus sanguine redundat, incidenda est primum vena cubiti exterior, quam κεφαλαίων vocant, & tandem & vena frontis vel saltem de nribus sanguis est eliciendus. Tertio loco tandem purgandum est totum corpus sequentibus pillulis.

R². Mas. pill. Aurearum,
Cochiarum,
Aggregatarum an. ʒ i. cum
syr. de Betonica q. s. Conformentur pillulæ n. 27. & deglutendæ offerantur in aurora, sex horis ante prandium.

Postea commodissime uti poterit æger Apophlegmatis pulvisculo masticatorio & gargasimate, i. gmatisti. Item Errhinis ex succo Beræ, quorum paradigma supra in Cephalalgia speciebus annotata sunt.

Topica vero remedia, nisi causis κεφαλαγίας adjuncta est caliditas, sequentia utiliter applicari possunt. ℞. Ol. rosati ʒ i. Aceti rosat. ʒ s. Misceantur & inungantur tempora. Si vero causis est adjuncta frigiditas,

Inunctio.

℞. Ol. chamæmelini,
Anethini,

Sacculus.

Rutæ an. ʒ 12. Misceantur ac tepidis prædicta loca inungantur: aut,

℞. Serpilli,
Pulegii,
Betonix,
Majoranæ,
Verbenæ,
Fol. Lauri,
Sisimbrii an. M. i.
Flo. Chamæmili,
Mehloti,

Anethi an. M. s. Concisa insuantur sacculo oblongo & coquantur in aquæ & acetii p. æ. q. s. & expresso sacculo à superflua humiditate calidus capiti circumponatur, fasciisque adligetur.

17. *Ἡμικρανία* quid est, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis profliganda?

Hemicrania locus seu sedes.

Ἡμικρανία est dolor in dimidia vel dextra vel sinistra duntaxat parte capitis, qui quandoque in intimis capitis partibus per medietatem cerebri, quandoque extra calviam in pericranio, nonnunquam in musculis tantum temporum sentitur.

Causæ.

Causæ hemicranias communes sunt speciebus κεφαλαγίας ut plurimum tamen excitatur aut à vaporibus, aut ab humoribus frigidis aut calidis ad mediam cerebri partem per venas aut arterias defluentibus ibidemque ageratis.

Signa.

Signa *Ἡμικρανίας* manifesta sunt, dolor videlicet mediæ tantum partis capitis, & qui plurimum per intervalla & circuitus exacerbat. Quales autem sint causæ hujus doloris, vaporesne an humores vitiosi, & quibus qualitatibus juncti, ex signis in speciebus Cephalalgias recitatis facile dignosci possunt. Et quia communes causæ sunt Cephalalgia Cephalæ & Hemicranix, curatio ejus ut supra dictum est, pro causarum varietate alteranda erit. Si itaque

Curatio.

languinis adsit redundantia, venæ sectio præmittenda erit: Si vapor ex inferioribus visceribus sursum feratur, per clystera avertendus est: si humorum vitiosorum copia, vel totum corpus, vel cerebri vasa referta sunt, per convenientia pharmaca primum concoquendi ac tandem evacuandi erunt, quorum remedium copiam in Cephalalgia speciebus proposuimus: Ubi vero cerebri vasa excrementitiis humoribus abundant, quibus adjuncta est caliditas, hisce pillulis commodissime detrahi possunt.

℞. Mas. pill. Hieræ simpl. ʒ i.

Arabicarum ʒ i. s.

Myrabalanorum citrinorum ʒ s.

Rhabarbari ʒ ii.

Spicæ indicæ ʒ s. Ex his omnibus optime contritis formentur pillulæ cum syr. è stacade q. s. instar pisorum, de quibus æger jejunos singulis 14. diebus deglutiat post mediam noctem ʒ iii.

Si vero adjuncta est frigiditas.

℞. Mas. pill. Arab.

Hieræ simp. an. ʒ ii.

Troch. de agarico,

Flor. stacados,

Myrabal. Chebulorum an. ʒ s. Ex his omnibus contritis conformentur pillulæ cum q. s. syr. è Betonica, & utatur eis æger ut de præscriptis diximus.

Topica vero remedia mediæ capitis parti dolenti hæc potissimum conveniunt, causa existente frigida.

℞. Euphorbium cum aceto vini levigatum & instar linimenti redactum, dolentique capitis parti illitum mirifice auxiliatur. Aëtius nullum præsentius remedium in Hemicrania esse scribit quam iterum bubulum aut hircinum cum æquali portione Thuris mixtum, & cum aceto in Emplastri formam redactum, calidumque affectæ parti applicatum. Vel fiat sacculus.

℞. Majoranæ,

Stacad.

Chamæmel.

Beton. an. p. æ. Concisa consuantur in sacculum, qui ebulliat in æ. p. acetii & aquæ, & expressus dolenti parti applicetur.

Miri-

Pillula in causa calida.

Pillula in causa frigida.

Topica singularia.

Mirificè prodest & foramini auris partis do-
lentis tres guttulas repidas Ol. de Euphor-
bio instillare, quod tamen in calida causa
cavendum est. In calida vero causa pluri-
mum juvat si lumbrici terrestres cum aceto
rosaceo conterantur & parti dolenti illinan-
tur.

LIBRI I.
PRACTICÆ
FRANCISCI JOELIS,
SECTIO II.
DE AFFECTIBUS CAPITIS
RATIONEM TUR-
BANTIBUS.

I. *Qui sunt morbi capitis ratiocinationem
turbantes?*

Dolores capitis, qui in præcedentibus
propositi sunt, accidunt in & circa me-
nynges, pericranium, & cerebri membra-
nas. Morbi vero sequentes in ipsa cerebri
substantia contingunt. Et quia cerebrum
est sedes potentia animæ Intellectivæ, per
cerebri morbos turbantur actiones mentis,
videlicet Intellectus, Ratiocinatio & Me-
moriam. Sunt autem, ut supra in tabella mor-
borum capitis est monstratum, morbi in
substantia cerebri contingentes:

Phrenitis,
Melancholica infania,
Mania,
Memoria læsio,
Sopor,
Lethargus.

II. *Phrenitis quid, quæ ejus causa, quæ
signa, & quibus mediis curanda?*

Phrenitis
quid. *Phrenitis* est delirium seu mentis propul-
sio cum febre acuta: *Phren* enim Græci men-
tem vocant, & inde mente captos phre-
niticos vocant. Est autem phrenitis acu-
tissima & perniciosissima affectio, quæ ut
plurimum in septem diebus interimit, si

fit exquisita & vera. Duplex enim ea est,
vera & non vera. Non vera phrenitis est
quoque delirium, sed remittente febre &
ipsum cessat, quæ non est morbus sed sym-
ptoma ardentium febrium. **Causa** phre-
nitidis veræ & exquisitæ est aut vehemens
inflammatio septi transversî, quod & ipsum
Phren Græci appellant, ex cujus malignis &
fuliginosis vaporibus per consensum & i-
psum cerebrum inflammatur & delirium ex-
citatur: aut est sanguis retorridus, aut bilis
flava præusta & accensa in venis meny-
ngum cerebrum interseptientium. In virgi-
nibus autem adultis dilirii causa est putridus
vapor ex corrupto semine sursum ad cere-
brum delatus.

Signa phrenitidos sunt, si sanguis ustus
cerebrum opplevit, mitius & ridiculosè in-
sanit æger: Quibus vero inflammata bilis
per cerebri substantiam est perfusa, ma-
gis ferociunt & immanius insanunt. *Qui*
autem ex inflammatione Diaphragmatis
phrenitici sunt, iis præcordia tument & dis-
tenta sunt. Omnibus autem commune est
accidens, & continua febris & perpe-
tuae vigiliæ: Et si quando somnus illis ir-
reperit, valde is turbulentus & brevis est,
& adeo laboriosus, ut expergesti sæpe è
lecto nudi prosiliant, oculi eorum squali-
di sunt & oratio inordinata, minimè cohæ-
rens & sine sensu. Porro quibusdam in
phrenitide universum cerebrum inflamma-
tur, aliis autem antica tantum pars, qui-
busdam vero posterior tantum. Quibus
totum cerebrum est inflammatum, iis ra-
tiocinatio perit, quibus autem anterior pars
tantum, ii in imaginando aberrant: quibus
vero postica tantum pars est affecta, illis
memoria magis labefactatur.

Curatur Phrenitis victus ratione, Venæ
sectione, & remediorum convenientium u-
surpatione.

Victus ratio in phrenitide talis est insti-
tuenda. Aër ubi æger decumbit æstate ad fri-
giditatem, hyeme vero ad tepiditatem decli-
nare debet. Utrum autem lucidus aut obfu-
rus aër ei conveniat, ex natura ægroti con-
jectandum est. In eo enim quo magis dele-
ctatur,

Phrenitis
hoc
delirium
vocatur ad
differe-
tiam vera
phreniti-
dis.
Causa ve-
ra phreni-
tidis.

Signa di-
versorum
causarum.

Signa di-
versorum
locorum
affectuum.

Curatio.

Dietæ.

*Quies &
somnus
maximè
conducunt.*

*Cibi salu-
bres.*

Potus.

Clyster.

Etatur, contineri eum oportet. Cum autem ut plurimum vehementi agitatione corpus fatigant phrenetici, contineantur quantum possibile est, aut manu administratorum aut vinculis, aut prohibeantur ab omni vehementi & inordinato motu. Nihil enim magis hujusmodi ægrotis convenit quam quies & somnus. Plærique enim per solum somnum sanitati restituuntur. Arceatur æger ab animi vehementi commotione, Ira potissimum & Tristitia. Astantes itaque & amici attemperent se ad ejus mores, & ingenium nunc blandiendo, nunc objurgando. Sæpius tamen ei est assentiendum quam contradicendum. Quantum autem ad cibum spectat, is moderate est ei adhibendus, & quidem in forma sorbitionis. Convenientissima itaque ei edulia sunt cremor ptisanæ, juscula gallinarum, lac ex amygdalis & seminibus papaveris albi simul mixtis confectum, & pruna Ungarica, poma aut pyra assata, & pilces saxatiles &c. Potus illi sit aqua hordei, in qua semen coriandri & pauxillum Cinamomi incocta sunt, cuique est admixtus syr. acidus citri: convenit & lac ex quatuor seminibus frigidis, cum aqua stillaticia Endiviæ confectum, & clara cerevisiæ, tenuisque substantiæ optimè cocta, qualis est Brunswicensis, (Brunswicensis tamen cerevisiæ propter lupulum copiosum valde petit cerebrum, ideoque alia tenui cerevisiæ potius utendum.)

Post victus rationem probè institutam statim in initio morbi alvus sequenti Clystere subduci debet.

℞. Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Lactucæ,
Capitum papav. albi siccor. an. M. i:
Hordei decorticati ʒ i.
Quatuor seminum frigidorum majorum an. ʒ i i.
Concisis concidendis & contusis contundendis coquantur in q. s. aquæ ad tertias, colentur, colati juris accipe ʒ x v. Quibus admisce,
Cassia recenter evulsæ ʒ i s.

Mellis rosati ʒ i.

Ol. Violarum ʒ i i i.

Salis communis ʒ i. Fiat Enema,

quod tepidum infundatur recto intestino.

Sex horis post alvi per Clystera evacuationem, si ætas & vires ferant, nec turbulenta commotio corporis obster, secetur vena cubiti exterior, quam cephalicam vocant, vel si ea non est satis perspicua, mediana vocata, & tantum sanguinis detrahatur, quantum vires ferre possunt: Altero rursus die, si paulo quietior est æger, & vena frontis commodè incidi poterit. At ubi venæ sectionem tolerare non potest æger, cucurbitulæ cum multa scarificatione cervici applicandæ sunt. Altero die post venæ sectionem evacuetur corpus à reterridis & inflammatis humoribus vaporibusque, sequenti haustu.

℞. Rhabarbari electi ʒ i. & s.

Haustus

Cinamomi ʒ s. Contusa macerentur per noctem in aqua Endiviæ sativæ ʒ i i i. altero die ebulliant leniter & exprimantur ac colentur, colato jusculo admisceantur syr. rosati solutivi ʒ i. Pulpæ cassiæ recenter extractæ ʒ s. Fiat haustus, & propinetur in aurora s. horis ante prandium: aut offeratur ægroti sequens bolus devorandus totidem horis ante prandium.

℞. Pulpæ cassiæ recenter evulsæ ʒ i.

Bolus evacuans.

Elect. rosati Mesuæ ʒ i i.

Cinamomi,

Anisi an. ʒ s.

Misceantur & conspergantur saccharo albissimo, fiat bolus. Post evacuationem corroborentur spiritus Vitales & studiosè mitigetur calor febrilis, id quod usu sequentis Electuarii perfici potest.

Electuarium corroborans.

℞. Conservæ rosarum,

Nymphaeæ,

Buglossæ an. ʒ s.

Pyror. muscatellinorum conditorum,

Citri Citrinati conditi an. ʒ i. Concidantur minutissime, eisque admisceantur fragmentorum præparatorum Rubini, Hyacinthi, Margaritarum, Corallorum rubeorum an. ʒ s. seminis papaveris albi, portulacæ,

lactæ, Acetofæ, Lactucæ, an. ʒ i. syr. Violarum q. s. commisceantur, fiat Electuarium, de quo frequenter comedat æger particulam semijuglandis nucis magnitudine.

In phrenitide duo gravissima symptomata ægrum affligere consueverunt, sitis vehemens & perpetuæ vigilæ, quæ sequentibus medicamentis leniri & curari possunt.

Sitis vehemens compescitur succo granatorum aut succo ribes, aut syr. acido Citrii qui cum aqua hordei mixti aut simul aut singulatim, & subinde ægroto propinati, aut sequenti potiuncula.

℞. Syr. Violarum,

è succo Citrii acidi an. ʒ i.

℞. Aq. Endiviæ,

Boraginis,

Acetofæ an. ʒ iiii.

Misceantur, fiat potio, quæ subinde utatur æger ad sitim sedandam & supprimendas evaporationes. Somnus vero sequentibus & intra corpus assumptis & topicis externis conciliandus erit.

℞. Syr. de papavere ʒ i.

Aq. Lactucæ,

Nymphææ an. ʒ ii. Miscantur, fiat haustus, qui quotidie vesperti pro una vice offeratur: post hanc potionem fiat lavacrum hujusmodi.

℞. Fol. Vitis,

Salicis,

Lactucæ,

Flo. Nymphææ an. M. iiii.

Rosarum rubearum,

Violarum an. M. ii.

Capitum papaverum cum seminibus M. i. & s. Concidantur & decoquantur in q. s. aquæ, fiat lavacrum in quo tepido vespertino tempore laventur crura & brachia ægroti & fomententur per dimidiam horam: post lavacrum inungantur tempora sequenti Linimento.

℞. Unguenti populini ʒ i.

Opii Thebaici cum pauxillo aceti rosacei ad ardentem ignem soluti ʒ i. Miscantur, fiat linimentum, quo inungantur tempora & narium foramina: aut eluantur narium auriumq; foramina sequenti decocto.

℞. Vini optimi lib. s.

Sem. papaveris albi,

Hyoschiami albi an. ʒ ii.

Cort. Mandragoræ ʒ i.

Violarum P. i. Decoquantur, fiat

collutio. Quin & cordi & spiritibus vitalibus refrigerandis & corroborandis in phrenitide prospiciendum est sequenti Epithemate.

℞. Aq. Rosarum lib. s.

Buglossæ,

Nymphææ,

Acetofæ an. ʒ iiii.

Aceti rosacei ʒ ii.

Pul. rosarum,

Sandalorum omnium,

Coralli rubei præparati an. ʒ i.

Croci gr. vi.

Camphoræ gr. iiii. Miscantur, fiat Epithema, in quo tepido duplicata linteola madefiant & cordis regioni carpiſque manuum applicentur. Est quoque singulati experientia comprobatum phrenitidis remedium pulmo agni aut arietis recens ab animali evulsus & adhuc tepidus capiti applicatus: prius tamen in phrenitide semper abradendi sunt pili capitis, & ubi refixit pulmo, rursus in aqua recalefaciendus, iterumque applicandus.

2. *Melancholica insania quid, quæ ejus causa, & quibus mediis curanda?*

Melancholia vocabulum apud Medicos nunc pro succo melancholico, qui sæpe est sanguinis à liene in purificatione sanguinis attractus & collectus, nunc, ut hoc loco, pro morbo cerebri usurpatur.

Est autem *melancholia* sive melancholica insania affectio cerebri quam consequitur mentis alienatio sine febre, qua laborantes vel cogitant vel loquuntur vel operantur absurdum. Corruptitur autem in Melancholia potissimum facultas imaginativa, illæsis interdum Ratiocinatione & Memoria.

Causa Melancholicæ amentię est redundantia corrupti & vitiosi humoris melancholici, qui vel sua substantia vel fuliginoso vapore inficit cerebrum & obscurat spiritus animales. Talis autem humor melancholicus colligitur nonnunquam

X in

plus præstant.

Alterantia.

Epithema refrigerans.

Experientum.

Melancholia quid.

Causa.

Situm refrigerantia.

Lap. prunelle quoque hic multum potest in aq. fontana dissolui: spiritus virioli & aliquos guttula hisce julapii admixta.

Somnum concilians.

Linimentum hypnoticum.

Laudani opii gr. iiii. cum liquore convenienti exhibita.

in solo liene, nonnunquam vero in solo cerebro, & interdum dispergitur in universum corpus. In mulieribus vero nonnunquam generatur in utero ex mensium retentione, unde quatuor sunt melancholicæ amentię species. Ubi enim in solo Liene corrumpitur melancholicus humor, & suo vapore inficit cerebrum, dicitur Melancholia *χρονία*. At si in cerebrum confluat hic humor putridus, & inde turbetur ratiocinatio, talis melancholia est affectio cerebri primaria. Si vero idem humor per universum corpus diffundatur, & inde per *συνεχόμενον* cerebrum afficiatur, melancholia universalis nominari potest. Simili ratione si ex retentione mensium turbetur ratiocinatio, uterina melancholia vocatur.

Signa communia.

SIGNA communia omnibus speciebus Melancholię sunt Timor & Mœsticia, quę perpetua ac certissima indicia sũnt vel pręsentis vel futurę Melancholię insanię, teste Hippocrate 6. Aph. 23. His accedunt quod Melancholia laborantes vel cogitant, vel loquuntur, vel efficiunt absurda & à ratione & consilio abhorrentia. Pręterea melancholici avertantur conversationem hominum, animo sunt abjecto, negligunt sua, vitam damnant, & sæpe prę mœsticia sibi mortem consciscunt. Varias autem pro constitutione & mixtura humoris melancholici habent imaginationes. Alii enim brutum aliquod ut lupum aut gallum se esse sibi persuadent, & eorum animantium vocem & gestus imitantur: alii vero se fictile aut vitreum corpus habere arbitrantur, & omnibus occurrentibus cedunt, ne collidantur: alii se mortuos esse opinantur, ac noctu in cimiteriis oberrant tumultusque excitant: alii semper rident, alii semper læchrymantur: alii sunt taciturni: alii afflatu divino se imbutos esse credunt, quorum exempla & historias recitat Galenus lib. 3. 6. de locis affectis.

Plura hujus rei exempla miranda sunt apud Schenckium, & Forestum in observationibus.

Signa melancholię hypochondriacę.

Signa vero singularum specierum Melancholię hæc sunt. In Melancholia hypochondriacę adest cum insanía cordis palpitatio, gravitas & dolor sinistri hypochondrii, frequens flatus ventrisque rugitus, ru-

stus acidi & nonnunquam vomitus, post sumptum cibum augetur eis amentię signum. In melancholia vero in qua cerebrum primaria affectione laborat, nullum signum hypochondriacę melancholię conspicitur, sed gravitas tantum & dolor capitis cum vertigine & sensuum debilitate. Melancholia autem universalis in qua vitiosus humor melancholicus per venas in omnes corporis partes est dispersus, iis signis dignoscitur. Totum corpus est gracile, hirsutum & squalidum, cum notabili nigredine, & si vena iis incidatur, sanguis niger & crassus instar picis liquidę conspicitur.

Signa melancholię cerebri primarię.

Melancholia universalis indicia.

Melancholia uterina faciliorem à reliquis discernitur.

Curatio.

Curatur Melancholia sive insanía melancholica tribus potissimum præsidii, victus ratione, venę sectione, & remediorum adhibitione. Victus ratio talis esse debet, quę moderatę calida est & humida. Versetur itaque æger in aëre moderatę calido & humido. Velcatur autem cibus boni succi & facilis concoctionis, quales sunt caro gallinarum, ovium, jusscula carnis bovillę, ova forbilia, pisces laxatiles &c. Potus ejus sit vinum tenue & album, & cerevisia benę cocta & clara. Vitet è contra omnia quę melancholicum succum generant flatulque excitant, quales sunt omnes carnes & pisces sale conditi fumoque durati, & omnia ferè leguminum genera. Vitet & carnes, asnerinam, leporinam & cervinam; somnus & exercitium sint moderata, utatur autem balneo aquę dulcis seu lavacro frequentissimę, cujus beneficio solo sæpe totalis melancholia sanitati restituta visa est; commodę autem in aqua balnei concoqui possunt sequentes herbę, Malva cum radicibus, Althea cum radicibus, Betonica & chamæmeli flores.

Cibi melancholicum generantes suscipiunt.

Balneum aquę dulcis valdè prodest melancholicis.

His rectę institutis accedatur ad venę sectionem, & si melancholia est universalis, secetur vena Mediana dicta sinistri brachii, vel si lien solum est oppletus & obstructus melancholico humore, primum secetur vena inferior cubiti sinistri quam Lienariam vocant, deinde aperiantur & venę hæmorrhoides circa anum, præsertim ubi

Venę sectio.

ubi æger antea affluet fuit evacuationi hæ-
morrhoidum : aut incidatur interna vena
sub malleolis sinistri pedis. Cerebro vero
solo vitioso melancholico imbuto maximè
ubi corpus sit plethoricon, incidatur pri-
mum jecoraria dextri cubiti, tandem & Ce-
phalica sinistri cubiti. Ubi vero ex mensium
retentione mulierculæ melancholia labo-
rant, statim menses & per venæ sectionem &
per medicamenta provocandæ sunt, de qua
affectione intra tractabitur.

Clyster.

Interpositis tribus diebus à venæ sectione
medicatio hujusmodi est instituenda, &
primum quidem applicetur sequens E-
nema.

R. Maluæ,

Violaru,

Betæ an. M. i.

Chamæmeli,

Melitori an. M. s.

Betonice,

Serpilli,

Majoranæ an. P. i. Concidantur &
coquantur in q. s. aq. ad medias, colen-
tur, colati juris accipe ꝑ xv. quibus ad-
misce,

Pulpæ Cassiæ ꝑ ii.

Ol. Chamæmelini ꝑ iii.

Salis communis ꝑ i. Misceantur,
fiat Enema, & infundatur jejuno 2. horis an-
te prandium.

Post Clysterem adhibitum extenuetur &
concoquatur humor melancholicus sequen-
ti apozemate.

R. Hyslopi,

Sampfuchi,

Serpilli,

Melissæ,

Betonice an M. s.

Boraginis,

Lupulorum,

Ceterach,

Fumarie,

Capillorum veneris an. P. i.

Rad. Cichorii,

Boraginis,

Feniculi,

Corticum capparorum an. ꝑ iii.

Corticum Citrii ꝑ s.

Flo. Absinthii,

Centaurii minoris,

Chamædrios,

Chamæpiteos an. ꝑ ii.

Pulegi ꝑ i.

Fol. Senæ,

Epithymian. ꝑ iii.

Schænantii,

Spicæ Indicæ an. ꝑ s.

Sem. Anisi,

Dauci,

Feniculi an. ꝑ i.

Asari ꝑ i. s.

Passularum ꝑ i. Contusa & concisa

coquantur cum lib. iii. aquæ in cantharo
cujus junctura massa farinacea est oblitera
per duas horas, & ubi refrigit, exprimantur
ac colentur, cui liquori admisceantur,

Succi Pomorum acidorum,

Pomorum dulcium,

Malorum puniceor. an. lib. s.

Succi Fumarie,

Boraginis,

Rosarum an. ꝑ vi.

Saccari albi lib. i. s. Coquantur & clarifi-
centur cum ovorum albuminibus, fiat sy-
rupus, cujus mane ac vesperi exhibeantur æ-
gro singulis vicibus ꝑ iii. Absumpta præ-
scripta portione evacuetur melancholicus hu-
mor sequenti decocto.

R. Conservæ rosarum,

Violarum,

Boraginis,

Fumarie an. ꝑ s.

Herbar. Fumarie,

Ceterach. an. M. s.

Hordei decorticati,

Fol. Senæ Alexandrinæ,

Epithymi an. ꝑ ii.

Cort. Myrabulanorum Indorum ꝑ i. s.

Prunorum Ungaricorum n. v. Infun-
dantur simul per noctem in aquæ lib. ii.
altero die decoquantur ad medias, expri-
mantur ac colentur, colati juris accipe
ꝑ iii. quibus admisce Diasenæ ꝑ ii. fiat
haustus exhibeaturque tepidus mane sex ho-
ris ante prandium. Interpositis sex septem-

Chymici
ad præpa-
randum

humorem
melanchol-
icum u-

tuntur tar-
taro vi-

triatolo per
aliquot
dies exhi-

bendo
drach. s.

vel seru-
pul. i. cum
vino vel a-

lio liquore
convenien-
te.

Potio me-
lanagoga.

Nonnulli
humorem
melanch.

evacuunt
Electuario
vel Extr.

belleb. ni-
gri, quod
tamen ma-

gnacum
cautione
fieri debet.

ve diebus denuo vitiosus & contumax melancholicus humor extenuetur, & rursus evacuetur, aut præscripta parte decocti aut sequentibus pillulis.

*Pillula
melanago-
ga.*

℞. Mass. pill. Indarum,
De lapide lasuli an. ʒ s.

Pulveris veratri nigri præparati ʒ s.
ex quibus cum melle rosarum contusis formentur pillulæ n. 27. quæ exhibeantur in aurora sex horis ante prandium: aut commodius etiam melancholia vitiosa ex cerebro eliciatur sequenti diluto.

*Infusum
ad hum.
melanch.
elicien-
dum.*

℞. Veratri nigri præparati ʒ IIII.

Fol. senæ ʒ i.

Anisi ʒ i.

Cinamomi ʒ s. Macerentur simul inferi caprini ʒ vi. Et post 24. horas ebulliant leniter ac fortiter exprimantur & colentur,colato juseulo admisceantur Elect. Diasenæ ʒ. fiat haustus & exhibeatur tepidus diluculo.

*Humor
melan-
cholicus
difficile
eradicatur.*

Porro præscripta remedia cum extenuantia tum evacuantia in melancholica amentia, præsertim ubi humor vitiosus per totum corpus est diffusus, ter quaterve reiteranda erunt. Est enim humor melancholicus contumax, & instar picis liquidæ tenax, nec facile aut una vice medicamentis ablui potest: subinde itaque repeti debent, interjectis tamen aliquot diebus inter purgationes in quibus cerebrum & spiritus animales sequenti Electuario corroborari debent.

*Electua-
rium cor-
roborans.*

℞. Conservæ Boraginis,

Buglossæ,

Fumariz,

Melissæ an. ʒ s.

Specierum Diamoschi dulcis,

Elect. de gemmis,

Diambraz an. ʒ i.

Diamargariti frigidi ʒ s.

Corallii rubei præparati ʒ IIII.

Syrup. è pomis q. s. fiat Elect. molle, de quo 2. horis ante prandium offeratur ægro quantitas semijuglandis, & paulo post gustet æger haustulum vini cretici aut alterius generosi.

*Melancho-
lia hypo-*

Porro melancholia hypochondriaca paulo diversam curandi rationem efflagitat.

Primo subducatur alvus sequenti Enema-
mate.

℞. Flo. Chamæmeli,

Fol. Betonicæ,

Betæ,

Brassicæ,

Parietariz an. M. i.

Rad. Polypodii,

Sem. Anisi an. ʒ s.

Cassuræ,

Epithymi an. P. i. Decoquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati juris accipe ʒ xv. Cui admisce pulpæ cassiæ ʒ i. Hieræ simp. ʒ s. Olei chamæmelini, liliorum alborum an. ʒ i. s. Salis ʒ i. fiat Clyster, infundatur tepidum duab. aut trib. ante prandium horis. Altero deinceps die incidatur vena primum quidem sinistri cubiti inferior, quæ Lienaria nominatur, deinde & vena sub malleolo sinistri pedis, postea præparetur melancholicus humor in Liene collectus ad evacuationem, sequenti Potione.

℞. Rad. Cichorii,

Boraginis,

Feniculi,

Capparum an. ʒ II.

Asari ʒ i.

Fol. Hyssopi,

Sampsiuchi,

Serpilli,

Melissæ,

Boraginis,

Betonice,

Scolopendr.

Fumariz,

Capill. Veneris,

Chamædrios,

Chamæpit.

Pulegii an. m. s.

Centauri min.

Abinthii,

Spicæ,

Junci odorati an. p. i.

Passular. corinth. ʒ i.

Sem. anisi,

Dauci Fœnic.

Rad. Asari,

Enema.

*Digesti-
um Me-
lancholia.*

Cort.

Cort. citri an. ʒ i.

Fol. senæ alex.

Epythimi an. ʒ iiii.

Hæc omnia crassiusculè contusa in cantharum stanneum imponantur, eisque adfundantur aquæ fluvialis lib. iiii. & orificio canthari probè paita farinacea illito, ne vapor exhalare queat, in lebeæ aqua ferventi plena collocetur & ad duas horas simul coquantur, ac tandem ubi per se refrixit, coletur, colatoque juri admisceantur succi pomorum dulcium acidorum, & malorum punicorum, item succi Boraginis, Rosarum Fumatæ an. ʒ vi. Saccari albi lib. x. s. fiat potio secundum artem, de quo summat æger ʒ iiii. tepidas diliculo & vesperi: hac potione ubi per octiduum est usus, evacuetur melancholicus humor sequenti haustu cathartico.

*Hausus
melanago-
gus.*

℞. Elect. lenitivi,

Diacatholici an. ʒ s.

Spéciærum Hieræ simpl. ʒ ii. Dissolvantur in q. s. aquæ fumaris, fiat haustus, qui tepidus offeratur ægro mane sex horis ante prandium. Hæc autem præscripta remedia, si ita necessitas exigat, propter humoris vitiosi contumaciam, reiterari possunt. Præterea frequentissimè utatur æger rotulis duabus aut tribus Diamoschi dulcis aut diambæ ad corroborationem cerebri. Quin & topica remedia hypochondriis ad discutiendos status sunt adhibenda, veluti est sequens sacculus.

Topica.

*Sacculus
hypochon-
drii fini-
stro appli-
candus.*

℞. Rutæ,

Absinthii,

Pulegii,

Anethi,

Chamæmeli an M. r.

Baccarum lauri,

Sem. Fænu Græci,

Cumini an. ʒ s.

Contusa & concisa misceantur, & in sacculum convenientem insuantur, & in aceti & aq. portione æq. decoquantur, & expressus à liquore sacculus calidus hypochondrio sinistro subinde applicetur. Ubi autem status vehementius extendunt hypochondria, cucurbitulas eis applicato sine tamen scari-

ficatione, quæ, Galeno teste, instar incantamenti statim omnem dolorem à flatuosis spiritibus ortum sedant & auferunt.

Prodest quoque per intervalla, si absit æstus, uti ʒ i. Theriacæ Andromachi soluti cum aqua ex baccis Juniperi destillata.

4. *Mania quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Mania, Latinis Furor est calida affectio in substantia cerebri oborta, sine febris, quæ quid. læditur imaginatio & ratiocinatio sæpe illæsa manente memoria. Cognati morbi sunt phrenitis, melancholia & mania. In his enim omnibus afficitur cerebrum, & turbatur ratiocinatio: differunt tamen quod phrenitis semper adjunctam habet ardentem febrem, at melancholia à mania sola intentione differt. Et si enim in utraque affectione turbetur ratiocinatio, & æger absurda imaginetur, loquatur & operetur: tamen qui mania laborant, iracundia, ferocitate, jurgiis, clamoribus & horrendo aspectu longe sunt turbulentiores quam melancholici. Hinc Trallianus lib. 3. cap. 7. maniam intensam esse melancholiam desinit.

CAUSÆ manis sunt vitiosi humores, *Causæ.* adulta videlicet melancholia, bilis flava retorrida & sanguis assatus inque naturam melancholiæ transversus, qui vitiosi humores vel per totum corpus sunt diffusi, vel per venulas intra substantiam cerebri congesti.

SIGNA *Manias* sive furoris, si sit ortus *Signa.* ex melancholico humore adusto & in cinerem converso, æger delirat ac ferocit cum timore & mœstitia & solitaria amat loca. Qui vero ex flava bile adusta delirat, ferox est & effrænis, qui nisi vinculis cohibeatur, vestimenta propria delacerat & in obvios instat immanis beluæ dentibus, unguibus & pugnis impetum facit. Qui autem ex retorrido sanguine maniacus est, mitior esse in specie videtur, & tamen lædere cupit homines, & subinde in cachinnos insolitos solvitur. Commune autem *Prognosti-
ca.* symptoma perpetuo omnes Maniacos subsequitur, videlicet perpetuæ vigiliæ

*Cucurbitu-
la.*

& omnibus adest stupendum corporis robur. Porro nisi in principio succurratur maniacis antequam confirmetur furor, sero medicina paratur. Nec enim pharmaca admittunt, nec exhibita multum profunt. Apparentibus itaque antecedentibus signis & futuram maniam indicantibus, veluti sunt debilitas & dolor capitis, risus insolitus sine causa, ira ex levi & nullius momenti occasione, vigilæ insolitæ, & cura rerum peregrinarum nihilque ad se pertinentium &c. statim inchoanda est manias curatio.

Curatio.

Curatur mania victus ratione, venæ sectione, & remediorum tam externorum tum internorum adhibitione, quæ omnia variari debent pro causarum diversitate. In universum autem in victus ratione, æt in quo æger detineri debet, temperatus sit.

Victus ratio.

Victu vero utatur tenui, paucis, concoctis facili, & boni succi, qualem paulo ante in phrenitidis curatione commemoravimus, veluti sunt cremor prisanæ, juscula forbilia, caponum, ova forbilia, pruna Ungarica, caro pullorum & avicularum, lac ex amygdalis & semine papaveris albi confectum &c.

In potu caveatur vinum & plena cerevisia, quorum loco bibendum offeratur hordei aqua in qua Cinamomum & semen coriandri est incoctum. His ritè ordinatis, statim ubi ferocire inceperit æger, ne vel sibi ipsi vel aliis nocere queat, fasciis in lecto vinciendus est, ibidemque blandissimis amicorum orationibus cicurandus, eique statim crines capitis auferendi sunt, ac si ulla ratione fieri potest, alvus sequenti Clystere subducenda est.

Enema.

℞. Maluæ,
Althææ,
Mercurialis,
Violaris,
Betonice an. M. i.

Rad. Althææ ʒ s.

Sem. Fenu Græci ʒ ii. Concisa & contusa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, juris colati accipe lib. i. s.

Olei violarum ʒ iii.

Hieræ simp. ʒ i. s.

Salis communis ʒ i. Fiat Enema, & applicetur, ubi paululū furor fuerit sedatus.

Reliqua curandi ratio pro causarum diversitate, ut diximus, varianda est. Si itaque causa furoris sanguis adustus, aut etiam bilis exarsata extiterit, mox pacato ægro vena est incidenda, eaque primum cephalica, deinde & frontis, idque ubi ætas & vires ferunt, sæpiusculè est tentandum. Post venæ sectionem omnis cura ac diligentia Medici in conciliando somno occupata esse debet. Quibus autem id remediis perfici queat, eorum formulas in curatione phrenitidis descriptas petere licebit, hoc loco uno remedio contenti, veluti est sequens.

Remedia in sanguinea mania. Vena sectione.

Linimentum.

℞. Opii Thebaici ʒ s. resolvatur lento igne cum pauxillo aceti rosacei instar Linimenti, cui admisce unguenti populini ʒ i. croci gr. ii. fiat linimentum, quo narium foramina & tempora inungantur. Prodest tandem & caput frequenter fovere ac rigare sequentibus topicis remediis.

Laudanum opiarum hic quoque ad gr. iiii. exhiberi posses. Linimentum soporiferum.

℞. Aceti rosacei ʒ ii.

Aq. papaveris lib. s.

Ol. rosarum ʒ ii.

Ol. Anethini ʒ i. Misceantur, quæ tepida duplicatis linteolis excepta syncipiti ac temporibus circumponantur; Aut sequens sacculus capitalis commodè capiti applicari potest.

Sacculus.

℞. Flo. Rosarum rubearum,

Violarum purpurearum,
Nymphaeæ,

Folio. Solatri,

Lactucae an. M. i.

Capitum papaveris cum semibus crassiusculè contusorum
n. vi.

Florum Chamæmeli,

Anethi an. M. s.

Betonice,

Majoranæ an. P. i. Concisa mi-

sceantur ac consuantur in sacculum oblongum, qui in olla ebulliat cum pari mensura aceti & aquæ q. s. & à liquore expressus tepens

repens adhuc capiti circumligetur. Utilissimum quoque est potionis loco ægrotò afferre syrupum de papavere aut violarum cum haustu cremoris ptisanæ.

In mania ex bile qua conveniant. Porro si furor ex bile præstata, quæ omnium ferocissimam reddit maniam, sit ortus, primum bilis vitiosa ad evacuationem sequenti potione est præparanda, ejusque acrimonia mitiganda.

Tulapium alterans. R. Syrup. Rosarum, violarum, è fumarum an. ʒ i. s. è boragine, de cicorea, & de endivia an. ʒ s.

Aq. stillat. boraginis, cicoræ, endiviæ an. ʒ iiii. Misceantur, fiat potio, de qua diluculo & duabus ante cœnam horis offerantur bibenda ægrotò ʒ iiii. modicè calefactæ. Tandem una die inter hanc potionem absumptam interposita evacuetur bilis adusta sequenti haustu.

Haustus cholagogus. R. Rhobarbari electi ʒ i. s. Fol. senæ Alexandrinæ ʒ i. Cinamomi & spicæ Indicæ an. ʒ s.

Contusa macerentur per spacium 24. horarum in aq. Cicoræ ʒ vi. Deinde leniter ferveant ac tandem exprimantur atque colentur, colato jusculo admisceantur Diacatholici, Diasenæ an. ʒ ii. fiat haustus, & bibendus offeratur diluculo tepidus. Præscripta potio bilem præparans & haustus evacuans, singulis mensibus circa solis ac lunæ oppositionem reiterandus erit, donec furor remitti incipiat: ac tandem utilissimum erit ægrum sæpiusculè in lavacrum aquæ dulcis calidæ deducere & abluere. At vero si mania ex occasione melancholiæ adusta sit generata, tum illis remediis omnibus commodissimè medentur quæ in præcedente tractatione de curatione melancholicæ insanis enumeratæ sunt. Omnium autem efficacissimum ad adustæ melancholiæ evacuationem remedium est, Extractum helilebori nigri, quod chymica arte parari solet, cujus consuecendi rationem Guinterus Andernacus in commentario secundo de veteri & nova medicina faciendâ describit, cujus ʒ i. in forma pillulari cum conserva boraginis exhibitus valentissime purgat.

Quoties remedia reiteranda.

Balneum aquæ dulcis.

Extract. helilebori nigri.

5. *Memoria quid, memoria abolitio & diminutio quibus ex causis oboritur, per qua signa causa oblivionis dignoscuntur, & quibus remediis abolita Memoria restituitur & corroboranda est?*

Memoria quid. *Memoria* *quid.* *Memoria* est intellectivæ animæ interior sensus, in posteriori ventriculo cerebelli sedem habens, quo rerum & actionum præteritarum imagines ac simulachra nobis à sensibus exterioribus oblata tanquam fidelissimo custode retinemus, conservamus, & rursus per ejusdem sensus extensionem quasi præsentia reminiscimur.

Versatur autem & semper adjuncta est memoria temporis præterito, & ideo teste Aristotele de reminiscencia, solis hominibus inest memoria: quia soli homines habent rationem temporis præsentis ac præteriti. Bona autem & mala memoria ex temperie cerebelli pendet. Est itaque memoriæ diminutio sive abolitio cum quispiam eorum quæ prius noverat oblitus fuerit, & audita, visa, gustata, lecta &c. nec retinere nec reminisci potest aut ægrè comminisci.

Causæ debilitatæ & abolitæ memoriæ *Quibus de causis laedatur memoria.* *αδυναμία* quidem sunt, cerebelli aut venenosis vaporibus oppletio, veluti contingit in quibusdam pestiferis morbis, qualem Thucydides describit in Peloponesiaco bello grassatum fuisse, quo qui afficiebantur, omnem memoriam amittebant, adeo ut ne nomina quidem propria meminisse possent: aut est sicca & frigida intemperies: aut humor cerebellum occupans: aut frigida & humida intemperies: aut humor cerebellum gravans, veluti accidit in Lethargo & *νάρκη* morbis, de quibus paulo post dicemus.

Προσθετική vero debilitatæ memoriæ causæ sunt vehemens aëris ambientis aut aquæ capiti admotæ frigiditas cerebellum ac medullam spinæ refrigerans: medicamenta stupefacientia cervici applicata: plagæ cervici incussæ: continua ebrietas: immoderatæ vigiliæ & intempestiva studia.

SIGNA causarum interiorum sunt, si *Signa* cerebelli.

cerebellum intemperie frigida & sicca est infectum, æger perpetuis vigiliis infestatur & constitutionem corporis habet melancholicam: si vero frigida & humida qualitate imbutum est cerebellum, perpetuo somno detinetur, & pituitoso corporis habitu præditus est. Signa vero externarum causarum manifesta sunt, & ex ante acta vitæ ratione deprehendi possunt.

Prognostica.

Ex abolita memoria hæc certissima mala futura nobis prælagire licebit: Si cui memoria repente aboleatur toto corpore incolumi manente, hic aut Epilepsia, aut Apoplexia, aut Paralyfi brevi corripitur, nisi statim in initio hæc gravissima mala convenientibus remediis avertantur: si ægroto vitibus jam destituto memoria deficiat, id certissimum est propinquæ mortis indicium.

Abolita & diminuta memoria remedia.

CURATIO abolitæ aut diminutæ memoriæ per convenientem victus rationem & medicamentorum adhibitionem instituenda est, quæ tamen pro causarum diversitate varianda erunt. Victus ratio (nisi memoria sit ex pestilenti contagione abolita) debet esse moderatè calida, eligendus est itaque aer moderatè calidus: similiter & alimenta calefacientia conveniunt, qualia sunt carnes gallinarum, caponum, hædorum & similium aromatis conditæ: In potu vero vinum tenue & cerevisia clara, nec usque adeo plena convenit & hydromeli: è contra vero studiosè vitanda sunt omnia quæ refrigerant & vehementius humectant, qualia sunt olera, fructus arborum, pisces omnis generis, & legumina, lac, caseus & cæpæ: Potissimum autem, ut pestem præsentissimam, vitare debet ebrietatem, Venèrem & somnum meridianum, quisquis tenacem memoriam habere desiderat, & occipit à frigidiore aëre perpetuo munitum habere debet. Utatur præterea indies moderato exercitio; ignavia enim & ocio, & intellectus & memoria vehementer labefactatur.

Memoriam labentia.

Medicamenta quibus cum ad removendas causas debilitatæ memoriæ, tum eorum quibus ad corroborandam memoriam uti-

mur & ipsa moderatè calida esse debent, & pro causarum diversitate varianda. Ubi itaque memoria diminuta est ex nuda intemperie frigida cerebelli, & siccitas ei est adjuncta, veluti fieri consuevit in melancholicis naturis, tum iis remedium generibus, quæ in ea specie *νεφθαλμίας* quæ ex iisdem causis oboritur & in dolore capitis ex melancholico humore orti, paulo ante commemorata sunt, commodissimè uti licebit. Simili ratione si memoriæ debilitas originem trahat à frigida & humida intemperie, quemadmodum fit in pituitosis naturis, iis conducunt ea pharmaca, quæ in curatione doloris capitis ex redundantia pituitæ in cerebro orti, descripta sunt. Si autem abolitio memoriæ symptoma sit alicujus morbi, ut febris pestilentialis vel lethargi vel cari, ejus curandi rationem & medica præsidia paulo post proponemus. Sublato enim morbo tolluntur & symptomata.

In debilitate memoriæ, exceptis senibus, *Senum quibus proprium est labili esse memoria, memoria debilis.* quæ contingit ex frigidityte & humiditate cerebelli, vel ex perfusione ejusdem ab excrementitia pituita, id quod ex alba ac molli constitutione corporis dignoscitur, tum causa debilitatis memoriæ subsequenti- bus remediis præcidi ac curari potest. Primum pituitosa excrementa ex cerebello & toto cerebro sequenti potione concoquuntur, extenuantur & ad expurgationem præparantur.

R. Bethonica, Majoranæ, Serpilli, Hyssopi, Salviæ, Stachados Arabicæ, Rorismartini an. M. S.

Sem. Carui, Feniculi, Sileris infantani an. ʒ III.

Rad. Pæoniæ, Glycirrhizæ, Dauci cretici an. ʒ II.

Cinamomi, Macis an. ʒ I. Concisus conciden-

Decoctum præparans pituitam.

dis & contusis contundendis imponantur simul in cantharum stanneum, quibus adfundantur lib. iiii. hydromellis, & oblinita junctura canthari in leberem collocentur ac simul per duas horas coquantur, ac postea eximantur ac colentur, colato juri admisceantur syrupi è stachade, oxymellis scillitici an. ʒ iiii. fiat potio, qua utatur patiens, & singulis diebus mane exhauriat ʒ iiii. similiter & vesperi duabus horis ante cœnam. Exhausta portione, uno die interposito, sequenti Clystere pituitosa excrementa subducenda erunt.

Enema evacuans.

℞. Maluæ,
Betonicæ,
Serpilli,
Majoranæ,
Mercurialis,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Flo. Chamæmeli,
Anethi an. M. s.

Sem. Carvi ʒ s. Concisa & contusa decoquantur in q. s. aquæ ad medias, quibus in fine ebullitionis adjiciatur ʒ i. Pulpæ colocynthidos in linteolo ligatæ, ac ubi decoctum ab igne remouetur, statim ipsa colocynthis eximatur, ac liquor ab herbis percoletur, colati hujus juris accipe ʒ xv. quibus admisceantur Hieræ pictæ simp. ʒ i. s. Diaphaniconis ʒ vi. Olei chamæmelini, Anethiani. ʒ i. s. Salis ʒ i. Misceantur, fiat Enema, quod recto intestino infundatur duabus horis ante prandium. Rursum à Clystere duobus interpositis diebus purgetur cerebellum sequenti haustu.

Haustrus Phlegma-
gogus.

℞. Agarici Trochiscati ʒ iiii.
Fol. Senæ Alexandrinæ ʒ i. s.
Zinziberis albi,

Sem. Carvi an. ʒ s. contusa macerentur per 24. horas in aq. betonicæ ʒ vi. tandem ebulliant leniter & colentur, colato jusculo admisceantur Diaphaniconis ʒ iiii. fiat haustus, qui tepidus exhibeatur diluculo 6. ante prandium horis: aut deglutiat æger sequentes pillulas, quæ pituitosos humores ex cerebello egregiè evacuant.

Pillula.

℞. Mas. Aurearum,

Arabicarum,

Aggregatarum an. ʒ i. ex quibus commixtis cum q. s. mellis rosacei formentur pillulæ n. 27.

Commodissimè uti quoque possumus ad detrahendos ex cerebro pituitosos humores gargarismate ex radicibus pyrethri & seminibus erucae confecto, atque errhinis ex succo betæ, quorum medicamentorum paradigmata, & simul aliorum quæ huc referri possunt, ex curatione doloris capitis à pituita orti, petenda erunt.

Ubi vero ex melancholici humoris copia cerebellum refrigerantis & memoriam debilitantis oritur obliuio, tum humor melancholicus sequenti primum portione concoqui & extenuari debet.

℞. Rad. Polypodii ʒ i. Fæniculi, Petroselinii, Glycyrrhizæ an. ʒ iiii. capparum, Helbori nigri præparati an. ʒ ii.

Herb. Fumariæ, Capillorum Veneris, Betonicæ, Asplenii an. M. s. Melissæ, Rorisinari an. P. i. Thimi, Epithymi an. ʒ ii.

Sem. Anisi, Fæniculi, carvi an. ʒ i. Cynamomi, cubebarum an. ʒ i. s. Concisis & contusis cum aq. lib. iiii. decoquantur in duplici vase sive cantharo in leberem collocato per spacium duarum horarum, deinde colentur & colato juri admisceantur Syr. è betonica, è fumaria, de epithymo an. ʒ iiii. fiat potio, de qua exhauriat æger ʒ iiii. diluculo & duab. horis ante cœnam semper prius calefactas. Portione exhausta purgetur humor melancholicus sequenti haustu.

℞. Elect. Diasenæ,

Confectionis Hamech. an. ʒ iiii.

Aq. Fumariæ ʒ v. Misceantur, fiat haustus qui tepidus ebibatur 6. horis ante prandium: Aut

℞. Mass. pil. è fumaria, cochiarum an. ʒ s. formentur pillulæ n. 27. cum aqua Majoranæ, & deglutiantur mane sex horis ante pastum. Quia vero lentus & crassus est humor melancholicus, præscripta medicamenta singulis trimestribus reiteranda erunt.

Porro subsequenteria remedium genera
Y cum

Memoria
lesio ex
melancholia.

Potio
melancholicam
digerens.

Haustrus
melan-
gogus.

Pillula.

cum ratione sui temperamenti, tum specifica virtute memoriam quacunque ex causa debilitatam restituunt, corroborant, firmam ac tenacem mirifice reddunt, id quod frequenti experientia comprobatum est.

Memoriam confortantia experientia.

Post convenientem cerebelli expurgationem memoriam vehementer corroborare & amissam restaurare Chymicæ artifices non sine rationibus asserunt, si quis singulis septimanis bis aut ter semiscrepuli mensuram olei vitrioli rectificati cum haustu vini generosi jejuno ventriculo ebibat. Crassos enim spiritus discutit & clarificat, & lentos humores in cerebello extenuat, ipsumque cerebellum ad convenientem temperiem reducit.

Idem præstant, si quis singulis septimanis semel jejunos cum generoso vino assummat 3 i. confectionis Anacardinae aut Theriacæ Andromachi, aut singulis diebus jejunos devoret rotulas 11. Diamoschi aut Diambrae.

Restituit quoque amissam memoriam & corroborat 3 i. sequentis pulvisculi cum optimo vino exhausta.

Pulvis pro memoriâ.

℞. Ramentorum eboris veri,
Cornu cervini,
Castorei an. 3 i.
Monocerotis cornu 3 i.
Moschi gr. 111. Redigantur in subtilissimum pulvisculum.

Corroborat & tenacissimam efficit memoriam medix juglandis instar quotidie devoratum sequens electuarium.

Electuarium.

℞. Conservæ florum Betonicae,
Salviae,
Rorismarini,
Melissæ an. 3 i.
Specierum Diamoschi dulcis,
Diambrae an. 3 i.
Pulveris Zedoariae,
Caryophyllorum,
Cubearum,
Carvi an. 3 s. Commisceantur, commixtisque addantur olei Cinamomi gr.

Aqua vitæ authoris pro memoria.

111. His autem omnibus præstantior est Aqua vitæ nostra, quæ hac ratione conficitur.

℞. Aq. stillaticia juniperi lib. 1111.

Flo. lilii convallii ex stipitibus decerptorum M. 11.

Flo. Salviae M. 1. Macerentur in sole diebus x111. deinde exprimantur ac colentur, colato liquori rursus indantur conservæ Rorismarini, Lavendulae an. 3 i. specierum Diamoschi dulcis, Diambrae an. 3 i. saccati cand. in aqua Lavendulae soluti lib. 1. Quibus simul mixtis macerentur per mensem, ac tandem destillentur chymico artificio vitro in arenam calidam posito. Hujus aquæ 1. cochlear ter per hebdomadam sumptum illustrat spiritus animales & mirifice corroborat memoriam, præservat ab apoplexia, & epilepsia, & hisce malis correptos brevi sanitati restituit, si eam vel intra corpus sumant vel ea foris affectæ partes inungantur. Memoriam autem restituit atque corroborat, si ea sæpius occipit inungatur. Egregie quoque memorix debilitati opitulatur sequens Linimentum occipitio per aliquot dies inunctum.

Linimentum ad memoriam confortandam.

℞. Olei de lateribus,
de Castoreo an. 3 s.
Olei nucis Muscatae,
Olei caryophyllorum an. 3 s.
Cerae quantum sufficit. Fiat linimentum, cui admiscantur pulverum Cubearum, Caryophyllorum, Benzoi an. 3 i. Rad. pyrethri 3 i. Misce.

Non minoris quoque efficacix est sequens sacculus inter calidos lateres, aut vino generoso aut aqua Lavendulae conspersos calefactus & occipitio alligatus.

℞. Florum Rorismarini,
Lavendulae,
Foliorum Majoranae,
Melissæ an. M. 1.
Strachados Arabicae,
Serpilli,
Betonicae an. M. s.
Nucis moscatae,
Macis,
Cubearum an. 3 i.
Caryophyllorum,
Syracis calamitæ,
Benzoi an. 3 s.

Sacculus.

Sema.

Sem. Carvi 311. Concisis concidendis & contundendis contusis, mixta insuantur sacculo lineo oblongiusculo, & cervici adaptato, & ne herbæ convolvantur, intersuatur sacculus.

Non incommode ad diminutionem causarum oblivionis & restitutionem memoriæ uti possumus & gargarismatis, apophlegmatismis sive pulveribus masticatoriis, er-rhinis ac sternutatoriis remediis, quæ supra in curatione cephalalgias ex pituita ortæ, præscripta sunt.

6. *Lethargus, carus & catalepsis quales sunt cerebri affectiones, ex quibus causis oboriuntur, per quæ signa dignoscuntur, & quibus remediis curanda?*

Soporosa affectiones. Tres hæ cerebri affectiones lethargus, carus & catalepsis, cognatæ sunt inter se, & ex iisdem causis eveniunt, iisdemque remediis profigantur, ac non nisi magnitudine & causæ extensione differunt. Sub una itaque eademque tractatione earum curationem proponere visum est. Positis itaque prius singularum descriptionibus, causis & signis, generalem omnium subjungemus curandi rationem.

Lethargus quid. *Ληθργία*, Latinis veterus seu iners somnolentaque oblivio, est inevitabilis dormiendi necessitas in febribus lentis oborta, cum oblivione repentina omnium quæ dicuntur aut acclamantur.

Causa. Causa huius mali est excrementum pituitosum & impensè frigidum cerebri substantiam occupans, gravans, ibidemque putrescens, & simul ratiocinationem memoriamque turbans & inexpugnabilem somnolentiam inducens.

Signa. Signa veterni sunt: lenta febris torquetur æger, ignavus est & somnolentus, adeo ut vix vehementer impulsus ad interrogata tumultuariè respondeat: ad vehementem autem acclamationem oculos quidem aperit, sed statim iterum claudit, oscitat creberrimè & ore inusitatè hiat, ipsumque claudere obliviscitur: quin ubi ad mejen-

dum è natura stimulatur, matulam expectit, sed manu tenens, mejere obliviscitur. Lethalis est morbus lethargus, nisi maturè ei succurratur.

Κάρος, Arabibus subeth, Latinis mortis *Carus* imago, vel somnus morti similis dici potest. In Caro enim, teste Galeno 2. de Articulis, omnes operationes animæ læduntur, ita ut neque sentiat, neque moveatur, neque intelligat, nec comminiscatur, nec appetat æger; sola respiratione, quæ illæsa manet, differt à mortuo.

Differt Caros à Lethargo. Lethargus enim adjunctam sibi habet febrim, & ad vociferationem oculos aperit, ad interrogata respondet incondita: Caro vero correpti febre carent, oculos nunquam aperiunt, nec loquuntur, nec corporis partes commovent, sed mortuo similes jacent, respirant tamen. Non dissimilis est morbus Carus Apoplexiæ, differt tamen ab ea, respiratione. In Caro enim libera est respiratio, in Apoplexia vero vehementer impeditur.

Causa Cari est pituita crassa, ac lenta, cerebri substantiam comprimens ac constrin-

gens. Signa ejus sunt, gravis somnus ac præternaturalis, & oculorum perpetua occlusio.

Κατοχή sive *καταλήψις*, deprehensio seu stupor, & recentioribus congelatio dicitur. Est autem subita quædam omnium actionum animalium ablatio. Congelatione enim correpti, statim totius corporis sensum & motum amittunt, & eam corporis figuram, in qua deprehensi sunt, sive stantes sive sedentes sive decubentes, sive clausis sive apertis oculis tum extiterint, retinent, sola respiratione manente.

Rarissima est affectio, cujus admiratione nemo spectatorum est, qui non obstupescat.

Fernelius lib. 5. suæ *παθολογίας* duo huius mali horrenda exempla recitat, unius qui literis & chartis sedens invigilabat, qui subita congelatione correptus ita obrigit, ut calamum digito premens, oculisque in libros defixis putaretur in eorum studia, incumbere, donec vocatus & impulsus agnosceretur ipso sensu ac motu

privatus esse. Alterius, qui cubans in somno ^{nocturno} deprehensus mortui instar jacebat & nec videre nec audire, nec punctiones violentasque contrectationes sentire poterat, respirationem tamen inculpatam habebat, & si quid ei in os inferebatur, deglutiebat facile, è lecto sublatus solus consistebat, & impulsus incedebat, & quocunque vel manus vel pedes inflectebantur, illic fixi ac stabiles instar statuæ aut larvæ permanebant.

Causa. Causa congelationis est posterioris partis cerebri adeoque cerebelli extrema refrigeratio, vel pituitosi humoris in ea parte cerebri instar glaciei concretio.

Signa. Signa hujus mali ex descriptione & recitatis exemplis manifesta sunt. Hæc tria affectionum genera Lethargus, carus & congelatio cum inter se sint cognata & ex iisdem causis oboriantur, & tantum extensione & remissione causarum differant, una & eadem medendi ratione, iisdem medicamentis curanda erunt.

Curatio. Curantur tres hi morbi bona victus ratione & medicamentorum usurpatione.

Dieta. Victus ratio debet esse calefaciens. Detineatur itaque æger in loco aëreque calido, alimentum ei offeratur quod & ipsum calefaciat, & lentorem pituitæ extenuet. Sunt autem hujusmodi carnes pullorum & gallinaceorum, avium sylvestrium, perdicum & vitulorum. Commodè quoque offerri possunt ova & ex ovīs vinoque aut cerevisia parata juscula: item juscula carniū bovillarum, cremor prisanæ, & lac amygdalarum, condiantur fercula aromatibus, pipere, zinzibere, Maccæ, croco, gario-phyllis, radicibusque petroselinis, potus illi convenit vinum aromat. hydromeli, vinum Rhenanum & cerevisia plena ac clara.

Remedia. Remedia in his morbis sequentia adhibenda veniunt. Primum subducantur pituitosa excrementa frigideque vapores detrahantur sequenti clystere.

Enema. ℞. Salviæ, Origani, Betonicæ, Majoranæ, Rutæ, Centaurii minoris, stachados Arabicæ an. M. s.

Sem. Carvi, Sefelios, Fæniculi an. ʒiij. Concisa & contrusa coquantur in q. s. aquæ ad tertias, in coctionis fine adjiciatur ʒi. pulpæ colocynthidos in linteolo ligatæ, & iterum uno & altero fervore ebulliant, ac tandem colentur, colati juris accipe ʒ xv. Cui admisce hieræ cum colocynthide ʒ i. benedictæ laxativæ ʒ s. Olei laurini, rutacei an. ʒ i. s. salis fossilis ʒ i. Commisceantur, fiat Enema quod tepidum recto intestino infundatur.

Deinde in lethargo & caro, si ægri vires, *Vena s-* ætas & temperies ferunt, vena mediana dicta *ctio.* dextri cubiti secunda erit, postea somnum præternaturalem ac profundum, odoramen-

Suffitus. tis, suffitibus & sternutatoriis auferre studemus. Naribus itaque ægri continue admovenda sunt, aut castoreum aut sagapenum, aut asa foetida, aut pix liquida aut suffitus fumusque naribus immittendus accensi sulphuris. Irritandus est æger ad sternutationem sequenti pulvisculo naribus indito.

℞. Pul. Pyrethri, Majoranæ, Hellebori albi an. ʒ i. *Sternuta-*
torium.

Euphorbii, Nigellæ an. ʒ s. Misceantur fiat pulvisculus. Palato vero ac faucibus ægri ad proliciendam extenuandamque pituitam sequens linimentum est inungendum.

℞. Pul. pyrethri, Erucæ, sem. staphisagriæ an. ʒ s. *Apophle-*
gmatis-
mus.

Oxymellis scillitici ʒ s. Misceantur, fiat linimentum.

Tandem caput universum est radendum & mitra ex sequentibus herbis confuta capiti imponenda.

℞. Majoranæ, Rorismarini, Pulegii, Betonicæ, stachados Arab. an. M. i. sem. Carvi ʒ i. Euphorbii ʒ i. contrusa consuantur in mitra & decoquatur in aqua expressaque diligenter capiti subinde imponatur & ubi refrigerari incipit rursus calefacienda in eodem jusculo erit. *Cucupha.*

Cervix adeoque totum caput & dorsi spina sequenti oleo bis per diem inungi non incommodè potest.

℞. Ol. Philosphorum sive de lateribus ʒ s. *Linimen-*
tum pro
capite &

Ex baccis juniperi ʒ ii. *spina.*
Laurini, de castoreo an. ʒ i. Misceantur,

tur, fiat linimentum. Aut imponatur capiti sequens sinapismus.

*Sinapi-
smus.*

R. Olei Castorei ʒ i.

de Euphorbio, è costo an. ʒ s.

Sagapeni in aceto resoluti ʒ ii.

Pul. styrcis calamitæ ʒ i. s.

Euphorbii ʒ s.

Castorei ʒ i.

Sinapi ʒ s. Ceræ quantum sufficit, fiat Emplastrum. Postea efficacissima hæc remedia singulis diebus bis manè nimirum ac vesperi bibenda exhiberi debent.

Theriacæ Andromachi ʒ i. s.

Aut Elect. Anacardini ʒ i.

Aut Olei vitrioli ʒ i. cum vino aut aquæ Juniperi mixta.

Porro ubi morbus ultra septimum diem protenditur tum non levis sanitatis spes restat teste Hippocrate lib. 2. de morbis. Si itaque tum vires non prorsus sunt prostratæ, lenta ac frigida pituita sequenti potione extenuanda & ad educationem præparanda erit.

*Potio pi-
tuitam in-
cidens &
præpa-
rans.*

R. Salviæ, Hyssopi, Thymi, Pulegii, Betonicæ, Majoranæ an. M. s.

Rad. Pæoniæ, Dauci Cretici, Pyrethri, Fæniculi an. ʒ ii.

Sem. Carvi, Fæniculi, fescelios, coriandri an. ʒ iii.

Cinamomi, cubebarum, Cardamomian. ʒ i.

Concisæ & contusa coquantur in cantharo oblinito in lebereque collocato per duas horas cum adfusis trib. lib. hydromellis, postea colentur & colato juri admisceantur syrupi de stachade, de betonica an. ʒ ii. Aquæ juniperi ʒ i. Misceantur, fiat potio, è qua ægroto bibenda offerantur ʒ v. calefactæ mane ac vesperi duab. horis ante cænam. Exhausta hac potione evacuetur præparata pituita sequentibus pillulis.

*Pillu-
rum phle-
gmagoga.*

R. Mas. pillularum Hieræ simp. Cochiarum an. ʒ s.

Trochiscorum Alhandali ʒ s. Cum melle rosaceo q. s. formentur pillulæ n. 27. quæ post mediam noctem cum hydromelle deglutiat æger.

Infessus.

Tandem deducatur ægrotus in lavacrum

aquæ dulcis in qua incoctæ sunt betonica, serpillum, majorana, salvia, chamæmelum & similes herbæ, idque singulis septimanis bis est tentandum, donec convalescat æger. Reliqua remediorum genera ad horum morborum propulsationem facientia, partim ex curatione abolitæ memoriæ paulo ante tractata, partim ex curatione Apoplexiæ, quæ paulo post sequetur, petenda erunt.

SECTIO III.

DE AFFECTIBUS CAPITIS MOTUM ET SENSUM LÆDENTIBUS.

1. Qui sunt morbi Cerebri motum & sensum debilitantes aut auferentes?

Cerebrum est principium motus & sensus totius corporis. Causa efficiens sensus & motus est spiritus animalis in ventriculis cerebri contentus: Instrumenta vero sunt nervi, quorum septem paria (Neoterici octo paria observarunt addentes reliquis par odoratoriorum nervorum) ex ventriculis cerebri, & triginta paria ex spinæ medulla, quæ tanquam rivulus est cerebelli, oboriuntur. Ventriculi vero sive cavitates quatuor in cerebro conspiciuntur per canales conjunctæ, in syncipite duæ instar duarum novarum lunarum dorsis suis conjunctarum. Hæ sunt domicilia phantasie sive imaginationis sensusque communis, tertia est in medio sive centro cerebri, in qua fit specierum distinctio & ratiocinatio, quarta habetur in cerebello quæ est domicilium memoriæ. Ubi itaque in hisce ventriculis vel canales quibus conjunguntur vel principia nervorum crassis lentisque humoribus densisque vaporibus obstruuntur, aut venenosis halitibus spiritus animales inficiuntur, subsequentes morbi, motum sensumque lædentes, oboriuntur:

Vertigo,
Epilepsia,

*Generalis
causa sen-
sum &
motum
lædens.*

*Affectus ce-
rebri seu*

Y 3

Apo-

lesiones
sensus &
motus.

Apoplexia,
Paralyfis,
Convulsio sive membrorum contra-
ctio,

Tremor,
Tetanus,
Incubus,
Catarrhus.

2. *Vertigo quid, quæ ejus causâ, quæ
signa, & quibus remediis cu-
randa?*

Vertigo
quid.

Σύγχωσις, vertigo, *der Schwindel* est
exagitatio & præternaturalis commotio
spirituum animalium in ventriculis potis-
simum anterioribus cerebri. Vertigine la-
borantibus aut tenebræ aut alii colores pro
causarum varietate oculis offunduntur, o-
mniaque cum ipso circumrotari videntur,
adeo ut nisi æger propinquis nitatur admi-
niculis, corruere eum sit necesse. Causæ
vertiginis *ἑνεργίδου* internæ sunt vapores
aut flatulenti spiritus in crudis vitiosisque
humoribus ab imbecilli calore excitati, &
per venas ac arterias in ventriculo cerebri
delati, qui spiritum animale ibidem va-
riè impellentes & exagitantes sensum in-
primis visus, & motum turbant. Exci-
tantur autem hujusmodi vapores per inter-
valla & periodos: hinc est quod hoc sym-
ptoma non sit permanens, sed intervallis
certis recurat. Crudi autem & vitiosi hu-
mores, in quibus calor imbecillis agit &
tales excitat vapores, nonnunquam in i-
pso cerebro, interdum vero in subjectis
partibus veluti ventriculo & matrice conti-
nentur.

Causæ ex-
terna.

Causæ procatarticiæ sive evidentes ver-
tiginis sunt, corporis totius diuturna &
celeris gyratio atque rotatio, aspectus con-
tinuus rotarum celeriter circumagitarum,
balneorum calor vehemens, prospectus è
sublimi & altò loco, crapula ex ebrietate,
diuturna excrementorum alvi retentio, &
solis radii, lunæque lumen caput feriens.

Signa di-
versarum
causarum.

Signa internarum causarum sunt, si in
capite continetur vitiosus humor, semper
adeest dolor & gravitas capitis atque tin-
nitus aurium: Si vero in ventriculo consti-

tuta sit causa, vertiginem præcedit nausea,
oris amaror & appetitionis prostratio ad-
eoque orificii ventriculi morsus & erosio,
si ex matrice vapores eleventur, decolo-
rata est mulier & conqueritur de dolori-
bus partium circa pubem existentium, &
suppressionem mensium. Reliqua evidèntia si-
gna in descriptione vertiginis commemorata
sunt.

Prognostica signa in vertigine hæc ve- *Prognosti-*
niant notanda: Vertiginis facilis est permu- *ca.*
tatio aut in epilepsiam, aut in apoplexiam,
aut in amentiam.

Quibus in vertigine viridis aut purpureus
color observatur, magis proni sunt ad epilep-
siam: quibus ater, ad apoplexiam: quibus
autem rubeus, ad amentiam.

Curatio vertiginis victus ratione & reme- *Curatio.*
diis convenientibus venæque sectione perfici-
tur.

In vivendi ratione, eligat æger aërem *Aer.*
tranquillum, clarum & temperatum, non
impensè calidum aut frigidum, non cras-
sum, non nebulosum aut ventis agita-
tum. Ventus autem Austrinus unicè vitan-
dus est.

Cibus utatur concoctu facilibus & san- *Cibus.*
guinem purum generantibus, quales sunt
ova recentia forbilia, & ex his parata ju-
scula, carnes caponum & vitulorum, pisces
saxalites & squamati, vitet sedulo cæpas, pi-
sa & alia legumina, & quicquid vaporibus
cerebrum implere potest.

Potus ei sit vinum tenue & album: eo au- *Potus.*
tem rarius utatur, nisi sit causa morbi in ven-
triculo, hydromel & cerevisia limpida ac
non valde plena.

Externas quoque vertiginis causas veluti *Evitanda*
sunt venti australes, radii solares, splendor *vertigino-*
lunæ, loca alta & præcipitia, rotarum alia- *si.*
rumque rerum celeres circumagationes
& alvi obstructions vitabit quam studiosissi-
mè.

Remedia vertiginem depellentia duplicia
habentur, unum genus eorum est quæ pa-
roxysmo succurrunt, & agitationem spiri-
tum animalium sedant: alterum genus est,
quæ causas vertiginis auferunt.

In

Remedia
Paroxy-
smi.

In ipso paroxysmo sive exacerbatione spiritus animales corroborandi & sedandi sunt sequentibus remediis: statim itaque in vertigine foramina narium inungantur aut oleo majoranæ aut oleo ex nucibus moschatis vel destillato vel expresso; aut admoveantur naribus odores aquæ stillatiæ rosarum cum pauxillo aceto rosaceo mixtæ: quin & tempora carpique manuum fortiter confricentur cum aqua & aceto rosaceo simul mixta, cui guttula olei cinamomi aut nucum moschatarum indita est. Ori vero mastican- dum indatur aut momentum salis, aut frustulum cinamomi aut macis, aut rotula una diamoschi dulcis aut diambra.

Remedia
causarum.

Remisso paroxysmo, viribusque recuperatis, si alvus est obstructa statim glande sive suppositorio ex melle, momento salis & pulveris Trochiscorum Alhandali confecto subducenda erit, aut sequente Clystere.

Enema.

℞. Mercurialis,
Betæ,
Maluæ,
Betonicæ,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Flo. Chamæmeli,
Anethini an. M. s.

Concidantur & concoquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati juris accipe ℥ xvi. quibus admisce olei amygdalarum dulcium, anethini, an. ℥ i. s. mellis rosacei ℥ i. Hieræ simp. ℥ ii. salis ℥ i. commisceantur, fiat Enema & tepidum ovesis recto intestino infundatur.

Vena se-
ctio.

Porro vertigine laborantes qui sanguine redundant, quod ex rubedine faciei deprehendere licet & venarum amplitudine ac tumore, iis post alvi dejectionem venam cephalicam quæ suprema est in humero, incidere convenit; sanguis tamen non confertim, nec una vice sed per crebras vices, subinde vulnus digito comprimendo & aperiendo rursus, eliciendus est. Tandem causa materialis vertiginis sive contineatur in ipso cerebro, sive in subjectis partibus, sequentibus remediis extirpanda erit.

Si biliosus humor vertiginis sit causa, sequenti potione præparari ad educationem debet.

℞. Syr. de Cichorea,
ex infusione rosarum an. ℥ ii.
Aquæ stillatiæ Cichoreæ,
Intybi an. ℥ iiii.
Absinthii ℥ iii.

Misceantur, fiat potio, de qua per triduum bibat æger mane ac una hora ante cenam. Postea sequenti haustu evacuetur biliosus humor.

℞. Cort. Myrobalanorum citrinorum *Haustus*
℥ s. contusa coquantur in duplici vase cum *Cholaga-*
aquæ boraginis ac cichoreæ an. ℥ iiii. per *gus.*
dimidiam horam, exprimaturn atque co-
lentur, colato jusculo admisceantur Syr.
rosati solutivi ℥ i. Diacatholici. Elect. le-
nitivi an. ℥ s. Misceantur, fiat haustus, qui
matutino tempore tepidus exhibeatur, je-
junet autem æger post assumptum haustum
sex horarum spacio. Commodissime quo-
que purgari potest humor biliosus iis reme-
diis quæ supra in cephalalgia ex bilioso hu-
more descripta sunt.

Si vero vertigo à cruda pituita aut melan-
cholico humore exciteretur, hi humores quo-
que iisdem remediis & concoqui & evacua-
ri possunt qui in cephalalgia speciebus ex
pituita & melancholico humore ortis, enu-
merata sunt; singulariter autem pituitam e-
vacuant sequentes pillulæ.

℞. Mas. pil. Arabicarum, cochiarum, *Pillula*
aurearum an. ℥ i. *Phlegma-*

Agarici trochiscati ℥ s. cum q. s. mellis
rosacei. Formentur pillulæ n. 27. & deglu-
tiendæ offerantur sex horis ante prandium.

Melancholicus vero humor commodè eva-
cuabitur pillulis sequentibus. *Pillula*
melana-

℞. Mas. pil. Indarum, de lapide lasuli an. *℥ s.*
℥ i. s. ex quibus mixtis cum aqua fumarie
formentur pil. n. 21. quæ deglutiendæ offe-
rantur diluculo.

Post generalem evacuationem cervici *Cucurbi-*
commodissime affigi possunt cucurbitulæ *tula.*
cum scarificatione. Utiliter quoque sequen-
ti gargarismate æger uti potest, si pituita sit
causa vertiginis.

℞. Sem.

Gargaris-
mus.

Errhinon.

Mastica-
torius pul-
vis.

Quantum
etiam in
hoc affectu
possit infu-
sum esse co-
ris Pavo-
nis in vi-
no, per ali-
quot dies
exhibi-
tum, vi-
de apud
Quercet.
in Phar-
macopæa
restitutâ.
An arte-
riotomia
admitten-
da.

Differen-
tia inter

℞. Sem. Erucæ ʒ s. Rad. Pyrethri ʒ iiii.
Majoranæ, Betonice an. M. s. Concisa
atque contusa coquantur in aceti & aquæ
an. lib. s. ad medias, colentur, ac colato
juri admisceantur mellis rosacei ʒ iiii. fiat
Gargarismus. Mirificè quoque attrahit pi-
tuitam, & ab obstructione meatus liberat
succus radice Betæ rubræ per nares ad ce-
rebrum attractus. Subinde quoque in ver-
tiginè ex frigidis humoribus orta cerebri
sequenti masticatorio pulvisculo est corro-
borandum.

℞. Sem. Erucæ ʒ ii.
Cubebarum,
Macis an. ʒ i.
Cariophyllorum,
Cinamomi an. ʒ i.

Fol. Majoranæ siccæ ʒ s. Concidentur
crassiusculè & jejuno ventriculo hujus pul-
veris P. i. masticetur in ore, obstructis na-
ribus, donec sapor omnis evanescat.

Ubi vero vertigo ex flatulentis spiritibus
in cerebro oclusis, originem ducit, ve-
hementer laudat Galenus lib. 3. de locis af-
fectis, arteriarum supra aures sitarum sectio-
nem, sed meo judicio non sunt temerè ar-
teriæ incidendæ, tum quia sanguis ægrè si-
sti potest, tum quod Hippocrates manife-
stè testetur incisionem earum arteriarum
sterilitatem inducere.

3. *Epilepsia sive morbus comitialis quid,
quæ ejus causa, quæ signa, & qui-
bus prædiis curanda?*

Ἐπιληψία, quasi dicas, superna compre-
hensio; quæ & ἱερον νόσημα id est sacer mor-
bus, & ἡρώλειον νόσημα id est Hercules
morbus, & πειδιον νόσημα id est puerilis
morbus, item comitialis morbus nomi-
natur, Galeno lib. 3. cap. 7. de locis af-
fectis teste, est convulsio seu potius disten-
sio totius corporis non perpetua sed per in-
tervallâ affligens, quæ laborans subito con-
cidit, omnibusque animalibus actionibus,
sensu videlicet ac motu propter intercep-
tionem spirituum animalium ita privatur, ut
nec audiat, nec videat, nec præteritorum
comminiscatur. Differt tamen à convul-
sione sive membrorum contractione, quia

convulsio continua est, diuque affligit, E-
pilepsia vero per intervalla recurrit: in con-
vulsione sensus manent illæsi, in epileptico
paroxysmo verò plerumque prorsus amit-
tuntur.

In epilepsia locus affectus est media ca-
vitas cerebri ubi potissimi nervi principium
habent.

Epilepsia trifariam accidit. Una est, quan-
do causa morbi est in ipso cerebro, ipsum-
que primaria affectione laborat. Secunda
est, quando cerebrum non per se sed per
consensum, quem cum ventriculo, inte-
stinis & matrice habet. Tertia est quæ & i-
psa per consensum fieri dicitur, quando ni-
mirum causa morbi à cruribus aliisque ex-
tremis partibus sensibiliter ad cerebrum
defertur.

Causæ epilepsiæ αἰτιαὶ ἐπὶ τῆς νόσου sunt, aut
frigida humidaque impensè cerebri consti-
tutio, qualis est in puerulis: aut humoris
pituosissimi vel melancholici ingens copia, re-
pentè cerebri ventriculos meatusque infar-
ciens, animalesque spiritus ab universo
corpore interceptans, (non tamen penitus
intercipiuntur, sed ejus nonnihil præter-
fluit:) aut venenata aliqua qualitas in ce-
rebri substantia delitescens: aut vapor vene-
nosus vel ex utero vel ex ventriculo aliisque
visceribus & quandoque ab extremis parti-
bus instar auræ per cæcos meatus in ventri-
culos cerebri repens: aut apostema cere-
bri, particulæque menyngum corruptio.

Causæ αἰτιαὶ ἐπὶ τῆς νόσου vero sunt, ira &
vehemens animi commotio, teter & vene-
nosus odor, alimentorum corruptorum &
virulentorum usus: Continua heluatio:
Violentus capitis ictus & concussio, ex qua
sanguis ex venulis in ventriculos cerebri de-
stillat & ibidem concrevit. In puerulis (qui
etiam propter humiditatem cerebri pronio-
res sunt ad epilepsiam quam adulti) causæ
plerumque sunt, aut hæreditarium malum:
aut nimia humiditas cerebri: aut prava vi-
ctus ratio corruptumque in ventriculo ali-
mentum: aut lumbrici quando ex intesti-
nis in ventriculum repunt.

Signa communia & generalia epilepsiæ
sunt, communia.

sunt, subitus collapsus artuum capitisque vibratio ac concussio: oris spuma, quæ ex humiditate cerebri per spiritum commotum agitur & simul ei commiscetur ac in spumam in ipsis cerebri ventriculis degenerat, & inde ad os per palatum defluit; quibusdam etiam excrementa præter voluntatem exeunt: nonnunquam evomunt, & quidam cum mugitu deprehenduntur.

Signa diversarum causarum. Signa epilepsie ex primaria cerebri affectione. Per consensum ventriculi & intestinorum.

Differentiæ autem epilepsie iis dignoscuntur signis. Qui ex cerebri *idiopathia* sive primaria affectione epilepsia laborant, iis semper adest gravitas & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, motusque stupor, & faciei pallor & insomnia turbulenta, qui ut plurimum inter dormiendum corripiuntur. Qui vero per consensum, aut orificii ventriculi aut intestinorum, propter lumbricos, evaporatione, venenosque halitu ascendente epilepsia corripitur consueverunt, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi, dolorem, erosionem & distensionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficilimè inediam tolerare possunt. Paroxysmus autem semper antecedit nausea, dolor & palpitatio cordis, animique deliquium: solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum aut pituitosorum humorum. Historiam hujus speciei epilepsie recitat Galenus lib. 1. de locis affectis, de quodam Grammatico juvene, qui, quoties inediam paulo diutius sustineret, aut vehementius doceret aut irascere, statim epilepsia corripiebatur.

Epilepsia ex utero.

Quæ vero mulierculæ ex matricis cum cerebro consensu in epilepsiam incidunt, iis circa lumbos & pubem dolores antecedunt & simul capitis acerbos cruciatus percipiunt. Porro quibus origo comitialis morbi ab extremis particulis veluti manuum aut pedum digitis provenit, ii ex iisdem particulis in quibus fomes epilepsie continetur ante paroxysmum auram quandam frigidam per continuatas corporis partes ad cerebrum elevari sentiunt, cujus impetus, arctiori vinculo particulæ affectæ injecto, facile intercepti potest, ut vel nullam vel mitiorem adferat epilepsiam, cu-

jus quoque epilepsie historia habetur apud Gal. in loco præcitato de puero decimum tertium annum agente. Hippocrates l. 6. *Prognostica* de morbis vulgaribus: Melancholici magna ex parte epileptici sunt & epileptici omnes redduntur melancholici.

Idem 5. Aph. 7. Quibuscunque mala comitialia ante pubertatem sunt, id est, ante annum ætatis 14. per ætatis mutationes quæ sunt septimo quoque anno, liberantur, quibus autem post 25. annum durat, difficilimè curantur, & ut plurimum commoriuntur.

Infantulis & pueris crebro, consistentis ætatis rarius, senibus aut nunquam aut rarissimè contingit epilepsia corripitur, frequentius autem apoplexia.

Curatio epilepsie in tribus consistit, in liberatione à paroxysmo, in causarum ablatione, & in præservatione: quæ omnia per victus convenientem rationem & medicamentorum usurpationem perficiuntur.

In paroxysmo epileptico statim ubi corruit homo, os ægrotantis ligno aliquo adaptato, aut cultello vel cochlearis manubrio etiam violentius aperiendum est, & spuma ab ore abstergenda pituitaque infertis ori digitis eximenda, & pollex aliique digiti, qui vehementissimè convelluntur, reliquæque partes in rectum dirigendæ: ac si ulla ratione fieri potest ægri fauces & palatum vel digito vel penna immissa titillandum & ad evomendum proritetur æger. A vomitu enim ut plurimum statim liberantur hoc malo correpti. Si vero vomitus non procedat, protinus ori sequentia remedia imbibenda infundi debent: spiritus vitrioli chymica arte paratus pondere medii scrupuli, aut si is desideretur, olei ejusdem rectificati ʒ i. cum mensura cochlearis aquæ lavendulæ exhibitus statim tollit epilepticum paroxysmum. Idem præstat oleum ex seminibus angelicæ ʒ i. eadem ratione exhibitus.

Adultioribus utilissimè exhiberi possunt in epileptico paroxysmo duo aut tria cochlearia aquæ vitæ aureæ ex floribus lilior. *Ag. vitæ aurea* convallium, cujus præparandi ratio supra in curatione memoriæ abolitæ tradita est.

Coag. leporis.

Præstantissimum ad tollendam epilepsiam remedium judicatur 3 i. coaguli leporis, cui moschi gr. iiii. sunt admixta, cum aqua lavendulæ ebibenda oblata.

Pulvis expertiss. antiepilepticus.

Aut exhibeatur sequentis expertissimi pulvisculi 3 i. aut 3 s. pro ætatis ratione.

℞. Rad. Pæoniæ,

Sem. Pæoniæ an. ʒ i.

Ossis cranei hominis suspensio necati 3 s.

Cornu unicornis ʒ ii.

Coralliorum rubeorum,

Præparat. Margarit. ana ʒ s.

Moschi gr. iiii. Fiat pulvis subtilissimus qui in paroxysmo cum aqua lavendulæ bibendus propinetur.

Experientium superstitiosum.

Experientia comprobatum est, pridie D. Johannis Baptiste, sub radicibus artemisise evulsæ carbones reperiri, quorum 3 i. si in pulvisculum redigatur & cum aqua stillatitia florum tilis aut florum lilior. convallium ebibenda offeratur, protinus ægrum ab epilepsia liberatum iri.

Præstat quoque in ipso paroxysmo epileptico naribus indere erhinon & sternutationem provocare, quod facile vel succo rutæ, vel ex radicibus betæ rubæ expresso & naribus tepidè infuso perfici potest, vel sequenti pulvisculo.

Pulvis sternutationis.

℞. Pul. Hellebori albi,

Fol. Majoranæ an. ʒ s.

Castorei & Euphorbii an. gr. ii. Misceantur, fiat pulvisculus, cujus momentum per calamum in narium foramina suffletur, unde statim subsequitur sternutatio. Postea non inutile est narium foramina inungere aut oleo è nucibus moschatidis, aut ex seminibus angelicæ destillato. His peractis distentæ partes in rectum sunt dirigendæ, & oleo amygdalarum dulcium cui aqua ex granis juniperi destillata est commixta, inungendæ & confricandæ.

Epilepsia puerorum remedia.

Porro infantibus & puerulis epilepsia correptis sequentia tentanda sunt: ac primum quidem distenta membra, ut supra dictum est, in rectum sunt dirigenda, & oleo calido amygdalarum dulcium cui aqua lavendulæ est commixta, confricanda. Cervix

autem & occiput potissimum duplicato lintheolo in aqua lavendulæ calefacto & rursus expresso, fovendum est, ac statim ex ore pituita eximenda, & naribus fumus incensi succini est admovendus, ac statim in os infantis gr. tria moschi cum aqua lavendulæ sunt instillanda: aut sequens eclegma lambendum ori inferendum.

Eclegma.

℞. Syr. è succo Betonicæ,

de cichorio an. 3 i.

Aquæ vitæ aureæ ex floribus lilior. convallium destillatæ 3 s.

Moschi gr. iiii. Misceantur.

Aut dissolvatur rotula una Diamoschi dulcis cum aquæ lavendulæ & ori instilletur.

Sublato paroxysmo reliqua universa curatio in causæ remotione, & præservatione à paroxysmo collocanda erit, quæ victus ratio & pharmacis sequentibus perficitur.

Præservatio à paroxysmo.

Victus ratio in epilepsia juxta præceptum Galeni in lib. de attenuante victu, debet

victus ratio.

esse extenuans & incidens. Ita enim inquit; epilepsias parvas & nunc incipientes, attenuans victus penitus sanat, consummatis vero non mediocriter juvat. Curandum itaq; ut æger in aëre moderatè calido & sicco versetur, & evitet contrarium. Utatur præterea corporis exercitio moderato, caputque jejunis calidis lintheolis quotidie confricat, & pectine poros aperiat: Somnum meridianum, ut pestem, fugiat: id quoque caveat sedulo ne quoquo modo alvus sit obstructa: quod si vero fiat, statim supposita glande medicatoria, vel communi Clystere injecto subducatur.

Cibis utatur moderatè calefacientibus & incidentibus. Ejus alimenta condiantur cinamomo, mace, zinzibere, semine carvi, coriandri, foliis majoranæ & radicibus petroselinii. Caro turturum, turdorum & passerum comesta specifica proprietate adversatur epilepsie. Vitet carnem suil-

Carnes epilepticis prosum.

lam, anserinam & omnia fumo indurata, & simul universa leguminum genera & cæpas.

Vitet & vini meracioris & flatuosarum cerevisiarum potum. Bibat hydromeli & aquam

aquam in qua decocta sunt cinamomum & coriandri semen præparatum.

Eradicatio causa epilepsie. Ad causas epilepsie extirpandas sequentibus utendum est remediis. Primum subducatur alvus sequenti clystere.

Enema. R. Maluæ, Mercurialis, Betæ, Betonice, Majoranæ an. M. i. Furfurum tritici M. s. Flor. Anethi, Centaurii minoris an. P. i.

Sem. carvi 3 s. Concidantur, & in q. s. aquæ decoquantur ad tertias exprimantur ac colentur, colati juris accipe 3 xv. Quibus admisce pulpæ cassiæ 3 i. Hieræ simp. 3 s. Olei communis 3 iiii. Salis 3 i. Miscantur, fiat enema quod jejuno ventriculo tepidum recto intestino infundatur, Alvo evacuata si æger sanguine redundet, & ætas ferre possit, primum vena cephalica, & altero die & vena frontis vel venæ lividæ, quæ sub lingua conspiciuntur, incidendæ erunt: tandem humor lentus, in ventriculis cerebri hærens sequenti potione extenuandus & ad educationem præparandus erit.

Decoctum digerens & evacuans. R. Sampfuchi, stachados Arabicæ, Ronismarini, Hyssopi, Betonice, Melissæ, Salviæ, centaurii minoris, card. benedicti an. M. s.

Rad. Pæoniæ, Cicoreæ an. 3 s.

Hellebori nigri præparati 3 v.

Sem. Pæoniæ, Cubebarum, Cardamomi, Agarici, Troscati an. 3 i.

Sem. Carthami 3 vi.

Fol. Senæ 3 s. Concisis concidendis & contusis contundendis misceantur ac simul cantharo stanno imponantur eisque adfundantur lib. iiii. hydromellis ac tandem oblinito operculo canthari massa farinacea in leberem aqua repletam collocetur, & simul concoquantur per 2. horas, postea ubi refrigerit, coletur & exprimitur, colato juri admisceantur syr. de stachade, & cicorea & è betonica an. 3 ii. & aromatizetur speciebus diambæ, diamoschi dulcis an. 3 i. Fiat potio, de qua tepefacta bibat æger mane ac vespere ante canam singulis vicibus 3 iiii. Ubi hæc po-

tio exhausta, purgentur vitiosi humores sequentibus pillulis.

R. Mas. pil. cochiarum, Arabicarum, *Pillula.* Trochiscorum de Agar. an. 3 i. Ex his simul mixtis formentur pillulæ n. 27. cum aqua majoranæ: Aut

R. Mas. pil. Asajereth, Agarici Troscati an. 3 i.

Extractionis Hellebori nigri gr. v. cum aqua lavendulæ formentur pillulæ n. 27. & deglutiantur in aurora: Aut

R. Rad. Hellebori nigri 3 ii.

Fol. senæ 3 iiii.

Cinamomi electi, anisi an. 3 i. Contusa macerentur horis 24. in aquæ majoranæ 3 vi. Tandem ebulliant leniter, exprimantur ac colentur, expreso jusculo admisceantur diacatholici diaphæniconis an. 3 ii. Fiat haustus, quo æger utatur 6. horis ante prandium. Porro si epilepsia ex ventriculi virulenta evaporatione oboriatur, *Epilepsia ex consensu ventriculi remedia.* primum is per vomitorium potionem evacuandus erit. Vomitoria vero potio confici potest ex sale & aqua tepida cui admixtum sit pauxillum aceti: Aut

R. Sem. Atriplicis.

Anethi,

Rad. Raphani an. 3 s.

Ficuum concisum n. ii. Contusa coquantur in aqua 3 ix. ad tertias, colentur, colato jusculo admisceantur oxymellis scillitici 3 ii. Fiat haustus, & tepidus ebibatur & post quadrantem horæ rursus evomatur: At si vomitio sua sponte non procedat, penna anserina oleo tincta faucibus inferatur, ex cujus titillatione statim subsequitur vomitio: altero deinde die reliquæ vitiosorum humorum sequentibus pillulis ex ventriculo evacuari debent.

R. Mas. pil. de hiera simplicis,

Alephanginarum,

Agarici Troscati an. 3 i. Ex quibus mixtis cum syrupo de absinthio, formentur pillulæ n. 27. quas deglutiat æger duabus horis ante cænam.

Ventriculi verò orificium mane ac vespere sequenti inungatur linimento.

R. Olei absinthii, nardini, mastichini,

Z 2 cyto-

Vomitium.

Hujus loci chymici utuntur gilla Theophrasti seu vitrioli venetici vel sale vitrioli albi quæ egregie vomitum movent. Pillule stomachales.

Inunctio ventriculi. Si olea de stillat, pro

hisce sum-
muntur
multo erit
efficacius.

Epilepsia
per consen-
sum par-
tium re-
media.

Pillula.

Vesicato-
rium.

Si hisce
non cedit,
cauterium
parti mit-
tenti ap-
plican-
dum est.
Hac enim
ratione
multi re-
stituti.

Cucurbi-
tula.
Præserva-
tio ab epi-
lepsia.

cytoneorum an. ʒ s. Ceræ quantum sufficit,
fiat linimentum, cui admisceantur Pul. men-
thæ, cariophyllorum, coralli rubei præpa-
rati an. ʒ s.

At si epilepsia ab aura venenosa extremæ
alicujus particulæ ad cerebrum ascenden-
te concitatur, aura illa statim vinculo for-
ti intercepta erit, ægrotanti vero ʒ i.
Theriace Andromachi cum aqua lavendulæ
exhibenda, ac tandem sequentibus pil-
lulis corpus purgandum.

℞. Pil. foetidarum, de Agarico an. ʒ s.
Cum aqua scordii formentum pillulæ n. 27.
& deglutiantur in aurora.

Particulæ vero in qua fomes mali delite-
scit applicetur sequens *καυστηριον*.

℞. Cantharidum, abjectis pedibus &
capitibus ʒ i.

Fementi acerrimi ʒ s.

Mellis Anacardini ʒ ii. Misceantur,
fiat cataplasma, ex cujus impositione exci-
tabitur vesica, virulento humore plena, ex
qua perfecta exprimitur humor & ulceri
folium brassicæ imponatur, donec consoli-
detur.

Prodest quoque cucurbitulas cum scarifi-
catione etiam parti affigere.

Reliqua pars curandæ epilepsiae tota est
collocanda in præservatione. Post genera-
lem itaque causarum epilepsiae sublationem,
id est, post vitiosorum humorum ex ven-
triculis cerebri præparationem & evacua-
tionem, ne iidem humores coacerventur,
providendum est.

Subinde itaque vitiosi humores, aut per
palatum aut per nares ex cerebro sunt eli-
ciendi, cerebrique substantia & spiritus a-
nimales convenientibus remediis corrobo-
randi.

Evacuatio
quo tempo-
re fieri de-
beat.

Qui itaque epileptici gravedine aut capi-
tis gravitate laborant, singulis mensibus
quarto nimirum ante oppositionem solis
& lunæ die, utantur primum pillulis paulo
ante descriptis, altero autem tertio die à
sumptis pillulis reliquæ excrementitiorum
humorum, vel per palatum sequenti garga-
rismate subtrahantur.

℞. Pyrethri ʒ s.

Sem. Erucæ ʒ vi.

Majoranæ, Hyssopi an. M. s. Conci-
sa & contusa coquantur in aq. & aceti an.
lib. i. ad medias, colentur, colaturæ admi-
sceantur mellis rosacei ʒ iii. fiat gargari-
smus, quo tepido jejunos utatur æger. Aut
eliciantur crassi humores per nares sequenti
errhino.

℞. Suc. Sampfuchi ʒ ii.

Rutæ, ʒ i.

Mellis virginei ʒ s. Misceantur fiat
errhinon cujus pauxillum tepidum per cala-
mum naribus attrahatur.

Fumus succini & flor. rorismarini simul
mixtorum quotidie naribus haultus præfer-
vat ab epilepsia, corroborando cerebrum
& humores exiccando.

Præservat similiter & pulvis sequens
mansilis quotidie jejuno ventriculo in ore
obstructis foraminibus narium masticatus.

℞. Fol. Majoranæ, Rorismarini an. ʒ i. Pulvis
Cinamomi, Macis, Cariophyllo-
rum an. ʒ s.

Sem. carvi, coriandri præparati, cu-
bebarum an. ʒ i. s. Concidentur crassiuscule
& fiat pulvis masticatorius.

Cum autem hoc malum juxta motum
lunæ exacerbari soleat, epilepticus hisce
sequentibus remediis se munire ac præser-
vare poterit, eisque tali ordine uti.

Tribus diebus ante & post plenilunium
& novilunium bibat jejunos duo cochlea-
ria aquæ vitæ nostræ ex liliis convallis de-
stillatæ, quæ in curatione debilitatæ me-
moræ præscripta est, quæ sola & ad prossi-
gandum paroxysmum & ad præservationem
satis esse poterit. In quadraturis vero lunæ
bibat æger jejunos aut theriacæ Androma-
chi aut confectionis anacardinae ʒ i. cum
aqua lavendulæ solutam. Reliquis vero in-
termediis diebus hisce corroborantibus &
præservantibus pharmacis quotidie uti po-
terit.

℞. Conf. Betonicæ, Salviæ, Rorismarini an. ʒ i.

Rad. cicoreæ conditarum, corticum
citri conditarum & minutim
concisarum an. ʒ s.

Spe.

*Apopleg-
masismi.*

Errhinon.

*Suffimi-
gium.*

*Pulvis
masticato-
rius.*

*Aqua vitæ
ex lil. con-
vall. quan-
do utendū
ad præser-
vationem.*

*Electua-
rium præ-
servati-
vum.*

Spe. Diamoschi dulcis, Diambrae an. 3 i. s.

Pul. Visci quercini, cineris cuculi avis, cranei hominis,

Coralli rubei præparati an. 3 i.

Sem. Pæoniæ 3 i. s.

Olei cinamomi 3 s. cum q. s. syr. de cicorea. Commisceantur & fiat electuarium de quo jejunus singulis diebus devoret æger semijuglandis quantitatem.

Pulvis antiepilepticus.
Aut loco elect. utatur iiii. rotulis Diamoschi aut Diambrae. Efficacissimum est & experientia comprobatum cum ad præ-servationem tum à paroxysmo liberationem remedium, sequens pulvisculus.

R. Rad. cicoreæ, artemisiæ rubæ an. 3 i.

Sem. pæoniæ 3 i. visci quercini, cranei hominis an. 3 iiii.

Coralli rubei præparati, cornu Monocerotis an. 3 i.

Moschi 3 s. Margaritarum præparatarum 3 s. Redigantur in subtiliss. pul. cujus 3 i. cum aqua lavendulæ in plenilunio, vel tempore quo paroxysmus recurrere solebat, exhibeatur.

4. *Apoplexia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Apoplexia quid.
Ἀποπληξία, Celso attonitus morbus, est omnium corporis partium motus ac sensus repentina privatio, omniumque animalium functionum interceptio. Ea enim correpti nullis præcedentibus ante paroxysmum malis indicii toti repente, quasi attoniti concidunt, & jacent fixis oculis stentuntque sine sensu, sine motu & sine intellectu, sola respiratione eaque difficili à mortuis differentes. Duæ autem sunt Ἀποπληξίας species, fortis & mitior. Fortis apoplexia morbus est acutissimus, cito hominem jugulans, vel qui non statim ea extinguatur paralyticus redditur. Mitior autem quæ ὑποπληξία dicitur, curabilis quidem est, manet enim in ea sensus & motus, sed uterque stupidissimus & incertus, in eaque altera pars corporis tantum resolvitur & ingravescit.

Senibus ac decrepitis pituitosis & crapu-

læ indulgentibus familiare malum est apoplexia.

Causæ apoplexiæ ἀποπληξίας, sunt Causæ. crapula continua & delapsus è sublimi; ἀσυνεψία vero sunt pituitosa, (ex sanguine etiam contingere & quidem ut pl. apoplexiam una cum experientia Platerus asserit,) frigida & lenta excrementa in ventriculis cerebri collecta, ac nervorum principia (veluti in hemiplexia contingit) obstruentia: aut rete mirabile (quod ex arteriis spiritum vitalem ex corde ad cerebrum deferentibus contextum est) constringitur, id quod in forti apoplexia evenit.

SIGNA apoplexiæ manifesta sunt. Ea enim correpti sensu ac motu privantur & quasi mortui jacent ac stertunt & difficulter spirant, & quibusdam respiratio est adeo exigua ut sensum adstantium effugiat, & plane mortui credantur: magis hoc accidit in hysteris, nam apoplectici magna ex parte difficulter respirant, & pulsus magnus habent: quidam etiam adhuc viventes contumelantur. Signa hoc modo explorari debent, candela accensa naribus est opponenda, ex cujus lucis motu dignoscitur vitam adhuc superesse: aut vitrum aqua plenum pectori est apponendum in quo si aqua commoveatur, signum est vitæ. Inde apoplecticos non nisi post tres dies sepeliendos jubent Medici. Quanto autem in apoplexia respiratio est difficilior, tanto morbus est periculosior. Et si autem apoplexiæ paroxysmum nulla mala præcedant signa, tamen hi potissimum proni sunt ad hoc malum, qui vehementes capitis dolores sæpius sentiunt, & quibus extremæ partes perpetuo frigore rigent, quique inter dormiendum dentibus strident. Ut plurimum autem mingunt urinam æruginosam id est è viridi nigram, hypostasin farinaceam habentem. Prognosticum signum apoplexiæ tradit Hipp. 2. Aphor. 42. inquit, apoplexiam fortem solvere impossibile est, debilem vero non facile, mortem enim minatur celerem. Idem aph. 57. l. 6. apoplexiæ in ætatibus maxime sunt à 40. anno usque ad 60.

Ad apoplexiam quanam dispositi.

Prognostici.

Curandæ apoplexiæ ratio in præservatione & liberatione sita est.

Præservatio quibus peragatur mediis.

Præservatio rursus circa victus rationem, & pituitosi humoris in ventriculis cerebri collecti præparationem & evacuationem, & totius cerebri spirituumque animalium corroboracionem versatur. Qualis autem debeat esse ratio victus & quibus remediis pituitosa excrementa cerebri sint præparanda & evacuanda, partim supra in curatione abolitæ memoriæ & epilepsiæ, partim in sequenti *παράλυσις* (in quam curabilis apoplexia ut plurimum terminari solet) sunt enumerata, quæ omnia huc referri & adaptari commodè possunt.

Ad corroborandum vero cerebrum & spiritus animales, ut causam apoplexiæ discutere & apoplecticum paroxysmum avertere queant, pro præservacione duo tantum remedia experientia comprobata, hoc loco referre satis esse putamus.

Sequentis electuarii cerebrum & spiritus animales corroborantis humiditatemque cerebri exiccantis, si quis quotidie nucis avellanæ quantitatem jejunos devoraverit, eo die tutus ac liber ab apoplexia evadet.

Electuarium præservativum ab apoplexia.

℞. Conservæ anthos ʒ i. Betonice, Salvie an. ʒ s. Theriacæ Andromachi ʒ i i. confect. Anacard. ʒ ii. Specierum Diamoschi dulcis, Diambre an. ʒ i. Pul. Castorei, sem. Erucæ an. ʒ s. Cum syr. è Betonica vel è stachade. Fiat electuarium in optima forma, cui admisceantur olei vitrioli rectificati ʒ ii. Olei Cinamomi ʒ s. Fiat Electuarium.

Præservat & sequens aqua vitæ sive quinta essentia, & non tantum præservat, verum etiam ab ipso apoplectico paroxysmo statim liberat, si ejus cochlearis mensura jejuno ventriculo ebibatur.

Aqua apoplectica.

℞. Confer. Rorismarini, Lavendulæ an. ʒ i i. Melissæ, salviæ an. ʒ i. specierum Diamoschi dulcis, Diambre an. ʒ ii.

Rad. Pæoniæ, Sem. Pæoniæ, Cinamomi Electi an. ʒ s. Croci ʒ i. Castorei, sem. Erucæ an. ʒ ii. Sacchari candi lib. s. Aq. stillatitiæ ex granis Juniperi ab oleo separa-

tæ lib. i i i i. Contundenda contundantur ac simul mixta in vitro angusti orificii commisceantur & macerentur sive digerantur, aut in sole, aut in fimo equino semper tepido. Post mensem chymica arte in calidis cineribus destillentur, exiccata materia è vitro eximatur & conteratur, rursusque vitro imponatur & liquor destillatus adfundatur, ac denuo aut in fimo equino, aut in tepida aqua maceretur per dies 14. ac tandem per balneum Mariæ denuo destilletur ac conservetur tum ad præservacionem tum ad liberationem ab apoplexia.

Oleum destillatum nucum moschatarum *Ol. nuc. muscata stillaticium.* naribus illitum, aut suffitus succini accensi præservat ab apoplexia.

In liberativa & apoplectico paroxysmo, curatione ita procedendum est. Primum si os apoplectici oclusum est, statim violenter aperiri debet, & inter dentes bacillus ex ligno apratus, inferendus. Faucibus autem statim infundendæ sunt 4. guttulæ spiritus vitrioli, aut lingua illinienda est aqua vitæ sive quinta essentia paulo ante præscripta.

Mirificè discutiunt apoplexiam & quintæ *Revulso.* essentia ex margaritis aut corallis extractæ & ori instillatæ.

Quo peracto protinus glans medicatoria *Supposito-* oblonga, quam suppositorium officinæ *rium acre.* cant, ex melle, sale & pulvere trochiscorum alhandali & momento euphorbii confecta, recto intestino inferenda erit, ut crassi vapores ex cerebro, & fæces alvi subducantur, aut si ulla ratione ob vehementiam paroxysmi fieri queat, sequens clyster subijciendus erit.

℞. Salvie, origani, betonice, rutæ, *Enema.* centaurei minoris, majoranæ an. M. s. pullegii, hyssopi, lavendulæ an. M. s.

Sem. carvi, fileris montani an. ʒ ii. Agarici ʒ ii. Contusa & concisa coquantur in q. s. aquæ ad tertias & in fine coctionis imponatur ʒ i. Pulpæ colocynthidos, & rursus ebulliant ac colentur; colati juris accipe ʒ x i i. cui admisce salis gemmei ʒ i. s. Hieræ comp. ʒ i. s. Hieræ Logadii Nico-

Nicolai § 1. Olei rutæ, è baccis lauri an. § 1. s. Olei de castoreo § 3. s. Misceantur, fiat enema, quod recto intestino tepidum injiciatur, vel in ipso paroxysmo, vel primo quoque tempore. In tota enim curatione apoplexiæ, alvi constipati singularis est habenda ratio. Omnis enim vis expulsiva intestinorum prorsus extingui solet. Necesse itaque erit ut alternis, vel tertio quoquo die vel Clysteribus vel glandibus acrioribus fæces detrahantur. Glans autem medicatoria ex hisce rebus confici potest.

Evacuaciones per alvum unnice necessarias.

Supposito-rium.

R. Mellis ad duritiem cocti § 3. s.

Pul. colocynthidos § 1.

Euphorbii § s.

Salis Gemmei § 11. Misceantur & dum adhuc tepent, formetur suppositoria sesquidigitum longa, quibus fila alligari possunt, ut pro arbitrio extrahi queant.

Subducta alvo statim concitetur æger ad sternutationem sequenti pulvisculo naribus indito.

R. Majoranæ, Perethri, Hellebori albian. § s.

Euphorbii, castorei an. gr. v. Misceantur pulverisfata, cujus momentum naribus insuffletur.

Tandem lingua ægroti confricetur theriaca Andromachi aut confectioe anacardina.

Viæus ratio.

Ubi vero jam apoplexia in paralyfin est terminata, viresque paulatim redire conspiciuntur, ita ut per gulam alimenta & medicamenta deglutire possit, victus ratio ei est præscribenda, quæ in curatione abolitæ memoriæ est præscripta, ut nimirum utatur cibis mollioribus qui aromatibus calidis, pipere, cinamomo, macere, zinzibere & croco sunt conditi. In potu ei convenit hydromeli, & tum sequentia remedia foris & intus corpus sunt exhibenda.

Cura paralyfis ab apoplexia.

Derafis itaque à capite pilis, caput ipsum jejuo quotidie lineolis calidis confricandum est, ac statim aqua lavendulæ, cui nonnihil olei ex granis juniperi est admixtum, totum caput ac potissimum occiput probe est inungendum. Cervix vero & dorsi spina omnesque resolutæ partes quotidie mane

ac vespere ante cænam sequenti unguento confricandæ & inungendæ.

R. Ol. costini § 1. de euphorbio, de castoreo an. § 3. s. ex granis Juniperi, petrolei an. § 11. ceræ q. s. Fiat unguentum.

Linimentum pro spina dorso.

Singulis septimanis semel in lavacrum deducere ægrum oportet, in quo decoctæ sunt sequentes herbæ, in eoque totum corpus, & resolutæ omnes partes herbis & floribus concoctis cooperire.

Balneum.

R. Salviæ, majoranæ, serpilli, origani, betonicæ, saturejæ, baccarum juniperi confusarum, & baccarum lauri an. pro arbitrio & q. s. A balneo autem semper inungenda sunt membra præscripto unguento. Intra corpus vero sequentibus remediis utatur.

Singulis mensibus circa oppositionem solis & lunæ assumat sequentes pillulas.

R. Mas. pil. aurearum, cochiarum, de euphorbio an. § 1. trochiscorum alhandali gr. 111. cum aqua majoranæ, fiant pillulæ n. 27. quas cum aqua majoranæ deglutiat in aurora. Post dies circiter 8. ab assumptis pillulis, utatur Theriacæ Andro. § 1. s. Theriacæ cum q. s. aq. lavendulæ. Reliquis vero intermediis diebus mensis, quotidie utatur alternatim vel aqua vitæ quintave essentia, vel electuario cerebrum corroborante, paulo ante in præservatione ab apoplexia descripto, vel aqua vitæ ex floribus lilii convallii, quæ supra in abolitæ memoriæ curatione est præscripta.

Pillula.

5. Paralysis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus pharmacis curanda?

Παράλυσις resolutio nervorum propriè Paralysis est, ubi aut totum corpus, excepto capite, quid.

aut alterutrum latus, aut corporis duntaxat aliqua pars, videlicet pes, manus aut lingua motu ac sensu simul, aut motu tantum privata est. Quo in morbo si & caput ipsum cum toto corpore afficiatur, non est paralyfis sed apoplexia. In paralyfi frequentissime membra motu tantum privantur manente sensu, nonnunquam sensu tantum manente motu, cujus rei causam Gal. 1. cap. 4. de symptomat. causis, ad nervorum

Cur in paralyfi interdum sensus interdum motus

natu-

tantum,
interdum
utroque
pereat.

naturas refert. Alii enim nervi duriores nimirum & ex spinali medulla orti, motui magis serviunt: alii vero molliores, & ex cerebro propagati, sensui inserviunt. Obstruitur igitur nervis sensui destinatis, salvis vero reliquis qui motui opitulantur, solus sensus amittitur, & è contra: id quod in resolutione partium diligenter est considerandum.

Causa.

Causa παραλύσεως πρεηνμερής est lentus & pituitosus humor vel in ipsis cerebri ventriculis coacervatus, vel ex eis per cervicem in spinalem medullam defluens, principiaque nervorum obstruens, & spiritus animales, qui efficientes causæ sunt sensus ac motus, intercipientes: aut antecedens apoplexia ex eadem causa orta.

Προκαταρκτησὶς causæ sunt vehemens nervorum refrigeratio vel ab ambiente aëre, vel à diuturna mora in aqua gelida, aut luxatio vertebræ alicujus, aut dissectio nervorum, musculorum vel spinalis medullæ. Stupor paralyti cognata est affectio, ex iisdem enim causis oritur, & sola magnitudine sive intensione differunt. Potissimum autem oritur stupor ex vehementi refrigeratione aut forti compressione nervorum.

Stupor
quid.

Signa.

SIGNA paralyti & causarum ejus manifesta, & ex relatione ægroti dignosci possunt. In omni enim paralyti tum universali tum particulari sensus ac motus vel simul vel alterutra facultas tantum, aut prorsus extinguitur aut vitatur.

Curatio.

Curatio παραλύσεως perficitur proba vitæ ratione, & medicamentorum convenientium cum intra tum extra corpus administratione.

Diatæ.

Vitæ ratio hujusmodi est instituenda. Versetur æger in aëre calido & sicco. Si causa interna, pituita lenta est, uratur & moderato exercitio: cibi sint tales, qui calefaciendi, exiccandi & extenuandi facultatem habeant. In principio παραλύσεως utendum est victu tenuiori, veluti sunt cremor pitusanæ, sorbitiones & juscula ex hydromelle: processu vero temporis validioribus, ex quibus sanguis calidus & inculpatus generetur, utendum est: tales sunt

carnes caponum, gallinarum, vitulorum & similia. Magis autem assata quam elixa conveniunt. Alimenta omnia condiantur zinzibere, cinamomo, croco, macere, satireja, rosinarino, majorana & salvia: Acetum, fructus crudos, & pisces, omniaque refrigerantia & humectantia alimenta, simul & vini (*vinum enim nervis inimicum, si tamen vinum medicatum reddatur herbis convenientibus, valde juvat paralyticos*) usum vitet diligenter. Porus sit hydromeli aut aqua in qua cinamomum & semen coriandri sunt cocta & melle purissimo dulcorata.

MEDICATIO perficitur pharmacis intra & extra corpus exhibitis, quæ sequenti methodo usurpanda sunt.

Initio alvus sequenti clystere emollienda & evacuanda erit.

℞. Betonicæ,
Serpilli,
Majoranæ,
Mercurialis an. M. i.
Flo. Chamæmeli,
Anethi,
Centaurii minoris an. M. s.

Enema.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati juris accipe ꝑ xv. quibus admisce diacatholici, diaphaniconis an. ꝑ s. Hieræ simp. ꝑ i. olei chamæmelini ꝑ i. i. salis communis ꝑ i. s. misceantur, fiat enema, quod tepidum jejuno ventriculo intestinis infundatur.

Altero die si adsit plenitudo id est copia Phlegmatis sanguinis in venis, quod ex rubedine faciei & tumentibus venis deprehenditur, & vires atque tolerare possunt, vena mediana lateris incolmioris secanda est.

Deinde si causa παραλύσεως est pituita lenta & crassa, sequenti potione concoquenda & extenuanda erit.

℞. Rad. fœniculi,
Petroselinii,
Dauci cretici,
Apii an. ꝑ s.
Pæoniæ ꝑ i. i.
Sem. fœniculi,
Sileris montani,

Potio concoquens & extenuans pituitam.

Carvi

Carvi an. ʒ iiii.

Herb. Chamæpithyos,

Betonicæ,

Saturejæ,

Salviæ,

Rosmarini,

Majoranæ,

Scordii,

Cardui benedict. an. M. s.

Scobis five ramentorum ligni Guajaci ʒ i. cinamomi, cubebæ, stæchados Arabicæ an. ʒ i. s. Contundendis contusis & concidendis concisis, mixta in stanneum cantharum ponantur adfundanturque lib. iiii. hydromellis, ac tandem canthari junctura pasta farinacea oblita in ahenum aqua plenum collocetur, & simul per duas horas coquantur, deinde colentur, colatoque juri admisceantur syr. è stæchade, de calamintha, è beronica an. ʒ iiii. fiat potio, de qua mane & duabus horis ante cenam quotidie haustum ʒ iiii. tepidum ebibat. Absumpta porione evacuetur humor pituitosus sequentibus pillulis.

Pillula pblegmagoga.
Pillula Matthioli contra paralyfin etiam utilissima sunt in hoc affectu.
Hauftus diaphoreticus.

R. Mas. pil. cochiarum, assajereth, agarici trochiscati an. ʒ i. Ex quibus contulis cum q. s. aq. salviæ formentur pillulæ n. 27. quæ deglutiendæ præbeantur matutino tempore sex horis ante prandium. Porro præscripta potio & pillulæ, si necessitas efflagitat, singulis mensibus reiterandæ erunt.

Altero tandem die à purgatione commodissime exhibetur sequens haustus sudorificus.

R. Theriacæ Andromachi ʒ i.

Ol. vitrioli rectificati ʒ s.

Aq. cardui benedicti ʒ iiii. Miscantur, fiat haustus, qui exhibeatur in aurora & æger componat se ad sudandum per sesquihoram. Deinde singulis septimanis semel devoret æger sequentes pillulas nervos excalescentes & ab obstructione liberantes.

Pillula an-reparalytica.

R. Castorei, opoponacis, sagapeni an. ʒ s. cum melle anacardino q. s. fiant globuli, & deglutiantur in aurora, aut loco harum pillularum utatur ʒ i. anacardinæ confectionis, cum aqua salviæ dissolutæ.

Reliquis vero intermediis diebus quotidie mane ac vespere devoret unum ex sequentibus morsulis.

R. Specierum diamoschi dulcis, diambræ, pliris arcotici an. ʒ s.

Pul. cinamomi, macis, coriandri præparati an. ʒ i. zinziberis ʒ i. saccari in aq. juniperi soluti ʒ iiii. fiant morsuli thombiformes pondere ʒ i. Aut pro morsellis devoret sequentis electuarii semijuglandis magnitudine.

R. Conservæ rosismatini, salviæ, betonicæ an. ʒ i. diacori,

Cort. arantiorum conditorum & minutim concisorum an. ʒ s.

Spec. diamoschi dulcis, diambræ, dianthos an. ʒ i.

Syr. in quo conditum est zinziber q. s. Fiat electuarium, cui admisceatur aq. vitæ, five quintæ essentia paulo ante in Apoplexiæ curatione descriptæ q. s.

His omnibus ritè peractis ac ordinatis ad externa ac topica remedia est deveniendum.

Si itaque alterutrum latus five brachium duntaxat motu fuerit destitutum ac sensutum considerata origine nervorum, in brachiorum resolutione, cervicis vertebra, in pedum vero, lumborum vertebra cucurbitulæ cum scarificatione applicandæ sunt, ac tandem singulis septimanis ter æger est deducendus in balneum laconicum five sudorificum, quod in dolio cum vaporibus sequentium herbarum est instituendum.

R. Salviæ, hyssopi, camomillæ Rom. salviæ Rom. eupatorii Avicennæ, sideritidis, chamæpytios, majoranæ, betonicæ albæ, hypericonis an. M. i. catiophyllum, castorei an. ʒ i. Concisa decoquantur in olla ac supponatur ægro, ut ex ejus vapore in sudorem solvatur, cujus liquor si refluxerit, candentes filices, aut ferri scoriz candentes sunt imponendæ, ut calidus vapor rursus excitetur. Postquam autem benè sudaverit æger rursus in hypocaustum deducatur & tota spina dorsi, vel saltem origines nervorum ad resolutam partem descendentiū sequenti unguento probe inungantur ac confricentur.

Valde etiam juvant rotulae ex oleo rosmarini, succini & lavendulae cum sacchari q. s. parata.
Morsuli.

Electuarium.

Topica.

Cucurbitula quo in loco applicanda.

Unguentum pro spina.

A a

R. Olei

R. Olei vulpini, nardini, de nucemoscata an. ʒi.

Succi hypericonis, salviae an. ʒi. Sagapeni in aqua juniperi soluti ʒ ii. Pulveris castorei, euphorbii an. ʒi. Ceræ q. s. Fiat unguentum, quo singulis diebus bis, ut dictum est, inungatur: aut hujus unguenti loco sequenti oleo commodissime uti possumus.

Oleum.

R. Ol. ex granis juniperi, de euphorbio, de castoreo an. ʒ s. Hypericonis, de terebinthina an. ʒi. Aq. juniperi ʒ i. Misceantur.

Paralyfis particularis quid & quibus in partibus contingat.

Particularis *παρὰ μέρος* est in aliqua corporis peculiari parte, in qua sola sunt laxati & resoluti nervi, aut per obstructionem suorum principiorum, vel per refrigerationem vehementem ramulorum in ipsis particulis, unde motu ac sensu destituuntur. Particulæ autem quæ frequentius paralyfi afficiuntur sunt digiti, lingua, faucium musculi deglutitioni servientes, vesica & pudendum.

In particulari paralyfi cui parti remedia sint applicanda.

In omni particulari *παρὰ μέρος* omnium diligentissime sunt investiganda initia & radices nervorum in læsam particulam inplantatorum, & medicamenta localia non tam affectæ parti quam origini nervorum sunt applicanda; exemplo Galeni, qui Paulinæ Sophistæ, cujus digiti omnes paralyfi erant affecti, & quibus solis imperiti Medici convenientia quidem medicamenta applicaverant sed sine fructu, cum ad eum accessit esset, eadem ipsa remedia à digitis remota cervicis vertebra, unde nervi digitorum originem ducunt, applicare iussit, & brevi sensum moramque digitorum restituit, uti ipse Gal. lib. 4. de locis affectis refert.

In omni paralyfi lenti humores primum concoquendi, extenuandi & evacuandi sunt superius præscriptis mediis. In omni particulari paralyfi, iisdem remediis commodè uti possumus quæ in universali paralyfi sunt descripta.

Remedia paralyfis lingua &

In paralyfi linguæ & musculorum in faucibus primum secandæ sunt duæ venæ conspicuæ sub lingua: Deinde excitanda sunt vesiculæ in cervice sequenti em-

plastro.

R. Pul. cantharidum ʒ ii.

Fermenti acerrimi ʒ ii. Commisceantur, fiat emplastrum. Deinde utendum gargarismate tepido in hunc modum parato.

R. Rad. pyrethri, sem. erucæ an. ʒ s. Gargarisma. Contusa coquantur in aquæ & aceti an. lib. s. ad medias, colentur & colato liquori admisceantur mellis rosati ʒ ii. Fiat gargarisma. Deinde sæpiusculè confricetur lingua confectioe anacardina, aut teneatur in ore frustulum castorei.

In vesicæ & pudendi paralyfi, quando videlicet urina involuntariè prolabitur, partes circa pubem primum lixivio forti, in quo decocti sunt furculi & grana juniperi atque strobili piceæ probè laventur, deinde oleis & unguentis paulò ante descriptis quotidie inungantur, aut sequenti linimento.

R. Olei è costò, è piperibus, de euphorbio an. ʒ i. Ceræ q. s. Fiat linimentum.

In vesicæ paralyfi præsentissimum auxilium adferunt thermæ sulphureæ si earum aqua bibatur, in eisque commoretur æger. De reliquarum partium paralyfi suis in locis tractabitur.

6. Convulsio sive contractio membrorum quid, quæ ejus cause, quæ signa, & quibus remediis curanda?

Σπασμός, convulsio sive contractio, est nervorum & musculorum versus suum capitulum originemque violenta præter voluntatem contractio, in qua voluntaria extensio articularum læditur, & membrum à figura naturali detorqueatur, acerbissimoque dolore afficitur.

Convulsionis species quatuor narrantur.

I. *Ἐμμενέτιον* id est, capitis cervicis & spinæ dorsii in anteriorem corporis partem incurvatio.

II. *Ὀπισθόν* id est earundem partium in posteriora contorsio.

III. *Τέντον* id est distensio, quando partes nominatæ æqualiter in utramque partem

musc. fau-
cium.

Vesicato-
ria.

Gargari-
smus.

Remedia
paralyfis
vesicæ &
pudendi.

Therma-
rum usus.

Convulsio
quid.

Convulsio-
nis diffe-
rentia.

partem trahuntur, & quasi expanduntur, quæ species spasmû ut sunt rarissimæ, ita etiam periculosissimæ.

*Spasmus partícula-
rii.* IV. Simpliciter *σπασμὸς* Celsi rigor nervorum nominatur, nobis *der Krampf* vel *Kram*/ plurimis familiarissima est affectio, non tamen ita periculosa, ut superiores species, & accedit plerumque musculis tibiarum & humerorum, digitisque manuum ac pedum. Accedit & interdum, rarius tamen, maxillis, ubi risum sardonium efficit.

Causa convulsionis. Causæ convulsionis tum *αὐτογενεῖς* tum *αὐτογενετικαί* plures sunt, quas Hipp. 6. Aphor. 39. ad duo genera restrinxit, ubi inquit: convulsio fit vel ex repletione vel ex inanitione. Ex repletione oritur convulsio, quando muscoli & nervi aut irrigantur aut inflantur & in tumorem elevantur. Ex inanitione vero, quando nervi & muscoli plus justò exsiccantur, & instar chordæ aut lori, igni admoti, contrahuntur.

Repletionis causa. Externæ vero causæ repletionis nervorum & musculorum sunt crapula, ebrietas, & diuturna mora in aquis: Internæ vero sunt, mensium & hæmorrhoidum consuetarum detentio, tumor, flatulenti spiritus, crassi vapores, venenosique halitus musculos obsidentes.

Externæ causæ inanitionis musculorumque excitationis sunt vulnera musculorum, vini meracioris continua ingurgitatio, inedia, sudoris nimia profusio, violentæ per pharmaca purgationes vel vomitiones, sanguinis ex quacunque parte multa profusio. Internæ sunt febres ardentes, venenosæ (*ha causa sæpius excitant spasmus, unde nonnulli ab objecto nervorum inproportionato convulsionem excitari statuunt, ita punctus nervus convellitur,*) & ferventes qualitates, halitus venenosi ex animalium morstu excitati.

Signa. Signa convulsionis evidentia & manifesta sunt. Visu enim & tactu deprehenduntur. Utrum vero convulsio ex repletione aut inanitione sit excitata, tum ex antecedentibus causis tum ex hisce signis dignoscere licet. Convulsio ex repletione repente

oboritur, ex inanitione vero sensim multoque tempore: quæ vero ex flatulentis halitibus accedit convulsio, reliquis speciebus citius resolvitur.

Signa prognostica hæc notanda veniunt.

Convulsio ex inanitione semper periculosior est quam ex repletione. *Prognostica.*

A febribus convulsio difficillimè curatur. Gal. com. aph. 26. l. 2. Convulsionem ex repletione febris superveniens solvit 4. Aph. 57.

Quicumque tetano corripuntur, in 4. diebus pereunt; si vero hos effugerint, sani fiunt, l. 5. Aphor. 6. Convulsio in corporibus vulneratis non caret maximo periculo, aph. 2. l. 5.

CURATIO convulsionis pro ratione *Curatio.* causarum & loci affecti varianda erit. Convulsio enim ex inanitione & siccitate repletionem & humectationem, ex repletionem evacuationem & exsiccationem, ad sui curationem postulat.

Convulsio ex repletionem ut plurimum ex frigidis lentisque humoribus aut crassis vaporibus nervorum initiis aut musculorum corpori impactis oboritur, ejus curatio tribus instrumentis perficitur, victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum usurpatione.

Convulsus itaque ex repletionem versetur *Dieta.* in aëre calido, & vitet alimenta omnia refrigerantia, atque in initio quidem morbi tenuissima utatur victus ratione. Satis enim illi erit in cibo offerre juscula & sobrietates, pruna Ungarica, cremorem ptisanæ & carnes pullorum aut avicularum, easque assatas magis quam elixas. Potus illi sit mulsa sive hydromel in quo concocta sunt salvia, satireja, majorana, rosamarinus, semina coriandri & nonnihil cinamomi: à vino prorsus abstineat. Post victus convenientem rationem subtrahantur vitiosi cum vapores tum humores sequenti enemate.

℞. Betonicæ,
Salviæ,
Serpilli,
Majoranæ an. M. i.

Enema.

A a 2

Meru-

Mercurialis,
Centaurii minoris an. M. s.
Sem. coriandri,

Carvi an. $\frac{3}{4}$ s. Concisa ac contusa coquantur in aq. q. s. ad medias, colentur, colati juris accipe lib. i. cui admisce hieræ simpl. $\frac{3}{4}$ i. s. Diaphæniconis $\frac{3}{4}$ s. olei rutæ $\frac{3}{4}$ iiii. falis $\frac{3}{4}$ i. misceantur, fiat clyster.

Vena se-
ctio.

Post enema si corpus fuerit plethoricum, detrahatur sanguis ex vena cubiti mediana dicta, sanguine detracto, vitiosa convulsionis materia extenuetur, præpareturque & præparata evacuetur, aut medicamenti paulo ante in curatione paralyseos descriptis, aut sequentibus remediis.

Potio dige-
rens.

℞. Betonica,
Salvia,
Majoranæ,
Hyslopi,
Saturejæ an. M. i.
Cardui benedicti,
Scordii,
Centaurii minoris an. M. s.

Sem. carvi, anisi an. $\frac{3}{4}$ s. Concisa & contusa coquantur in duplici vase sive cantharo cum lib. iiii. hydromellis per sesquihoram, colentur, colato juri admisceantur syrupi è betonica, è stæchade an. $\frac{3}{4}$ iiii, fiat potio, de qua mane ac vesperi hauriat æger $\frac{3}{4}$ v. tepidas. Absumpta hac potione purgentur humores lenti & crassi vapores sequentibus pillulis.

Pillula.

℞. Mas. pil. foetidarum,
de Sagapeno,
Agarici troscifcat. an. $\frac{3}{4}$ i.

Troch. Alhandali gr. v. Ex his formetur pillulæ n. 27. cum mellis rosacei q. s. quæ post mediam noctem deglutiantur. Hæc præscripta remedia ubi necessitas expositulat, aliquoties reiterari debent.

Cerebri
evacuatio
particula-
ri.

Post hujusmodi universalem evacuationem, & cerebri excrementa detrahenda veniunt gargarismate, eribinis & pulvere sternutatorio supra in curatione paralyseos descripto.

Postea singulis diebus ad discutiendos crassos vapores & consumendos vitiosos humores in musculis & nervis collectos, utatur æ-

ger & quidem jejunus sequentibus præsidiiis.

Assumat vel aquæ juniperi $\frac{3}{4}$ i. vel succi Centaurii minoris $\frac{3}{4}$ ii. vel theriacæ Andromachi $\frac{3}{4}$ i. vel pulveris cardopatæ $\frac{3}{4}$ i. aut olei vitrioli defæcati $\frac{3}{4}$ i. aut myrrhæ & castorei simul mixtorum $\frac{3}{4}$ i. quæ remedia commiscenda sunt $\frac{3}{4}$ iiii. aut iiii. vel hydromelitis vel aquæ scordii vel aquæ cardui benedicti.

His peractis quotidie ægroto inungatur Balneum cervix & spina dorsii, partesque affectæ unguentis & oleis in paralyseos curatione commemoratis, iisdemque electuariis vires & spiritus corroborentur, quæ ibidem sint præscripta.

Prodest præterea ægrum ad thermas sulphureas (ubi haberi possunt) deducere, quæ ubi longius absunt, lavacrum hac ratione præparandum erit.

℞. Betonica,
Salvia,
Serpilli,
Origani,
Chamæpytios,
Chamæmeli an. M. ii.

seu thermæ
artificia-
les.

Rad. Elenii,
Althææ an. $\frac{3}{4}$ ii.

Sem. Fœnu Græci $\frac{3}{4}$ iiii.

Sulphuris cittini lib. i.

Aluminis lib. s. Contusa & concisa coquantur, fiat lavacrum, quo partes convulsæ ante prandium vel totum corpus ter quaterve lavetur & confricetur. Post lotionem & aliàs singulis diebus inungatur cervix & spina dorsii simul & partes affectæ sequenti linimento.

℞. Ol. liliorum alborum,
Lumbricorum terrest. an. $\frac{3}{4}$ s.
Costini, ex strobulis piceæ seu de te-
rebintina an. $\frac{3}{4}$ iiii.

Linimen-
tum.

Ceræ albæ q. s. Fiat linimentum.

Porro in convulsione cui adjuncta est caliditas, sive ea ex repletionem sive ex inanitionem sit oborta vitare studiosè debent tam extra quam intra corpus calefacientia remedia, sed medicamenta sunt usurpanda quæ supra in cephalalgicæ speciei ex calida intemperie ortæ medicatione sunt enumerata.

In

Convulsi-
o ex ina-
nitione &
siccitate
remedia.
Diata.

In spasmō ex inanitione & siccitate gene-
rato, siccitati opposita tum victus ratio tum
remedia adhibenda sunt. Nutriatur itaque
ager cremore ptisanæ, prunis Ungaricis,
pullorum carnibus contusis, jusculis car-
nium pinguium, carnibus agnina & hædi-
na, & piscibus squammatis, veluti sunt lucei,
percæ, & melanuri, potus illi sit aqua hor-
dei in quo parum cinamomi, seminis anisi
& uvarum passarum sunt decocta; vitanda
sunt pharmaca evacuantia. Ubi vero alvus
adstricta fuerit, emolliatur aut enemate
communī aut pulpæ cassiæ recenter evulsæ
3 x. Lavacrum vero convenientissimum
inanitioni & siccitati ex sequentibus con-
ficiatur.

Balneum.

℞. Malvarum,
Althææ,
Violariæ,
Chamæmeli,
Meliloti,
Hordei an. M. iiii.

Rad. Althææ M. ii.
Sem. lini,
Fænu Græci, an. ʒ ii.

Fol. salicis aut betulæ viridium ubi haberi
possunt an. M. iiii. Concoquantur in a-
qua, fiat lavacrum quo lavetur ter quater-
ve ager per septimanam. Post lotionem &
singulis diebus bis cervix & spina dorsi &
partes convulsæ inungantur sequenti un-
guento.

Unguen-
tum pro
spina &
partibus
convulsis.

℞. Ol. violatum, rosarum an. ʒ iiii. Vul-
pini, chamæmelini an. ʒ ii. Ceræ albæ q.
s. quibus admisceatur mucilaginis ex radi-
cibus althææ & semine lini ac fænu Græci
præparati ʒ s.

Ad corroborationem virium utatur se-
quentibus morsulis.

℥. Conf. violarum,
Buglossæ,
Rosarum an. ʒ s.

Carnium canctorum fluviatilium
bene coctorum & minutissimè
concisorum ʒ i.

Specier. diamargaritonis frigidi
ʒ ii.

Pinearum ʒ s.

Magiste-
rium hya-
cintini tan-
quam spe-
cificum
contra spa-
smum
commen-
dat Quæ-
retanus.

Saccari in aqua rosacea soluti lib. s. fiant
l. a. morsuli. Ubi vero convulsio ex crassis
halitibus ac flatibus, qui soboles sunt cru-
ditatis, musculos obstruentibus, & in tu-
morem elevantibus, originem trahit, quæ
ut plurimum musculosas partes suræ, bra-
chiorum & digitorum affligit, & facillè
discussis vaporibus remittit ac cessat; sola
leni confricatione volæ manus ac panno a-
spero ac calido affectarum partium, vel in-
unctione salivæ, aut pauxillo theriacæ,
aut aquæ juniperi, aut illitione olei vel cha-
mæmelini vel anethini, vel lumbricorum,
statim ultrq cessat. Si vero crebrius redeat,
præstat pannum in vino calido madefactum
affectis partibus imponere aut easdem partes
paulo antè præscripta lotione fovere, aut se-
quens cataplasma calidum imponere.

℥. Flo. Chamæmeli, Meliloti,

Anethi,

Furfuris triticei an. M. i. coquan-
tur cum vino sufficienti, fiat cataplasma.

Si vero convulsio oriatur à venenosi ani-
malis morfu, statim theriacæ Andromachi
3 i. s. cum vino generoso exhibenda erit
& venenosa qualitas ex punctura aut per
cucurbitulam aut per podicem gallinæ de-
plumem viventis vulneri applicatum elicien-
da erit, & convulsa pars oleo lumbricorum
calido fovenda.

Huc referenda & est σπασμὸς τῆς κυνικῆς,
id est caninæ convulsionis curatio. Nihil
autem aliud est canina convulsio quam mu-
sculorum faciei, maxillarum, oris & ocu-
lorum à loco nativo detorsio & deformis fi-
guratio, quæ ut plurimum apoplexia & pa-
ralysi correptis accidit. Curatur autem
σπασμὸς κυνικὸς remediis quæ in πνευμά-
τι curantur sunt præscripta. Post humo-
rum itaque vitiosorum præparationem & e-
vacuationem, sequentibus, gargarismate,
pulvere sternutatorio & linimento commo-
dè curari, & muscoli omnes in naturalem
figuram reduci possunt. Gargarismi descri-
ptio hæc est.

℞. Rad. pyrethri ʒ s. Sem. erucæ ʒ v. Gargari-
Decoquantur in lib. i. vini ad medias ac co-
smus.

A a 3 lentur,

Convulsi-
o parti-
cularis,
quæ
dicitur
remedia.
Friccio.

Potus ex
vino.

Catapla-
sma.

Annulos
quoque ex
alcis ungu-
la, vel cor-
nu Buffali

digitis ge-
stator, ner-
vis item a-
liis, parti-
bus affectis
alligatos
spasmo me-
deri expe-
rientia te-
statur.

Convulsi-
o à vene-
nato morfu

remedia.

Spasmi cy-
nici cura-
tio.

lentur, colato juri admisceantur oxymellis scillitici ꝯ i. hieræ pictæ ꝯ s. fiat gargari-
smus, quo jejunos tepido utatur æger.

Sternutatorius pulvis ita conficitur.

*Sternu-
ratorius
pulvis.* R. Pyrethri, euphorbii, majoranæ an.
ꝯ i. Misceantur, fiat pulvis, quo in nares
attracto, excitetur sternutatio.

Linimentum ad spasnum cynicum.

*Linimen-
tum.* R. Ol. costini, elumbricis terrestribus,
de lateribus an. ꝯ ii.
Ol. succini
pl. quoque
juvat si
admiscea-
tur. Ag. stillatiæ juniperi ꝯ s. ceræ paxil-
lum. Fiat linimentum, quo illinatur cervix,
tempora & partes faciei.

*Cucurbitu-
la.* Quin & cucurbitulæ cum scarificatione
cervici applicatæ; & venarum sub lingua
existentium incisione, facillimè hic mor-
bus curari potest. Prodest quoque in ore
continere, aut theriacæ Andromachi, aut
confectionis anacardinæ portiunculam pisi
magnitudine.

7. Tremor artuum quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quibus remediis cu-
randus?

*Tremor
quid.*

Τρόμος, tremor est motus depravatus
præter voluntatem aut caput aut manus aut
pedes concutiens. Fit autem tremor mem-
brorum, quando aliqua pars insita sua
gravitate deorsum labitur, & in eadem
motrix facultas imbecillior facta ipsam libe-
rè erigere aut exporrigere nequit, sed
quantum facultas ipsam in sublime erigit,
tantum suo pondere deorsum fertur. Unde
constat, tremorem nihil aliud esse quam
pugnam locomotivæ potentia cum insita
gravitate membri.

*Causæ tre-
moris va-
riæ.*

CAUSÆ tremoris sunt aut facultatis
motricis in nervis contrahendis inbecillitas,
aut nervorum languor & mollietis, qualis
tremor accidit senibus: aut nervorum ob-
structio à crassis humoribus, aut nervo-
rum refrigeratio, qualis tremor accidit au-
rifabris, ex contrectatione hydrargyri: aut
virium resolutio, qualis fit in diuturnis
morbis: aut timor metusque, qualis est
tremor in præcipitio ambulantium.

Signa.

Signa tremoris manifesta & evidentia sunt.

Causarum autem signa ex relaxatione ægro-
torum & corporis constitutione deprehen-
duntur.

IN CURATIONE tremoris, ut *Curatio.*
& in reliquis morbis, causæ semper primum
sunt auferendæ, quibus sublati cessat &
morbus. Auferuntur autem causæ suis con-
trariis, ut tremor ex helluatione aufertur
temperantia, ex timore animi quiete &
confidentia. Qui autem ortus est ex nervo-
rum obstructione à crassis frigidisque hu-
moribus (qualis solet esse diuturnus & con-
tinuus) curatur extenuatione & evacuatio-
ne humorum peccantium, per medicamen-
ta in paralyseos curatione descripta. Tre-
morem vero manuum ex contrectatione
hydrargyri aut alicujus venenosæ materiae,
qualis plerumque aurifabris & in chymia o-
perantibus accidit, curabimus sequentibus
medicamentis. Primum sumat æger ꝯ i. s.
theriacæ Andromachi cum generoso vino
aut aqua juniperi, & ad sudandum se com-
ponat per spacium unius horæ. Deinde tre-
mulas foveat partes in vasculo convenienti
vapore vini generosi in candentem spumam
ferri aspersi, ac per sudorem proliciat vene-
nositatem nervorum. Tandem colluat mem-
bra frequenter decocto sequentium herba-
rum.

*Tremoris
ex hy-
drargyro
vel vene-
no reme-
dia.*

*Fotus ex
vino.*

R. Serpilli, salviæ, majoranæ, flor.
lavendulæ, rorismarini an. M. i. rad. pyre-
thri, elenii an. ꝯ s. sem. erucæ, cymini an.
ꝯ iii. concisa & contusa coquantur in q. s.
aquæ, fiat lavacrum. Post lotionem vero
ubi partes per se sunt exiccatae, inungantur
partes aut aqua stillaticia, aut oleo ex gra-
nis juniperi destillato, ac deinceps singulis
diebus jejunos hauriat ꝯ i. infusionis lilior.
convallium, quæ supra in curatione aboli-
tæ memoriæ est descripta.

Inunctio.

Ubi tremoris causa frigidus humor ner-
vos obsidens extiterit, utatur æger pil. sceti-
darum ꝯ i. ex qua formentur pillulæ n. 27.
& deglutiantur in aurora. Cervix autem si
manus trement, & spina lumborum, si pe-
des vacillent, oleo costino inungatur sin-
gulis diebus bis.

Pillula.

*Quæ par-
tes in tre-
more in-
ungenda.*

Intra corpus vero assumat æger confe-
ctio-

*Electua-
tio.*

ium con- tionis anacardinae ʒ i. cum aqua juniperi,
ra tremo- aut quintam essentiam vini, in qua macera-
tem. ta est salvia, aut devoret indies sequentis
confectionis quantitate semijuglandis.

Peculiari- ʒ. Confer. betonicae,
er etiam Rorismarini an. ʒ. i.
medetur Zinziberis conditi minutissimè con-
remori ex- cisi ʒ s.

crapula Sp. diamoschi dulcis,
praesertim Diambrae an. ʒ i.
orto oleum Theriacae Andromachi ʒ ii.
ex trifolio Castorei ʒ s.
vulgari
varietate.

Cum syrupo è betonica q. s. & pau-
xillo aquae juniperi. Misceantur, ac fiat
electuarium.

Reliqua remediorum genera ex curatio-
ne περιγλυσιως huc commodè transferri
possunt.

3. Incubus quid, qua ejus causa, qua
signa, & quibus remediis curan-
dus?

Ephialtes ʼΕφιάλης, id est incubus, dicitur ἀπὸ τῆς
quid. ʼΕφιάλης quod premere significat, est gra-
Die vis corporis oppressio nocturna quae semi-
Nacht- suffocatio respirationem & motum impe-
Adaar. diens vocemque intercipiens. Hoc malo la-
borantes, aut ab hoste, aut à terribili spectro,
aut ab aliqua gravi incumbente mole
se premi, ac vehementissimè se exclamare
putant, dum dormiunt.

Causa ve- Causas hujus nocturni & molestissimi
ta incubi. mali ἀσχημιδίας quidem statuunt Medici
frigidos & crassos vapores in principio so-
mni, initia nervorum magis quam decet
in cerebro obstruentes, & potentiam mo-
tricem pectoris, diaphragmatis & pulmo-
num intercipientes: aut humores frigidos
circum praecordia collectos, quibus dia-
phragma turgescit ac pulmo motusque pec-
toris & vox intercipitur. Προκατακτά
vero causa dicitur esse crapula & somnus
statim à cæna inchoatus, dum adhuc orifi-
cium hiat ventriculi.

Vulgi opi- Vulgus incubonem daemonum ludibrium
nio vana, per sagas & vetulas veneficas id perficien-
Rationes tium esse credit, & dum premitur homo,
vulgi, qui- vero causa dicitur esse crapula & somnus
bus auctor statim à cæna inchoatus, dum adhuc orifi-
aliquid cium hiat ventriculi.
tribuere
videtur.
Sed cum
contingat
primo so-
mno, in sa-

persuasum habet, cujus opinio his rationi-
bus nititur. Si incubus ex recitatis physici-
causis oboriretur, tunc seniores ac decrepiti
aequè hoc malo laborarent atque adolescentes
ac pueri: item agrotantibus ex iisdem
causis frequentius quam sanis accideret. Sed
nec senioribus nec adultis mulierculis, nec
infantibus, & raro morbo aliquo laboran-
tibus contingit. Ergo non potest ex iis phy-
siciis causis oriri ephialtes. Historia quo-
que sagarum in hujusmodi facinore sub cul-
mi straminis aut pili forma in pectore in-
cubum parientium deprehensarum & tan-
dem agnitatum, testantur, daemonum lu-
dibrium potius quam malum physicum
esse.

Signa sunt manifesta & ex relatione & Signa.
groti dignosci possunt.

Prasagia significantia ex hoc malo notan-
da veniunt.

Incubone frequentius & diutius vexatis Prognosti-
metuenda est cordis palpitatio, aut epile-
ca.
psia, aut apoplexia. Communia enim hi
morbi habent accidentia.

Curatur hic morbus, quantum ad causas
physicas, temperantia & bona victus
ratione. Quare studiosè vitentur crapula
& ventriculi cruditas. Cæna itaque semper
sit parciore prandio, & inter cænam & so-
mnum tres ad minimum horæ interveniant.
Cubitum iturus æger pro corroboratione
ventriculi & occlusionem orificii ejus devoret
duas rotulas vel diambrae vel diamoschi
dulcis, aut semijuglandis quantitatem diacy-
tonii, aut frustulum cydonii conditi, aut pu-
gillum coriandri saccharo obducti, aut assu-
mat ʒ s. olei vitrioli cum aqua lavendulae
commixti. Inter cubandum vero ut perni-
tiosam occasionem hujus mali, caveat su-
pinum decubitus, sed perpetuo alterutri la-
teri incumbat. Qui consuescere posset ad in-
cubonem decubitus, huic non esset de in-
cubonis insultu nec de apoplexia metuendum.

At ubi incubonem patientis corpus ple-
thoricum fuerit, post alvi per sequens clyste-
ra subductionem, venam incidere, primum
quidem epaticam dextri humeri, si necessitas
vero

pino decubitus, plethora & crapula deditis, à crassa potius vaporibus respirationem intercipientibus naturaliter fieri, quam à sagis excitari statuendum est.

Curatio.

Occlusio orificii ventriculi maxime hic prodest.

Supinus decubitus evitandus.

Vena scabio.

vero urget, & venâ frontis incidere utile erit.

Enema.

℞. Malvæ,
Altheæ,
Mercurialis an. M. s.
Flo. Centaurii minoris,
Absynthii,
Chamæmeli,

Anethi, an. P. i. Concidantur & in q. s. aquæ coquantur ad medias, colentur, colati juris accipe lib. i. in qua dissolve hieræ simp. ℥ i. s. olei chamæmelini ℥ iiii. salis communis ℥ i. fiat enema & infundatur per syringa in rectum intestinum ventriculo adhuc jejuno.

Si vero corpus fuerit *νεμεχυμινον* aliisque vitiosis humoribus oppletum, humor prædominans vitiosus pharmacis concoquentibus & post sufficientem concoctionem evacuandis subducendus erit. Quæ autem pharmaca quos humores concoquant & evacuent, supra in tabellis medicamentorum, & in curatione *κεφαλαλγίας* à singulis humoribus abundè sunt præscripta. Aut in genere uratur patiens ad capitis & ventriculi crudos humores deturbandos singulis mensibus circa plenilunium sequentibus pillulis.

Pillula ad cruditates evacuan-
das.

℞. Mas. pil. de hiera cum agarico, stomachicarum, aurearum an. ℥ i. ex quibus cum aqua lavendulæ formentur pillulæ n. 27. quæ oleo vitrioli inunctæ cum aliquo liquore deglutiantur in aurora sex horis ante prandium.

Corroboretur etiam cerebrum & ventriculus sequenti Eleſtuario.

Eleſtuarium corroborans cerebrum & ventriculum.

℞. Conſer. rorismarini,
Diacydonii cum speciebus an. ℥ i.
Pyrorum muscatellinorum conditorum,
Myrobal. chebulorum conditorum an. ℥ s.

Concidantur minutiffimè, eiſque admisceantur ſpecierum diambrae ℥ i. olei cinamomi gr. iiii. & cum q. s. ſyrup. è betonica, fiat eleſt. de quo ſumat patiens peracta cæna ſemijuglandis quantitatem. Reliqua remediorum genera ex curatione epileſiæ huc commodè transferri poſſunt.

At ſi, ut vulgus opinatur, incubus ſit ludibrium Sathanæ & ſagarum diabolicis conatus, nullum præſtantius remedium eſt, quam vera fiducia in Chriſtum, qui in hoc venit ut deſtruat opera diaboli, & ardens præcatio cum ſobria vita & prono in lecto decubitu.

2. Deſtillatio cerebri quid, quæ ejus cauſa, quæ ſigna, & quæ ratione curanda?

CAPUT reliquis corporis partibus auctore Galeno veluti tectum quoddam calidæ domui eſt impoſitum, quod omnes vapores omniaque fuliginofa excrementa, quæ à ſubjectis partibus ſuſum efferuntur, excipit, ubi frigiditate cerebri tanquam nubes in aëre condenſantur, & tandem ſpirituum calore reſoluta inſtar pluviæ in ſubjectas partes deſtillant ac deſcunt; quod malum Græci vocant *καταιρρις*, id eſt deſluxionem ſive deſtillationem.

Tres autem ſunt catarrhi ſpecies.

I. Cum cerebri excrementa in os & fauces deſcunt, tum generalem nomenclaturam retinet & catarrhus nominatur. *Catarrhi differentiæ.*

II. Ubi vero in nares incumbunt *ῥέγουρα* id eſt grævo nominatur, *der Schnupfen.*

III. Si autem in guttur & aſperam arteriam illabatur *βρόγχος* i. e. rauco dicitur.

Porro deſtillatio excrementorum cerebri eſt quam plurimorum morborum cauſa & genitrix. Si enim in oculos incumbat *ὀφθαλμίας* ſi in aures, tinnitus & auditus læſionem; ſi in maxillas, dentium dolores; ſi in cervicem aut ſcapulas aut brachia deſcunt in iſdem partibus dolores excitat: Si ad gurgulionem, uvulæ elongationem; ſi in articulos *ἄρθρα* ſi in latera *πλευρά* ſi in manus *χειρά* ſi in pedes *πόδια* ſi in ſpinæ medullam *πυέλας* ſi ad nervorum origines, tremorem, apoplexiam & epileſiam; ſi in pulmones, peripneumoniam, tuſſim, aſthma & phthiſin; ſi in ventriculum, cruditatem & nauſeam appetitusque proſtrationem; ſi in inteſtina colicos dolores & alvi profluvia; ſi in jecur aut lienem deſcunt, obſtructiones, tumores, putrefactiones, febres, ictericam, hy-

Mala ex catarrhe.

hydropem & alia infinita morborum genera excitat.

Catarrhi
causa.
Interna.

CAUSÆ catarrhi seu destillationis cerebri *αἰσθητικῆς* quidem, id est internæ sunt aut intemperies frigida & humida, aut calida & humida cerebri; aut crassæ evaporationes ex ventriculo reliquisque visceribus ad cerebrum elevatæ. *Προστατικές* vero sive externæ causæ, quæ excrementa cerebri aut multiplicant, aut exprimunt, aut resolvunt & ea ad defluxionem excitant, sunt æris nimia intemperies frigida, & æris repentina ex calido in frigidum vel contramutatio, venti austrini & aquilonarii, vini meracioris immoderatus usus, repentina capitis refrigeratio à sudore in balneo vel æstuario, calor solaris caput feriens, pedum refrigeratio, fœtor inusitatus, somnus diurnus, intempestivæ vigilæ & lucubrationes nocturnæ.

Signa sin-
gularum
catarrhi
specierum.

SIGNA catarrhi cujuslibet speciei evidèntia sunt. Utrum vero cerebrum frigidum, calidum aut humidum excremento redundet, utrumve tenuè vel crassum existat excrementum, partim ex signis supra in cephalalgia speciebus enumeratis, partim excrementi in os naresque defluentis qualitate deprehendere licet. In specie vero in catarrho, humore tenui ad fauces & os decumbente, æger continuè salivam tenuem expuere cogitur. In *αἰσθητικῆς* aut obstruuntur foramina ossis *ῥινοειδούς*, aut humor tenuis & crudus instar aquæ per nares destillat: in *βρογχικῆς* sive raucedine adest gutturis asperitas & raucedo vocis, sæpius etiam tussis.

Curatio.

CURATIO catarrhi pro causarum varietate, pro humoris vitiosi qualitate, & pro membri fluentem humorem excipientis natura, varianda erit.

Perficitur autem curatio catarrhi tribus potissimum instrumentis, victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum convenientium artificiosa usurpatione.

Dietæ.

Victus ratio in universum talis observari debet: aër in quo æger versatur, debet esse temperatus: cibo ac potione utatur tenui ac moderata, quales sunt cremor pi-

sanæ, juscula caponum aliæque sorbitiones, pruna Ungarica, lac amygdalinum & quæ sua qualitate defluenti humori semper sunt contraria. Pituitosus enim humor paulo calidiora, biliosus verò frigidiora alimenta expostulat. A vino prorsus arcendus est æger. Potus autem illi sit, si de caliditate capitis conqueratur, aqua hordei, in qua parum glycyrrhizæ, seminum anisi & cinamomi sit incoctum. Cum vero & caput & universum corpus est refrigeratum, defluensque humor sit pituita cruda, uti poterit in potu hydromelle, studiosè autem vitet æger durante catarrho balnea & Venæ sectionem: item omnia salsa, acida & actria: item vitandi sunt & venti austrini & aquilonarii, somnus diurnus, intempestivæ lucubrationes, & alvi suppressio, quæ si contingat, vel glandibus medicatoriis, vel prunorum esu, vel leniori clystere alvus ad egerendum est irritanda.

Vinum na-
xum ca-
tarrhosi.

Balnea &
Venæ evi-
tanda.

Venæ sectionem in catarrho non nisi in Venæ sectione calidis & biliosis defluxionibus ubi febricula metuitur, & in plethoricis corporibus utendum erit. Est autem secanda vena mediana aut hepatica dextri lateris, aut si destillatio in fauces incumbat venæ sub lingua comparentes. Non autem vena est secanda antequam alvus sequenti enemate est subducta & inanita.

Venæ sectio
quando
conveniat.

R. Flo. Chamæmeli,
Anethi,
Maluæ,
Mercurialis,
Serpilli,

Enema.

Violariæ an. M. s. Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati juris accipe ꝑ xv. Quibus admisce hieræ simplicis Galeni ꝑ i. s. Olei chamæmelini ꝑ iiii. Salis communis ꝑ i. Miscantur, ac tepida instar lactis recens mulcti recto intestino per syringa infundantur.

Reliqua medicamentorum cum præparantium tum expurgantium defluentes humores, genera, pro humoris fluentis natura variari debent, quorum copiam ex cephalalgia speciebus curandis huc transfer.

Bb

Cum

*Cerebrum
corrobo-
randum.*

Cum autem fons & origo omnis destillationis sit ipsum cerebrum, omnium primo capitis est habenda ratio. Cerebro itaque calidiusculo existente, indeque resolutis humoribus orto catarrho, synciput & tempora frequenter inungi debent sequenti linimento.

*Liniment.
refrigera-
ns.*

R. Ol. Rosacei,
Nymphaeae an. \mathfrak{z} i.

Aq. rosaceae \mathfrak{z} s. Aceti rosacei \mathfrak{z} ii.

Quae simul commisceantur ac conquassentur, & inungatur eo caput, aut linieolis temporibus applicetur.

*Lotio pe-
dum.*

Quin & pedes vespertino tempore ablui ac foveri debent in calido lavacro in quo concocta sunt flores chamæmeli, anethi, fol. salicis, betonica herba & capita papaverum. Post lotionem vero plantarum pedum asperius confricandæ sunt sale & aceto simul mixtis, & plantarum calido asseri querno applicandæ. Mirificè enim ea ratione fluentes ex cerebro humores deorsum eveluntur.

*Potio pra-
parans hu-
mores cali-
dos.*

Calida porro excrementa cerebri defluentia sequenti potione preparari commodè possunt.

R. Glycirhyzae \mathfrak{z} i. jujubarum, sebesten an. \mathfrak{z} s. quatuor seminum frigidorum majorum an. \mathfrak{z} i. capillorum Veneris M. i. florum communium an. M. s. confusa & concisa cum ii ii. lib. aquae coquantur in cantharo obturato & in aeno aqua pleno collocato ad sesquihoram; deinde colentur, colaturae admisceantur syr. violarum, de glycirhyza, de cichorea an. \mathfrak{z} i. fiat potio, de qua ebibat æger mane & tribus horis ante cenam \mathfrak{z} iiii. calefactas. Exhausta potione evacuentur calida excrementa sequenti infusione:

*Hauftus
cholago-
gus.*

R. Rhabbarbari electi & parum confusi
 \mathfrak{z} i. s.

Thamarindorum minutim concisorum \mathfrak{z} s.

Misceantur, & in aqua cicoreae \mathfrak{z} vi. per noctem macerentur, tandem ebulliant leniter, & fortiter expressa colentur, colato jusculo admisceantur aut pulpæ cassiæ recte evulsæ \mathfrak{z} i. aut syr. rosati solutivi \mathfrak{z} ii.

Fiat haustus, qui tepidus ebibatur sex horis ante prandium.

Postquam excrementa resoluta cerebri hac ratione sunt evacuata, utatur æger ad cohibitionem tenuium humorum sequenti electuario.

\mathfrak{z} Bol. armeniæ in aq. rosacea eloti ac preparati \mathfrak{z} ii.

Amyli candidissimi \mathfrak{z} i.

Tragacanti,

Gummi Arabici,

Sem. papaveris albi an. \mathfrak{z} s. Diligenter omnibus pulverisatis commisceantur confer. rosaceae \mathfrak{z} ii. & cum syr. de papavere q. s. Fiat electuarium lambile, de quo frequenter sensum deglutiat æger semijuglandis quantitate. Commodè quoque hujus electuarii loco uti poterit æger rotulis diatragacanti frigidi aut diapapaveris.

Ubi vero fervens destillatio fauces exulceraverit, utatur frequenter elect. diacodii, & conservæ rosaceae an. \mathfrak{z} ii. quæ simul misceantur & ejus nucis avellanæ quantitas in ore resoluti deglutiat. Ulceratæ vero faucium partes inungantur mucagine ex seminibus cytoniorum parum confusis & aqua rosacea confecta.

At vero ubi defluens humor frigidior est, & excrementa cerebri pituitosa, cerebrumque ipsum refrigeratum, in hujusmodi catarrhi curatione primum pituitosi humores è toto corpore sequenti enemate sunt exturbandi.

\mathfrak{z} Maluæ,

Mercurialis,

Betæ,

Majoranæ,

Origani an. M. s.

Flor. Chamæmeli,

Meliloti,

Anethi an. P. i.

Rorismatini P. ii.

Sem. carvi \mathfrak{z} s. Concisa & confusa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati juris accipi \mathfrak{z} xii. quibus admisce hieræ simpl. \mathfrak{z} i. benedictæ laxativæ \mathfrak{z} s. olei communis \mathfrak{z} iiii. salis communis \mathfrak{z} i. fiat enema,

*Eclegma
ad sisten-
dum ca-
tarrhum
tenuum.*

*Lauda-
num opi-
um, si e-
jus unum
atque alte-
rum gra-
num exhi-
beatur, ad
miracu-
lum usque
catharrum
sistit.*

*Actioris
catarrhi
remedia.*

*Remedia
catarrhi
frigidi.*

Enema.

enema, infundatur tepidum jejuno existente ventriculo.

Digestivum. Tandem extenuentur & ad educationem præparentur excrementa cerebri, sequenti potione.

℥. Rad. Glycyrrhizæ,
Angelicæ,
Asparagi,
Graminum,
Feniculi, an. ʒ s.

Herb. Betonicæ,
Melissæ,
Hyslopi,
Rorismarini,
Adianthi an. M. s.

Flor. Stachados Arabicæ,
Centaurii minoris an. P. 11.

Sem. carvi ʒ 11. Cinamomi ʒ 1. Zinziberis albi ʒ s. Concisa & contusa decoquantur cum hydromellis lib. 1111. in cantaro probè oblitato, & in ahenò collocato ad duas horas, quæ ubi refrixere, colentur, colato juri admisceantur syr. è stachade, de betonica, de hyslopo an. ʒ 11. Fiat potio, de qua hauriat æger diluculo & tribus horis ante cenam ʒ v. calefactas. Exhausta hac potione, purgentur excrementa sequentibus aut pillulis aut haustu cathartico.

Evacuantiaphlogomagoga.

Pillula.

℥. Mas. pil. cochiarum, de agarico an. ʒ s. Conformentur ex his cum melle rosaceo pillulæ n. 27. & deglutiantur cum aliquo liquore in aurora: Aut

Hauftus.

℥. Diaphæniconis ʒ vi. Diacatholici ʒ s. Dissolvantur cum aquis stillatitiis, betonicæ & Hyslopi an. ʒ 11. Fiat haustus, quem tepidum ebibat æger in aurora sex horis ante prandium. Altero die à purgatione corroboretur cerebrum sequenti haustu diaphoretico.

Diaphoreticum.

℥. Theriacæ Andromachi, confer. rorismarini, an ʒ 11. Dissolvantur cum ʒ 11. Aquæ juniperi, fiat haustus & assumatur jejuno ventriculo.

Particulari cerebri evacuatio per nares. Porro ad particularem cerebri purgationem sequentibus remediis feliciter utimur, ac primum per nares sequenti eribino.

℥. Succ. radicum betæ rubæ, succi Errhinon. majoranæ an. ʒ s.

Mellis virginei ʒ 1. Misceantur & calefiant ac tepida per calamum pennaceum in nares per triduum quotidie mane attrahantur.

Idem præstat & radix gentianæ in crassitudine calami adformata, & naribus altius inserta, in eisque paulo diutius retenta. His valentius attrahit pituitam pauxillum fellis taurini tepidum naribus attractum: & his quidem potissimum in coryza utendum erit.

Radix gentianæ pituitam è cerebro eliciens.

Per palatum vero ac fauces catarrhi materiam commode detrahimus sequenti vel pulvere masticatorio vel gargarismate.

℞. Mastiches ʒ s. Rad. pyrethri ʒ 11. Apophlegmatismi. cubearum, carvi an. ʒ 11. Sem. staphidigræ ʒ 1. Concidentur crassiusculè ac commisceantur: Hujus pulveris P. 1. jejunos Pulv. masticet in ore æger naribus obstructis, subinde pituitam in os defluentem expuendo.

Aut

℞. Hyslopi,
Salviæ,
Rosarum an. M. s.
Passularum ʒ 1.
Cubearum ʒ 11.
Rad. pyrethri,

Gargarismus.

Sem. Eruæ an. ʒ s. Contusa coquantur in aquæ & aceti an. lib. 1. ad medias, deinde colentur, colato jusculo admisceantur mellis rosacei ʒ 11. Fiat gargarismus, quo utatur æger jejunos tepido, singulis vicibus ter quaterque gargarizando.

Porro qui natura fluidum habent cerebrum, & crebrius catarrhi speciebus instantur, ii singulis septimanis sequentibus pillulis salubriter uti possunt.

Præservatio à catarrho.

℞. Mas. pil. de hiera simpl. assajereth. Pillula. usualer. an. ʒ 11. agarici trochiscati ʒ s. Ex quibus simul cum melle rosaceo contusis formentur pillulæ ex singulis drachmis 27. de quibus totidem deglutiantur tribus horis à cenâ.

De pillulis sumendis hoc loco obiter observandum est, pillulas quæ vehementius purgant, quales sunt, quibus vel tar-

NB.

Quo tempore pillula assu-

bith vel scammonia, vel colocynthis vel troscifi alhandali sunt admixti, deglutientas esse circa mediam noctem, aut in auro: Mitiores vero, quales sunt pil. de hiera, alephangina, pestilentialia & similes assumendas esse tribus horis à cæna.

Corroborantia & exsiccantia cerebri.

Exsiccent quoque humiditates cerebri, cerebrumque ipsum mirificè corroborant, si quis mane aut vesperi duas aut tres rotulas diamoschi, diambra, aut semijuglandis quantitatem conservæ rorismarini, aut semidrachmam theriacis Andromachi manè assumat, aut si quis utatur sequentibus mortulis mane ac vesperi.

Mortuli à catarrho preservantes.

℞. Diamoschi dulcis,
Diambra an. ʒ s.
Dianthos ʒ i.
Pul. cinamomi electi,
Cubebæ,
Macis an. ʒ ii.
Sacchari albi cum aqua juniperi soluti ʒ iiii.

Quibus commixtis admisceantur olei anisi ʒ s. Olei cinamomi gr. ii. fiant mortuli. Suffragia quoque multum faciunt ad exsiccandum cerebrum, ex succino, mastice, thure, sandaraca & similibus.

SECTIO IV.

DE AFFECTIBUS CAPILLORUM ET TEGUMENTORUM CEREBRI.

I. Qui sunt morbi capitis, capillos, cutem, & subcutaneas partes infestantes?

Capillorum, cutis capitis & subcutaneorum partium morbi sunt.

- I. Ἀλωπεκία & ὀφίασις.
- II. Capillorum luxuries.
- III. Capillorum erosio.
- IV. Porrigo vel furfures.
- V. Achores seu scabies capitis.
- VI. Phthiriasis seu pediculatio.
- VII. Vulnus capitis.
- VIII. Cranei fractura.

2. Alopecia quid, qua causa, qua signa, & quibus remediis curanda?

Ἀλωπεκία id est vulpina capillorum denudatio & ὀφίασις id est nuditas pilorum serpentiformis, congenere sunt morbi, ac pilorum symptomata, quando videlicet capilli decidunt, cutemque nudam relinquunt: Quo morbo cum singulis annis vulpeculæ laborent, inde nomen hoc symptomata acquisivit. Ἀλωπεκία enim vulpem significat. A quo malo ὀφίασις non nisi forma differt, quando videlicet in una aliqua parte tantum pilorum denudatio instar serpentis in gyrum extenditur.

Alopecia quid.

Ophiasis quid.

Causa ἀλογημένη & alopeciae & ophiasis eadem est, humorum videlicet, ex quibus pili nutrirī debeant, corruptio ac putrefactio, quorum vitio pori cutis laxantur & radices pilorum simul corrumpuntur.

Causa.

Προκίττειται vero causæ sunt vel venenosæ qualitatē remedia pilosque corrumpentia, quæ Græcis ψιλάρα dicuntur, capiti illita, aut sordes tenaces capiti illapsæ, veluti sunt liquores succidiarum.

Signa quibus ab alopecia ophiasis inter nosci debeat, manifesta sunt & ex definitione patent. Signa vero corrupti humoris in subcutaneis partibus à colore cutisprehenduntur. Albidior enim cutis capitis, pituitæ sordidæ corruptionem, niger melancholici humoris, fulvus vel citrinus color flavæ bilis putrefactionem, causam defluvi capillorum ostendit.

Signa.

Alopecia vero differt à calvitie. Alopecia enim à vitiosis & corruptis humoribus oboritur. Calvitie autem naturalis est & provenit ex penuria humorum pilos nutriendum.

Differentia inter alopeciam & calvitiam.

Raro tentantur homines alopecia in hisce locis septentrionalibus nisi qui vel lepra vel Gallico morbo sunt infecti. Quibus à morbo Gallico decidunt pili, iis primum defluunt pili superciliorum & barbæ & tandem capitis. Lepra vero non tantum ex defluvio capillorum, sed ex aliis signis digno-

Signa defluvi capilli ex morbo Gallico.

Ex lepra.

diagnoscenda est, de quibus suo loco dicturi sumus.

uratio. Curatur alopecia ex vitiosis humoribus, Gallicoque morbo orta, victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum applicatione.

Diata. Victus ratio semper debet esse contraria corrupto humori, aut humore frigido existente, veluti est pituitosus & melancholicus humor, utatur calida; calidis existentibus, veluti sunt bilis & serosus sanguis, frigida victus ratione. In universum autem vescatur cibus ac potionibus, purum ac laudabilem sanguinem generantibus.

Quæ vena incidenda. Venæ, si sanguinis ferosi vel aliorum vitiosorum humorum copia redundant, secandæ sunt, primum cephalica, postea & venam frontis vel temporum incidere non erit alienum, quin & cucurbitulas cum scarificatione occipitio applicare utilissimum erit. Item cutem capitis sæpe & multis in locis scalpello pungere, & sanguinem corruptum exprimere, locumque ut dolor mitigetur adipe asnerino inungere commodissimum est.

Medicamenta. Medicamenta corruptos humores præparantia & evacuantia, pro humorum vitiosorum diversitate varianda sunt, quorum medicamentorum copia ex præscriptis affectionum capitis generibus seu cephalalgia speciebus curandis petenda & huc transferenda erunt.

Capillorum vero defluvium, ex mixtorum humorum corruptione, quam *trichotomia* vocant, aut ex morbo Gallico exorto, sequenti simul præparante & evacuantepotione iterum atque iterum utendum erit.

Potio præparans & evacuans. R. Rad. Oxylapathi, Elenii, Glycyrrhizæ, Cichoreæ an. ʒ s.

Herb. Fumarizæ, Veronicæ, Brassicæ marinæ, Capillorum Veneris, Scordii, Centaurii minoris,

Betonicæ,

Abrotaniani. M. s.

Rad. Polypodii quercini ʒ i.

Sem. Anisi,

Feniculi an. ʒ iiii.

Fol. senæ Alexandrinæ ʒ i.

Rhabbarbari ʒ s.

Ramentorum ligni guajaci ʒ i.

Prunorum Ungaricorum n. xv. Passularum minorum ʒ i. Cinamomi ʒ iiii. Concisa & contusa decoquantur cum lib. vi. feri lactis caprini in cantharo vel duplici vase, uti supra docuimus, ad horas ii. Deinde colentur, colato juri admisceantur syr. rosarum, fumarizæ, betonicæ an. ʒ iiii. fiat potio, de qua ebibat æger diluculo & tribus horis ante cenam ʒ iiii. calefactas.

Exhausta hac potione interpositisque sex septemve diebus rursus evacuentur putridi humores sequentibus pillulis.

R. Mas. pil. aurearum, aggregatarum, Pillule putridos humores evacuant.

Diagridii gr. ii. Formentur pillulæ, cum melle rosaceo n. 27. quæ deglutiantur circa medium noctis.

Præscripta potio & pillulæ, si contumacius est malum, bis terve reiterari possunt, interposito tamen mensis spacio. His addenda est & particularis evacuatio capitis per pastillos manfiles, sive apophlegmatismos, qui ita conficiendi sunt.

R. Piperis oblongi,

Nucis moscatæ an. ʒ s.

Sem. Staphisagrizæ,

Rad. Pyrethri ad. ʒ ii.

Cinamomi ʒ i.

Cubebæ ʒ s.

Mastiches ʒ i. Trita omnia commisceantur & cum q. s. mellis rosacei formentur pastilli, quorum unus & alter, matutino tempore jejuno adhuc ventriculo in ore commasticetur per quadrantem horæ, aut detrahantur serosa pituitosæque excrementa capitis gargarismate paulo ante in curatione catarrhi descripto.

Gargarismus.

Interim nec topica sive localia remedia negligenda erunt. Post universalem itaque & particularem evacuationem corruptorum

Topica.

Bb 3 rum

rum humorum lavetur frequenter caput sequenti lixivio.

Lixivium pro ablutione capitis.

℞. Rad. Pæoniæ,
Serpentariæ,
Calami aromat. vulgaris an. ʒ ii.
Marrubii,
Abrotani,
Verbenæ an. M. ii.
Capillorum Veneris,
Polytrichi an. M. i.
Lupinorum & fabarum integrarum an. ʒ i.

Linimentum ad generandos capillos.

Fol. Rorismarini M. ii. Contusa & concisa decoquantur in lixivio ex cineribus marrubii & abrotani confecto, quo jejuno ventriculo lavetur caput, pilorum reliquiis prius novacula abradis. Capite post lotionem probè siccato, inungatur oleo laurino in quo abrotani herba viridis & contusa est decocta, & cui cinis muscarum aut vesparum est admixtus: vel inungatur caput pinguedine ursi, aut sequenti unguento.

Vnguentum aliud.

℞. Pinguedinis ursi, olei laurini, olei nucum juglandium, aut ejus loco olei amygdalarum amararum an. ʒ s. olei è granis juniperi ʒ s. mellis virginei ʒ iii. Misceantur, eisque admisceantur pul. nucum avelanarum ustarum, abrotani adusti an. ʒ i. Cineris pilorum hominis ʒ s. ladani ʒ i. s. Misceantur, fiat unguentum.

In pituitosa materia qua convalescunt.

Si lenta & crassa pituita hæret in subjectis partibus cutis capitis, quod ex candore cutis dignoscitur, sequenti linimento caput est inungendum.

℞. Ol. laurini,
De euphorbio an. ʒ s.
Ex granis juniperi ʒ i.
Pul. Euphorbii,
Myrrhæ an. ʒ i.
Ladani,
Cineris abrotani an. ʒ s.
Mellis virginei ʒ ii.

In morbo Gallico.

Fiat linimentum. Si ex morbo Gallico defluunt pili, præstat præscriptis unguentis admiscere argenti vivi in saliva hominis juni extincti ʒ s.

Aqua molli.

In omni autem capillorum defluvio glabrum locum frequenter illinire prodest aqua

ex melle chymica arte destillata. Similiter pilos succrescere facit pilorum contritorum in pulveremque redactorum farina cum melle virgineo instar linimenti temperata, & loco glabro inuncta.

Farina pilorum.

3. Capillorum Luxuries quid, quibus ex causis provenit, & quibus remediis auferenda est?

Decens capillorum, & in capite, & in Gal. l. i. r. de usu
genis, & in superciliis, moderatusque pro- part. c. 14.
ventus datus est hominibus à natura, non
tantum utilitatis, sed & ornamenti causa. *Pilorum luxuries qua propriè curanda.*
Verum ubi vel in sexu non convenienti, vel in loco pilis à natum minimè destinato, suffructant pili, ut barba in mulierculis, & crinium luxuries in virginum frontibus, non levem inferunt deformitatem, præterquam quod nullus sit usus eorum.

Proveniunt autem pili cum capitis tum a- Generatio
liarum partium, Galeno lib. 2. cap. 10. & pilorum.
ii. de temperamentis teste, ex crassioribus fuliginosisque humorum vaporibus per angustia cutis spiracula prodeuntibus, qui propulsi primum impacti poris inhaerent, in transitu vero alii rursus è profundo sublatis, priores feriunt & impellunt, tum hos rursus alii, qui subinde conjuncti ex pororum angustia corpus pilorum consequuntur.

Medicamenta pilos è locis non convenientibus extirpantia comprobata unum atque alterum subjungemus.

Pilothra.

℞. Calcis vivæ ʒ ii. Extinguantur in a- Primum.
cerrimo lixivio q. s. Hujus lixivii colati ℞. ʒ xv. Cui admisce pul. alterius calcis vivæ, auripigmenti, arsenici an. ʒ s. Ebulliant simul quousque penna intincta plumas suas amittat, fiat linimentum, quod in balneo, Modus u-
ubi pori prius per lotionem aquæ calidæ fuerant dilatati, loco depilando inungatur, surpandi.
& post quadrantem horæ, aut paulo longiori spacio, ubi pili in universonum radicatus sunt extirpati, rursus abluatur locus, inungaturque oleo rosaceo.

Aliud linimentum.

℞. Albumina ovorum recentium con- Secun-
quassata n. ii. dum.

Calcis

*Chymici
horum lo-
co utantur
sublimato
vel ol.
auripi-
gmenti.*

Calcis vivæ ꝯ iii. auripigmenti ꝯ i.
Conterenda conterantur & commisceantur,
quibus adde tantum lixivii acris, ut pulvis
crassioris formam recipiat, fiatque un-
guentum, quo partes pilosæ optimè lotæ
cum aqua calida, penna aliqua inungantur,
& post quadrantem horæ rursus eluatur
unguentum aqua calida, & statim pili deci-
dent. Quod si vero reliquæ adhuc hæreant,
rursus locus inungi potest ac post ablutionem
oleo rosaceo aut violaceo inungatur
locus depilatus. Et quamquam difficulter
prohiberi potest, ne pili eradicati renas-
cantur, cum ex ipsis mortuorum calvis in
aëre collocatis, donec humidum inest ra-
dicale, pili protrudantur: tamen si præscri-
ptis remediis luna deficiente utamur, ac
postea sequenti unguento locum depilatum
frequenter inungamus, aut nunquam aut
certè tardius renascuntur pili.

*Remedia
prohiben-
tia ne pili
renascan-
tur.*

*Unguen-
tum locum
glabrum
servans.*

R. Ossium olivarum combustorum,
corticum fabarum siccarum,
Sem. hyoscyami, lithargyri, ossis se-
piæ *Fischbein* sæpius combusti,
Opii an. ꝯ i.

Auripigmenti ꝯ i. Redigantur in pul-
verem omnia, quibus adfundatur olei ro-
sacei tantum ut 4. digitos emineat, deinde
coquantur simul, subinde commiscendo per
horam integram: quod ubi refrigit, coletur
oleum, eique addantur succi chelidonis
ꝯ iii. quod unguentum per aliquod noctes
exceptum panno, loco depilato applica-
bis.

4. *Capillorum Erosio quid, qua ejus causa,
& quibus remediis curanda?*

*Erosio pi-
lorum.* Eroduntur ac deformantur pili cum ca-
pitis tum barbæ à tineis, non secus ac pan-
ni & vestimenta, & deformitatem infe-
runt.

Causa.

Causæ erosionis pilorum sunt unctuosæ
sordes pilis isthærentes.

Curatio perficitur crebra lotionem cum a-
cri lixivio, in quo decoctæ sunt sequentes
herbæ.

*Lixivium
pro erosio-
ne pilorum*

R. Rad. Oxylapati,
Flo. Absinthii,
Chamamelis an. M. i.

Sem. Colocynthidos, ꝯ ii. à tineis.
Fenu Græci ꝯ s.

Contusa & concisa in lineoque sacculo
confuta decoquantur in lixivio aut confric-
centur pili frequenter pulpa colocynthidos.
Ita enim decidunt & extinguuntur tineæ ac
vermiculi.

Hic non incommode inferi possunt phar-
maca quæ crassos rigidosque pilos exte-
nuant mollesque reddunt, quæ omnia de-
bent esse exterioris facultatis, veluti sunt
sequentia.

R. Fabarum, Lixi-
Hordei, vium.
Erui, *Wicken* an. ꝯ i.

Rad. hellebori nigri, bryonis, ari-
stolochiæ rotundæ an. ꝯ i. Contusa deco-
quantur in lixivio, quo crebro crassi pili
abluantur, ac tandem sequenti linimento
inungatur ac confricentur.

ꝯ. Nitriusti, pumicisusti, calcis te-
starum ostracearum marinarum an. ꝯ i. of-
fis sepiæ ꝯ s. Ol. ex granis juniperi ꝯ i. Aq.
lavendulæ q. s. Fiat linimentum, quod ubi
exiccatur duriusculum redditur, rursus
recenti aqua lavendulæ humectetur & in li-
nimenti formam redigatur.

Reliqua remediorum cosmeticorum ge-
nera, quibus capillis flavum, aureum, a-
liosque colores inducere possumus, quorum
hoc loco mentio erat facienda, ex aliis Me-
dicorum monumentis, potissimum autem
ex Alexii Pedemontani secretorum com-
mentariis, & Johannis Baptistæ Portæ ma-
gia naturali ac antidotario speciali Weckeri
petenda erunt.

5. *Porrigo seu furfures quid, qua ejus
causa, & quibus remediis curanda?*

Porrigo seu furfures quibus-
dam, caput scalpentibus furfuribus similes quid.
squamulæ ex capitis cute sine ulla exulcera-
tione decidunt, quas furfures vocant.

Causæ porriginis sunt vitiosi ac ferosi hu-
mores ex nitrolo pituita, bileque flava ad-
usta, sub cute cranei collecti.

Curatur hoc symptoma bona victus ra-
tione & medicamentorum sequentium u-
surpatione.

Victus

Vitius ratio ex curatione capitis dolorum à vitiosis humoribus ortorum, huc referenda erit.

Humorum quoque vitiosorum (quorum species ex colore cutis capitis dignosci possunt: albus enim pituitæ, flavus vero flavæ bilis vitiosæ copiam ostendit) remedia tum concoquentia tum evacuantia ex curatione cephalalgæ huc accommodari possunt. Humoribus autem vitiosis purgatis sequentibus topicis remediis commode uti possumus.

*Lixivium
ad porrigi-
nem.*

℥. Chelidonie viridis cum radicibus M. ii.

Rad. althææ M. i. baccarum lauri, lupinorum an. 3 s.

Contusa & concisa coquantur in lixivio acerrimo & percolentur, quo caput crebro lavetur. Post lotionem vero cutisque exicationem confricetur capitis cutis amygdalis amaris cum pauxillo aceti contusis, aut sequenti linimento inungatur.

*Linimen-
tum.*

℥. Sem. staphidis agriæ coriandri præparati an. 3 i.

Vitrioli Romani,

Sulphuris vivi an. 3 i.

Helleb. nigri 3 s.

Lithargyri 3 i. omnibus pulveratis cum 3 i. s. olei rosacei commisceantur, fiat linimentum. (Potest etiam curari sola chelidonia decocta in lixivio.)

6. *Achores seu ulcera scabiesque cutis capitis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

*Achores
quid.*

Ἀχὼρες Latinis ulcera capitis madida, sunt scabies seu exigua tubercula in capitis cute excitata, sub quibus humor acris & erodens continetur, qui ad scalpendum pruriendumque caput excitat, cutemque tenuissimis foraminibus post pruritum perforat & erodit, eamque humore lento complet.

Causa.

Causa hujusmodi exulcerationis est vitiosus, tenuis & erodens humor, lentorem exiguum in se continens, qui ut plurimum ex falsa nitroque pituita & bile flava commixtis & sub cute capitis coacervatis

originem ducit, suæque acrimonia ad scalpendum hominem impellit, ex cujus pruritu foramina exilia cuti insert, glutinosa humiditate repleta.

Signa vitiosi humoris speciem indicantia sunt: Humor manans è foraminibus nimium tenuis bilem flavam, paulo autem glutinosior sanieique similis pituitam vitiosam, & in toto corpore & in subcutaneis partibus ostendit.

Curatur hoc malum vitius ratione & Curatione medicamentorum administratione.

In vitius ratione vitanda sunt onania acria, salsa & nimium excalescentia, omnia denique esculenta & potulenta glutinosum sanguinem generantia.

Curandi ratio ab humoris vitiosi cum ex toto corpore, tum maxime ex capite evacuatione auspicanda erit. Medicamentorum vero copiam, quæ hæc præstare possunt, curationes cephalalgæ superius annotatæ suppediant, inter quæ præstantissimæ sunt subsequentes pillulæ.

℥. Mas. pil. aurearum, cochiarum, aggregatarum an. 3 i. Ex quibus contusis formentur pil. 27. quæ deglutiantur cum aliquo liquore circa mediam noctem, deinde adhibeatur & purgatio particularis cerebri, quam commode efficiet gargarismus ex pyrethro & seminibus erucæ confectus, smus.

cujus descriptionem aliquoties in superioribus tradidimus. Tandem topica remedia capiti sunt applicanda, inter quæ primum obtinet locum sequens lotio sive lixivium.

℥. Fol. Rubi,
Plantaginis,
Polygoni,
Salicis an. M. i.

Rad. Bryoniæ,
Tormentillæ an. 3 i.

Baccarum lauri,
Myrtillorum,
Lupinorum an. 3 s.

Concisa & contusa coquantur in q. s. lixivii, quo caput subinde lavetur & desiccatur sequenti inungatur linimento.

℞. Pul. Fol. salicis 3 i.

Pompholigis, nihil albi vocati,

Lithar-

*Lixivium
pro lotionem
capitis.*

*Linimen-
tum.*

Lithargyrii, lapidis calaminaris an. 3 s.
Oxymellis simpl. 3 i. Misceantur, fiat
linimentum. Aut si validius desideratur me-
dicamen, ad ἀχῶρες,

*Aliud va-
lidius.* 2℥. Fæcis vini adustæ, calcis vivæ, vitrio-
li an. p. æ. quæ minutissimè contrita, aceto
commisceantur instar linimenti. Præsen-
tissimum quoque remedium ad sanandos
ἀχῶρες est oleum vitrioli ulceribus illitum :
aut

2℥. Fæcis vini adustæ & in calcem reda-
ctæ, arsenici an. 3. i.

Sulphuris vivi 3 ii. hydrargyri in sa-
liva jejuni hominis mortificati 3 i. s. olei
laurini 3 i. Fiat unguentum, quo illinatur
scabies. Galenus lib. i. πέντες scribit se se-
quenti linimento paratu facili ἀχῶρες cu-
rasse.

*Galenus ex-
perimen-
tum.* 2℥. Cineris charularum luforiarum 3 ii.
diluantur cum aceto acerrimo & in formam
linimenti redigantur, quo caput frequen-
ter inungatur. Tenuioris fortunæ homines
ἀχῶρες & scabiem fortis solorum pifo-
rum & mellis æ. p. jejuno ore commastica-
tis & ulceribus capitis inunctis facili-
mè curare possunt.

Si achoribus vel ex inunctione vel alias
inflammatio accidat, caput oleo rosaceo aut
linimento ex pompholyge & aqua rosacea
confecto, inungendum erit.

7. *Pediculatio quid, qua ejus causa,
& quibus remediis cu-
randa?*

*Pedicula-
tio quid.* Φθειράσις, Latinis pediculatio, est pedi-
culorum acervatim proventus, qui ut plu-
rimum in sordidis capitibus generantur.

Causæ. Causæ generationis pediculorum sunt put-
ridi sudores & humores corrupti ac tepidi
in profundis cutis poris ac meatibus colle-
cti. Sicut enim ex sordidis corruptisque hu-
moribus per superficiem cutis sparsis fursu-
res: ita ex iisdem humoribus altius in cute
hærentibus, pediculi generantur.

Curatio. Curatur hoc malum topicis remediis tepi-
dos humores elicientibus, abstergentibus &
exsiccantibus, qualia hæc sequentia sunt.

℞. Baccarum lauri,
Sem. staphidisagriæ an. 3 i.
Fol. parietariæ,
Hederæ arboreæ an. M. i.

*Lixi-
vium.*

Concisa & confusa coquantur in acri
lixivio, quo frequenter caput lavetur. Post
pilorum autem exsiccationem sequenti un-
guentio bis in die inungatur caput.

℞. Sem. staphidisagriæ 3 ii.
Hellebori albi,
Baccarum lauri an. 3 i.
Salis armeniaci 3 s.

*Unguen-
tum.*

Argenti vivi in saliva mortificati 3 s.
Ol. laurini 3 i. Omnia probe in mor-
tatio confusa misceantur, & fiat unguentum.

Panno, quo aurifabri vasa deaurata ex-
tergere solent, si caput confricetur, statim
pediculos enecat.

*Experi-
mentum.*

8. *Vulnus capitis quid, & quomodo
curandum?*

Capitis vulnus & cranei fractura ad chi-
rurgiam, tertiam ἡγεμονικῆς partem per-
tinent. Ne quid autem in affectionibus ca-
pitis præteritis videamur, placuit hoc loco
quædam de curatione vulneris capitis com-
memorare.

Dicitur autem propriè vulnus solutio
continuitatis cutis, carnosarumque partium,
extrinsecus videntur inflata, & non à putre-
factione aut interna causa oborta, quæ non
vulnus sed ulcus nominatur.

Porro notandum est, vulnera partium *Qua vul-
principalium, iisdemque subservientium, nera lethalia.*
veluti cordis, cerebri & panniculorum e-

jus, epatis circa cavam portæque venam in-
flata, item diaphragmatis, ventriculi, ceso-
phagi, asperæ arteriæ, pulmonum, vesi-
cæ, lienis, renum, & gracilium intesti-
norum, ex necessitate lethalia esse, quin &
musculorum capitis vulnera, quæ prope
tempora infliguntur, ut plurimum mortife-
ra sunt; item vulnera quibus spasmus seu
convulsio supervenit, plerumque mortalia
sunt teste Hippocrate.

In curandis autem vulneribus, non tan-
tum capitis, sed & aliarum partium in ge-
nere quatuor intentiones sunt obler-
vandæ.

*In curan-
du vulne-
ribus 4.
observan-
da.*

Mundatio. Primum ut extrinsecus incidentia & vuln-
nerum cavitati inherencia, veluti sunt grumi
sanguinis, ossis particulæ, &c. leniter
removeantur & abstergantur.

Consutio. Secundò ut vulnorum extrema labra ab
invicem hiantia, vel artificiosè consuendo,
vel ligatione vel conglutinantibus remediis
rursus contrahantur.

*Hemor-
rhagia co-
hibitio.* Tertiò ut eruptio sanguinis vehemens co-
hibeatur.

*Sympto-
matum
præcautio.* Quartò ut symptomata gravia à vulnera-
tis partibus arceantur, veluti sunt dolor, tu-
mor & inflammatio.

Hæ chirurgicæ intentiones partim digi-
torum, partim instrumentorum, partim
medicamentorum convenientium applica-
tione peraguntur. In curando itaque vul-
nere difficili ac gravi, siue id sit in capite,
siue in aliis partibus diligenter providendum
est; primum ne alvus sit adstricta: deinde
omnium primum post absterfionem vulne-
ri inherentium sanguinis profusio impe-
tuosa est restringenda, vulnusque, si labra
nimium hient, consuendum. Restringitur
autem sanguinis eruptio in leviusculis vul-
neribus solius telæ aranearum mundæ im-
positione: aut cohiberi potest ovorum al-
buminibus conquassatis & leni stupa excep-
tis vulnereque impositis: quod medica-
mentum & sanguinem restringit & dolorem
sedat, & inflammationem prohibet. In ma-
joribus vulnerebus labia vulnorum primum
sunt consuenda, deinde sequens remedium
vulnere applicandum.

*Pulvis re-
frictivus
Blute
stillunge
Chirurgi.*

℥. Farinæ fabarum, farinæ lentium,
farinæ volatilæ an. ʒ i. s.
Sanguinis draconis,
Thuris an. ʒ i.
Myrrhæ,
Aloës an. ʒ ii.
Terræ sigillatæ,
Gypsi an. ʒ s.

Pilorum leporis minutissimè inciso-
rum, telæ aranearum incisæ an. ʒ ii.

Spongix arefactæ & in pulverem
contritæ ʒ s.

Corallorum rubeorum, trium sanda-
lorum an. ʒ i.

Tragacanti ʒ s. fiat pulvis tenuissi-
mus, cujus aliqua pars vulnere inspergatur, *Galen. l.
uncia vero una cum ovorum albuminibus s. meth.
med. c. 4.*
instat linimenti mixta & cum stupa leni ex-
cepta vulnere imponatur, nec ab eo ante
diem tertium removeatur. Postea vero ab-
luatur vulnus vino rubeo in quo incoctæ
sunt rosæ rubæ & veronica herba. Ac tan-
dem sequenti emplastro tora conficiatur cu-
ratio.

℥. Myrrhæ,
Aloës an. ʒ s.
Thuris,
Masticis an. ʒ ii.
Ceræ ʒ ii.

*Empla-
strum ad
vulnera.*

Terebintinæ ʒ s. Cera & terebintina
resolutis, admisceantur rerum præscripta-
rum pulveres & redigatur in emplastri for-
mam, quo vulnus singulis diebus bis deli-
getur.

Aut curetur vulnus emplastro de minio,
aut emplastro tetrapharmaco. Ante deliga-
tionem semper vulnus à pure & sordibus ab-
stergendo & vino rubeo paulò ante comme-
morato ablundo.

Pulvis sequens si vulnere inspergatur, &
emplastrum de minio vulnere impositum, fe-
licissimè curare potest.

℥. Boli armeni,
Terræ sigillatæ an. ʒ iiii.
Thuris,
Masticis,
Sarcocollæ an. ʒ iiii.
Draganti,
Sanguinis draconis an. ʒ s.
Farinæ hordei,
Fabarum an. ʒ i.

*Pulvis ru-
beus ad
vulnera.*

Misceantur fiat pulvis rubeus.

In difficilioribus vulneribus siue capi-
tis siue aliarum partium utilissimè exhiberi
solet portio sequens vulneraria.

℥. Rad. Rubæ ʒ i.
Vincetoxici,
Tanacetii,
Herbæ Ruperti (quæ species est ge-
ranii klein Storchchen Schna-
bel)

*Potio vul-
neraria.*

Brassicæ rubæ an. M. i.

Rad.

Rad. consolidæ majoris,

Pimpinellæ,

Cariophyllatæ an. ʒ s.

Cynoglossæ M. s. Contusa & concisa

coquantur in duplici vase cum lib. iiii. vini, additis ʒ ii. mellis, fiat potio, de qua bibat vulneratus jejuno ventriculo ʒ iiii.

Symptomata præcipua vulnerum.

Symptomata præcipua quæ vulneribus accidere solent, præsertim majoribus, sunt dolor, inflammatio, puris tarditas, vulneris lividitas, febris, convulsio, paralysis, syncope, carnis excrecentia.

Dolor.

Dolor sedatur ac mitigatur oleo rosaceo cum albuminibus ovorum conquassato & vulnere cum stupa imposito: aut herba solatri cum axungia porcina confusa, item medulla panis in lacte calefacto macerata & vulnere imposita.

Inflammationem arcentia.

Inflammationem vulnerum aufert cataplasma ex plantagine & rosis cum axungia porcina confusis impositum: aut illitio unguenti albi ex cerussa.

Tumorem tollentia.

Tumor vulneris subsidet, si mala punica in vino cocta & confusa instar cataplasmatibus vulnere imponantur.

Pus, quod in vulnere salutare signum est, si tardius proveniat, sequens cataplasma generare poterit.

Cataplasma suppuratorium.

ʒl. Fol. Maluæ,
Flo. Absynthii,
Arthemisiæ,
Farinæ triticinæ,

Flor. chamæmeli an. M. i. Coquantur in vino ad mollitiem, contundantur, eisque mellis ʒ i. & axungie porcine ʒ ii. admisceantur, fiat cataplasma.

Pruritus sedans.

Pruritus in vulnere capitis sedat unguentum populeum, pauxillo aceto rosaceo commixtum & parti prurienti illitum.

Lividitas vulneris remedia.

Lividitas vulneris est signum refrigerationis, tonfores vocant *das kalte Fiehr*. Loca livida primum tepido vino fovenda ac tandem emplastrum basilicon vocatum vulnere impositum & sanat & colorem nativum vulnere restituit.

Febris vulneri superveniens die suo loco proposituri sumus.

Febris incidens in magnis vulneribus capitis, non caret periculo, cujus curationem

Spasmus seu convulsio in vulneribus capitis, teste Hippocrate aph. 2. l. 5. est pessimum signum. Oboritur autem spasmus à vulnere aut ex plenitudine aut ex inanitione, cujus curandi rationem pro causæ variatione supra tradidimus.

Paralyseos curationem quæ in magnis capitis vulneribus incidit supra tradidimus. Felicissimè verò curatur liquore balsami, cujus descriptionem habet Mesue: aut oleo ex granis juniperi chymica arte confecto, si eo cervix & spina dorsii parsque paralyti affecta inungatur.

In syncopen ubi incidit vulneratus statim circumstans turba è conclavi abigenda erit, & æger in aërem frigidum deducendus, & ei buccella panis in vino cretico aut generoso alio imbuta sugenda est offerenda, faciesque aqua rosacea aut frigida conspergenda, naribus acetum vel rosaceum vel aliud acre admoventum, naresque & aures vellicandæ, propriumque nomen alta voce acclamandum.

Excrecentia carnea id est carnis in vulnere excrecentia, insperso pulvere vel vitrioli adusti vel hermodactylorum radice, vel calce viva, vel unguento viridi illito facile tollitur.

9. Cranei fractura quid, quæ ejus causa, quæ prognostica signa, & quæ variatione curanda?

Quemadmodum solutio unionis in cute & partibus carnosius vulnus, ita solutio continui in ossibus dicitur fractura, Græcis *νεκρωσις*, ubi videlicet ossa in aliqua corporis parte aut præscinduntur, aut contunduntur, aut confringuntur.

Cranei fractura, si ad subjectam membranam pertingat, difficilis curationis est & plena periculi. Nisi enim maturè diligentissima curatio adhibeatur, sevilissima symptomata, veluti sunt apoplexia, epilepsia, convulsio, mentis alienatio, ardens febris, & mortem ipsam comitem habebit.

Causæ fracturam cranei interiores nullæ sunt. Externæ vero sunt omnia ea quæ calviam

calvam vel dividere scindendo, vel contundere sua gravitate, vel conterere, frangereque possunt, ut sunt, capitis violenta vulneratio, contusio, & casus à loco præcipiti.

*Signa prognostica.
Fractura
cranei quæ
lethalis.*

Signa prognostica in calvæ fractura pessima & lethalia quidem sunt, si osse contrafacto remoto, subiecta dura meninx immobilis esse deprehendatur, & nigra, aut livida colore, aut si acriter vomat æger, si paralyti, mentis alienatione, apoplexia, aut epilepsia subito corripiatur, aut si maxillæ & cervix moveri nequeant. Spem autem salutis promittunt signa contraria, videlicet duræ meningis pulsatio & inculpati coloris, ac in masticando facilis motus maxillarum, cervicisque libera commotio.

*Bona &
salutaria
signa.*

Curatio.

Quantum ad curationem atinet, sciendum est, ossa capitis perfracta aut prorsus ab invicem esse devulsa, aut aliis partibus calvæ adhuc coherentia, deorsum tamen compressa, in cuius curatione quatuor scopi diligenter sunt observandi.

*I. in curatione
fracturæ ob-
servanda.*

I. Videndum utrum os perfractum solum sit ab aliis ossibus, vel sit ruptio quædam instar filamenti tantum.

II. Utrum os contrafactum usque ad membranam duram cerebri sit impressum.

III. Utrum per rimulam rupturæ aliquid sanguinis ad membranam defluerit.

IV. Quomodo symptomatibus incidentibus sit occurrendum.

Ossa eximenda.

Primo itaque in fractura cranei cum vulnere cutis existente, si ossa sunt à toto devulsa & membranam duram pungentia, statim pilis prius derasis, & sanguine vino calido eluto, sunt eximenda, & sequentibus remediis curatio perficienda. Verum longè difficilior est curatio, si fractura cæca, rupturæ latens sine cutis vulnere extiterit, & tum maxime periculosa, si vel sanguis per rimam fracturæ ad duram meningem defluerit, aut ossicula pungentia ad eam impressa decumbant. In huiusmodi casu abrasis pilis, mox circa fracturam, cutis capitis novacula instar crucis est discindenda, & à craneo fracto vel instrumentis vel unguibus revellenda ac

*Fractura
cæca abs-
que cutis
lesione ut
curanda.*

*Cutis aper-
rienda.*

separanda, quo & qualitas & quantitas fracturæ commodius dignosci queat. Ubi itaque ablata cute una pars ossis fracti toto adhuc adhærentis in membranam superpressa incubat, aut etiam ubi per rimam inter os & membranam sanguinis quippiam influxisse suspicio est, statim os suppressum terebello chirurgico calvariæ densitatem non penetrante perforandum est, ac sursum trahendum circumjacentibusque partibus coæquandum: sed si sanguinis coluvies sub fractura contineatur, præstat craneum fractum circa rimulam, rosorio instrumento usque ad duram meningem abraderi, & grumos sanguinis argentea virgula, cuius apici syndo est involuta in oleo rosaceo calido madefacta, extrahere ac mundificare. Facilius enim est ac tutius, vulneris cutis & cranei ablati curatio, quam ossis in membranam duram impressi, aut saniei putrescentis inter craneum & membranam neglectus: Utrumque enim hominem in præsentissimum vitæ periculum conjicit. Vulnus enim cutis facile curatur & craneum ablatum per impositionem testæ, exiccata cucurbitæ, aut sola cute obducto loco vacuo, restitui sanitati potest. Cavendum tamen quantum fieri potest, ne abrasio ossis præsertim magni prope suturas instituat, ne dura meninx laxetur. His ritè peractis sub os fractum duræ membranæ imponatur syndo lenis in mello rosaceo calido imbuta, cui imponatur licinium molle ex lineis fasciis corrasum in oleo rosaceo tepido madefactum, huic rursus alia licinia majora linimento ex vitellis ovorum oleo rosaceo & pauxillo croci confecto imbuta. Interim tamen si sanguis vehementius ex vulnere cutis profluat, pulvis rubeus restringens, paulo ante in capitis vulnere præscriptus cum leporum pilis & candidis ovorum exceptis, imponendus erit: Ac postea toti vulneri emplastrum vel unguentum balsilicon capitale supra licinia imponi debet, cuius emplastri descriptio hæc est.

*Trepans
usus.*

Mundificatio.

*Cautio ne
sutura se-
centur.*

*Cerebrum
apertum
ut munien-
dum.*

Defensivum.

*Empla-
strum ca-
Pin-*

℞. Ol. rosarum ℥ iiii.
Ol. mastice ℥ i.

italis Baf-
icum.

Pinguedinum recentium, virulinæ,
porcinæ an. 3 ii.

Vini lib. ii.

Herb. virid. Betonicæ,

Plantaginis,

Matricariæ,

Pimpinellæ,

Rorismarini an. M. s.

Contusa macerentur simul per noctem,
ac deinde concoquantur ad vini absum-
ptionem, colatæque pinguedini admiscean-
tur Pul. Masticis,

Gummi elemi,

Resinæ pini,

Lithargyri an. 3 s. Rursum simul co-
quantur, donec subnigrum acquirat colo-
rem semper agitando; tandem addantur
Terebinthina claræ 3 ii.

Ceræ albæ q. s. Fiat emplastrum quo
universa curatio cranei fracti feliciter perfici
poteat. Idem præstat emplastrum de mi-
nio. Emplastro præscripto vulnere imposi-
to, circumjacentes proximè partes sequen-
ti linimento defensivo, dolorem sedativo,
tumorem & inflammationem prohibente,
illiniiri debet.

Linimen-
tum defen-
sivum.

℞. Ol. rosarum 3 i.

Ceræ albæ parum, fiat linimentum,
cui admisce boli armenti tenuissimè pul-
verati 3 i. quo inunge loca circumja-
centia.

Abstergen-
tia &
mundifi-
cantia.

Post quartum diem ab ossis contusi re-
motione aut suppressi alteratione, licinia,
quæ duræ menynge imponuntur, imbuen-
da sunt oleo hypericonis aut melle rosaceo
colato. Abstergit enim mel rosaceum &
mundificat vulnus à sanie, & resolvit sangui-
nis grumos menynge inherentes. Aut im-
ponatur vulnere sequens mundificativum.

Mundifi-
cativum
linimen-
tum.

℞. Terpentinae claræ 3 i.

Ol. rosarum 3 s.

Mellis rosati colati 3 iiii.

Croci 3 s.

Vini optimi 3 iiii. Sem. Hypericonis contritorum 3 s. Bulliant simul ad
vini absumptionem, coeantur, & cum lici-
niis excepta duræ menynge denudatæ im-
ponantur tepida.

Nono tandem transacto die eluatur
vulnus ac nudata membrana sequenti de-
coctione.

℥. Rosarum rubearum,

Myrtillorum,

Absynthii an. M. s.

Balaustiorum P. i.

Nucum cypressi n. v.

Flor. rorismarini, hypericonis,
rubeæ tinctorum an. M. s. contusa coquan-
tur in vini rubei lib. iiii. ad medias coeantur,
colato juscūlo admisceatur mellis rosæ
3 i. quo abluatur vulnus tepidè.

Ubi tandem fractura cranei & subjecta
membrana sufficienter fuerit mundata, &
jamjam incipit membrana cum craneo coa-
lescere, syndonidis particula quam menyn-
gi imponendam supra diximus, rursum exi-
matur, & cum præscriptis medicamentis,
utque ad menyngis cum craneo congluti-
nationem, & cranei carne & cute obductio-
nem tota curatio perficiatur.

Symptomata in cranei fractura incidere Sympto-
solent, ruptio, seu vulnus duræ menyngis, mata fra-
nigredo ejusdem membranae, callus duriti-
esque ac tumor duræ membranae, carnis
succrescentia in ipso vulnere, fungi item ce-
rebri præterea convulsio, epilepsia & apople-
xia, quæ hisce remediis profliganda sunt.

Ruptio seu vulnus duræ menyngis quod
à fractis ossiculis, eidemque incumben-
tibus accidit, consolidatur sequenti pul-
vere.

℥. Colophonii 3 i. s.

Myrrhæ, masticis, aloës an. 3 s.

Croci, sarcocollæ an. 3 i. Te-
nuissimè pulverata misceantur ac vulneratæ
membranae inspergantur.

Nigredo duræ menyngis illitione mellis
rosacei aufertur, quod si eo non remove-
tur, est lethalis, & à curatione abstinend-
um.

Callus duritiesque & tumor menyngis,
qui ut plurimum à frigido aëre contingit, Catapla-
smo ad
emolliri potest sequenti cataplasmate.

℞. Pul. Rad. althææ, sem. lini an. 3 s.

Flor. chamæmeli, meliloti an. M. i.

Rosarum rubearum M. s. coquantur

C c 3

in q.

Elotio me-
nyngum
denudata-
rum.

Pulvis ad
menynge
cerebri
consolidan-
das.

Catapla-
sma ad
emollimen-
tum menyn-
gis tumo-
ris.

in q. s. aquæ ad pulvis formam, quibus admisceantur farinæ hordei quantum ad crassitiem sufficit, olei rosarum, chamæmeli an. ʒ i. vitellorum ovorum n. ii. croci ʒ i. fiat cataplasma, quod tepidum applicetur.

Carnis succrescentia inpersione pulveris aluminis usti, aut hermodactylorum removeri potest. *Carni ex-
crescentia
remedia.*

Reliquorum symptomatum, convulsionis, epilepsiæ, apoplexiæ &c. curationes in superioribus, & in vulnere capitis tradidimus.

PRACTICÆ FRANCISCI JOELIS

LIBER SECUNDUS,

DE MORBIS ORGANORUM SENSILIIUM, RELIQUARUMQUE IIS ADHÆREN- TIUM PARTIUM CURANDIS.

I. *Quæ sunt sensuum organa & alie partes in capite contenta?*

Capiti inhærent & connexæ sunt sequentes
particulæ :

OCULI, AURES, NARES, OS, LINGUA, FAUCES,
TONSILLÆ, GURGULIO, COLLUM,

Quarum morbos in sequentibus curare docemus.

SECTIO I.

DE OCULORUM AFFECTIBUS.

I. *Oculi quibus potissimum morbis afficiuntur?*

*Oculorum
nobilitas
& præstan-
tia.*



Obilissima organa sunt oculi, Platone attestante, qui in Timæo ita inquit, omnium rerum optimarum & totius naturalis philosophiæ cognitionem nobis oculi attulerunt, &c. Constant autem oculi ex quatuor tunicis & tribus humoribus, veluti supra in explicatione partium demonstravimus, quorum morbi præcipui sunt:

Ophthalmia,

Sugillatio,
Suffusio,
Lachrymositas,
Exulceratio,
Cicatrix,
Pustulæ,
Visus obscuritas,
Nocturna cæcitus,
Oculorum procidentia, id est, strabismus.

2. *Ophthalmia.*

*Oculorum
affectus.*

2. *Ophthalmia quid, quæ ejus causa, qua signa, & quibus remediis curanda?*

Ophthalmia propriè quid. Ὠφθαλμία, lippitudo, (quamquam ὀφθαλμίας vox in genere pro omni affectione oculorum usurpatur) propriè apud Galenum tunica exterioris, quam ἐπιμεμβρανὴν, id est, adnatam vocant, inflammationem significat. Est autem adnata exterior oculorum tunica à pericranio orta, & oculis obtenfa, cui reliquæ tunicæ & totus oculus adnatus est, & cum ea ossibus circumjacentibus alligatus.

Causa. Causa inflammationis adnatæ ὀφθαλμίας quidem est percussio violenta, ὀφθαλμίας vero est sanguis biliosus & acris, de subcutaneis capitis partibus ad oculos irruens, qui vel sua acrimonia tunicam adnatam erodit, vel copia ac crassitie extendit, & inflammationem doloresque in ea excitat.

Signa. Signa externæ causæ ex relatione ægri agnoscuntur: signa vero adfluentis humoris tenuioris, sunt oculorum rubedo, dolor pruriens, & continuæ lachrymæ. Crassioris vero humoris affluentiæque signa sunt, collectio sordium crassarum in oculorum angulis & mitior dolor.

Curatio. Curatio ophthalmiæ tribus instrumentis perficitur; victus ratione, venæ sectione, & remediis convenienti usurpatione.

Vinum ophthalmicis noxiis, licet Gal. com. aph. 3 v. l. 6. in dolore oculorum à crassis humoribus venularum obstruentibus concedat. Vena sectio. Victus rationem oportet esse sobriam ac tenuem. Versetur itaque æger in aëre temperato subobscurò & minimè splendenti, vitet ventorum appulsus: utatur cibis moderatè refrigerantibus, veluti sunt cremor ptisanæ, pisculi squamati, ova forbilia. Fugiat omnia calida & acria, ut sunt cæpæ, sinapi, piper. A vini potu prorsus abstineat, ac ejus loco aquam bibat hordei cum pauxillo cinamomi & passulis confectam.

Si ætas ferat, detrahatur sanguis ex vena humeraria quam cephalicam vocant, quin & cucurbitulas cervici applicare affluentemque sanguinem per eas avertere commodissimum erit.

Post sanguinis detractionem vitiosi humores ad oculos affluentes, sequenti potiuncula exturbari possunt.

℞. Cort. myrobalanorum citrinorum ʒ i. Rhabarbari ʒ i.

Zinziberis albi ʒ i. Contusa mace-
rentur per noctem, infere lactis caprini ʒ vi.
ac tandem leniter ebulliant, expressaque
colentur ac colato liquori admisceatur ʒ s.
electuarii lenitivi, fiat haustus, qui tepidus
exhibeatur sex horis ante prandium. Aut in
eundem usum exhibeantur sequentes pil-
lulæ.

℥. Mas. pil. aurearum, cochiarum an. ʒ s. formentur pillulæ cum aqua fæniculi
n. 27. & inungantur pauxillo olei fæniculi,
ac deglutiantur circa medium noctis.

Purgatis vitiosis humoribus, sequentibus
topicis remediis inflammationi ac dolori
succurrendum erit, & quidem à levioribus
collyriis ad fortiora progrediendum erit:
itaque

℥. Lactis muliebris sæmellam lactan-
tis, aquæ rosaceæ an. ʒ i. Camphoræ gr.
i iiii. Misceantur, fiat collyrium, quod
mane ac vespere lippientibus oculis instil-
letur, ac si quid noctu sordium in angu-
lis oculorum collectum est, manè lana
molli in eodem collyrio imbuta abstergere
oportet. Noctū autem non abs re erit
ovorum candida cum q. s. aquæ rosaceæ
conquassata duplicatoque mundissimo lin-
teolo excepta, instar epithematis applicare.
Fortius autem agit sequens epithema.

℥. Succo rosarum rubearum, succi plan-
taginis, succi fol. salicis an. ʒ i. i.
Defæcentur misceanturque & fiat epithe-
ma oculis imponendum.

Si irruens in oculos humor vehementer
tenuis & acris fuerit, tum prodest fronti se-
quens cataplasma applicare.

℥. Farinæ hordeaceæ M. i.

Boli armeniaci ʒ i.

Thuris, acaciæ, an. ʒ ii.

Santali rubei,

Balaustiarum an. ʒ i.

Albuminum ovorum n. iiii.

Haustus
purgans.

Pillula o-
culares, ab
mores pec-
cantes a-
vacuantes.
Topica.

Collyrium
lene.

Saccha-
rum Sa-
turnicum
aq. rosa-
rum vel

euphrasie
Chymici

utiliter
usurpant.

Epithema
refrige-
rans.

Epithema
adstrin-
gens, refri-
gerans &
repellens.

Defensi-
um fron-
ti appli-
candum.

Olei

Olei rosacei q.s. Commisceantur ac redigantur in formam cataplasmatidis ac fronti applicentur.

In omni autem oculorum phlegmone utilissimè instillari potest sequens collyrium.

Collyrium ad oculorum inflammationem.

℥. Aquæ rosarum,
Feniculi, Euphrasæ an. ʒ ii.
Pompholygis lotæ ʒ ii. Misceantur,
fiat collyrium: Aut

℞. Draganti,
Gummi Arabici,
Amyli an. ʒ i.

Collyrium anodyn.

Cautè hoc adhibendum, facili enim visui noxam infert. Aqua ophtalmica ex croco metallorum confecta commendatur à Quercetano.

Opii thebaici ʒ s. Contrita subtilissimè commisceantur cum lacte mulieris q. s. fiat collyrium, quod fortissimè agit, & omnem dolorem oculorum aufert: non tamen nisi summa urgente necessitate eo est utendum propter opii vim narcoticam. In extrema necessitate præstantissimum remedium est, sufflare oculis antimonii adusti pulvisculum, tenuissimè lævigatum.

3. *Unguis in oculis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?*

Πτερυγίον, unguis, ein fell über dem Auge est membranula nervosa, albicans, ex angulis oculorum prodiens, tunicæ adnatæ inhærens, & sese per oculum obtendens, totamque pupillam, si diutius increseat, tegens, visumque intercipiens.

Causa.

Causa pterygii unica est *αεονυγισμὸς*, videlicet humoris crassi ac lentis ex partibus inter cranium & cutem contentis ad oculos defluxus.

Signa.

Signa membranulæ obductæ oculis manifesta sunt, conspicuè enim & visum paulatim obscurant ac postremo totum adimunt. Porro incurabilis ferè est oculorum unguis ope remediorum, qui ad nigredinem usque processit & totam pupillam contextit. Sed curati tantum potest per artificiosam cum acu argentea à tunica adnata separationem & cum scalpello ablationem.

Prognostica.
Unguis quando chirurgica curandus vide Parei chirurg. l. 16. c. 14.
Remedia

Pterygion vero recens & adhuc albicans sequentibus remediis faciliè curabitur. Ini-

tio lenti crassique humores sequenti potione concoqui & extenuari debent.

℥. Rad. Feniculi,
Apii,
Petroselini,
Chelidoniz,
Dauci cretici an. ʒ s.
Betonica,
Euphrasæ an. M. s.
Sem. feniculi,
Carvi an. ʒ s.

Contusa ac concisa macerentur per noctem in lib. iiii. hydromellis. Deinde in duplici vase sive in cantharo oblinito in lebetemque aqua plenam collocato coquantur simul per duas horas, colentur,colato liquori admisceantur oxymellis scilicet, syr. è stæchade, è betonica an. ʒ ii. fiat potio de qua bibat æger per dies sex mane ac vesperi mensuram ʒ iiii. prius calefactam. Tandem purgetur caput à crassis humoribus sequentibus pillulis.

℞. Mas. pil. sine quibus,
Lucis majoris,
Alajereth an. ʒ i.

Trochiscorum alhandali gr. iiii. cum aq. feniculi formentur pillulæ n. 27. quas deglutiat æger cum aliquo liquore 6. horis ante prandium.

Deinceps præter topica remedia quæ sequuntur singulis diebus bis una ante prandium & cænam hora, utatur æger sequenti pulvere, cerebrum & oculos, spiritusque visivos mirabiliter corroborante.

℞. Sem. fileris montani,
Cinamomi electi an. ʒ ii.
Sem. feniculi,
Anisi an. ʒ i.
Flo. rorismarini, euphrasæ an. ʒ i. s.
Cubebarum,
Macis, caryophyll. granorum paradyli an. ʒ s.

Sacchari albissimi ʒ iiii. Misceantur optimè pulverata fiat tragæa, de qua sumat æger pro una vice ʒ ii. per buccellam panis tosti & in aqua juniperi aut in vino generoso madefacti conspersas.

unguis adhuc recens, Potio digestiva.

Pillula ab oculis crassos humores evacuant.

Tulvis ad corroborandum visum.

Topi-

Topica un-
guem ab-
summentia.

Topica præcipua unguem oculorum ab-
summentia hæc sunt.

Collyrium ad oculorum unguem.

Collyrium
1.

℞. Aeruginis ʒ i. s.
Aris usti ʒ i. i.
Auripigmenti rubei, salis nitri an. ʒ s.
Salis armoniaci ʒ i.
Gummi armoniaci in succo rutæ so-
luti ʒ i.

Reliquis omnibus tenuissimè pulve-
ratis commisceantur, & cum q. s. succi che-
lidoniæ, fiat collyrium, quod angulis oculo-
rum singulis diebus bis inungatur.

Aliud.

Collyrium
2.

℞. Fellium lupi piscis,
Cyprini piscis *Itar pengalle* /
Mellis rosacei an. ʒ i.
Aloës Hepaticæ, Saccari candi an.
ʒ ii.
Tutæ præparatæ, camphoræ an.
ʒ i.

Succi chelidoniæ ʒ ii.
Aquarum fœniculi,
Verbænæ,
Euphrasie an. ʒ i. i.
Ex his ea quæ in pulverem redigi pos-
sunt, conterantur tenuissimè & liquoribus
admisceantur, fiat collyrium.

Aliud.

Collyrium
ad varias
oculorum
affectiones
præstantis-
simum.

℞. Cadmiæ præparatæ id est ustæ & in
vino extinctæ,
Tutæ præparatæ an. ʒ s. Macis,
camphoræ an. ʒ i.
Cariophyllorum ʒ i.
Zinziberis, galangæ an. ʒ s.
Vitrioli albi, fellis vitri an. ʒ ii.
Vini cretensis, seu malvatici lib. i.

Simile se-
re Crollii
describit
in Basil.
rhymica,
quod oph-
thalmicum
vocat.

Pulveris commisceantur, & deco-
quantur in duplici vase, quod est præstantissi-
mum collyrium, & ad unguem, & ad alias affe-
ctiones oculorum.

Præstat & sequentis pulvisculi momentum
singulis diebus oculorum angulis indere.

Pulvis
oculorum.

℞. Tutæ præparatæ,
Antimonii calcinati,

Cerussæ lutæ, sarcocollæ ustæ an. ʒ i.

Amyli ʒ s.

Draganti usti, lycii an. ʒ i.

Coralli rubei præparati, ossium sepiæ,
camphoræ an. ʒ i.

Viridis aris, vitrioli albi, fellis vitri
an. ʒ i.

Fiat pulvis subtilissimus.

Lapi me-
dicamento-
sus Crollii
in aq. rosa-
cea velen-
phrasia so-
lutus idem
præstat.

4. Sugillatio oculorum quid, quæ ejus
causa, quæ signa, & quibus re-
mediis curanda?

ὑπόφωμαι oculorum sugillationes sunt *Sugillatio*
sanguinea puncta in aliqua parte exteriorum *oculorum*
tunicarum, adnatæ videlicet & corneæ, *quid.*
apparentia, quæ & oculorum maculæ no-
minantur: quæ nisi remediis in tempore
discutiantur, antequam sanguis in grumos
condensetur, livescit, & visum magnopere
obscurat, & alia gravia sympomata inducit,
nonnunquam in pus transit, difficulterque
curatur.

Causæ sanguinolentarum macularum in *Causa.*
oculis immediatæ sunt, venularum aut arte-
riarum, per exteriores tunicas oculorum
conspersarum, ruptiones & apertiones, ex
quibus sanguineæ guttæ stillantes intramem-
branas effunduntur. Apertionis autem ven-
narum *απονευρῶν* causa est redundántia
sanguinis in oculis, venas extendens &
rumpens: *αρεγκταεκτικαί* vero sunt vio-
lenta percussio aut contusio oculorum, aut
asper & frigidus ventus in oculos aper-
tos irruens & constringendo venulas rum-
pens.

Signa sugillationis manifesta sunt & in *Signa.*
conspicuo, oculus enim læsus cruentus esse
videtur, deinde lividis aut nigris maculis
conspersus. Præterea patienti omnia quæ
conspicit corpora rubra apparent.

Curatio sugillationis statim in initio *Curatio.*
turæ est adhibenda. Si itaque venularum
ruptio ex redundántia sanguinis, quod raro
contingit, orta sit, statim venam primum *Vena se-*
quidem cephalicam, deinde & in angulis o-
culorum existentem secare convenit, & cu-
curbitulis cervici adfixis cum scarificatione *Cucurbitu-*
sanguinem avertere convenit. *la.*

D d

Si

Si autem ex procataractica aliqua causa oborta sit sugillatio, confestim ad topica remedia confugiendum est: & primum quidem recenti adhuc existente malo, imbecilliora, inveterato autem fortiora sunt applicanda.

Fomentum pro oculis sugillatis.

Initio itaque oculi sugillati fomententur liquore tepido, in quo flores meliloti & rosarum ac semina fœnugræci sunt incocta; qui liquor molli spongia exceptus, oculis aliquandiu applicetur, ac tandem affecto oculo sequens collyrium inungatur.

Collyrium I.

℞. Sanguinis ex alis columbarum expressi ʒ ii.

Lactis mulieris temperatæ ʒ s. Misceantur, fiat collyrium, cui adjiciatur thuris in tenuissimum pulverem redacti ʒ i.

Collyrium 2. ag. lividas oculorum maculas.

Fortius est, & ad lividas maculas discutendas convenientius.

Ol. epatis galei fluviatilis Quap. pin. lethe. rosl. est in signa medium in hoc affectu.

℞. Succo herb. Chelidonii majoris, card. benedicti an. ʒ s.

Pinguedinis quæstulæ (Wachtel) avis liquefactæ ʒ ii.

Pul. tenuissimi myrrhæ ʒ i. Misceantur, fiat collyrium.

Si inflammatio aut pruritus ad sugillationem accedant, albumina ovorum in spumam concussa ac tepida, mollique lana excepta oculis sunt applicanda.

Ubi vero sanguis inter tunicas collectus propter copiam in pus est conversus, dolorem acerbum excitare consuevit, qui hisce præsidiiis mitigabitur; In lacte recens mulso decoquantur semina fœnugræci & lini, addantur quoque, si adsit inflammatio, flores rosarum & folia solani, & lac tepidum spongia exceptum oculis apponatur. Pus autem commodè extenuari & evacuari potest collyrio ex mucagine fœnugræci cum aqua fœniculi macerati & melle rosaceo p. æ. simul mixto & oculorum angulis illito.

5. Suffusio oculorum quid, qua ejusdem causa, qua signa, & quomodo curanda?

Suffusio

Ἰνέχυσις, oculorum suffusio, Avicennæ

cataracta vocatur *der Star* / & est humore seu catara-
moris lenti vel in pupillam, vel inter Rha-
goidem tunicam & crystallinum humorem
collectio & concretio, qui spiritus visivos
per pupillam prodire impedit: accidit hoc
malum nunc utrique; nunc uni tantum oculo.

Causæ suffusionis *αἰνυμένη* quidem Causa, sunt aut humor crassus ex cerebro per nervos opticos adfluens, aut vapor crassus ex ventriculo ad oculos delatus: *αἰνυμένη* vero sunt cibi evaporantes, intempestivæ lucubrationes, immoderata Venus.

Signa suffusionis primum incipientis sunt Signa. simulachra evanescencia parvorum culicum, muscarum, filamentorum, telarum araneorum, aliarumque rerum, aut caliginosarum aut lucentium, ob oculos versantium: Processu vero temporis humore magis magisque incrassescente, rerum visibilium species intercipiuntur, visusque fallitur, ita ut res vel mediæ tantum, vel minores, vel dissimiles, vel alieni coloris, quam verè sunt, conspiciantur.

Curatio suffusionis recentis (inveterata Curatio, enim discuti per medicamenta nequit) venæ sectione, victus ratione, & medicamentorum usurpatione perficitur.

Venæ sectio & quidem cephalicæ, iis Venæ tantum est adhibenda, qui natura plenitudi-
ni sunt obnoxii, quibus cum oculi, tum to-
ta facies rubet. *locus.*

Victus ratio debet esse moderatè calefacta. *Dietæ.* ciens & exiccans. Cibis utatur boni succi & qui minimè evaporent, sed probè concoqui queant. Esculenta itaque condien-
da erunt zinzibere, cinamomo, macere, *Condi-
menta co-
borum.* seminibus carvi, fœniculi & coriandrorum, foliisque majoranæ. In potu vero utatur hydromelle, vel decocto cinamomi. Vitet *Evapora-
tia vitan-
da.* vaporantia omnia, & pituitosum excrementum augmentia, veluti sunt cibi crassi & concoctu difficiles humectantesque, ut lac, caseus, pisces, capræ & legumina: Fugiat & vini potionem, Venerem & balnea.

Post venæ sectionem crassi humores ex cerebro, & evaporantia excrementa ex ven-
tricu-

triculo, per sequens clystera subducenda crunt.

Enema.

℥. Herb. Pulegii,
Betonicae an. M. i.
Flo. Chamæmeli,
Absynthii,
Anethi an. M. s.

Sem. Fæniculi, carvi an. ℥ s.

Concisa & confusa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati liquoris accipe ℥ xiii. quibus admisce hieræ simpl. ℥ i. s. Agarici troch. ℥ i. Ol. chamæmeli ℥ iiii. Salis communis ℥ i. Commisceantur, fiat enema, quod tepidum jejuno existente ventriculo, recto intestino infundatur.

Tandem pituitosi cerebri humores sequenti potione extenuentur.

Potio præparans & digerens pituitam.

℥. Syr. è stechade, oxymellis scillitici,
Syr. de betonica an. ℥ ii.

Aq. stillatiuæ fæniculi, majoranæ,

Ex grani juniperi an. ℥ iiii. Commisceantur, fiat potio, cujus ℥ iiii. tepidæ exhibeantur mane ac vespere.

Exhausta potione hac, detrahantur iidem humores jam concocti & præparati sequentibus pillulis.

Pillula oculares.

℥. Mas. pil. Aurearum,
Lucis majoris,
Atabicarum,
Troch. de agarico an. ℥ i.

Ex quibus confusis cum aqua fæniculi formentur pillulæ n. 33. quæ deglutiantur in aurore sex horis ante prandium.

Cucurbitula corvici applicanda. Vena frontis aperienda.

Post evacuationem excrementorum capitis, aversionis gratia, occipiti cucurbitulæ cum scarificatione singulis mensibus commodè applicari possunt: quin & venam, quæ in frontis medio habetur, ubi plethoricum est corpus, aperire non erit inconveniens.

Postea lenti humores sensim per sequens gargarisma jejuno adhuc existente homine indies detrahi debent.

Gargarisma phlegmæ.

℥. Herb. Betonicae,
Majoranæ,
Fæniculi an. M. s.
Rad. Pyrethri,

Sem. Erucae an. ℥ s.

Carvi, cubebarum an. ℥ ii.

Concisis concidendis & contundendis confusis admisceantur aceti acris & aquæ puræ an. lib. i. mellis rosacei ℥ iiii. coquantur lento igne in nova olla sub operculo ad medias, colentur, fiat Gargarismus, quo tepido utatur æger.

Proderit plurimum semper post Gargarismi usum cerebrum & visivos spiritus sequenti pulvere masticatorio corroborare.

℥. Flo. Majoranæ ℥ i.

Sem. Fæniculi,

Carvi,

Cubebarum,

Cinamomi an. ℥ s.

Macis,

Mastiches an. ℥ i.

Concidantur crassiuscule, ex quibus P i. ore mastice æger, naribus compressis, donec nullus sapor in eo sentiat. Non absque quoque erit in suffusione oculorum singulis mensibus circa lunam plenam, sequentibus uti pillulis.

℥. Agarici troch. ℥ iiii.

Spec. hieræ simp. ℥ i.

Pul. myrabulanorum, chebulorum

℥ ii.

Omnibus probè pulveratis ac cum succo fæniculi defœcato commixtis ac confusis fiat massula pill. ex cujus ℥ i. conformentur pil. 27. quæ vespere è cœna deglutiantur.

Topica oculorum suffusioni conveniunt. Topica. pharmaca hac ratione sunt adhibenda.

Primum singulis diebus mane fomententur oculi molli spongia sequenti decoctione imbuta.

℞. Herb. fæniculi,

Flo. chamæmeli,

Meliloti an. M. i.

Sem. fænu Græci confusi ℥ s.

Coquantur in q. s. aquæ, quo decocto laventur foveanturque oculi tepidè: post fomentationem illiniantur oculorum angulis aliquot guttulæ sequentium collyriorum.

Tulvis masticatorius visivos roborans. Ol. succini vel fæniculi cum rotulo dianthi vel aquæ fænic. multo hoc præstat efficacius.

Pillula oculares singulis mensibus usurpanda.

Collyria varia visum acuetia.

Chymici
magisterio
peararum
cum aq.
chelidonii
feliciter u-
suntur.

R. Fellis Galligallinacei annosi.

Succi chelidoniz, fœniculi, rutæ, suc-
cis prius defæcatis, mellis virginei & candi-
dissimi an. 3 ii. Commisceantur, fiat colly-
rium. Aut

R. Caput hirundinum n. iiii. com-
burantur, & in tenuissimum pulverem redi-
gantur, quibus admisceantur ol. vittoli re-
ctificati gr. iiii. & cum q. s. mellis virginei,
fiat collyrium quod oculis illiniatur.

Præclare quoque & suffusioni & omnibus
ferè affectionibus opitulatur sequens aq. stil-
lat. & chymica arte præparata, frequenter
que oculis illita.

Aqua
composita
stillaticia
ad suffuso-
nem præ-
stantissi-
ma.

Variaz aq.
ophthalmi-
carum de-
scriptiones
vide apud
Querceta-
num in
pharmaco-
pæa resti-
tuta, &
in anti-
dotario
Weckeri
speciali l.
2. f. 1.

Modum
auferendi
catarrhas
den. Star-
gii ste-
chen vile
apud
Pareum in
cap. 21.
chirurg. op.
l. 16. c.
21.

Ilachry-
marum in-
volunta-
ria seu lip-
piundo.

℞. Herb. recentium, exiccatarum tamen, fœniculi, rutæ, euphrasiz, betonicæ, verbenæ, tormentillæ, gallitrici, anagallidis, chelidoniz an. M. i. Flor. rosarum sylvestrium, cichoreæ, agtimoniæ, periclymeni an. M. s. Contusa omnia misceantur & cucurbitulæ vitreæ imponantur, quibus admisceantur mellis virginei lib. v. urinæ infantis, vini generosi, rosis cælestis, in Majo aut Junio mensibus per fœniculi virentis herbam mundissimo linteolo collecti & expressi an. lib. ii. qui liquores adfundantur herbis & per xiiii. dies mace-
rentur seu ut Chymistæ loquuntur, dige-
rantur, vitro bene clauso, in ventre equino,
ac tandem exempto vitro in furnum arctum
& cinere tenui plenum collocato, eique cu-
curbitæ alembico vitreo imposito artificio-
sè destilletur, aqua vero extracta ter ad fæ-
ces siccati incipientes refundatur ac subinde
iterum destillentur.

Quæ hisce remediis non curatur suffusio,
huic chirurgica curatio adhiberi debet, quæ
qua ratione sit instituenda docet Celsus
lib. 7. cap. 7. & Paulus Ægineta lib. 6.
Pareum in cap. 21.

6. Lachrymarum invite manantium
causa quæ, & quibus remediis
curanda?

Lachrymæ sunt tenuissimæ guttulæ ex o-
culis erumpentes: Boni homines ut habet
proverbium natura sunt lachrymabiles, faci-
lè enim convertuntur ad misericordiam. Be-
ne vero & salubriter habentes, non facilè il-

lachrymantur, nisi aut misericordia aut aliis
tristibus affectibus animi moti. Verum in
gravioribus morbis spontaneæ lachrymæ sæ-
pè erumpunt, & plerumque sunt lethalia si-
gna teste Hippocrate lib. i. & 6. de morbis
popularibus. *Omnibus hisce illachrymati-
onibus missis, de illa agamus, quæ in sanis
aliis corporibus oculorum aliquo affectu
proprio contingit nobis invitis.*

Causa hujusmodi lachrymarum invite ef-
fluentium in sanis corporibus & sine animi
affectionibus ænigmati quidem est, re-
dundantia tenuis humoris, sive is sit cali-
dus sive frigidus, inter craneum & cutem
syncipitis collecti, & ad oculos decumben-
tis. *Ænigmati verò sunt, aut frigidi
tenuisque aëris & ventorum gelidorum in
oculos irruptio, quæ constringendo tuni-
cas oculorum, aqueum humorem ex ocu-
lis exprimunt: aut acri vapore, veluti sunt
cæparum, sinapi, fumique in oculos irruen-
tes quæ dilatando lachrymas eliciunt.*

*Causas lachrymarum prolicientes & visui no-
centes Salernitani hisce versiculis compre-
hendere.*

Balnea, vina, Venus, ventus, piper, al-
lia, fumus,
Porrum cum cepis, faba, lens, fletusque,
sinapi,
Sol, coitusque, ignis, labor, ietus, acumi-
na, pulvis,
Ista nocent oculis, sed vigilare magis.

Signa lachrymarum manifesta sunt, quæ *Signa*
ex causis procatacticis oriuntur; quæ vero *causarum*
ab interna causa profluunt, si humor est fri- *interna-*
gidus, sine dolore manat: si vero tenuis & *rum.*
calidus, tum pruritum, acerbos dolores &
oculorum exulcerationem affert.

Curantur lachrymæ invitæ si ab externis *Curatio.*
causis proveniant, sola earum remotione
vel alteratione. Ubi vero ab interna causa
& quidem à tenuibus & frigidis humoribus
procedunt lachrymæ, sequenti potione hu-
mor ad evacuationem præparetur.

℞. Syr. è stachade, mellis rosarum, syr. *Potio dige-
stiva.*
è betonica, an. 3 iiii.

Aq. stil-

Aq. stillat. euphrasæ,

Feniculi,

Beronicæ an. ʒ iiii.

Commisceantur, fiat potio; de qua sumat æger mane ac vesperi ʒ iiii. tepidat. Deinde tenuis humor sequentibus pill. evacuatur.

Pillula tenuem & serasum humorem educentes.

℥. Mas. pill. Aurearum,

Lucis major.

Cochiarum an. ʒ i.

Troch. alhandal. ʒ s. cum q. s. aquæ feniculi, formentur pill. n. 27. & in aurora deglutiantur sex horis ante prandium.

Cucurbitula.

Deinde avertantur reliquæ humorum à syncipite ad occiput per cucurbitulas cum scarificatione cervici applicatas. Proderit insuper & theriacæ Andromachi aut aureæ Alexandrinæ singulis mensibus ʒ i. cum aqua feniculi assumere. Præterea corroborentur spiritus visivi, & retentiva facultas oculorum sequentibus morsulis mane ac vesperi quotidie particulam assumendo.

Morsuli visum roborantes.

℥. Spe. rosatæ novellæ,

diarhodon abbat. an. ʒ i.

Pul. sem. feniculi,

Cubebarum,

Cinamomi an. ʒ s.

Moschi gr. iiii. sacchari albi cum aqua feniculi ʒ iiii. Commisceantur, & inter commiscendum addatur olei feniculi ʒ s. Fiant morsuli.

Topica.

His rite peractis topica remedia applicanda sunt. Ituro itaque cubitum ægroto sequens emplastrum, quod non tantum lachrymas, verum & alias cerebri defluxiones sistere potest, fronti applicandum erit.

℥. Myrrhæ, cymini, thuris, aloës, masticis, boli Armeni an. ʒ i.

Croci ʒ ii. Tenuissimè pulverisatâ commisceantur cum q. s. albuminis ovorum & extendantur per duplicatum linteolum instar emplastri. Porro si lachrymæ tenues & acres erodentesque extiterint, tum sequens emplastrum fronti applicetur.

Emplastrum frontale.

℥. Thuris, masticis, gummi armoni, niaci, draganti.

Boli Armeni, sanguinis draconis, mu-

niæ an. ʒ ii. Opii ʒ i. Commisceantur cum q. s. albuminis ovorum, fiat emplastrum.

Quin & sequenti linimento, si frons quotidie bis inungatur brevi sistuntur lachrymæ.

℥. Masticis, thuris, boli Armeni, lachrymidis calaminaris an. ʒ i.

Scoriæ ferri ʒ ii. Opii ʒ s. Succifeniculi & aquæ rosacæ an. q. s.

Fiat linimentum.

Idem præstat si oculi indies laventur vino ex quo, modo absit acredo lachrymarum, ter quaterve, in quo candens aurum extinctum est. Rhazes Medicus Arabis ad lachrymas sistendas sequentem pulvisculum mitissime commendat.

℥. Pompholygis sive nihili albi ʒ i.

Corallii albi usti præparatique,

Myrobalanorum citrinorum, aloës an ʒ i.

Redigantur in tenuissimum pulvisculum angulisque oculorum mane ac vesperi instillantur.

7. Exulceratio oculorum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Exulceratio oculorum Græcis ἑλκὺς τοῦ ὀφθαλμοῦ est continui solutio vel laceratio deraisione alicujus exterioris membranæ in oculis. Exulceratio propriè differt ab ulcere. Ulcus enim profundior continui solutio est, exulceratio autem superficiales tantum. Exulceratur autem, vel eroditur in oculis nonnunquam exterior tunica, quam adnatam vocant, quæ minus est periculosa; quandoque cornea membrana, quæ non caret periculo, ut plurimum enim cæcitatem inducit propter effusionem aquei humoris.

Causæ exulcerationis oculorum sunt aut internæ aut externæ. Internæ sive ἰατρικαὶ sunt humores acres & erodentes ex subcutaneis syncipitis partibus in oculos influentes, progressuque temporis membranas erodentes. Externæ sive ὁφθαλμικαὶ causæ sunt, violentus ictus aut confusio oculi, item res acres foris in oculos incidentes veluti sunt ignis, ignei liquores, calx, ærugo, & omnia quæ erodendi vim habent.

Signa. Signa caufarum exteriorum exulcerationis & visu deprehendi, & ex relatione ægrotantis dignosci possunt. Interiores autem causas semper præcedit vehemens oculorum pruritus, inflammatio & dolor pungens pulsansque aut continuè erodens.

Curatio. Curatio exulceratorum oculorum venæ sectione, victus ratione, & remediis congruentibus perficitur.

Vene sectio. Si itaque adfit plethora id est sanguinis in venis redundantia, id quod ex rubedine faciei & venarum tumore cognoscitur, vena est secanda humeraria quam cephalicam vocant, & quidem affecti lateris. Non abs re quoque erit ad acrium humorum averfionem cucurbitulas cum scarificatione cervici affigere.

Dieta. Victus ratio in internarum caufarum remotione præscribi ægrotò debet moderatè refrigerans. Arceatur itaque patiens ab aëre calido, squalido, fumoso ac crasso; & ab acrium calidorumque eduliorum usu, & vini potione, piscibus magis quam carnibus, & prunis Ungaricis, cremoreque ptisanæ magis uti ei convenit, & in potu aquam bibat hordeaceam in qua cinamomi frustulum est incoctum.

Remedia instituenda sunt, quæ acres humores à capite deorsum trahant ac evacuent. Initio itaque sequenti enemate uti licebit.

Enema revellens à capite. R. Herb. Maluæ, Althææ, Betonicæ an. M. i.

Flo. chamæmeli, centaurii minoris, rosarum violarum an. M. s.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati liquoris accipe ꝑ xv. quibus admisce hieræ simp. electuarii è succo rosarum an. ꝑ vi. Olei violarum, chamæmeli an. ꝑ i. & s. salis communis ꝑ i. Fiat enema, quod tepidum rectò intestino infundatur jejuno adhuc existènte ventriculo.

Sequenti tandem die in aurora deglutendæ præbeantur sequentes pillulæ.

Pillule. R. Maf. pill. aurearum, cochiarum, lucis major. an. ꝑ i.

Diagridii gr. iiii. formentur pill. n. 27. cum aq. betonicæ, post quarum assumptio-

nem abstineat æger à potu ciboque per spacium sex horarum.

Averfio quoque acrium vaporum oculos ferientium molienda erit cum per pedum lotiones in decocto chamæmeli, tum per fortem confricationem plantarum pedis cum sale & acri aceto.

Quibus ritè adhibitis tandem ad topica remedia deveniendum erit, ac primum omnium dolor & inflammatio mitigetur, oculos exulceratos in dies fomentando sequenti decocto.

℞. Sem. Fænu Græci contusorum ꝑ i. Fomentatio. Maluæ, rosarum, caput pateris an. M. i.

Coquantur in q. s. aquæ, qua tepida foveantur oculi ac tandem sequens collyrium instilletur.

℞. Cerussæ cum aqua rosea probè elotæ ꝑ i. s. Collyrium consolidans & anodyn. Sarcocollæ ꝑ s. draganti opii Thebaici an. ꝑ s.

Tenuissimè pulverisata resolvantur cum aqua rosarum & lacte muliebri p. æ & q. s. fiat collyrium.

Porro si sordida ac purulenta existat exulceratio, primum eluatur ac mundetur cum mulsâ tepida, ac mitigetur dolor, illita oculis mucilagine fænu Græci cum lacte muliebri parata, qua absterfa post doloris mitigationem sequens collyrium instillatum ulcus ipsum sanat & ad cicatricem deducit.

℞. Pompholyginis cum aqua rosea elotæ ꝑ s. Collyrium aliud sarcoticum. Plumbi usti ꝑ ii. Croci gr. v. Squama æris Hopfferiag ꝑ i.

Ex his tenuissimè tritis fiat collyrium cum aqua pluviali. Aut utere sequenti collyrio Rhafis.

℞. Plumbi eloti, vel ex confricatione plumbi cum aqua rosea collecti liquoris vel luti.

Antimonii, pompholyginis ablota, æris usti, gummi Arabici.

Draganti an. ꝑ i. opii gr. v. cum aquæ pluvialis q. s.

Fiat collyrium.

3. Cicatrix oculorum quid, quæ cuius causa, & qua ratione curanda?

Albugo oculi quid. Ulcera oculorum curata ut plurimum sui vestigia post se relinquunt, quæ Græcis λευκώματα, Latinis albugines & nubeculæ nominantur.

Causa. Causa talium nubecularum est exulcerationis præcedens curatio.

Signa. Signa cicatricum in oculis sunt albæ maculæ in nigro oculo apparentes. Contingunt autem hæ maculæ ex callo, densitateque contractæ cornæ tunicæ, quæ aliquando planæ, quandoque & cavæ conspiciuntur.

Curatio. Curatio cicatricum in oculis bona victus ratione & topicorum remedium maculas abstergentium adhibitione perficitur.

Dieta. In victus ratione conveniunt cibi boni succi, & facile concoquibiles, non evaporantes. Vitanda itaque sunt omnia dura, concoctu difficilia, acria, salsa, vaporosa & mali succi edulia, & simul vini potio.

Topica. Topica remedia cicatrices abstergentia matutino tempore post excrementorum alvi & cerebri excretionem evacuationemque oculis illiniri debent, eorum autem remedium præcipua hæc sunt.

Collyrium abstergens. ℞. Lactis equini ℥ iiii. mellis virginei, commisceantur ad lentum ignem, fiat collyrium.

Efficacissimus est in delendis cicatricibus & sequens pulvisculus.

Pulvis egregius ad delendas cicatrices oculorum. ℞. Succorum chelidonie majoris, centaurei minoris, induratum an. 3 i. sacchari candi 3 ii.

Sarcocollæ, cornu cervi usti & præparati, galbani an. 3 s.

Oleo salis vel vitrioli chymici utuntur. Tenuissime contrita commisceantur, & vel per se, vel cum melle virgineo mixta oculorum cicatrici illinantur.

Fortior autem est in delendis nubeculis sequens pulvisculus.

Alius pulvis fortior. ℞. Ossium sepiæ piscis, sarcocollæ, rad. Aristolochiæ rotundæ,

Myrihæ, spumæ vitri, sacchari candi an. 3 ii.

Æris usti & eloti 3 i. omnia tenuif-

simè contrita & in pulverem redacta, misceantur oculisque indantur.

9. Pustula oculorum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis tollenda?

Φλύκταινες, Celso pustulæ oculorum nominantur, quæ sunt exiguæ quædam instar minutissimarum bullarum in cornea tunica excrecentiæ vesiculæque.

Causam habent oculorum pustulæ *αἰσθητική* causa. γαμέλιον tantum, ferventiores videlicet accrioresque humores per duram meningem ad oculos defluentes.

Signa pustularum manifesta sunt, Visu enim deprehenduntur. Humoris vero vitiosi ad oculos defluentis speciem ex doloris qualitate, & colore pustularum interoscere licet. Dolor enim acris & color pustularum flavescens, biliosos; mitis autem dolor & rubeus color, sanguineos humores causam pustularum esse ostendit.

Curantur pustulæ venæ sectione, victus Curatio. ratione, & medicamentorum administra-

tione. Si adsit plethora, id quod ex rubedine pustularum totiusque faciei percipere licet, *Vena se-* *atio sepius* vena est secanda cephalica, & quidem bis reiterata terve sectio in uno mense est reitanda. *prodest.*

Victus ratio laboranti ea est præscribenda, ut nimirum vitet vociferationem, multiloquium, & sternutationem, aeris solisque splendorem, corporis vehementiorem motum, & vini potionem; & alimentis utatur æger mollioribus, boni succi & concoctu facilibus eisque temperatissimè.

Potus ei sit aqua hordei in qua cinamomi frustulum & coriandrorum semina sunt incossa. Post venæ sectionem, subtrahantur vitiosi humores totius corporis sequenti enemate.

℞. Herb. betonicæ,

Majoranæ,

Feniculi an. M. i.

Flo. Chamæmeli, meliloti, Maluæ,

anethi, centaurei minoris an. M. s. concisa coquantur in q.s. aquæ ad medias colentur, colati juris accipe 3 xiiii. quibus admisce hieræ simp. 3 ii. olei chamæmelini 3 i. salis

Enema.

salis communis ꝓ i. fiat enema quod tepidum infundatur recto intestino jejuno adhuc existente ventriculo. Altero die purgetur cerebrum sequentibus pillulis.

Pillula capitales.

℞. Mas. pillularum aurearum, cochiarum, arabicarum an. ꝓ i.

Diagridii gr. iiii.

Ex quibus contusis formentur pil. n. 27. quæ deglutiantur in aurora sex horis ante alimentorum assumptionem.

Topica.

Evacuato cerebro adhibeantur ipsis oculis topica vocata remedia.

Primum quidem sequens applicetur cataplasma.

Cataplasma.

℞. Vitellorum ovorum n. ii.

Medullæ panis similacei in lacte macerati iterumque expressi ꝓ ii. subigantur simul in mortario, croci ꝓ s. & si vehemens adsit dolor etiam opii Thebaici ꝓ i. quæ tepida per tenuissimum linteolum idque duplicatum extensa, oculorum pustulis imponantur, eo usque donec siccescant. Detracto cataplasmate abluantur oculi decocto fœnugræci, malvæ & meliloti, & sequens illiniatur collyrium.

Collyrium.

℥. Lycii, croci an. ꝓ s.

Acatiæ ꝓ i.

Sarcocollæ, myrrhæ an. ꝓ s. dissolvantur cum ꝓ iiii. aq. rosacæ, fiat collyrium.

10. Nocturna cæcitas quid, qua ejus causa, qua signa, & quomodo curanda?

Nyctalopia quid.

Νυκταλῶψ, nocturna cæcitas est quando homo per diem quidem probè cernit, occidente vero sole obscurius, noctu autem accensa licet candela penitus nihil videt.

Causa.

Causæ hujus mali internæ sunt, spirituum visivorum paucitas & turbiditas, atque humorum in oculis redundantia & obscuritas, tunicarumque crassities.

Signa.

Signa ex relatione ægri dignosci possunt.

Visus pro luna motu & lumine viget.

Qui hoc symptomate laborant propter nocturnam cæcitudinem id peculiare habent ut etiam interdiu circa novilunium melius ac exactius cernant, circa plenilunium vero obscurius videant, id quod & in equis,

& in aliis animantibus contingere consuevit.

Curatur hoc malum venæ sectione, vietus ratione, & pharmacorum usurpatione. Curatio itaque, si corporis constitutio & ætas patitur, à venæ sectione auspicanda erit. Qualis enim est sanguis, tales sunt perpetuo spiritus in corpore. Ante venæ sectionem vero corpus est evacuandum sequenti enemate.

Curatio.

Venæ sectio.

Enema.

℥. Betonicæ, majoranæ, fœniculi, malvæ, meliloti, mercurialis an. M. i. sem. carvi ꝓ s. contusa & concisa coquantur in aqua q. s. ad tertias, colentur, colati juris accipe lib. i. in qua dissolve hieræ compositæ ꝓ ii. mellis rosacæ ꝓ i. olei chamæmelini ꝓ iiii. salis communis ꝓ i. fiat enema. Tandem secetur vena cephalica primum: deinde & venulæ in angulis oculorum delitescentes.

Quæ vena incidenda.

Dietæ.

Vetus ratio talis esse debet, quæ & sanguinem & spiritus extenuet. Vitanda igitur sunt omnia incrassantia.

Altero vel tertio die post venarum sectionem (aut si æger non ferat venæ sectionem, post cucurbitularum in cervice applicationem) detrahantur ex cerebro supervacanei humores sequentibus pillulis.

℥. Mas. pill. cochiarum, lucis majoris ꝓ i. an. ꝓ i.

Pillula cephalica.

Trochiscorum Alhandali ꝓ s. Ex quibus contusis cum pauxillo aquæ fœniculi conformentur pill. n. 21. & deglutendæ præbeantur paulo post mediam noctem.

Ad obstruentium humorum detractio- nem ex cerebro, mirificè opitatur sequens errhinon per nares in cerebrum attractum.

Errhinon.

℥. Piperis nigri, sem. staphidis agriæ an. ꝓ i.

Sinapi, majoranæ an. ꝓ s. Omnibus tenuissimè pulveratis admisceatur succi è radicibus betæ rubæ extracti ac colati q. s. hoc est mellis liquidi formam acquirit, cujus duorum pilorum magnitudinem per 4. dies mane jejunus naribus attrahat.

Cerebro probè purgato sequentia topica remedia exhibeantur.

Topica.

Primum fomententur oculi aperti vapore Primæ fomentatio.

Fomentatio.

elixati epatis hircinil, cum quo concoctæ sunt herbæ fœniculi & florum euphrasiz an. M. i. per semihoræ spacium, deinde siccat oculis illiniatur sequens collyrium.

Collyrium visum clarificans.

℞. Fellis perdicis, fellis hirci an. ʒ s.
Mellis virginiei, lactis mulieris sanæ & boni habitus an. ʒ ii.

Experimentum singulare.

Misceantur, & fiat collyrium quod mane ac vespri oculis illiniatur. Aut indatur oculo succus ex recenti epate hircino non salito, quod inter assandum effluxit ac stillavit.

II. *Caligo seu visus obscuritas quid, quæ ejus causa, quæ signa causarum, & quomodo curanda?*

Caligo quid.

Ἀμύγγωσις caligo seu visus obscuritas dicitur, quando alicui citra evidentem aliquam causam visio impeditur, ita ut objecta corpora coloresque quasi per caliginem cernat, pupilla clara & lucida existente.

Causæ externa.

Causæ hujus mali sunt duplices, ἑξωτερικαὶ id est externæ ac remotæ quæ internas causas excitant, veluti sunt crapula, vini immoderata ingurgitatio, intempestiva Venus, & statim à cibo sumpto lectio & scriptatio immoderata, cerebri calefactio in radiis solaribus, crebræ vomitiones &c. Προγυμνάσις causæ hoc est internæ & propinquæ sunt, spirituum visivorum aut penuria aut crassities, aut cornæ tunicæ densitas, aut nervorum opticorum ex crassitis humoribus obstructions.

Signa.

Signa obstructorum opticorum nervorum à crassis humoribus aut vaporibus dignoscuntur ex syncipitis, ac potissimum circa radices oculorum, gravitate: Tunicarum crassities ac corrugatio visu deprehendi potest: spirituum densitas ex tumore oculorum, penuria vero ex collapsu & cavitate eorundem deprehenditur. Reliquarum causarum signa ex relatione ægrotantis, aliisque vitæ circumstantiis animadverti possunt.

Curatio.

Curatio obscuritatis visus perfici debet viâ ratione convenienti, venæ sectione, & pharmacorum convenienti administratione.

Victus ratio causis morborum semper debet esse contraria. Vivat itaque æger in hoc malo quam potest temperantissime, utatur alimentis boni succi & concoctu facilibus: ne alvus sit adstricta studeat, & ubi obstructionem sentit, statim vel enemate vel glande communi, vel esu prunorum Ungaricorum alvum leniat: à vini potu abstineat, Venerem, balnea, intempestiva studia ac somnum meridianum fugiat sedulo.

Vena, si ætas & corporis temperies flagitat, incidatur primum cephalica, deinde & vena frontis, ac si venæ in oculis rubent, etiam ipsæ, quæ in oculorum angulis hærent, ad utramque nasi partem incidantur: aut loco venæ sectionis singulis aut alternis semper mensibus circa plenilunium cervici cucurbitulæ applicentur cum scarificatione. Post venæ sectionem vitiosi humores crassique vapores sequenti potione concoqui & extenuari debent.

℞. Herb. Fœniculi,

Betonicæ,

Euphrasiz an. M s.

Fl. Stachados Arabicæ,

Rorismarini an. ʒ ii.

Rad. Fœniculi,

Apii,

Petroselinini an. ʒ s.

Sem. Anisi, fœniculi, napi an.

ʒ iii.

Contusis omnibus in cantharumque stanneum impositis adfundantur iii. lib. aquæ puræ, addanturque mellis rosacei ʒ ii. & simul in ferventi aqua cantharo collato coquantur per spatium duarum horarum, deinde refrigerata colentur, cujus liquoris assumat æger mane ac vespri ʒ iiii. calefactas.

Hac potione absumpta evacuentur vitiosi humores sequentibus pill.

℞. Mas. pill. cochiarum, lucis major. aurearum an. ʒ i.

Agarici trochiscati ʒ s. Cum aq. fœniculi formentur pillulæ n. 27. Quæ deglutientiæ præbeantur in aurora sex horis ante prandium. Post evacuationem hanc uni-

Ec

versa-

Dia.

Vena se.
ctio.

Potio digestiva.

Pillule oculares visum clarificantes.
Gargarismus phlegmagogus.

versalem utendum & particularibus evacuationibus ex cerebro. Sequenti itaque gargarismate subducendi sunt ex capite pituitosi humores.

℞. Sem. erucæ, fœniculi, carvi an. ʒiij.

Rad. pyretii ʒ s.

Cubearum ʒi. Herb. majoran. rorismarini an. ℞. i.

Aquæ & aceti an. lib. i. Contusa coquantur sub operculo ad medias, colato jussulo admisceantur mellis rosati ʒ ii. Fiat gargarismus, quo tepido singulis diebus jejunus ter quaterque gargarizando eluat fauces & palatum.

Errhinon. Prodest quoque per nares pituitam cerebri elicere, id quod succo radicis betæ rubæ tepido, aut errhino in præcedenti tractatione descripto commodè perfici potest si per nares in cerebri meatus attrahatur. His ritè præmissis tandem & topica remedia & spiritus visivos corroborantia clarificantique deveniendum erit. Illiniantur itaque mane ac vespri oculorum angulis aliquot guttulæ de uno sequentium collyriorum.

Collyrium ad visum acuendum. ℞. Tutæ præparatæ ʒi. camphoræ gr.v. Tenuissimè contrita dissolvantur in ʒiij. aq. rosacæ, fiat collyrium.

℞. Suc. fœniculi, chelidonie defæctorum an. ʒ iiij. quibus admisce mellis virginei liquefacti ʒ s. Fiat collyrium. Aut

Aqua Quercetani ex croco metallo-rum aptissima est ad hunc affectum. ℞. Croci, myrrhæ an. ʒ i. Spicæ indicæ ʒ i. Redigantur in tenuissimum pulverem eisque admisceantur mellis virginei liquefacti ʒ s. Succorum fœniculi, marrubii an. ʒiij. Fiat collyrium.

Collyrium præstantissimum ad visum roborandum. Aut quod præstantius est reliquis, ℞. Aquarum stillatitiarum betonice, rutæ, verbenæ, chelidonie, euphrasie, fœniculi, rosarum an. ʒ i.

Quibus admisce Pulveres tenuissimos pompholigis candidi ʒ s.

Aloës purissimæ, myrrhæ an. ʒ i. Fiat collyrium.

Spiritus visivos auget, extenuat, purificat & cerebrum corroborat sequens tragea.

Tragea spiritus visivos augens. ℞. Sileris montani, sem. fœniculi, napi, anisi an. ʒi.

Flor. euphrasie, rorismarini an. ʒ s. *Similem*

Cinamomi electi, nucis moscatæ, pulverem commenda- *pulverem commenda- dat Tortula de mulier. pass. c. 63. quo refectus est senex quidam qui 12. an. nū perspicillu usus erat.* caryophyllorum, cubearum an. ʒiij. Sac- cary albissimi ʒ iiij. Omnia tenuissime pulverata misceantur, fiat tragea, de qua sumat laborans caligine oculorum ʒiij. cum à prandio tum à cæna iturus cubitum. Aut pro occludendo ventriculo reprimendisque vaporibus, utatur æger post assumptum cibum semine coriandri laccaro obducto, aut diacitonio simplici cum saccharo parato.

12. Oculorum procidentia quid, qua ejus causa, qua signa causarum, & quomodo restauranda?

Εκπερµε, oculorum procidentia sive Oculi pro- expressio est, cum oculi, vel uvea tunica lapsus aut pupilla à propria sede extorquentur, ex- *quid.* pressique extra calvam persistunt. In qua affectione ut plurimum rupta est aut erosa cornea tunica, aut ejus ligamenta sunt laxata.

Causæ procidentie oculorum *αἰτίαι* - Causæ. *αἰτίαι* quidem sunt humores vitiosi ad oculos defluentes & corneam tunicam aut erodentes aut laxantes. *Προγίγνεται* vero sunt aut violenta excussio oculorum, aut respirationis diuturnior interceptio, veluti accidere consuevit mulierculis uteri suffocatione correptis & difficulter parientibus, item strangulatis, & nonnunquam tubicinibus.

Signa causarum internarum sunt aut do- *Signa.* lor gravis circa radices oculorum, aut pustulæ, sensusque erosionis circa corneam tunicam.

Causarum vero externarum signa cum manifesta sint, ex relatione ægrotantium dignosci possunt.

Curatio pro causatum varietate instituenda est. Si itaque venulæ per oculos sparæ rubicundiores, & tunica cornea cruenta conspicitur, corpusque patientis sit plethoricum, in iis primum omnium vena humeraria quam cephalicam vocant, deinde & frontis vena incidendæ erunt. *Vena sc-* *Quo.* *Cucurbitula.* Quin & cucurbitulæ cum scarificatione cervici utiliter imponi possunt. Si autem adfluxione humo-

humorum pravorum procidentia oculorum contingat, primum concoquantur humores sequenti potione.

*Potio de-
rens &
præparans.*

℞. Aquar. stillatitiarum betonica, fœnuculi, euphrasæ an. ʒi.iii.

Oxymellis scillitici, syr. è stæchade, de betonica an. ʒii. Misceantur, fiat potio de qua ægotanti mane ac vesperi ʒi.iii. tepidæ exhaustiendæ præbeantur.

Absumpta potione evacuentur vitiosi humores sequentibus pillulis.

Pillula.

℞. Mas. pil. Aurearum,

Cochiarum,

Lucis majoris an. ʒi.

Trochiscorum alhandali gr. v. cum aq. fœniculi formentur pill. n. 27. quæ deglutiendæ præbeantur in aurora sex horis ante prandium.

*Causa re-
spirationis
intercepta
tollenda.*

Porro si oculorum procidentia ab interceptione respirationis quacunque ex causa contingat, causa primum est curanda. Quando itaque mulierculis vel ex suffocatione uteri, vel ex laborioso partu oculi prolabuntur, suffocationis, difficultatisque pariendi causæ removendæ erunt.

Qua autem ratione & quibus remediis perfici queat, suo loco inter affectiones matricis declarabimus.

Topica.

Sublatis procidentia causis, statim topica remedia prominentibus oculis sunt adhibenda. Primum itaque fomententur aut foveantur eminentes oculi, aut vapore aut liquore tepido molli sponsia excepto, decoctionis chamæmeli, meliloti aut fœnugræci. Ex post fomentationem sufficientem, oculis extuberantibus sequens Collyrium instar cataplasmatidis est applicandum.

Epithema.

℞. Mellis virginei ʒ i.

Croci ʒ s.

Myrrhæ,

Olibani an. ʒ i.

Tenuissimè pulverisata melli admisceantur ac fiat unguentum, quod serica lana mollissima exceptum oculis imponatur. Ut autem adfluxus humorum inhibeatur, succus polygoni herbæ, cui nonnihil boli armeniaci, & succi acatiæ, tenuissimè contriti ad-

mixtum est, qui tepidus duplicatis fasciis exceptus, fronti imponatur & alligetur.

13. *Strabismus sensu sciofitas, sive obliquus aspectus quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?*

Στραβισμός vel Ἀλγεσφῆ, Latinis obliquus aspectus, *Schielheit der Augen*/ *smus* est oculi convulsio, quæ oculus in obliquum *quid.* ita contorquetur, ut nequeat utriusque oculi unus & rectus aspectus esse.

Causæ strabismi propinquæ & internæ *Causa.* sunt, aut musculorum in oculis molliities & resolutio, aut nervorum ex secunda conjugatione cerebri ortorum, musculisque implantatorum convulsio, aut est crystallini humoris inversio. Remotiores vero causæ sunt, aut nimia humiditas, musculos oculorum laxans, aut nimia siccitas nervos contrahens. Externæ causæ in infantibus, quibus hæc affectio familiaris esse consuevit, est intuitus repentinus vel rerum terribilium vel vehementer splendentium.

Signa sunt manifesta. Strabismus enim *Signa.* non levem infert deformitatem cum ad superna aut inferna aut ad alterutrum latus contorti sunt oculi. In adultis rarissimè, in infantibus vero facilius emendari potest.

Curatur strabismus in infantibus, si noctu accensa lucerna in adversam partem, quam detorti sunt oculi, ita collocetur ut si oculi sursum detorti sunt, deorsum ad pedes sit sita lucerna: si vero deorsum, ad frontem sit collocata: si vero in alterutrum latus, ex adverso aspicienda ponatur: eoque modo infans subinde in contrariam partem aciem oculorum dirigat. Interdium vero cunæ in quibus infans jacet ita collocentur ut recta lucem aspicere, oculosque nec sursum nec deorsum flectere queat: at si oculi in obliquum rapiantur statim cunæ ita collocentur ut ex opposito lucem recta habeat. Præstat & picturas illustres, splendidosque colores præsertim cæruleos ac rubeos, in quos oculos dirigere queat infans, ex opposito collocare.

nii, portulacæ an. ʒ ii. Misceantur & auribus instillantur.

Quod si autem & febris adsit, & humores vaporesque calidi infestent hominem, sequenti potiuncula subducendi sunt humores.

℞. Elect. lenitivi ʒ i. è succo rosarum Mesues ʒ ii. aquæ Cicoreæ ʒ v. Misceantur fiat haustus, qui in aurora ebibendus exhibeatur tepidus, quo sumpto absteineat æger à cibo potuque per sex horarum spacium.

Ubi vero hisce topicis dolor ex inflammatione non mitigetur & ratio turbari incipiat, tum ad narcotica, opiatque remedia confugiendum erit; quibus tamen caute ac prudenter uti debet Medicus, ne ita organa auditus stupefaciat ut auditui obesse queat. Itaque

℞. Opii Thebaici ʒ i. Castorei medullæ ʒ ii. Dissolvantur in ʒ iir. lactis muliebris, percolentur & ejus liquoris guttulæ aliquot tepidæ auribus instillantur.

Ubi vero inflammatio aurium in apostema est conversum, ad suppurationem duci debet humor seu apostema, quod sequenti liquore commodè fieri potest.

℞. Olei Liliorum alborum, adipis gallinæ, anatis an. ʒ ii. Misceantur ac tepida subinde auribus instillantur. Suppuratione enim facta statim pus profluet & subito dolor omnino cessat.

Porro ubi dolor aurium ex frigida intemperie obortus sit vel ex illapsu frigidæ aquæ, vel irruptione ventorum gelidorum, præstat statim aquam aut auram frigidam ex auribus vel per calamum sugendo ejicere ac tandem refrigeratis membranis sequentia topica remedia instillare.

℞. Olei rutacei, laurini an. ʒ s. Lilliorum alborum de euphorbio an. ʒ i. Liquefiant simul & aliquot guttulæ auribus instillantur. Aut

℞. Cæpam grandiusculam ab interna medulla excavatam, cujus cavitas repleatur oleo dulci olivarum, & igne assetur & succus cæpæ cum oleo exprimat, ejusque guttulæ auribus instillantur.

Si dolor à flatulentis spiritibus crassisque vaporibus excitetur, quod ex sonitu in auribus dignosci potest, accipe ʒb i. milii quod torrefactum fervidumque in lineo sacculo impositum, frequenter auribus applicetur. Discutit enim flatu in auribus omnes. Aut

℞. Stachados Arabicæ, majoranæ, rosmarinum, mentastri, serpilli an. M. i. Concisa coquantur, quorum vapor tepidus in aures dolentes excipiat. Sedat enim aurium dolores omnes.

5. *Surditas, quid, quæ ejus causa, quæ signa causarum, & quibus remediis curanda?*

Κόφωσις, surditas, aut *ὑποακουλία* auditus difficilis, aut *βαρύνγλια* id est gravis auditus, quid est ubi quis voces ac sonos aut profus nullo audit, aut magnas etiam acclamationes difficulter audit, quæ affectione laborantes Latini subfurdi, surdastrique nominantur.

Surditas omnis aut simul connascitur, aut per accidens oboritur. Surditatis per accidens ortæ causæ *ἀσθενήματα* sunt aut vapores biliosi, aut humores crassi nervos auditorios obstruentes, & facultatem animæ auditricem interceptantes: aut est cerebri intemperies ac læsio in parte illa ubi nervi *ἀκουσικὴ* originem habent. *Πεονεργατικὴ* autem causæ sunt violenti ictus circa aures, unde aut grumi sanguinis aut fordes ab abscessibus in auribus contingunt, auriumque foramina obstruunt.

SIGNA causarum recitararum sunt, si *Signa diversarum causarum surditatis.* surditas à biliosis vaporibus aut humoribus lentis sit orta, ut plurimum surditatem febris ardens præcessit, & patientis corpus biliosum est. Si autem à crassis lentisque humoribus obstructi sunt nervi auditorii, una adest capitis gravitas & sibilus in auribus. Si fordes ex apostemate, aut ex ictu grumi sanguinis aurium meatu obstruxerunt, & visu dignosci & scalpello explorari, & ex relatione patientis cognosci potest. Signa prognostica sunt, si *Prognostica.* surditas congenita est, curationem nunquam

quam recipit humano præsidio. Diuturna surditas difficilem admittit curationem: Quibus vero in febribus aures obsurderunt, teste Hippocrate 4. Aphor. 60. si sanguis è naribus profluat aut alvus turbetur biliosa-que deiciat, statim solvi surditatem.

*Curatio
surditatis
ex biliosis
evaporati-
onibus.
Vena se-
ctio.*

Curandi ratio pro diversitate causarum varianda erit. Ubi itaque surditas post biliosas febres morbosque ex evaporatione biliosa oboritur & corpus sit plethoricum, sanguis ex epatica vena dextri brachii detrahatur & biliosi humores per sequentem haustum deiciantur.

*Hauftus
cholago-
gus.*

℞. Elect. lenitivi ʒ vi.
Rosati Mesuei ʒ iiii.
Aq. cichoreæ ʒ v.

Misceantur, fiat haustus, qui tepidus in aurora sex horis ante prandium exhauriatur.

Detractis biliosis humoribus statim cessat surditas. Sive enim sponte ac natura in surditate deiciatur bilis, semper surditatem auferit teste Hippocrate 4. Aphor. 28. Deinde deveniendum est ad topica remedia. Utatur itaque æger frequenti capitis pedumque lotionem aquæ dulcis tepidæ in qua cocta sunt flor. chamæmeli, rosarum rubearum, malvæ, majoranæ & similes. Tandem sequenti fomento commodè uti licebit.

*Fomenta-
tio.*

℞. Fol. violarum, salicis, althææ, malvæ, lactucæ an. M. s. Decoquantur in q. s. aquæ, quarum vapor per canalem infundibuli in aures recipiatur. Deinde foraminib. aurium instillantur aut aquæ ex amputatis palmitibus sponte destillatæ, aut lactis muliebris guttulæ aliquot reperfactæ.

*Surditatis
à crassis
humoribus
remedia.*

Si vero surditas à crassis pituitosisque humoribus nervos auditorios obsidentibus sit exorta, tum illi ipsi humores concoquendi & extenuandi erunt sequenti potione.

*Potio dige-
stiva.*

℞. Betonicæ,
Origani,
Majoranæ,
Serpilli an. M. s.
Rorismarini,
Stæchados Arabicæ an. p. i.
Rad. Afari,
Petroselinii,

Pæoniæ an. ʒ ii.

Schænathi,

Cubebæ an. ʒ i.

Sem. Anisi,

Feniculi,

Carvi an. ʒ ii.

Concisa & contusa coquantur in cantharo aut duplici vase cum t̄b iiii. vini Rhemani per 2. horas, deinde refrigerata colentur,colato liquori admisceantur oxymellis sciliciti ʒ iiii. Syr. è stæchade, è betonica an. ʒ ii. fiat potio, de qua bibat æger mane ac vesperti haustum ʒ v. tepidum, donec tota potio sit exhausta. Ita tandem crassi humores sufficienter concocti & ad educationem præparati evacuentur: aut sequenti haustu cathartico.

R. Elect. Indi majoris ʒ v i.

Diacatholici,

Diaphænicon. an. ʒ ii.

Aq. Betonicæ q. s. fiat haustus, qui tepidus sex horis ante prandium ebibatur, aut sequentes pillulas in aurora deglutiat.

℞. Mas. pil. cochiarum, arabicarum,

Alephanginarum an. ʒ i.

Trochiscorum Alhandali gr. iiii. ex quibus conformentur pillulæ n. 27. cum melle rosaceo. Altero aut tertio die post evacua-

tionem ebibat æger haustulum ex Theriacæ Andromachi ʒ i. s. & aquæ rutæ q. s. simul mixtis confectum, & per horam sudori profundendo det operam. Postea curabimus

sedulo, ut cerebri excrementa cum per palatum gargarismate, & per nares errhinis, (quorum formulas supra in cephalalgia à frigidityte ortæ curatione & à pituitosis humoribus, aliisque locis tradidimus) evacuentur, & ea omnia huc commodè referantur.

Prodest & caput frequenter lavare lixivio calido in quo concocta sunt folia juglandis aut sequentes herbæ.

℞. Betonicæ,
Majoranæ,
Serpilli,
Meliloti,
Chamæmeli,
Lavendulæ an. M. s.

*Hauftus
purgans
pituitam.*

*Pillula
phlegma-
goga.*

*Hauftus
diaphoretici-
cus.*

*Particula-
ris cerebri
evacuatio.*

*Lixivium
pro ablu-
tione capi-
tis.*

*Fl chame-
meli re-
medium
præstantiss.*

Topica remedia primum quidem leviora, postea si parum proficias etiam fortiora auribus sunt instillanda, inter quæ generosum est remedium, Oleum ex floribus chamæmeli arte chymica destillatum, cujus guttulæ tepidæ aliquot instillandæ veniunt. Aut

*Olea auri-
bus instil-
landa.*

*Experi-
mentum
ad surdi-
tatem sin-
gulari.*

*Chymici
nonnulli
Q. E. vi-
ni g. j.*

*quosdam
auribus
indunt ad
surditatem
minuen-
dam.*

*Alii a-
quam*

*Card. Bene-
dict. ali-
quoties de-
stillatam
hic com-
mendant.*

*Surditas
ex confu-
sione vel
plaga in-
curabili.*

*Tinnitus
aurium
quid.*

Causa.

℞. Olei amygdalarum amararum, nardini, laurini an. ꝑ i. Commisceantur & guttulæ tepidæ auribus instillantur.

Omnium autem præstantissimum & experientia comprobatum ad surditatem tollendam remedium est succus ex ovis formicarum expressus, vel aqua ex ipsis formicis earumque ovis simul arte chymica destillata auribusque guttatim infusa. Ejusdem efficaciz est & fel leporinum cum pari portione mellis virginici commixtum & auribus instillatum.

Surditas quæ ex obstruente auribusque impacta sanie oritur, quomodo curanda sit, paulo post in curatione purulentarum aurium, ulcerumque ejus manantium docebimus.

Surditas quæ ab ictu, frequentibusque plagis capitis oborta est, si per aliquot menses perseveraverit & topicis remediis adhibitis non solvatur, incurabilis permanet.

4. *Sonitus aurium quid, quæ ejus causa, quæ signa causarum, & quibus remediis curandus?*

℞. Sonitus, *τρεῖς*, strepitus sive sibilus, *βέβη* tinnitus ejusdem affectionis aurium sunt species. Est autem quando intra aures soni alicujus peregrini species, veluti tintinnabuli, campanulæ, follium fabrorum, papyri laceratæ sonus, aut cicadarum strepitus, non foris extrave aures edidit, sentitur auditumque offendit.

Causæ hujus mali sunt *αἰσθητικὴ* quidem flatulenti spiritus inter membranam foramini auditorio prætensam à nervo auditorio ortam, & inter piam matrem, quæ ab invicem incude ossiculo sunt disjunctæ, collecti & inclusi, aut sunt tenues & sicci vapores ex epate, ventriculo aliisque visceribus eo delati, item humores crassi ac leni foramina aurium obstruentes: *αἰσθητικὴ*

αἰσθητικὴ vero causæ sunt capitis plaga, vini meracioris frequens ingurgitatio, crebri vomitus, & aquæ in foramina aurium profluxæ.

Signum flatuosorum spirituum intra membranas inclusorum est, quod tinnitus continû infestat donec discutiantur flatus. Signum crassorum vaporum ex infernis vaporibus ad nervos auditorios delatorum est, quod sonitus in auribus repente excitatus, per intervalla affigit, & rursus cessat. Præterea & cruditas ventriculi adest, & crebræ eructiones. Signa crassorum humorum membranas gravantium sunt, capitis gravitas & sonitus aurium non repenti sed paulatim excitatur & continû durat donec auferantur crassi humores. Causarum externarum signa ex antea acta vita, & narratione ægrotantis dignoscitur.

Curatio, ut in omnibus morbis, pro diversitate causarum varianda erit, causæque removenda, tum per victus rationem, tum per remedium usurpationem.

Victus itaque ratio semper est instituenta causæ contraria. Vitanda itaque sunt in cibo ac potu omnia quæ vel flatulentos spiritus vel evaporationes crudas excitare queant: deinde si aurium tinnitus à flatuosis spiritibus intra membranas contentis, aut crassis humoribus easdemque gravantibus, excitatus sit, primum molienda est capitis purgatio per sequentes pillulas.

℞. Mas. pil. cochiarum, Arabicarum, trochiscorum de agarico an. ꝑ i. conformentur cum q. s. aquæ majoranæ pillulæ n. 27. & deglutiantur post mediam noctem. Tandem evacuentur cum vapores tum humores reliqui cerebri sequenti gargarismate.

℞. Rad. pyrethri ꝑ s. sem. erucæ ꝑ iii. sem. carvi ꝑ ii. majoranæ M. s. aceti & aquæ an. lb. s. oxymellis sciliciti ꝑ ii. Arida crassiusculè contusa & simul commixta coquantur sub operculo ad medias, fiat gargarismus, quo indies mane ventriculo jejuno existente, tepido utatur.

Post gargarismum masticet æger sequentem pulverem.

℞. Flor.

Signa.

Curatio.

Diaeta.

Pillula cathartica.

Gargarismus phlegmogogus.

Pulvis masticatus.

R. Flor. Majoranæ ʒ ii.

Sem. Carvi ʒ iii.

Sem. angelicæ, cubebæ, Macis
an. ʒ i. Concidentur crassiusculè, fiat pulvis
masticatorius cujus pugillum masticet æger
naribus obstructis donec sapor aromaticum
non amplius in ore sentiat, ac tandem ex-
puat.

Topica. His accedant & tinnientis auris fo-
mentatio, topicaque remedia sequentia.
Itaque

*Fomenta-
tio & va-
por deco-
cti herba-
rum.*

R. Fol. Majoranæ,
Stachados Arabicæ,
Rorismarini,
Betonicæ,
Rutæ,
Fol. Lauri,
Absinthii an. M. s.
Sem. Carvi,
Cymini an. ʒ ii.

Concisa & contusa misceantur, saccu-
loque lineo insuantur & in q. s. aquæ sub
operculo coquantur donec ebullire cœpe-
rint. Tandem remota ollula ab igne pri-
mum vapor per canalem infundibuli ollæ
impositi tepidus in aurem tinnientem re-
cipiatur. Postea & sacculus à liquore ex-
pressus & adhuc calens auri imponatur. In
aurium autem foramina instillantur aliquot
guttulæ vini tepidi, in quo incocta sint ca-
storei ʒ i. & spicæ Indicæ ʒ s. Aut

*Auribus
instillan-
da.*

R. Olei amygdalarum amararum ʒ i.
succicæparum, aut porri ʒ s. lactis mulie-
bris ʒ ii. misceantur & ejus guttulæ ali-
quot tepidæ auribus instillantur.

*Chymici
ol. casto-
rii instil-
lantur.*

Ubi vero causa tinnitus per consensum,
aut à biliosa evaporatione interiorum vi-
scerum aut à vaporibus crudis ex ventricu-
lo ascendentibus contingat, vapores illi se-
quenti enemate subducendi erunt.

*Tinnitus
per con-
sensum
partium
inferiorum
remedia.
Enema.*

R. Malvæ,
Violariæ,
Flo. Chamæmeli,
Meliloti,
Centaurii minoris,
Absinthii an. M. s.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad me-
dias, colentur, colati liquoris accipe ʒ i.

cui admisce hieræ simpl ʒ ii. Olei violarum,
si biliosa est evaporation, aut olei absinthii,
si cruditas est causa evaporationum, ʒ iii.
salis communis ʒ i. commixta ac tepida in-
fundantur recto intestino. Deinde si biliosa
est evaporation, sequenti haustu bilis subdu-
catur.

R. Cassiæ recenter evulsæ ʒ i. Elect. ro-
sari Mesuæ ʒ ii. Aq. Cichoræ q. s. fiat hau-
stus qui sumatur sex horis ante prandium.

*Hauſtus
cholago-
gus.*

Cruditæ vero ventriculi si causa sit vapo-
rum tinnitum excitantium, humores crudi
sequenti potione sunt concoquendi.

*Tinnitus
à crudita-
te ventri-
culi ut cu-
randus.
Digesti-
vum.*

R. Rad. Fœniculi, Apii,
Calami aromatici an. ʒ ii.

Sem. Anisi,
Fœniculi,
Carvi an. ʒ iii.

Herb. Mentæ,
Hysopi,
Melissæ,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris an. M. s.

Concisa & contusa coquantur in duplici
vase cum ʒ ii. aquæ ad sesquihoræ spacium,
colentur, colato juri admisceantur Syr. è
menta, oxymellis simpl. an. ʒ ii. fiat potio,
cujus mane ac vesperi ebibantur ʒ v. tepidæ.
Absumpta potione evacuentur crudi humo-
res sequenti haustu.

R. Elect. diaphæniconis ʒ i. hieræ simpl.
ʒ s. Aq. absinth. q. s. fiat haustus, & assu-
matur sex horis ante prandium. Egregiè
quoque concoquit, digerit & discutit cru-
ditates ventriculi ʒ s. vel cochlear aquæ
juniperi manè jejuno ventriculo assumpta.
Plura de cruditate ventriculi infra in curan-
dis affectionibus ejusdem tradituri sumus.

*Hauſtus
purgans.*

Topica quoque sequentia auribus instil-
landa minimè prætereunda. In tinnitu ita-
que à calida evaporatione oborta, auribus
instilletur hic liquor.

Topica.

R. Olei rosacei, lactis muliebris an. ʒ ii.
in quibus commixtis dissolvantur opii The-
baici gr. ii. cujus aliquot guttulæ instillen-
tur, ut dictum est, tepidæ.

*Liquor
narcoticus.*

Si verò vapores crassi crudique excitent
tinnitum,

*Tinnitus
à vapori-
bus crassis
remedium.*

R. Succ

℞. Succī majoranæ ʒ. ii. olei caryophyllorum arte chymica parati ʒi. in quibus commixtis dissolvantur moschi gr. ii. & tepida instillantur.

5. Tumor pone aures quid, quæ ejus causa, quæ causarum signa, & quomodo curandus?

Parotis quid.

Παρωτίδες Græcis, Latinis parotis est tumor qui glandulis inflammatis pone aures & præsertim circa radices aurium jacentibus accidere consuevit, & quidem aliquando cum febre, quandoque etiam citra febrim, ut plurimum post capitis dolores & deliria accidere solet.

Causa.

Causa αἰσθητικὴν parotidum ut plurimum est sanguis vitiosus aut fervens & biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus in venis capitis redundans, & à natura ad glandulosas aurium partes propulsus.

Signa.

Signa efficientis & materialis causæ sunt, sanguinis quidem ferventioris biliosique tumor tubeus & inflammatus ac dolor pulsatilis & acerbus. Sanguinis pituitosi signum est ubi tumor cedematis figuram refert h. e. laxus est & albidior & dolor mitior. Sanguinis vero melancholici signum est, si tumor scirrhum æmulatur h. e. durus ac livescens sineque dolore.

Curatio.

Curatio parotidum pro excitantis humoris ratione, quemadmodum in omnibus tumorum generibus, varianda erit. Parotides, quæ ex ferventiori biliosoque sanguine originem habent, curandæ sunt instar tumorum præternaturalium, quas φλεγμονῆς & erysipelata nominant. Omnium itaque primum in parotidibus inflammatis alvus, & per consequentem ferventior sanguinis impuritas sequenti enemate subducatur.

Enema.

℞. Malvæ, althææ, violariæ,
Flo. centaurii minoris an. M. s.
Quatuor seminum frigidorum majorum an. ʒ ii.
Prunorum dulcium exiccatorum n. x.
Concidenda concidantur contundendaque contundantur, & in q. s. aquæ conco-

quantur ad tertias, colati liquoris accipe ʒ xv. quibus admisce cassiæ extractæ, hieræ simpl. an. ʒ i. Ol. violarum ʒ iiii. salis communis ʒ i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Post alvi evacuationem incidatur vena cephalica affecti lateris. Altero die à venæ sectione reliquæ ferventium humorum sequenti haustu eyacuentur.

℞. Rhabbarbari electi ʒ i. s.

Thamarindor. ʒ s.

Venæ sectio.
Haustus cholago-

Contusa macerentur per noctem in aqua cicoræ ʒ vi. deinde leniter ebulliant, fortiter exprimantur ac colentur, colato jussculo admisceantur elect. lenitivi, rosati Mesuæ an. ʒ ii. fiat haustus, qui in aurora tepidus patienti offeratur.

His ritè peractis ad topica accedendum erit, ac tumori primum anodyna id est dolorem mitigantia, & deinde suppurantia, sive maturantia pharmaca applicanda erunt. Cavendum autem ne in initio tumori repellentia & astringentia, qualia sunt omnia quæ refrigerant, imponantur. Repellunt enim materiam vitiosam, & augment dolorem. Primum itaque tale cataplasma anodynum tumori commodè applicabimus.

℞. Ol. olivarum in aqua calente beneloti ʒ ii.

Butyri recentis non saliti ʒ i.

Vitellorum ovorum n. ii.

Muccaginis seminis lini & sænugræci cum aqua simplici & pauxillo aceti præparata ʒ ii. Misceantur, fiat cataplasma, quod tepidum duplicatis linteolis exceptum tumori bis indies imponatur. Remittentibus doloribus aliud cataplasma suppurans & ad maturitatem tumorem perducens imponi debet, quod hoc modo conficitur.

℞. Pollinis five fatinæ volatilis in molendinis parietibus adherentis, Cataplasma mala-
Pul. Sem. lini, sænugræci an. ʒ i. ticon &
Pinguetinis porcine recentis & non suppuratorum.
salitæ ʒ ii.

Ficuum probe contusarum ʒ s.

Muccaginis ex decocto rad. althææ, malvarum,

Flor. Chamæmeli & millitoti confectæ

Ff

q. s. ad

Cerebrum roborantia.
Apoſtoma aperiendum.
 q. s. ad conformationem cataplaſmatis, quod tepidum bis in die tumori imponatur. Interim nec cerebrum negligendum est, ſed quotidie mane ac vesp̄ri corrob-
 randum erit rotulis r. diarhodon abbatis. Ubi vero tumor ad maturitatem perductus est, quod ex ejus mollitie dignoscere licet, chirurgica manu scāpello aperiatur, pus-
 que exprimatur ac vulnus purificetur, & communibus emplastris diateſaron & ci-
 trino diſtis ad cicatricem deducatur.

Parotidum ex pituita vel melancholia remedia.
 Porro parotidibus ex pituitoso sanguine instar œdematis aut ex melancholico fuc-
 co instar scirrhī progenitis, talis curatio ad-
 hibenda erit.

Primum concoquatur & extenuetur vi-
 tiosus humor in capite collectus, deco-
 ctionibus, syrupisque supra in cephalalgia
 speciebus à pituita & melancholia ortis, de-
 scriptis, vel sequenti potione.

Potio digestiva.

R. Mellis rosarum,
 Oxy mellis scillitici,
 Syr. è stachad. an. ʒ i. s.

Aq. stillatitiarum betonicae, fumarie,
 melissae an. ʒ iiii. Misceantur fiat potio, cu-
 jus ʒ iiii. tepida mane ac vesp̄ri ebiban-
 tur. Potione hac exhausta purgetur cere-
 brum sequentibus pillulis.

Pillula cephalica.

R. Mas. pil. cochiarum, aggregativa-
 rum, arabicarum an. ʒ i. cum aqua ma-
 joranae formentur pill. n. 27. quæ deglutian-
 tur sex horis ante prandium. Aut evacuen-
 tur cerebri excrementa sequenti haustulo.

Haustus phlegmagogus.

R. Diacatholici ʒ s. Diaphœniconis
 ʒ iiii. Dissolvantur cum q. s. aquæ majora-
 nae, fiat haustus; qui tepidus sex horis ante
 prandium ebibatur. Tandem indies corro-
 boretur cerebrum sequenti elect.

*Elect. cere-
 brum cor-
 roborans.*

R. Theriaca Andromachi ʒ s.

Confer. rorismarini, melissae an. ʒ i.
 Sp. diamoschi dulcis, diambrae an. ʒ i.
 Syr. è stachade q. s. misceantur fiat ele-
 ctuarium, de quo mane ac vesp̄ri assumat
 patiens quant. semijuglandis.

*Topica. Vnguenum emol-
 liens.*

Topica vero remedia tumori hæc com-
 mode applicabuntur.

R. Pinguedinis porcinæ antiquæ & li-
 quefactæ, gallinacæ, anserinæ an. ʒ ii.

Ol. liliorum alborum, irini, mellis vir-
 ginei an. ʒ i. Commisceantur, fiat linimen-
 tum, quo tepido tumor probe inungatur:
 & statim post inunctionem sequens cata-
 plasma singulis diebus bis usque ad molli-
 tiem tumoris imponatur.

R. Capparum in ferventi cinere cocta-
 rum ʒ iiii. *Cataplasma mala-
 thicon.*

Pul. fenugræci, orobi, lini an. ʒ s.

Ol. liliorum alborum q. s. Commiscean-
 tur instar cataplaſmatis & calidum impo-
 natur. In scirrhosis autem parotidibus du-
 risque tumoribus, post tumoris inunctio-
 nem sequens emplastrum utiliter impo-
 nitur.

R. Sem. sinapi, urticæ, sulphuris vivi, Empla-
 spumæ maris, Aristolochiæ rotun-
 dæ an. ʒ ii. *Empla-
 strum ad
 scirrho-*

Bdellii, ammoniaci in aceto soluti
 ac colati an. ʒ s. *ſas paroti-
 des.*

Ol. irini & ceræ albæ an. q. s. fiat em-
 plastrum, quod per alutam tumori adapta-
 tam extendatur & parotidibus applicetur.

(Aluta ein Semisch fell.)

6. Aurium purulentia sive fluxio quid, ex
 quibus causis oritur, quibus signis
 dignoscitur, & quomodo cu-
 randa?

Πυρρῶνται αὐτί, purulentæ aures dicun-
 tur quando ex auribus aut ἰχῶρες aut sanguis
 tenuis aut pus saniesve ex auribus profluit.
 Profluit autem aut continuè, aut περιόδι-
 κῶς. puerulis familiare malum, sed omnis
 excterio quæ per aures fit, à natura est alie-
 niſſima. Naturales enim viæ per quas ce-
 rebrum expurgari debet, sunt nares & pa-
 latum.

*Purulen-
 tia aurium
 quid. Differen-
 tia. Biliosum
 tamen ex-
 cremen-
 tum pau-
 cum per
 aures na-
 turaliter
 expurga-
 tur. Causa.*

Causæ αἰσθητικῆς fluentium aurium
 sunt, aut nimia humiditas cerebri, veluti
 in infantibus, aut vitiosus acrisque sanguis,
 membranas, aurium foraminibus præten-
 sas, erodens; aut abscessus, intra aures ab
 impuro sanguine inter membranas, tenuem
 atque crassam menyn gem circa aures sitas,
 coacervatus. Causa vero abscessus αἰσθη-
 τικῆς est ictus violentus aut capitis per-
 cussio.

Signa causarum sunt manifesta. Si enim Signa.

ἰχῶ-

is profluant, humiditatem: Si sanguis acris, erodentem humorem: Si pus, abscessum intra aures, fluoris causam esse ostendit.

Prognostica.

In fluore aurium hæc prognostica sunt notanda. In abscessibus aurium, nisi pus profluat, epilepsiam infert. Si autem mature profluxerit, doloris, gravitatisque capitis levationem insignem adfert. Nulla itaque aurium fluxio temerè ac citò cohibenda est, nisi diuturnitate affligat hominem.

Aurium fluxiones non cito cohibendas esse.

Curatio.

Curandi ratio pro causarum varietate dirigenda erit. Cum itaque fluunt aures ob nimiam cerebri humiditatem, exiccando & evacuando curabitur. Remedia autem quæ cum intra corpus sunt assumenda, tum foris applicanda, supra in specie cephalalgicæ, ab humiditate orta, sufficienter enumerata sunt. In genere autem hoc loco notasse satis erit, in omni fluxu ex auribus, primum aures esse à sordibus per auriscalpia vocata, instrumenta, quæ Galeno ἀντρυχίας nominantur, emundandas esse. Deinde hydromelis tepidi guttulæ aliquot auri fluenti sunt instillandæ, & post horæ quadrantem rursus ex auribus effundendæ.

Mundatio aurium per antrychias.

Fluxio periodica quibus prolecienda.

Ubi vero fluxio periodica sistatur meatusque obstruat, hominemque in metum epilepsicæ conjiciat, statim aut tepido hydromelite, aut oleo ex floribus chamæmeli arte chymica destillato & auribus instillato, obstructio aperienda erit. Verum si fluxio diutius perduret, tum sequens linimentum lana mollissima aut bombace exceptum, & prædicto instrumento involutum fluentibus auribus indatur.

Linimentum nimium fluxum cohibens.

℞. Vini rubei stiptici, vel in quo candens chalybs est extinctus ʒss.

Mellis rosacei ʒ ii.

Aluminis crudi tenuissimè pulverati ʒ i.

Misceantur, fiat linimentum instar collyrii.

Fluxio ab exulceratione ut curanda.

At vero si pus ab exulceratione profluat aut sanguis, post elotionem cum tepido hydromelite, sequens remedium tepidum instillandum erit, aut, ut præscriptum, lana tenuissima exceptum auribus imponendum.

Liquor au-

℞. Sarcocollæ, aloës purissimæ, thuris an. ʒ i.

Squamæ aris cum aceto præparatæ *rib. indendus exsic-*
aut croci martis ʒ ii. *cans val-*

Omnia tenuissimè pulverata & q. s. vini rubei chalybeati temperentur ac misceantur, fiat linimentum instar collyrii.

Præscripta remedia tantisper repetenda erunt, donec omnis exicetur humiditas, & ulcus ipsum consolidetur. Quin & saniei ex auribus profluente præclarè medentur hæc sequentia:

Oleum ex seminibus cannabis paratum, *Saniei*
aut succus ex ejus floribus expressus, aut *profuentis*
oleum irinum, aut oleum terpenthinum *remedia.*
auribus tepidum instillatum. Foris autem auribus fluentibus humiditatem exiccantia commodè imponi possunt, veluti sunt *Sacculus.*
sacculus ex torrefacto & adhuc calente milio concinnatus. Si vero fluxioni adjunctus sit dolor acerbus, granis 2. opii in lacte muliebri solutis, auribusque instillatis dolor mitigari potest. *Anodyna.*

7. Vermiculantes seu verminosa aures, & vermes foris irrepentes, aut alia corpuscula aurium meatibus incidentia, quomodo curanda?

Verminosæ aures, Græcis σκωληκάντæ *Vermes in*
ἀντρυχίαι nominantur: vermes autem quando- *aures quo-*
que, quanquam rarius, innascuntur *modo irre-*
auribus sordidis, exulceratis ac purulentis. Foris *pant.*
vero irrepunt vermiculi frequentius, quales sunt pulices & oblongiusculi puniceique coloris vermiculi, qui in putrefactis lignis & circa vitium antiquarum radices nascuntur, quos auriculares vermes vocant.

Causæ vermium in auribus nascentium, *Causæ.*
est fordida exulceratio internarum circa aures partium. Signa ejus mali evidenter sunt, dolor nimirum, pruritus, & titillatio aurium, ex quibus vel sponte albicantes vermiculi prorepunt, vel auris scalpello excipiuntur.

Curatur hoc malum mundificatione, & *Curatio.*
ulceris consolidatione, iisdem remediis & instillationibus quæ in præcedenti quæstione sunt enumeratæ.

Enecantur autem in auribus vermes, cum *Vermes*
Ff 2 ii, qui

*aurium e-
necantia
remedia.*

ii, qui in eis sunt geniti tum qui foris inci-
derunt succo mentastri *ψερδενύργε* /
aut succo foliorum persicorum, aut succo
absinthii, quibus pauxillum aloës est admi-
xtum, si tepidi auribus instillantur.

*Signa ver-
mium in
auribus.*

Signa vero vermium foris irrepentium,
sunt strepitus in auribus, titillatio & pruri-
tus sine dolore, sineque putis aut humidi-
tatis effluxione, qui strepitus repente exci-
tatur, hominesque non parum anxios reddi-
tur, nisi maturè vermes aut eliciantur, aut
enecentur.

*Quomodo
vermes eli-
ciendi.*

Elici autem possunt vermes ex auribus,
si fasciculus pilorum in hydromelite quade-
factus aurium meatibus inferatur.

*Necantia
vermes.*

Si vero ea ratione vermes elici extrahi-
que nequeant, in ipsis auribus enecandi pri-
mum sunt, & processu temporis auri scal-
pellis expurgandi. Enecant autem vermes
fucci omnes acriores & amariore, aurium
meatibus tepidi instillati, quales sunt suc-
ci rutæ, mentastri, folia persicorum, cæ-
parum, absinthii, vinum in quo cocta
est colocynthis.

Efficaciores autem sunt succi, si pauxil-
lum aloës eis admisceatur.

*Solidum
quid ut ex
auribus
eximen-
dum.*

Porro ubi corpusculum aliquod solidius
meatibus aurium illapsum fuerit, statim
conandum est ut quamprimum eximatur,
alioqui sæpe tumorem, inflammationem,
acerbos dolores, periculosasque convul-
siones in auribus excitat. Primum itaque
lavetur fomenteturque totum caput deco-
cto chamæmelino. Deinde instilletur au-
ribus pauxillum olei chamæmelini, ac tan-
dem excitetur sternutatio pulvisculo Hel-
lebori albi naribus attracto. Ita enim faci-
le excutitur res auribus illapsa nisi gran-
diuscula fuerit, quæ forpecula aut instru-
mento ferreo, hami obtusi formam refe-
rente excipienda, aut saltem artificiosè
comminuenda erit, ut facilius per sternu-
tationem profilire queat.

*Pisæ ex
auribus ut
eximenda.*

At si pisigrana aut materia intumescens
auribus inciderit, tum ab omni humecta-
tione & olei instillatione abstinendum erit,
& instrumentis chyrurgicis aut extrahenda
aut minuenda erit materia.

Si vero aqua aut liquor aliquis in au-
rium meatus illabatur, capite inclinato ad
affectam partem facile liquor profluat,
præsertim ubi sternutatio accedat. Ex infan-
tium auribus aqua illapsa valida suctione e-
lici potest.

SECTIO III.

DE NARIUM MORBIS ET AFFECTIBUS.

1. *Narium morbi qui, & qua ratione curandi?*

Nares non sunt primaria olfactus or- *Narium
gana, sed viæ tantum & receptacula qua- officium.*
litatum odorabilem, rerum odores exci-
pientia, & ad duas molles ac spongiosas
propagines, quæ ex substantia cerebri ad
nasi radicem usque protenduntur, suntque
propriissima olfactus organa deferentia.
Naribus tamen male affectis obstructivè
quoquo modo vitari necesse est sensum ol-
factus, & plurimum impediri respirationem.
Narium porro familiares affectiones sunt:

Sanguinis è naribus eruptio,
Ulcus virulentum seu exulceratio na-
rium,
Carnosa excrescentia seu tumor in
naribus,
Fœtor narium,
Olfactus privatio,
Sternutatio crebra,
Gravedo.

2. *Sanguinis è naribus eruptio quid, ex qui- bus causis contingit, & quibus re- mediis sistitur?*

ῥιναῖς ἀπορροή sanguinis è naribus pro- *Hemor-
fluvium Latinis dicitur. Erumpit autem ac rhagia na-
profuit sanguis è naribus, aut naturæ be- rium quid.*
neficio, aut ex causa præternaturali.

Causæ præternaturales eruptionis san- *Causa.*
guinis è naribus, sunt apertio, erosio, aut
ruptio venarum in nares desinentium. Sunt
autem hæ venæ surculi quidam venarum, ex
palati venis orti, & per nares divaricati,
qui

qui aut aperiuntur à redundant sanguine, aut eroduntur ab acri & bilioso sanguine, aut rumpuntur ab actu violento.

Prognostica.

Porro ex quacunque causa proveniat sanguinis è naribus eruptio, nisi sit critica, & expellatur naturæ beneficio, minimè despicienda contemnenda erit. Nam ubi per negligentiam fluor sanguinis modum excedit, animi deliquium infert, & jecinoris calorem innatum extinguit, quo extincto *neque* & hydropem inducit.

Signa.

Signa fluentis sanguinis manifesta sunt. Si enim sanguis sit tenuis & flavus, erosione venarum; si inculpatus, cum robore faciei, apertione significat: Qui ex ruptione profluit, ejus causæ cum sint manifestæ, nullo indigent signo.

Hoc signum est morbi mali mori, & plerumque lethale, ut experientia testatur.

Aëtius prognosticum signum lib. 5. cap. 124. ponit, inquit, sanguis è naribus profluens, si in febribus quarto die ab initio febris contingat, pessimum est signum, præsertim ubi parum sanguinis exstillet; tum enim absoluta morbi malitia significatur: Si vero affatim & copiose profluat, salutatio est signum.

Curatio.

In fluore itaque sanguinis è naribus, si per se non statim sistatur, curatio minimè differenda erit, sed statim pro causarum diversitate inchoanda ac varianda est. Si itaque sanguis è naribus erumpat ob *aversionem*, id est venarum ex redundantia sanguinis apertione, & vires ætasque admittant, protinus sanguis à capite per venæ sectionem fluentis lateris revellendus erit. Vena autem est secanda jecoraria, & per intervallo temporis bis terve digito comprimenda, ac rursus aperienda, donec sanguis abunde est diminutus.

Vena sectionio.

Ligatura & frictio nes extremitatum.

Sistitur facile sanguis è naribus rumpens per aversionem, quæ fit per artuum manus fortes deversiones & fricationes; sed teste Hippocrate, nullum est præsentius remedium ad cohibendum erumpentem sanguinem quam cucurbitulas magnas cum multa flamma hypochondrio lateris fluentis, vel, si ex utraque nare profluat, utrique applicare.

Avertit quoque à naribus & erumpen-

tem sanguinem citissimè sistit, si masculis quidem testiculi, fæmellis verò mammillæ acerrimo aceto, duplicatis linteolis excepto, eisque impositis & alligatis foveantur. Idem præstat in quocunque fluore sanguinis lapidis hæmatitis particula invola manus lateris fluentis fortiter compressa ac contenta.

At vero ubi sanguis è naribus per erosionem venarum ob acrem ac tenuem sanguinem profluat, sanguis tenuis & erodens refrigerandus incrassandusque erit sequenti potione.

℞. Syr. è papavere, è myrtillis, è cichorea an. ʒ i. s.

Aq. plantaginis, portulacæ, rosarum an. ʒ ii.

Misceantur, fiat potio, quæ in tres divisa partes, diluculo trium dierum, tepida exhauriatur. Postea tandem sanguis à biliosis & acrioribus excrementis per sequentem haustum purificetur.

℞. Rhabarbari electi ʒ ii.

Sem. anisi ʒ i.

Contusa macerentur per noctem in ʒ v. aquæ cichoreæ, mane vero fortiter exprimantur, expresseque liquori admisceantur elect. lenitivi ʒ iir. Rosati melle ʒ i. Fiat haustus, qui tepidus in aurora sex horis ante prandium ebibatur.

Topica & experientia comprobata remedia ad profusionem è sanguinis naribus ex quacunque causa sunt sequentia errhina.

℞. Gypsi, cineris chartarum lusoriarum, gallarum an. ʒ i.

Calcis vivæ ʒ ii. Quibus in tenuissimum pulverem & cum albumine ovi in linimenti formam redactis linteï ratura in pyramidalem formam conformata & prædicto unguento imbuta, naribusque indita, sanguinem sistunt. Aut

℞. Sanguinis è naribus patientis profusum si ʒ ii. qui exiccetur & torrefiat per laminam ferream calefactam, & in tenuissimum pulverem redactus naribus suffletur.

Mixticæ quoque sanguinem sistere potest sterco asininum, aut in ejus penuria suillum.

Ff 3

Epithema hamorrhagiam sistens singulare. Lapis hæmatitis.

Remedia erosione venarum.

Potio sanguinem incrassans. Chymici hujus loco

croco ʒ utuntur cum succo cironiorum vellaudani opiat ali quos granis, vel tinctura corallorum. Haustus purgans.

Topica.

Linimentum nasale sanguinem sistens.

Pulvis sanguinis rossi.

Experientia suillum.

lum torrefactum & natibus inditum vel admotum.

Idem facit odor capæ. Quin stercus suillum recens excretum & adhuc tepens natibus admotum, solo odore sanguinem sistit.

Lanugo foliorum salicis naribus indita, sanguinem statim comprimit. Probata sunt omnia.

3. *Exulceratio sive ulcus virulentum narium quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Ozæna quid. Causa.

Ozæna sunt ulcera crustosa, fœtida, curatu difficilia, in naribus exorta. Causæ hujus mali sunt humores acres, erodentes & virulenti, qui ex cerebro ad nares defluunt, qualibus cerebrum redundat in lue Venerea laborantibus.

Signa.

Signa sunt conspicua. E naribus enim crustula sordidiora & grave olens mucus emungitur: quomodo laborantes & sibiipsis & proximè astantibus tetro fœtore molesti sunt.

Prognostica.

Ozænarum curatio si à principio negligatur, sæpe narium alas, & interstitium magna cum deformitate exedunt & perforant.

Curatio.

Curandi ozænarum ratio à venæ sectione & humorum virulentorum concoctione & evacuatione auspicanda erit. Incidatur itaque vena cephalica dextri cubiti primum, deinde & vena frontis.

Vena sectionis.

Post venæ sectionem præparetur vitiosus humor ad evacuationem sequenti potione.

Potio digestiva.

℞. Beronicæ,
Fumaricæ,
Veronicæ,
Thymi,
Epithymi,
Rorismarini an. M. s.
Sem. Angelicæ,
Ligustici,
Anisi,
Feniculi an. ʒ ii.

Chymici suo universali digestivo,

Rad. Polypodii, veratri nigri prius ebulliti in aqua & rursus siccati an. ʒ i.
Cinamomi electi, cubebarum, macis an. ʒ i.

Rhabarbari ʒ i. & s.

tartaro

Concidendis concisis & contundendis contusis in hydromelitis lb̄ i. coquantur in duplici vase, sive in obturato cantharo, ferventi aquæ impositæ per duas horas: Quo refrigerato fortiter exprimantur, colescentur, & colato juri admisceantur Syr. è fumo terræ, de epithymo, è bethonica an. ʒ i. fiat potio, cujus ʒ v. tepidas patiens mane ac vespere exhauriat.

*nempe vi-
riolato in
vino dis-
soluto.
Idem præ-
stant.*

Absumpta hac potione purgantur virulenti humores sequentibus pillulis.

Pillula.

℞. Mas. pil. aurearum, cochiarum, fœtidarum an. ʒ i. diatridii gr. iiii. ex simul contusis cum aqua majoranæ conformentur pillulæ n. 27. quæ obauratæ circa medium noctis deglutiantur. Aut purgetur universum corpus sequenti haustu.

Haustus

℞. Confectionis hamech, electuarii è succo rosarum, diasenæ an. ʒ iiii. Hieræ purgans compositæ ʒ i. Aquæ betonicæ q. s. ad præscriptorum resolutionem, fiat haustus, qui tepidus assumatur in aurora, & abstinere aeger à cibo potuque per spatium sex horarum.

Purgans

Purgato universo corpore, nec cerebrum ipsum est negligendum, sed ex eo supervacanea excrementa ante prandium & cœnam detrahenda, aut sequenti gargarisma- te, aut pulvere masticatorio.

*Gargari-
smus.*

℞. Rad. pyrethri ʒ s. Sem. erucæ ʒ v. Carvi ʒ ii. Cubebarum ʒ i. Contusa crassiusculè coquantur in aquæ & acerrimi aceti p. æ. id est singulorum lb̄ i. Coquantur autem in olla ad medias, colato jusculo admisceantur mellis rosacei ʒ ii. Fiat gargarisinus, quo tepido utendum est.

℞. Sem. staphidis agriæ ʒ s.

Masticis ʒ v.

*Pulvis
masticato-
rius.*

Fol. Majoranæ ʒ ii.

Cubebarum ʒ i.

Scammonii ʒ s.

Concisa crassiusculè commisceantur, fiat pulvis masticatorius.

Post masticationem aut gargarisatio- nem, cerebrum subinde corroboretur, aut rotulis duabus tribusve diamofchi vel diambæ vocatis, quotidie jejuno ven- triculo

*Cerebrum
roborantia.*

triculo assumptis, aut decorata semiuncia conservæ rorismarini aut sequentis electuarii.

Electuarium. R. Conser. rorismatini ℥ i. myrobal. chebulorum conditorum, corticum arantiorum conditorum an. ℥ s.

Spe. Diamoschi dulcis,

Diembræ an. ℥ i.

Syr. è betonica q. s. fiat electuarium, cui admisceantur Olei cinamomi gut. ii. quo utatur patiens mane ac vesperi. His probè procuratis ad topica remedia confugiendum erit. Ac primum quidem crustosæ nares singulis diebus vapore decoctarum in vino herbarum emollientium, quales sunt, flores chamæmeli, meliloti, malvæ, anethum, veronica, fomententur.

Topica.

Fomentatio.

Aut extergantur sordes sequenti liquore.

*Liquor ex-
tergens.*

R. Suc. Marrubii, millefolii, veronicæ an. ℥ ii.

Mellis rosati ℥ i. quo tepido nares ulcerosæ eluantur, deinde exiccentur humores in hærentes vapore excrementi ferri candentis; quod scoria ferri dicitur (*Zunderstein*) vino rubeo conspersi, & vapore per canalem infundibuli naribus immisso. Post exiccationem ulceris sequens linimentum mollissimo lino carpto exceptum, naribus est inferendum, ut ulcus ad cicatricem deducat.

*Vapor ex-
siccat.*

*Linimen-
tum sa-
nans i.*

R. Myrrhæ, thuris an. ℥ i.

Calcis ex testis concharum ustarum factæ ℥ i.

Albuminis ovorum q. s.

Fiat linimentum.

Aut illud quod sequitur eadem ratione naribus inferatur.

Alterum.

R. Lythargyrii, cerussæ, an. ℥ iii.

Plumbiusti ac eloti ℥ ii.

Myrrhæ, aloës an. ℥ i.

Cort. granatorum ℥ s.

Tenuissimè pulverata excipiantur oleis hypericonis è terebintina destillati an. q. s. Fiat linimentum molle.

Citissimè sanat & ad cicatricem deducit non tantum ozænas, sed ad alia sordida ulcera suffumigium naribus aliisque partibus ul-

ceratis per canalem admissum, sequens pulviscul.

R. Auripigmenti, cinabaris an. ℥ i. Suffumi-
Benzoi, styracis calamithæ, caryophyl-
lorum an. ℥ i. *gium val-
de sanans
& exsic-
cans ulce-
ra narium.*

Misceantur, fiat pulvis, qui carboni candenti inspergatur, & fumus inde excitatus per canalem naribus immittatur.

Præstat autem meatus ad cerebrum, & ossa Ithmoidum ad radices narium sita molli lana prius obstruere, ne fumus per inspirationem in ipsum cerebrum attrahatur: Obest enim cerebro.

Verum his omnibus præstantius est re- *Ol. vitrio-
li.*
medium ad ozænas curandas, oleum vitrio-
li ulceri illitum. Sordes enim abstergit,
corruptas carnes partium exedit, & statim
sanitati restituit.

*Carnosa in naribus excrecentia quid, qua
ejus causa, qua signa, & quibus
remediis curanda?*

Πολύπυς est carnosa è naribus excre- *Polypus
quid.*
scientia ac prominula, quæ dum adhuc recens
est, σάρκωμα Græcis nuncupatur, quæ sem-
per exulcerationis, si ejus curatio negligat-
ur, est comes. Hæc carnosa excrecentia in
plenilunio ita excrescit, ut è naribus foras
propendeat, circa novilunium autem flac-
cescit & imminuitur. Molestissimum est
malum, nam enim obstruit, respiratio-
nem intercipit, loquelamque obscurat &
impedit.

Causæ αἰσθημέναι carnosæ excre- *Causæ.*
scientia sunt lenti viscidique humores ex cerebro
ad nares exulceratas decumbentes, ulceri-
busque in hærentes, teste Galeno lib. 3. de
comp. med. secundum loca, c. 3.

Signa sunt manifesta. Caro enim excre- *Signa.*
scens polypi piscis carni similis est, h. e. tu-
mescens, laxa, rara, mollis, colore varia:
Nunc enim alba, nunc rubea, nunc cine-
ritia, nunc livida conspicitur, Celso lib. 6.
cap. 8. attestante.

Curatio hujus mali non caret difficulta- *Curatio.*
te, & nisi cautè & cito curetur, in cancerum
transire consuevit. Curatur autem duplici
ratione, aut chirurgica videlicet præcisione, *Præcisio*
aut

periculosa. aut medicamentorum applicatione. Verum chyrurgica præcisio hujus carnis periculosa est, tum propter sanguinis violentam eruptionem tum propterea quod nisi radicitus excidatur, processu temporis ex radicibus ejus reliquiis rursus hæc caro renascitur, aut certo in cancrum transit. Qui itaque polypi curationem in rigidis corporibus per chirurgica tentare volunt, non satis est prominentem carnem abscindere, sed necesse est nasi alam in affecto latere foris profundè incidere, & radices evellere, earumque vestigia candenti instrumento ex argento facto, inurere, & tandem vulnus ad cicatricem deducere. Quæ curandi ratio & deformitatem infert, & non leves cruciatus adjunctos habet.

Quomodo absque chyrurgia auferatur. Venæ sectio. Præter chirurgicam curationem potest auferri hoc malum, quanquam difficulter medicamentis *ngvsvngis* h. c. erodentibus & exurentibus carnem. Primum itaque si corporis constitutio & ætas efflagitat, incidatur vena cephalica affecti lateris. Deinde lenti crassique humores cerebri extenuentur, coquantur & extenuentur per

Evacuatio corporis & cerebri. remedia cum generalia, qualia sunt decocta & syrupi, tum particularia qualia sunt gargarismata & masticatoria, quorum copiam supra in curatione cephalalgæ pituitosæ descripsimus, quæ hoc loco repetere supervacaneum est. Purgato itaque

Topica. universo corpore & cerebro, ad topica remedia, pharmaca confugiendum erit, & naribus partique affectæ indenda & applicanda sunt, quæ carnem & absumant & erodant. Applicanda autem sunt circa novilunium, cum flaccet caro. Præstantissimum vero omnium remedium polypi oleum vitrioli prima vice destillatum, necdum correctum, aut ejus aqua in principio destillationis excepta, quæ molli lana excepta, carni circumponatur, carne scalpello scarificata, & reliquis partibus narium oleo rosaceo prius illito: aut caro excreescens inungatur sequenti linimento.

Linimentum pro absumendo polypo. R. Lythargyri 3 iii. cerussæ 3 s. Cort. granatorum, aluminis usti an. 3 ii.

His in tenuissimum pulverem redactis, cum mellis rosacei, & aquæ fortis seu separationis auri ab argento (*Schedelwasfer*) q. s. exceptis, in formam linimenti redactis subinde locus affectus illiniatur.

Aut

R. Squamæ æris *Kupferschlag* 3 i. Pulvis. Atramenti sutorii, hellebori nigri an. 3 iii.

Sandaracæ 3 ii.

Fiat pulvis subtilissimus, & naribus insuffletur. *Aut*

R. Mellis cocti & à spuma defecati, *Linimentum aliud* Æruginis tenuissimè pulveratæ an. 3 s.

Sarcocollæ, gummi armeniæ in aceto acri liquefacti ac colati 3 s. Commixta rursus coquantur simul in formam linimenti, quod affectæ nari molli lana exceptum singulis diebus bis indatur. Porro sollet inveteratus polypus plerumque in *Polypii in cancrum cynoma* five cancrum vocatum ulcus degenerare, quod ejus duritie, lividitate & horribili fœtore, acrique ejus dolore, facile cognosci potest, cujus curatio omnium est difficillima. Præstat itaque ut Medicus cum à præcisione, tum ab acribus erodentibusque medicamentis absteineat. Neutram enim sine patientis vitæ periculo tentare poterit. Ideo sola palliata, ut vocant, curatio, & vitæ protractione sequentibus medicamentis uti commodè poterit.

R. Sem. lentium, plantaginis an. 3 i. Con-Liquor tusa simul coquantur in lactis caprini lb ii. eluens ad medias, colentur, & colato jusculo admisceatur 3 i. sacchari albi: quo jusculo tepido fordes carcinomatis quotidie bis è naribus eluantur: elutis sordibus inungatur cancer sequenti linimento.

R. Unguenti rosacei 3 i. *Unguentum.*

Succi plantaginis, solatri an. 3 ii.

Lithargyri auri & argenti an. 3 v i.

Tuthiæ præparatæ 3 i.

Cerussæ 3 ii.

Simul coquantur donec succi in vaporem evanescant, fiat unguentum in plumbeo mortario probè agitatum, quod subinde narium cancro inungi debet. Aut illinc can-cro narium vitella ovorum in mortario plum-

Experimentum

Experi-
mentum
singulare
in cancro
narium.

plumbeo diutissime usque ad nigredinem agitata & in unguenti formam redacta, cui admisceatur camphoræ ꝑ i. Hoc linimentum prohibet in cancro putrefactionem, nimium exiccando, & mitigat dolorem refrigerando, foetoremque auferit ratione camphoræ.

Hac quo-
que de fe-
tore ori-
valent.

5. Foetor narium quibus ex causis ori-
tur, & quibus remediis au-
fertur?

Foetor na-
rium.

Narium foetor dicitur ubi halitus grave o-
lens è naribus inter expirandum eructatur,
non modo ipsi patienti sed & astantibus mo-
lestus.

Causa.

Causæ foetoris narium *αἰσθητικῆς* præ-
cipuæ sunt duæ, videlicet vapor putridus ex
ventriculo aut pulmonibus ad os nareque
exhalans, & materia corrupta ac marcida
foraminibus ethmoidum meatibusque na-
rium impacta.

Curatio.

Curatio hujus mali à causarum remotio-
ne auspicanda erit. Si itaque foetor, puti-
dusque odor per *αἰσθητικῆς* ex ventriculo ad
nares exhalet, materia putrescens ex ven-
triculo purganda erit, id quod commodè
fiet, si quis crebrius aut singulis mensibus
semel sequentes pillulas circa medium no-
ctis deglutiat.

Pillula

R. Mas. pil. de hiera simplicis,

Stomacha-
es.

Mastichinarum,

Agarici trochiscati an. ꝑ i.

Ol. absin-
thii, men-
thæ, cario-
phylli, færo-
em anbo-
icius e-
mendant.

Cum aqua menthæ formentur pillulæ n.
27. Absumunt simili ratione omnes ventri-
culi impuritates, vaporesque exhalantes
supprimunt, guttulæ septem olei vitrioli
cum haustulo vini assumptæ, aut guttulæ
quinque olei absinthii aut menthæ aut ca-
ryophyllorum chymico artificio exstillatæ
cum vino paxillulo haustæ. Verum morbo-
rum symptomatumque ventriculi curatio-
nem paulo infra uberius explicabimus.

Si causa

Porro si foetoris causa in narium meatibus
aut ossis ethmoidis foraminibus hæreat,
per errhina & sternutamenta excitantia phar-
maca auferenda erit, & gravis odor natium,
fragrantium rerum in nares insertionem tem-
perandus est.

Sternutamentum probè excitat, & ob-

structionem narium referat sequens pulvi-
sculus.

R. Calami aromatici, myrrhæ, fol. ma-
joranz an. ꝑ s. Redigantur in pulverem te-
nuissimum & naribus inspirando attrahantur.
Aut si vehemens meatuum sit obstructio, in-
seratur naribus sequens errhinon.

R. Nucis moschatæ, piperis nigri, sta-
phidis agricæ, pyrethri an. gr. v. helle-
bori albi ꝑ s. Salis ustulati gr. ii. lau-
dani ꝑ i.

Ex his omnibus exactè pulveratis, cum
q. s. succi majoranz in calido mortario con-
ficiantur Nasalia.

Suavitatem exhalationis cum è naribus
tum ex ore reddit sequens pulvisculus masti-
catorius.

R. Cubebarum,

Calami aromatici,

Iridis illyricæ (*Ίρις Ιλλυρική*)

Cinamomi, macis an. 3 s.

Folior. majoranz ꝑ i. gariophyl-
lorum ꝑ s.

Pulvis
masticato-
rius suavi-
tatem an-
helitus
concilians.

Concitantur simul crassiusculè, & ejus
pulvisculi P. masticetur in ore naribus ob-
structis.

Molestam ex naribus spirationem emen-
dat guttula una aut duæ olei nucis moscha-
tæ aut angelicæ aut majoranz, chymica ar-
te destillati, naribus illitæ.

Idem præstat masticatio radicum zedoa-
riæ, angelicæ, aut iridis illyricæ.

6. *Οσφάκτις diminutio aut abolitio quid,
quæ ejus causa, quæ indicia, & qui-
bus rebus facilius odorandi
recuperanda?*

Odoratus oblatio Græcis *ὁσφάκτις ἀφύ-
πνος* dicitur. Odor omnis in vapore tan-
quam proprio suo subjecto situs est, qui ex

rebus odoratis per nares tanquam recepta-
cula, & per ossa ethmoida tanquam vias
attrahatur, & à duobus spongiosis meatibus
seu propaginibus ex anterioribus ventriculis
cerebri ad narium radices protensis percipi-
tur, ac prioribus cerebri ventriculis, qui sunt
loca sensus communis commendatur, ibi-
demque à spiritibus animalibus dijudica-
tur, & in suas differentias distinguitur.

Gg

Odora-

Definunt
tamen in
processus
odorato-
rios nervi
ex princi-
pio spinali
medulla
exoriri.
Causa læ-
sionis olfac-
tus.

Odoratus portio sensus in quibusdam dimi-
nuitur vitaturque, quibusdam prorsus abo-
letur.

Causæ cum diminutionis, tum abolitio-
nis odoratus sunt *απορρεπείας* quidem, in-
temperies anticæ partis cerebri, aut ventri-
culorum priorum; vel excrementitiorum
humorum, ac præsertim pituitosorum col-
luvies, quæ aut ventriculos replet, & spi-
ritus animales inficit, aut auditorias pro-
pagines, ossaque ethmoida obstruit. *Πε-
ρσπαστική* causa unica est, narium ob-
structio.

Signa di-
versarum
causarum
& locorum
affectio-
rum.

Signa quæ in olfactus privatione locum
vitiatum ostendunt, hæc sunt, si cum ob-
lata odorandi facultate vox manet sonora
& inculcata, vitium erit in antica parte ce-
rebri, aut in prioribus ventriculis. Si vero
vox & respiratio simul vitiantur causa mali
h. e. obstructio est in ethmoidis ossis fora-
minibus. Quod vitium statim sequitur gra-
vedo & solitorum excrementorum cohibi-
tio. Porro quæ ex intemperie cerebri &
colluvie humorum in ventriculis cerebri
collecta provenit odoratus privatio, non
caret periculo, plerumque enim Epilepsiam
aut Apoplexiam minatur. In morbis simi-
liter acutis si aboleatur olfactus, vel teter o-
dor sentiat, mortis signum est.

Prognosti-
ca.

Curatio.

Curatio diminuti aut aboliti olfactus à
causarum sublacione auspicanda est. Pri-
mum itaq; si corpus sit plethoricum & caput
sanguine redundet, quod facies rubicunda
ostendit, vena cephalica alterutrius brachii
secanda erit, & ratio victus temperamento
cerebri conveniens instituenda.

Vena se-
ctio.

Remedia
intempe-
riem cere-
bri alte-
rantia an-
tea tradita
sunt.

Remedia in odoratus læsione pro causa-
rum diversitate varianda sunt. Si itaque o-
doratus sensus vitietur ex ventriculorum
cerebri aliqua intemperie *δυσκρασία* illa
contrariis remediis cum internis tum exter-
nis, ut calida frigidis, frigida calidis, hu-
mida siccis, sicca humidis est alteranda. U-
bi verò humorum colluvies cerebrum aut
ejus cavitates meatusque obsederit, & o-
doratus propagines aut foramina ethmoi-
dum obstruxerit, humores excrementitii
convenientibus remediis cum externis tum

internis, concoquendi, extenuandi & ex-
purgandi erunt. Quæ autem remedia quas
intemperiei species commodè alterent, &
quæ quos vitiosos humores præparent &
expurgent, eorum sylvam & formulas su-
pra in cephalalgia speciesbus curandis pro-
posuimus, quæ inde studiosi suo Marte col-
ligere, & huc transferre possunt, quibus ubi
necessitas exigit, ac potissimum purgato-
riis non tantum semel, sed crebrius uten-
dum erit.

Alterata intemperie, & subductis vitio-
sis humoribus, topicis remediis reliqua cu-
ratio feliciter perfici potest. Localium au-
tem remediorum quæ obstructions aut
ethmoidum aut propaginum cerebri ape-
riunt, odoratusque sensum restaurant, per
nares inferenda sunt, quorum præcipua hæc
sunt.

Radix Gentiana minimi digiti longitu-
dinis, & crassitie arundinis in teretem for-
mam redacta, naribusque inserta, mirifi-
cè aperit obstructions, & vitiosos humo-
res præsertim lentam & crudam pituitam ex
cerebri ventriculis ac meatibus prolicat. Aut
℞. Sem. nigellæ in aceto per noctem ma-
cerati,

Radix
Gentiana
naribus in-
ferenda.

Sternuta-
torius pul-
vis.

Rad cyclaminis an. ʒ s. In tenuissimum
pulverem redacta, ac inspirando per nares
attracta, obstructions aperiunt, & sternu-
tationem excitant. Castoreum in aceto ma-
ceratum, & subinde naribus admotum, suo
odore gravi tollit obstructions, & frigidam
intemperiem aufert. Idem præstat & menta
sicca manibus contrita & naribus odore ejus
attracto. Quin omnia remedia sternuta-
mentum cientia, obstructions cerebri ape-
rire possunt.

Castoreum
odoratum.

Menta.
Ol. nigella
etiam hic
commodè
adhibetur.

7. Gravedo quid, quæ ejus causa, quæ si-
gna, & quæ ratione curanda?

Gravedo, Græcis *ῥέβυζα*. Supra in destil-
lationis curatione tres destillationis species
esse docuimus. Ubi enim excrementum
cerebri ad fauces defluit, & inde in pecto-
ris partes, generali nomine *κατάρρεσις*, Catarrhi
si vero ad asperam arteriam *βρόγχος*, si species.
ad nares decumbat *ῥέβυζα* nominatur. Est
itaque

Coryza seu itaque *ῥέβριζα* sive gravedo, nostris *der Schnuppe* / excrementitii humoris cerebri, adhuc instar aquæ crudi ac tenuis

ad nares defluxio, quam ut plurimum frequens & molesta comitatur sternutatio. Eius humoris crassior pars ossa ethmoida obstruit, & expirationem impedit.

Causa. Causæ gravedinis *ὑπερθερμίας* sunt aër frigidus, aër calidus humidusque, & fœtor rancidus, somnus meridianus, & progressus nudato capite ex æstuario aut balneo calido in aërem frigidum, &c. vel ex aëre frigido in nimis calidum. *ὑποθερμίας* sunt aut frigida aut calida intemperies cerebri. Calida intemperies cerebri copiam vaporum & humorum in se allicit ac trahit. Frigida vero intemperies cerebri excrementa concoquere nequit, sed cerebrum instar spongiæ comprimit, & crudiores partes excrementorum exprimit. Semper itaque calida intemperies cerebri causis externis frigidis circumdata gravedinem per *ἀντιπεριστάς* excitat.

Signa. Signa caliditatis cerebri tum ex tactu capitis quod calidum deprehenditur, tum ex humoris in nares defluentis acrimonia & falsedine deprehenduntur. Sic & in frigida cerebri intemperie calor capitis exiguus tactu sentitur & fluens ad nares materia, nulla excellenti qualitate molesta est.

Curatio. Curatio coryzæ alteratione intemperiei cerebri, & concoctione crudorum excrementorum perficitur. Si itaque ex causa calida gravedo suboritur, gravedinem tollit odor aquæ rosacæ per nares subinde attractus, item odor rosarum virescantium & violarum purpurearum. Similiter & oleum rosaceum naribus inditum.

Remedia in frigida intemperie. In frigida verò intemperie utendum est odore majoranæ, aut basiliconis, aut nigellæ, aut cymini, & naribus illiniendum seu indendum oleum ex majorana aut nucibus moschatis arte chymica destillatum. Obstructiones ethmoidum in gravedine referat ac tollit vapor aceti rosacæ silici candenti inpersi naribus attractus: crudas excrementorum partes ethmoides obstruentes

concoquit & maturat sacculus oblongus in sacculus aqua percoctus tepidusque sincipiti applicandus, qui ita concinnatur.

℞. Betoñicæ, majoranæ,
Flor. Chamæmeli, meliloti an. M. r.
Sem. Carvi ʒ s.

Concisa sacculo infuantur, & ne collabi queant, intersuantur. Reliqua remediorum genera ex superioribus de destillationis cerebri curatione huc transferri possunt.

8. *Sternutatio crebra quid, quæ ejus causa, quæ signa prognostica, & quomodo sistenda?*

Πέρι σπέρματος, sternutatio. Sicut tussis in thorace, singultus in ventriculo, pandiculatio in musculis corporis, & oscitatio in faciei partibus: ita sternutatio est operatio naturæ à causis præternaturalibus orta.

In sternutatione natura excitat spiritus animales in anterioribus cerebri ventriculis ad expulsionem flatuosorum spirituum acriumque vaporum cerebrum offendentium. In sternutatione duplex fit motus simul ac semel, videlicet contractio cerebri, contractioque thoracis: Quibus repente contractis, fit violenta & involuntaria per nares spirituum expulsio, idque fit cum strepitu, tum, quia spiritus confertim, tum, quia per angusta narium foramina erumpit.

Causæ sternutationis *ὑπερθερμίας* sunt radii orientis solis oculos ferientes: Item tenues pulvisculi narium membris adhærentes, quas nares communes habent cum anterioribus ventriculis cerebri: Odores acres, fumi, ptarmica corpuscula ac remedia, qualia sunt, majorana, piper, euphorbium, helleborus, castoreum, &c. ex quibus sternutatoria remedia confici solent, naribus indita. Similiter & vini tenuis potio.

ὑποθερμίας sternutationis causæ duæ sunt, teste Hippocrate, calida cerebri intemperies, & vapores acres in ventriculis anterioribus cerebri in flatulentos spiritus resoluti, quos natura expellere gestiens, incitat spiritus animales ad expulsionem & sternutationem. Porro quæ in gravedine fit sternutatio, & gravedo ut plurimum

Gg 2 ex fri-

ex frigida aëris constitutione oritur, ea sit per ἀντιπρῆξιν, frigiditate aëris duplicante cerebri caliditatem, qua humores resolvuntur ac funduntur.

Prognostica.

Sternutatio omnis in morborum declinatione etiam in morbis perniciosissimis & exitialibus salutare signum est & securitatem pollicetur, & argumentum est concoctionis, ostenditque robur facultatum animalium ac naturalium. Exitiosa vero habetur, quæ in defluxione humorum à cerebro ad pulmones procumbente excitatur & in phthisi. Concutit enim thoracem & vitiat pulmonem, materiamque fluentem magis propellit ad pulmones, teste Galen. secundo comment. sect. 49. in prædict. Hippocratis.

Curatio.

Curatio sternutationis ut plurimum negligitur à Medicis & naturæ committitur, eo quod nihil periculi post se relinquit, ut olim accidisse creditur, cum per Christianum orbem sævissima lues epidemica grassaretur, in qua circa ventriculos cerebri, tumores abscessusque oboriebantur, & omnes, quibus sternutatio superveniebat, statim vel in apoplexiam incidebant, aut protus exstinguebantur, unde inter Christianos inolevit pia illa consuetudo, ut sternutantibus salutem & divinum auxilium precemur.

Cur sternuantibus salutem precemur.

Sternutatio quæ ex causis externis, ut acrium rerum odoratu aut inhæsiōne in naribus oritur, remota causa facile cessat.

Sternutatio gravedinem comitans compescitur curatione gravedinis quam paulo ante tradidimus.

Sternutatio nimia ex periculosa quibus remediis curanda.

Crebra autem aut immoderata sternutatio, quæ ex internis causis oboritur, ut cerebri caliditate, vaporibus in ventriculis cerebri resolutis & acrioribus humoribus spiritibusque flatulentis in eis contentis, sequentibus remediis commodè curari poterit.

Vena sectio.

Primum in naturis calidioribus vena jecoraria secetur, deinde acres vapores tenuisque humores cerebri sequenti potione alterentur.

Tulapium

℞. Syr. rosarum, nimpheæ an. ʒ iij.

Syr. de cichorea cum rhabarbaro ʒ ii. alterans caliditatem cerebri.

Aq. Intybi ʒ xv.

Misceantur ac ejus ʒ v. per totidem dies tepidæ, jejuno existente ventriculo, exauriantur. Quibus exactis, vapores ac humores biliosi sequenti potiuncula subtrahantur.

℞. Rhabarbari electi ʒ i. s.

Fol. senæ Alexandrinæ ʒ i.

Haustus cholag.

Singula per se parum contrita in aquæ cichoreæ ʒ iij. infundantur, ac per noctem maceantur: sequenti diluculo rhabarbarum, sine coctione, fortiter expressum coletur, sena autem uno atque altero fervore ebulliat ac coletur. Hæc duo juscula simul commisceantur eisque addatur ʒ i. elect. lenitivi, quæ tepida sex horis ante prandium exhibeantur.

Quod ad topica remedia attinet, odor aquæ rosacæ naribus frequenter admotus alterat cerebri caliditatem & sternutationem compescit. Idem præstat oleum rosaceum, aut ex floribus salicis naribus illitum. Item sequens epithema anticæ parti capitis seu futuræ coronali applicatum.

℞. Aq. rosacæ ʒ vi. succi nymphææ, portulacæ an. ʒ ii. Misceantur & duplicato linteolo excepta capiti applicentur.

Epithema refrigerans.

Idem præstat cataplasma ex farina hordeacea, oleo rosaceo & ovi luteo confectum, capitisque anticæ parti applicatum.

Remedium singulare ad compescendam sternutationem.

Venulæ in majori angulo oculorum naribus proximo, fortius compressæ crebram sternutationem statim sedant.

Sternutationem ex gravedine aut ossium Ithmoidum lentâ pituitâ obstructorum, excitatam, odor basiliconis & majoranæ compescit.

SECTIO IV.

DE ORIS ET IN ORE CONTEN- TARUM PARTIUM MORBIS.

1. *Oris & in ore contenta partes quæ sunt?*

O S, labia, gingivæ, dentes, palatum, gurgulio, tonsillæ, lingua, fauces, collum.

2. *Oris*

2. Oris morbi qui sunt?

Os nonnunquam pro receptaculo & toto domicilio linguae, quandoque vero pro rima duntaxat inter labia usurpatur. Duæ autem sunt præcipuæ oris affectiones:

Factor oris,
Contorsio oris.

3. Factor oris quid, quæ ejus causa, quæ signa causarum differentias indicantia, & quæ ratione curandus?

Factor oris quid. Factor oris dicitur cum & περιχρησται est tetra per respirationem, ex ore & naribus exhalatio, & ipsos patientes, & proximè adjacentes molestans.

Causa. Causæ περιχρηστικαὶ sunt corrupti cibi inter vel in cavernis dentium hærentes, aut cibi foetidi, medicamenta quæ graveolentia comesta & assumpta. Περιχρηστικαὶ causæ sunt gingivarum aliarumque oris partium putrescentia ulcera & abscessus, aut corrupti humores hærentes in orificio ventriculi, aut pulmonis jecorisve putrefactio & corruptela.

Signa diversarum causarum. Signa per quæ prædictæ causæ internosci queant hæc sunt: si foetidi halitus causa sunt, vel cibi corrupti dentibus inhærentes, vel gingivarum aliarumve oris partium putrescens exulceratio, visu tactuque facile dignosci potest. Si vero humor corruptus in ventriculi orificio collectus foetorem excitet, tum ante sumptum cibum potissimum factor molestat ex ore exhalans, post sumptum cibum mitigatur. Ubi vero putrefactio pulmonis causa terri odoris est, tunc una cum foetore adest continua tussis & totius corporis tabes. Jecoris vero putrefactio si causa sit foetidæ exhalationis una adest malus corporis habitus & coloris deſœdatio, appetentizque proſtratio.

Curatio. Curatio pro causarum diversitate varianda est. Ac si factor exhalet à corruptis cibis dentibus inhærentibus, summa cura dentes quotidie purgandi, eluendi, emundandique sunt, & omnis spurca materia ex cavernulis dentium scalpellis eximenda, & mox in cavernulas odoratæ res inferendæ, veluti sunt iridis illyricæ radix, angelicæ ra-

dix, caryophylli, zedoaria, cinamomum & similia.

Cavendum autem est sedulo iis, qui dentes habent excavatos, à cibis lentis, crassis glutinosisque, quales sunt vetus caseus, carnes pinguiore, pisces, carnesque summo duratæ. Qui ex alimentis, medicamentisque graveolentibus tetrum spirant odorem, hic odor assumptione ciborum, medicamentorumque emendari potest, & comestione aromatum.

Fœtida ex ore exhalatio quæ ex gingivarum putredine exulcerationeve eructatur, ejus curandi rationem & remedia paulo post in gingivarum affectionibus curandis docuimus. In genere tamen hoc in casu plurimum prodest gingivas aceto scillitico eluere, & sequenti pulvisculo putredinem gingivarum arcere & suaveolentiam inducente subinde gingivas confricare.

℞. Salis candidissimi & parum torrefacti,

Pumicis,

Origani an. ʒ s.

Rad. iridis illyricæ,

Schænoanthi, cinamomi electi an.

ʒ i.

Mofchi gr. ii.

Conterantur in tenuissimum pulverem.

Fœdus & teter halitus oris qui ex corruptis humoribus ventriculo inhærentibus evaporat, curabitur remotione materiæ putrefactæ, id quod per vomitionem & assumptionem fragrantium remediorum, qualia sunt diambra, aromaticum rosatum ac vinum, in quo incocti sunt caryophylli, quæ & ventriculorum corroborent & vapores exhalantes gratiores reddunt. Verum hujus mali curationem, & remediorum varias formulas infra inter ventriculi affectiones uberius trademus.

Fœtidæ respirationis ex putrefacto pulmone excitatæ curationem infra in Φθισιν curatione commodius proposituri sumus. Ita & foetorem oris ex corruptione jecoris inter affectiones epatis. Cum autem foetor oris & narium ex similibus fere causis oriantur, huc commodè transferri

Gg 3 possunt

Si à medicamentis vel cibis foetida ex ventriculo.

Si ex gingivis putridis.

Pulvis odoratur.

Si ex ventriculo.

Ex pulmone.

Ex epate.

possunt remedium genera, quæ paulo ante in curatione fœtoris narium enumeravimus.

4. Contorsio oris quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Spasmus cynicus quid.

Contorsio sive distortio oris quam Græci *σπασμὸν κυνικόν*, id est caninam convulsionem vocant, fortè quia muscoli oris in hac affectioe instar canum venatoriorum labris prominulis à suo loco distorti, similesque conspiciantur, est resolutio seu paralytis musculorum oris & qui mandibulis annexi sunt, quæ os detorquetur in alterutram faciei partem, eam vehementer vitians ac deformans.

Causa interna quæ.

Causæ detorsionis oris ut plurimum sunt *σπασμὸν κυνικόν* id est internæ, ac plerunque accidunt post acutos morbos capitis, videlicet apoplexiam, epilepsiam ac paralytin, in quibus tertii paris nervorum rami ori & faciei musculus implantati contrahuntur, & musculos secum trahentes convellunt, in alterutram partem detorquent, & à propria configuratione abripiunt ac deformant.

Ut vero supra in curatione convulsionis tradidimus, causas contradictionis Hippocrates ad duo genera restringit, ad inanitionem vehementem, quæ ex nimia siccitate & caliditate provenit, veluti videmus in loris igni admotis quomodo contrahantur ac corrugentur: & repletionem, quando videlicet excrementitiis humoribus vel ipsi nervi vel musculi elevantur nervique breviores redduntur, ubi necesse est convulsionem fieri.

Causa externa quæ.

Ex causis *σπασμὸν κυνικόν* non facile fit nisi per accidens detorsio oris, veluti sunt longa & nimia meracioris vini ingurgitatio, vel nervorum musculorumque oris transversa dissectio & vulnere non artificiosè curata.

Signa.

Signa causarum detorsionis oris sive caninæ convulsionis, quæ videlicet ex repletionem oritur, ita dignosci possunt. Quæ ex repletionem provenit ea repente homi-

nibus accidit. Ex inanitione seu vehementi siccitate sensim ac longo tempore oboritur, & longe pernitiosior & curatu difficilior est, quam quæ ex humorum redundantia oritur.

Curatio distorti oris pro causarum diversitate alteranda & dirigenda est. Cum autem universam curandi rationem, quæ sit cum per victus rationem, tum per medicamenta supra in tractatione convulsionis & paralyseos iusta methodo & copiosè descriperimus, quæ huc transferri debet, supervacaneum esse judicamus eam hoc loco repetere. Hoc tandem de topicis remediis adjicere licebit, in distortionem oris quæ ex repletionem originem ducit, primum præmissis evacuationibus partem capitis distortam ad faciem frequenter lintheolis calidis leniter confricandam esse & statim inungendam oleo costino ex granis juniperi & aliis unguentis calefacientibus & exiccantibus, quatum formulas in convulsionis curatione recensuimus. Per nares quoque prarmiciis remediis sternutationem excitantibus cerebrum evacuare utilissimum erit. In ore vero & potissimum in parte læsa diutissimè retinere 3 r. confect. anacardine mirifice prodest, idque post gargarisationem orisque sedulam elotionem cum liquore ex pyrethri radicibus & erucæ sem. simul confusis & concoctis confecto, cujus curandi rationem in superioribus quoque demonstra-

Curatio.

Topica si ex repletionem fiat.

Confectio anacardina hic utilis.

Si ex inanitionem.

Fomentatio.

Distorsio vero ex inanitione sive siccitate oborta, prorsus contrariam efflagitat curationem & contrariæ qualitatis remedia. Prodest itaque partem faciei distortam & extra & intra os frequentius lavare ac fomentare cum decocto ex chamæmelo, melilotho, anetho, & rad. althææ parato vel in sacculum confuto, orique admoto. Utile quoque erit distortam partem oleo violaceo & chamæmelino subinde inungere. Hoc autem observatione dignum est, quod quæ post acutos morbos ex siccitate oboritur, rarissimè curari possit distortio, & ut plurimum brevi mortem subsequituram ostendat.

5. Labiorum vitia quæ, ex quibus causis
proveniunt, per quæ signa dignoscun-
tur, & quomodo curanda?

Labiorum vitia. Labia hominum duobus potissimum af-
ficiuntur malis, scissura videlicet & aspre-
dine, quæ ex iisdem ferè causis oboriuntur,
& iisdem remediis curantur.

Scissura labiorum. Scissura labiorum Græcis *παράδες*, sunt
ex genere solutionis continui rimulæ quæ
ex rupta pellicula labiorum relinquuntur,
nonnunquam sanguine madent, quando-
que & sicca, ita aspredo vel asperitas labio-
rum est, ubi illa ipsa pellicula fluctulatim
rupta à labiis detrahitur. Porro scissuræ sive
παράδες non tantum labiis, verum & aliis
partibus corporis mollioribus, veluti lin-
guæ, volæ manuum, plantis pedum, digi-
tis, podici, & locellis mulierum frequenter
accidere consuevere.

Symptoma excandescens in quibusdam. Reperiuntur multi heroici homines qui
ubi vehementer excandescunt, eis labio-
rum tunica è vestigio rumpuntur & sangui-
nem effundunt. Tale quid legimus de A-
lexandro Magno, & de illustri heroè Scan-
derbeco, qui Turcicum exercitum sæpe
magna clade afflixit.

Causa. Causæ *αἰσθητικαὶ* sive externæ cum
scissurarum, tum aspreдинis in labiis sunt,
peregrinatio in æstivo calore, & squalida
purulentaque aëris constitutio. Similiter
& venti borealis, vehemensque frigus ac
gelu. *Προγυμνικαὶ* sive internæ causæ sunt,
excandescens, aridæ evaporationes ex
ventriculo, veluti contingit in ardentibus
febris, item humores tenues & ignei,
ad labia decumbentes, qui ut plurimum
causæ sunt rhagadum & in aliis corporis par-
tibus.

Signa. Prognostica. Signa sunt manifesta: Prognostica vero
ex rhagadibus hæc sumi possunt. Rhagades
vel rimæ labiorum in febribus ardentibus
salutaria sunt signa. Concoctionem enim
materiæ significant, è diverso rimæ sive
scissuræ in lingua in febribus, pernitiola
sunt signa: Rimæ seu scissuræ in vola manus
pedumque plantis ac digitis, sanguinem esse
infectum Gallici morbi colluvie.

Curatio. Curatio pro causarum diversitate varian-

da est. Rimæ itaque labiorum sequen-
tibus illitionibus curari possunt.

R. Gummi Tragacanti 3 i.

Mucilago.

Contusa maceretur in aquæ rosaceæ
3 iii. ita ut in lentum liquorem conver-
tantur, quo munctæ rimæ sanari possunt.

Similiter tolli possunt rimæ adipe gallina-
ceo & oleo rosaceo & violaceo aut sigilla-
tum.

Rimæ labiorum quæ ex frigida causa ex-
citæ sunt, curantur illitione mellis rosa-
cei, cui admixtum sit momentum thuris &
mastiches.

Rimæ linguæ adeoque siccitas sanantur
sequenti liquore.

℞. Sem. cytoniorum 3 i. contusa mace-
rentur in aquæ plantaginis 3 ii. donec in
lentorem seu mucilaginem convertatur,
quæ subinde linguæ illiniatur. Rhagades
sive scissuræ reliquarum partium, ut volæ
manus, digitorum aut plantæ pedum ita cu-
rari debent.

Scoria ferri candens in ollam magnam im-
ponatur, vinoque rubeo spongia excepto
subinde irroretur, parsque affecta ollæ infe-
ratur obtegaturque olla, ut totus vapor fe-
riat affectas partes, eaque incallescant ac
sudent, idque per integram horam, & per
octo continuos dies peragendum, ita tollun-
tur scissuræ, & infecta cutis decedit.

Scissuræ obscurarum partium sequenti
unguento commodissime curantur.

R. Cerussæ lotæ,

Amyli,

Cadmiz lotæ,

Lythargyri an. 3 s.

Mucilaginis tragacanthi 3 i. cum
aqua rosacea factæ.

Misceantur, fiat linimentum.

Ad scissu-
ras obscu-
rarum
partium.

SECTIO V. DE GINGIVARUM MORBIS.

Gingivarum familiares morbi & sympto-
mata sunt:

Pruritus & inflammatio,

Luxu-

Morbi seu
vitia gin-
givarum.

Luxuries seu tumor gingivarum,
Corruptio sive absumptio gingiva-
rum,
In scorbutico morbo.

1. *Prurigo & inflammatio gingivarum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

*Pruritus
& inflam-
matio gin-
givarum.
Dentitionis
tempus.*

Prurigo seu pruritus & inflammatio dolorifica gingivarum, Græcis *αδύγιον* dicitur, & sunt symptomata conjuncta, quæ puerulis dentire incipientibus accidere solent. Dentiant autem ut plurimum pueri septimo, aut circiter, mense, & tum maxime gingivarum inflammatione & prurigine afficiuntur, teste *Hip. 3. Aph. 25.*

Causa.

Causæ horum symptomatum sunt dentes erumpentes, carnemque gingivarum perforantes, ac prurimum, inflammationem ac dolores excitantes. Observandum autem citam dentitionem infantium leniorem & minus dolorificam; tardam vero vehementiores excitare inflammationes & dolores.

Signa.

Signa visuprehenduntur, rubent enim, calent & dolent gingivæ.

Curatio.

Curatio est ipsa dentium eruptio. Pruritus tamen gingivarum ante dentium proventum sedatur leni confricatione: solent itaque matres dentientibus puerulis lupinos dentes argento inclusos, aut aliud corpus duriusculum ac frigidum veluti est corculum ex auro aut argento fabrefactum adhibere & ori infantium inferere.

*Dentitionem pro-
moventia
& adju-
vantia.*

Utilissimum autem est capita puerorum ac maxillas potissimum aqua calida in qua concocti sunt flores chamæmeli, anethi, & malvæ lavare, & oleo liliaceo aut chamæmelino inungere, gingivas vero subinde confricare aut adipe gallinacea, aut cerebro leporino cocto, aut recenti butyro, aut sequenti linimento.

*Linimen-
tum.*

R. Mellis virginei ʒs.
Pulveris glycyrrhizæ, thuris an. ʒs. misceantur fiat linimentum.

*Inflam-
mationem
quæ sedent.*

Inflammationem autem & dolorem vehementiorem gingivarum adprime lenit & restinguit succus solani, aut plantaginis aut portulacæ subinde gingivis illitus. Idem præstat & mucilago ex seminibus cydo-

niorum cum aqua rosacea confecta. Item oleum rosaceum tepidum gingivis illitum, item butyrum recens cum melle virgineo commixtum.

2. *Luxuries sive intumescencia gingivarum quid, quæ ejus signa, & quomodo curanda?*

Parulides.

Gingivæ interdum supra modum luxuriant & intumescunt, adeo ut dentes prope modum obtegant; quæ affectio Græcis *παρυλίδες* & *επυλίδες* nominatur, quamquam propriè *παρυλίδες* gingivarum tumorem seu apostema, *επυλίδες* vero vesiculas circa radices dentium significat.

Causæ intumescentiæ sive excrecentiæ gingivarum sunt, mollities & instar spongiæ raritas gingivarum, & uberius sanguinis ad gingivas defluxus.

Signa evidentiâ sunt, visu enim ac tactu deprehenduntur.

Curatio.

Curatio succrescentium gingivarum in venæ cephalicæ sectione primum, deinde & venarum sub lingua delitescentium apertione, & scarificatione gingivarum, suctioneque redundantis sanguinis, & deinde remedium topicorum applicatione consistit, inter quæ præstantiora sunt hæc subsequentiâ.

*Vena se-
ctio.*

Mane ac vespere confricentur gingivæ luxuriantes sale & aceto, usque dum sanguis effluerit, tandem probe inungantur unguento Ægyptiaco vocato quantitate nucis avellaneæ. Aut confricentur sequenti pulvisculo.

*Confri-
catio.*

℞. Aluminis ulsi salis armoniaci an. ʒi.
Mastiches, thuris an. ʒs.

*Pulvis
luxurian-
tes gingi-
vas absumit.*

Ex quibus fiat pulvis tenuissimus. Aut quotidie eluantur sequenti collutione.

℞. Rosarum rubearum, plantaginis an.
M.s.

*Collutio
oris.*

Corticum mororum Celsi arboris

Paulbern /

Corticum malorum puniceorum an.

ʒii.

Aluminis crudi ʒi.

*Crollius
lapidem
suum me-
dicamen-
tosum dis-
terve*

Mastiches, thuris, æruginis an. ʒi.s.

Contusa coquantur in lib. ii. vini rubei ad medias, fiat collutio oris quæ tepida bis

solvit in a- terve mane ac vespere eluatur os ac confri-
qua plu- centur gingivæ, ac tandem obliniantur gin-
viali in givæ melle rosaceo.

eundem u- 3. *Gingivarum putrefactio, eroso ac ab-*
sum. *sumptio quid, qua ejus causa, qua*
signa, quomodo cu-
randa?

Gingiva- Gingivarum corruptio & diminutio, *tum corru-*
ptio. Græcis ἐλαπαδισμός est ubi gingivæ putre-
scunt, flaccescunt, absumentur radicesque
dentium denudant, osque terro odore com-
plent.

Causa. Causa πονηριέμεν putrescentium gingi-
varum est corruptus ac melancholicus san-
guis, vel serosa ac salsa erodensque pituita
sanguini admixta, & ad gingivas sive ex ce-
rebro sive ex liene defluens: πονηροὶ (ερκικαί)
sunt aer crassus, putridus & fælugine infe-
ctus, cibique crassi lenti & fæluginosi, qua-
les sunt fæscamenta omnia.

Signa. Signa sunt manifesta. Livefcunt enim
primum gingivæ & ex levi earum contactu
tenuis & ater sanguis profunditur, osque
fœtore completur, & paulatim absumitur
gingivarum caro, radicesque dentium nu-
ditate deformantur. At cum gingivarum
putrefactio perpetuum symptoma sit morbi
scorbuti nominati, & utraque affectio ex
iisdem ferè causis oboriatur, iisdemque re-
mediis curetur, non incommode hoc loco
methodum curandi scorbuti inferi posse ju-
dicamus.

4. *Scorbutus quid, qua ejus causa, qua*
signa, & quibus remediis
curanda?

Scorbutus Scorbuti vocabulum barbarum est, omni-
unda deno- bus antiquis Medicis ignotum, & à Danica
minatus. appellatione, qui hunc morbum **Schör-
huck** appellant ad nos derivatum. Pleri-
que autem Medicorum nominant & gingi-
pedium, hinc nimirum quod in eo gingivæ
potissimum afficiantur ac deinde & pedes tibi-
eque lividis maculis conspurcentur, arti-
culique pedum doleant, ambulandique offi-
cium impediatur. Veteribus & toti Europæ

Vbi grasset ignotus est hic motus & in solis maritimis
tur potissi- septentrionalibus locis grassatur ob crassi-
mus. tiem perculdubio, & putredinem fælugine

mixtam aëris, quemadmodum in Carinthiæ
regione **Pingkhato** à fluvio vocata, omnes
incolæ ob aquæ vitiatæ usum strumas miræ
magnitudinis sub collo acquirunt & rauca
voce loquuntur. Sunt qui hoc malum sto-
macen sive σωμακονχέλιαν, Plinio lib. 25. c. 3. cen Pli-
descriptam esse putent, in quo Plinius dicit
dentes decidere, & compages in genibus dis-
solvi. Alii vero malum hoc referunt ad mor-
bos ex magnitudine & intumescencia splenis
ortos quos Hippocrat. lib. 2. prædictionum
describit, ac dicit, in intumescensibus & ma-
gnis lienibus gingivas vitari easque grave o-
lere. Cui ut Cornelius Celsus lib. 2. cap. 1.
assentiri videtur inquiens, quibus magni sunt
lienes & intumescunt, iis aut sanguis ex nari-
bus fluit, aut gingiva corrumpitur & os male
oler, in cruribus vero magnæ cicatrices fiunt.
Sunt nonnulli, qui non sine rationibus scor-
butum ad icteritiam nigram referant.

Est itaque **SCORBUTUS** morbus
endemiæ id est certis regionibus ac populis
propter vitium aëris & aquæ proprius, in
quo primum corrumpitur in corporibus san-
guis, exulcerantur gingivæ, resolvuntur
compages pedum, & cutis tibiæ, non-
nunquam & humerorum aliarumque par-
tium, lividis, violaceis, flavis viridisque co-
loris maculis defædatur.

Causæ σωμακονχέλιος sive scorbuti πονηροὶ (ερκικαί) sunt aëris cruda, crassa & fælugi-
nosa constitutio, qualis aer est mari incum-
bens, ejusque vapore infectus, aquæ fæfæ
ac marinæ usus in potu ac cibo, alimenta
rancida, putida, & concoctu difficilia, ve-
luti sunt panis bis coctus, lardum rancidum,
carnes piscesque fumo durati.

Πονηριέμεν causæ sunt obstructions, *Causa in-*
tumor, & intemperies epatis & lienis, eo-
rumque debilitas in sequestratione seu puri-
ficatione excrementorum chyli sive sangui-
næ massæ, in qua purus sanguis, putidus &
tenuissimus est, & hinc sæpe in hoc mor-
bo per nares erumpit, bilis autem flavajui-
sto acrior ac calidior evadit, melancholi-
ca fæx similiter se ipsa crassior & fæcu-
lentiore existens faciliè obstructions lie-
nis & epatis conciliat. Hæc itaque putida
Hh & in-

An stom-
macen sive
σωμακονχέλιαν,
Plinio lib. 25. c. 3. cen Pli-
descriptam esse putent,
in quo Plinius dicit
dentes decidere, & compages
in genibus dissolvi.

Hippocra-
tis ma-
gni lienis
nihil aliud
sunt quam
scorbutus.
An icteri-
cia nigra.

Scorbutus
quid.

Causæ
scorbuti
externæ.

Causa in-
terna.

Vnde hæc
morhægia
frequens
in scorbu-
ticis.

*Causa
scorbuti
materialis.
Sympto-
matum
generatio.*

& inæqualis intemperataque sanguinea maffa in venis est causa materialis scorbuti, & cum in ea superet melancholica fæx, primum distendit splenem & diaphragma, respirationemque reddit difficilem, deinde ad pedes per ramos venæ portæ defluit eorumque motum impedit, & maculas in iis producit; acris vero & biliosa evaporatio, & pars hujus vitiosi humoris ad palatum delata, inficit & exulcerat teneram gingivarum carnem.

*Signa
scorbuti
imminen-
tis.*

Signa scorbuti imminētis sunt spontaneæ lassitudines & totius corporis gravitas, quæ subsequuntur & alia signa magis peculiaris, ut dyspnæa, sive anhelandi difficultas, præsertim ubi corpus commoveretur aut erigitur.

*Signa præ-
sentis jam
scorbuti.*

Si vero decumbat æger, liberius respirare possunt. His accedit gingivarum lividitas & ex quolibet contactu sanguinolentia, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, quandoque crurum intumescētia, nonnunquam vero eorum extenuatio.

*Interdum
tamen
macula
non appa-
rent, præ-
sente ta-
men scor-
buto.
Prognosti-
ca.*

Hoc autem perpetuo adest, lividæ nimium, plumbeæ, flaveæ & violaceæ in cruribus maculæ & faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Prognostica signa hæc sunt: Appetentia in scorbuto raro prosternitur, nisi alia accedant symptomata.

Scorbutus in febris exortus, contagiosus est & ut plurimum lethalis. Terminatur enim in perniciosam dysenteriam sive alvi fluorem, & adimit hominem repentino animi deliquio.

*Curatio
scorbuti.*

Curatio scorbuti perficitur victus ratione convenienti, venæ sectione, & remediorum usurpatione.

Dieta.

In victus ratione utatur æger cibis boni succi & concoctu facilibus, veluti sunt cremor ptisanæ, pulli gallinacei, ova forbilia, juscula carnum recentium, caro vitulina, pruna Ungarica, cappares &c. Econtra vitet fumo duratas saleque conditas carnes ac pisces, item carnem suillam, leporinam, anserinam & omnium avium in aquis degentium. Potus eorum esto cerevisia clara & benè cocta, & præstat absinthiaca, aut in qua chamædris & ceterach sunt

macerata. Laudatur & vini optimi vel absinthitis ad mensam haustus.

His ritè ordinatis venæ sectio est institienda. Oportet autem sanguinem detrahere non una vice, nec ex una tantum parte in hoc morbo, sed ter ad minimum, interpositis tamen aliquot diebus.

Primum autem incidenda est vena humeraria sive splenetica sinistri brachii, deinde saphæna vocata sinistri pedis, aut sub poplite, aut sub interno malleolo pedis. Postremo & duæ venæ lividæ sub lingua latitantes commodissimè incidi possunt.

Post venæ sectionem crassus, putidus & phæculentus sanguis in toto corpore sequenti potione præparari, extenuari & ad educationem habilis reddi potest.

℥. Rad. Capparum,
Polypodii,

*Potio dige-
stiva.*

Corticum fraxini arboris an. ʒ ii.

Hellebori nigri prius in aqua mellisæ ebulliti & exiccati ʒ iii.

Rad. Chinæ ʒ ii.

Sem. Anisi,

Feniculi an. ʒ s.

Quatuor seminum frigidorum majorum an. ʒ i.

Herb. Veronicæ,

Absinthii, centaurei minoris,

Chamædris, asplenii an. M. s.

Thymi, epithymi an. p. i.

Fol. senæ, rhabarbari an. ʒ ii.

*Si herba
ha in vino
infundan-
tur, & de
vino hoc a-
ger bibat,
magis pe-
netrat &
materiam
præparat.*

Confer. fumariz, boraginis, melissæ an. ʒ i. Contundendis contusis & concidendis concisis coquantur in iii. lib. aquæ in duplici vase sive cantharo oblinito ad sesquihoram, quæ refrigerata exprimantur ac colentur; cujus liquoris omni diluculo & duabus horis ante cænam exhauriendæ offerantur ægroto ʒ ii. tepidæ.

Hac potione exhausta interpositis duobus diebus, ut natura reficiatur, evacuentur putidi humores sequenti haustu cathartico.

℥. Flo. Senæ Alexandrinæ ʒ ii.
Rhabarbari ʒ i.

*Haustus
purgans.*

Contusa parum infundantur in ʒ v. aquæ absinthii & macerentur per noctem. Altero die ebulliant leniter & expressa colentur,

lentur, colato juseulo admisceantur diacatholici 3 ii. elect. rosati Mesuæ 3 i. syr. de epithymo 3 s. Fiat haustus, qui tepidus in aurora exhibeatur & abstineat æger à cibo potuque per 6. horas.

Tandem singulis diebus una hora ante prandium ac cænam corroborentur vires sequenti electuario.

Electuarium corroborans.

℞. Myrabalanorum chebulorum conditorum 3 i.

Conser. florum boraginis, buglossæ, Melissæ,

Fumariæ an. 3 ii.

Specierum diarhodon Abbatis plynii sarcotici an. 3 ii.

Pul. ceterach. 3 s. cum syrupo acetositis citri seu limonum q. s. commisceantur in forma electuarii, cui postremo admisceantur ol. cinamomi arte chymica destillati guttulæ 1 ii. olei angelicæ guttulæ v.

Balneum scorbuticum valde utile.

Deinceps ubi vires constant plurimum conducit ægotantem in balneum sudorificum deducere, & post mediocrem desudationem herbis emollientibus, veluti sunt chamæmelon, melilotum, anethum, malva, betonica, absinthium &c. in aqua coctis totum corpus fricare, eademque aqua probè ablueri, & pedum articulos & totam tibiam oleo chamæmelino inungere.

Compensatio scorbuti curatio ab auctore sæpè probata.

Ego potto tenuioris fortunæ homines, qui sumptuosam hanc laboriosamque curationem admittere non possunt, solis sequentibus vulgarissimis remediis sæpissimè per gratiam Christi felicissimo successu sanitati restitui.

Decoctum simplex antiscorbuticum.

Post venæ sectionem accipiat æger nasturcii aquatici *Brunnkresse* M. 1 ii. & si haberi potest, acetosæ minoris in agris nascentis cum floribus ac radicibus M. 1 i. Concidentur simul crassiusculè & macerentur per noctem in lactis caprini lib. v. 1 i. ac tandem coquantur leniter ad 1 i. fere lib. absumptionem & percolentur: hujus lactis ebibat æger haustum satis largum ad 3 vi. omni mane, & 1 ii. horis à prandio, eoque utatur donec sanguis est purificatus, morbi semina extincta, & manifesta sanitatis restitauratio percipiatur.

Plurimos curavimus scorbuto conflantes solo sequentis pulvisculi usu.

℞. Aloës hepaticæ purissimæ, croci orientalis an. 3. ii.

Myrrhæ 3 i.

Electuarii de succo rosarum in solida tabularum formam confecti 3 s.

Tenuissimè pulverata commisceantur, cujus 3 i. mane, & 3 i. vesperi duabus horis ante cænam haustui lactis caprini admisceatur, aut præscripto lacti in quo nasturtium aquaticum est coctum, ebibendaque ægotanti propinetur, & proculdubio brevi extirpabuntur semina scorbuti.

Symptomata scorbuti, pedum videlicet Symptomata tumores compaginumque resolutiones, nervorum in articulis rigores, & maculæ in tibiis, item gingivarum putrescentium exulcerationes, dentiumque vacillationes hisce remediis feliciter curari possunt.

Primum alternis ad minimum diebus fomententur tibie & articuli pedum vapore decoctarum herbarum, videlicet chamæmeli, anethi, meliloti, serpilli, betonicæ, scordii, baccarum juniperi & similibum, qui ubi sanis sudarunt calore vaporis, tandem in decocto earundem herbarum probè laventur, herbisque prædictis confricentur pedes & ligamenta poplitis, deinde exiccati, inungantur oleo chamæmelino tepido aut sequenti linimento.

Pedum & tibiæ rigidarum cura.

℞. Unguenti dialthææ 3 s.

Ol. Chamæmelini, liliorum alborum, anethini an. 3 ii.

Unguentum.

Granorum juniperi 3 s.

Misceantur, fiat linimentum, quo & post lotionem & alias singulis diebus bis inungantur tibie & articuli pedum. Ante inunctionem vero præstat vola manus pedes molliter confricare donec nervi incallescant. Nervi vero ligamentaque articularum si rigent contrahanturque, quotidie laventur liquore subpingui & mucoso ex decoctis pedibus bubalis præparato.

Contractura nervorum remedium.

Gingivarum putredo & exulceratio, dentesque vacillantes in scorbuto sequentibus remediis curari possunt. Singulis diebus mane ac vesperi eluantur ac confricentur gin-

Gingiva putrescens & dentes vacillantes ut curantur.

givæ sale & aceto, donec sanguis ex gingivis profluat, & mox inungantur aut unguento Ægyptiaco, aut sequenti linimento.

*Linimen-
tum.*

℞. Mellis scillitici 3 s. Olei vitrioli 3 s. Misceantur, fiat linimentum, quod utilissimum & saluberrimum est ad omnes gingivarum & oris affectiones. In vehementibus gingivarum putredinibus sequenti decocto eas colluere utilissimum erit.

*Collutio o-
ris, sedum
minus seu
vermicula-
ris valde
hic juvat.
Lapidem
medica-
mentosum
hic com-
mendat
Crollius.*

℞. Rosarum rubearum, plantaginis an.
M. s.

Rutæ,

Salviæ an. M. s.

Æruginis *Grünsuan* 3 i.

Thuris, mastiches an. 3 i. s.

Aluminis 3 s.

Concisa & contusa coquantur in aqua & aceti singulorum lib. s. ad medias, colentur & colato liquori admisceantur mellis rosati 3 ii. Fiat collutio.

pertum esse asserit, seque non simplicem dolorem tantum sed & pulsatilem dolorem in substantia dentium manifestè sensisse: 2. *facilis ori-
tur a copia
sanguinis
calidi in
arteriis
dentium
contenti.* aut in nervis, radicibus dentium insertis: (In omnium enim dentium radicibus implantati sunt, & quidem satis altè rami nervorum ex tertio pari nervorum cerebri ad maxillas descendentes) 3. aut in gingivis, si illæ videlicet circa dentes inflammantur, cum quibus per *συμπύκνωσις* & dentes ipsi condolent.

Causæ *αἰσθητικῆς* moventes *αἰσθη-
τικῆς* sunt ær ventique impensè frigidi, *loris den-
tium ex-
terna.* & aqua frigidissima in ore detenta, duriusculorum corporum dentibus mordicatio, entro aut ferro dentium fodicatio, nucum juglandium & veteris casei, uti & dulcium crebra commenducatio: quæ causæ sedulo sunt vitandæ qui dentium affectionibus laborant.

Προγυμέναι causæ sunt intemperies calida aut frigida, humoribus calidis, tenuibus acribusque aut frigidis adjuncta, qui ex partibus subcutaneis capitis primum ad maxillas, earumque alveolos, deinde ad dentium radices irruunt, nervosque in dentium radicibus aut obstruunt ac comprimunt, aut erodunt, aut in tumorem extendunt, & sensum doloris acerbum inferunt.

Signa calidorum humorum ad dentes defluentium sunt dolor acerbissimus sine tumore genarum, faciei pallor & macilentia. *Signa.*

Frigidorum humorum defluentium signa sunt, dolor mitior, genarum tumor & faciei albedo, & ad contactum genarum nullus sentitur caloris excessus.

Curatio pro causarum internarum differe-
rentia varianda est. Si itaque in dolore dentium adsit plethora id est sanguinis redundantia, quod ex rubedine faciei dignoscitur, curatio à venæ cephalicæ, circa pollicem manus lateris dolentis, sectione instituenda est. In calidorum vero, tenuium acrimque humorum defluxione ad dentes, aversionis humorum acrium gratia, prodest cervici cucurbitulas cum scarificatione adfigere: aut acres tennesque humores per la-
vesica-

SECTIO VI.

DE DENTIIUM MORBIS.

1. Dentes quibus afficiuntur morbis?

Soli dentes inter omnia ossa torius corporis & nudi spectantur, & facultate sentiendi præditi sunt, suntque tanquam nervi indurati. Sunt autem morbi dentium:

*Dentium
affectus.*

Dolor vehementissimus,
Mobilitas seu vacillatio,
Erosio seu excavatio,
Fuscedo seu scæda decoloratio,
Stupor seu hæmodia.

2. Dolor dentium quid, quæ ejus causa, quæ causarum signa, & quibus remediis curandus?

*Odontal-
gia quid.
Ejus diffe-
rentia tri-
plex.*

Ὀδονταλγία dentium dolor, est ingens cruciatus & ineffabile tormentum quod dentibus accidere consuevit. Porro doloris dentium tres sunt differentiæ Galeno lib. 6. de usu part. & lib. 3. de composit. medicam. *ἢ τῶν* teste. Sentitur enim vehemens dolor, 1. aut in ipsa dentium substantia, id quod Galenus se in propriis dentibus ex-

*Causa in-
terna &
proxima.*

Signa.

Curatio.

*Vena se-
ctio.*

*In calido
affluxu re-
media.*

*Cucurbitu-
la.*

vesicatorium aliquod remedium à dentibus avertere, elicere & evacuare, id quod commodè fieri potest sequenti placetula.

Vesicatorium.

℥. Cantharidarum pulveratarum 3 s. Fermenti acris 3 s.

Aceti acerrimi parum, commisceantur, fiat massula vel placentula, qua nucis juglandis testula compleatur, & ponè aures adligetur per pauculas horas, donec vesica excitetur, qua pertusa effluet tenuis & acris humor, causa mali: Deinde ruptam vesiculam, quo citius curetur, & dolor mitigetur, oleo rosaceo inungere præstat. Illi ipsi acres calidi & tennes humores ex capite ad dentes fluentes, commodè evacuari possunt sequentibus pillulis.

Pillula acres humores evacuantur.

℥. Mas. pill. aurearum, cochiarum, hieræ simpl. an. 3 i.

Diagridii gr. v. Ex quibus formentur pillulæ n. 27. & 6. horis ante prandium deglutiantur.

Dentium dolores ex calida intemperie humoribusque ortos sequentibus remediis mitigare & sistere poteris.

Liquor in ore tenendus.

℥. Sem. portulacæ, plantaginis an. 3 ii. Herb. sempervivi minoris, parietariæ an. M. i.

Glycyrrhizæ 3 i. s. Contusa decoquantur in aceto q. s. colentur & tepidus liquor in ore diutiusculè contineatur. Aut

Alia collusio magis narcotica.

℥. Sem. lactucæ, papaveris nigri, hyoschiami an. 3 ii. contusa coquantur in aceto, colentur, & liquor calidus in ore contineatur.

Narcoticis non temere utendum.

Remedia narcotica vel stupefacientia dentium dolores ex calida intemperie aut fermentioribus humoribus ortos, statim sedant dentibus inserta. Sed cavendum est ne temerè eis utamur, nisi summa urgeat necessitas, non enim carent noxa. Inter ea autem præstantiora hæc sunt.

Globuli narcotici, dentibus inserendi.

℥. Opi thebaici 3 s. theriacæ Andromachi 3 i. commisceantur, formenturque globuli, cavernis que dentium imponentur. Aut repleatur cavitas dentium Philonio Romano. Aut

Liquor

℥. Suc. sempervivi Hausblock/

Hyoschiami, solatri an. 3 ii. *narcoticus.*

Aceti rosacæ 3 i. commisceantur, ac tepida in ore contineantur.

Sedat quoque dolores dentium ex calida defluxione genitos galla in partes scissa & dentibus imposita mordicusque inter dentes retenta: Genas foris inungere unguento populino aut oleo rosaceo, mitigat dolores dentium.

Galla dolores dentium sedat.

Porro in doloribus dentium ex frigida defluxione aut intemperie ortis utilissimè sequentibus remediis utimur.

Primum frigidi humores subtrahantur ex capite sequentibus pillulis.

Doloris dentium ex frigida defluxione remedia.

℥. Mas. pil. de agarico, hieræ simpl. an. 3 s. *Pillula.*

Trochiscorum alhandali gr. iiii. cum aqua betonicæ formentur pillulæ n. 27. & deglutiantur à cæna tribus horis.

Deinde in ore tepida retineatur sequens dentium collutio. *Topica varia. Collutio.*

℥. Flor. salviæ, Rorifinarini, Betonicæ, Majoranæ an. M. s.

Nigellæ, sem. carvi an. 3. ii.

Rad. pyrethri 3 iii.

Concisa & contusa coquantur in vini lib. i. ad medias, colentur, ex liquore fiat collutio. Herbæ vero concoctæ instar cataplasmatum maxillis foris imponantur tepidæ. *Cataplasma. sma.*

Aut. ℥. Origani, calamenthi, hyssopi, verbenæ cum radicibus an. M. s.

Pyrethri 3 iii. contusa & concisa coquantur in lib. i. vini ad medias, fiat collutio dentium.

Radix pyrethri concisa & dentibus imposita mordicusque in ore retenta, frigidos humores extenuat, elicit & dolores dentium sedat. *Rad. pyrethri in ore desentia.*

Idem præstat & radix Tithymali *Wolffmilch* in aceto macerata, & dentibus imposita.

Cavernis dentium in frigida defluxione globulum ex sequentibus rebus confectum imponere utilissimè possumus.

℥. Theriacæ Andromachi 3 i. *Globuli.*

Hh 3 Euphor-

Euphorbii ʒ s.

Commisceantur cum pauxillo vini adu-
sti **Brandwein.** Aut*Ol. succini
quoque
valde pro-
dest.*ʒ℥. Hieræ picræ Galen. ʒ i. commisce
cum vino ardentis & dentibus illinito.Unum ex sequentibus oleis stillatitiis
dentibus illitum aut lana xylyna exceptum
dentibusque insertum, statim tollit dolores
dentium ex frigida causa.*Crollius ho-
rum loco
suum o-
dontalgi-
cum oleum
anodinum
usurpat, &
equam o-
dontalgi-
cam.*Oleum { Petroleum,
E cariophyllis,
Spicæ,
Terpentinæ,
Ex granis juniperi.Foris commodè inungi possunt genæ
oleo anethino aut rutaceo. Ubi autem ge-
næ intumuerunt & nondum cessarunt dolo-
res, sequentes herbæ in sacculo confuantur,
& in æquali portione aceti & aquæ ebul-
liant, & expressus sacculus calidusque ge-
nis applicetur.*Sacculus
genis ap-
plicandus.*ʒ℥. Malvæ,
Meliloti,
Anethi an. M. i.
Rosarum rubearum M. s.
Spicæ celticæ,
Rorismarini an. P. i.Sem. sænugræci, lini an. ʒ ii. concisa &
contusa insuantur sacculo.*Dentium
dolor ex
gingivis ut
curandus.
Collusio.*Si dentes per consensum ex gingivarum
affectione condoleant, sequenti collutione
uti possumus.ʒ℥. Gallarum, corticum granatorum,
sem. plantaginis an. ʒ ii.Rad. verbenæ ʒ s. sandaracæ ʒ i. Con-
tusa coquantur in aceto vini, colentur, & eo
liquore colluantur dentes.Ex quacunque autem causa oboriatur
dentium dolor, omnium præsentissimum ad-
fert auxilium oleum vitrioli dentibus illi-
tum, aut lana xylyna exceptum cavernisque
dentium impositum. Præstat autem & vi-
res suas citius exferit, si prius cavernulæ
dentium scalpello, aut acuta penna à fordi-
bus emundentur, & eo usque radices den-
tium fodiantur aut gingivæ donec sanguis
erumpat, si ita oleum vitrioli imponatur.
Quin & specifica proprietate, dolores den-*Ol. vitrio-
li anody-
num in o-
mnis dolo-
re.
Chymici
miraculo
se, inun-
ctione scal-
pelli quo
gingiva*tium sedat senecta serpentis in vino aut ace-
to cocta & ore rerenta. Aut gummi hæde-
ræ erosio dentibus insertum.*vulnerata
sunt, dolo-
res den-
tium san-
nant.*Quicumque excavatos dolentesque den-
tes digitis eximere sine omni cruciatu ac
molestia cupit, is dissolvat ʒ ii. gummi am-
moniaci aut galbani cum sufficienti lacte e-
sulæ aut hyosciami, & coquat lento igne
donec lac absumatur. Ex his gummatibus
conformet globulos, & erosio foraminibus
dentium imponat per noctem, & sic sine do-
lore eximere dentes poterit.*Exuvia
serpentis.
NB.
Quomodo
dentes ab
que dolore
eximendi.*3. *Dentium nigredo & scabrities quid, ex
quibus causis provenit, qua signa,
& quibus remediis cu-
randa?*Μελανωδόνται vel Μελανία ἢ ὀδόνται, den-
tium nigredo est quando dentes decoloran-
tur, & fusco, livido, nigro flavoque colore
conspurcantur & deformitatem aspicienti-
bus inferunt. Candidi enim & eburnei den-
tes inter honestam pulchritudinem nume-
rantur.*Dentium
decoloratio
quid.*Causæ nigredinis dentium *αἰτιαται* Causa.
καὶ sunt cibi justo calidiores, creber dul-
cium eduliorum usus, potissimum lactis,
detergendi abluendique dentes incuria.
Προσημνέται sunt crapula & crudæ ex ven-
triculo exhalationes, & defluentes ex capite
ad dentes corrupti humores.Signa sunt manifesta, intuitu enim de-
prehenduntur.*Signa.*Curatur spurcities dentium, causarum Curatio.
sublatione & dentium crebra deterfione ar-
tificiosaque dealbatione. Si itaque dentes
fædo colore inficiantur ex vitiosis humori-
bus ad eos defluentibus, subducantur hi se-
quentibus pillulis.ʒ℥. Mas. pil. aurearum, arabicarum, Pillula.
aggregatarum an. ʒ i. cum aqua majora-
næ conformentur pillulæ n. 27. & deglutian-
tur vesperti tribus horis à cæna, ac tandem
quotidie mane ac vesperti abstergantur den-
tes, & digito probè confricentur sale & ace-
to, quibus aqua pura elotis, sequentibus pul-
visculis dentes dealbantibus, digito primum
melle rosaceo madefacto, & in pulvisculum
tincto, optimè confricentur.

ʒ℥. Ma-

Dentifri-
cium ele-
rans.

℥. Mastiches corallii albi adusti an. 3 s.
Ossium sepia piscis ʒ i.
Ossium dactylorum ustorum, pumi-
cis an. ʒ s.
Spica Indica cyperi an. gr. v.
Salis gemmei, caryophyllorum, gal-
liae moschatae an. ʒ i.

Moschi gr. ii. conterantur in tenuissi-
mum pulvisculum, quo confricentur den-
tes, quibus non tantum candorem, sed &
suavem oris halitum conciliat. Aut

Denti-
ficium
ulcerum.

℥. Maxillarum lucii piscis ustarum
Hechtæ Zahnen ʒ ii.
Corallii albi adusti ʒ s.
Pumicis ʒ i. radices iridis illyricæ
3 s. aluminis usti ʒ s.

Conterantur in tenuissimum pulverem,
fiat dentifricium. Aut

Dentifri-
cium tey-
inum.

℥. Aluminis usti, salis gemmei, bora-
cis, tartari usti an. 3 s.

Testarum ovorum ustarum ʒ i. pulve-
rata commisceantur, fiat dentifricium. Aut
inungantur sequenti linimento.

℥. Aluminis usti,
Myrrhæ, mastiches an. 3 s.

Cornu cervini adusti ʒ i. testar. ovo-
rum ustar. ʒ s.

Pulverentur subtilissimè & commiscean-
tur cum q. s. oxymellis scillitici, fiat lini-
mentum, quo dentes crebro confricentur.
Aut

Liquor ad
rurandem
usum.

℥. Rad. althææ, iridis illyricæ an. ʒ s.
Concidantur crassiusculè, & decoquan-
tur in q. s. aquæ aut marinæ aut cui admi-
xtæ sunt salis gemmei & aluminis an. ʒ ii.
Hisce radicibus probe coctis, coletur ju-
sculum, quo dentes elui possunt. Radices
vero in fornace exsiccatæ, in minutissimum
conterantur pulverem, eisque commiscean-
tur moschi gr. iiii. fiat nobile dentifricium.

Dentifri-
cium no-
bile.

Dentes lividos & impuro lentore fuligi-
neque obductos citissimè abstergit, & in-
star nivis candidos reddit, si aliquoties con-
fricentur, post elotionem cum sale & aceto,
oleo vitrioli. Verum cavendus est crebrior
ejus usus, emollit enim & friabiles instat
cretæ aut calcis reddit dentes, si sæpius eo
confricentur.

4. Dentium vacillatio sive mobilitas quid,
quæ ejus causa, quæ signa, & quo-
modo curanda?

Εχθροτάτη ὁδὸν, dentium vacillatio si-
ve mobilitas. Mobiles fiunt dentes in suis
alveolis & vacillant, ubi nervi in eorum ra-
dicibus & ligamenta, quibus gingivis con-
nexi ac firmati sunt, resolvuntur laxantur-
que.

Dentium
vacillatio
unde.

Causæ relaxationis resolutionisque ner-
vorum & ligamentorum circumdente, κα-
κὸν τροχικὴν sunt, aut violenta concussio,
aut venenati fumi vaporesque, veluti sunt
hydrargyrii sive argenti vivi cinabrii, stibii
sive antimonii Spizglaz / item medica-
menta stupefacientia diutius in ore retenta.
Ex hisce causis, plerumque argentariis, me-
tallorum fusoribus & aurifabris dentes va-
cillare consueverunt.

Causa.

Cur auri-
fabris den-
tes vacil-
lent.

Προγινώσκουσα causa sunt humorum putri-
dorum ad dentes & gingivas defluxio, qua-
les causas in scorbuti curatione dentes va-
cillantes reddere docuimus.

Signa sunt manifesta.

Signa.

Curatio in vacillatione dentium prima e-
rit, ut externæ causæ evitentur, internæ
autem evacuentur, putidique humores sub-
trahantur sequentibus pillulis, prius, si opus
fuerit, præparatis humoribus vitiosis cum
potione live decocto in scorbuti curatione
præscripto.

Curatio.

℥. Mas. pil. de hiera simplici, foetida-
rum, aggregatarum an. ʒ i.

Pillula.

Trochiscorum alhandali gr. iiii. ex qui-
bus conformentur pillulæ n. 27. cum aqua
betonica, & deglutiantur tribus horis à
cæna. Deinde si adsint scorbuti signa, cu-
ratio vacillantium dentium ex medicatione
scorbuti petenda est. In genere vero dentes
vacillantes stabiliunt ac confirmant & den-
tium ligamenta laxitatemque gingivarum
probe constingunt sequentia remedia.

℥. Rosarum rubearum, veronicæ, plan-
taginis an. M. s.

Collutio
dentes fir-
mans.

Nucum cupressi ʒ ii. baccarum myr-
rhi, sumach an. ʒ i.

Corricum granatorum, gallarum
an. ʒ s.

Cor-

Corticum radicum prunorum silvestrium, corticum mori arboris an. P. r. aluminis, mastiches, thuris an.

℞ i.

Concisa & contusa crassiusculè decoquantur in lib. i. vini rubei ad tertias, colentur, & eo liquore frequenter os & dentes ac gingivæ eluantur tepido. Post elotionem verò confricentur sequenti pulvisculo.

℞. Gallarum, corticum granatorum an.

℥ s.

Balaustiarum, sumach, myrrhæ an. ℞ i.

Sanguinis draconis, mastiches, thuris an. ℞ s.

Fiat pulvis subtilissimus.

Si vero gingivæ putrescant cum dentium vacillatione, fortiori medicamento sequenti gingivas colluemus.

℞. Aluminis usti ℥ ii.

Mastiches, myrrhæ, thuris, æruginis an. ℥ i.

Rosarum rubearum, teucriti sive veronicæ an. M. s.

Crassiusculè contusa & concisa coquantur in aceti & aquæ an. lib. s. ad medias, colentur, quo fiat collutio.

Post elotionem inungantur dentes & gingivæ sequenti linimento.

℥. Pul. æruginis ℥ i. mellis rosacei ℥ i. aceti vinacei ℥ s.

Ærugo tenuissimè pulveretur & simul commixta ad aceti adsumptionem coquantur, quibus per se refrigeratis, admisceantur tenuissimi pulveres aluminis usti ℞ i. mastiches, myrrhæ, thuris an. ℞ i. fiat linimentum. Reliqua remedium genera ex scorbuto huc accommodari possunt.

5. Cavitas seu erosio dentium quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo in dentium cavitatibus vermiculi generantur, & quomodo curanda?

Dentium excavatio seu erosio unde.

Vermiculi dentium.

Κοιλωσις τῶ ὀδόντων, cavitas dentium. Excavantur dentes & præsertim molares, hominibus, tum quia nudi sunt, tum quod ex continua contritione alimentorum, e-
jus interstitiis & cavitatibus alimentorum reliquiæ inhaereant. Sæpe & vermiculi exi-

gui, instar teredinum vel tinearum, quales & sæpe inter cutem & cuticulam manuum ac pedum, pustulas ac pruritum excitantes generari solent: quos nostri *die subren* vocant. Hi dentium vermiculi sæpe acerbissimos dolores dentium excitant.

Causæ excavationis erosionisque dentium *απορρυπναι* sunt putres & vitiosi humores reliquiæque alimentorum putrefactæ & ad radices dentium incumbentes, in maxillarumque alveolis collectæ. *Προσποσιν* sunt ciborum reliquiæ, & incuria crebræ emundationis dentium.

Signa excavatorum dentium & tactu & visu facillè deprehenduntur, & ut plurimum qui excavatos dentes habent, jejuni tetrum halitum exspirant, nisi putrida materia ex iis eximatur.

Curatio consistit in causarum remotione. Si itaque dentes ex humoribus acrioribus & putridis in alveolis dentium collectis erodantur, caput purgetur sequentibus pillulis.

℥. Mas. pil. aurearum,

Foetidarum,

Arabicarum an. ℞ i.

Trochiscorum alhandali gr. i. i. ex quibus contusis cum aqua majoranæ formetur pillulæ n. 27. ac deglutiantur ante somnum à cæna. Aut si necessitas efflagitat vitiosi humoris præparationem & decoctionem evacuationemque, iis remediis utiliter procedere possumus, quæ supra in curationibus specierum cephalalgicæ à vitiosis humoribus ortarum descripta sunt. Ne autem dentes amplius excaventur & ab erosionem præserventur, opus erit singulis diebus à cæna & prandio cavitates & interstitia dentium dentiscapio argenteo aut eburneo aut ex virgulis salicis parato ab impuritatibus expurgare, & vino rubeo aut aceto scillitico aut rosaceo, aut sequenti decoctione diligenter eluere.

℞. Verbenæ,

Veronicæ,

Salviæ, hyssopi an. P. r.

Caryophyllorum, rad. iridis illyricæ an. ℥ i.

Spicæ Indicæ, mastiches an. ℞ i.

Concisa

Pulvis
dentes mo-
biles stabiliens.

Collutio ad
dentes vacillantes
& gingivas putridas.

Linimentum.

Lapis medicamentosus
Crollii idem præstat.

Causa.

Signa.

Curatio.

Pillula cephalica.

Præservatio ab erosionem.
Mundatio dentium.

Collutio.

Concisa & contusa crassiusculè in vini rubei lib. i. ad tertias concoquantur, liquoreque colato tepido dentes abluantur. Post elotionem si sequens pulvis dentium cavitatibus inferatur præservat ab erosione dentes, & suavem expirationem ex ore efficit.

Pulvis ad dentes erosæ ac putres.

- ℥. Rad. verbenæ, agrimonie an. ʒ s.
Cinamomi electi, mastiches an. ʒ i.
Origani, menthæ an. ʒ i.
Rad. iridis illyricæ, zedoariæ, angelicæ an. ʒ i.

Odontalgici Crollii g. 1. denti impostum cum gossyp. efficac est remedium.

Moschi gr. ii. concidantur crassiusculè pulverata, & dentium cavitatibus inferantur.

Trallianus gravis autor Græcus ad erosionem cohibendam sequenti remedio uti nos docet.

Tralliani experimentum.

- ℥. Opii Thebaici ʒ i.

Myrrhæ, styracis calamithæ an. ʒ s.

Piperis albi, croci, galbani an. ʒ i.

Ex omnibus his contusis cum melle scilicito conformentur globuli pro cavitatis dentium capacitate & imponantur per noctem.

Remedia ad vermiculos dentium auferendos.

Si teredines sive vermiculi in radicibus dentium generantur, id quod ex vehementissimo terebrante & pullante dolore cognoscitur, tales vermiculi sequenti remedio elici & interimi possunt.

Suffragium.

- ℥. Sem. hyoscyami ʒ i.

Cæparum, porri an. ʒ s. Crassiusculè contusa laminæ ferreæ aut lateri candenti imponantur, ex quibus excitatus fumus per trajectorii foramen, quod dentis cavitati est applicatum, recipiatur. Statim enim ubi vermiculi fumum perferant spontè excidunt & cum aquosa vel tenui saliva effluunt, & si laminæ candenti incidant, moventur ac crepant. Aut

Globuli.

℥. Sola semina hyoscyami aut simul jam dicta semina & cum s. q. sevi caprini **Bochig-tallich** conformato globulos, & cavitati dentium imponito.

6. Stupor dentium quid, quæ ejus causæ, quæ signa, & quomodo curandus?

Stupor

Aquod dentium stupor est, quando den-

tes sensu tactus vitiantur, ita ut cibum ægrè dentium & cum molestia commasticare queant.

Causa stuporis dentium **αἰσθητικὴ** est causa, vapor acidus ex ventriculo delatus & dentibus instar fuliginis adherens. **Προσγεγραμμένη** est rerum acerbarum & stypticarum, quales sunt mala acida, uvæ imminutæ, prunella sylvestris, mala cydonia, masticatio, vini item austri & acidorum potus.

Signa patienti sunt notissima.

Signa.

Curatio est facilis, dentes nimirum à succis acidis abstergendo, & calefaciendo, idque vino calido, non tamen austero aut acido in ore retento, aut pannò calido saepe ustulato, dentes confricando, fieri potest: specifica facultate abstergunt dentium stuporem, portulaca viridis, aut ejus semen, aut amygdalæ amaræ commasticatæ.

Curatio.

Nuces pinæ & avellana commasticatæ, ol. omphacinum & castoreus recens idem præstant.

SECTIO VII.

DE MORBIS LINGUÆ.

1. Qui sunt lingua morbi præcipui?

Lingua

Lingua est inter omnes corporis partes, si usum spectemus, & optima & pessima. Est autem lingua organum distinctæ ac explanatæ vocis, saporumque certissimus judex. Composita est lingua ex novem musculis, quibus variè movetur, & duabus vestitur tunicis, quæ ortum habent ex tertio pari nervorum cerebri per linguam expanso, quarum exteriorem communem habet lingua cum palato, per quam sapores percipimus. Morbi præcipui, qui linguæ accidunt, hi sunt:

lingua

Constitutio lingue ex variis partibus.

Lingua affecius.

Pustulæ seu aphthæ,
Paralysis,
Gustus depravatio,
Tumesculi scyrthosi,
Ranulæ,
Scabrities & nigredo.

2. *Pustula lingua quid, qua ejus causa, qua signa, & qua ratione curanda?*

Aphtha quid.

Ἀφθῆς, pustulae linguae, Arabibus Alcola, nostri **die Schwammen** / infantibus familiare malum, quod non tantum iis per superficiem linguae, sed in toto ore & labiis spargitur. Adulti rarius hoc symptomate affici solent.

Causa.

Causa pustularum in infantibus ut plurimum est *πρὸνυλαχτηνῆ*, vitiosa videlicet qualitas lactis, quod sugunt infantes, tenuitas videlicet, acredo & ignea caliditas. In adultioribus *πρὸνυλαχτηνῆ* causae sunt, tennes, acres & venenosi humores ex cerebro per palatum defluentes, aut vapores calidi & acres ex ventriculo aliisque visceribus inflammatis in os exhalantes, uti in morbis calidis saepe contingit.

Signa.

Signa sunt manifesta. Pustulae enim conspersae per linguam & vicinas partes conspiciuntur, ex quarum colore praesagientia signa sumimus. Pustulae enim albicantes ac rubentes tutiores sunt & curatu faciles: Lividae autem aut subnigrae perniciosae & saepe lethales habentur.

Curatio.

Curatio pustularum linguae in infantibus consistit in alteratione lactis nutritis & accurata ablutione abstersioneve pustularum. Nutrix itaque caveat ab usu alimentorum acrium & largius salforum, veluti sunt piper, sinapi, carnes piscesque sale conditi vel fumo indurati, caveat & vini potionem. Bibat autem quotidie jejuna & tribus horis à prandio lac, quod confectum est ex quatuor seminibus majoribus & semine lactuca cum aqua stillatitia plantaginis q. s. dulcoretur cum saccharo candi q. s.

Topica infantibus adhibenda.

Lingua infantum & oris partes quae pustulis sunt conspersae eluantur & confricentur bis terve post suctionem lacte bubalino vel caprino, in quo auriculae Judae vel fungi sambucini **Fleder örcken** sunt incocti. Cum ipsis itaque fungis & lacte, aut foliis salviae virentibus in eodem lacte madefactis pustulae confricentur & abstergan-

Absterfo cum fungis sambuci.

tur; quibus absterfis, lingua & partes pustulosae oris inungantur aut melle rosaceo aut diamoro, aut rob ribium. Item eluantur aqua rosacea, plantaginis aut solatri, quae remedia sufficiunt ad curationem aphtharum albicantium & flavescentium. Ubi vero aphthae lividae aut nigrae apparuerint, quae difficilius sunt curationis & periculosiores, in hujusmodi aphthis frequenter eluantur pustulae sequenti decocto.

℞. Florum rosarum chamemeli, meliloti an. M. i.

Sem. sanugraeci 3 s. sumach 3 ii.

Coquantur in aquae plantaginis lib. ii. ad medias, coeantur, quo tepido aphthae eluantur & eo madefacto folio salviae probe confricentur.

Præsentissimum vero remedium ad aphthas cujuscunque coloris tam in infantibus quam adultis est eas prius diligenter ablutas & absterfas oblinire sequenti remedio.

℞. Mellis rosacei 3 s. olei vitrioli 3 i. Commisceantur, fiat linimentum.

Porro in adultorum aphthis curandis, quae ut plurimum ex corruptis, acris & ferventibus humoribus oboriuntur, ita procedendum est.

Primo si aetas & vires ferant secetur vena cephalica in dextro cubitu, deinde subtrahantur acres humores cerebri sequentibus pillulis.

℞. Mas. pil. aurearum, Aggregativarum, Cochiarum an. 3 i.

Trochiscorum alhandali gr. iiii.

Ex quibus contusis cum aqua majoranae formentur pillulae n. 27. & deglutiantur circa mediam noctem. Subductis humoribus vitiosis, iterum duae liveantes venae sub lingua existentes inciduntur, & sanguis profluet cum multa pituita, quae probe sugendo eliciatur, deinde quotidie bis terve coluatur os & lingua sequenti decocto.

℞. Flo. rosarum M. i.

Sem. plantaginis, acetosae, sumach an. 3 ii.

Cort. granatorum, nucum cypressi an. 3 iiii.

Inunctio partium oris. Elotio.

Ad aphthas nigrae decoctum.

Linimentum.

Processus in curandis aphthis adultorum. Vena sectio. Pillula.

Inciso venulatum.

Collutio ad aphthas.

Galla-

Gallarum ꝯ i. concisa crassiusculè coquantur in aq. q. s. colentur & colato jussculo calido subinde eluatur os & lingua, ac statim post collutionem inungantur aphthæ diamoro aut melle rosaceo, aut sequenti linimento.

Linimentum. ℞. Sem. rosarum, quæ officinis antheræ vocantur, cornu cervini usti an. ꝯ i. hippuris adusti ꝯ s.

Lapis medicamen- Pulverata commisceantur cum ꝯ i. mellis rosacei, sed ut supra dixi, omnium certissimum & præstantissimum est remedium aphthis inungere oleum vitrioli aut per se, aut cum melle rosaceo mixtum.

3. *Paralysis seu mollificatio linguae quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Diximus paulo ante, linguam esse explanatæ distinctæque vocis primarium organum. Explanata autem & articulata vox diversis linguæ motibus perficitur. Motus autem omnis voluntarius per musculos & nervos peragitur. Ubi itaque vel musculi linguæ, qui numero sunt novem, vel nervi linguæ, qui sunt rami orti ex tertio pari nervorum cerebri, vel laxantur vel molliores redduntur, vel torpescunt refrigerati, statim motus linguæ aut oboletur, aut vitatur, & elocutio articulata aut prorsus amittitur, aut ægrè, balbutiendoque tantum effertur. Tale symptoma linguæ Græcis *παράλυσις*, Latinis resolutio linguæ nominatur.

Causa interna. Causæ mollificationis linguæ *αεγρογυμναι* sunt, nimia humectatio ex sanguinis redundantia, aut nimia humectatio ex pituitoso humore, quæ linguæ musculos gravant nervosque eorum relaxant, veluti videre est in corporibus plethoricis, quorum lingua copioso sanguine est infarcta, & in infantibus, qui ob humoris pituitosi copiam lallant tantum & balbutiunt.

Causa externa. *Περίσπικται* causæ sunt, aut remedia stupefacientia, diutius linguæ in hærentia, aut ebrietas. In ebrietate enim propter linguæ nimiam humectationem & nervorum ejus, nec lingua, & ut dici solet, neque

pes, neque manus suo fungi potest officio.

Accidit autem & sæpè, ut motu privetur lingua ex vehementi ejus exsiccatione, veluti contingit in ardentissimis febribus, & in morituris, propter innatæ humiditatis absorptionem, ubi elocutione destituitur lingua. Verum talis affectio non potest referri ad linguæ mollificationem. De eo itaque symptomate hic non agimus, sed in alio loco tractatio ejus se nobis offert.

Signa redundantie sanguinis sunt, rubedo caliditasque faciei & linguæ in tumorem elevata, venæque sub lingua repletæ & tumescentes. Pituitosi autem humoris redundantiam, linguæ musculos gravantem ostendit salivæ humiditas os infestans, & cerebro ex ore effluens. Reliquarum causarum signa manifesta sunt.

Curatio à causarum ablatione incipienda est: ubi itaque elocutionis impedimentum non est congenitum, sed ex linguæ & nervorum gravitate vel resolutione contingat, propter sanguinis redundantiam, tum primum omnium statim vena cephalica, deinde & duæ conspicuæ venæ sub lingua incidentæ erunt, & os ac lingua subinde sequenti decocto gargarisanda ac eluenda.

℞. Salviæ,

Plantaginis,

Veronicæ an. M. i.

Rosarum rubearum,

Rutæ an. M. s.

Concisa coquantur in aceti & aquæ an. lib. i. s. ad tertias, colato jussculo admisceantur mellis rosati ꝯ iiii. fiat gargarisinus: post elotionem semper conficitur lingua tali linimento.

℞. Mellis rosati ꝯ i. olei vitrioli ꝯ i. Commisceantur.

Ubi vero lingua & ejus nervi à pituitosi excrementi copia aut laxantur aut gravantur elocutionemque impediunt, primum quidem & in tali casu venæ sub lingua sunt secandæ, ex quibus sanguis pituitosus effluit, ac tandem reliquæ pituitosorum excrementorum cerebri sequenti potione concoquendæ & ad eductionem præparandæ sunt.

Lingua nimia exsiccatio locutionem impedit.

Signa.

Curatio.

Vena secanda.

Gargarisinus.

Linimentum.

Paralysis lingua ex pituitosa materia remedia.

Potio dige-
stiva.

℥. Oxymellis scillitici, syr. de v. radici-
bus, syr. de stæchade an. ℥ ii.

Aq. stillatitiarum salviæ,

Betonicæ,

Hyslopi an. ℥ iiii.

Commisceantur, fiat potio, de qua bi-
bat patiens per triduum, diluculo, & dua-
bus horis ante cænam haustum tepidum
℥ iiii.

Tandem evacuentur excrementa pitui-
tosa sequentibus remediis.

Hauftus
phlegma-
gogus.

℥. Hieræ compositæ ℥ s.

Diaphæniconis, diaturbith cum rha-
barbaro an. ℥ iiii.

Aq. bethonicæ ℥ iv.

Commisceantur, fiat haustus, qui di-
luculo tepidus exhauriatur sex horis ante
prandium. Aut

Pillula.

℥. Mas. pil. cochiarum,

Arabicarum,

Aurearum an. ℥ i.

Trochiscorum alhandali gr. iiii. Ex
quibus formentur pill. 27. quæ auro foliato
obducantur & deglutiantur circa mediam
noctem. Subductis itaque pituitosis excre-
mentis, collum cervixque singulis diebus
bis inungantur sequentibus oleis.

Linimen-
tum pro
cervice.

℥. Olei Irini, anethini an. ℥ s.

Ex granis juniperi ℥ s. de euphor-
bio ℥ i.

Acethi ℥ i. commisceantur.

Per os porro subtrahantur reliquæ pi-
tuitosorum excrementorum, & corrobo-
rentur muscoli & nervi linguæ sequenti
gargarismo.

Gargari-
smus.

℥. Rad. Pyrethri ℥ s. angelicæ ℥ i.

Salis mar-
garitarum

Sem. erucæ, staphidis agricæ an. ℥ iiii.
salviæ, origani an. M. s.

gr. x. Chy-
mici in vi-
no malva-
tico exhi-
bent in o-
mni para-
lysi.

Inunctio
linguæ

cum the-
riaca.

Pastilli

Concisa & contusa coquantur in aceti
& aquæ an. lib. i. ad medias, colentur, co-
laturæ admisceantur mellis rosati ℥ i. fiat
gargarismus, quo tepido utatur æger mane
ac vesperi.

Post gargarisationem conficitur inunga-
turque lingua theriaca Andromachi, cui
momentum olei vitrioli sit admixtum. Aut
retineantur sub lingua sequentes pastilli.

℥. Pul. rad. pyrethri, sem. erucæ an. ℥ s.

euphorbii ℥ s. commisceantur, & cum q. s. sublingua-
confectionis anacardinæ formentur pa-
stilli.

Experientia comprobatum est sequentem
pulvisculum mirifice elicere & extenuare pi-
tuitosos humores linguæ musculis infar-
ctos, si lingua cum eo crebrius confricetur.

℞. Salis armoniaci ℥ i. zinziberis, ma-
stiches an. ℥ s.

Rorismarini ℥ s. fiat pulvis subtilif-
simus.

Quando linguæ motus impeditur ex
ejus ariditate, elocutioque intercipitur, hu-
jus symptomatis curationem in ardentium
februm tractatione tradituri sumus. Plura
remediorum genera ex curatione paralyseos
studiosi petere, & commodè huc transferre
possunt.

4. Gustus depravatio quid, quæ ejus causa,
quæ signa causarum, & quæ ra-
tione curanda?

Gustus depravatio vel diminutio est ab-
sundi alienique saporis perceptio. Accidit
autem cum vel linguæ corpus, vel quæ i-
psam atque palatum vestit, membrana vitio-
so aliquo humore infarcitur & imbuitur:
Linguæ enim & palati tunica, quæ ex mol-
lioribus tertii paris nervorum cerebri ramu-
lis originem ducit, est immediatum orga-
num gustus & perceptrix saporum.

Causæ imminuti & depravati gustus
quidam sunt, aut vitiosi hu-
mores vaporesque aut tertii paris nervorum
originem obstruentes, aut tunicam linguæ
& palati imbuentes. Eorum autem humo-
rum vitiosorum plures sunt species, sed ta-
men potissimi sunt pituita salsa vel acida, &
bilis amara, vel in ipso cerebro collecta, vel
ex subjectis visceribus evaporantes.

Neque tamen hæc causæ sunt, succus teter
& vitiosus insignique aliqua qualitate præ-
ditus in esculentis, potulentis & medica-
mentis contentus, linguæ tunicam inter gu-
standum inficiens, & refrigeratio nimia e-
jus capitis partis, unde tertium par nervo-
rum exoritur.

Signa

Signa cau- Signa caularum depravati gustus hæc sunt,
sarum di- si tertium par nervorum est obstructum,
versarum. aut vehementius refrigeratum, sapores æ-

gerimè sentiuntur, & adest simul dolor capitis & gravitas. Si vero bilioso humore vel vapore lingua est imbuta, omnia quæ gustantur, etiam dulcissima, amara esse sentiuntur. Si vero falsa pituita lingua est infarcta, omnia falsa; si acida, omnia acida; si diluta, omnia insipida gustando percipiuntur: *αἰσθητικῶν* caularum signa manifesta sunt.

Curatio.
Vena se-
ctio.

Curatio depravati gustus pro caularum diversitate varianda erit. Confert autem plurimum venæ sectio, secunda est autem, si corpus est plethoricum, vena communis quæ mediana vocatur, dextri lateris; si caput pituitosis excrementis redundet, vena cephalica; si bilis infestet, epatica, & sequenti deinceps die, & venæ sub lingua incidendæ veniunt. Tandem humor supervacaneus, aut vapor linguam inficiens convenientibus pharmacis concoquendus, abstergendus & evacuandus erit. Quibus autem remediis singulæ vitiosorum humorum species concoqui & evacuari queant, supra remedium paradigmatis, huic negotio servientibus, hoc loco contenti erimus.

Pituita vitiosa & præternaturalis sequenti potione commodè concoqui & extenuari potest.

Potio dige-
rens pitui-
tam.

℞. Hyssopi,
Betonice,
Calaminti an. M. i.

℞. Rad. Apii,
Petroselinii,
Feniculi an. ʒ s.

Sem. Carvi,
Feniculi an. ʒ iiii.

Cubearum, cardamomi an. ʒ i. coquantur in duplici vase cum vini lib. iiii. refrigerata colentur: colato juti admisceantur oxymellis simplicis, syr. de hyssopo, de stachade an. ʒ ii. cuius ʒ iiii. tepidæ diluculo & vesperi exhibeantur patienti.

Post sufficientem coctionem evacuentur pituitosa excrementa sequentibus pillulis.

℞. Mas. pil. aurearum,

Cochiarum,

Agarici trochiscati an. ʒ i.

Diagridii gr. iiii. cum aqua majorana formentur ex his omnibus contusis pillulæ n. 27. quæ exhibeantur deglutendæ sex horis ante prandium. Aut si à pillulis abhorret æger, exhauriat hunc haustum tepidum.

R. Diatrbith, diaphaniconis an. ʒ v.
hieræ simpl. ʒ ii.

Aq. hyssopi ʒ v. fiat haustus.

Ubi vero lingua bilioso humore vel vaporibus est imbuta, quod ex amaritudine oris dignoscitur, ante topica remedia biliosi humores ut commodius evacuentur, sequenti potione præparari debent.

℥. Syr. Rosacei,

Violacei, de cichoreæ cum rhabarbaro an. ʒ i. s.

Aq. Stillatitarum, Cichoreæ,

Acetosæ,

Absinthii an. ʒ iiii.

Misceantur, fiat potio, cuius ʒ iiii. tepidæ diluculo, & paulo ante cœnam quotidie ebibat patiens, qua absumpta evacuetur bilis sequenti bolo.

℞. Pulpæ cassiæ extractæ, elect. lenitivi an. ʒ v.

Elect. rosati, Mesuæ ʒ i. commisceantur, fiat bolus qui zaccaro conspersus devoretur. Aut si patiens magis potione delectetur, resolvatur hic bolus cum ʒ v. aq. cichoreæ, fiat haustus, qui diluculo tepidus ebibatur. Idem præstant & sequentes pillulæ.

℞. Mas. pil. aggregatarum, è rhabarbaro an. ʒ s.

Diagridii gr. v. ex his omnibus contusis cum aq. cichoreæ formentur pillulæ n. 27. quæ deglutiantur in aurora.

Bilis vero atra si corpus infestet, & gustum depraverit, id quod ex acore & stiptico sapore per linguam, potissimum post somnum, dignoscimus, tum melancholicus humor sequenti potione concoqui & extenuari commodè potest.

℥. Rad. polyodii, feniculi, petroselinii an. ʒ s.

Rad. capparum, hellebori nigri an. ʒ iiii.

I i 3

A'ple-

Pillula
phlegma-
gica.

Haustus
pituitam
eluens.

Potio præ-
parans bi-
lem.

Bolus cho-
lagogus.

Pillula bi-
lem eva-
cuantes.

Potio me-
lanchol-
iam dige-
rens &
præpara-

Asplenii, capillorum Veneris, fumariz an. M. s.

Fol. senæ, thymi, epithymi an. ʒ i.

Cinamomi ʒ i. passulorum minorum ʒ i.

Concidenda concisa & contundenda confusa, in cantharo oblinito sive duplici vase cum aq. lib. iiii. concoquantur per duas horas, & refrigerata colentur, colato juri admisceantur syr. è fumaris de epithymo an. ʒ iiii. fiat potio, de qua mane, & tribus horis ante cenam sumat æger ʒ v. concoctis extenuatis & præparatis melancholicis excrementis, exvacuentur ac subducantur sequenti haustulo.

*Hauſtus
melanago-
gus.*

℞. Diacatholici ʒ vi. Confectionis hammech ʒ s.

Dissolvantur & commisceantur cum ʒ v. aq. fumariz, fiat haustus, qui patienti offeratur tepidus mane sex horis ante prandium.

Evacuatis ita vitiosis humoribus, & subductis fomitibus vaporibusque adulterinorum saporum, linguæ adhibeantur sequentia topica remedia.

Topica.

Primum confricetur lingua mane ac vespere sale & aceto, deinde eluatur succo urticae, qui mirifice abstergit impactos linguæ vitiosos humores. Tandem oblinatur lingua aut aqua cinamomi aut syr. rosaceo, cui momentum olei vitrioli aut cinamomi est admixtum, vel commasticetur crebrius radix glycyrrhizæ. Contingit frequenter in ardentissimis febribus, ut lingua reddatur aridissima, & omni sapore privetur, cujus symptomatis remedia in sequentibus de linguæ asperitate ac nigredine commemorabimus. Linitur autem ariditas mucilaginis sem. Cytoniorum, vel tragacanti cum aqua rosacea confecta, linguæque illita.

*Linimentum ad
linguæ ariditatem
singulare.*

5. Tumores sive Apostemata Lingua quid, qua eorum causa, qua signa, & quomodo curanda?

Lingua apostemata.

Suboriuntur adultis sæpe per linguæ superficie tumores tum duriusculi ac scyrrhosi instar verrucarum alse warten/tum

molles, albi aliorumque colorum, aphthis majores, eos Græci in genere linguæ apostemata, Arabes Botornos, nostrates **Blattern auff der Zungen** vocant.

Causæ talium excrementiarum in lingua *Causa.* *convergencies* quidem sunt humores corrupti, venenati & acres ad linguam decumbentes, aut eorum acris evaporatio ex ventriculo aut matrice. *Προγεγενηται* sunt cibi, potus & medicamenta exurentia & acris suo contactu linguæ tunica erodentia.

Signa sunt manifesta, ut qui visu tactu- *Signa.* que deprehendantur facile. Prognostica vero signa hæc sunt notanda, duri scyrrhosi- *Prognostica.* que instar verrucæ tumusculi linguæ & aliarum partium oris, ut plurimum sunt soboles morbi Gallici. Si in febribus ardentibus per linguam apostemata nigra aut livida conspiciuntur, propinquam mortem minantur.

Curatio tumusculorum linguæ pro diversitate causarum immutanda erit. Si itaque tumores sunt rubicundiores, & adsit plenitudo, primum incidetur vena cephalica, deinde altero die venæ sub lingua conspiciæ, tandem & cervici genisque cucurbitulæ cum scarificatione utilissime applicari possunt. Si vero ex aliis vitiosis humoribus eorumque vaporibus apostemata originem trahant, consideranda est vitiosi humoris species, id quod ex tumorum colore facile dignosci potest. Rubeus enim eorum color sanguinem esse infectum, flavus bilem flavam adustam redundare, niger melancholiæ adustæ copiam, durities sive scyrrhositas venenatos omnes humores arguit. Humor itaque peccans statim concoquendus, extenuandus & evacuandus est remediis congruentibus supra in cephalalgiam curatione ex vitiosorum humorum speciebus ortarum, & in tabellis medicamentorum descriptis.

Curatio.

Vena sectio.

Cucurbitulae.

Pharmaca unde petenda.

His ritè peractis curatio perficienda est per topica remedia. Si itaque tumor sit scyrrhous, ac instar verrucæ durus, quotidie bis terve colluatur lingua sequenti decocto.

In scyrrhous tumores collutio.

℞. Ficum concisatum n. vi.

Sem. fenugræci contusi ʒ s.

Flo. Malvæ hortulanæ M. i.

Pru-

Prunellæ M. s. coquantur in aq. & acetī partibus æqualibus quantum sufficit, ad medias, colati juris lib. i. admisceantur mellis rosacei ʒ iij. fiat gargarismus.

Post abluionem confricetur tumor sequenti pulvisculo.

Pulvis. ℞. Salis armoniaci ʒ ii.

Mastiches ʒ i.

Pyrethri ʒ s.

Fiat pulvisculus. Saliva ex confrictione linguæ in ore collecta, subinde exspuat, & tandem inungatur tumor sequenti linimento.

Linimentum. ℞. Olei vitrioli ʒ i. mell. rosacei ʒ i. commisceantur, fiat linimentum.

Ad apostema lingua fistulosum. Ubi vero apostema fistulosum appareat, sequenti gargarismate frequenter eluendum est.

Gargarismus. ℞. Agrimonix, Veronicæ, Rosarum rubearum an. M. i. Rad. Aristolochiæ rotundæ ʒ s. Mastiches, olybani an. ʒ i. æruginis ʒ s.

Concisa & contusa coquantur in vini rubel lib. iij. ad tertias, colaturæ admisceantur mellis rosacei ʒ iij. fiat gargarismus.

Post elotionem confricetur sequenti linimento.

Linimentum. ℞. Mellis rosacei ʒ ii. pulv. tragacanti, mastiches an. ʒ s. Misceantur fiat linimentum.

Gargarismi alii quos ad quoscunque lingua tumesculos. Reliquæ species tumesculorum linguæ, post causæ remotionem sequentibus gargarismatibus ac collutionibus faciliè curari possunt.

℞. Ramentorum sandali rubei ʒ ii.

Lentium, rosarum rubearum an. M. i. coquantur in aceti & aquæ an. lib. i. ad medias, colentur, colato juri admisceantur diamori, rob. nucum an. ʒ ii. fiat gargarismus, quo tepido eluat æger ter aut quater in die linguam. Aut

℞. Cort. rad. prunellorum sylvestrium vel ejus stolones ejusdem anni, mespilorum, citoniorum an. M. i. contusa inaccendantur per noctem in aquæ & aceti lib. i. & coquantur ad medias, colato juri admi-

sceantur mellis rosati ʒ ii. fiat gargarismus, quo tepido utatur præscripto modo. Aut

℞. Gallarum, balauftiarum, sumach an. ʒ s.

Mastiches, thuris, myrthæ an. ʒ ii. coquantur in vini rubei lib. i. ad medias, colaturæ admisceantur mellis rosati ʒ iij. fiat gargarismus.

At si apostemata seu tumesculi sint subnigri & urentes, quales sunt carbunculi, tunc magis refrigerantibus est utendum, veluti sunt succus plantaginis, solari, portulacæ, granatorum, quibus vel singulis vel commixtis crebro eluantur apostemata lingua.

Porro ad quoscunque linguæ tumores mirificè conducit oleum vitrioli inunctum.

6. *Ranula sub lingua quid, qua earum causa, qua signa, & quibus remediis curanda?*

Βάρελ, ranula est tumoris species *Ranula* exigua ranæ formam referens quæ sub lingua ex molli carne, cui lingua incumbit, cuique quasi vinculo alligata est, nonnunquam exoritur.

Causa *ασηγμένη* ranularum, est sanguis viscidus & pituitosus per venas sub lingua fitas ad mollem oris partem cui lingua incumbit, confluens, ibidemque mollem & laxum tumorem excitans, qui si aperitur, profluit ex eo mucus ovi candido persimilis, qui, si tempestiva negligatur curatio, in *φλεγμονή* transire consuevit.

Signa sunt evidentia, visuque deprehensibilia.

Curatio perficitur aut chirurgica operatione, aut topicis remediis. Per chirurgiam itaque si mollis & laxus est tumor, incidendus & purificandus erit, sequenti- que linimento inungendus.

℞. Tragacanti torrefacti, rad. hermodactylorum an. ʒ s. cum albumine ovorum, fiat linimentum.

Frequenter quoque eluere oportet sequenti gargarismate.

℞. Cort. Granatorum, Origani,

Gargarismus.

Sal.

Salviæ an. M. s. coquantur in aq. q. s. ad medias, colaturæ admisceantur mellis rosacei ʒ i. fiat gargarismus.

Hæc si non contulerint, transeundum est ad remedia fortiora. Confricetur itaque ranula sequenti linimento.

Linimentum.

ʒ℥. Salis armoniaci,
Æruginis,

Tragacanti an. ʒ s.

Aceti acerrimi q. s. fiat linimentum. Aut

Ranula in phlegmonem transeuntis remedia. Linimentum. Chirurgia.

ʒ℥. Mellis rosacei ʒ s. olei vitrioli ʒ i. commisceantur, fiat linimentum. Ubi vero ranula in phlegmonem transit, tunc non leves excitat in lingua dolores, qui sequenti linimento mitigari possunt.

ʒ℥. Ol. rosacei ʒ s. pul. amyli, boli armeni an. ʒ i. commisceantur, fiat linimentum.

Si vero hisce remediis cedere non vult, chirurgico instrumento est prorsus excindenda, & post evulsionem vino rubeo tepido subinde eluenda, & vulneri sequens pulvisculus inspergendus.

Pulvis restrictivus.

ʒ℥. Attamenti sutorii, aluminis an. ʒ s.

Mastiches, olibani an. ʒ i. fiat pulvis tenuissimus.

7. *Nigrities Scabritiesque, cum aut sine scissura linguae quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Lingua scabrities quid.

Nigrities scabritiesque & instar corticis arborei durities, interdum etiam scissura membranæ linguam tegentis, sæpe linguam infestat, quæ omnia accidentia sunt, symptomataque aliorum morborum & non morbi.

Causa.

Causa itaque horum symptomatum ægyptiacum quidem est venenum assumptum aut venenati animantis morsus: ægyptiacæ vero sunt acres & urentes ex subjectis partibus exhalationes & vapores, quales accidere solent in ardentissimis febribus tertiana & causo, quam nostri *die Brun* vocant. Item ignei humores ex cerebro ad linguam defluentes.

Signa.

Signa visu tactuque deprehenduntur.

Prognostica.

Quantum ad prognosticum signum attinet, nigrities & scabrities linguæ ut pluri-

um, nisi maturè succurratur morbusque mitigetur, vitæ periculum portendit.

Curatio hujus symptomatis est sublatio *Curatio.* ejus morbi sive causarum. Semper enim primum morbus, qui est tanquam causa symptomatis, est curandus, & tandem symptoma, nisi symptoma adeo sit perniciosum, ut Medicum ad se curandum ante morbi ablationem abripiat. Quomodo autem horum symptomatum morbi sunt curandi, suis in locis demonstrabimus: Hoc loco satis erit topica remedia ad nigritiem *Topica.* scabritiemque linguæ præscribere.

Cum autem hæc symptomata omnia ex ignea causa suboriantur, ubi vires tolerant, prodest initio venas sub lingua incidere & linguam ipsam refrigerantibus & humectantibus pharmacis fovere, qualia sunt hæc sequentia.

Frequenter eluatur abstergaturque adusta & subnigra lingua lacte caprino tepido aut canino, quod in nigritie linguæ mirificè prædicat Plinius. Deinde sub lingua retineantur sequentes pastilli.

Lac caninum valde hic prodest.

ʒ℥. Quatuor seminum frigidorum majorum minutissimè concisorum an. ʒ i. sublin-
saccari candi ʒ i. Mucilaginis tragacanti
cum aq. rosacea confecti q. s. conformen-
tūr exiguæ pillulæ compressæ.

Pastilli sublinguales.

Aut frequenter illiniatur lingua mucilagine ex seminibus psyllii & cytoniorum cum aqua rosacea maceratorum expressa. *Linimentum egregium.*

Præterea si viscosus humor linguæ adhæreat, subinde abstergatur & lingua confricetur cum foliis salviæ in aceto madefactis, aut linteolo carpto ad virgulam alligato & diamoro intincto confricetur lingua, ac tandem sæpius eluatur decocto tamarindorum & rad. prunellorum sylvestrium. Ablata hic inungatur lingua syrupo violaceo aut melle rosaceo, cui momentum olei vitrioli est admixtum, aut inungatur, præsertim si adsit scissura, sequenti linimento.

Decoctum refrigerans.

ʒ℥. Mucaginis, tragacanti, mucaginis sem. psylli & mucaginis gummi Arabici an. ʒ i.

Linimentum ad scissuras linguæ.

Pulpæ tamarindorum ʒ i. s.

Syr.

Valde quæ
que juvat
saltem lapis
prunella in
aqua fen-
iciana soluta
vel in
lingua de-
tentur.

Syr. violarum ꝓ ii.

Sem. portulacæ, spodii præparati
an. ꝓ i.

Camphoræ gr. iiii. fiat linimentum.

SECTIO VIII. DE FAUCIUM ET TONSIL- LARUM MALIS.

1. Faucium in eisque contentarum partium Morbi qui sunt?

Faucium
partes &
morbi.

Faucium, fauces, dicitur tota oris capacitas
circa radicem linguæ, ubi aspera arteria
& gula initium sumunt & simul connectun-
tur. Partes faucium sunt guttur, gurgulio
sive uvula, tonsillæ seu amygdalæ, quæ par-
tes ut plurimum afficiuntur tumore, inflam-
matione & exulceratione.

2. Gutturis tumor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus mediis curandus?

Angina
proprie di-
cta quid.

Gutturis tumor, Græcis *συνδερχειν* dicitur
συνδερχειν id est à suffocando, & Latinis An-
gina dicitur, & est morbus acutissimus, a-
deo ut nisi maturè succurratur, intra 24. ho-
ras hominem suffocando interimat. Inter-
cipitur enim in angina & deglutendi & re-
spirandi facultas.

Causa.

Causa semper est *συνδερχειν*, videlicet
repentina & copiosa defluxio aut puri san-
guinis, aut biliosi aut pituitosi ex capite, in
ipsis faucibus collecta.

Signa
causarum
diversa-
rum.

Signa ex quibus vitiosi humoris differen-
tia dignoscitur, hæc sunt. Si sanguis purus
redundat, facies rubet, venæ tument, &
totum caput est repletum; si biliosus san-
guis in faucibus est collectus, acerbissimos
excitat dolores, sine tamen manifestò tu-
more, & facies pallidior apparet; si pitui-
tosus est sanguis, mitior est dolor, tumor ma-
jor. Prognosticum autem signum est teste
Hippocrat. 6. Aphorism. Quibus ex bilioso
sanguine angina oboritur, & nec intra fau-
ces, nec in collo manifestus tumor apparet,
lethale est; quibus autem tumor ad exteriora
vergit, securior est.

Prognosti-
ca.

Curatio ab alvi evacuatione per enemata *Curatio.*
statim in initio est auspicanda. Convenit au-
tem sequens clyster.

℥. Malvæ, violariæ, mercurialis an. *Enema.*
M. r.

Chamæmeli, melilori an. M. s.

Coquantur in q. s. aquæ ad medias, co-
lentur, colati juris recipe ꝓ xv. quibus admi-
sce Cassiæ extractæ ꝓ i. s.

Saccari ꝓ i.

Olei violacei ꝓ iiii.

Salis ꝓ i.

Commisceantur, fiat enema, quod tepi-
dum infundatur recto intestino. Post ene-
matis infusionem, statim venæ inciduntur, *Vena se-*
& primum quidem cephalica, deinde & *ctio.*
utræque sub lingua. Cavendum tamen *Quid ob-*
ne sanguis è vena cephalica semel & con- *servandum*
fertim detrahatur, ne videlicet ex cumula- *in phlebo-*
ta sanguinis detractio patiens in animi *tomia.*
deliquium & suffocationis metum conj-
ciatur.

Præstat itaque ter quaterve in unius horæ
spacio reiterata sectione auferre sanguinem;
verum si mulier, cui suppressi sunt menses, *Saphena*
anginâ laboret, huic præstat venam saphæ- *inciso in*
nam sub talo incidere. Qui vero aut per æ- *saminis.*
tatem, aut per virium debilitatem venæ se-
ctionem ferre nequeunt, iis commode cu- *Cucurbitu-*
cubitulæ cum scarificatione cervici applica- *la.*
buntur.

Altero die post venæ sectionem, si æ-
ger deglutendi facultate nondum est pri-
vatus, exhibeatur sequens haustus cathar-
ticus.

℥. Cassiæ recentè extractæ ꝓ vi.

Syr. violacei ꝓ i.

Haustus
catharti-
cus.

Elect. rosati Mesuæ ꝓ i. Ex quibus con-
ficiatur haustus cum ꝓ iiii. aq. stillati-
tæ cichoræ, & mane tepidus exhibeatur.
Deinde mitigetur dolor statim ab initio se-
quenti gargarisinate.

℥. Flo. malorum puniceorum, cort. gra-
natorum, Gallarum, sumach an. ꝓ s. con-
cisa crassiusculè decoquantur in aq. planta-
ginis lib. i. s. ad tertias, colentur, & cola-
to juri admisceantur diamori ꝓ i. quo tepi-
do crebrius utatur. Post gargarisationem *Gargari-*
smus ad-
stringens
& repellens *in initio u-*
sus.

K k

frequen-

frequenter illiniatur syr. violarum, aut teneat in ore diatragacantum frigidum.

Epithemata.

Commodè & sacculi ex milio & sale torrefacto repleti calidique capiti in principio morbi applicari possunt, & anterior pars colli foveatur lana oleo chamæmelino imbuta.

Secundo die convenit uti sequenti gargarismate.

Gargarismus alter secundo die adhibendus.

R. Lentium, balaustiarum, psidiae, gal-
larum, sumach an. $\frac{3}{4}$ s.

Rosarum rubeatum P. i. confusa coquantur in aq. lib. ii. ad medias, colentur, colaturæque commisceantur diamori, rob. nucum an. $\frac{3}{4}$ i. mellis rosacei $\frac{3}{4}$ s. misceantur, fiat gargarismus, quo utatur tepido. Aut

Alius dolorem leniens.

R. Lactis muliebris $\frac{3}{4}$ iiii. s. pulpæ cassiæ recentæ evulsæ $\frac{3}{4}$ s. commisceantur, fiat gargarismus, qui mirificè dolorem lenit, & tumorem mitigat. Eodem quoque die collo imponatur lana succida id est *geschlagene Wulle* / sequentibus oleis tepidis imbuta.

Epithema.

℞. Ol. liliorum alborum, chamæmeli, anethini an. $\frac{3}{4}$ i. misceantur.

Tertio die quid agendum.

Tertio vero die prodest uti sequenti emollienti gargarismate.

Gargarismus emolliens.

℞. Ficum pinguium n. vi.

Palmularum sive dactylorum n. iiii.

Balaustiarum $\frac{3}{4}$ s.

Sem. lini, fænugræci an. $\frac{3}{4}$ s.

Coquantur in aquæ lib. ii. ad medias, colentur, colatoque jusculo admisceantur

Pulpæ cassiæ extractæ $\frac{3}{4}$ s.

Pulveris myrrhæ $\frac{3}{4}$ i.

Croci $\frac{3}{4}$ s.

Lactis muliebris $\frac{3}{4}$ i.

Fiat gargarismus, quo tepido frequenter utatur. Eodem die applicetur emplastrum foris ex nido hirundinum confectum, quod specifica quadam sua facultate anginae & omnibus colli tumoribus mirificè opitulatur, quod tali ratione parari potest.

Emplastrum ex nido hirundinum.

℞. Nidorum hirundinum unâ cum excrementis lib. s.

Decoquantur in aq. q. s. ad aquæ exha-

lationem, donec ad pulvis crassitiem redigatur, huic pulvi admisceantur ol. liliorum alborum, amygdalarum dulcium an. q. s. ad cataplasmatismam formam inducendam, idque collo tepidum imponatur, & ubi refrixit iterum concalefiat.

Quarto die plerumque tumor suppurari & emollescere incipit. Eo itaque die subinde sequenti gargarismate utatur patiens.

R. Dactylorum n. iiii.

Ficum pinguium concisorum n. v.

Florum chamæmeli, meliloti an. P. i.

Sem. lini, fænugræci an. $\frac{3}{4}$ i.

Decoquantur in aq. lib. ii. ad medias, colentur, colatoque juri admisceantur pulveris hirundinum torrefactorum, myrrhæ an. $\frac{3}{4}$ i. s.

Croci $\frac{3}{4}$ s. mellis rosacei $\frac{3}{4}$ i. fiat gargarismus.

Porro ubi hirundinis pulvis haberi nequit, ejus loco rumpendi tumoris gratia admisceatur superiori gargarismati stercoris aserini pulverati $\frac{3}{4}$ i.

Rumpentia tumorem.

Galenus hистoriâ narrat de angina à se Galeni curata, quod nimirum, cum aliis remediis destitueretur, receperit pueri stercus & exiccarit, idque cum melle commiscuerit, & prædivitis cujusdam faucibus angina laborantis illiniisse, intraque horæ spatium tumorem ruptum fuisse, hominemque sanitati restituisse, & pro mercede 100. aureos recepisse, ipsumque divitem 200. aureos ei spondidisse, si hoc secretum medicamentum ei manifestaret.

Porro ubi jam ruptus est abscessus, intermissis reliquis gargarismatibus solo hydro-

Vbi abscessus ruptus, quid agendum.

melite tepido ulcus crebro eluatur, ac mel rosaceum cui parum olei vitrioli est admixtum illiniatur. Foris vero sequens cataplasma collo tumentique loco tepidum applicetur.

℞. Pollinis sive fatinæ volatilis, pul. sem. Cataplasma.

lini, fænugræci an. $\frac{3}{4}$ s.

Ficum pinguium contusarum $\frac{3}{4}$ i.

Nid. hirundinum $\frac{3}{4}$ s.

Omnia probè subigantur cum q. s. olei liliorum alborum, fiat cataplasma.

At ubi angina à frigida pituitosaq; defluxione

frigida de-
fluxione
remedia.
Vena se-
ctio.

xione originem habet, in ea quoque specie anginae curatio à venæ cephalicæ venarumque sub lingua existentium incisione auspicianda erit. Prodest autem ante venarum incisionem sequens enema patienti jejuno sub-
jicere.

Enema.

R. Malvarum, Althææ, Mercurialis, flo. chamæmeli, Melilori, anethi an. M. s. betonicæ, majoranæ, Ræchados Arabicæ, Centaurii minoris an. P. i. Concisa coquantur in q. s. aquæ ad tertias, & inter coquendum imponatur pulpæ colocynthis ʒ i. in linteolo ligatæ, quæ rursus post concoctionem eximatur: reliqua percolentur, hujus colati juris accipe ʒ xiii. in quibus dissolvito hieræ simplicis ʒ i. benedictæ laxativæ ʒ vi. Mellis rosati ʒ i. olei chamæmelini ʒ iiii. salis communis ʒ i. commisceantur, fiat clyster.

Altero die si æger adhuc assumenda deglutire poterit, sequens haustus catharticus jejuno tepidus exhibeatur.

Haustus
catharticus.

R. Diacatholici, diaphæniconis an. ʒ s. Elect. Indi majoris ʒ ii.

Aquæ betonicæ ʒ v. fiat haustus.

Cucurbitu-
la.

Secundæ tandem vertebræ cervicis magna cucurbitula applicetur cum scarificatione, & subinde eluatur guttur sequenti gargarismate tepido.

Gargari-
smus ad-
stringens
& repel-
lens.

R. Nucum cypressi, balaustiarum, summach an. ʒ s. mastiches ʒ i. rosarum M. s. contusa coquantur in hydromellis lib. iiii. ad medias, colentur, colato juri admisceantur Rob. è nucibus, mellis rosacei an. ʒ i. aluminis ʒ i. myrrhæ, croci an. ʒ s. fiat gargarismus, quo primo duntaxat die ab initio morbi utatur æger, foris autem obtegatur collum tumens lana succida, oleo liliorum alborum tepido imbuta.

Altero autem die, omisso præcedenti gargarismate, ad magis emolliens ac maturans accedendum est, quod ita concinnari potest.

Emolliens
ac matura-
rans gar-
garismus.

℞. Uvarum passarum majorum exemptis seminibus abjectis arillisque ʒ i. ficuum pinguium n. vi. sem. lini, sænugræci an. ʒ s. coquantur in hydromelitis lb̄ iiii. ad tertias, colentur, colatoque liquori ad-

misceantur pul. synapis, Pyrethri an. ʒ i. s. myrrhæ, croci an. ʒ ii. cineris hirundinum ʒ i. fiat gargarismus, quo tepido utatur eolusque donec ruptum sit apostema. Interim extra tumentis collo sequens cataplasma calidum imponatur.

℞. Nidi hirundinum confusi lb̄ s. co-
quatur in hydromelitis q. s. ad pulpamenti
crassitiem, cui admisceatur unguenti Althææ
q. s. fiat cataplasma, quod bis singulis die-
bus tepidum imponatur. Rupto apostema-
te hydromelite subinde abluatur, & oxy-
mel, cui olei vitrioli momentum sit admi-
xtum, illiniatur saneturque.

Catapla-
sma.

Nonnulli
multum
tribuunt
suni quo
serpens
strangula-
tus est.

Porro cum angina laborans difficilime deglutire queat, per triduum inedia aut tolerare debet aut solo cremore prisanæ, aut aqua mulsa aut ovi luteo liquidiori vesceatur. Sitim vero aqua hordei aut syrupo violaceo sedabit.

Rupto apo-
stema
quid agen-
dum.
Inedia hic
convenit.

2. Gurgulionis tumor, inflammatio & laxitas quid, quæ eorum symptomatum causa, per quæ signa internoscenda, quomodoq; curanda?

Παγκρεσίων, Gurgulio sive columella, nobis *der Huelle* / est particula palato circa radicem linguæ inhærens, quæ plectrum sive organum est sonoræ vocis, barbaris perperam uvula nominatur: Uva enim sive uvula probatis autoribus non ipsa particula seu columella, sed ejus morbus, tumor videlicet & inflammatio dicitur; afficitur gurgulio, aut inflammatione ac tumore, aut extenuatione, laxitate, aut elongatione.

Gurgulio
quæ pars.

Quibus
afficitur
malis.

Causæ *αεονυμίας* cum tumoris tum laxitatis columellæ sunt, excrementitii humores à capite ad fauces destillati, qui si calidiores extiterint, tumorem & inflammationem columellæ excitant: si vero frigidiores ac tenuiores existant, quales sunt pituitosi humores, resolutionem ligamentorum ejus, & elongationem efficiunt. *Προσταεστικαί* causæ sunt, continua heluatio potusque ingurgitatio, & frigida humidaque aëris per respirationem attractio.

Causæ tu-
moris &
laxitatis
uvula.

Signa.

Signa cum inflammationis tumorisque, tum elongationis ac laxitatis columellæ visu tactuque faciliè deprehenduntur. Aperto enim ore columella instar uvæ rotundæ, rubea & inflammata cernitur: In elongatione vero tenuior & oblongior de palato aut in guttur dependet, metum suffocationis infert, aut pendet in gulam, & tum continuam salivæ expuitionem, & quasi boli carnisque in faucibus hærentis deglutiendi conatum, sed inanem, excitat.

Curatio tumoris & inflammationis gurgulionis.

Curatio symptomatum gurgulionis pro causarum efficientium diversitate, morbi-que specie, varianda erit. In tumore itaque, inflammationeque gurgulionis, omnium primo alvus evacuetur sequenti clystere.

Enema.

℞. Malvarum, violariæ, althææ, mercurialis an. M. i.

Violarum, rosarum an. M. s. concisa coquantur in q. s. aquæ, ad tertias, colentur, colati liquoris accipe lib. i. in eoque dissolve hieræ simplicis $\frac{3}{4}$ i. s. olei violarum $\frac{3}{4}$ iiii. salis $\frac{3}{4}$ i. fiat enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Vena sectio.

Sequenti die vena cephalica dextri brachii primum, deinde & venæ sub lingua sitæ inciduntur, quin & cucurbitulæ cum scarificatione aversionis gratia cervici appositæ, proficue sunt.

Dieta.

Victus ratio in affectionibus columellæ debet esse parcior ac tenuior. Utatur itaque patiens cremore prisanæ aut avenæ, jusculisque gallinarum, prunis & lacte amygdalino. Potus ejus sit aqua hordei, in qua cinamomi frustulum est incoctum. Tertia tandem die vitiosi ac calidi retorridique humores in inflammatione gurgulionis non è capite modo, sed è venis totius corporis sequenti haustu subducantur.

Haustus purgans.

℞. Rhabarbari electi $\frac{3}{4}$ i. s. fol. senæ Alexandrinæ $\frac{3}{4}$ ii. contusa macerentur per noctem in aq. cicoræ $\frac{3}{4}$ iiii. mane leniter ebulliant expressaque colentur, colato jusculo admisceantur elect. lenitivi, diacatholici an. $\frac{3}{4}$ ii. fiat haustus, qui diluculo 6. horis ante alimenti assumptionem tepidus exhauiatur.

Topica.

His ritè peractis, statim ad topica reme-

dia accedendum erit, quæ & tumorem sedent & inflammationem arceant.

Primis autem diebus sequenti gargari-
smate feliciter uti possumus.

℞. Dactylorum nucleis exceptis n. vi. *Gargari-
smus pri-
mus.*
Flo. rosarum rubearum M. s. balau-
stiarum $\frac{3}{4}$ iiii.

Cort. rad. recentium mori arboris & rad. prunellor. sylvestrium an. $\frac{3}{4}$ s. concisa coquantur in hydromellis lib. iiii. ad medias, colentur, quo tepido crebriusculè per diem utatur æger. Sive hoc quod magis constringit.

℞. Gallarum, thus seu sumach, acatiæ, *Gargar. 2.*
balaustiarum, psidiæ an. $\frac{3}{4}$ iiii.

Sem. plantaginis $\frac{3}{4}$ s. flor. prunellæ herbæ M. s. crassiusculè contusa coquantur in aq. lib. ii. ad medias, colatum jus dulce efficiatur mellis rosacei $\frac{3}{4}$ ii. fiat gargari-
smus, quo utatur tepido. Aut quod inflam-
mationem magis restringit.

℞. Aq. stillatitiarum rosarum, planta-
ginis, prunellæ, herbæ solatri an. $\frac{3}{4}$ i. dia-
mori, rob. è ribes an. $\frac{3}{4}$ i. rob. è berb. aceti
rosacei an. $\frac{3}{4}$ s. misceantur, fiat gargari-
smus. Aut quod ulcerato tumori prodest.

℞. Flo. rosarum rubearum, mororum *Gargar. 4.*
rubi immaturorum an. M. i.

Psidiæ, balaustiarum, glandium
an. $\frac{3}{4}$ ii.

Hypocistidos, acaciæ an. $\frac{3}{4}$ i. sem. ace-
tosæ, cytoniorum an. $\frac{3}{4}$ s. coquantur con-
tusa in aq. plantaginis lib. i. s. colentur, co-
lato juri admisceantur mellis rosacei $\frac{3}{4}$ iiii.
fiat gargari-
smus.

Præter hæc tumenti columellæ commodè illiniri inungique possunt per se, vel simul commixta Diamoron, mel rosatum, Rob. nucum, & Rob. è berberis. Aut si adit ex-
ulceratio aut putredo columellæ, momen-
tum olei vitrioli cum melle rosaceo mixtum.
Foris verò collum cervixque oleo rosaceo & cytoniorum inungi commodè possunt.

Potro si columella citra inflammatio-
nem propter affluxionem frigidorum hu-
morum laxetur, & in fauces propendeat,
quam affectionem Græci *παρρηξία* & *χέ-
λας*, id est, laxitatem vel elongatio-
nem

*Prolonga-
tionis colu-
melle re-
media.*

nem columellæ, barbari vero casum uvulæ vocant, hujus mali curatio hac ratione est instituenda.

Primum tenuis sive serosa pituita, (hujus enim defluxu ut plurimum laxatur & extenuatur columella) præparanda & concoquenda evacuandaque erit iisdem remediis quæ supra in cephalalgia pituitosa recensuimus. Aut purgabitur commode 3 r. pill. Aurearum: quin & venæ sectio, præsertim sub lingua commode adhiberi potest. Quibus peractis, statim ad topica & pituitam ex capite subtrahentia pharmaca, & retinentia columellam in proprio loco, qualia sunt sequentia gargarismata & pulvisculi, accedendum erit.

¶ Salviæ,

Origani,

Hyssopi, fol. lauri an. M. s.

Fungorum arboribus sambuci vetustis adnascensium 3 s.

Gallarum 3 iij. Contusa coquantur in aceti & aq. an. lb. i. ad medias, colentur, colatum jus dulcoretur cum mellis rosacei 3 i. fiat gargarismus, quo tepido in die frequenter utatur æger. Aut

℞. Sem. erucæ 3 v. Rad. Pyrethri 3 s. Salviæ, hyssopi an. P. i.

Mellis rosacei nondum colari 3 iij. Aceti & aq. an. lb. i. coquantur ad medias ac colentur, fiat gargarismus. Post collutionem faucium & columellæ cum præscriptis gargarismatibus subleuetur columella chirurgico artificio, videlicet aut crinibus in vertice capitis suis fortiter sursum tractis, aut pollice madefacto gargarismate, & pulvisculis sequentibus intincto, aut exiguo cochleari huic negotio adaptato, pulvisculisque sequentibus impleto.

℞. Gallarum imminutarum, aluminis, salis armoniaci an. ʒ i. Tenuissime pulverentur & commisceantur, fiat pulvis. Aut

℞. Piperis, Cinamomi an. ʒ i.

Cort. Thuris, Gallarum an. ʒ s.

Acaciæ ʒ i. Rosarum rubearum 3 s.

Tenuissime contrita commisceantur, fiat pulvisculus. Quin & solius zinziberis albi pulvisculo, si reliqua ad manus non sint,

commode sublevari potest columella de-^{uvulam}pendens. In infantibus laxata columella^{sublevas.} sublevarur, si eorum vertici charta munda^{Experi-} quadruplicata lactis materni & aq. rosa-^{mentum}ceæ æ. p. simulque mixtis imbuta impo-^{pro pueris.}natur.

Adeo sæpe molesta est columellæ relaxa-^{Vulvaria}tio, ut si in initio per ineuriam negligatur^{herba pro-} ejus curatio, supputrescat, ut abscessionem^{pter signa-} desideret, quæ sane non temerè est tentanda,^{turam} statim enim ea abscessa, claram & expeditam^{valde sta-} vocem adimit, & sanguinis eruptio ex ejus^{uitur ju-} sectione difficilime potest cohiberi. ^{vare.}

4. Tonsillarum Tumor & Inflammatio quid,
quæ ejus causæ, quæ signa, & qui-
bus remediis curanda?

Tonsillæ, Græcis *παισιδιαι* & *ἀντιόδες*, Tonsillæ^{quan-} Barbaris glandes & amygdalæ, nostrati-^{proprie?} bus populari voce **die Suchhaken** nomi-^{namur.} nantur. Sunt autem duæ spongiosæ particule, instar duorum nucleorum amygdalinorum, rotundæ, utrinque circa radicem linguæ dispositæ, ex quibus inter mandendum sa-^{Earum u-} livalis profluit humiditas ad cibi durioris^{humiditas} humectationem in ore. Afficiuntur autem crebrò hæ particule, Inflammatione & tu-^{Tonsilla-} more, ac nonnunquam exulceratione, quam^{rum affe-} affectionem Græci *φλεγμονή αντιόδων* ap-^{ctus.} pellant.

Causæ intumescentiæ, inflammationis^{Causa af-} & exulcerationis tonsillarum *αεθυμείων*^{fectionum} sunt acres, erodentes & tenues humores,^{tonsilla-} ex capite ad eas defluentes. Sæpe quoque ex^{rum.} solius sanguinis redundantia in venis jugula-^{ribus} ribus intumescunt.

Προσηπτικαί causæ sunt crebra helua-^{tio}tio & meracioris vini ingurgitatio. Inflam-^{matio}matio tonsillarum puerulis fugentibus fa-^{miliaris}miliaris est, quod ex lactis acrimoniâ con-^{tingit.}tingit.

Signa tum intumescentiæ tum inflamma-^{Signa}tionis & exulcerationis tonsillarum manife-^{sta}sta sunt. Aperto enim ore, tonsillæ aut ve-^{hementer}hementer rubent & tumidiôres apparent, aut alba & pituitosa sanie oblita sunt, & ul-^{cus}cus quoque visu deprehendi potest, & per-^{petuo}petuo cum ex tumore, tum ex inflamma-^{tione}tione dolor circa radicem linguæ sentitur,

Kk 3 & de-

Evacuatio
per phar-
maca.

Venæ sec-
tio.

Topica.

Gargaris-
mus.

Alius.

Modi suble-
vandi co-
lumellam
relaxatam
& pendu-
lam.

Pulvis
adstrick-
tus.

Alius pul-
vis.

Pulvis
zinziberis

& deglutendi difficultatem parit: nonnunquam adest simul & febricula.

Curatio.

Curandi ratio in tenui victus ratione, venæ sectione, medicamentorumque usurpatione consistit.

Dieta.

Victus ratio tenuis & concoctu facilis præsertim in inflammatione tonsillarum convenit, veluti sunt, cremor hordei aut avenæ, ova forbilia, juscula ex ovis, carnes ovillæ & pullorum gallinaceorum, pruna Ungarica & similia. Potus ejus esto aut aqua hordei cum cinamomo & uvis passulis probe parata, aut cerevisia clara ac tenuis, qualis est Brunsvicensis & ejus similes.

Venæ sectionis reiteratione.

Victus tali ratione præscripta, si in tonsillarum inflammatione intumescenciaque adsint signa plethoræ, & sanguinis redundantis, tum statim in initio secanda est vena cephalica, sanguisque non confertim, sed sensim & per vices detrahendus, vulnuscule venæ subinde digito compresso ac rursus laxato. Nec obesse potest altero vel tertio die venam sub lingua incidisse. Verum ante venæ sectionem sedulo curandum est ne alvus sit constricta. Quod si durior fuerit alvus, sequenti enemate emollienda erit, fecesque subducendæ.

Enema.

℞. Malvæ, althææ, violariæ, mercurialis an. M. s.

Chamæmeli, meliloti, furfuris tritici an. P. i.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colati jusculi accipiat lib. i. eique admisceantur.

Elect. lenitivi ℥ i. s.

Ol. chamæmelini ℥ iiii.

Salis communis ℥ i. fiat enema quod tepidum jejuno infundatur.

Purgatio.

A venæ sectione si actis aliquis humor biliosus, aut serosa pituitosa excrementa in venis redundant, cujus species ex detracto cruore cognoscere dabitur, ipsum prævalentem humorem propriis remediis, quorum paradigma & copiam cum ex cephalalgia speciebus curandis, tum ex tabellis purgantium remedium certis humoribus destinatorum petere licet, subducere oportet.

Si vero adsit tumori tonsillarum & febricula, sequenti remedio utendum est.

℞. Pulpæ cassiæ recenter evulsæ ℥ x. Bolus. quæ devorentur hora dimidia ante prandii sumptionem, saccaro probe conspersæ: aut ebibantur resolutæ cum haustu aquæ stillaritiæ cichoreæ. Interim nec topica remedia, veluti sunt gargarismata, fomentationes & chirurgicæ mundificationes tonsillarum, inunctionesque negligendæ sunt.

℞. Rosarum rubearum, violarum purpurearum exsiccatarum an. M. i. s.

Sem. plantaginis ℥ iiii.

Cort. rad. prunellorum sylvestrium ℥ s.

Dactylorum n. iiii. furfuris tritici ℥ ii.

Concidea concisa & contundenda confusa simul mixta coquantur in lib. ii. aquæ ad medias, colentur, fiat gargarismus, quo tepido frequenter utatur patiens.

Si quid autem sordidum tonsillis adhærescere videtur, chirurgicis instrumentis & penicillis in diamoro aut rosaceo melibus imbutis, quotidie bis abstergendum erit. Ubi vero adest & exulceratio tonsillarum, melli rosaceo, quod illinitur, admiscendum erit parum olei vitrioli. Interim vero & externæ fomentationes tepidæ cum decoctis chamæmeli, meliloti, malvæ, althææ, fænugræci, ficuum ac similibus minimè negligendæ erunt. Quin & sequens cataplasma commodè collo tepidum imponitur.

℞. Farinæ hordei, sem. lini, fænugræci an. ℥ ii. coquantur cum q. s. aq. & acet. p. ad liquorem absorptionem, ut pulmenti crassitiem consequantur, cui tandem admisceatur olei chamæmelini q. s. fiat cataplasma, quod bis per diem collo circumponatur tepidum. Porro exulceratæ tonsillæ actia remedia ferre nequeunt, proinde aut tepido lacte, aut hydromelite, aut decocto ficuum & glyzirhyæ aut cremore furfurum gargarizandæ erunt.

SECTIO IX.
DE COLLI EXTERIORIS
AFFECTIBUS.

1. Colli exterior pars quibus Morbis
afficitur?

Affectiones præcipuas in interiori capacitate colli contentis partibus accidunt in præcedentibus explicavimus. Foris vero & in cute colli, potissimum circa guttur, duo genera tumorum plerumque oboriuntur, Bubo videlicet pestilentialis, cuius tractationem in curanda febris pestilentiali absolvemus, & strumæ five scrophulæ, de quibus hoc loco breviter docebimus.

2. Struma seu Scrophula circa guttur
quid, quæ ejus causa, quæ signa, &
quomodo curanda?

Varia genera tumorum circa guttur inter cutem & carnem oboriuntur, quæ ob formæ diversitatem cum à Græcis tum à Latinis diversis appellationibus notantur.

Vocant enim *γάγγλιον*, & *βερογχονήλην*, id est strumam & Herniam gutturis, quæ magni ac lati sunt tumores, & *χοιράδες* id est scrophulæ, glandulæ & noduli nominantur. Et si autem ex iisdem causis hæ tumorum species ut plurimum oboriuntur, & iisdem medicamentis curentur, tamen & forma & situ, mollitie ac duritie inter se nonnihil differre videntur. *Γάγγλιον* enim & struma, non tantum in collo, sed & in aliis articulationibus proveniunt. *Χοιράδες* vero five scrophulæ excrescentiæ sunt duræ, propriis membranis involutæ & prominulæ, doloris expertes, circa guttur obortæ, quales sub porcorum quorundam collis pendere conspiciunt.

Est regiuncula Stiriz in alpium convallibus, quæ à fluvio, eam per medium secante *Pingstau* / *χοιράδες*, id est, scrophulas pendeutes habent & omnes rauca loquuntur voce. Ferunt autem eis scrophulas contingere ex usu potuque ejus fluvii. Nam si baculi virgæque arborum flumini ei inji-

ciantur, brevissimo tempore strumas acquirunt.

Sunt autem omnes hi tumores pituitosæ excrescentiæ inter cutem & carnem obortæ, renitentes & doloris seu sensu carentes, & in propriis continentur pelliculis.

Causæ strumarum ac glandium *αεχνη* Causa scrophularum. *περικνη* sunt, vehemens compressio aut percussio & intemperantia victus: *αεχνη* μένη est pituitosus, cænosus, & gypseus humor, ex capite per venulas extra cranium sitas ad collum defluens.

Signa sunt manifesta, sub mento enim in collo prominent, & plerumque mobiles sunt, & à cute separabiles.

Prognostica signa: Scrophulæ seu strumæ recentes ac molles faciliè in principio discuti resolvique possunt: duræ vero, scyrrhozæ, & jam inveteratæ difficillimè curantur. Strumis duris si accedat dolor & rubedo, in abscessum & suppurationem terminantur, & in cancrum fistulamque degenerant.

Strumæ glandulæque in cæteris partibus carnosæ existentes, incisione evulsioneque commodè curari possunt, verum in collo propter concursum venarum, arteriarum & nervorum sine extremo periculo incisio tentari nequit. Curatio itaque statim in initio & bona victus ratione & medicamentorum applicatione, antequam indurescant, auspicanda erit.

Victus ratio debet esse parcius & tenuior, vitanda saturitas, meridianus somnus, & loca paludosa & montium convalles. Per medicamenta pituita ex cerebro subinde est expurganda, concoquenda & subducenda remediis in cephalalgia pituitosæ curatione & in tabella medicamentorum pituitam evacuantium, enumeratis. Aut concoquatur primum gypsea & lenta pituita sequenti potione.

℞. Rad. Ireos, galangæ, petroselinii, graminum, Asparagi, polypodii, elenii, angelicæ an. ʒ iii. Rad. Chelidonii minoris, scrophulariæ an. ʒ s.

Sem.

Potio gypseam pituitam concoquens & præparans.

Sem. petroselinī Macedonici, fœniculi, carvi cymini an. ʒ ii.

Herb. melissæ, betonice, marrubii, asplenii, veronicæ an. M. s.

Baccarum juniperi ʒ s. ramentorum ligni guajaci ʒ i.

Concisa & contusa coquantur in cantharo sive duplici vase cum lib. iiii. vini Rhenani ad duas horas, deinde colentur, colatoque juri admisceantur oxymellis scillitici, syr. è stachade an. ʒ iiii. fiat potio, de qua ebibat æger mane ac vesperi tribus horis ante cœnam ʒ v. calefactas. Hac portione absumpta deglutiat in aurora sequentes pillulas.

Pillula. ʒ. Mas. pil. Asfajereth, cochiarum, pul. turbith an. ʒ i. zinziberis, salis gemmei an. gr. iiii. formentur pillulæ n. xix. cum aqua majoranæ: hæ pillulæ singulis mensibus reiterentur.

Aut utatur singulis septimanis sequentis pulvisculi ʒ ii.

Pulvis castarticus. ʒ. Turbith, folliculorum senæ, zinziberis albi, sacchari candi an. ʒ ii.

Assumatur jejuno ventriculo cum aliquo jusculo. Aut

Pillula. ʒ. Mas. pil. de hermodactylis, de agarico, fœtidarum an. ʒ i.

Conformentur pill. 27. & deglutiantur vi. horis ante prandium.

Purgatis subductisque pituitosis humoribus, quotidie subsequencia remedia, strumas specifica virtute absumentia & discutientia, intra corpus sumi debent.

Potio specifica virtute scrophularum absument. ʒ. Rad. scrophulariæ, filipendulæ an.

ʒ ii.

Pimpinellæ, pilosellæ, tanaceri an.

ʒ i.

Aristolochiæ rotundæ, spatulæ fœtidæ, rad. raphani an. ʒ s. Contusa coquantur in lib. iiii. vini ad tertias, cui admisceantur oxymellis simp. ʒ iiii. fiat clara potio de qua tertio quolibet die ebibat æger ʒ iiii.

Limaces strumas absument.
Item caro viperina. Quin & limaces quoquo modo præparati & intra corpus assumpti strumas absumere creduntur. Idem præstat & viperarum caro præparata, & à veneno separata: aut ʒ i. trochiscorum è vipera alternis diebus

cum vino Rhenano assumptus: Aut

ʒ. Rad. gladioli, scrophulariæ an. ʒ ii. Pulvis cineris viperarum ʒ s.

Pulvis probatus.

Cineris spongiæ aquam non expertæ, limacum ex testis exemplarum & siccatarum an. ʒ iiii. ex his omnibus fiat pulvis, de quo indies iiii. horis ante prandium assumat æger ʒ i. cum haustu uno vini Rhenani.

Porro foris strumæ seu scrophulæ molliores & recentiores inungendæ & confricandæ sunt, aut pauxillo theriacæ Andromachi, & crebro spina, aut aculeo, quæ Rajæ piscis caudæ inhaeret, compungendæ, sanguisque exprimendis, strumisque lamina plumbea imponenda & alliganda. Strumæ vero jam indurata & in scyrrhum tractæ, primum emolliendæ ac tandem discutientæ & absumendæ erunt, quod sequentibus inunctionibus, cataplasmatibus & emplastris perficitur.

Topica ad strumas molliores.

ʒ. Gummi armoniaci, galbani, bdellii, sagapeni an. ʒ s.

Emplastrum valde emolliens.

Resoluta ad ignem cum pauxillo aceti vini redigantur in formam emplastri: Emollit enim omnes durities. Aut imponatur strumæ emplastrum diachylum magnum quod in myropoliis prostat. Aut

ʒ. Diachyli emplastri ʒ iiii. resoluto ad ignem admisceantur,

Emplastrum diffusum suum.

Rad. iridis Illyricæ, scrophulariæ an. ʒ s. fiat emplastrum.

Emollita hac ratione duritie, unguenta & cataplasmata discutientia & absumentia, quæ subsequuntur, imponenda erunt.

ad hunc effectum commendat.

ʒ. Plumbiusti, fuliginis ex ligno sambuci factæ an. ʒ ii. cum aceti aceto vini contemperentur, & in formam linimenti redigantur, quo indies bis confricetur tumor. Aut

Linimentum strumas absument.

ʒ. Cinerum viticis quam agnum castum officinæ vocant, exuviar. Serpentum quas Plinius vernacionem serpentum appellat, an. ʒ ii.

Contrita cum q. s. olei amygdalarum amararum, fiat linimentum. Post illicionem sequens emplastrum tumori imponatur.

ʒ. Aloës, Acatiz,

Emplastrum aliud.

Myrrhæ,

Myrrhæ,
Olibani,
Sarcocollæ an. ʒ ii.
Aluminis,
Salis an. ʒ i.

Tenuissimè contrita redigantur in emplastri formam cum q. s. albumin. ovorum.
Aut

cataplasma mirificè strumæ absistens.

℥. Rad. filicis,
Asphodeli,
Ebuli an. ʒ iii.

Concisæ coquantur in vino optimo, donec molles evadant, deinde vino effuso radices contundantur in mortario, quibus admisceantur,

Sulphuris vivi ʒ i.
Cineris cochlearum ʒ ii.

Et cum mellis ac aceti p. æq. redigantur in cataplasmatiss formam, & strumis im-

nantur, quas mirificè absument. Aut

℥. Stercoris bubuli aut caprini exsiccati ʒ ii.

Aliud cataplasma.

Rad. Brassicæ,
Capparum,
Scillæ,
Ficuum an. ʒ s.

Exactissimè contusa temperentur cum melle & aceto, fiat cataplasma.

Absumit quoque strumas calx viva cum adipe anserino & resina picea in formam emplastri redacta, illisque imposita.

Quæ strumæ hisce remediis curari nequeunt, illæ ad Reges Galliarum & Angliæ ablegandæ sunt, quibus divinitus id munus concessum esse perhibent Medici Galli, ut sola manuum impositione strumas & scrophulas curare queant.

Reges Galliarum strumas solo attactu curant.

Practicæ

FRANCISCI JOELIS

LIBRI II.

F I N I S.



FRANCISCI JOELIS
 OPERUM MEDICORUM
 TOMVS TERTIVS,

In quo

LIB. III. ET IV.

De

MORBIS ET AFFECTIBUS THO-
 RACIS, VENTRICULI ET INTE-
 STINORUM.

*Thorax
 quid.
 Ventrem
 superiorem
 vocat hanc
 cavitatem
 Hipp.
 aphor. 38.
 l. 7. Alii
 medium
 ventrem
 dicunt.
 Partes
 Thoracis
 interna.*



OPAZ, pectus, est secunda capaci-
 tas humani corporis. Dicitur au-
 tem thorax, quidquid inter collum
 sive jugulos & inter septum transversum,
 quod transversaliter intersepit corpus, & a-
 pici sterni, costis mendosis & dorsi vertebri-
 connatum est, & ventrem superiorem ab in-
 feriori dividit, continetur. In hac capacita-
 te Thoracis continentur partes respiratori,
 vitæ & voci servientes, veluti sunt:

Aspera arteria,
 Pulmones,
 Pleura,
 Costæ,
 Superior facies septi transversi, &
 Cor cum sua capsula, vitæ fons.

Extrinsæcæ ejus partes sunt:

Externa.

Mammæ,
 &
 Musculi Thoracis.

*Pectus pro-
 priè quid.*

Thorax latè patenti significatione Pectus
 dicitur; quanquam authores anteriorem
 thoracis partem propriè pectus appellent.
 Hæ partes singulæ & per *ιδιωνιδίαν* & per
συμπλάγιαν variis afficiuntur morbis & af-
 fectibus.

SECTIO I.

DE ASPERÆ ARTERIÆ,
 PULMONUM ET PLEURÆ
 AFFECTIBUS.

1. *Aspera arteria, pulmonum & pleura
 morbi qui sunt?*

Aspera arteria est fistula cartilaginosa, or-
 tum ducens à faucibus, & inversæ ar-
 teriæ de-
 boris instar in pulmones implantata, estque *scriptio.*
 organum respirationis & vocis. Pulmones in
 pectore sunt tanquam folles in vivo animan-
 te, ob necessitatem respirationis & exspira-
 tionis perpetuo motui subjecti, organa re-
 spirationis. Pleura est membrana intrinsecus
 Thoracem undique succingens.

Asperæ arteriæ, pulmonum & pleuræ præ-
 cipui morbi sunt:

Raucedo,
 Tussis,
 Asthma,
 Peripneumonia,
 Pleuritis,
 Hæmoptysis,
 Empyema,
 Phthisis.

*Morbi a-
 spera arte-
 riæ, pulmo-
 num &
 pleura.*

2. *Raucedo*

2. *Raucedo quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis tollenda?*

Raucedo quid. Βρόγχος, raucedo, est vocis insolita & non naturalis gravitas & asperitas.

Causa. Causæ αἰσθητικαὶ raucedinis sunt, nimia humectatio membranarum, asperam arteriam constituentium, per catarrhum siue destillationem excrementitiæ humiditatis ex cerebro in ipsam asperam arteriam: αἰσθητικαὶ causæ sunt nimia humectatio membranarum ejus per heluationem. Gignatur quoque rauca vox ex causis externis per accidens, ut ex diuturno clamore, ventorum borealium, fumorum & pulverum inspiratione, quæ per accidens excitant affluxionem humorum ex cerebro.

Signa. Signa raucedinis manifesta sunt. Causarum vero signa ex relatione patientis dignosci possunt.

Curatio. Curatio raucedinis à causarum remotio-
ne auspicianda est. Si itaque causa raucedinis Catarrhus extiterit, curabimus iisdem remediis, quæ supra in curatione destillationis cerebri sunt tradita, defluentem materiam decoquendo, evacuando, exiccando & defluxionem restringendo. Topicis autem omnibus remediis commodè utimur in curatione raucedinis, quæ paulo post in curanda tussi enumerabuntur.

Remedia raucedinis. Raucedo à lenioribus externisque causis oborta, facile tollitur usu pastillorum Bechicorum, Rorularumque Diaireos simpl. Diatrágacanti, Diapenidii, Loch sani, Syr. è Glycyrrhizæ, succo Glycyrrhizæ, & similib. subinde in ore retentis & sensim deglutitis. Lobel. etiam valde commendat syr. de erysimo, quo decennali raucedine laborantes curavit.

Myrrha etiam ore retenta raucedinem tollit.

3. *Tussis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Tussis quid. Βήξ, tussis, est depravatus violentusque contra voluntatem motus organorum respirationis, videlicet pulmonis, asperæ arteriæ, musculorum thoracis & diaphragma-

tis, quo natura vehementi & coactatâ respiratione, noxia expellere & discutere conatur. Galenus lib. 2. cap. 4. de sympt. causis, Tussim dicit esse vehementissimam efflationem, quæ plurimum spiritus celerrimè foras erumpens impetu suo discutit & explodit excrementa in meatibus partium respirationis contenta.

Duplex genus tussis sensu deprehenditur: *Differen-
tia.* sicca, cujus causa est aut vapor, aut mala qualitas; & humida in qua excrementitii humores excernuntur.

Causæ αἰσθητικαὶ tussis sunt, catarrhus *Causa.* seu destillatio cerebri ad organa respirationis meatus eorum obstruendo, exasperando, ac titillando, item partium prædictarum à mala qualitate, vel à vaporibus ex inferioribus partibus, videlicet Epate, Liene, Ventriculo, Matrice & Diaphragmate ad eas partes ascendentes, calefactio, exiccatio & obstructio atque exulceratio: Et tales *Tussis
Symptoma-
tica.* quidem tussis dicuntur Symptomata, & fiunt per consensum, talesque oriuntur in inflammatione Epatis & febribus, item in Lienis, Matricis & ventriculi affectibus, item in tumoribus Diaphragmatis, in pleuritide, in orthopnoea, in phthisi, & ubi ventriculum lumbrici infestant, aut acres humores os ventriculi mordicant.

Προγαστικαὶ causæ sunt, venti boreales frigidi & sicci, fumi, pinguium jusculorum usus, nucum rancidarum esus, quæ causæ vel excitant catarrhum, & per consequens tussim, vel exasperant asperam arteriam, & ad tussim stimulant.

Signa tussis sunt manifesta. Signa autem *Signa cau-
sarum di-
versarum.* per quæ causæ tussis internoscuntur præcipua hæc sunt: destillationes cerebri quarum signa supra in catarrhi curatione tradita sunt. Vaporum vitiosorum qualitarumque, ex singulis membris ad organa respirationis delatarum, & tussim excitantium signa ex loci affecti dolore, & signis affectionum internoscuntur. Utrum autem vapor seu qualitas excitans tussim sit vel sicca vel humida, id cognosci potest per assumptionem remedium vel alimentorum similium aut contrariorum. Similibus enim augetur tussis,

sis, contrariis vero curatur. Item caliditatem arguit sensibilis in thorace caliditas, siccitatem autem sequitur sitis & tussis sicca.

Prognostica. Signa causarum *αἰτιατικὰ* ex relatione ægri cognosci possunt.

Signa prognostica hæc sunt:

Vehementem tussim ut plurimum sanguinis rejectio comitatur.

Diuturna & violenta tussis in prægnantibus plerumque abortum facit.

Tussis ex destillatione capitis, si humor defluens tenuis sit aeris & salus, pulmonem exulcerat & in phthisin conjicit.

Curatio. Curatio tussis pro diversitate causarum varianda erit. Ubi itaque tussis symptoma est alicujus morbi, primum motus est curandus, quo curato, cessat & ipsa tussis. Si autem ex catarrho, id quod frequentissimè contingit, oboritur tussis, aut ex intemperie, præter sequentia remedium generata, huc referenda sunt, quæ supra in catarrhi seu destillationis cerebri curatione sunt enumerata.

Cum vero in omni tussi, sive ex destillatione generetur, sive ex intemperie, semper adsit corporis vel frigida vel calida constitutio, juxta vincentem qualitatem instituenda est tussis curatio.

Tussis à pituita crassa remedia. Diata. Ubi itaque pituita frigida & crassa, vel in cerebro, vel in respirationis organo hæret & tussim excitat, concoquenda, extenuanda & evacuanda erit. Primum itaque instituatür victus ratio calefaciens & abstergens, tussimque mitigans, veluti sunt Cremor avenæ, & alia alimenta, in quibus cocta sunt Majorana, cinamomum, crocus, semen anisi, caveat autem ab acidis & nimium salis. Deinde utatur sequenti potione.

Apocema ætherale. R. Rad. Glycyrrhizæ rasæ, Iridis Illyricæ an. ʒ ii.

Polypodii, Angelicæ, Elenii an. ʒ i.

Sem. Anisi ʒ s. Urticæ ʒ ii.

Herb. Hyssopi scabiosæ, succisæ, Marthubii an. M. s.

Tussilaginis, capillorum Veneris an. P. i.

Zedoariæ, Cinamomi an. ʒ s.

Croci ʒ i. Ficum n. v.

Conciddenda concidantur & contundenda contundantur simulque commixta decoquantur in duplici vase sive cantharo oblitro, cum aquæ semicongio *einem haben stübechen* seu lb iiii. ad duas horas. Deinde colentur, colato juri admisceantur Syr. de Hyssopo, è passio an. ʒ ii.

Oxymellis scillitici ʒ i. s.

Fiat potio, de qua quotidie bibat æger manè ac vesperi ʒ v. recalcetas. Interdium autem simul ac per noctem quodcumque à tussi infestatur æger, utatur rotulis Diareos simpl. aut Diapenidei. Absumpta præscripta potione extenuati & concocti humores ex capite & pectore purgentur & subducantur: aut sequentibus pillulis.

R. Mas. pill. de Agarico, Cochiarum, *Pillule Aslaggereth* an. ʒ i. Cum aqua hyssopi *Plegma-* formentur pill. n. 27. & circa mediam noctem deglutiantur: aut sequenti potiuncula.

R. Agarici Trochiscati, sem. Carthami, *Haustus cathartici.* fol. Serræ an. ʒ i. s.

Passularum minorum ʒ s.

Cinamomi ʒ i.

Contusa macerentur per noctem in aqua hyssopi ʒ vi. sequenti diluculo ebulliant leniter, expressaque colentur, & colato jusculo admisceantur Diaphæniconis, Diacarthami an. ʒ i. fiat haustus.

Altero die à purgatione assumat æger ʒ i. *Sudorifica.* Theriacæ Andromachi cui admixtus sit *ra.* Olei Anisi ʒ s. & sudet in loco tepido per horam.

Tandem sequentibus Bechiæ pharmacis, quæ & crassos humores extenuant atque expectorant, & tussis violentiam mitigant, alternatim uti poterit æger. Aqua vitæ Bechiæ.

R. Aq. Juniperi ʒ vi. Saccati candi albibissimi & confusi ʒ ii. commisceantur, & in scutella tribus filis sulphuratis aqua incendatur. Est enim inflammabilis, & fila Sulphurata ardentia simul imponentur flammansque liquor subinde agitetur cultro, vel spatula eburnea & ardere sinatur, donec faccarum est resolutum, tandem coletur eique *Chymici Elixir* admisceatur Croci ʒ s. de qua mane ac vesperi

proprietatibus Paracelsi à 6. gr. ad 11. in aq. convenientem exhibent. Eclegma.
 Speri assumat patiens unum cochlear: is liquor tussiles omnes ex frigidis humoribus aut ex frigida intemperie ortas solvit & discutit. Præterea tussi frigida confert sequens Electuarium.

R. Loch sani & experti, Loch de pino, de pulmone vulpis an. 3 s.

Spec. Diapenidii, Diatreos simplicis an. 3 i.

Pul. Zedoariæ, sem. Utticæ an. 3 s. Croci 3 i.

Lac sulphuris rancidam quam specificum pulmonum, hic à Chymicu usurpatur, idque in humidioribus naturis non infelicitur. Rotula.
 Cum syr. è Glycyrrhizæ q. s. Probè commisceantur, quibus in fine etiam admisceantur Ol. Angelicæ, Ol. Anisi an. 3 i. fiat Electuarium lambile, de quo frequenter assumat æger tam nocte quam die semijuglandis quantitatē sensim deglutendo.

Rotula ad tussim ex frigidityte ortam.

R. Spec. Diatreos simplicis, Diapenidii an. 3 i.

Pul. Zedoariæ, succi Glycyrrhizæ atidi & in pulverem redacti an. 3 s. Saccari albi 3 iiii. in aqua juniperi soluti.

Conficiantur rotulæ, quib. inter commiscendum addantur Olei Anisi 3 i. Olei Cinnamonum guttulæ iiii. fiant rotulæ, de quibus unum & alterum quocunque tempore in ore resolutum sensim deglutire utilissimè poterit æger.

Trochisci Bechici.
 Trochisci Bechici subnigri qui in myropoliis prostant in ore sub lingua contenti, & sensim deglutiti tussim mirifice sedant.

Quarum partium ratio habenda in tussi frigida.
 In tussi à frigida pituita aut intemperie frigida orta, ratio quoque habenda est cerebri, pectoris & pedum.

Cerebrum itaque topicis remediis calefaciendum ac corroborandum erit, & defluens humor exiccandus & extenuandus; id quod sequenti suffimento perfici potest.

Tulvū pro fumo ad catharrum exsiccandum.
R. Thuris, Ladani, styracis calamithæ an. 3 ii.

Succini, Benzoi an. 3 i. caryophyllorum 3 iii.

Flor. Lavendulæ, flor. Majoranæ an. 3 i.

Concidantur crassiuscule, & mane ac vespere ejus tanta portio, quanta tribus digitis

comprehendi potest, carbonibus candentibus inspergatur, aut cacabis ferventibus fornacis imponatur, & halitus per nates in cerebrum attrahatur.

Pectus autem singulis diebus bis mane ac vespere, sequenti linimento, post lenem frictionem calefactis linteis inungatur.

R. Unguenti pectoralis, Dialthææ an. 3 ii. *Linimentum pectorale.*

Ol. amygdalarum dulcium, mucaginis ex semine lini & fænugraci (contusis & in aqua hyssopi maceratis ac decoctis) confectæ an. 3 ii. Cera albæ q. s. fiat linimentum, cui admisceantur Ol. Angelicæ guttulæ iiii. fiat linimentum.

Pedes à refrigeratione diligenter custodiendi sunt, ac prodest ut tussiens ex frigida causa singulis septimanis bis aut ter, iturus cubitum, fomentet ac abluat pedes sequenti lavacro.

R. Hyssopi, Betonice, Majoranæ, flo. chamæmeli, Anethi, Serpilli an. M. ii. concisa coquantur in q. s. aquæ, fiat lavacrum.

Post abluionem confricentur plantæ pedum sale & aceto acerrimo, & per tabellam quercinam probe calefactam exiccati & incallescere permittantur.

Tussis ex nuda frigida intemperie orta facillimè curari potest, si æger in calido hypocausto se contineat ac quiescat, & inter tussendum spiritum cohibeat.

Porro si tussientis constitutio, & intemperies calida existat, id est, si tussis sit contracta, vel ex intemperie calida, aut humoribus calidis, salis & tenuibus ad organa respirationis defluentibus, superiori contraria est instituenda curatio. Ac primum quidem, si adsit plethora, sive sanguinis redundantia, vena primum Epatica dextri brachii, deinde & venæ sub lingua, aut etiam si caput dolore infestetur, Cephalica incidenda erit. Tandem Vistus ratio instituatur refrigerans, & tenues humores incrassans, quales sunt cremor prisanæ, lactuca in cibo comesta, lac amygdalinum, & alia iuscula, item pisces squamati, ova forbilia, ac similia. Fici autem assati, & dulcia mala assata, non tantum cibi loco, sed

Tussis ex sola intemperie frigida ut curanda.

Ex intemperie vel materia calida quibus remediis tollenda.

Vena sectio.

Diata refrigerantia & incrassantia.

Remedia
catarrhum
interci-
pientia.

Tenuis &
acris ca-
tarrhi ma-
la.

Diacod-
ium hic
valde u-
tile.

Iulapium,
siftens ca-
tarrhum.

Decoctum
pectorale
refrige-
rans &
incrassans.

Rotula
diatraga-
canti fri-
gidi valde
siftunt ca-
tarrhum.

Laudania
piati ali-
quot gra-
na cum
conserva
rosarum
veteri vel
st. pa-
pav. erra-
tici effi-
caciter
catarrhum
siftunt.
Pillula.

co, sed & medicamenti vice usurpari pos-
sunt. Deinde omnibus modis conandum
est, ut defluens tenuis humor interceptiatur
& incrassetur, ut per excretionem com-
modus expelli queat. Tenuis enim, aquo-
sus, salus & acris humor, per asperam ar-
teriam in pulmones defluens, nisi interci-
piatur, ægrotum in periculosa conjicit sym-
ptomata. Excitat enim vehementem tussim,
que tamen omnem conatum excreandi
expuendi que eludit & irritum facit, faci-
leque pulmones exulcerat, & phthisin sive
tabem inducit. Ut autem defluxio occludi
intercipique queat, æger iturus cubitum,
palatum ac fauces illinat semidrachma con-
fectionis diacodii. Deinde assumat mane
ac vespere duabus horis ante cænam 3^o v. se-
quentis portionis.

R. Syr. Violarum, è papavere, ex juju-
bis, capill. Veneris an. 3 ii.

Aq. stillatit. Endiviæ, papaveris,
Rosarum,

Malvæ an. 3 iiii. Misceantur, fiat po-
tio. Aut simili ratione utatur sequenti de-
cocto.

R. Rad. Glycyrrhizæ, Cichoreæ an. 3 s.
sem. papaveris 3 iiii.

Jubarum, sebesthen, an. n. viiii.

Flor. Hepaticæ, Malvæ, Rosarum,
violarum an. M. s.

Pulmonariæ, Tussilaginis an. p. i.

Contundendis contusis, ac concidendis
concisis, decoquantur in duplici vase cum
semicongio aquæ per duas horas, colentur,
fiat potio.

Inter potiones autem & interdiu & nocte
frequenter devoret rotulas duas Diatraga-
canti frigidi.

Absumpta potione, humoribusque mi-
tioribus redditus, evacuentur humores vi-
tiosi sequentibus pillulis.

℞. Mas. pill. Assajereth, Aurearum, A-
garici Trochiscati an. 3 i. Ex quib. confor-
mentur pillulæ 27. cum q. s. Syr. violarum,
& deglutiantur in aurora 6. horis ante pran-
dium.

Aut qui à pillularum usu abhorrent, se-
quenti haustulo uti possunt.

℞. Agarici Trochiscati, sem. Cartha-
mi an. 3 s. *Haustus
purganti.*

Rhabbarbari electi 3 i. s. Contusa mace-
rentur per noctem in aq. Cicoreæ 3 vii. Ma-
ne ebulliant, & expressa colentur, colato
jusculo admisceantur Elect. lenitivi 3 ii. *Extr. aga-
rici &
rhabbarbari
idem pra-
stant.*

Diaphæniconis 3 i. fiat haustus, qui te-
pidus ebibatur 6. horis ante prandium.

Evacuato corpore, mitigetur tussis se-
quenti Electuario.

℞. Conserv. Rosarum, Violarum an. *Eclogma
in acris
catarrhis
utile.*

Loch sani 3 ii. pul. papaveris albi 3 i. *catarrhis
utile.*

Sem. lini 3 s. spec. Diatragacanti fri-
gid. 3 i. s.

Commisceantur in mortario cum q. s.
syr. violarum, fiat elect. lambile, de quo
subinde quantitas nucis avellanæ lamben-
do sensim deglutatur. Pectus interim
quotidie bis inungatur sequenti linimento.

℞. Ol. Violarum, Amygdalarum *Linimen-
tum pe-
ctorale.*

Muccilaginis ex sem. lini cum aq.

rosaceæ confectæ 3 ii.

Ceræ albæ q. s. fiat linimentum.

Nec interim cerebrum inflammatum ne-
gligendum est, sed subinde refrigerandum
& corroborandum odoribus refrigeranti-
bus, veluti sunt aqua rosacea, cui momen-
tum Camphoræ est admixtum. *Cerebri
calidi ra-
tio habenda.*

4. *Respirationis difficultas, Asthma & Or-
thopnea quid, quæ earum causa,
quæ signa, & quomodo
curanda?*

Cum sine aëris attractione & respiratio-
ne animantia diu supervivere nequeant, i-
deo opifex certa organa & canales attrahen-
do aëri & respiratori idoneos in thorace
fabricavit, Arteriam videlicet asperam e-
jusque ramos in pulmones distributos. Ubi
itaque hi canales obstruuntur, statim se-
quitur aëris attracti coarctatio, difficultas
que respirationis. Δυσπνοια itaque respiran-
di difficultas in genere quamlibet respira-
tionis offensionem significat. Ejus autem
duæ sunt differentię secundum majorem &
minorem respirandi difficultatem, ἀσθμα vi-
delicet & ὀρθοπνοια. *Respira-
tionis ne-
cessitas &
modus.
Respira-
tionis diffi-
cultas un-
de.
Dispnea
quid.
Ejus diffi-
rentia.*

*Asihma
quid.*

Ἀσθμα est crebra, densa ac celeris anhelatio sine febre, qualis cursu fatigatis accidere consuevit.

Orthopnea quid.

Ὀρθόπνοια vero est respirationis ejusmodi difficultas in qua jacentes suffocari videntur, & semper erecto thorace & extensa cervice, & tamen cum magna difficultate respirare coguntur. In utraque respirandi difficultate obstruuntur cavitates vel asperæ arteriæ in collo, vel ramorum ac fistularum ejus, in pulmones implantatarum.

*Dyspnea
Symptomata
a quibus
morbus
excitetur.*

Difficultas respirationis quandoque symptoma est aliorum morborum, veluti virium imbecillitatis qualis contingit in morientibus, quandoque inflammationis cordis ac pulmonis, qualis fit in ardentibus febribus: quandoque fit per consensum ex tumoribus affectionibusque partium vicinarum ut Diaphragmatis, stomachi, musculorum pectoris, Epatis & splenis, qualis est in hydropse, scorbuto &c. De qua difficultate respirationis suis in locis dicturi sumus. Hoc autem loco sermo tantum nobis erit de ea respirationis difficultate, quæ ab Asperæ arteriæ ramorumque ejus angustia in pulmone & obstructione evenit.

*De qua
dyspnea
hic agatur.*

Causa.

Causæ hujus difficultatis respirationis sunt, aut humores ex cerebro defluentes, & asperam arteriam replentes, aut humores tenaces in asperæ arteriæ fistulis infarcti & pulmones gravantes, aut tumor seu tuberculum circa asperam arteriam obortum.

*Interdum
etiam
lappilli
in
pulmonum
ramulis
contenti
respirationem
difficilem
reddunt.*

Πνεύματις causæ difficilis respirationis sunt cibis, aut aliud corpus duriusculum in asperam arteriam inter devorandum imprudentibus delapsum, aut crassus ac venenosus vapor, ærque, veluti est argenti vivi, & qualis in specubus fodinariis & in serobibus Charoneis (quæ in agro Puteolano mortiferum & noxium spiritum exhalant, præcipue prope lacum Anianum in antro isto percelebri, in quo suffocantur omnia animantia injecta, nisi quamprimum extrahantur & in vicinum lacum immergantur) continetur, per respirationem attractus: Item violenta pectoris percussio.

*Signa
dyspneæ.*

Signa causarum sunt, si ex destillatione cerebri in asperam arteriam oriatur difficul-

tas respirationis, tum nulla adest febris, ad-
sunt autem catarrhi signa supra commemo-
rata. Si humores tenaces asperæ arteriæ fistulis inhaerent, pectoris adest gravitas, æger stertit inter dormiendum, & respiratio fit cum sonitu. Si tuberculum aut tumor circa asperam arteriam, aut in pulmonibus adsit, tum adest febris, & paulo post rupto tumore pus excreatur, adest & tussis gravis. Signa causarum procatarticearum ex ægri relatione dignosci possunt.

Prognostica signa habentur: Orthopnea vehementissimas habet accessiones, quæ frequenter ægros suffocare solent, quæ non contingit in Dyspnea.

Dyspnea in valde senibus in mortem terminatur. Cum *δυσπνοια*, *ἄσθμα*, & *ὀρθόπνοια* sola intensione differant, iisdem remediis, pro causarum tantum variatione alteratis, curandæ erunt.

Curatio itaque primum à victus ratione inchoanda erit. Accommoda autem victus ratio in Dyspnea est, ut æger versetur in aëre ad caliditatem siccitatemque vergente, & vitet contrariam aëris constitutionem. In lecto decumbat thorace & capite sublevato. In cibo potuque utatur æger rebus viscosos humores incidentibus & attenuantibus, & obstructos meatus aperientibus, veluti sunt cremores & juscula, quibus incocta sunt ficus & semina Anisi. Carnibus vero utatur vitulinis, gallinarum, caponum & avicularum, quæ condiantur sem. Anisi; sceniculi, radicibusque petroselinis. Pisces, lac, caseum & fructus crudos omnes vitet sedulo. In potu ei convenit hydromel, & nonnunquam vinum tenue, in quo vel radix glycyrrhizæ, vel hyssopi, vel marrubii nonnihil sit maceratum.

Proinde si alvus est adstricta, utatur frequenti clystere.

℞. Malvæ, Mercurialis, Althææ an. *Enema*
M. r. Hyssopi, Origani an. M. s. Sem. Anisi ζ s.

Decoquantur in q. s. aquæ ad tertias, colentur, colati juris accipe ζ xiv. quibus admisce elect. Diaphaniconis, Diacarthami, Hieræ simplicis an. ζ s. ol. chamæmelini.

melini ꝯ iii. salis communis ꝯ i. fiat Ene-
ma quod tepidum recto intestino injiciatur.

*Vena se-
ctio.*

Tandem si corpus ægro plethoricum fue-
rit & viribus constet, vena incidatur vel
Mediana vel Basilica vocata quæ & jecora-
ria dicitur.

*Incidentia
& aperien-
tia.*

Postea administrentur phasmaca crassam
pituitam incidentia & emollientia, obstru-
ctionesque meatus asperæ arteriæ aperien-
tia, quæ tamen non vehementer calefa-
ciant, refrigerent adstringantque, qualia
hæc subsequenter sunt.

P O T I O.

*Decoctum
pectorale
ad juven-
dam respi-
rationem.*

ꝯ. Rad. glycyrrhizæ, fœniculi, Iridis
Illiricæ an. ꝯ s.

Rad. Angelicæ, Aristolochiæ rotun-
dæ an. ꝯ ii.

Sem. anisi, fœniculian. ꝯ iii. urti-
cæ, fœnugræci an. ꝯ i.

Herb. Hyssopi, Marubii, capillo-
rum Veneris, scabiosæ, pulegii,
cardui Benedicti an. M. s.

Cinamomi ꝯ ii. passularum minorum
ꝯ ii. Contundenda contundantur & concidenda
concidentur & decoquantur cum
mullâ sive hydromellis semicongio seu
lb̄ iii. in duplici vase sive in cantharo obli-
nito ad 2. horas. Refrigerata colentur &
patienti mane ac vespere exhauriendæ offe-
rantur ꝯ iii. tepidæ.

*Purgantia
asthmati-
cis conve-
nientia.*

Concoctis & extenuatis crassis humori-
bus subtrahantur & per inferiora expurgentur
aliquoties reiteratis sequentibus purga-
tionibus.

Pillula.

ꝯ. Mas. pil. hieræ simpl. ꝯ i. Agarici
trochiscati ꝯ iii. Ex quibus confusis cum
Syr. de hyssopo q. s. conformentur pill. n.
42. de quibus singulis septimanis 21. in auro-
ra deglutendæ offerantur. Aut

*Haustus
catharti-
ci.*

ꝯ. Diaphæniconis ꝯ vi. Diacarthami,
Hieræ simpl. an. ꝯ ii. s. Resolvantur simul
cum ꝯ v. decocti hyssopi in hydromelle, fiat
haustus, qui in aurora tepidus exhibeatur.
Deinde ad faciliorem respirationem reddenda
sequentibus remediis frequenter uti
commodissimum erit.

*Remedia
varia asth-
maticis u-
tilia.
Ol ange-
lica.*

ꝯ. Ol. Angelicæ ꝯ s. cum haustu aquæ
hyssopi tepidum exhibeatur. Aut

ꝯ. Pulmonum vulpis aridorum, Ze. *Specifi-
cum pul-
monum
seu pecto-
rale sumum
commen-
tatum.*
doariæ an. ꝯ s.

Ol. Anisi ꝯ s. commixta cum haustu hy-
dromellis propinentur patienti. Aut

ꝯ. Loch è pulmone vulpis ꝯ i. spec.
Diareos Salomonis, Syr. de hyssopo q. s. das
fiat elect. lambile, cui admisceantur aq. ju-
niperi ꝯ iii. Ol. Anisi ꝯ i. de quo crebro
assumat æger duarum avellanarum quanti-
tatem. Aut

ꝯ. Theriacæ Andromachi ꝯ i. Ol. An-
gelicæ gr. v. *na vera
valde ju-
vat asth-
maticos.*

Aq. Juniperi haustulum, commiscean-
tur & ægrotanti exhibeantur.

Sequenti decocto in Orithopnæa facilita-
tem respirationis sæpè ego restitui. *Decoctum
utilissi-
mum ab
autore
sæpius pro-
batum.*

ꝯ. Zedoariæ ꝯ s. Gummi Ammoniaci
ꝯ ii.

Sulphuris Chymica arte sublimati, quod
Flos sulphuris nominatur ꝯ iii. Croci ꝯ i. Balsamus
contusa decoquantur in hydromellis lb̄ i. sulphuris
ad medias, de quo patienti crebro unum
cochlear exhauriendum præbeatur. *quoque est
remedium.
Radix Ze-
doariæ.
Topica.*

Dyspnæam mirabiliter levat sola radix
Zedoariæ comesta. Interim tamen nec to-
pica & externa remedia negligenda erunt. *Friccio pe-
toris.*

Primum itaque his singulis diebus totum
pectus panno cæruleo novo asperius con-
fricetur donec rubescat. Deinde sequenti
linimento inungatur.

ꝯ. Ol. Irini, Anethini, Rutæ an. ꝯ iii. *Linimen-
tum.*

Mucaginis ex seminibus fœnugræci & li-
ni, radicibus althææ, in aq. Juniperi mace-
ratis, confectæ ꝯ iii.

Ceræ q. s. fiat unguentum.

Dyspnæa, quæ ex flatibus circa præcor-
diâ coacervatis, & diaphragma distenden-
tibus orta est, tollitur ac discutitur facilli-
me ꝯ i. Ol. cymini, chymica arte præpara-
ti cum haustu vini calidi assumpto.

5. *Pulmonis inflammatio quid, quæ
ejus causa, quæ signa, & quo-
modo curanda?*

Πνευμονία, sive Περικαρδια, Celsō pul-
monia & pulmonis inflammatio, est morbus
acutus pulmonum, in quo videlicet pulmo-
nes, tenerimæ corporis partes, inflam-
matæ *Peripneu-
monia
quid.*

mata uruntur cum præcordiorum totiusque pectoris angustia.

Causa externa. Causa *αἰσθητικῆς* inflammationis pulmonum potest esse venenosorum vaporum, & inflammati aëris, veluti sunt fumi ex Mercurio sublimato, Arsenico, & similibus mineris, excitati, per respirationem attractio: *αἰσθητικῆς* sunt aut inflammatus biliosusque sanguis ex dextro cordis ventriculo per venam arterialem in pulmones copiosius irrumpens, ibidemque aut phlegmona aut Erysipelata generans: aut per consensum, causa inflammationis pulmonis est, purulentus sanguis rupta pleuritide, aut angina in pulmones delabens: aut tenuis, acris, urensque humor ex cerebri catarrho in pulmones defluens.

Signa. Signa peripneumoniarum sunt, acuta febris, spiritus difficultas, genæ & oculi inflammati rubentesque, sputum in principio nullum, processu autem temporis aut cruentum, quod sanguinis redundantiam ostendit; aut biliosum, quod flavæ bilis exuberantiam; aut spumofum, quod pituitam denotat. Adest quoque nonnunquam & tussicula; item pulsus est languidus & inæqualis.

Prognostica. Prognostica signa hæc in pulmonum inflammatione sunt notanda. Peripneumonia acutus & perniciosus semper est morbus, interdum tamen levis phlogosis in pulmonibus excitata à sanguine pituitoso, non adeo periculosam excitat peripneumoniam. Si enim sputum est biliosum, ut plurimum in quinque diebus, si spumofum in octo interimere solet. At si cruentum sit, in suppurationem transit.

Morbus acutus. Peripneumonia à morbo laterali orta perniciofa est. In peripneumonia virium prostratio, vigilie, deliria, ungues lividi & incurvi, tussis item & expectoratio si omnino cesser, lethalia sunt signa. In peripneumonia virium robur constans ac 21. diem superans, item sanguinis è naribus eruptio copiosa, aut uberioris bilis per alvum excretio sine difficultate, & quæ cito cesser, item apostemata circa mammæ, aut in cruribus erumpentia, salutaria

sunt signa. At si dejectis viribus alvi fluxus superveniat, ac perseveret, perniciosum est signum.

Curatio. Curatio peripneumoniarum est difficilior. Consistit autem in victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum intra & extra corpus administratione.

Victus ratio. Victus ratio debet esse refrigerans & humectans, veluti sunt cremor præsanæ, iuscula gallorum gallinaceorum cum uvis omphacitis aut cum succis Arantiorum, limonum, granatorum cocta, butyrum recens, pulpa pomorum dulcium aslatorum, ova sorbilia, pruna Ungarica: & ad virium corroboracionem prodest gustare marci panem ex pineorum nucleis confectum. Videntur autem omnia falsa, acris & difficilis concoctionis cibaria. Potus esto aqua hordei decorticati, in qua radices glycyrrhizæ & uvæ passæ sunt incoctæ.

Ante venæ sectionem exturbentur alvi excrementa sequenti clystere.

℞. Malvæ, violariæ, Mercurialis an.

M. i.

Flor. violarum M. i. i. Hordei excorticati M. s.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, colaturæ ℥ i. admisceantur Hieræ simpl. ℥ i. s. pulpæ cassiæ recentis ℥ i. Olei violarum ℥ i. i. Salis ℥ i. fiat enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Vena sectio. Alvo hac ratione evacuata, in morbi statim initio, dum vires adhuc constant, incidatur vena Epatica; aut, si commodè fieri per artificem possit, arteria venæ Epaticæ subiecta. At si venæ sectionem quid prohibeat, cucurbitulæ lateribus utrinque applicandæ, & sanguis copiosè eliciendus erit.

His ordinatis & peractis, leviori cathartico remedio ferventiores humores à venis & visceribus subducendi erunt, quod feliciter sequenti haustu peragi potest.

℞. Rhabarbari, fol. senæ ap. ℥ i. s. contusa crassiusculè macerentur in ℥ v. decocti communis florum ac fructuum: Mane ebulliant leniter & colentur, expressio colatoque

Mm

juri

juri admisceantur 3 iiii. pulpæ cassiæ recenter evulsæ, fiat haustus.

Bolus ex cassia.

Aut devoret æger particulam, quam Bolus vocant, pulpæ cassiæ sesquiunciæ pondere.

Pectoralia ad expectorationem materia juvenum.

Post purgatum corpus hujusmodi remediis utendum erit, quæ per sputum & excreationem in pulmonibus ferventiores humores expectorant & simul refrigerationem ei importent, qualia sunt hæc subsequenter. Potio:

Decoctum.

℞. Rad. Glycyrrhizæ rasæ, Malvæ an. 3 s.

Quatuor seminum frigidorum majorum an. 3 ii.

Sem. Anisi 3 i. Jujubarum, sebesten. an. n. x.

Sem. Malvæ, Adianti an. P. i. Hordei excorticati 3 iiii.

Non etiam hic negligenda quæ affluxum sanguinis & humorum cohibent ut decoctum si. papaveris erratici, diacodion laudarium opiatum, pillula de cynoglossa, quæ vesperi exhibenda.

Eclegma.

Passularum minorum, violarum an. 3 i. Contundendis contritis, & incisis incidendis, coquantur cum aq. tb iiii. in duplici vase, sive in cantharo oblitato, & in ahenum aqua plenum imposito, refrigerata colentur, fiat clara potio, de qua frequenter diu noctuque pitissando sive sorbendo assumat æger tria aut quatuor cochlearia.

Electuarium lambile.

℞. Muccilaginis, sem. Cytoniorum cum aq. tussilaginis confectæ 3 iiii. Syr. violarum 3 i. sacchari penidii 3 s.

Spec. Diatrageanthi frigidi 3 ii. commisceantur, fiat Electuarium molle, cujus nucis avellanæ quantitas crebro lambendo devoretur.

Topica.

Magni momenti quoque sunt medicamenta Topica & foris adhibenda. Quotidie itaque bis confricentur leniter linteolo calido pectus, latera, ac dorsum, & post frictionem sequenti Linimento calefacto probe inungantur.

Linimentum.

℞. Ol. violarum, amygdalarum dulcium an. 3 i.

Ol. chamæmelini, Anethini an. 3 i. Muccaginis ex sem. lini, cum aceto rosaceo factæ 3 i. s. ceræ q. s. fiat linimentum.

Commodè insuper applicari possunt dor-

so discutiendi & evacuandi caloris gratia sequentes herbæ in amplo sacculo insutæ.

℞. Flor. chamæmeli, Meliloti, Anethi, Epithema. Absinthii, Malvæ, violariæ an. M. ii. aut iiii. quæ decoquantur in æ. p. aquæ & aceti, una tantum ebullitione, deinde expressa & ad tolerabilem teporem reducta, applicentur dorso; ubi autem refrigerari cœperint, rursus in eodem jure calefacienda sunt.

Si ægrum vigiliæ infestant, futura coronalis & tempora crebro inungenda sunt Ol. rosaceo, cui pauxillum aceti rosacei sit commixtum.

Reliqua remedium genera inflammationem pulmonum mitigantia pro causarumque varietate usurpanda ex curatione pleuritidos huc transferenda erunt. Ex similibus enim ferè causis uterque morbus oboritur, & similibus remediis curatur.

6. *Lateralis dolor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?*

Πλευρίτις, Lateralis morbus, *Seiten wehe / oder stechen in der Seiten* Pleuritis quid. nomen habet à particula affecta: τὸ πλευρῶν enim latus, & πλευρῶν membranam, costas & intercostales musculos vestientem, sique τὰ πλευρῶν costas significat. Est itaque pleuritis quando membranæ costas succingentes à collecto in eo vitioso sanguine intumescunt & inflammantur, & quia membrana sicuti & nervi, sunt instrumenta sensus, earum inflammatio ac distensio infert acutissimos ac pungentes dolores.

Dux autem sunt species pleuritidis: vera, exquisita & magis periculosa una: altera non vera sed notha & minus periculosa.

Vera Pleuritis est, quando fervens & impurus sanguis, inter membranam costas vestientem & musculos intercostales, colligitur. Notha vero & non vera pleuritis est, ubi illi ipsi vitiosi humores crassi & frigidiore, aut flatulenti spiritus inter membranas costas exterius vestientes, & musculos, qui extrinsecus costas incumbunt, coacervati fuerint.

Καὶ Πνευμονικὰ καὶ πλευρῶν πόσις. Causæ sunt esse omnia ea quæ vel sanguinem in venis calefacere, extenuare, & fluidum redde-

re atque fluorem concitare, & destillationem ex cerebro commovere possunt, veluti sunt excandescencia, balnea, subita refrigeratio, largus haustus frigidus, nimius, calidorum aromatum usus, vini inerioris largior ingurgitatio, vehemens corporis exercitatio, & in solis æstu diuturnior commoratio, item lapsus, & violentus ictus in latera.

Causæ *αἰτιολογίαι* sunt sanguis aut flatulenti spiritus inter membranas, costas ventrantes, collecti.

Sanguis autem in pleuritide raro crassus est & pituitosus, frequenter autem tenuis & biliosus.

Modus generationis pleuritidis vera.

Hanc pleuritidem Platorius succingentis vocat, ubi nihil exspuitur, sed materia in abscessum definit & extrinsecus percipitur.

Pleuritis spuria seu externa ut fiat.

Pleuritis catarrhusa.

Pleuritis flatulenta.

Signa.

Fit autem pleuritis hoc modo. Sanguis tenuior & calidior ex vena cava cordi adjacentem in ramum ejus qui *ἀζυγός* nominatur, & per internam thoracis capacitatem dispergitur, imperu suo illabens, & inde rursus in tenuiores ramulos costarum defluit, quorum orificiis erosus aut ruptis incidit musculos intercostales, ibidemque collectus grumescit, putrescit & inflammatur, membranasque distendit, & punctivos dolores infert, veramque pleuritida. Quandoque autem biliosus feruensque sanguis ex vena cava in ramum ejus intrat, qui circa jugulos in alas distenditur & per ejus ramos in exteriores laterum musculos influit, ubi collectus non veram sed notham ut plurimum excitat pleuritida, quæ tamen in veram sæpe degenerat, propter venarum externarum & interiorum inter se societatem; sæpe enim internarum venarum propagines & orificia in externos musculos costarum & contra exteriorum venarum orificia in internos & subcostales musculos definunt.

Fit præterea pleuritis sæpe & ex catarrho, ubi humor frigidus à summo capite per fauces in scapulas destillat, & inde in musculos thoracis exteriores colligitur, & in tumorem transit, quæ pleuritis non dicitur vera sed notha: fit deinde & à spiritibus flatulentis inter musculos & membranas costarum collectis easque distendentibus, quæ & ipsa Pleuritis notha est.

Signa principalia *πρωτεύοντα* sunt, ejusdem gravissima symptomata, videlicet dolor

punctivus lateris, respirandi difficultas, tussis sicca, & febris.

Causatum vero species per hæc signa dignoscuntur. In omni Pleuritide inflammantur membranæ costas succingentes. Inflammatio autem omnis dolorem punctivum, æstum ac extensionem comites habet. Ac si membranæ costas succingentis pars superior inflammetur, tunc dolor circa vel versus jugulos protenditur. Inferiori autem ejus parte inflammata, dolor ad hypochondria vergit.

In pleuritide si vitiosus sanguis internas membranas intercostales obfideat, tunc ex contactu dolor non ingravescit, sed æger facilius in affecta parte, quam in sana, decumbere potest.

In sanguine affecto humoris redundantis species ex sputi rejecti colore dignoscitur. Sanguis enim, si est purus, sputum erit rubrum aut cruentum: si flava bilis, flavum: si album ac spumosum est sputum, pituitam: nigredo vero & lividitas sputi, melancholicum humorem ostendit. Dolor in exteriori parte laterum si consistat, tunc ex contactu ingravescit & intenditur dolor, & æger in affecto latere decumbere non potest. Si Pleuritis ex destillatione sit orta, præcessit cervicis & scapularum dolor ac gravitas.

Si pleuritis à flatibus, inter membranas costales collectis, originem ducat, dolor erit vagus, & non in unico loco perseverans, & calidis fomentis dolor sedatur, vel omnino discutitur.

Sputum liquidum & album non ex loco affecto, sed ex pulmone rejicitur: Flavum vero, cruentum & purulentum ex phlegmone sive rupto apostemate provenit, & per tussim ac respirationem per thoracis cavitatem excernitur.

Prognostica signa hæc sunt animadvertenda: Facilitas sputi & grumi cruoris excreti per tussim, salutem promittunt. Tussiendo autem si aut nihil, aut lividum nigrumque sputum excernatur, perniciosum est indicium; Hipp. l. 2. prognost. c. 8. Si in initio morbi, h. e. tertio aut quarto die, sputum largius ejiciatur, morbum brevem, sed

An pleuritis interna vel externa.

Qualis humor peccans.

An ex catarrho.

An à flatibus.

Prognostica.

si diutius sputum cohibeatur, longiorem futurum ostendit, Id. 12. aph. l. 1.

Morbo laterali laborantes si in 14. diebus non repurgentur, ii in suppurationem incidunt: Hipp. aph. 8. l. 5. Pulsus durus, parvus, & creber, in pleuritide lethale signum est.

Curatio.

Curatur Pleuritis victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum convenientium & extra & intra corpus administratione.

Victus ratio.

In victus ratione decumbat æger, quiescat, ac dormiat, quantum fieri potest, in aëre puro & moderatè ad caliditatem vergente. Frigidus enim aër obstruit, & nervosas partes contrahit, doloremque extendit.

Locus decubitus aer.

Omnium autem primum in pleuritide alvus patientis emolliatur, fecesque subinde per integram curationem sequenti leni Ene- mate subducantur.

Enema leniter alvum subducens.

℞. Malvarum, Althææ, Violariæ, Mercurialis an. M. 1.

Flor. violarum, chamæmeli an. P. 1.

Concisa coquantur in q. s. aquæ ad medias, expressa colentur, colati juris accipe ℥ xvi. Cui admisce hieræ simpl. ℥ s. Diacatholici ℥ 1. Ol. violarum ℥ 111. salis 31. commisceantur, ac tepida recto intestino infundantur.

Cibus qualis conveniat.

Cibus utatur tenuissimis & lenibus & præcipue sorbitionibus, quales sunt cremor ptisanæ, cremor avenæ, lac amygdalarum, lac ex sem. Melonum cum aq. hordei paratum, pruna Ungarica, mala dulcia assa vel decocta, & saccaro conspersa, ova sorbilia, juscula gallinacea & panis Marcii vocatus. Vitet autem omnia acida, acrida, salsa & adstringentia. Prædicti cibi condiri possunt butyro recenti non salito. Potus ei sit aq. hordei, cui incoctum sit parum Cinamomi, & Rad. Glycyrrhizæ. Vel loco potus bibat aquam stillat. cardui benedicti, vel cardui Mariæ, quam spinam albam vocant. Hi autem liquores omnes dulcorari possunt cum julebo violaceo, quos præstaret tepidos potius quam frigidos exhibere.

Potus.

Remedia topica.

Post ordinatam victus rationem statim Topica remedia Anodyna (id est quæ dolorem mitigant) veluti sunt fomentationes & inunctiones dolenti loco sunt applicanda, ut

nimirum dolor mitigetur, coacervata materia extenuetur, ac digeratur dissipeturque.

Fomentationes hac ratione conficiuntur. *Fomenta-
tiones.*
℞. Malvæ, Althææ, parietariæ, rosarum
siccarum an. M. 1.

Sem. lini, fænugr. contusorum an. ℥ 1.

Decoquantur in q. s. aq. cujus lib vi. admisceantur Ol. violacei, Rosarum, Anethi an. ℥ 111. in quibus tepidis filtrum vel pannus duplicatus mersus & iterum expressus loco dolenti applicetur. Aut in eodem liquore imbuatur spongia magna ac mollis & loco dolenti applicetur. Aut idem liquor infundatur in vesicam suillam, & loco dolenti applicetur. Aut

℞. Flor. Malvæ, parietariæ, Majoranæ, *Sacculus
ad dolorem
sedandum.*
Flo. chamæmeli, Anethi, Meliloti an. M. 1.

Rad. Althææ, sem. Fænugræci & lini contusorum an. ℥ 1. Commixta sacculo lineo raro insuantur ac intersuantur, & in q. s. aq. coquantur, expressaque loco dolenti applicentur. At si lateralis dolor ex flatibus & crassis humoribus originem ducat,

℞. Milii M. 11. Flor. chamæmeli M. 1. *Sacculus
ad discutien-
dos flatus.*
Sem. Fænugræci, lini an. ℥ 1. salis ℥ 11.
Commixta in sartagine torresiant, & in

sacculum lineum rarum inclusa, calida dolenti loco applicentur.

Post fomentationem, ac deinde per unionem curationis tempus, quotidie locus affectus inungatur, aut unguento pectorali communi, aut Oleis amygdalarum dulcium & Anethi, aut sequenti linimento.

℞. Ol. amygdalarum dulcium ℥ s. *Linimen-
tum.*
Liliorum alborum, chamæmelini, Anethini an. 3 11.

Ceræ albæ q. s. fiat linimentum.

Post hæc topica remedia, si dolor minimè sistatur, & impurus sanguis in membranis costas succingentibus radices egisse videatur, si ætas & vires tolerant, statim in initio vena phoræ, magis dolorem mitigat. *Vena phoræ
magis
mitigat.*

usque color sanguinis effluens immutetur. Magna autem disceptatio fuit inter Medicos Quæ vena in pleuritide vena in pleuritide brachio lateris affecti, vel lateris oppositi de secunda esset

esset secunda: vel utrum sanguis semper esset ex vena basilica detrahendus, quemadmodum Vesalius suadet. Nos doctissimorum Medicorum Fernellii & Amati Lusitani placita Hippocrate autore confirmata, sequimur, qui docent, in pleuritide cum exteriore tum interiore, tam vera quam notha, venam axillarem seu epaticam affecti lateris secandam esse, ut nimirum sanguis revellatur, & derivetur à loco affecto.

Peccoralia A venæ sectione utatur æger medicamentis sputi facilitatem efficientibus, veluti sunt *cilicantia*. hæc sequentia.

Julapium. R. Syr. Violacei, de succo Endiviæ an. 3 i.

Aq. Violarum purpurearum, Tussilaginis an. 3 i.

Cardui benedicti 3 i. s. Fiat haustus, qui tepidus exhibeatur mane ac vespere per triduum reiterando.

Lenitiva. Deinde si vires tolerant, exhibeatur patienti 3 i. s. Pulpæ cassiæ recenter evulsæ, aut 3 i. i. Syr. rosati solutivi cum 3 i. i. aq. violarum. Post corpus purgatum utatur subinde æger expectorante potione.

R. Glycyrrhizæ racæ 3 s. Passularum minorum 3 i.

Sem. Anisi, Malvæ an. 3 i. i.

Melonum cucurbitæ an. 3 i. Hordei M. i.

Confer. Rosarum, violarum an. 3 i. Ficuum n. v.

Adianthi, Cardui benedicti an. M. s. contusa & concisa coquantur in aq. stillati- tis cardui benedicti, pimpinellæ an. tb i. i. in duplici vase sive in cantharo obturato per duas horas, refrigerata colentur, colato juri admisceantur Syr. deglycyrrhiza, de capillis Veneris an. 3 i. i. cujus potio- nis 3 i. i. i. ebibat æger mane ac vespere per totum curationis tempus. Per diem autem simul ac nocte utatur æger frequentissimè aut Syr. violarum, aut sequenti lambitivo.

24. Saccaripendii 3 i. Quod cum q. s. Syr. violarum commixtum fiat electuarium lambile, cui admisceantur spec. Diatraca- canthi frigidi, pul. sem. spinæ albæ, sive Car- dui Mariæ an. 3 i. fiat Eclegma. Aut

24. Lohoch è Tussilagine, de Althæa an. 3 i.

Syr. violarum q. s. fiat Eclegma.

Assumat autem hujus Eclegma semiju- glandis quantitatem, & quidem lambendo sensim deglutiat.

Præter præscripta remedia contra dolores pleuritidis præstantissimum auxilium adfer- reprehenduntur hæc sequentia, si se- cundo die morbi exhibeatur 3 i. pul. sem. spinæ albæ, quam carduum Mariæ vocant, & nostris *Marien distel* aut *Strich- wurtz* nominatur. Aut 3 i. priapi taurini vel cervini, aut 3 i. Ramenti dentis aprini, aut 3 i. Flor. sulphuris sublimati arte chy- mica, quæ omnia cum q. s. sive haustu aq. Cardui benedicti, aut cardui Mariæ, tepida exhibenda sunt. In externa pleuritide, si cutis lateris affecti rubeat, intumescereque videatur, locusque affectus ex compressio- ne aut contactu indolescat, præter superio- rum remedium prudentem administra- tionem, loco affecto cucurbitulam affigere, & cutim scalpello leniter incidere, utilissi- mum erit.

7. Sanguinis per os rejectio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Αἱμὴν πρὸς est sanguinis undecunque profluentis per os rejectio. Sanguis unde- cunque & in quamcunque partem alienam defluerit, perpetuo ex propriis vasis, id est, venis & arteriis, aut ruptis vulneratisque, aut erosis & exulceratis, aut orificiis eorum dilatatis profluxit. Triplex hæc causa hæmo- ptyssis hoc disticho comprehenditur:

Diabrosis venas erodit, rixis easdem

Scindit, anastomosis has aperire facit.

Causæ *Πεονυτιεχνικαί*, ex quibus vasa hæc rumpuntur vulneranturque, sunt autem hæc: ictus & percussio, aut lapsus, aut vulnus ab extra illatum, aut violenta commotio, aut vor- ciferatio, aut rullis vehemens, aut hirudo gut- turi inhærens, aut extensissimi frigidi potio.

Πεονυτιεχνικαί ruptionis vasorum causæ sunt, sanguineæ massæ & spirituum in vasis redundantia, ea distendens.

Causæ *Πεονυτιεχνικαί* erosionis vaso- rum sunt, acres & erodentes cibi potusque, & sionis.

Mm 3

creber

De hac
controver-
sia videan-
tur P.

Forestus in
scholia ob-
servationis
52. lib. 16.

Peccoralia
sputum fa-
cilitantia.

Julapium.

Lenitiva.
Chymici
nonnulli
vomitoria
sati val-
ida hic ex-
hibent, ut
Rulandus
suam aq.
benedi-
ctam, alii
Turpeti
minerale
aliquot
grana.

Decoctum
peccorale.
continue u-
surpan-
dum.

*Antipleu-
ritica sin-
gularia.*

*Mirisco-
tiam sedat
dolores
pleuriticor-
um deco-
ctum si pa-
rav. erra-
tici, quod
pl. com-
mendat
Valleriola
l. 5. obser-
10.*

*Externa
pleuritidis
remedium.*

*Hamopty-
sis quid.
Sanguis
unde pro-
venit, unde
fluat.*

*Causæ ru-
ptionis va-
sorum.*

*Causæ ero-
sionis.*

creber usus liquorum Chymicorum acrium & erodentium : *αἰνυμένει* erosionis sunt, humorum acrium, ut pituitæ salæ & atræ bilis adustæ in venis redundantia.

Causa anastomasti seu aperitionis.

Causæ *αἰνυμένει* orificia venarum & arteriarum aperientes ac dilatantes sunt, calidiores plus iusto cibi ac potus, balneandi crebrior usus, & medicamenta vehementer abstergentia & aperientia : *αἰνυμένει* sunt tenues humores, & calida corporis dispositio.

Signa diversarum causarum.

Signa, ubi vasa sunt rupta aut vulnerata sunt, sanguis confertim & repente effluens in os : si erosa, sanguis paulatim per modica intervalla destillat : si aperta eorum sunt orificia, tum profuit sanguis inæqualiter, quandoque moderatè, nonnunquam immoderatè, pro ratione dilatationis orificiorum.

Ante curationem observanda.

In sanguinis per os reiectione, antequam ad curationem accedamus, studiose observandum est, ex qua corporis parte sanguis in os perfluat. Profuit autem ex capite, aut ex oris fauciumque partibus, aut ex aspera arteria, aut ex pulmonibus, aut ex thoracis partibus, aut ex ventriculo. In ventriculi autem capacitatem rursus illabitur & confluit, aut ex capite, aut ex epate, aut ex liene, aut ex utero, aut ex proprio corpore scilicet ventriculi. Locus autem ex quo, per modum projectionis, & sequentia indicia cognosci potest.

Signa indicantia diversum locum affectum.

Si sanguis ex capite in os profluat, præcessit gravitas dolorque capitis, & sanguis cum screatu rejicitur.

An ex capite.

Si ex oris partibus, videlicet gurgulione aut gingivis, simplici exspuitione projicitur.

Ex gingivis.

Si ex aspera arteria, tum sanguis est paucus, & cum tusi ac titillatione asperæ arteriæ excernitur.

Ex aspera arteria.

Si ex pulmonibus, tum sanguis est floridus ac spumofus, & sine dolore cum tusi effluit.

Ex pulmonibus.

Ex thorace.

Si ex thoracis partibus, sanguis nigricans & grumofus cum tusi rejicitur, & partes thoracis dolent.

Ex ventriculo.

Si ex ventriculo prodeat, tum post nau-

seam, sanguis niger & grumofus, ac interdum vel pituita vel bile commixtus per vomitum rejicitur.

Porro in ventriculorum stillare ac confluere sanguis solet aut è venis arteriisque, communes quas habet ventriculus cum Epate, liene aut matrice. Si itaque ex epate sanguis infuat, in dextro latere; si ex liene, in sinistro latere tumor ac dolor percipitur, & sanguis ejectus niger ac grumofus cernitur. Si ex utero, tum menses aliquandiu substitere juxta aphor. 32. l. 5. Hippoc. & hypogastrium intumescit ac doler.

Prognostica signa sunt.

Hipp. 5. Aphor. 3. ubi sanguis plurimus fluxerit, si singultus aut convulsio superveniat, malum est signum.

Item 7. Aph. 15. à sanguinis sputo puris sputum, (excretio) malum est, conjicit enim in Phthisin.

Item 7. Aph. 37. Quicunque evomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare; si vero cum febre, perniciosum.

Sanguinis ex pulmone aut thorace cum tusi reiectione, ostendit initium vel dispositionem ad phthisin.

Curatio sanguinis per os reiectionis, pro loci; ex quo in os sanguis deferretur, & causarum diversitate, instituenda erit (obiter hic author omnis sputi sanguinei curationem tradit, cum hoc loco propriè de hæmoptysi vera, quando ex thorace sanguis rejicitur, saltem esset agendum.)

Si itaque sanguis ex capite in os delabatur, per venæ cephalicæ ac frontis sectionem, aut sanguinis ad nares derivationem, & per ea remedia, quæ supra in Cephalalgia sanguinea, & in eruptione sanguinis è naribus descripta sunt, & astringentibus gargarismatis perfectè curari potest. Gargarismatis formula hæc est.

℞. Sumach, Acatiz, Balauftior. an. ʒ ii. Gargarism. plantaginis, rad. tormentillæ, smus adstringens. Hyppolapati an. ʒ i.

Aluminis ʒ s. Aceti & aquæ an. ℥ s. Contusa coquantur ad medias, colentur, fiat gargarismus, quo frigido colluantur fauces. Tempora atque frons inungantur.

Epithema.

tur aceto rosaceo, in quo instar linimenti resolutus sit succus Acatiae.

Sanguis
gargari-
mus, ha-
nophy-
sin
ex fauci-
bus sa-
rians.
Si sanguis ex gingivis profluens expuatur, commanducatione portulacæ herbæ & collutione cum aceto rosaceo, in quo momentum aluminis sit resolutum, sisti potest, nisi gingivis adsit tumor & putredo, veluti contingit in scorbuto morbo; tum enim ad remedia supra in scorbuti curatione descripta confugiendum erit.

Si vero sanguis ex partibus faucium aut gurgulione in os feratur, sequenti gargari-
gargari-
mus, ha-
nophy-
sin
ex fauci-
bus sa-
*rians.*mate curari potest.

℞. Cort. rad. prunorum sylvestrium, Balaustior. caryophyllorum an. ʒ ii. sumach ʒ i.

Rosarum, plantaginis an. M. s. Aluminis ʒ ii.

Concisa ac contusa in aq. & aceti an. ℥b. decoquantur ad medias & colentur, fiat gargariemus, quo frigido eluatur os crebrius. Tempora vero ac frons linimento Acatia & aceto rosaceo confecto confricentur.

Vena hæ-
moptica
curatione.
Si sanguis ex pulmonum aut thoracis venulis aut arteriis ruptis, erosus, aut apertis, per asperam arteriam cum tussi rejiciatur, quod non caret periculo, (facile enim laborantem in phthisin conjicit) sequenti methodo in ejus mali curatione procedendum erit.

Vena se-
ctio.
Initio statim sanguis per venæ epaticæ dextrilateris sectionem ex partibus thoracis detrahendus erit. Debet autem sanguinis detractio fieri paulatim atque per vices, ut primo die binis vicibus, & post triduum semel. Deinde ut sanguis ad thoracem defluens ad inferiora averti revellique queat, prodest pedum venas sub talis incidere: tandem prodest & cucurbitulas magnas dextro hypochondrio adfigere, & per scarificationem sanguinem avertere ac detrahere.

Dista.
Aer.
Post venæ sectionem victus ratio est præscribenda, quæ refrigerandi & exiccandi habeat facultatem. Æger itaque decumbat in aëre moderatè frigido & sicco, quiescat & sileat, & quam potest levissime respiret.

Cavendum autem, ne alvus illi sit dura ac constipata, sed vel singulis diebus vel alternis, si natura nequit, balanis & Clysteribus subducatur leniter.

Cibi offerantur refrigerantes ac constri-
Cibi con-
venientes.
gentes, simul ac conglutinant, veluti sunt hordeacea ptisana, & ejus cremor, lac caprinum, in quo chalybs candens est extinctus, pulmenta ex oryza, milio, & similia cæa farina cum lacte caprino parata. Convenit & caseus recens, & lutea ovorum & extremitates animalium (ut pedes, aures) carnes item pullorum, & leporina; assæ autem potius, quam elixæ conducunt. Utiliter quoque offeruntur pruna Ungarica acida, pyra tosta, & pulpæ malorum, acidonia mala. Cibi autem coquendi sunt in aqua fluviali, in qua ferrum candens, aut chalybs sit extinctus. Potus illi sit aqua hor-
Potus.
dei, aut lac caprillum.

Ordinata victus ratione, si corpus est
Remedia.
biliosum & sanguis acrior ferventiorque, tum utatur æger ad sopiendam acredinem ac fervorem sanguinis sequenti porione.

℞. Syr. de rosis siccis, de berberis an. ʒ i. s. de papavere ʒ i.

Aq. stillat. rosarum, solani, plantaginis an. ʒ ii.

Misceantur, fiat potio, quam quatuor vicibus mane ac vespere exhauriat tepidam.

Aut
℞. Aq. rosacæ ʒ ii. Hippuris ʒ i. In quibus resolvantur

Camphoræ gr. iiii. & que admisce
Syr. de papavere ʒ i. fiat haustus, qui ter reiteretur.

Mitigato sanguinis fervore, humor biliosus subducatur sequenti haustu.

℞. Rhabarbari electi ʒ i. s. fol. senæ
Haustrus
cholago-
gus.
ʒ i. contusa macerentur in aq. Plantaginis ʒ v. per noctem. Diluculo ebulliant leniter, exprimantur & colentur, colato liquori admisceantur pulpæ cassiæ recenter evulsæ ʒ vi. aut syr. rosati solutivi ʒ i. s. fiat haustus, qui sex horis ante prandium tepidus ebibendus præbeatur.

Expurgatis acribus & erodentibus humoribus, sequens potio omnem sanguinis fluxum

fluxum quacunque ex parte sistere potest, & valorem vulnera constringit & conglutinat mirifice.

℞. Rad. Symphyti majoris ʒ i.

Glycyrrhizæ, Cichorææ, Tormentillæ an. ʒ. s.

Herb. Agrim. veronicæ, Rosarum rubearum an. M s.

Cetrach P. i. Sumach, cinamomi, Mastiches,

Caryophyllorum an. ʒ i. concidenda concidantur, & contundenda contundantur, ac in duplici vase seu cantharo conjecta & adfusis iiii. lb. aquæ, additisque lb i. s. succi symphyti, juncturaque canthari bene oblinita, in aheni per duas horas coquantur, & refrigerata colentur, fiat potio clara, cujus mane ac vesperti assumat æger sorbendo sensimque bibendo ʒ iiii. tepidas.

Pectoralia sensim esse assumenda.

Per intervalla autem inter præscriptam potionem assumat æger sequentis electuarii semijuglandis quantitatem.

Eclegma consoli-dans ac incrassans.

℞. Conser. symphyti majoris ʒ i. conf. Rosarum veteris ʒ s.

Mucaginis crassioris Ichtiocollæ cum aq. rosacea confectæ ʒ i.

Pul. Gummi Arabici, Tragacanthi an. ʒ s.

Coralliorum rubeorum præparatorum, succini albi præparati, Margaritarum non perforatarum an. ʒ i.

Boli armeniæ orientalis, sanguinis Draconis an. ʒ s. cum q. s. syr. Myrtillosum, fiat electuarium.

Chymici tinctura vel sale coralliorum rubeorum, vel laudano opiato utuntur non infelicititer. Eupérista pro pauperibus.

Tenuioris autem fortunæ homines in sanguinis rejectionem uti possunt ʒ i. trochiscorum de carabe, aut trochiscorum de spodio, aut trochiscorum de terra sigillata pulveratorum cum haustu aq. stillatitiæ symphyti aut plantaginis. Pectus autem totum oleo è mastiche & Cytoniis calefacto bis in die inungi potest, & post inunctionem commodè cataplasma ex radicibus symphyti & herbis Agrimonis ac veronicæ, & farina fabarum simul contusis & cum oleo mastichino decoctis, & in formam cataplasmatris redactis.

Inunctio pectoris.

Cataplasma.

Curatio

Porro si sanguis ex ventriculo per gulam

evomatur, primum considerandum est, utrum vena aliqua in ipsa capacitate ventriculi, vel vena ex epate, liene aut matrice in ventriculo implantata, sit rupta, erosa aut aperta: Id enim nosse plurimum confert ad morbi curationem. Quomodo autem internoscendum sit, supra declaratum est. Si itaque in ipsa capacitate ventriculi vena sit aperta vel erosa, tunc sanguis longiori tempore colligitur, & in grumos coit, & nauseam excitat, quam sequitur evomitio nigri ac concreti sanguinis, & prosternitur appetentia, dolorque in ventriculo & circa orificium præsertim sentitur: Hic statim habenda est ratio ventriculi. Ac primum si reliquæ grumorum sanguinis in ventriculo hæreant, quod ex dolore percipitur, tunc statim concretus sanguis dissolvi debet: in quem usum assumat æger ʒ i. coaguli leporini aut mumie, aut spermatis ceti cum haustulo cerevisiæ, aut haustulum decocti buphthalmi herbæ, quam nostri *Wulvelen* vocant.

Si in capacitate ventriculi sit causa mali.

Concretum sanguinem dissolvenda.

Inunctio ventriculi.

Deinde institatur victus ratio superius descripta, quibus tamen admiscenda sunt moderate calefacientia ac siccantia, veluti sunt cinamomum ac caryophylli. Potest & vini rubei austeri usus concedi. Tandem utatur æger paulo ante descripta potione ex radicibus symphyti ac veronica. Fortis autem inungatur ventriculus singulis diebus bis sequentibus oleis calidis.

℞. Ol. cytoniorum, Mastichini an. ʒ s. Aceti rosacei parum, misceantur. Inuncto tandem ventriculo imponatur Emplastrum de crusta panis vocatum, & oleo caryophyllorum perunctum. Aut

Emplastrum machale adstrictivum.

℞. Thuris, Mastichis, Nucis Cypressi, Sumach, Berberum, Cort. mali granati an. ʒ ii. sanguinis Draconis ʒ s.

Boli Armeni, Terræ sigillatæ, Myrtillosum an. ʒ ii.

Pulverentur minutissime & cum ʒ ii. ol. cytoniorum cum quo decocti sint succi plantaginis & polygonii an. ʒ ii. usque ad consumptionem succorum, cui immisceantur pulveres & cum q. s. ceræ fiat Emplastrum, quod per alutam extensum & instar

instar scuti conformatum ventriculo applicetur.

Si ex hepate vel liene sanguis in ventriculum confluat, quod per dextri hypochondrii dolorem; aut ex lienis, quod per sinistri hypochondrii dolorem dignoscitur, statim lotio vena Basilica vocata vel dextri vel sinistri humeri, pro dolentis partis ratione, sive ejusdem venæ ramus, qui inter minimum & annularem digitum situs est, secandus erit: deinde alterutro hypochondrio, dolenti videlicet, cucurbitulæ affigendæ erunt, & sequentibus remediis tum externis tum internis, curatio perficienda erit. Hypochondrion laborans inungatur sequenti Linimento.

Linimentum. R. Ol. rosarum, Myrtillorum an. ʒ s. & mastichæ ʒ ii.

Suc. plantaginis, Polygonii an. ʒ i. coquantur ad succorum evaporationem, deinde addita q. s. Cera, fiat linimentum, cui admisceantur Pul. Acaciæ, hypocistidos ladanii an. ʒ i. corallior. rub. præparat. ʒ s. fiat unguentum, quo mane ac vesperis affectum laus inungatur. Post inunctionem imponatur sequens Emplastrum.

Emplastrum pro hypochondriis. R. Ol. Cytoniorum, Rosarum, & myrtillis an. ʒ vi.

Suc. symphyti majoris ʒ ii. commisceantur, in eis decoquantur

Herb. Agrimonix, veronicæ an. p. i. Rad. Tormentillæ, symphyti majoris an. ʒ i.

Balaustior. ʒ s.

Post succi absorptionem colentur,colatoque oleo addatur ceræ q. s. quibus, antequam refrigerentur, admisceantur pul. tenuissimi rad. symphyti, veronicæ, succini an. ʒ ii. Trochiscorum de terra sigillata, de spodio an. ʒ s. sandali rubei, Boli armeniaci, corallii rubei, hamatidis an. ʒ s. misceantur, fiat Emplastrum, quod per corium tenue quod alutam vocant extendatur, & lateri convenienter conformetur, eique applicetur.

Potus sanguinem si Bibat patiens quotidie bis mane ac vesperi nimirum una hora ante cœnam ʒ iiii. ex

potione constringente sanguinisque fluxum rem sistente & rupturas consolidante de symphyto & veronica, quam paulo ante descriptimus. Crebro utatur & Diacitonio simpl. ex succo & saccaro confecto.

Si vero mulierculis ob mensum retentionem sanguinem per vomitum ejicere contingat, quod dignoscitur quando mulierculæ in hypogastrio intumescunt, dolent, ac cruciantur, & sanguinem evomunt non in grumos concretum, nec nigrum, sed splendidiorem, liquidum, varique coloris: Ejus symptomatis curatio consistit in mensum subductione per venæ talaris apertionem & medicamenta menses moventia, quæ omnia in curatione retentionis mensum accuratius enumerabuntur: præclare enim dicit Hippocrates 5. Aphor. 32. si mulier sanguinem evomuerit, menstruis erumpentibus solutio fiet, id est liberabitur.

8. *Purulenta excretio sive suppuratio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Ἐμπύημα, Latinis suppuratio sive purulentia, est collectio puris in thoracis capacitate inter membranam costas succingentem & pulmones, indeque per os cum tussi excretio. Pus autem dicitur sanguinis aliorumque humorum per præternaturalem calorem in apostematibus aliisque locis corporis in saniem conversio.

Causa suppuracionis in thorace *τρυπη* & accidentalis est casus è sublimi, aut percussio violenta thoracis. Causæ autem *κατὰ φύσιν* sunt, catarrhus ex capite in thoracem decumbens; Angina in collo perupta, saniemque in thoracem effundens; ulcus & inflammatio pulmonis, sanguinem in pus convertens; Pleuritis seu abscessus in latere perruptus, & pus in capacitatem thoracis effundens; diuturna sanguinis ex thorace rejectio. Colligitur autem pus in thorace quandoque in uno tantum latere, nonnunquam in utraque thoracis parte.

Signa *ἔμπυημα* sunt, puris feculenti cum valida & sicca tussi excretio, quando-

N n que

quecum, nonnunquam sine febre: respiratio difficilis, gravitas pectoris, vel in utroque vel in altero latere. Ubi diutius Empyema perseverat, & pedes intumescunt, & noctu sudoris copia erumpit, postea vero ubi phthisis subsequi videtur, accedit & febris hectica, & oculi ac genæ rubescunt, unguesque incurvantur. Ut plurimum autem Empyema præcedit aut destillatio capitis, aut angina, aut pulmonis inflammatio, aut pleuritis: Suppuratione autem in utroque latere thoracis existente dignoscitur ex gravitate totius thoracis. In alterutro autem latere existente, altera thoracis pars magis dolet & calidior sentitur. Fluctuatio etiam in illa parte percipitur.

Qui morbi præcedant empyema.

Prognostica.

Prognostica signa sunt:

Si purulentis adsit febris continua, sitis vehemens, appetentiæ prostratio, alvus humida, & spurum per pus ejectum lividum conspiciatur, præsentem interitum ostendit.

Aphor. 15. l. 5.

Qui post morbum lateralem suppurantur, si in 40. diebus non cesset puris excretio, in phthisin transeunt. Purulenti omnes si non in tempore curentur, tabidi redduntur. Pus enim pulmonibus incumbens eos exulcerat.

Curatio.

Curatio suppuratorum in bona victus ratione, & medicamentorum usurpatione consistit. In victus ratione hæc observentur; versetur ac decumbat æger in loco temperato; quieti se dedat, & ab omni vehementiori commotione cum corporis tum animi studiose abstineat, super sanum latus in lecto decumbat, & ubi alvus est obstructa, sequenti clystere alternis, ternisve diebus subducatur.

Enema.

℞. Malvarum, Althææ, violariæ, Mercurialis an. M. s.

Flor. chamæmeli, Anethi an. p. i.

Concisa decoquantur in q. s. aquæ ad medias, colentur, colatique juris accipe ꝑ̄ xiiii. quibus admisce Diaphæniconis, elect. lenitivi, Diacatholici an. ꝑ̄. s. Ol. chamæmeli, amygdalarum dulcium an. ꝑ̄. i. s. salis ꝑ̄. i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Cibi suppuratorum convenientissimi *Cibi convenientes.* sunt, cremor prisanæ, hydromel, juscula gallinarum, lac amygdalinum, carnes vitulinæ, caponium, perdicum & similes. Alimenta condiantur semine Anisi aut Fænicali, aut malvæ, uvis passis & prunis Ungaricis. Utiliter quoque assumi possunt amygdalæ dulces excorticatæ, nuclei pistaceorum & pinearum, item panis Marcii ex amygdalis pineisque saccharo & pauxillo aquæ rosaceæ confectus. Potus illi conveniens est aut prisanæ succus, aut aqua hordei, aut hydromel, præsertim ubi adsit vehementior febris. Vitanda illi sunt omnia fælsa, acida & acria, tum alimenta tum medicamenta.

Potus.

Post victus rationem statim ad medicamenta foris affecto loco applicanda, quæ maturandi pus facultate prædita sunt, accedendum erit. Convenit autem ad apostematismaturationem, si in decocto flor. chamæmeli & sem. lini calido spongia magna affecto, aut pannus duplicatus imbuatur & loco affecto applicetur, aut sequens cataplasma tepidum imponatur.

Remedia.

Epithema pro latere affecto.

℞. Micam panis filiginei q. s. ac decoquatur cum aqua ad pulvis crassioris formam, cui admisce farinæ hordeaceæ parum, & olei chamæmelini q. s. fiat cataplasma.

Cataplasma.

Aut imponi potest concoctorium maturativumque sequens cataplasma.

℞. Rad. Althææ ꝑ̄. i. Ficuum & uvarum passiarum enucleatarum an. n. xv.

Maturativum.

Flor. chamæmeli, Meliloti, Anethi an. p. i. contusa decoquantur in q. s. aquæ. Tandem contundantur omnia, & per cribrum transigantur instar pulmenti, cui admisce pul. sem. lini, fænugræci, farinæ triticeæ an. ꝑ̄. i. ol. liliorum alborum, amygdalarum dulcium, butyri recentis non saliti, terpeninæ an. ꝑ̄. i. misceantur, & calida per duplicatum linteum extendantur & loco affecto applicentur.

Intra corpus vero talia assumantur remedia, quæ & maturent, & materiam ex apostemate effluentem educere queant, talis erit sequens potio.

℞. Liquiritiæ rasæ, Rad. althææ, Rad. Symphyti majoris an. ꝑ̄. i.

Potio expectoratoria matura.

Herb.

teria puru-
lenta ju-
vant.

Herb. capillorum Veneris, scabiosæ,
Agrimonix, Tussilaginis an. M. s.
Quatuor seml. frigidorum majorum
contusorum,
Anisi an. ʒ s.
Conserv. Boraginis, Buglossæ & vio-
larum an. ʒ i.

Flor. Chamæmeli P. i. Concisa atque
contusa cum ʒb iij. aquæ concòquantur in
duplici vase sive cantharo per tres horas, quæ
refrigerata percolentur, fiat potio clara quæ
dulcoretur cum ʒ iij. Syr. è Glycyrrhiza,
& assumat æger pitissando mane ac vesp-
ri ʒ v.

Plurimum prodest ex sequenti lambitivo
frequenter assumere.

Elegma.

℞. Mucaginis ficuum pinguium mace-
ratorum in aq. Tussilaginis ʒ i.
Butyri recentis non saliti ʒ s.
Ol. amygdalarum dulcium recentis
ʒ iij.
Saccari candi tenuissime pulverati
ʒ i. s.

Pul. amyli ʒ v. commisceantur in mor-
tario, fiat Loch, aut singulis diebus bis mane
ac vesperti exhibeatur ægro ʒ s. terpeninx
albæ, vel cum aq. tussilaginis vel symphyti
majoris sexies clotæ, cui admixtæ sint pul.
Glycyrrhizæ & sem. Anisi an. ʒ i. Reliqua
remediorum genera empyemati conferen-
tia, ex pleuritidos curatione petenda & ac-
commodanda sunt.

Apertio
thoracis
per chirur-
giam.

Vbi sectio
instituan-
da.

Nisi pul-
mones jam
corrupti

sint, absque
periculo

hac apertio
instituitur

& multi
hæc ratione
sunt resti-
tuti.

At vero si nec victus ratione nec remedio-
rum exhibitione pus è thoracis capacitate
excerni queat, & jam suffocationis pericu-
lum imminere videatur, tum jubet Hippo-
crates, ut thorax inter secundam & tertiam,
vel inter tertiam & quartam à spuria costa
numeranda & potissimum sinistri lateris, aut
novacula incidatur aut candenti ferro inu-
ratur, quo pus per vulnus effluere queat;
ita enim quam plurimi pristinx sanitati sunt
restituti. Sed cavendum diligenter ne dia-
phragma vel ferro vel igne tangatur læda-
turve. Hæc curatio non caret periculo: sem-
per cum protestatione de discrimine vitæ
Medico est aspicienda.

9. *Tabes quid, quæ ejus causa, quæ signa,
& quibus mediis curanda?*

Phthisis tabes est pulmonis exulceratio cum
hectica h. e. lenta & vix perceptibili febre, quid.
qua sensim universi corporis caro absumi-
tur, & ad extremam macilentiam aridita-
temque redigitur.

Cum autem non solum & pulmonis-ul-
cere, sed & ex corde, epate, ventriculoque
male affectis exarescat contabescatque cor-
pus, tres constitutæ sunt à Medicis Phthi-
seos seu Tabis species: ut Phthisis propriè di-
cta pulmonis exulceratio. *Phthisis*
Tabescentia id est nutritionis frustratio, ubi alimentum
in sanguinem nutrientem verti nequit:
& *καχεξία*, id est, malus corporis habi-
tus, cum alimentum sumptum vel in ven-
triculo, vel *χύμῳ* in epate corrumpitur
corruptusque in totum corpus digeritur.
Inter has species contabescentiæ, Phthisis est
omnium periculosissima & curatu difficilli-
ma propter motum continuum pulmonis.
Et quanquam omnes tres species ferè per ea-
dem remedia curentur, tamen hoc loco de
phthisi nobis tantum sermo erit.

Causæ *παραγενεαὶ* & accidentales
Phthisis sunt omnes quas paulo ante in san-
guinis rejectione per os enumeravimus, vel-
uti sunt, gelu aëris attracti, borealis venti,
frigidissimorum liquorum haustus, cibi ve-
hementer saliti, pharmaca venenata & ero-
dentia, lapsus ex sublimi, violenta pectoris
percussio pulmonisque vulneratio, & hali-
tus alterius phthisici per respirationem attra-
ctus, aut ex eodem poculo potus assumptus.
Est enim phthisis morbus contagiosus.

Προγενεαὶ causæ sunt congenita & à Phthisi
parentibus hæreditariè contracta pulmonis
morbus hæ-
vitiola, mollis & tenella constitutio: (Est e-
nim phthisis ut contagiosus ita & hæredita-
rius morbus, & quicumque ex tabida stirpe
sunt sati, quasi hæreditario jure omnes con-
tabescunt.) Item humor acris, tenuis & ero-
dens, vel ex capite in pulmones defluens,
aut acris sanguis ex corde in eosdem per-
fluens. Item antecedens Empyema, pleu-
ritis, peripneumonia & sanguinolenta re-

jectio, qui morbi omnes, nisi cito ac rite curentur, ut plurimum in tabem mutantur.

*Signa
phthisico-
rum.*

Signa tabis seu contabescentium sunt, totius corporis extenuatio & absumptio & febris lenta & hectica, quæ semper à cibo sumpto invalescit, & ex celeritate pulsus, rubedineque genarum dignoscitur. Hæc febris sensim suo calore primum absumit in omnibus partibus similibus humidum radicale, deinde absumit & carnosas partes, omniumque partium substantiam, unde extrema subsequitur corporis macilentia & siccitas, tum tempora collabuntur, nares exacuuntur, genæ livefcunt, ungues in digitis incurvantur, & vincente jam malo, capilli defluunt, & proximi morti alvi profluvio laborant, difficulter respirant, tussi continua infestantur; & per tussim aut cruentum aut sordidum ac fædum pus sine dolore excernunt, quod cum in ignem projicitur tetrum spirat odorem, vel si eorum sputamina in aquam injiciantur, ob gravitatem in fundum labuntur. Malo jam aucto nonnunquam per tussim excreant portiunculas carneas vel cartilagineas asperæ arteriæ propter pulmonis putrefactionem. Tandem & genæ livefcunt & facies pallet, & urina initio est salubris & naturalis, processu vero temporis oleaginea apparet, etiam in urina non levis calor ex rubedine illius cernitur, & in absumptione carnis fursuracea, in absumptione ossium in fundo urinæ cernitur materia ovorum putaminibus contractis similis. Postremo humiditate corporis absumpta, placide sineque perturbatione ut plurimum extinguuntur.

Prognostica.

Prognostica signa sunt:

Qui pectus angustum habent & collum gracile, horum natura ad phthisin est disposita.

*Vera
phthisis in-
curabilis.*

Quibus pulmones sunt exulcerati, curationem rarissimè admittunt, ac non nisi palliatam, inconstantemque, propter has causas, quia curatio exulcerationum quietem partis læsæ postulat. Pulmones autem cum propter respirationem, tum propter tussim, qua phthisici infestantur, continuè moven-

tur: Et quia remedia ulcerum curationi convenientia ulcus pulmonis, etiam si crebro assumantur; attingere non possunt.

In phthisi retentio puris mortem propinquam indicat.

In tabe profluvium alvi superveniens, lethale est signum.

Curatio tabidorum etsi sit difficilima, tamen per victus rationem & convenientium medicamentorum adhibitionem causæ phthiseos diminui, & palliativa curatio introduci, & vita eorum longius protrahi potest.

Quantum ad victus rationem attinet, versetur æger in aëre sicco & temperato ad caliditatem. Cibus eorum sit pitisana hordei, lac amygdalarum, ova sorbilia, carnes gallinarum ac vitulorum & hædorum. Ex piscibus maximè tabidis conveniunt squamati omnes, ac potissimum cancri fluviales.

Cæterum lac inter omnia cibaria tabidis est optimum & sabuberimum. Plurimi enim lactis caprilli recens emulcti usu vitam in multos annos produxerunt. Sed Medici inter lac tabidis convenientissimum esse putant lac muliebre. Id tamen cavendum in usu lactis, ne statim cibum assumant, vinumque aut acidum quippiam gustent. Corruptum enim in ventriculo lac & coagulatur.

Inter fructus arborum profunt tabidis amygdala excorticata, nuclei pineæ, ficus, daëtyli, pistaia & uvæ passæ. Vident tabidi vehementes animi commotiones, veluti sunt ira, tristitia, mærorque animi; vident & vigilias immodicas, famem & sitim. Potus eorum sit aqua hordei in qua parum Cinamomi est decoctum.

Medicamenta in phthisi pro causarum & loci affecti ratione varianda erunt.

Si itaque ex defluxu humorum acrim in thoracem pulmo exulceretur, tabemque conciliet iis, utendum est remediis, quæ supra in curatione catarrhi sunt proposita. Ita & si ex peripneumonia, Sanguinis vel puris rejectione, aut ex pleuritide phthisis seu tabes oboriatur, ad eorum morborum curationes paulo ante recitatas confugiendum.

Sed ubi jam tabescunt & emaciantur homines,

Curatio.

Victus ratio.

*Lac caprillum
phthisicis
utilissimum.*

Lac muliebre.

Remedia.

Prophylactica.

Curativa.

mines, pulmonesque exulceratos esse signa præscripta indicant, universa cura ad pulmonis exulcerati absterisionem, exiccationem & consolidationem converti debet, quæ sequentibus remediis commode perfici possunt.

Primum utatur æger singulis diebus ter, nimirum mane tribus horis à prandio & vesperi iturus cubitum sequenti potione.

Decoctum.

℞. Sem. Malvæ, Flor. Hyssopi, capillorum Veneris an. M. i.

Hordei mundati M. ii. Rad. Glycyrrhizæ ʒ i.

Ficuum n. vi. Scabiosæ M. s.

Contusa & concisa coquantur in duplici vase sive cantharo, cum aq. semicongio per duas horas, refrigerata colentur & colato juri admisceantur 4. sem. frigidorum majorum an. ʒ iii. exacte contusorum, conserv. rosarum ʒ i. confer. symphyti majoris ʒ i. s. In mortario benè contusa & commixta colentur per pannum aliquoties transfundendo, donec clara fiat portio, qua, ut diximus, tepida utatur.

Aut eadem ratione utatur Syrupo ex symphyto majori, quem doctissimus Fernelius in phthisi plurimum celebrat, qui sic conficitur.

Syrupus de symphyto Fernelii tabidus maxime utilis.

℞. Rad. symphyti majoris & minoris & flor. utriusque recentium an. M. iii.

Rosarum rubeatum, Betonicæ, Plantaginis, pimpinellæ,

Polygoni, scabiosæ, Tussilaginis omnium viridium an. M. ii.

Contusis diligenter omnibus, exprimatur succus ad lb. iii. coquatur & expumetur, postea admisceantur sacchari lb. ix. s. coquantur iterum ad syrupi consistentiam, qua utatur æger frequentissimè lambendo: aut ter in die assumat ʒ i. cum aq. Tussilaginis ʒ iii. commixtam & calefactam.

Conf. rosarum vana catarrhum sistit, & consolidat exulcerationem.

Temporibus autem inter potionem medicis crebro assumat æger quantitatem semijuglandis conservæ sive sacchari rosacei vetusti, quod ab omnibus Medicis in phthisi vehementer laudatur.

Porro ad Pulmonis exulcerati exiccationem. Flor. nem. nihil præstantius est, quam si quis quo-

tidie ʒ i. floris sulphuris chymica sublimatione præparati, in haustu capilli lactis assumat, aut sequentis pulvisculi.

℞. Sem. papaveris albi, corallii rubei præparati, Eboris aut cornu cervi ulsti an. ʒ s.

Boli Armeni veri, florum sulphuris an. ʒ i.

Gummi Arabici, Tragacanthi an. ʒ ii.

Pulverata misceantur, fiat pulvisculus, cujus ʒ i. cum lacte caprillo tepido mane ac vesperi assumat æger.

Vbi alvus suppressa est,

℞. Gallinam suppinguem seu caponem evisceratum & ad coctionem præparatum, in cujus ventrem inde utrumque varum passerum ʒ ii. prunorum dulcium n. x. Conserv. Rosarum ʒ i. Rad. Glycyrrhizæ ʒ ii. sem. Carthami ʒ s. Decoque in sufficienti aqua, post cujus perfectam decoctionem accipe juris lb. i. cui admisce Syr. rosacei solutivi ʒ ix. cujus mediam partem ebibat æger, & si necessitas exigat, hunc haustum singulis mensibus bis assumat.

Lenitivum viscerum. Chymici pro singulari secreto in hoc morbo utuntur st. antimonii rite præparati.

Cum verò phthisi ut plurimum & cor & Calorem Epar inflammantur, ad hujus caloris mitigationem bibat æger mane ac vesperi aq. hordei, in qua hordeum, passulæ, & Glycyrrhiza sunt incocta, & quæ per conservam rosarum aliquoties est percolata. Sumenda autem est ad singulas lb. aquæ ʒ i. conservæ.

Utatur quoque frequenter medicamentis carnem nutrientibus & vires reficientibus, qualia sunt sequens Electuarium & Morfali.

℞. Nucleorum pini, Avellanarum, Amygdalarum dulcium, Pistaciorum an. ʒ ii. omnibus à superiori cortice mundatis macerentur per noctem in q. s. aquæ Boraginis, deinde addantur 4. sem. frigidorum majorum an. ʒ ii. Concidentur minutissimè, & isque admisceantur pul. papaveris albi, Corallii præparati an. ʒ s. Conserv. Rosarum ʒ ii. & cum q. s. syr. violarum, fiat electuarium de quo sumat quantitatem semijuglandis. Aut

Electuarium analepticum phthificis convalescens. Chymici hujus loco utuntur tinctura perlarum, corallorum auro potabili & ol. cinamomi.

N n 3.

℞. Car-

ad caloris
nativi re-
stauratio-
nem.
Morsuli
vires re-
ficientes
& nutrien-
tes in
phthisi.

24. Carnis cancrorum fluviatilium 3 ii.
saccari rosati 3 i.

Pinearum, pistaciorum, Amygda-
larum dulcium & 4 sem. frigido-
rum majorum in aq. boraginis per
noctem maceratorum an. 3 i.

Pul. sem. papaveris albi, portulacæ
an. 3 s.

Saccari albi in aq. rosacea soluti tb s.

Fiant ex his morsuli, de quibus unum de-
voret semper una hora ante cibi assumptionem.

Thorax & spinæ dorsii Indies bis inungan-
tur sequenti linimento.

Linimen-
tum.

25. Ol. rosacei, violacei, Amygdala-
rum dulcium an. 3 s. ceræ albæ q. s. fiat li-
nimentum, admisceantur 3 ii. mucilaginis
ex seminibus lini & Cytoniorum cum aq.
rosacea facti.

Triave-
media
phthisico-
rum vi-
tam con-
servans.

Notandum est de phthisi raið posse cura-
ri, sed vita diutissime potest conservari per
hæc tria, per continuum usum lactis caprilli,
per esum conservæ rosacæ, & per aëris mu-
tationem.

SECTIO II.

DE CORDIS AFFECTIBUS.

1. Cordis morbi qui sunt?

Cordis di-
gnitas &
situs.

Cor omnium partium corporis nobilif-
simum, officina spirituum vitalium, fons
vitæ, & caloris nativi, affectuumque se-
des, in medio thorace sub quinta costa col-
locatum est, cujus mucro versus sinistram
papillam dirigitur: afficitur autem tribus
potissimum morbis;

Affectus
cordis pra-
cipui &
frequen-
tiores.

Palpitatione,
Animi deliquio,
Dolore seu imbecillitate.

2. Palpitatio cordis quid, quæ ejus cau-
sa, quæ signa, & quomodo cu-
randa?

Palpitatio
cordis
quid.
Triplex

Παλμός τῆς καρδίας, Cordis palpitatio est
immoderata ac violenta cordis concussio,
sive præternaturalis dilatio & compressio.
Triplici motu movetur cor, duobus se-

cundum naturam videlicet pulsus & affecti-
bus, & uno præter naturam videlicet palpi-
tatione. Per palpitationem cor sibi noxia
executere conatur.

Causæ palpitationis cordis αἰτιαταί. Causa pal-
pitatio sunt, vehemens corporis commotio & pitatio.
exercitatio, excandescencia, balnea justo
calidiora, crapula & veneni assumptio.

Causæ αἰτιαταί sunt sanguinis in cor-
dis thalamis redundantia, cordis propria
intemperies, retorrida bilis in arteriis ef-
fusio, vapor ex putrida melancholia in lie-
ne, aut corruptorum humorum in matrice
per arterias ad cor demissus.

Hinc omnium maximè palpitationi cor-
dis sunt obnoxii qui hypochondriaci me-
lancholia laborant, & quibus lien bilis
atræ copia turgescit, aut quibus bilis in o-
rificio ventriculi hæret.

Signa Palpitationis cordis sunt manifesta, Signa.
& ex relatione ægri & ex contactu facile
deprehenditur. Palpitatione cordis labo-
rantibus pulsus arteriarum est vehemens, &
arteriæ, potissimum quæ circa jugulum conspiciuntur, dilatantur. Palpitatio nonnun-
quam, ac potissimum in quiete remittit. Ex-
asperatur autem immodica exercitatio, crapula & Venere.

Curatio Palpitationis cordis consistit in
bona victus ratione, in venæ sectione, &
in medicamentorum usurpatione. Quæ ta-
men omnia pro causarum varietate mutan-
da erunt.

Primum itaque unice consideranda est
constitutio corporis & intemperies, qui sci-
licet humores in corpore redundant, & quæ
qualitas excellat. Potissimum autem vexan-
tur cordis palpitatione, qui biliosam aut
melancholicam habent corporis constitu-
tionem, quanquam, ut dictum est, & ex
redundantia sanguinis palpitatio suboriri
potest.

Quod si ergo sanguis tenuis uberius in-
fluat in thalamos cordis, tum solum venæ
sectio est adhibenda, & vena jecoraria de-
xtri lateris aperienda.

Ubi vero bilis retorrida in arterias est
perfusa, tum biliosi humores & præpa-
randi,

motus cor

palpi-
ditio.

cor sibi noxia

executere conatur.

Causa pal-

pitatio sunt,

vehemens corporis commotio &

pitatio.

exercitatio,

excandescencia,

balnea justo

calidiora,

crapula & veneni assumptio.

Causæ αἰτιαταί

sunt sanguinis in cor-

dis thalamis redundantia,

cordis propria

intemperies,

retorrida bilis in arteriis ef-

fusio,

vapor ex putrida melancholia in lie-

ne, aut corruptorum humorum in matrice

per arterias ad cor demissus.

Hinc omnium maximè palpitationi cor-

dis sunt obnoxii qui hypochondriaci me-

lancholia laborant, & quibus lien bilis

atræ copia turgescit, aut quibus bilis in o-

rificio ventriculi hæret.

Signa Palpitationis cordis sunt manifesta, Signa.

& ex relatione ægri & ex contactu facile

deprehenditur. Palpitatione cordis labo-

rantibus pulsus arteriarum est vehemens, &

arteriæ, potissimum quæ circa jugulum conspiciuntur,

dilatantur. Palpitatio nonnun-

quam, ac potissimum in quiete remittit. Ex-

asperatur autem immodica exercitatio,

crapula & Venere.

Curatio Palpitationis cordis consistit in

bona victus ratione, in venæ sectione, &

in medicamentorum usurpatione. Quæ ta-

men omnia pro causarum varietate mutan-

da erunt.

Primum itaque unice consideranda est

constitutio corporis & intemperies, qui sci-

randi, & educendi sunt medicamentis, quæ supra in tabellis biliosorum humorum præparandorum, & evacuandorum recensuimus.

Simili ratione, ubi palpitatione cordis ex melancholico humore vel vaporibus melancholicis, vel ex liene, veluti in melancholia hypochondriaca, vel ex matricis corruptis humoribus sursum elevatis oboriatur, tunc melancholico humoti convenientia adhibenda, quæ & ipsa superius sunt enumerata.

Victus quoque ratio pro causarum varietate immutari debet, ita ut frigida constitutione corporis calidis, in calida frigidis vescatur cibus ac potionibus æger. In victus autem ratione diligenter prospiciendum est, ex quacunque tandem causa oborta sit palpitatione, ne alvus sit obstructa, ac si adsit obstructio, ut statim Clystere aut glandibus quas suppositoria vocant, alvus solvatur. Præterea in calida intemperie utatur æger mane ac vespere sequenti Electuario.

R. Sacchari violarum, rosarum, borraginis ac buglossæ an. ʒ s.

Pul. Coralliorum præparatorum ʒ i.

Spec. Diamargariton frigidi, ossis cordis cervini an. ʒ ii.

Misceantur, & cum q. s. syrupi acetositis Citrii, fiat Elect. de quo mane ac vespere devoret æger semijuglandis quantitate.

Foris vero inungat cordis regionem sequenti linimento.

R. Ol. rosarum, violaceæ, nymphææ an. ʒ ii.

Ceræ albæ q. s. fiat linimentum, cui immisceantur tenuissimorum pul. Coralliorum rubeorum, sandalorum rubeorum, rosarum an. ʒ i. Camphoræ gr. iiii. Aceti rosacei guttulæ v. fiat unguentum.

Aut cordi imponatur sequens Epithema.

R. Aq. stillat. rosarum, acetosæ, borraginis an. ʒ ii.

Aq. Melissæ ʒ i. sp. Cordalium, vel pro Epithemate cordis ʒ ii. sandali rubei coralliorum an. ʒ i.

Camphoræ gr. v. Commixtis omnibus fiat Epithema, quod duplicato panno rubeo te-

pidum excipiat aut duplicato linteolo, & regioni cordis applicetur. Vel conficiatur sequens sacculus quadratus.

R. Flor. violarum, Buglossæ, Rosarum an. M. i.

Sacculus pro corde.

Sandalorum omnium an. ʒ i. coralliorum rub. & alborum an. ʒ s. Contusa crassiusculè insuantur in sacculum ex syndone confutum, qui aq. rosacea conspersus ac tepesfactus cordis regioni applicetur. Intermediis temporibus prodest palpitationi cordis ex calida intemperie assumere rotulas duas aut diamargariton frigidi, aut diatrion sandalon.

Porro si ex frigida cordis intemperie palpitet Cor, vel corporis constitutio sit frigidior, vel redundet aut pituitosis aut melancholicis excrementis, tunc vitiosus humor iusta methodo primum extenuandus, concoquendus & expurgandus erit convenientibus remediis, quæ supra in tabellis medicamentorum concoquentium & purgantium, & in Cephalalgæ speciebus certis humoribus destituta, commemorata sunt: ut ex. gr.

Si pituitosus humor corpus obsidet, sequenti decocto commode concoqui potest.

R. Rad. Boraginis, fæniculi an. ʒ s. Herb. Melissæ, Hyssopi, Betonicæ an. M. s.

Decoctum digerens pituitam.

Cardui Benedicti, Majoranæ, Rorismarini an. P. i.

Sem. Anisi, fæniculi an. ʒ iiii.

Contusa & concisa decoquantur in f. i. ii. Vini Rhenani idque in cantharo sive duplici vase bene obturato. Coquantur autem ad duas horas ac tandem colentur, colato juri admisceantur oxymellis scyllitici, syr. è Melissa an. ʒ i. ii. fiat potio, cujus ʒ v. mane ac totidem vespere tepidæ ebibantur: qua portione absumpta purgetur humor pituitosus sequenti haultulo.

R. Fol. senæ ʒ ii. Agarici Trociscati ʒ i. Zinziberis ʒ i. contusa macerentur per noctem in aq. Melissæ ʒ vi. mane ebulliant, leniter exprimantur ac colentur, in jusclo colato dissolvantur Diaphænicon. ʒ ii. fiat haultus, qui tepidus in aurora offeratur & jejUNET insuper horis 6.

Simili

Evacuatio per pharyngem

conveniat. sicut va-

lenitiva lumen silentia.

Electuarium coralliale refrigerans.

Linimentum infrigerans.

Epithema coralliale.

Hauftus phlegmæ gogus.

*Si melan-
cholia pal-
pitationis
cordis cau-
sa, ut em-
randa.*

*Decoctum
digerens
melancho-
liam.*

*Hauftus
melan-
gogus.*

*Cordis pal-
pitatio ex
veneno as-
sumpto ut
curetur.
Cordialia
cor & Spi-
ritus vita-
les confor-
tantia.*

*Electua-
rium.
Crollius
cordiale
suum ex
auro 7.
figillis mu-
nico aliis
omnibus
præfer.*

Simili ratione si corpus melancholico humore est perfusum, (melancholicis enim ut plurimum cordis palpitatio molesta est) tunc melancholicum excrementum sequenti decocto extenuetur, ad eductionemque præparetur.

℞. Rad. Polypodii ʒ s.

Conserv. Melissæ, Fumariæ, Boraginis an. ʒ ii.

Cort. citri ʒ v. Ceterach M. i. Thymi, Epithymi an. P. i.

Cort. Tamarisci ʒ ii. Hellebori nigri ʒ s.

Contusa atque concisa decoquantur in lb iiii. aq. melissæ in duplici vase per duas horas, & colentur, colaturæ admisceantur syr. de Epithymo, de boragine, de fumaria an. ʒ ii. fiat potio, de qua mane ac vespere assumat æger v. ʒ. tepefactas, qua portione exhausta, purgetur corpus sequenti haustulo.

℞. Rad. Hellebori nigri præparati ʒ i. fol. senæ ʒ i. s.

Polypodii ʒ s. Epithymi ʒ ii.

Contusa macerentur per noctem in aq. Melissæ ʒ vi. mane ebulliant, expressa colentur, colatoque juri admisceantur Diasenæ, Diacatholici an. ʒ ii. fiat haustus, qui tepidus 6. horis ante prandium ebibatur.

At vero si ex assumpto veneno cordis palpitatio oboriatur, protinus proderit Ol. olivarum ʒ ii. cum salis ʒ ii. tepefactis & ebibitis vomitum concitare, quibus rejectis, Theriacæ Andromachi ʒ i. cui sit admixta corallii præparati ʒ s. & ol. Angelici ʒ i. in aq. scordii resoluti ebibere.

His rectè curatis si palpitatio non cessat, cor ipsum & Spiritus vitales, & intra corpus assumptis remediis & foris topicis applicatis corroborandi erunt. In quem usum hæc sequentia maximè conveniunt.

℞. Confer. Rosarum, Boraginis, Melissæ an. ʒ s.

Cort. mali citrii, Atantiorum conditorum & tenuiss. incis. an. ʒ v i.

Spec. Diamoschi dulcis Diambæ an. ʒ i. s.

Pul. coralliorum rubeorum ʒ i. s. Syr. acetositaris citri, fiat electuarium, cui admi-

sceantur Ol. Cinamomi ʒ i. de quo assumat æger mane ac vespere, & quodocunque cordis palpitatio exacerbat, semijuglandis quantitate. Aut

℞. Spec. Diamoschi, Diambæ an. ʒ ii. *Morsuli.*

Corallii rubei præparati ʒ i.

Magaritarum in succo limonum resolutarum ʒ s. *Egremium quoque medium*

Saccari albissimi in aq. Cinamomi soluti ʒ iiii. fiant morsuli. *emulso margaritarum cum aq. boraginis*

Inter commiscendum adjiciatur Ol. Cinamoni ʒ s. *cina-*

Prodest quoque in palpitacione cordis mane ac vespere uti stillat. aq. ex Cinamomo, vel aq. Juniperi cochlearis mensura. *mom.*

Mirificè cor corroborat & palpitacionem sedat frustulum panis similacei in vino cretico madefactum, ac esitatum. Foris vero mammæ sinistræ applicetur sequens Epithema moderatè tepidum. *Aq. cinam. & spir. juniperi. Vinum creticum. Confectio Alkermes*

℞. Aq. stillat. Melissæ, Rosarum an. ʒ v. *quoque præstantiss.*

Boraginis ʒ ii. vini cretici ʒ ii. *est reme-*

Quibus commixtis admisceantur pulmaceris, caryophyllorum, cinamomi an. ʒ i. cort. citri, ligni aloës an. ʒ s. sem. ocymi ʒ i. *Epithema cordiale excellens.*

Moschi, Ambræ, croci an. gr. v. ol.

Angelicæ ʒ i. Ol. Cinamomi ʒ s.

fiat Epithema, quod duplicatis lin-

teolis exceptum applicetur. Aut

℞. Flor. Rosarum, Rotismarini, fol. Majoranæ, Basiliconis, *Sacculus cordialis.*

Melissæ an. P. i.

Pul. Caryophyllorum, ligni aloës, cinamomi, cort. citri an. ʒ i.

Trochiscorum Gallie Moschatæ ʒ s.

Contusa crassiusculè, insuantur sacculo quadrato ex syndone rubeo confecto, qui sacculus conspergatur aquis rosarum melissæ & vini generosi an. p. æ. simul mixtis & tepefactis & cordis regioni adligetur.

Aut inungatur regio cordis sequenti liquore.

℞. Aq. Rosarum, Melissæ, vini Cretici an. ʒ i. *Liquor pro inunctione cordis.*

Ol. è nuce moschata destillati, ol. Angelicæ an. ʒ s.

Ol. Ci-

Ol. Cinamomi ʒ s. ol. caryophyllo-
rum ʒ i.

Commisceantur, & parum calefiant
ante usum.

Quæ ex vaporibus crassis, aut ex liene,
aut ex epate, aut ex matrice, aut ex ventri-
culi orificio in cordis thalamos delatis oritur
palpitatio, ejus curandi rationes in curatio-
ne earum partium docebimus.

3. *Animi deliquium quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quomodo curandum?*

Lipothymia est le-
ne deli-
quium a-
nimi, ubi
vox & sen-
sus non
plane adi-
misur ut
in syncope.
Duplex
syncope.
Causa.

Συγκοπή seu *λεποθυμία*, syncope sive
Animi deliquium, est præceps omnium
trium virium sive facultatum, videlicet a-
nimalis, vitalis & naturalis lapsus & dissolu-
tio, quo calor natus & spiritus vitales dissi-
pantur, & omnes actiones labefactantur.

Duplex est syncope seu dupliciter affici-
tur cor in syncope, per *ἰδοπαθειαν* & per *συμ-
πίθειαν*. Id quod Medico diligenter est no-
tandum.

Causæ *συγκοπῆς* *παθητικαὶ* sunt,
labor vehemens, inedia longa, intempe-
stivæ vigiliæ, immodica evacuatio, balnea
nimium calida, & violenta percussio sinistræ
mammæ vel orificii ventriculi. *Προγενήσασα*
sunt cordis quælibet præternaturalis affec-
tio, & sæviora animi *παθήματα*, veluti sunt
atrox dolor, timor, & percussio repentina,
mœsticia fortis, gaudium vehemens, &
orificii ventriculi offensio, seu à venenatis,
(ita in febribus malignis certum est mali-
gnitatis indicium, cerebrum animi deliquium)
biliosus & corruptis humoribus inhærentibus
erosio. Item vapores venenati ex utero, ex
intestinis, aut ex pestilentibus bubonibus ad
orificium ventriculi exhalantibus.

*Signa syn-
copes ex-
quisita.*

*Unde sudor
frigidus in
syncope.*

Signa syncope sive deliquii animi sunt,
pulsus aut nullus aut extremè rarus aut ob-
scurissimus, frigiditas extremarum partium,
pedum, manuum, auricularum, & nasi, ma-
dor temporum cervicis & thoracis à frigido
sudore, pallor faciei & labiorum, mentis &
sensuum defectio, ac totius corporis ener-
vatio & collapsio. Sudor autem in syncope
frigidus est, quia calor natus omnis à re-
liquis partibus ad cor tanquam ad propriam
arcem confugit, & sanguis in extremis par-

tibus est refrigeratus, cujus aquosior pars ad
poros cutis defluit frigida.

Utrum vero syncope per *ἰδοπαθειαν*, id
est propriam cordis intemperiem & affectio-
nem, sive per *συμπίθειαν* quam habet cum
aliis membris, hominem affligat, dignosci
potest ex passione sive affectione cujuslibet
partis syncopen antecedente, ut, si deli-
quium animi oriatur ex affectione oris ven-
triculi, tum antecedit syncopen ventriculi
vellicatio ac mordicatio, item nausea & vo-
mitus: ita & de reliquis partibus malè affec-
tis, syncopen per consensum inducentibus
judicandum est. Si vero nulla pars alia sit af-
fecta, tunc cor ipsum per *ἰδοπαθειαν* affe-
ctum esse statuendum est.

Signum prognosticum tradit Hippocrates *Prognosi-
2. Aphor. 41.* inquit: Qui sæpe & mul-
tum exsolvuntur, h. e. in animi deliquium in-
cidunt sine causa manifesta, ii repente mori-
untur. Exitiosa syncope est, si corpore cru-
dis humoribus infarcto accadat.

Curandi ratio etsi pro causarum diversis-
tate varianda est, ac potissimum causæ *πα-
θητικαὶ* sive externæ citissimè removen-
dæ & alterandæ: tamen, cum syncope sæ-
vissimum sit symptoma, & inducias ad cau-
sarum internarum demolitionem non pa-
tatur, ac nisi ocyssimè calor natus spiri-
tusque vitales in corde revocentur ac resti-
tuantur, cito interimat hominem; causis
προγενήσασα in accessione neglectis, omnis
cura & sollicitudo ad symptoma tollendum
est convertenda. Statim itaque in initio pa-
roxyismi patientis nares apprehendendæ
sunt ac convellendæ, & facies, si nihil ad-
manum sit aliud, aqua frigida, aut aqua
rosacea moscata, aut simplici rosacea con-
spargenda est, & naribus admovendæ illi-
niendæque odoratissimæ res quæque, veluti
sunt aqua rosacea, acetum rosaceum, aqua
lavendulæ. Item Oleum angelicæ, oleum nu-
cis moschatæ naribus illitum, item Benzoi &
Storax calamita calefactæ & naribus admota,
nisi forte syncope oriatur ex matricis suffo-
catione, quæ suavis odoribus exacerbat
& foetidissimis, veluti sunt castorei & asæ fœ-
tidæ, levatur.

*An cor per
se, an per
consensum
patitur.*

*Prognosi-
2. ca.*

Curatio.

*Galenus l.
12. meth.
meden-
di syncope
curatio-
nem satis
accurate
tradit.
Paroxysmi
remedia.*

*In hunc fi-
nem para-
ti esse de-
bent balsa-
mi ex oleis
odoratissi-
mi, uti est
ol. cinam.
corticum
citri, succi-
ni, Benzoi-
ni, caryo-
phyllorum
&c.*

*Syncope
stomachica
ut curetur.*

In syncope stomachica, id est, quæ ex vaporibus venenosis, & corruptis ex ventriculi orificio ad cor delatis, excitatur, præter superiora, os ventriculi comprimendum & confricandum, erit & quatenus fieri potest æger ad vomendum irritandus penna aut digito in os inserto, quin & alto clamore patientem nominando, & in os patientis spiritum copiose inflando, & ab adamato aliquo homine patientem exosculando, multos ex deliquio animi excitatos vidimus.

Sternutamentum.

Prodest & sternutationem pulvisculo Majoranæ naribus indito excitare. Ubi vero æger paululum spiritum resumpsit, paucillum vini cretici vel alterius generosi gustandum præbere utile est, similiter & aquam cinamomi: Et linguam ejus quoque confricare, aut aqua Juniperi, aut aqua vitæ vocata, aut Theriaca Andromachi plurimum conducit. In universum autem in omni syncope convenit margaritarum, in succo limonum solutarum liquorem ori instillare. Cor autem statim pro ratione temperamentum corporis aut calidis aut frigidis liquoribus confricandum erit: calidis ut aqua lavendulæ, aut Juniperi, cui admixtum sit ol. caryophyllorum, cinamomi, Macis & Moschi momentum: frigidis vero, veluti sunt aqua rosacea, Melisse & acetum rosaceum simul commixtæ, oleum item camphoræ, & balsamus Rosarum.

*Aqua
carbunculi
hic quoque
insignes
obtinere vi-
res.*

*Tinctura
per larum
cum aq. ci-
namomi &
succu citri
valde pro-
dest.*

*Topica cor-
di admo-
venda.*

Quantum vero ad causarum syncopes ablationem attinet, semper est notandum, in ipso paroxysmo, præscriptis remediis vires esse restaurandas primum, deinde causas ocysimè removendas.

*Cause syn-
copes ut re-
movenda.*

Si itaque ex labore vehementi ac fatigatione syncope oboriatur, dulci quiete: si ex inedia longa, refectione per nutrimenta: si ex mœrore animi, lætitia curabitur syncope. Ubi vero immodica evacuatio, vel sanguinis profusio, sive id contingat ex naribus, sive ex venis hæmorrhoidibus, sive ex matrice, sive ex alvo, tum statim fluxus est cohibendus convenientibus remediis, quæ supra in narium fluore ac deinceps in alvi, hæmorrhoidarum & mensium fluore describuntur.

*Si ex im-
modica hæ-
morrhœ-
gia.*

At vero si ex nimia sudoris profusione quis in syncopen incidat, tum utendum erit corroborantibus & vires restaurantibus, sanguinemque refrigerantibus & incrassantibus. Foris autem loci odoriferi inungendi sunt aut oléo rosaceo, aut myrthino, aut citoniorum, aut albumine ovi, cui admixti sunt tenuissimi pulvisculi thuris & boli Armeni. In tali casu abstinendum est à vini exhibitione, & partium frictione.

Syncope si oriatur ex venenata potione haustu, aut veneno assumpto, statim vomitus est excitandus, & si vehemens calor absit, theriacæ ʒ i. aut ol. Angelicæ ʒ i. cum aq. scordii est ebibendus. Ac cessantia deinde erosio ventriculi, recens butyrum copiose est comedendum, & foris ventriculus ol. nardino & rosaceo subinde est inungendus.

Ubi vero ex copia vel biliosorum, vel corruptorum, venenatorumque humorum in aliquo viscere contentorum vaporibus ad cor delatis, excitetur syncope, tum post virium restaurationem, vitiosi humores convenientibus pharmacis detrahendi sunt. Oriuntur autem tales evaporationes ut plurimum ex bile flava in orificio ventriculi hærente, aut ex pituita corrupta cibique corruptis & venenatis in ipsa capacitate ventriculi natantibus: Item ex lienis & matricis vitiosis humoribus, quorum expurgandi rationem in earum partium curatione enumerabimus.

4. Dolor & anxietas cordis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Dolor omnem cordis affectionem & anxietas subsequitur; verum hoc loco intelligenda est ejus compressio, mordicatio & anxietas, quæ mirum in modum vires prosterunt.

Causæ mordicationis compressionisque cordis sunt tenues & acres humores vaporesque vel in cordis thalamis, vel in vasis h. e. venis & arteriis per cordis substantiam dispersis, infarcti, aut dolet cor per consensum ex intumescencia musculorum thoracis cordi incumbentium, aut substantiæ

*Ex nimia
sudore.*

*Ex veneno
assumpto.*

*Ex vapori-
bus ma-
lignis a-
liunde ad
cor delatis.*

*Interdum
etiam ex
nimia ple-
thora qui-
dam exsol-
vuntur,
quos vena-
sectio lar-
ga juvat.*

*Cordis do-
lor quæ
nostri
hertz en-
angst
und bang-
igkeit
vocant.
Causa.*

*Magnopere
etiam de
dolore &
anxietate*

cordis con- substantiæ cordis extabescencia. Contabe-
guentur scit autem cor, & instar pyri tosti corruga-
qui mali- tur, perpetuumque dolorem infert, & to-
gnis febr- tius corporis macilentiam ac marcorem, ex
bis & peste nimio animi mœrore aut amore: *ορενηπερ-*
laborant, & quidam *κπικη* causa doloris cordis est *φίλτρον*, aut
& quidam κπικη epileptici. magicæ potioniis assumptio.

Signa di- Signa causarum cognitu difficiliora sunt, &
versarum ex relatione ægri inquiri debent. Dolor ta-
causarum. men ex tenuium, acriumque humorum aut
 vaporum in cordis thalamis, aut in ipsa ca-
 psula cordis contentorum exortus, digno-
 sci potest ex specie doloris mordicante: Ex
 tumore autem musculorum ortus dolor cor-
 dis, gravans & comprimens sentitur. Cor-
 dis dolor qui ex mœrore, amore, & philti
 portione contractus est, ex totius corporis
 marcere, & ægri relatione investigandus est.
Prognosti- Omnem autem cordis dolorem ut pluri-
a. mum virium prostratio, cordis palpitatio,
 & si diutius perduret, marcor cordis sub-
 sequitur.

Curatio. Curatio pro causarum varietate immuta-
 ri debet. Si itaque vel cordis thalami, vel ve-
 nularum & arteriarum, per cordis substantiam spar-
 sæ, vel capsula cordis, repleta sunt tenui-
 bus acribusque humoribus, statim omnis cu-
 ra eò dirigenda est, ut cum per venarum sectio-
 nem, tum per levia remedia vitiosi humores
 detrahantur & discutiantur. Primum itaque
 macerentur per 24. horas Rhubarbari 3 r. s.
 in 3 v. aquæ Boraginis, postea leniter uno
 aut altero fervore ebulliant, exprimantur ac
 colentur, & colato iusculeo admisceantur El-
 lect. lenitivi 3 v. fiat haustus, qui tepidus in
 aurora exhibeatur, & jejune sex horis post
 assumptum potum.

Vena se- Altero à purgationis die incidatur vena
ctio. communis sive mediana sinistri lateris: ter-
 tiotandem die assumat sudorificum haustum.

Haustus 24. Theriacæ Andromachi 3 r. ol. Angeli-
udorificus. cæ guttulas v. commisceantur cum haustu
 aq. Boraginis, fiat haustus, quo assumpto
 componat se ad sudorem. Reliqua remedia
 corroborantia, & unctiones ac epithemata
 foris applicanda ex superioribus, ut synco-
 pes & palpitationis cordis curatione, peten-
 da erunt.

Si à tumore musculorum thoracis cordi *sal. theria-*
 incumbentium dolor & compressio cor *calu scru-*
 vet, tum cordis regio foris linteis calidis sub- *puli.*
 inde leniter erit confricanda, & cucurbitu- *Si à tumo-*
 læ cum scarificatione applicandæ, ac tandem *re Muscu-*
 sequenti linimento inungenda. *lorum tha-*
rachi.

24. Ol. Anethi, liliorum alborum, Hy- *Fritio.*
 periconis an. 3 r. ol. Angelic. 3 r. *Linimen-*
 Aceti rosacei momentum. Miscan- *tum.*
 tur, & tepefactis inungantur.

Porro, si dolor cordis ac compressio ab *Si ex mœ-*
 animi mœrore ac tristitia oriatur, aut ab im- *rore vel a-*
 moderato amore cor langueat ac corruge- *more.*
 tur, primum quidem quantum fieri potest,
 causæ dolorum ac *πυρμύτων* sunt auferen-
 dæ leniendæque, & in contrariam alterandæ,
 idque cum amicorum dulcioribus colloquiis
 rerum desideratarum oblatione, & ex verbo
 Dei petitis consolationibus solidis. Animi e-
 nim dolores pharmacis raro tolli possunt.

Si compressio & anxietas cordis ex phil- *Si ex phil-*
 tro aut venenato poculo, aut magicis incan- *tro vel ve-*
 tationibus originem ducat, quæ scelerata *veno.*
 molitio inter mortales usitata ac frequens
 est, ubi vel nocere vel ad amorem quem-
 quam allicere flagitiosi homines cupiunt, &
 sæpe pro amore insaniam inferunt, ita affecti
 medica ope (sunt tamen qui remediis humo-
 rem melancholicum, evacuantibus & spiri-
 tus tristes recreantibus, hujusmodi affectus
 curent) rarissimè curantur. Ardentibus ita-
 que in tali casu precibus ad Filium Dei est
 confugiendum, & curatio ecclesiæ precibus
 est commendanda. Ideo enim venit Chri-
 stus in mundum, ut opera diaboli destruat.
 Nec audiendus est impius Bombastus Para-
 celsus, qui docet, morbos magica incanta-
 tione infictos, per contrarias magicas in-
 cantationes curandos esse, superstitiosa item
 characterum imaginumque appensione, &
 similibus vetitis nugis, fidem à vero Deo
 ad creaturas avertentibus.

Præter has cordis ægritudines afficitur
 quoque in omnibus febribus: sed de febrili-
 bus, & quomodo in febribus ab accenso
 præternaturali calore in cordis thalamis or-
 tis sit agendum, suo loco dicturi sumus.

De febrili-
bus pecu-
liari tra-
ctu agit
auctor,
quem be-
nevolus lo-
cor tom 5.
ον Θελ.
videbit.

SECTIO III. DE MAMMARUM AFFE- CTIBUS.

1. *Mamma quid, & quibus potissimum morbis afficiuntur?*

ΤΙΤΘΟΙ τῶν μαστῶν ubera seu mammae
sive mamillae in pectoribus homi-
num duae sunt, & in faemellis quidem instar
semiglobi extuberant, substantia sua ratae
ac spongiosae, plurimisque glandulis refertae,
quae organa sunt lactificationis, recens na-
torum nutritioni servientia. Fetus enim in
utero non lacte, sed materno sanguine nu-
tritur; enixus autem alitur lacte, quod in
mamillis matris generatur. In medio mam-
marum apex seu tuberculum est, Graecis *ἡ-
λὴ*, Latinis papilla, nostris *die warzen*.
Afficiuntur autem mammae hisce potissi-
mum morbis:

*Mammil-
larum u-
sus.*

Papilla.

*Mammil-
larum af-
fectus.*

Lactis redundantia post partum,
Lactis defectu,
Lactis in mammis in grumos concre-
tione,
Tumore laxo,
Tumore duro,
Cancro,
Inflammatione,
Papillarum scissuris,
Mammarum in nimiam molem extu-
berantia.

2. *Lactis Redundantia quid, qua ejus causa, qua signa, & quomodo curanda?*

Lac quid.

Γάλα, lac, est sanguinis elaborati, cor-
pusque nutrientis sive nutrimenti utilis su-
perfluitas, in mamillarum vasis exacte per-
cocta, & per substantiam adenosam mam-
marum in candidum liquorem commutata.
Σπερματωδὴς lactis redundantia, est ejus in
mammis copiosa generatio, plusque, quam
recens natus absumere potest, unde in insi-
gnem tumorem mammae elewantur.

*Spargano-
sis seu la-*

*ctu redun-
dantia.*

Causa.

Causa **αρεσχητικὴ** est alimentorum
boni succi uberior usus. **Προσχημὴν** sunt
corporis sanguinea constitutio & calida hu-

midaque temperies, sanguinisque redun-
dantia.

Signa sunt manifesta; visu enim ac tactu *Signa.*
dignosci possunt. Extuberant enim plus ju-
sto ubera, ac lac potissimum est tenue, spon-
te profluit ex papillis, vel, si est densius, mea-
tus in mammis obstruuntur, mammae exten-
duntur, & in dolorificum tumorem elevan-
tur, & nisi occurratur, inflammationem, a-
liaque symptomata excitat.

Curatio redundantiae lactis perficitur vi- *Curatio.*
ctus ratione, venae sectione, & medicamen-
torum applicatione.

In victus ratione inedia & abstinencia ab *Victus ra-
alimenti boni succi veluti sunt ova-recentia, tio.*
vinum & carnes, plurimum conducit.

Prodest autem uti aqua & cremore hor-
dei, (cremor hordei lac generat, ideo ab eo
potius abstinendum.) Si corpus est sangui- *Vena sectio
commodè
adhibetur,
nisi statim
post par-
tum hoc
malo affi-
ciantur
famina.*
neum, secetur vena, primum quidem hepa-
tica dextri brachii, deinde & saphena dicta
vena sub poplite.

Topica vero remedia foris applicanda e-
runt mammis, lac exiccantia, veluti sunt a-
cetum acre caesactum & panno exceptum,
mammis applicatum. Aut

℞. Farinae fabarum, ol. rosacei & aceti *Topica va-
ria lac ex-
sicantia
& repellen-
tia.*
rosacei q. s. haec tria in formam
pulmenti commisceantur & tepida
instar cataplasmati mammis appli-
centur. Aut

℞. Gallarum, Cymini an. ζ i. Contusa
coquantur in aceto, ac colentur,
cujus liquor panno duplicato ex-
ceptus, ac tepidus mammis appli-
cetur.

Cohibet quoque lactis in mammis redun-
dantiam resina Terebinthina tepida per lin-
teum extensa & mammis applicata. Aut

℥. Cancros fluviatiles q. s. quos in vi-
treo fictili adustos, parumque
conquassatos, & sacculo lineo in-
futos, mammis applicabis.

In lactis autem redundantia, ante To- *Lac prius
picorum applicationem lac ipsum semper
extrahendum.*
picorum applicationem lac ipsum semper
primum emulgeatur, aut per suctionem ex-
trahatur, alioquin facile in mammis coa-
gulatur.

3. *Lactis in Mammis defectus sive penuria
quid, qua causa, qua signa, &
quomodo curanda?*

Lactis de-
fectus.

Ut lactis redundantia in mammis matri-
bus est molestia, ita lactis defectus & penu-
ria infantibus ac lac sugentibus noxia est.
Ita enim natura comparatum est, ut omnes
foemellæ utero gerentes, & partum enixæ,
si salubriter degant, lac in mammis futu-
rum factui alimentum, in uberibus tanquam
in lagenula colligant ac gestent.

Causa pro-
pter quam
lac defi-
ciat.

Causæ porro lactis defectus *αενηρμενεια*
sunt sanguinis in materno corpore aut pen-
uria, aut vitiositas, aut mammarum, to-
tiusque corporis extrema siccitas, venarum-
que in mammis summa gracilitas. *Περίεργα*
vero causæ sunt, aut imbecillitas
infantis, lac ex mammis sugere nequeantis,
aut recens & novi fatus in utero conceptio.
Revellitur enim tum lactis materia ad ute-
rum, ad fatus nutritionem.

Signa cau-
sæ di-
versarum.

Signa sunt evidentiæ: causæ vero penuriæ
lactis ita internosci possunt. Paucitatem
sanguinis in corpore vel mammis, marcor
totius corporis, & mammarum gracilitas
atque siccitas indicant. Sanguinis vitiosi-
tas ex malo corporis habitu fædoque co-
lore dignoscitur. Venarum gracilitas in
mammis visuprehenditur. Infantis malè
affecti vel morbofi signa manifesta sunt. Sic
& nova conceptio ex matris relatione di-
gnoscitur.

Curatio.

Curatio penuriæ lactis consistit in bona
victus ratione, & medicamentorum lac
generantium, tum foris, tum intra corpus
usurpatione. Utatur itaque mater lactis co-
piam desiderans cibis potionibusque op-
timi succi, & quæ natura humectent, &
moderatè calefaciant. Ex his enim san-
guinis copia generatur. Talia vero sunt
ova recentia forbilia, carnes hædinæ, vi-
tulinæ, pullorum, gallinaceorum, capo-
num & perdicum. Conveniunt quoque in
hunc usum pisces saxatiles, & squamati.
Condiantur edulia pulvisculis Cinamomi,
Zinziberis & Croci. Quin & cum edu-
liis concoquantur radices pastinacæ, pe-

trofelini, fæniculi, & carotæ *gelbe Mohr*, *sum con-*
rûben. Profunt & juscula carnis bovillæ, *mendant.*
lac ovillum, lac amygdalinum & panis Mar-
cius. Item amygdalæ dulces, semenque fæ-
niculi saccharo incrustatum atque obdu-
ctum. Tenuioris fortunæ matres & nutri-
ces ad lactis generationem expertæ sunt of-
fam ex cerevisia aliqua laudata cum butyro
recenti & impinguata prodesse. Et vinum
dulce ac generosum moderatè bibitum, lac
probum & sufficiens producit.

Si sanguis est vitiosus ex qua debeat ge-
nerari lac, idque ex colore & substantiæ te-
nuitate dignosci potest, si est serosius, reme-
diis pituitam & serum ducentibus; si viro-
biliosius, bilem evacuantibus, sanguis est
purificandus, quorum remediorum tabellam
in initio curationis morborum proposui-
mus. At si infans est imbecillis, & lac exsu-
gere nequeat, studendum est ut maternum
lac subinde emulgeatur, aut ab alio infante
exsugatur. In nova imprægnatione, ubi si-
gna senserit mater, statim infantem abster-
gi si novum fætum sanum esse cupiat.

Porro si venulæ in mammis graciliores
existant, quam ut per eas lac effluere queat, *Vena*
mammarum ipsæ & thorax calidis linteolis horâ *mamma-*
tertiâ à cibo sumpto leniter & suaviter con- *rum ut di-*
fricentur, ac deinde foveantur decocto fi- *lasanda.*
cium & radicum Althææ pannis excepto & *Copiam la-*
mammis applicato. Quo ablato mammarum *ctis suppe-*
inungantur oleo liliorum alborum. *ditantia*

Intra corpus sequenti pulvisculi ʒ i. s.
mane & una hora antea nam cum vino as-
sumpti lac maternum mirum in modum au-
gent.

Pulvis.
ʒl. Sem. fæniculi, anisi, pastinacæ an. ʒ s. *Idem præ-*
Sem. lini ʒ i. Cinamomi electi ʒ i. *stant*
Saccari candi ʒ i. s. Omnia in tenuis-
simum pulverem redigantur ac commi-
sceantur.

4. *Lactis in mammis concretio quid, qua
ejus causa, qua signa, & quomodo
curanda?*

Ορόμωσις, grumescencia lactis, est la-
ctis in casei formam in mamillarum ve-
nis & meatibus concretio: quod ple-
runque

sum con-
mendant.

Post no-
vum conce-
prum in-
fantis ab-
stergend.

Vena
mamma-
rum ut di-
lasanda.
Copiam la-
ctis suppe-
ditantia

Pulvis.
Idem præ-
stant
glauco her-
bula mari-
tima, po-
lygala, se-
men circa.

Espergula
cum pisti-
na decocta
& pota.

Lactis
coagulatio
in mam-
mis

runque puerperis post partum ex lactis redundantia, si non exlugarur aut emulgeatur, sed diutius in mammis contineatur, accidere consuevit.

Causa.

Causæ *αἰνυμέναι* sunt lactis redundantia, mammarum justo calidior intemperies, & sanguinis adfluentis, ex quo lac generatur, aciditas. Sicuti enim lac optimum ad ignem collocatum, si aceti quid, aut acidi liquoris adfundatur, statim coagulatur; ita si sanguis admixtionem habeat acidæ melancholiæ, aut ferosæ pituitæ, lac in mammis coagulatur.

Signa.

Signa sunt manifesta, visu enim & tactu, atque ex querimonia matronarum cognosci possunt.

Prognostica.

Huic malo nisi in tempore occurratur, tumorem, inflammationem & apostema mammis infert.

Curatio.

Curatio pro causarum varietate est instituenda.

Lac concretum ut educendum.

Statim autem in principio lac concretum in mammis educendum erit hac ratione. Fomententur mammae aqua calida simplici, aut calido liquore, in quo concocta sunt folia malvarum, & semen fœnugræci; deinde leniter comprimendo mammæ, lac concretum studiose emulgeatur exprimatque.

Victus ratio.

Tandem & victus ratio, sanguinem vitiosum alterans, instituitur. Victus ratio debet esse temperata, & edulia omnia saccharo; aut purissimo melle sunt dulcoranda. Acida autem omnia & acria vitanda erunt.

Porro si ex redundantia lactis lac concreverit in mammis, curatio est adhibenda, quæ paulo ante in curatione redundantia lactis est præscripta.

Si ex cacochymia melancholica lac concreverit, ut curanda agra.

Si vero sanguis sit acidior ex melancholico humore, id quod ex fusco cutis colore dignoscere licet, tum melancholicus humor subtrahatur remediis convenientibus, quæ supra in tabellis medicamentorum sunt commemorata, ut Diacatholicon, vel Diasena, vel infusione polypodii, & veratri nigri.

Si ex seroso sanguine.

Ita si serosus humor sanguini admixtus sit causa grumescentiæ lactis, quod ex candore & laxitate cutis deprehenditur, serosus

humor serum ac pituitam purgantibus remediis, veluti sunt diaphænicon, diacarthamum aut diaturbith, subducendus erit.

Ablatis causis congrumescentiæ, ea remedium genera & intra corpus sunt adhibenda, & foris mammis applicanda, quæ sanguinis grumos, & lac in mammis coagulatum, resolvere & extenuare possunt. Ut autem sanguinem, ita & lac in venis concretum resolvit ac liquefacit, tum in ventriculo, tum in mammis, coagulum leporinum, hoc est, lac concretum, quod invenitur in pullis leporum nondum natorum sed excisorum: Idem si illinatur

mammis, liquefacit lac concretum. Prodest quoque lentes in aceto elixatas instillari lac cataplasmatibus mammis imponere: Item fovere mammæ decocto florum chamæmelini, fœniculi, anethi, & sem. lini ac fœnugræci. Apium quoque herba virescens contusa & mammis imposita, lac concretum resolvit.

Ubi vero jam intumescere incipiunt mammae, medullam panis in lacte coctam, cui additum sit nonnihil fellis bubuli, & momentum croci, instillari cataplasmatibus mammis imponi utiliter potest; aut imponatur sequens emplastrum.

℥. Mellis virginei ʒ i. styracis calamitæ, myrrhæ, thuris an. ʒ s.

Fellis bubuli ʒ ii. medullæ panis q. s. fiat emplastrum.

Ad arcendam inflammationem earum prodest oleo rosaceo inungere.

5. Mammarum tumor mollis quid, quæ ejus cause, quæ signa, & quæ ejus curatio?

Ὀἰδῆμα est nomen generale tumorum in quacunque corporis parte, qui à materia frigida, vel pituita, vel statulentis spiritibus (tumores tamen statulenti quædam dicuntur non cedemata) excitantur. Est autem cedema latus sive mollis tumor doloris ut plurimum expers, qui in tibiis & mammis frequenter oboritur.

Causæ Oedematis in mammis sunt aut pituitosi humores, aut statuosi spiritus in eis collecti.

Signa

Lac coagulatum dissolventia.

Topica vadeo lac dissolventia.

Idem præstat decoctum Chelidonia majoris impossitum.

Cataplasma ad tumorem mammillarum.

Alii sterus Caprillum oxymelle feliciter applicant, nonnulli muria utuntur.

Mammarum tumor latus quid.

Signa.

Signa Oedematis sunt: Tumor est laxus, & doloris aut exigui, aut nullius: color tumoris ad albedinem vergit; & si causam habeat pituitosum humorem, digito impressus vestigium relinquit ac foveam: Si vero à flatibus originem ducat, eadem sunt signa, nisi quod vestigium digiti non relinquit, sed renitatur. Prognosticum Oedematis est, quod raro terminetur in suppurationem, sed aut resolvitur, aut evaporat, aut commutatur in nodos scirrhosos.

Prognosticum.

Curatio.

Phlegmago-goma-teria evacuanda.

Curatio Oedematis sive laxi tumoris in mammis, perficitur pituitæ præparatione ac subductione, aut flatulentorum spirituum resolutione & evaporatione. Primum itaque pituita digerenda & concoquenda est decoctis, ac potissimum oxymelite, aliisque syrupis convenientibus, ac tandem concocta expurganda & subducenda erunt diaphanicon, aliisque remediorum generibus, subducendæ pituitæ dicatis, quæ supra in tabellis medicamentorum & curatione Cephalalgæ ex pituita ortæ commemorata sunt. Post purgatam pituitam ad topica remedia, quæ tumorem resolvere & materiam evaporare exiccareque possunt, deveniendum erit: In quem usum plurimum commendatur aqua calida, in qua nonnihil salis natri & aluminis est incoctum, ac cui tantillum aceti sit commixtum, ut gustu non ingrata percipiat, quæ pannis duplicatis exceptis tumentibus mammis circumponi debet. Vel si valentius remedium, magisque resolvens ac siccans desideret.

Epithema resoluens & exsiccans, valde discutiens.

Aliud Euporifon.

℞. Aluminis, sulphuris, myrrhæ, salis an. ʒ i.

Quæ tenuissimè pulverata cum q. s. aceti & olei chamæmelini in pulvis formam redigantur, & instar cataplasmatum uberum tumori applicentur.

Qui in præsentem aliud remedium non habent, stercus bubulum recipiant, & cum aceto in cataplasmatum formam redactum calidum, tumentibus mammis imponant: Aut

Hoc antidynon est emolliens

℞. Micæ panis ʒ ii. macerato in aceto & coque ad pulvis similitudinem, deinde admisce pul. rad. Althææ,

sem. lin. an. ʒ i. Myrrhæ, Croci an. ʒ ii. Vitellorum ovorum n. ii.

Fiat cataplasma, quod tumentibus mammis calidum imponatur.

Porro si Oedema mammarum in nodos dueros sive apostema degenerat, emplastra emollientia, quale est Diachylon vocatum nodulis applicandum erit. Aut consiciendum tale cataplasma.

℞. Micæ panis ʒ i. pul. sem. lini. florum chamæmeli, rad. Althææ, sem. fenugræci an. ʒ s. Olei Anethini & chamæmelini an. q. s.

Fiat cataplasma, quod calidum apostemati indurato vel nodo, in die ter imponatur; & ubi nodus mollior est redditus, aut chirurgica operatione ferro aperiatur, aut sequenti caustico remedio.

℞. Stercoris columbini ʒ ii. fermenti acerrimi ʒ i. pul. Cantharidum ʒ s. cum succo flammulæ formetur massula, cujus ʒ i. plus minusve pro ratione loci tumentis, nodo imponatur.

Rumpit enim in paucis horis tumores cunque generis.

Id tamen observandum est, ut, si queat fieri, apertio sive ferro, sive medicamento, fiat in decliviori loco mammarum.

Si vero causa Oedematis flatulentis spiritibus in mammarum cavernis collecti existant, ea sunt adhibenda, quæ poros cutis aperiendi & meatus dilatandi spiritusque flatulentos evocandi, per vaporemque dissipandi vim possident. In hunc usum commendatur vinum acidum calefactum, aut lixivium ex cinere sarmentorum sive vitium, aut ex cinere sagi confectum, duplicatis pannis exceptum, & tumentibus mammis impositum. Idem præstat & lana succida, sive æspum vocatum medicamentum, aut sapo Gallicus, sive niger, instar cataplasmatum impositus. Nonnunquam tumor flatulentus mammarum, solo haustu sudorifico assumpto evanescit, qui ita confici potest.

℞. Theriacæ Andromachi ʒ i. s. quæ Sudorificum haustulo aquæ scordii commisce-

& resoluens.

Ad scirrhosos mammarum tumores remedia. Cataplasma.

Causticum ad aperiendum apostema in mammis.

Vbi aperiendum apostema.

Ad flatulentum tumorem remedia.

Vinum. Lixivium.

Sudorificum.

*Ejus loco
sal absin-
thii vel
Cardui be-
nedicti
cum aqua
convenien-
ti poterit
exhiberi.
Scirrhus
mamma-
rum.*

Causa.

Signa.

Curatio.

*Vena se-
ctio.*

*Vitus ra-
tio.*

miscetur, quo assumpto sudet æger lecto bene coopertus.

6. *Mammæ durus tumor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandus?*

Scirrhus, Scirrhus est tumor durus sive durum apostema, & renitens in mammillis, cujus ratio si negligentius tractetur, ut plurimum in inflammationem & cancerum terminatur.

Causæ *αἰτιαι* sunt sanguis sæculentus & melancholicus, aut lac in uberibus concretum ac corruptum, menses in utero retenti ad mammas profluentes. *Ποικίλαι* sunt, prava victus ratio, ex qua sanguis sæculentus generatur, repentinæ & vehementeſ mammæ refrigerationes per imposita remedia in earum inflammationibus.

Signa tumoris duri sive scirrhi sunt, durities & renitentia mammæ, & partis tumefcentis color cutis lividus sive fuscus, & venæ similiter per mammas sparsæ lividæ turgidæque conspiciuntur.

Curatio scirrhi perficitur venæ sectione, victus ratione, & medicamentorum convenientium applicatione.

In scirrhus itaque mammæ statim in initio, præsertim ubi menses ad mammas fluunt, faciendæ est sub talo pedis in interna parte venæ sectio. Si vero totum corpus melancholico sanguine redundet, secunda erit vena brachii sinistri inferior, quæ splenetica nominatur.

Vitus ratio debet esse moderatè calida, & ad humiditatem declinans. Utatur itaque æger alimentis boni succi, id est, purum sanguinem generantibus, veluti sunt ova forbilia, carnes caponum & pullorum galinaceorum, perdicum, vitulorum & capreolorum juvenum. Ex oleribus conveniunt spinachia, borrago & lupulorum Asparagi. Potus sit vinum tenue & odoratum, aut cerevisia optime cocta, in qua macerata sint Cinamomum & Asplenion. Virent vero omnia ex quibus melancholicus sanguis generatur, veluti sunt carnes, piscesque sale conditi, sumove indurati, item caro le-

porum, caro anserina, petasiones & vetus caseus. Vitanda sunt & animi pathemata, maxime autem, ira, mœsticia & solitudo.

His omnibus rite ordinatis ad medicamenta deveniendum erit. Primum itaque exhibeatur ægrotanti ʒ i. s. Theriacæ haustu aquæ scordii, & in lecto probè obtectus patiens sudet ad sesquihoram. Deinde melancholici humores convenientibus remediis extenuentur, concoquanturque primum: hujusmodi autem remedia sunt, decoctum polypodii, fumaræ, lupuli, epithymi, cum syrupis è fumo terræ, & epithymo commixtum, aliisque remediis supra in curatione melancholicæ infantiæ, & in tabellis medicamentorum melancholicos humores decoquentium enumeratis. Post concocti vitiosi humores ex corpore propellantur vel infusione Myrabolanorum Indorum, aut Diæsenæ, aut Diacatholico similibusque remediis, quorum copiam in locis præcitatis descripsimus.

Purgatis vitiosis humoribus ad topica remedia deveniendum erit. Quibus itaque in mammillis scirrhus est obortus, remedia topica cautè & circumspèctè imponenda erunt, ne videlicet resolutis quibusdam humiditatis partibus reliquæ in lapideam duritiem redigantur, vel ne nimium emolliendo putrescant in mammis & in cancerum terminentur. Ergo præstat alternatim, nunc emollientia, nunc resolventia, & nunc digerentia, ut quæ illas ipsas facultates habent, simul conjunctas & compositas mammis applicare, talia autem sunt subsequentiæ cataplasmata & emplastra, ut

℥. Bdellii, Ammoniæ, Galbanæ ʒ s. Emplastrum ad scirrhosos tumores. resolvantur in aceto, & percolentur instar pulvis: quibus admisceantur ʒ ii. ol. liliorum alborum. Mucaginis ex sem. fenugræci & lini factæ ʒ ii. His omnibus commixtis admisceatur ceræ liquefactæ ʒ i. & simul coagulata cogantur in unam massam, quæ per linteam instar emplastri extendatur, & tumori mammæ applicetur. Vel

℥. Rad.

Remedia.

*Haustus
sudorificus*

*Conco-
quentia
melancho-
liam.*

*Melana-
loga.*

Topica.

*Quid in
curatione
scirrhi ob-
servan-
dum.*

Cataplasma emolliens.

℞. Rad. Althææ, malvæ arborescens sive hortulanæ an. ℥ iiii. contundantur simul, eisque adjiciatur pinguedinis asinerinæ q. s. fiat cataplasma, quod calidum applicetur.

Tumor quando aperiendus.

Porro si apostema sive tumor laxior & mollior evadat, aut ferro, aut caustico remedio Chirurgica operatione aperiatur, & pure exempto emplastro diachylo vocato consolidetur.

7. *Inflammatio mamillarum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Mamillarum phlegmons quid.

Φλεγμὴ τῶν μαστῶν, Inflammatio mamillarum est fervens ac dolorifica mammarum affectio, ut plurimum duros tumores antecedens & subsequens.

Causa.

Causæ inflammationis mammarum αἰτιολογίαι sunt, aut sanguinis ferventioris in mammis collectio, quod magna ex parte contingit post mensium suppressionem, aut lactis in ipsis mammis concretio. Προκαταρκτικαὶ causæ sunt aut violentus ictus aut vulnus, inconveniensque sectio mammarum.

Signa.

Signa sunt, tumor vehementer renitens ardensque & dolor acerbus. Causarum signa tactu, visuque, & ex relatione patientis dignosci possunt.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate varianda erit.

Si menses suppressi.

Si itaque menses sunt suppressi mamillarum inflammatione laborantibus, iis per venæ sectionem, & pharmacorum convenientium usurpationem infra in uteri morbis præscribendorum, menses subducendi erunt.

Si lac in mammis concretum.

Si vero ex lactis concretionem in mammis inflammatio oboriatur, ejus curationem paulo ante tradidimus. At si ex copioso sanguine ad mammas affluente phlegmone sit excitata, tum statim venâ vel epatica vel mediana brachii ejusdem secanda erit.

Postea fervor sanguinis remediis supra in tabellis medicamentorum sanguinem purgantium enumeratis, aut hisce sequentibus

mitigandus, refrigerandus & purificandus erit.

℞. Syr. Violarum, Nymphææ, Acetosiatis citri an. ℥ ii.

Aq. stillat. Cichorææ, Nymphææ, Violarum, Misc. an. ℥ iiii.

Fiat potio ex qua bibat ægra mane ac vesperti ℥ iiii. tepefactas. Aut

℞. 4. Sem. frigidorum majorum an. Emulso.

℥ s. Contundantur minutissimè, eisque admisceantur saccari candi ℥ ii. Aq. Cichorææ ℥ ii. Quæ simul probè contusa & agitata coeantur & exprimantur, fiat liquor lactis speciem referens, è quo ægra mane ac vesperti ℥ v. summat. Tandem sanguinis purgandi purgantia.

℞. Cassiæ recenter evulsæ ℥ i. s. conspergatur cum saccaro, fiat bolus, qui una hora aut cibum devoretur. Aut

℞. Syr. rosati soluti ℥ ii. Aquæ Cichorææ ℥ iiii.

Misceantur, fiat haustus, qui in aurora tepidus ebibatur.

Quantum ad topica remedia attinet, quia φλεγμὴ molestissimos & urentes dolores in mammis excitat, statim ad doloris mitigationem omnis cura & sollicitudo convertenda erit. Cavendum tamen ne inflammationis mammis vehementer astringentia & frigida medicamenta apponantur: talia enim mammas in lapideam duriciem coeunt. Debent itaque esse remedia, quæ partim refrigerando, partim resolvendo ac digerendo dolores mitigent, qualia hæc subsequuntur.

℞. Ol. rosacei ℥ ii. Albuminum ovorum n. ii. Aq. rosacæ ℥ i.

Aceti rosacei ℥ s. convascentur ac miscantur, & tepida duplicatis linteolis excepta mammis inflammatis circumponantur.

His si dolor fervorque mammarum non mitigetur, ad Narcotica deveniendum erit: Ut

℞. In æstate quidem folia hyoschyami, Narco-

hyeme vero radices ejus q. s. Quas sub

Pp

cine-

Tulapium sanguinem refrigerans.

Purgantia.

Bolus.

Haustus lenitivus.

Topica.

Cautela diligenter observanda in omni phlegmone.

Epithema refrigerans & dolorem sedans.

cineribus calidis coquito & cum q. s. recentis axungie porcine contunde, & in cataplasmatibus formam redigito, quod per linteum extensum, mammis imposito. Sublato dolore iterum digerentia & discussoria medicamenta sunt applicanda, veluti sunt.

Epithema digerens & refrigerans.

Aliud resoluens & discutiens.

℥. Aceti rosacei, aq. stillat. solani an. ℥ s. commisceantur, ac tepida linteolis excepta mammis applicentur. Aut

℥. Mucaginis, sem. lini, fœnugræci, & flor. chamæmeli an. ℥ s. Macerentur in q. s. aquæ solani. Deinde decoquantur leniter, atque exprimantur per linteolum, hujus liquoris lenti ℥. ℥ i. eique admisce ol. rosacei ℥ i. Aceti rosacei ℥ i. fiat epithema, quod linteolis duplicatis exceptum tepidum mammis imponatur. Aut

Cataplasma resoluens & dolorem sedans.

℥. Pul. sem. lini, fœnugræci, rad. Althææ an. ℥ i.

Flor. chamæmeli, meliloti, Anethi an. ℥ s.

Coquantur simul cum q. s. aq. in pulvis consistentiam, quibus admisce ol. rosacei, chamæmelini, anethini an. ℥ i. Aceti rosacei ℥ s. fiat cataplasma, quod tepidum mammis imponatur. Aut

Aliud emolliens & digerens.

℥. Medullæ panis siliginei ℥ s. concoquito in lacte dulci ad cataplasmatibus formam, cui admisce Croci ℥ i. Myrrhæ ℥ ii. luteorum ovorum n. ii. fiat cataplasma, quod tepidum inflammatis mammis imposito.

Apostema quando aperiendum.

Porro si tumor mammarum in abscessum terminetur, aut si inflammatio ex ulcere sit orta, tum chirurgica operatione utendum erit, & ipsum apostema aut ferro, aut medicamentis causticis aperiendum, à pure expurgandum, & vulnus consolidandum erit.

8. *Cancer mammarum quid, quæ ejus causæ, quæ signa, & quibus remediis mitigandus?*

Cancer quid.

Κάρκινος ἢ καρκίνωμα ἢ καρκίν, Cancer mammillarum, est tumor rotundus, in ambitu turgidus, colore livescens aut nigricans, qui ubi exulceratur, aspectu teret,

cum dolore punctivo, & acri fervore plurimis partibus, adenosis potissimum, ut in collo, sede, palato, oboriri solet. Omnium tamen frequentissimè mammas foeminarum propter laxitatem infestat. Sensim autem hic tumor incrementum capit: ac primum pisi magnitudinem, deinde fabæ, tandem juglandis & postremo ovi magnitudinem adæquat. Nomen habet à cancris. Cancris rotundi, quos *τῆσεν κρέβα* vocant, sunt, à quibus propter similitudinem nomen hic affectus trahit fluviatilibus: quemadmodum enim hi in utraque parte plures pedes à corpore extendunt: ita tumor hic circum circa ex se venas, livido sanguine turgidas protendit.

In quibus partibus potissimum oritur.

Vnde nominetur.

Causæ *αἰτιολογία* Carciomatum sunt causa. melancholici, hique adusti humores, cum sanguine ad mammas defluentes; aut sanguis menstruus in melancholicis foeminarum corporibus corruptus in atram bilem conversus & ad mammas defluens: *αἰτιολογία* sunt, prava victus ratio melancholicum sanguinem generans, aut venenati alicujus animalculi aut herbæ mammis applicatio.

Signa cancri magna ex parte in descriptione ejus enumerata sunt. Nondum exulceratus cancer aspicientibus quidem molliis, tangentibus autem durissimus sentitur, colore lividus, ad nigredinem vergens cum pungente & urente dolore, quasi acu aut cultro ignito mammæ pungerentur. Non diu autem tumor hic intra cutem delitescit, sed cutem exulcerans erumpit, mammasque in profundum suffodit, & saniem venenosam & odore abominandam profundit.

Signa.

Curatio cancri est difficillima, & fere impossibilis. Succus enim virulentus & melancholicus, ex quo generatur, tenax & crassus est, ita ut nec repelli, nec discui, instar aliorum tumorum possit. Mitiora medicamenta planè contemnit, valentioribus autem magis irritatur & exacerbatur: unde rectissimè dicit Hippocrat. 6. Aph. 38. Cancros occultos, id est, in occultis partibus existentes, & non exulceratos melius est dicitur.

Curatio.

Noli mō tangere hic affectus à quibusdam eo de causa dicitur.

non

non curare; curati enim citius interimunt. Et Galenus inquit, omnes qui canculos vel sectione vel uisione curare tentarunt, magis irritarunt, & homines ad interitum deduxerunt. Nisi enim tota radix, id est, omnes venulae circa cancrum sanguine infecto turgentes radicitus excindantur, frustra sectio tentatur. Paulo post enim ex una guttula sanguinis venenati in mammis relictæ, cancer rursus suppullulat. In curatione cancri mitigatio potius & in eodem statu conservatio, quam vera sanatio expectanda est, dolorem enim mitigando, & ne ulterius serpat cancer præservando in multis annos misera & molesta vita patientis produci potest.

Qualis curatio in cancro in-
stituenda.

Præservatio ne la-
tus serpat
nubis per-
iciatur.

Vena se-
ctio.

Ne autem latius serpat malum, præcave-
ri potest Venæ sectione, victus ratione, &
melancholici humoris crebra evacuatione,
topicorumque remediorum applicatione. Si
itaque corporis constitutio melancholica ex-
sistat, & ætas viresque patientis non prohi-
beant, vena splenetica seu interna cubiti si-
nistri secetur, idque bis terve in anno.

Ubi autem menses sunt suppressi, & mu-
lier nondum attigit annum 50. Vena inter-
na pedis sub talo frequenter est aperienda,
& menses remediis infra de mensium reten-
torum curatione commemorandis provo-
candi erunt.

Victus ra-
tio.

In victus ratione alimenta offerantur pu-
rum sanguinem generantia, veluti sunt cre-
mor hordei, ova sorbilia, pisces squamati,
pulli gallinacei, aviculæ, caro vitulina & si-
milis. E contra vitentur omnia ex quibus
melancholicus sanguis generari possit, ve-
luti sunt carnes piscesque sale conditi, fumo-
ve durati, item caro leporina, anserina, cer-
vina, caseus, fabæ & similia.

Post venæ sectionem præparetur atque
evacuatur atra bilis in curatione infantiæ
melancholicæ commemoratis remediis: aut
concoquatur humor melancholicus sequen-
ti decocto.

Decoctum
præparans
melanchol-
iam.

℞. Polipodii ʒ i. Veratri nigri ʒ s. Sem.
anisi ʒ s. Cort. Capparum ʒ ii.
Asplenni, Veronicæ, Bethonicæ,
Epithymi an. M. s. Contusa & con-

cisa imponantur Cantharo stan-
neo, & simul admisceantur con-
ser. fumaricæ & borraginis an. ʒ i.
Syr. de fumo terræ ʒ iii. his omni-
bus adfundantur lb iiii. feri la-
ctis, & deinde oblinatur junctura
canthari pasta farinacea, ne quid
liquoris evaporet, & imponatur in
ahenum aqua repletum, & simul
concoquantur ad xi. horas, deinde
refrigerata colentur. Hujus portio-
nis bibat æger per octiduum mane
ac vesperi ʒ v. qua exhausta, uno
& altero tandem die interposito,
melancholicus humor sequenti in-
fusione evacuetur ac subducatur.

Tartaro
vitriolato
Chymici
idem præ-
stant cum
vino exhi-
bito.

℞. Myrabanorum Citrinorum, Che-
bulorum, Indorum an. ʒ i. s. Cra-
siuscule contusa macerentur per

Hauftus
menalago-
gus.

24. horas in ʒ viii. aquæ fuma-
ricæ, altero die admisceantur thy-
mi, epithymi, folliculorum senæ
an. ʒ i. Rad. Glycyrrhizæ ʒ i. s.
sem. citri ʒ i. Caryophyllorum
ʒ s. Rad. polypodii ʒ s. Simul
commixta ebulliant, donec liquo-
ris ʒ iii. evaporent & absuman-
tur, deinde fortiter expressa colen-
tur, & colatus liquor tepidus in
aurora vi. horis ante cibi assump-
tionem ægroto propinetur. Te-
nuioris fortunæ homines loco hu-
jus liquoris commodè uti possunt
ʒ i. pill. de lapide lasuli, aut de fu-
mo terræ: aut ʒ s. extractionis
hellebori nigri.

Pillula.

Extr. hel-
lebori ni-
gri hic uti-
liss.

Egregiè quoque atram bilem expellit hic
ra Ruffi à Galeno descripta. Præstabit au-
tem singulis mensibus lentum & contuma-
cem humorem melancholicum præscriptis
remediis præparare & evacuare. Una enim
vice subtrahi minime possunt.

Corporis purgatione peracta ad mitiga-
toria blandaque remedia topica, quæ cancri
sævitiæ leniunt, descendendum erit, quo-
rum ope vita ægrotantium sine magna mor-
bi exacerbatione in plurimos annos produ-
ci potest, & cavendum, ne temere sectio-

*Anodyna
in Cancro
leniendo
adhibenda.*

*Linimen-
tum.*

*Crollius
empl. suum
sticticum
& lapidem
medica-
mentosum
in hunc u-
sum com-
mendat.*

*Aliud lini-
mentum.*

*Chymici
saccharo
Saturni
hujus loco
feliciter
utuntur.*

*Habet &
Crollius a-
liud reme-
dium ad
cancrum
mortifi-
candum,
quod sper-
niolo com-
positum
vocat.*

*Papilla-
rum scissu-
ra.*

Causa.

nem aut uisionem adhibeamus. Sunt autem laudatissima & experientia comprobata ad cancri scitiam mitigandam, subsequencia remedia.

℞. Succus plantaginis, Solani, Semper vi-
vi *Hauszlock* an. ʒ i. pul. plum-
bi usti, & cum aqua rosacea sæpius
abluti ʒ i. s.

Thuris minutissimè contriti ʒ s. Quæ om-
nia in mortariolo plumbeo, cum pistillo
similiter plumbeo diutissime subigantur, do-
nec nigredinem & crassitiem linimenti con-
sequantur. Hoc linimentum duplicatis lin-
teolis exceptum, cancro imponatur, & la-
na molli, eodem linimento imbuta, conte-
gatur. Aut

℞. Ol. rosæti lb s. quod in mortario
plumbeo, ad solem subigatur at-
que agitur donec nigrescat & in-
crassescat, cui tandem admiscean-
tur pul. tenuissimi lithargyrii, ce-
russæ in aq. solatri elotæ, & rursus
exiccatae an. ʒ iiii. fiat linimen-
tum, quo utendum est, ut præ-
scripto.

Aut inungito cancrum oleo Sa-
turni, hoc est, plumbi chymica arte ex plum-
bo producto. Est enim vis plumbi mirifica
in mitigandis & coercendis cancri exacerba-
tionibus. Tenuioris fortunæ homines solo
succo solani, aut ejus stillat. aqua, & plum-
bo usto, ac eloto commodissime uti pos-
sunt.

9. *Scissura Papillarum in Mammis quid, quæ
ejus causa, quæ signa, & quomodo
curanda?*

Παράδες & Σηλῶν, scissuræ papillarum:
ἤλας, papillæ sunt tubercula in medio mam-
marum, per quæ infantes lac exugunt, te-
nerrimæ & mollissimæ substantiæ nervæ,
labiis infantum persimiles; unde ex suc-
tione matres ut plurimum titillationem ac vo-
luptatem percipiunt; hæ, ut labia, in puer-
peris præsertim scinduntur, exasperantur, &
acerbos inferunt matribus dolores.

Causa *αἰσχυρμένη* est fervor & acrimo-
nia lactis: *αἰσχυρμένη* est fortis infantis
exsuctio, & cutis subilitas.

Signa sunt manifesta: Sentiunt enim in-
ter sugendum matres exacerbos dolores, &
infantibus sugentibus osculum sanguinolentum redditur.

Curatio perficitur infantem ablactando, &
acrimoniam lactis convenienti victus ra-
tione alterando, & topica remedia exulce-
ratis papillis imponendo.

Sunt autem hæc topica sequentia à no-
bis in persanandis papillis scissis experientia
comprobata.

℞. Viscidum liquorem quem vernisum
Derris vocant, qui ex oleo lini & succino
liquido confici solet, & linteolo inungatur,
papillisque scissis applicetur, ac superimpo-
natur aliquod emplastrum tenax, ne à papil-
lis delabatur, & per triduum consolidat scis-
sas papillas.

Porro si calor adest & pruritus, scissis pa-
pillis illinito ol. rosarum pauxillum, in quo
decoctum est momentum mastice aut aca-
tiæ. Aut imponatur mucilago ex tragacan-
tho & aq. rosacea confecta.

Aut mucago ex seminibus cytoniorum &
succo plantaginis aut Polygonii.

10. *Mammæ indecens extuberantia
quid, quæ ejus causa, & quomodo
curanda?*

In *ἀκμή* solent puellulis, sicuti & mu-
lierulis lactationis tempore, mammæ ultra
modum excrecere, quod etsi non sit mor-
bus, tamen deformitatem adfert in nubili
præsertim ætate, sicut mammarum medio-
cri protuberantia ornamento esse solet.

Causa *αἰσχυρμένη* succrescentiæ mamma-
rum est benigni sanguinis ad mammas de-
fluentis copia: *αἰσχυρμένη* est frequens
contrectatio mammarum ab amicis. Inter-
dum etiam naturale est, ut in Frisia Occiden-
tali seu Waterlandia, ubi & parvulis puellis
majorem in modum protuberant mamillæ,
quæ naturalis dispositio mutari vix potest.

Signa manifesta & palpabilia sunt.

Curatio, si mammæ incrementum à co-
pia alimenti accidit, sanguis primum per
venæ saphenæ incisionem detrahendus erit,
& tenuis victus ratio præscribenda. Si ex
frequenti contrectatione intumescant mam-
mæ,

Signa.

Curatio.

*Topica ex-
perientia
probata.*

*Folia quo-
que sarfa-
ra & mo-
nophylli in
aq. mace-
rata & im-
posita val-
de juvant.*

*Mamma-
rum protu-
berantia.*

Causa.

Signa.

Curatio.

Topica. mæ, curabitur abſtinentia à contrectatione. Topica remedia, quæ mammas excreſcere prohibent, hæc ſequentia præcipua ſunt.

Cataplaſma. ℞. Argillæ puræ & tenacis q. s. & commiſce cum aceto acti, & inſtar cataplaſmatis calidam mammis mane ac veſperi applicato. Aut

Epithema. ℞. Gallarum, Balauſtiorum an. ʒ s. Boli Armenii ʒ ii. Camphoræ ʒ i. contuſa decoquantur in aq. & aceti tb ii. liquor decoctus pannis exceptus ac tepidus mammis applicetur. Aut

Aliud Epithema. ℞. Aq. Roſacæ tb i. aceti roſacei ʒ ii. lithargyri tenuiſſimè puluerati ʒ i. s. Camphoræ ʒ i. ebulliant leniter, & duplicatis linteolis excepta tepida mammis applicentur.

Cartilagini, ſive malo granato, in poſtica vero corporis parte alligata eſt duodecimæ vertebræ dorſi, per latera vero adnata eſt coſtis mendoſis. Eſt autem hæc membrana principaliffimum reſpirationis organum, & expulſionis excrementorum alvi.

Afficitur autem hæc pars aut tumore frigido, aut tumore calido, ſeu in inflammatione, aut exulceratione, aut perforatione.

Cauſæ tumorum inflammationis, aut exulcerationis diaphragmatis *cauſa.* *αἰτίαι τῆς φλεγμονῆς* ſunt vitioſi humores in illud conſuentes: *αἰτίαι τῆς ἐκτενῆς* tumorum ſunt, iſtus violenti, vociferatio aut reſpiratio vehementior; perforationis vero eſt vulnus inflitum.

Signa tumentis inflammati & exulcerati diaphragmatis ſunt difficultas reſpirationis, præſertim ubi quis corpus commouet, aut fæces extrudere conatur. In inflammatione & exulceratione diaphragmatis adeſt febris, & plerumque delirium, adeſt tuſſis & purulenta per tuſſim excretio. Perforati diaphragmatis ſignum eſt ipſa mors. Perforato enim diaphragmate ſtatim ceſſat reſpiratio, & ſubito moriuntur.

Curatio perficienda eſt convenienti victus ratione, & medicamentorum applicatione, ut, ſi tumori adſit inflammatio, utatur æger refrigerantibus alimentis, qualia ſunt hordei cremor, pruna, ova ſorbilia, piſces ſaxatiles, juſcula pullorum, & ſimilia. Si vero tumori frigiditas adſit, veſcatur patiens caleſcientibus alimentis, & cinamomi zinzibere, maceque conditis cibariis, & juſculis ex vino & hydromelle paratis, vinoque pro potu utatur.

Quantum ad remedia attinet, in tumore inflammato incidantur & præparentur humores calidi ſyrupo acetoliſitis citri, roſarum, violarum, nymphææ, &c. cum aquis cichorææ & acetoliæ. Non incommode quoque in calidis tumoribus, & ulcere diaphragmatis vena jecoraria ſecari poteſt. Purgans quoque remedium, velut eſt inſuſio Rhabbari cum elect. lenitivo, exhiberi poteſt, cujus formulas in pleriſque calidis

Pp. 3. mor-

SECTIO IV. DE DIAPHRAGMATIS AFFECTIBUS.

1. Suntne plures partes in Thorace, quæ peculiaribus morbis affici queant?

De aſophagi affectionibus. U Nica gula per thoracem à faucibus incipiens, per diaphragma tranſiens, in ventriculum implantatur. Sed quia gula pars eſt ventriculi, ejusdemque ſubſtantiæ, ejus affectiones in morbis partium infimi ventris declarabimus.

Quo loco agatur. Inferius autem thoracem claudit, & ab infimo ventre ſeparat diaphragma; eſt præcipuum reſpirationis organum, quare de ejus affectionibus hoc loco quoque agendum.

2. Septum tranſverſum quid, quibus morbis afficitur, quæ eorum cauſa & ſigna, & qua ratione curandi?

Diaphragma quid, quibus partibus conſtella- tur. Διάφραγμα, ſeptum tranſverſum eſt nervoſa, craſſa, & muſculoſa membrana, quæ interſepit, & inſtar tabulati thoracem ab infimo ventre tranſverſum dividit, quæ in anteriore corporis parte adnata eſt ἐν ποσὶ τοῦ

Ejus uſus.

Affectiones diaphragmatis præcipua.

Cauſa.

Signa.

Curatio.

Dietæ in phlegmone.

Dietæ in frigido tumore.

Remedia inflammationis. Lulapium;

Vena ſectio. Purgans.

*Remedia
frigidi tu-
moru.
Digesti-
vum.
Evacuan-
tia.*

morbis supra præscriptis. In frigidis tumorbis utatur æger pro humorum præparatione syr. de radicibus, è stachade & è mentha cum aq. cardui benedicti, abinthii, scordii & similibus. Et si corpus pituitosis excrementis est refertum, vel clysteribus, vel diaphænico, aliisque remediis pituitam educantibus, & supra in pituitosis morbis commemoratis, expurgandum erit; & ita purgato corpore, statim ad topica remedia descendendum erit, inter quæ sequentes sacculi, cataplasmata & inunctiones, utilissima sunt.

Topica.

In frigido tumore diaphragmatis utendum nobis erit inunctionibus calefacientibus, veluti est sequens linimentum.

*Linimen-
tum in tu-
more frigi-
do.*

℥. Ol. chamæmelini, anethini, rutæ an. 3 ii. Cera pauxillum, fiat linimentum, cui admisceatur aqua juniperi 3 s. quo præcordia, latera, & dorsum circa 12. vertebra bis in die inungatur: tandem imponatur cincturæ sequens sacculus.

Sacculus.

℥. Florum chamæmeli, meliloti, anethi, scordii, betonicæ, majoranæ an. M. i.
Rad. Althææ, brancæ ursinæ, malvæ an. 3 i.

Sem. lini, fænugræci an. 3 s. Conci-
dantur, & semina ac radices contundantur
crassiuscule, & simul mixta in sacculum ob-
longum consuuntur, qui in q. s. aquæ &
aceti æ. p. ebulliant & expressus calidusque
cincturæ alligetur. Vel ex iisdem herbis ra-
dicibus ac feminibus tenuissimè pulveratis
cum aceti & aquæ p. æ. concoquantur in
formam pultis, cui admisceantur ol. cha-
mæmelini 3 ii. fiat cataplasma, quod per
linteum duplicatum extendatur, & calidum
juncturæ alligetur. *Catapla-
sma.*

Porro in calido tumore, ut supra dictum
est, inungatur diaphragmatis regio olei ro-
facei & olei nymphææ an. 3 s. simul mixtis
ac calefactis, deinde applicetur sequens
sacculus. *In calido
tumore li-
nimen-
tum.*

℥. Rad. Althææ, malvæ an. 3. ii. Sem. *Sacculus.*
lini, fænugræci 3 i.

Flor. Chamæmeli, rosarum, violarum
an. M. ii. Ex iis contusis fiat sacculus, qui
decoquatur in q. s. aquæ & aceti expressus
cincturæ alligetur: aut ex iisdem herbis,
rad. & sem. pulveratis fiat cataplasma cum
q. s. aceti & aquæ simul commixtis, cui ad-
misceatur & ol. rosacei 3 i. & repidum ap-
plicetur, &c. *Catapla-
sma.*



PRACTICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER QUARTUS.

1. Venter inferior quid, & quæ partes in eo continentur?



OTUM corpus humanum in tres magnas capacitates, quas Anatomici ventres, latè patentis significationis, vocant, divisum est. In calvam sive caput, thoracem & infimum ventrem, qui propriè Græcis *παρὰ τὴν στήθεα*, nobis venter dicitur, cujus exterior cutis cum subiecto adipe & musculis *ἐν τῇ κοιλίᾳ*, Latinis abdomen nominatur. Est autem inferior venter tota illa capacitas, quæ sub diaphragmate secundum longitudinem usque ad pubem protenditur; secundum latitudinem vero, quicquid inter umbilicum & lumborum vertebrae osque sacrum comprehenditur. Estque hæc capacitas in cœconomia corporis humani tanquam culina in aula regia. Continentur autem in infimo ventre subsequentes nutritioni & generationi servientes partes, gula cujus inferior pars ventriculo inplantatur sub diaphragmate, quæ pars orificium ventriculi seu stomachus propriè nominatur, ventriculus, intestina, mesenterium, venæ mesaraicæ, epas, vesicula, bilis, lien, renes, vesica urinaria, vasa spermatica, testes, virga, anus, venæ hæmorrhoides. In mulieribus vero peculiare sunt uterus & vulva. Externæ partes infimi ventris sunt abdomen & umbilicus.

SECTIO I.

DE OESOPHAGI AFFECTIBUS.

1. Gula quid, quæ ejus morbi, ex quibus causis oriuntur, per quæ signa dignoscuntur, & quibus rationibus curantur?

OΙΣΟΦΑΓΟΣ, gula, est canalis seu fistula ab ore per thoracem in ventriculum

protensa & implantata, per quam cibus potusque in ventriculum transit, plurimis rectis fibris & transversis conspersa. Esti gula rarissime morbis afficiatur, vidimus tamen eam in quibusdam fuisse affectam devorandi impotentia.

Causa *ἀσθενείαν* devorandi impotentiae seu difficultatis, aut refrigeratio rectarum fibrarum in gula, aut inflammatio gulæ: aut tuberculum aliqua in parte gulæ obortum: *ἀσθενείαν* sunt, frigidissimorum liquorum continua ingestio, lentus & crassus humor hærens in ipsa gula, & aer vehementer calidus aut frigidus per gulam illabens.

Signa refrigerantium villorum est universæ potestatis devorandi amissio: calefactorum vel inflammatorum signa sunt sitis, febris & deglutitio difficilis cum dolore. Signa tumorum in gula est anxietas & dolor in deglutendo. Notandum autem quod omnis dolor gulæ sive Oesophagi ad spinam dorsii perferitur. Ei enim gula membranosæ fibræ connexa & adnata est. Quare topica remedia in gulæ affectionibus non antice corporis parti, sed dorsii spinæ sunt applicanda.

Curatio pro diversitate causarum varianda erit. Si itaque ex refrigeratione fibrarum in gula prorsus extincta est devorandi deglutientique facultas, & tanquam paralytica, omni motu sit gula privata, frustra internis remediis curatio tentabitur, cum æger nec potum nec cibum devorare queat, ut fame sitique enecari cogatur, tum pro victus ratione adhibenda sunt enemata seu clysteres per anum in intestina infundendi. In quem usum conveniunt juscula carniū recentium, lac amygdalinum, cremor pisti-

næ,

*Clysters
alimenta-
rii.*

*Liquores
calefacien-
tes gulam.*

*Linimen-
tum pro
inunctione
spinae dorsi.
Si tenaces
humores
gutturii
adhæreant
ut in mor-
bis calidi-
bus sepe fit,
quomodo
curandi a-
gri.*

Pillula.

*Electua-
rium mol-
le.*

Aq. cina-

næ, & ova recentia cum quibusdam jusculis commixta, quæ quotidie bis loco prandii ac cænæ infundenda sunt. Epar enim esuriens ex intestinis per venas melsaraicas hæc alimenta ad se allicit, & in sanguinem convertit, eaque ratione hominis vita diu sustentari potest. Interim foris est tentanda curatio, & fauces quidem subinde irrigandæ sunt liquoribus calefacientibus, eorumque tentanda est subinde deglutitio. Hujus generis sunt aqua cinamomi, aq. juniperi, & vinum Creticum.

Foris autem spina dorsi inter scapulas usque ad vertebrae lumborum quotidie bis inungi debet sequentibus oleis.

℥. Ol. è mattiche, è piperibus an. ʒ s. ol. de euphorbio ʒ i. quibus admisceatur pauxillum aquæ juniperi, & his tepidis prædictus locus inungatur. Ubi vero gula ob nimiam humectationem, & tenacium humorum adhæSIONem difficultate devorandi laborat, interque devorandum adsit nausea, primum subsequenti clystere alvus evacuetur.

℥. Absinthii, centaurei minoris, betonicæ, majoranæ an. M. i. Malvæ, Althææ, an. M. s. Flor. Anethini chamæmeli an. p. i.

Concoquantur concisa, eisque circa finem cocturæ adjiciatur pulpæ colocynthidos ʒ i. quæ post unam ebullitionem rursus eximatur, jusculumque quoque percoleatur, juris colati ℥. ʒ xv. quibus admisce ol. de absinthio ʒ iiii. Hieræ simp. ʒ i. s. falis communis ʒ i. commisceantur, ac tepida recto intestino infundantur, retineanturque per semihoram.

Alio die, si nulla ratione fieri queat, deglutiat æger ʒ i. pill. hieræ simp. instar alephaginarum formatarum, quæ in ol. vitrioli sunt madefactæ.

Porro lambendo assumat æger, idque frequenter, sequentis electuarii, q. avellanæ, sensimque in ore resolutam devorare conetur.

℥. Oxymellis simp. ʒ i. ol. vitrioli ʒ i. zinziber. pulverat. ʒ s.

Commisceantur, fiat electuarium.

Aqua quoque cinamomi, aut aq. juniperi

ri sensim deglutita exiccat & absumit superfluam humiditatem in gula. Foris vero spina ipsa inter scapulas quotidie bis inungatur sequenti linimento.

℥. Ol. Absinthii, Nardini an. ʒ s. ceræ Linimentum pauxillum, resolvantur simul ad ignem, fiat linimentum, quod ex oleo juniperi luatur cum aq. juniperi.

Porro, si deglutendi difficultas ex inflammatione siccitateque gulæ sit oborta, cui febrem adesse & sitim supra diximus, adjuncta febris minime est negligenda, sed omnis cura ad eam tollendam est convertenda. Utatur itaque æger in victus ratione cremore aut aqua hordei pro potu, deinde detrahatur sanguis ex epatica vena dextri humeri, intra corpus autem assumat sequentem potionem.

℥. Aq. Cichoreæ, Acetosæ an. ℥ s. Syr. rosacei, acetositis citri an. ʒ ii. Commisceantur, fiat potio, de qua mane ac vespere ʒ iiii. ebibat æger, ac tandem impuritas biliosa per sequentem haustum subducatur.

℥. Rhabarbari ʒ ii. fol. senæ ʒ s. Ma-

cerentur contusa per noctem in ʒ v. aq. cichoreæ, deinde ebulliant leniter & colentur, colatoque jusculo admisceantur elect. lenitivi ʒ ii. fiat haustus, qui tepidus 6. horis ante prandium ebibatur.

Foris autem inungatur tota spina dorsi & dextrum hypochondrion sequenti linimento.

℥. Ol. rosarum, nymphaeæ an. ʒ s. Ceræ albæ pauxillum, Mucaginis ex sem. cytoniorum cum aceto rosac. confect. ʒ i. misceantur fiat linimentum.

Prodest etiam frequenter lambendo deglutire succum è Ribes, aut deglutiat sequentis electuarii avellanæ quantitas.

℥. Confer. rosarum, violarum an. ʒ s. Cort. citri, pyrorum moscatellinorum.

Concisorum an. ʒ i. Commisceantur cum q. s. Syr. acetositis citri, fiat electuarium.

Porro si tuberculum vel tumor in gula succrescat, & devorationem impediat, id quod

*momi au-
juniperi.*

*Linimen-
tum pro
spina dor-
si.*

*Inflam-
mationis
ex siccita-
tis gulae re-
media.*

*Vena se-
cto.*

*Iulapium
refrige-
rans.*

*Haustus
cholago-
gus.*

*Linimen-
tum.*

*Electua-
rium.*

*Tuberculi
in gula
curatio.*

quod ex dolore certæ partis circa spinam maxime inter deglutendum dignoscitur, tum præter venæ sectionem, & febriculæ curationem, quæ in sequentibus docebitur, locus dolens emollientibus & tuberculum maturantibus linimentis inungendus est, & emplastrum subsequens imponendum: inungantur autem tali linimento.

℞. Ol. è mastiche, nardini an. 3 s.

Ceræ parum, fiat linimentum.

Inuncto loco dolenti imponatur emplastrum diachylon simplex per alutam aut linteolum densum expansum.

Si autem caliditas cum tuberculo & sitis excruciet, sequentibus oleis, ut rosarum & cyton. spina inungatur, & emplastrum refrigerans Galeni imponatur. Intra vero sitis & calor mitigetur syr. violar. & rob. è ribes deglutendo assumptis.

Ubi vero tuberculum sive apostema ruptum fuerit, & æger per vomitum sanguinem purulentum projicit, anxietatemque percipit, tunc utendum est medicamenti ulcus abstergentibus & consolidantibus, veluti sunt subsequencia, ut mel rosatum & hydromeli deglutendo assumptum, mundificant ulcera; dolorem vero leniunt albumina ovorum mollia ac tepida devorata. Consolidat autem syr. myrtillorum aut succus symphyti defecatus, & cum q.s. sacchari ad formam syr. redactus.

Si officulum, vel spina, vel acus infixæ sint gula, qua ratione eximenda eleganter docet Guil. Fabric. Hildenus centur. 1. observat. Chirurgicalar. Obs. 36.

SECTIO II.

DE VENTRICULI MORBIS ET AFFECTIBUS.

1. Ventriculus quid, & quæ ejus præcipuæ partes?

K Oιλία & *σύνχωλον*, generali vocabulo ventriculus à Græcis dicitur. Proprie enim stomachus orificium ventriculi significat. Est autem ventriculus cibi potusque

receptaculum & primæ concoctionis instrumentum, ex duplici membranosa, & robusta tunica contextum, in medio corporis sub diaphragmate collocatum, cujus figura rotunda & paululum oblonga est. Partes ejus notabiles tres sunt, ipsum videlicet corpus ventriculi, & duo ejus orificia sive foramina, quorum superius ubi gula insertitur propriè *σύνχωλον*, id est orificium ventriculi, inferius autem ubi intestina initium sumunt, *πυλωρὸς*, id est janitor nominatur.

2. Stomachus & ventriculus quibus morbis afficitur, & quibus symptomatibus infestatur?

Nulla pars propter robur suæ substantiæ Ventriculi salubrior esse posset in homine quam ventriculus, si temperanter viverent homines.

Nunc vero nulla pars tam crebris & variis afficitur morbis propter ingluviem & heluationem, quam ventriculus. Et cum ventriculus connexionem cum principalioribus partibus habeat, per nervos, arterias & venas, per consensum ex ventriculo omnes partes principales facillime afficiuntur: *σύνχωλον* orificium ventriculi veteribus, & *Kægdia* id est cor dictum nostratibus quoque usque in hunc diem *Das Herzgrüblin* vocatur.

Orificii ventriculi propriæ affectiones sunt: Dolor orificii ventriculi, *das Herzspan* / *Stomachi affectiones.* Ebullitio sive fervor stomachi, *die Sode.*

Sequentes affectiones communes habet stomachus cum corpore ventriculi, uti sunt:

Imbecillitas ventriculi ab intemperie aliqua, vel calida vel frigida, *Ventriculi morbi & Symptomata.* Imbecillitas ventriculi ex colluvie humorum,

Inflammatiō ventriculi,

Inflatio sive intumescētia ventriculi,

Cruditās ventriculi,

Apostema ventriculi,

Appetentiæ prostratio, sive cibi fastidium,

Appetentiæ canina,

Fames insatiabilis,

Pica ventriculi,

Nausea & vomitus,

Qq

Sanguis-

Sanguinolenta vomitio,
Cholera,
Singultus,
Sitis vehemens.

3. Dolor oris ventriculi quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curandus?

Cardialgia
quid.

Καρδιαλγία, dolor orificii ventriculi, nostris **das Herzspan** / est tristis sensus, sive mordicans dolor sub cartilagine ossis pectoris, quæ pars quandoque intumescit, nonnunquam & sine tumore doler.

Causæ.

Causæ καρδιαλγίας αετηγμέναι sunt humores acres & vengnati os ventriculi obidentes, vel status vaporosi & acres, ex capacitate ventriculi in ipsius os delati, ipsumque extendentes. Quibus causis ut plurimum vel caliditas vel frigiditas est adjuncta: αετηγμένη sive externa sunt alimenta vitiosa, venenata, & facile corruptibilia, veluti sunt lac, fructus horarii & immaturi, anguillæ.

Signa.

Signa καρδιαλγίας sunt dolor acris, pungens, vellicans, mordicansque orificium ventriculi, item siccitas, amaritudo, & falfedo oris, prout natura vitiosi humoris fert, eructatio & rugitus ventriculi, præsertim ubi flatulenti humores dolorem excitant. Vitiosis humoribus semper adest aliqua intemperies ventriculi, quod tactu dignoscitur.

Prognostica.

Prælagiens signum est juxta dictum Hippocratis; si tumor aut vesicula in dextro crure oboriatur laboranti καρδιαλγία, moritur æger.

Curatio.

Curatio doloris orificii ventriculi pro causarum diversitate dirigenda est: primum itaque considerandum, quæ qualitas excelsat in dolore, & quæ species vitiosi humoris obideat orificium ventriculi, & intemperiem quidem per sua contraria, cum intra tum foris adhibita, facile mitigabimus.

Vitiosi autem humores orificio ventriculi insidentes convenientibus remediis vel vomitu, vel egestionem educendi sunt. Quæ autem remedia singulis speciebus intemperiei conveniant, & quibus vitiosorum humo-

rum colluvies expurgari possit, copiose pos-
tea tradituri sumus. In genere dolorem
ventriculi mitigabimus ol. è mastiche, Nard.
& Absinthii, si eis vel singulatim vel simul
commixtis dolens locus inungatur. Ubi ve-
ro dolenti adjuncta est calida intemperies,
tum præstat ventriculum innungere ol. rosac. rosi rubei
aut cytonior. * Intra corpus assumenda e-
runt aq. stillat. è mentha, ex absinthio &
aparine, & in aquis præscriptis exhibeatur
pul. mirifice conferens dolori ventriculi, qui
ita concinnatur.

* Aqua convenienter exhibenda. Aqua Quercetani anodyna
in pharmacopea rest. descripta plus præstat.

¶. Coral. rub. præparatorum, Corn.

cervi ulsi ac præparati an. 3 s.

Cinam. ʒ i. commisceantur, fiat

pulvisculus, cujus 3 s. aut ʒ i.

exhibeatur. Aut

¶. Ol. vitrioli guttas ix. aq. menthæ,

aut vini Rhenani ʒ ii. quæ simul

commixta, quotidie per aliquot

dies ventriculo jejuno ebibantur.

4. Ebullitio sive fervor stomachi quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Ἐβυλλίσις ἢ σφοδρία est acris mordicatio
ac fervor, qui in orificio ventriculi, & to-
ta gula inter concoctionem cibi sentitur, &
post concoctionem rursum remittit: no-
stris **die Sode**.

Causæ αετηγμέναι sunt aut intemperies
calida vel frigida orificii ventriculi, aut bi-
liosus humor, aut serosa pituita orificio ven-
triculi infarcta, illitave. Causæ αετηγ-
μένη fervorem per accidens in ventriculo
excitantes, sunt alimenta calida & acria,
ut sunt vini aut calidæ cerevisiæ mane as-
sumptio, & motus corporis in concoctione
alimentis. Ut plurimum accidit iis, qui post
cibum sumptum iter faciunt, & natura sunt
biliosi.

Signa ferventis stomachi ex querela pa-
tientis dignosci possunt. Singulatim autem
in bilioso fervore, ventriculus acri mole-
statur mordicatione: in serosa vero pitui-
ta præ-

Olea ano-
dyna.
Sacculum
ex rad.
Alibæa,
flor. cha-
momilla,
rosi rubei
& absin-
thio con-
fectum
commen-
dat Fore-
sius.

Pulvis con-
tra car-
dialgiam.
Electuario
suo Laudani
in hoc
caso utitur
Crollius.
Laudani
opiat gr.

III. sum
decocto fl.
chamomil-
la statim
dolorem se-
dant.
Ebullitio
stomachi
quid.

Causa.

Cibi etiam
dulces præ-
pingues sa-
pe hunc af-
fectum ex-
citant.

Signa.

ea præcedit anxietas ex nausea, & tenuis ex stomacho per os instar aquæ profluit humor.

Curatio.

Curatio consistit in evacuatione materiæ orificio ventriculi impactæ, & corroboracione stomachi per constringentia remedia foris & intus applicata.

Vbi bilis peccat.

Si itaque ebullitio sive ardor stomachi à bile sive flava sive prassina contingat, evacuanda erit aut sequenti haustu, aut pillulis.

Haustus cholagogus.

℞. Rhabarbari ℥. 3 i. s. Cinamom. ℥. 1. contusa macerentur in aq. stillat. cichoreæ 3 v. per noctem, altero die ebulliant, expressaque colentur, & colato jusculo admisceantur El. rosar. Mes. 3 ii. Fiat haustus, & ebibatur 6. horis ante prandium tepidus. Aut

Pillula.

℞. Mas. pill. hieræ simpl. mastichin. an. 3 s. Diagridii gr. 111. cum q. s. aq. absinthii, formentur pill. n. 27. quæ deglutiantur cum pauxillo syr. rosarum in aurora, & 6. horis post assumptionem, à cibo potuque abstineat patiens.

Vbi pituita serosa in ventriculo generata, fit causa ebullitionis, & crebro præsertim jejuno ventriculo, humor tenuis instar aquæ, præcedente anxietate & nausea ex evacuatione per os effluit, tum sequentibus aut haustu, aut pillulis vitiosus humor detrahendus erit.

Haustus castoriceus.

℞. Diaphaniconis 3 vi. hieræ simpl. 3 ii. cum q. s. aq. absinthii, commisceantur, fiat haustus, qui calefactus in aurora ægrotanti propinetur. Aut

Pillula.

℞. Mas. pill. hieræ simpl. mastichinarum, agaticei trochiscati an. ℥. 1. Ex quibus cum aq. menthæ confirmantur pill. n. 27. & assumantur in aurora 6. horis ante prandium.

Alimenta quandoque visanda.

Ventriculo ita probe evacuato, vitet patiens alimenta facile corruptibilia, cibosque calefacientes melleque dulcoratos, & juscula ex vino cerevisiæque parata.

Post sumptum cibum semper concludatur orificium ventriculi frustulo cytoniorum

conditorum devorato, aut diacytonio simpliciter.

Ubi vero ab ebullitione sive fervore quis molestatur, in ipso symptomate devoret patiens unam ex sequentibus morsulis.

℞. Ros. rub. exiccat. Acatiz, tragacanthi an. 3 s. liquiritiæ, boli armeni an. ℥. 1. coral. rub. præparat. 3 i. Rad. symphyti, sem. portulacæ, cinamomi an. ℥. 11. myrtillorum, hypocistidos an. ℥. 5. pulverentur & cum sacchari 3 ii. in aq. rosarum soluti fiant morsuli.

Aut devoret æger in ipso paroxysmo rotul. 11. diatragacanthi frigidi, aut diapapaveris. Tenuioris fortunæ homines deglutiant in ipso paroxysmo unum aut duos pugillos grumi ex avena torrefacta & excorticata parati.

Iter facientibus præsertim æstate præsentissimum remedium adfert, si capiant extremitates surculorum viridium prunellorum sylvestrium, qui eo anno succreverunt, & commasticatas devorent.

Quibus vero cum ardore stomachi ex ore aquosus profluit humor, ii post evacuationem crebro ebibant duo cochlearia aq. cinamomi chymica arte distillatæ. Aut devoret in paroxysmo micam panis in cretico vino maceratam. Foris vero orificium ventriculi crebro inungat oleo mastichino, aut cytoniorum, aut nardino, quibus incocta sunt frustula caryophyllorum crassiusculè contusorum. Porro si aquosus humor ex lumbricorum mordicatione profluat, ejus curationem inter morbos intestinorum tradituri sumus.

5. Imbecillitas ventriculi quid, quæ ejus causa, quæ causarum signa, & quibus remediis curanda?

Ἀδυναμία sive ἀδυναμία τῆς πέψης est ubi ventriculus suas functiones aut proflus peragere nequit, aut perperam & vitiose perficit. Est autem propria actio ventriculi χύλωνος cibi ac potus in chylum id est liquorem cremori prusanæ similem conversio. Cibus enim ac potus alteratur in ventriculo per innatum calorem ventriculi, eidem opitulans

Remedia paroxysmi.

Morsuli. Prodest hic bolus, qui R. sacchari rosarum, ti uncia 1. oculor. cancri parati

3 i. boli Armeni 3 s. sejus particula deglutatur.

Rotula. Euporista remedia. Alii hoc utuntur pulvere, qui conficitur ex nuc. musc. n. 3. creta & sacchari albi uncia 1. & quidem felicitat.

Surculi pruni sylvestris. Aqua cinamomi. Inunctio ventriculi.

Actio propria ventriculi.

*Potentia
naturalis
in fibris re-
sistentes,
per eas a-
gunt.*

*Qua ratio-
ne conco-
ctio vitio-
sur.*

*Vitia con-
coctionis
sunt tripli-
cia.*

*Causa in-
terna.*

*Causa ex-
terna.*

*Signa in-
temperiei
calida.*

*Intemperi-
ei frigida.*

tibus naturalibus facultatibus fibris ventriculi congenitis. Sunt autem naturales potentia, attractiva in rectis fibris, retentiva in obliquis, expulsiva in transversis, quas potentias communes habet ventriculus cum omnibus partibus corporis.

Ubi itaque ventriculi vel calor natus est debilitatus, vel fibrae ejus sunt laxatae, tum ventriculus cibum ac potum aut difficulter, aut vitiose concoquit, aut prorsus conficere nequit.

Tres itaque species sunt imbecillitatis ventriculi, *Ἀπείθεια* id est cruditas, *Δυσπείθεια* id est difficilis concoctio, & *Βραδυπείθεια* id est tarda concoctio.

Causae imbecillitatis ventriculi *αἰσθητικῆς* sunt aut aliqua nuda intemperies sine pravis humoribus, calida, frigida, humida & sicca, (ex his autem ut plurimum calida & frigida intemperies debilitat ventriculum, sicca vero rarissime, nisi in marasmo, id est, febre hectica, aut in senectute, sic & humida minus nocet ventriculo, nisi praecedat hydrops:) aut colluvies humorum biliosorum, pituitosorum: aut melancholicorum in ventriculi capacitate natantium, aut tunicae ejus interiori impactorum: aut per accidens, vel per consensum, intemperies epatis, lienis, & effusio bilis ex propria vesicula: *αἰσθητικῆς* sunt ingluviēs, heluatio, voracitas, plus cibi potusque, quam natura conficere potest, & intempestiva ingestio, vigiliae, & intempestivae lucubrationes, venenata & corrupta qualitate imbuta alimenta. Omnis enim intemperies & aliena qualitas, sive ab internis sive externis causis excitetur in ventriculo, actiones ventriculi labefactat & impedit, teste Galeno lib. 3. cap. 1. de symptomat. causis.

Signa calidae intemperiei ventriculi sunt, sitis continua, nidorosa & ustulata eructatio; tales frigidis alimentis delectantur, calidis vero offenduntur.

Frigida intemperies ventriculi dignoscitur, quod raro aut nunquam siti premanetur, ructus sunt acidi ac crebri; cibum ultra modum appetunt, delectantur calidis,

aversantur autem frigida. Sicca ventriculi intemperies dignoscitur ex oris siccitate, & totius corporis macilentia; hi humidis delectantur, sicca vero fugiunt. Humida intemperiei signa sunt rugitus & fluctuatio in ipso ventriculo, oris humiditas & continua expulio; tales siccis afficiuntur, humidis vero laeduntur. Porro corruptorum humorum colluviem in ventriculo & copiam ostendunt, gravitas in ventriculo, tetri, horribiles & insueti ructus, nausea & crebra vomitiones. Speciatim autem si aliquis humor excedat, ex recitatis signis de intemperie (ineff enim omnibus humoribus sua peculiaris qualitas, veluti bili caliditas, pituitae frigiditas, atrae bili siccitas) & sequentibus signis internosci possunt. Si itaque bilis flava ex propria capsula in ventriculum sit delapsa, vel in ipso ventriculo ex corruptis alimentis praesina bilis generata, tum natura non quiescit, donec eam per vomitum propellat. Adest itaque anxietas & nausea donec bilis guttula in ventriculo haeret, praeterea os amaro sapore est infectum, sitis adest continua, & nidorosa eructationes, ac ventriculi mordicationes. Si pituita cruda, serosa aut salsa ventriculi tunicis impacta imbecillitatis concoctionis sit causa, his signis deprehenditur: Ructus adest acidus, assumptis alimentis gravitas sentitur ventriculi, & saepe cibi cum crassa pituita per vomitum projiciuntur, facies pallet, lingua albicat, & crebro expuunt.

Si atra bilis vel melancholicus humor molestat ventriculum, faciei lividitas & linguarum fuscus color, & eructationes magis acidae sunt, ac fames insolita hominem premit.

Quin & humoris vitiosi differentiam in ventriculo haerentis ab excrementis alvi & excrementis vesicae facile internoscimus. Si enim urina alba & excrementum alvi album mucosumque extiterint, pituitam; si excrementa alvi flava sunt, & urina crocea, bilem; nigra vero excrementa melancholicum humorem causam cruditatis arguunt.

Externarum vero causarum signa ex relatione antea tractatae vitae patientis cognosci possunt.

*Sicca in-
temperiei.*

*Humida
intemperi-
ei.*

*Signa cor-
ruptorum
humorum
in ventri-
culo.*

*Bilem qua
indicans
adesse in
ventriculo.*

*Picrocholi
quibus mo-
lestetur
symptoma-
ta.*

*Signa pi-
tuitae cru-
dae aut sal-
sae.*

*Signa me-
lancholici
guarum fuscus
color.*

*Signa ab
excrementis
alvi.*

Imbe-

pregnati-
Imbecillitate ventriculi diu laborantibus, ut plurimum aut hydropsi, aut lienteria supervenire consuevit.

Si imbecillitas ventriculi à bilioso humore excitetur, in ardentem febrem terminetur.

Nidiorosa eructatio perpetuo caliditatem, acida vero frigiditatem ventriculi arguit, & semper cruditatis est indicium.

regula ge-
eralu
iata solu-
tu ad
vacuam-
a villa
saltem.
utatio.
Inculpatam ventriculi concoctionem qui conservare cupit, is studiosè caveat, ut neque in multitudine sive copia eorum quæ in cibo potuque assumuntur, neque in qualitate, neque in assumendi oportunitate, neque in ordine delinquat.

indicatio-
es curati-
a genera-
te.
Curatio imbecillitatis ventriculi pro causarum diversitate varianda erit, & quidem in omni intemperie & in victus ratione, & in medicamentorum oblatione, alterantia in contrariam temperiem, & corroborantia sunt offerenda. In humorum vero vitiosorum præsentia præter alterantia & corroborantia, evacuantia remedia, pro natura humoris vitiosi, sunt adhibenda.

illius ra-
o refrige-
nti.
Imbecillitate itaque ventriculi ex nuda calida intemperie ortam, alimentis & remediis refrigerantibus curabimus. Utatur itaque æger in victu cremore ptisanæ, carnibus gallinarum, vitulina, & piscibus squamatis, inter quos laudatissimi sunt melanuri. Debent autem alimenta omnia condita esse aceto vini, aut ubi haberi possunt, uvis immaturis, quæ Græcis ὄμφακες vocantur, item prunis Ungaricis acidis. Prodest acetarii loco frequenter uti lactuca, portulaca & acetosa herbis, & aranciis malis. Potus illi sit aqua hordei cum pauxillo cinamomi cocto. Alterat autem & impense refrigerat calefactum ventriculum sequens potio.

ulapium
friga-
nti.
nuntiatio.
℞. Syr. acetos. citri ʒ iiii. aut syr. violar. aut rosar. tantundem, qui cum aq. frigidissimæ scaturientis fontis, aut cum aq. stillat. oxalidis ℥ ii. commisceantur, fiat haustus, cujus mane ac vespri assumat ʒ vi. frigidus. Foris autem inungatur singulis diebus bis ol. rosæ. nymph. Cyron. aut myrtillor. ex hisque paratis linimentis. Post inunctionem imponatur ventriculo sequens

cataplasma. ex mica panis tosta cum aq. & acetos. rosæ. q. s. confusa, semper autem æger sumpto cibo utatur corroborantibus remediis, veluti diacytonio simplici ex succo & saccharo parato, aut myrtabolanis chebulis, aut pyris moscatellinis, aut cortice citri, aut cytoniis conditis, aut subsequenti-
bus morsulis.

℞. Corall. rubeorum præparatorum, *Morsuli.*
ʒ i. s.

Cinamomi, rosarum rubearum an.

ʒ ii.

Spec. Diamargariti frigidi, diatrion sandalon an. ʒ i.

Saccari candidiss. in aq. rosacea soluti ʒ iiii. fiant morsuli, quorum unum à cibo sumpto devoret.

Porro ex frigida intemperie ventriculi nuda ortam imbecillitatem curabimus medicamentis & alimentis calefacientibus & corroborantibus. Alimenta autem omnia calidis aromatis condenda sunt, veluti sunt zinziber, piper, cinamomum, crocus, macis & caryophylli. In potu bibat æger vina Rhenana generosa, aut duabus horis ante potum assumat buccellam simlæci panis tosti in vino Cretico maceratam, aut in vino aromatate quod claretum sive potum Hippocraticum officinæ vocant. Loco medicamentorum assumat mane ac vespri duo cochlearia aq. stillat. vel granorum juniperi vel cinamomi, & alternatim devoret jejunus frustulum zinziberis conditi, aut pastillos duos confectionis diagalangæ, aut corticum arantiarum conditarum, aut diambæ, aut diatrion pipereon nominatæ: & singulis septimanis semel assumat theriacæ Andromachi ʒ i.

Foris inungatur ventriculus ol. menthæ, Absinthii Nard. an. ʒ ii. Quibus sit admixtum pauxillum aq. juniperi propter penetrationem.

Post inunctionem imponatur ventriculo sequens cerotum vel emplastrum.

℞. Pul. menthæ, calami aromatici, cinamomi, mastichis an. ʒ i. ol. Cerotum è mentha, Absinth. an. ʒ i. ol. juniperi ʒ i.

℞ 9 3

Ceræ

Catapla-
ceto rosæ. q. s. confusa, semper autem æger
sumpto cibo utatur corroborantibus re-
mediis, veluti diacytonio simplici ex succo
& saccharo parato, aut myrtabolanis chebu-
lis, aut pyris moscatellinis, aut cortice ci-
tri, aut cytoniis conditis, aut subsequenti-
bus morsulis.

Imbecilli-
tatis ven-
triculi ex
intempe-
rie frigida
remedia.
Alimenta
quibus
condenda.

Calefa-
cientia &
corrobo-
rantia
ventricu-
lum.
Chymici o-
leo vitrioli
Venerii
vel Martis
utuntur
cum aq.
mentha.
Linimen-
tum pro
ventriculo.
Cerotum
stomachale.
Cerotum

ex Ladano
valde com-
mendat
Crato con-
fil. à schol.
edito 105.
Manus ca-
lida ven-
triculo im-
posita ejus
calorem ro-
borat.
Imbecilli-
tatis ex sic-
ca intem-
perie reme-
dia.

Ventri-
culum hu-
meſcan-
tia in ma-
rasmo &
hectica.

Linimen-
tum hume-
ctans.

Humida
intempe-
rici reme-
dia.

Vitius ra-
tio.

Pillulæ hu-
miditatem

Ceræ q.s. ut duritiem emplastri olea con-
sequantur, quibus tepidis admisceantur pul-
veres præscripti, fiat emplastrum, quod ex-
tendatur per alutam scutiformem ventricu-
lo convenientem, & syndone obduſtum in-
terſuantur.

In frigida ventriculi intemperie recalefa-
cienda præstantissimum habetur remedium
calor insitus pueruli aut conjugis, si ejus
membra ventriculo applicentur.

Sicca intemperies rarissime soli ventricu-
lo inhaeret, sed per consensum totius cor-
poris, veluti in marasmo & senectâ, fre-
quentissime efficitur. Curanda itaque est
ventriculi siccitas alimentis ac remediis in
curatione hecticæ febris descriptis, quæ
huc transferenda erunt: sed ut pauca quæ-
dam adjiciamus, humectant siccitatem ven-
triculi & corroborant sequentia alimenta,
cremor prisanæ, avenæ, lac caprinum, vi-
num tenue, juscula pinguium caponum &
gallarum, caro vitulina, & succus sive
lac ex amygdalis, si eis crebro utatur æger.
Foris autem inungendus est ventriculus,
excepto tamen ejus orificio, sequenti lini-
mento: ut

℞. Ol. amygd. dulc. violat. an. ʒ iiii. a-
xungie gallinæ, anatum an. ʒ ii.
Ceræ albæ pauxillum, fiat linimen-
tum, cui admisce parum vini, quo
inungatur ventriculus una hora
ante prandium & coenam.

Ab humida intemperie debilitata ven-
triculi concoctione, si ea non est orta ab hy-
drope, sed humiditas ventriculi substantiæ
est intincta, tum alimenta & medicamenta
debent esse resiccantia. In cibo itaque utatur
æger pane bis cocto, & carnibus, piscibus-
que salitis fumoque duratis, recentibus au-
tem cum piscibus, tum carnibus, magis
assatis quam elixis & probe salitis. Ab u-
beriori potu, quantum fieri potest, absti-
neat, & bibat aut hydromeli, aut vinum
genetosum, sed moderate sumptum: reme-
dia autem sequentia humiditatem ventriculi
probe exsiccant.

℞. Maſ. pil. de hier. cum agar. ʒs. ex sin-
gulis ʒ i. conformentur pillulæ n. 27.

& conspergantur ol. vitrioli, & ventriculi
singulis septimanis devorentur pro
una vice 27. reliquis diebus septi-
manæ utatur æger, ad mensam pro
cibus condiendis loco salis sequen-
ti pulvere.

℞. Cineris intestinorum gallinarum Pulvis pro
exsiccano
ventriculo.

3 iiii.
Cornu cervi uſti & præparati,
Corall. rubeor. præparat. cinanom.
an. ʒ ii.

Cineris hirund. ʒ iiii. troch. è vipe-
ris ʒ ii. galang. ʒ i.

Salis ustulati medium pondus ad re-
liquorum pulverum. Fiat tenuissi-
mus pulvisculus.

Foris vero inungatur ventriculus ol. Maſti-
chini ʒ i. cui admixta sit ʒ i. ol. caryophyll. Cerotum
Post inunctionem imponatur ventriculo le.
cerotum stomachicum, quod in myropolii
prostat. Reliqua remediorum genera ven-
triculi humiditatem exiccantia ex curatio-
ne hydropicorum sunt petenda.

Cum ventriculi & facultatis concoctricis Si ventri-
actiones impediuntur ex vitiosorum hu-
culi sca-
morum aliqua specie, tum I. confide-
teat viti-
randum est, quis qualisve sit humor causa-
ss humo-
imbecillitatis. Ut plurimum enim ex cor-
ribus, qua-
rupta bile & putrida pituita contingit: raro sideranda.
autem ab atra bile. II. Utrum vitiosus hu-
mor in capacitate ventriculi fluitet, aut tu-
nicæ ejus sit impactus. III. Ut statim viti-
osus humor evacuetur, ejusque qualitas al-
teretur, & ventriculi substantia corrobore-
tur.

Si itaque bilis colluvies aut ex vesicula
bilis delapsa in ventriculum, aut ex corru-
ptis cibis in ipso ventriculo generata, qua-
lis est prassina viridis bilis, ventriculi con-
coctionem debilitat, id quod ex ventriculi
æstu, mordicatione & nausea dignoscitur,
tum statim per vomitum vel spontaneum
vel ope medicamentorum concitatum, e-
vacuanda erit. Facilem autem vomitum ex-
citat aqua calida aut hydromeli calidum an-
te vomitum bibitum (vomitio enim ven-
triculi est convenientissima evacuatio, præ-
sertim iis qui natura facile vomunt, iis, vomitoria
autem

Signa.

Curatio.

Vomito-
rium.

Quibus

autem

autem qui difficiliter evomere consueverunt non temere est adhibenda) aut bibat patiens hydromellis haustum, in quo per noctem 3 ii. rad. asari contusæ sunt macerate. Nobile autem vomitorium & pulvisculus ex julis five floribus juglandis arboris in fumo siccatis, præparatur, cujus 3 i. cum hydromelite assumpta omnem impuritatem lenissimè per vomitum expellit.

Bilis ventriculi tunicis im-
mixta ut evacuanda.
Ubi vero tunica ventriculi bilis est im-

Vena sa-
liva.

Bilis colo-
rem re-
singuen-
tia.

Inunctio-
nes.

Pituita
corrupta &
ventriculo
ut educen-
da.

Potio pi-
tuitam in-
cidens &
preparans.

mixta, quod ex continua nausea dignoscitur, tum exhibendæ sunt patienti 3 x. hieræ simpl. in aqua cichoreæ dissolutæ 6. horis ante prandium, quæ & purgant & evelunt bilem ex tunicis ventriculi & ipsum corroborant. Evacuata bile, si totum corpus præternaturalis calor occupavit, vena Epatica dextri brachii incidenda est: talia cum alimenta tum medicamenta sunt adhibenda, quæ bilis qualitatem refrigerent, & ventriculorum corroborent, veluti sunt cremor pitæ, aq. hordei, syr. violar. rosar. è succo citri, è succo granatorum, & conserv. rosar. ac violar. Sympliciorum autem pro una vice assumendæ sunt 3 ii. cum 3 vi. aq. cichor. Extrinsecus vero inungatur spina dorsi & tota ventriculi regio ol. rosar. cyton. & nymph. ex quibus cum pauxillo ceræ tepelactæ fiat linimentum. Possunt & fieri unguenta, eisque admisceri pauxil. aceti rosar. & pul. coral. rub. rosar. & momentum camphoræ.

Ubi vero ex copia pituitæ corruptæ in ventriculo collectæ ejus concoctio debilitatur, & ipsa vitiosa pituita commodissimè è ventriculo expurgabitur per vomitionem: sed quia materia pituitæ ut plurimum lenta est & crassa, & tunicis instar visci adhærescit, priusquam vomito instituat, crassa pituita incidenda & resolvenda erit per sequentem potionem.

℞. Rad. Iridis Iliricæ, elenii, pimpinel. an. 3 i. ii. femin. fœniculi, carvi an. 3 s. Herb. Hyssopi, sativæ, menthæ, calamiti an. M. s. contusæ & concisæ decoquantur in tb ii. hydromelitis, & colentur, colatoque juri admiscean-

tur oxymellis simp. 3 iiii. fiat portio, de qua bibat patiens mane ac vespere 3 v. calefactas, qua portione exhausta excietur vomitus, & ante vomitionem per horæ quadrantem assumat haustum vomitorium hac ratione concinnatum.

℞. Succus ex rad. raphani expressi 3 iiii. hydromellis 3 ii. in quibus simul mixtis macerentur per noctem 3 ii. rad. asari contusi, altera vero die expressa colentur, & liquor tepidus patienti propinetur. Aut
℞. Pul. sem. genistæ 3 i. cui admisceantur cinam. sem. fœnic. an. 3 s. paratum & cum hydromelite tepido ebibantur.

At si pituitæ reliquæ in ventriculi tunicis adhuc hæreant, prodest eas per seq. pil. exturbare.

℞. Mas. pil. de hiera simp. agar. troch. an. 3 s. cum q. s. oxymell. formentur pill. n. 27. & in aurora deglutiantur. Quin & pituitosa ventriculi excrementa absumit, calefacit, & vires reficit, si jejuno ventriculo tribus horis ante prandium guttulæ x v. robustioribus Ol. vitrioli, cum haustu vini generosi ebibantur. Idem præstant singulis diebus 2. aut 3. cochlearia aq. stillat. cinamomi aut juniperi exhausta.

Mirificè corroborant ventriculum ex frigida intemperie aut pituitosis humoribus debilitatum 2. aut 3. rotulæ diagalangæ, diambæ aut diatrion pipereon.

Extrinsecus una hora ante prandium inungatur ventriculus oleis sequentibus.

℞. Ol. è mentha, ex absinth. nardi an. 3 ii. Aq. juniperi 3 i. Commisceantur & calefacta inungantur: inuncto ventriculo imponatur sequens emplastrum.

℞. Ol. nardini, è mentha, ex mastiche an. 3 i. Ceræ candidæ q. s. fiat emplastrum, cui tepido admisce pulv. subsequentes simul commixtos.

℞. Pul. cinamom. galangæ, caryophyl. calam.

Vomito-
rium.
Heurnius
& Fore-
stus vom-
itorium ex
helleb. albo
conficiunt
quod de-
bito mo-
do præ-
paratum
& usurpa-
tum insi-
gniter in
hoc casu
juvat.
Pulvis vo-
mitorius.
Pituita
tunicis
ventriculi
imixta
quibus ex-
turbanda.
Pillula.
Spiritus
vitrioli ad
hanc affe-
ctionem
rectius ad-
hibetur,
quem &
author per
oleum in-
relligit.
Rotula
ventricu-
li frig.
roborantes.
Linimen-
tum sto-
machale.
Ex oleis
stillatis
longe effi-
cacius sit
remedium.
Empla-
strum sto-
machale.

calam. aromat. an. 3 i. Flor. absinth. menthæ an. 3 s. thur. mastich. an. 3 ii.

Fiat emplastrum, quod per alutam scutiformem stomachoque convenientem extendatur, & syndone obductum interfuatur: aut applicetur ventriculo sequens sacculus.

Sacculus pro ventriculo.

℥. Flor. absinth. rosar. an. M. s. menthæ, saturejæ, serpilli an. M. ii. Calam. aromat. cinam. caryoph. an. 3 ii. mastich. 3 s.

Concisa & contusa infuantur sacculo quadrato, qui in vino generoso decoquatur, & expressus calidusque ventriculo applicetur, & ubi refrigerari cœperit, rursus in eo liquore calefiat.

Crusta panis ventric. imp.

Aut imponatur ventriculo crusta panis digiti crassitiem habens, tosta & vino generoso conspersa, cui pulv. mastichis & caryophyl. sunt inspersi.

Ab atra bile raro turbatur concoctio. Sed tamen in hypochondriacis, ab infusione succi melancholicis, varia ventriculus symptoma patitur. Enema.

Ab atra bile sive melancholico humore non lebesctatur concoctrix vis ventriculi, nisi forte justo copiosus in ventriculum influat. Humor enim melancholicus quando secundum naturam per πύλωρον, in fundum ventriculi influit, corroborat ventriculum, & excitat appetitionem sive famem. Ubi itaque melancholicus humor uberius in ventriculum profluit, is non, ut reliqui humores vitiosi, per vomitum, sed per acre enemata subducendus erit.

℥. Mercur. Malvæ, Alth. an. M. i. Flor. cent. min. M. i. s. concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, colati juris accipe ℥b i. s. cui admisce confect. hamech, hie. simp. an. 3 i. ol. absinthii, rutæ, menthæ an. 3 i. salis 3 i. fiat enema, quod tepidum recto intestino injiciatur.

Inunctio.

Foris autem ventriculus, & sinistrum hypoch. inungatur ol. è mentha, & ol. de cap. an. 3 ii. simul mixtis & calefactis.

Crupula & ingurgitatio ut curanda.

Ast ubi ex cibi potusque assumpti immoderata copia ventriculus gravetur, & concoctio impediatur, statim aut per vomitum assumpta alimenta rejiciantur, aut per labores, famem diuturnam, & longum

somnum concoctio eorum est adjuvanda, & interim subinde vesperi ac mane aquæ cinamomi aut juniperi duo cochlearia sunt deglutienda.

Porro ubi venenum, aut venenosa qualitate imbuta alimenta ventriculi temperiem & facultates naturales debilitarunt, ac prostraverunt, statim 3 ii. aut ol. olivarum, aut recent. butyri salis expertis, cum tepido hydromelle æger ebibat, & paulo post vomitus excitandus. Post vomitum autem, si venenum igneæ sit naturæ, quod ex erosione, siti & æstu dignoscitur, tum lac recens tepidum propinandum erit, & pulv. sequens cum aq. scordii.

Assumpta venena si ventriculorum debilitarunt, quomodo aegris subveniendum.

℥. Boli Armeni, Coral. præparat. margar. præpar. an. 3 i. fiat pulvis.

Pulvis alexipharmacus.

Ubi vero venenum frigide sit qualitatis, & nulla ad sitis siccitas, nec æstus, nec mordicatio, sed anxietas tantum, & animi deliquium, tum post vomitum aut clysterem propinandus erit ægroto 3 i. ol. Angel. aut 3 s. tincturæ coral. aut 3 i. Ther. Androm. cum haustulo vini Cretici aut generosi.

Remedia veneni frigidi.

Arcano Theophrasti adversus venena, feliciter quidam intoxicati sunt restituti.

6. *Inflammatio Ventriculi quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Φλεγμονή τῆς κοιλίας est ubi tunicæ ventriculi ardore & incensione laborant, in eisque igneæ flammæ sentiuntur. Differt ab ejus affectione, quam paulo ante à nuda intemperie calida, & biliosis humoris in capacitate ventriculi collectæ copia, oriri diximus.

si adversus venena, feliciter quidam intoxicati sunt restituti.

Ventriculi Phlegmonæ quid.

Causa inflammationis ventriculi αἰσθημένη est fervens & biliosus sanguis in venis per substantiam ventriculi dispersis coacervatus: αἰσθητέα est venenum assumptum, veluti sunt Mercurius sublimatus, Arsenicum, Euphorb. & similia.

Causa.

Signa inflammationis sunt, vehemens æstus adorque in ventriculo, una cum dolore acerbo, fervens respiratio, sitis immoderata, linguæ ariditas: nonnunquam subsequuntur & tumor ventriculi, & febris ardens cum nausea.

Signa.

Prognosticum signum est, si non extinguitur inflammatio ventriculi convenientibus

Prognostica.

tibus remediis, priusquam vires ægroti profuerant, præsentaneam mortem adfert.

Curatio.

Curatio perficienda est victus ratione, venæ sectione, vitiosi sanguinis expurgatione, & remedium intra extraque corpus applicatione.

Vbi veneni assumpti suspicio, quid agendum.

In causa itaque procatactica, si veneni hausti suspicio adsit, quod ex repentina inflammatione & cruciatu dignosci potest, tum statim ol. viol. aut rosac. aut butyr. recent. non saliti ꝑ. iii. in aq. tepida resolutæ ebibendæ erunt, & paulo post vomitus irritandus, & per vomitum rursus ejiciendæ. Post vomitum autem assumat boli Armen. veri, & cornu cervi usti præparat. an. ꝑ. i. cum aq. rosac. ꝑ. iv. & tandem iis remediis utendum, quæ in præcedentis morbi curatione recensuimus.

Vbi Phlegmone à bilioso sanguine, ut curanda. Refrigerantia alimentia.

Si à *αἰσχυρὸν* causa orta sit inflammatio, in victus ratione commoretur, decumbatque æger hyberno quidem tempore, in temperato aëre, æstivo vero in frigidiori. Alimenta sint refrigerantia, veluti sunt cremor pitæ, pisces saxatiles ac squamati cum aceto cocti, pulli gallinacei cum uvis omphaciis aut aceto rosac. lactuca, borag. & oxali. cum aceto, recenti butyro, & sale condita, pruna Ungarica, lac amygd. cum aq. cichor. confectum.

Potus refrigerans.

Potus illi sit aq. hordei, in qua pauxillum cinamomi est incoctum, aut aq. cich. aut scariolæ, cui dulcoris vel suavitatis gratia admixti sunt syr. violar. acetos. citri aut Rob. è ribes.

Somnus & exercitium evitandum.

Somno utatur paucissimo, exercitio nullo. Si enim in alio aliquo morbo, in hoc maxime, locum habet illud Celsi: quiete & abstinentia multi magni morbi curantur.

Cavendum quoque ne alvus sit obstructa, aut si sit, seq. clystere statim referenda erit.

Enema.

ꝑ. i. violar. malvæ, mercur. flor. violar. an. M. ii. pruna Ungar. n. 9. coquantur in q. s. aq. ad medias colentur, colati jûris accipe ꝑ. xiv. quibus admisce elect. lenit. diacathol. an. ꝑ. i. Ol. violar. rosar. an. ꝑ. i. s. Salis ꝑ. i. Fiat enema, quod tepidum infundatur recto intestino.

His probe procuratis vena statim post usum enematis est secanda, & quidem jecoraria dextri brachii.

Porro in hoc casu à violentis expurgationibus abstinendum erit, aut mitissimis est utendum, quales sunt ꝑ. x. pulpæ cass. recent. extractæ, quæ una hora ante prandium sunt devorandæ, aut ꝑ. iii. aq. cichor. cum ꝑ. ii. syr. rosar. solutivi commixtæ. Violentia enim remedia à longinquis partibus calidos & excrementosos humores in ventriculum alliciunt, & morbum magis exasperant. Utendum itaque intra corpus extremè refrigerantibus & constrigentibus, qualia sunt frustulum cyton. condit. devoratum, ꝑ. s. Rob. è ribes deglutita, aut ꝑ. s. rad. cichor. conditarum, diacyton. ex succo cum saccharo præparatum ꝑ. s. aut conserv. rosar. sæpe usurpatæ, aut utatur sequenti elect. de quo frequenter assumat nucis juglandis quantitatem.

ꝑ. i. Pyrorum moscatellinorum cond. rad. cich. cond. an. ꝑ. i. quæ concidantur minutissime, eisque admisce conserv. rosar. borag. an. ꝑ. s. spec. diatria sand. ꝑ. i. coral. rub. præparat. ꝑ. i. ol. vitrioli ꝑ. s. Commisceantur cum q. s. syr. acetos. citri, fiat electuarius.

Deinde bibat æger frequenter de lactiformi liquore exhibent. ex 4. sem. majorib. frigidis an. ꝑ. s. probe contusis, & cum aqua cich. & scariolæ an. ꝑ. ii. sacchari candi in syr. violar. concreti ꝑ. iii. simul optime commixtis & percolatis confecto. Exterior regio æstuantis ventriculi inungatur quotidie bis sequenti linimento.

ꝑ. i. Ol. rosar. cyton. nymph. è mastich. an. ꝑ. ii. Ceræ cand. q. s. fiat linimentum, quod eluatur ter cum aq. ros. & postremo admisce gutt. 6. aut succi cyton. aut aceti rosac. & simul admisce pulver. coral. rub. rosar. flor. granatorum an. ꝑ. ii. campho. gr. ii. fiat linimentum. Inuncto ventriculo sequens emplastr. imponi commodè potest.

Rr

ꝑ. Pul.

Vena secanda.

Mitissima lenitiva.

A fortioribus abstinentum.

Refrigerantia & adstringentia.

Electuarius refrigerans.

Chymici salu Saturni gr. 111. in aq. rosarum.

Emulso sem. frigid. majorum.

Linimentum.

Emplastrum.

Paracelsus
hic saccha-
rum Sa-
turni tan-
quam sin-
gulare ar-
canum ex-
trinsecum
cum aq.
plantag.
vel solani
applicat.

Causela.

℥. Pul. rosar. coral. rub. præparat. mastic. an. 3 i. Myrtill. Acatiz an. 3 s. Flor. ablinth. è mastic. an. 3 i. ol. rosar. cyton. an. 3 s. Cera albæ q. s. ad duriciem ceroti induendam; quibus tepidis & nondum concretis admisce pulv. præscript. fiat emplastr. quod in aluta scutiformi, & ventriculo adaptata extendatur, sydoneque obducatur, & decussatim intersuatur.

Notandum in inflammatione ventriculi, omnia genera remedium debere actu frigida administrari & applicari.

7. Inflatio sive intumescencia ventriculi quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis persananda?

Inflatio
ventriculi
quid.

Ἰνδυστάσις ἢ ὑπερμεγέθης, inflatio & intumescencia ventriculi est ubi ventriculus, adeoque totus venter in tumorem præternaturalem elevatur, extenditur & simul dolet. Differt autem hæc intumescencia ventriculi ab illa quæ hydropicis accidere consuevit, de qua suo loco tractaturi sumus: hic vero de ea tantum ventris extuberantia, quæ ex coacervatis flatulentis spiritibus in capacitate ventriculi & quandoque intestinorum excitatur.

Causa.

Causæ ἀναγεννητικαὶ sunt, retentricis facultatis ventriculi imbecillitas, & flatulenti spiritus inter concoquendum alimentum ex vaporibus crassis generati, qui ubi nec per eructationem, nec per ventris crepitum excernuntur, ventrem inflant & dolorem generant.

Προγεννητικαὶ causæ sunt alimenta flatuosa omnia præter modum ingesta, & poros obstruentia, veluti sunt mel crudum, pisa, fabæ, rapæ, olera & fructus dulces, hisque similia, sicuti & recens cerevisia.

Signa.

Signa intumescenciæ ventriculi manifesta sunt: Tumor enim conspicuus est renitens cum dolore, etsi digito imprimatur, non, ut in œdematoso tumore, vestigium vel cavitatem relinquit, sed renititur. Et hæc quidem intumescencia per ventris crepitum aut eructationem ut plurimum levatur.

Signa Præsentia.

Si flatulenti tumores ventris in tempore Prognoscituræ negligantur, in hydropem degenerant, difficultatem respirationis inferunt, & appetentiam prosterunt.

Curatur intumescencia ventriculi bona vi. Curatio. Actus ratione, & medicamentorum tum internorum tum externorum applicatione.

Alimenta autem debent esse concoctu facilia & boni succi. Parum autem in hac affectione comedendum est, siquidem inedia plurimum levat hoc malum; ac post cibum quidem pro potu meraciori vino utendum est, sed moderatè; multus enim potus in inflatione ventris faciliè patientem in hydropem conjicit. Confert huic malo & longus somnus, qui concoctionem mirifice juvat. Deinde solium calidum, hoc est, balneum in aqua alida *Solium* *ag. calid.* *ein Wannen* *da.* *Bad* in qua incoctæ sunt radic. ebuli aut ejus folia, chamæmelum & semina cymini, mirifice confert mitigando dolorem, emolliendo tumorem, & flatu dissolvendo.

Post institutam victus rationem, omnium primo crudi humores, crassique vapores ac flatu è ventriculo sequenti enemate subducendi erunt.

℥. Flor. chamæmeli, anethi an. M. i. Enema ad Centaurii minoris, ablinthii, Rutæ discutien- dos flatu.

an. M. s. Baccarum lauri 3 i. sem. cymini, anisi, carvi an. 3 s.

Corticum medianorum sambuci p. i.

Concisâ & contusâ coquantur in q. s. aquæ ad medias, colati liquoris sume 3 xiv. eisque admisce benedictæ laxativæ 3 s. hieræ simp. 3 i. olei rutacei, anethini, de ablinthio an. 3 i. salis communis 3 i. Misceantur, fiat enema, quod tepidum jejuno ventre recto intestino infundatur.

• Ubi vero inflatio ventriculi ex copia pituitæ corruptæ vaporibusque ejus in flatu resolutis, oboritur, aut ex crudis cibis atque flatulentis, statim aut per vomitum spontaneum, aut artificiosum, potionemque vomitoriam, (cujus conficiendi exempla supra de curatione imbecillitatis ventriculi posuimus) *Si à pituita corrupta vel cruditate ventriculus inflatur, ut curandus.*

fuimus) deturbandi erunt, aut corrupta flatulentaque pituita si torminum acerbitas non obstitit, sequenti decocto primum concoquenda, & ad educationem præparanda erit.

*Decoctum
pituitam
præparans.*

℞. Rad. pimpinellæ, dauci Cretici, ele-
nii an. ʒ ii.

Sem. anisi, cymini, carvi an. ʒ i. s.

Herb. calaminthæ, origani, saturejæ
an. M. s.

Rutæ, Centaur. minor. an. P. i.

Concisa & contusa coquantur in duplici
vase cum lb ii. aquæ, decoquantur autem
ad duas horas; deinde colentur & iusculo
colato admisceantur syr. de calaminth. oxy-
mel. scillitici an. ʒ iiii. fiat potio, de qua
mane ac vespere ebibat æger ʒ v. calefactas,
idque per triduum: quarto tandem die eva-
cuetur flatuosa materia sequenti haustu ca-
thartico.

*Haustrum
purgans.*

℞. Diaphæniconis ʒ x. aq. rutacæ ʒ v.
commisceantur, fiat haustus, qui
tepidus in aurora offeratur, & æ-
ger abstinere per sex horas ab ali-
mentis.

*Carmina-
tiva seu
flatus dis-
cutientia
remedia.*

Si vero acerbiora tormina, ad conco-
quendam & expurgandam pituitam, fla-
tumque copiam inducias non concedant,
tum statim ad remedia flatus dissipantia &
dolorem mitigantia accedendum erit. Plu-
rimum autem confert, & instar incanta-
menti, ut Galenus testatur, dolorem omnem

*Cucurbitu-
la magna.*

*Pulvis ta-
lorum suis-
lorum.*

levat magna cucurbitula cum multa flamma
sine incisione umbilico applicata ac sæpius
repetita. Aut intra corpus exhibeatur ʒ i. ta-
lorum suillorum adustorum & cum aq. rutæ
præparatorum, cum haustulo vini. Aut

*Ol. carmi-
nativa qua
cum rotulis
diacymini
exhiberi
possunt.*

℞. Ol. vitrioli rectificati ʒ i. cum ʒ iiii.
aquæ rutacæ. Aut

℞. Ol. cymini, anisi & angelicæ chymi-
ca arte destillatorum, an. ʒ s. Aut
exhibeantur ʒ ii. elect. de bac-
cis lauri cum haustulo aq. rutacæ
resolutæ. Aut subsequenteris pulve-
ris ʒ i. singulis diebus bis exhibi-
ta, tormina & flatus omnes dis-
cutit.

Pulvis con-

℞. Pul. cymini præparati, Aristolochiæ

rotundæ, Dauci Cretici, baccarum tra-
lauri an. ʒ i. fol. rutæ, cornu cervi
usti præparati, coralliorum rubeo-
rum præparatorum an. ʒ s. Te-
nuissime pulverisata commiscean-
tur, & cum calida cerevisia assu-
mantur.

Foris vero diu fovendus est venter flati-
bus repletus calidis sacculis ex æq. p. milii
sicci, salis, & cymini præparati, confectis,
sæpiusque recalefactis: deinde inungatur tu-
mens venter sequenti linimento.

℞. Ol. laurini ʒ ii. ol. rutacei, absinthii
an. ʒ i. ceræ parum, fiat linimentum.

Post inunctionem autem imponatur ven-
tri subsequens cerotum.

℞. Ol. rutacei, anethini, nardini, laurini
an. ʒ s.

Sem. Apii, carvi, nigellæ an. ʒ s.

Baccar. lauri, centaurii minoris an. ʒ s.

Gummi amoniaci, opoponacis an. ʒ ii.

Ceræ quantum ad indurationem oleo-
rum sufficit, quibus ad emplastri formam re-
dactis, & adhuc tepentibus addantur præ-
scripti pulveres, & per alutam sive corium in-
statur emplastri extendantur, tumentique ven-
tri applicentur.

Aut applicetur ventri sequens sacculus in
cerevisia coctus & iterum expressus, appli-
cetur autem quam calidissimè.

℞. Rad. ebulli, elenii, bacc. lauri an. ʒ ii.

Herb. vel fol. ebulli, rutæ, scordii
an. M. ii.

Flor. chamæmeli, anethi, centaurii
minor. absinthii an. M. i.

Sem. cymini, carvi an. ʒ s.

Contundenda contusa, & concidenda
concisa, commisceantur, & sacco insuan-
tur, neve concidant, interfuantur.

8. Tumor præternaturalis sive abscessus par-
ticularis ventriculi quid, quæ ejus cau-
sa, quæ signa, & quibus præ-
sidiis curandus?

A' πόνος, Abscessus, ein Schwell/ est Apostema
tumor præternaturalis in aliqua parte ven-
triculi collectus. Ut enim in cæteris corpo-

ris partibus externis & internis: ita sæpe &
in ventriculi tum externa tum gibba parte,

tum in interna capacitate inter tunicas ejus tumor oboritur; qui non raro indurefcit, aut in ulcus tranfit, ut ruptum, in exteriore quidem parte ventriculi, pus in abdomen. Intrinfecus vero, in ventriculi capacitate effundit, & varia excitat fymptomata.

Caufa.

Caufa *αὐτὴν ἐπὶ τῷ* tumoris in ventriculo funt, corrupti humores inter tunicas ventriculi collecti & impacti, aut tenuis feculentusque fanguis ex aliis partibus per venas in aliquam partem ventriculi confluent, ex quo ut plurimum calidus tumor excitatur.

Interdum

etiam in re acuta, ut cultero, acicula vel fpiria per incuriam deglutita & ventriculi tunici infixa abfciffus excitatur.

Signa.

Locus affectus ut diftinguendus.

Προσπεσόντων caufæ funt vitiofa & concoctu difficilia alimenta, doloremque in ventriculo excitantia: (dolor enim in qualibet parte excitat fluxionem, & ad fe trahit humores vitiofos) violenta pharmaca & ictus violenti. Omnis autem tumor præternaturalis in qualibet parte inter duas contiguas partes oboritur, quas fua mole ab invicem diftendit & dolorem excitat.

Signa apoftematis ventriculi funt, dolor in aliqua parte ventriculi, præfertim ad tactum & compreffionem affecti loci proftitatio appetentiæ, concoctionis fruſtratio. Si tumor in exteriore ventriculi parte hæreat, ad tactum & compreffionem; fi in ipfa capacitate fit fitus, poſt aſſumpta alimenta maxime duriora, anxietas & doloris exacerbatio ſubſequitur. Si in officio ventriculi tumor exiſtat, ſentitur dolor circa malum granatum, & exacerbatur inter cibum aſſumendum, adeo ut sæpe in ſyncopen conjiciat ægrotantem. Si tumor in fundo ventriculi fit compactus, dolor ſentitur paulo ſupra umbilicum, & exacerbatur tribus à ſumpto cibo horis.

Prognofica.

Præſagire ex tumore ventriculi licet, tumorem ventriculi ex calidis putridisque humoribus, præfertim in interna capacitate ventriculi hærentem, raro in ſanitatem, frequentiffime in mortem, aut in ſchirrum, per totam vitam hominem infeſtatem terminari.

Curatio.

Curatio tumoris ventriculi tentanda eſt per venæ ſectionem, victus rationem, tumorisque per medicamentorum, intus forſique applicatorum, maturationem, ruptionem.

ſive apertionem, mundificationem & conſolidationem.

In calida itaque corporis conſtitutione, *Intumore calido.* tumoreque calido exiſtente, ſtatim aut media aut jecoraria vena dextri humeri incidenda erit. Alimenta vero ſint parca & *Vena ſcilio.* quam tenuiſſima, concoctuque faciliſima, veluti ſunt cremor ptifanæ, cremor avenæ, juſcula pullorum gallinaceorum, pulmenta ex oryza tuſa, ex amylo, & lacte caprillo conſecta & ſaccharo dulcorata. Item lac caprillum ſerveſactum, & ſaccaro conditum, lac amygdalinum & ſimilia. Potus vero ejus ſit aqua hordei in qua cinamomum eſt decoctum. *Dietæ.*

Si itaque præter abſceſſum ſimul & vitioſi humores fluitaverint in ipſa capacitate ventriculi, hi leniſſimis catharticis remediis expurgandi veniunt. Abſtinentium tamen eſt ab omnibus violentis purgantibus remediis. Tuto vero exhiberi poſſunt vel ʒ i. s. pulpæ caſſiæ una hora ante prandium; aut ʒ i i i. ſyr. roſari ſolutivi cum hauſtulo aquæ abſinthii commixta, & in aurora exhaustæ aut infuſionis rhabarbari ac foliorum ſennæ q. s. cui admixta ſit ʒ s. elect. lenitivi, aut ʒ ii. Diaphaniconis. Deinde cum *Purgantia lenitiva hic conveniunt.*

interni abſceſſus ventriculi difficilius externis remediis, veluti ſunt unguenta, cataplaſmata & emplaſtra, curentur quam internis, interni abſceſſus internis remediis primum emolliendi, maturandique, deinde aperiendi & mundificandi ſunt remediis in forma potionis & electuarii exhibitis, & interea tamen nec exteriora negligenda erunt. Emolliat autem atque ad maturitatem perducit tumorem ventriculi decoctum ficuum & ſem. malvæ frequenter potum. Aut elect. ex mucaginibus rad. althææ, ſem. fœnugræci, ſem. lini & malvæ cum ſaccaro albo inſtar pulmenti craſſioris conſectum & frequenter eſtratum. *Interni abſceſſus quibus remediis curandi.*

Foris autem primum inungendus eſt ventriculus abſceſſu affectus ſequenti linimento.

ʒ. Ol. chamæmeli, roſarum, cytoniorum, abſinthii, è maſtich. an. ʒ i i i. Ceræ albæ q. s. fiat linimentum, quod *Linimentum.*

quod cum aceto rosaceo eluatur, & tandem admisceantur tenuissimi pulveres coralliorum rubeorum & mastiches an. ʒ i. ol. cinamomi gr. v. & inungatur locus affectus singulis diebus bis. Post inunctionem imponatur cataplasma tumorem simul emolliens ac maturans, & ventriculum corroborans, quod ita concinnari potest.

Cataplasma emolliens & ventrici corroborans.

℥. Pulpæ malorum cytoniorum in cineribus coctorum & pulpæ prunorum dulcium an. ʒ i. Mucaginis ex sem. lini, fenugraci, rad. Althææ, & ficibus simul confusis, ac in tepida aqua maceratis, confectæ ʒ ii. Ol. amygdalarum amararum, chamæmeli, violarum, pinguedinis gallinarum an. ʒ s. quibus liquoribus simul probè commixtis, admisceantur pulveres sem. malvæ, flor. absinthii an. ʒ i. calami aromatici ʒ s. croci ʒ s. mastiches ʒ s. farinæ hordeaceæ q. s. ad justam condensationem, ut reddatur simile pulmento crasso. Tandem admisceantur quoque ovorum lutea n. iiii. & fiat cataplasma, quod calefactum affecto loco bis per diem imponatur.

Ad astuantem tumorem remedia. Inunctio. Emplastrum refrigerans & emolliens.

Ubi autem astuans & vehementer calidus est tumor, inungendus est oleo rosaceo, & sequenti emplastro fervor mitigandus, quod simul & refrigerat & emollit.

℥. Ol. rosarum, cytoniorum an. ʒ ii. & mastiche ʒ i. Mucaginis ex sem. cytoniorum cum aq. absinthii paratæ ʒ i.

Ceræ q. s. fiat emplastrum, cui tepido admisceantur pul. sandali rubei, rosarum rubeorum ʒ iiii. flor. absinthii ʒ i. mastiches, coralliorum rubeorum an. ʒ ii. rad. althææ & farinæ hordeaceæ q. s. fiat emplastrum.

Vbi abscessus maturus quid agendum. Rumpen-

Porro ubi tumor ad maturitatem est perductus, hoc est, concoctum est pus in tumore quod in abscessu continetur, id quod ad septimum circiter diem contingit, quæ pelliculas tumoris incidant & rumpant, intra

corpus exhibenda erunt. Id autem commo-
distissime præstabitur ʒ s. ol. vitrioli rectificati, aut ʒ i. tincturæ coralliorum rubeorum, cum vini quinque cochlearibus commixtus, & quotidie assumptus.

Rupto apostemate & effuso pure in capacitatem ventriculi, ut plurimum anxietatem & vomitionem excitat. Tum itaque vires reficiendæ sunt, & sedanda anxietas assumptis ʒ ii. aq. cinamomi, & si natura fert, pus per vomitum ejiciendum: verum ubi natura à vomitione abhorret, vel laboriose quis vomat, tum pus acri clystere subducendum erit, quod ita concinnari potest.

℥. Malvæ, violariæ, mercurialis an. M. i. Enema.

Flor. absinthii, chamæmeli, centaurei minoris an. M. s. concilia decoquantur in q. s. aquæ ad medias, cui in fine ebullitionis injiciatur pulpæ colocynthidos ʒ i. in linteolo ligatæ, quæ tamen inter percolandum rursus eximatur, hujus liquoris colati accipe ʒ xv. quibus admisce hæræ simpl. ʒ i. s. ol. de absinth. ʒ iiii. salis communis ʒ i. misceantur, fiat clyster, quod je juno ventre recto intestino infundatur.

Subducto pure ulcus ipsum mundificetur sequenti potione.

℥. Mellis rosati ʒ ii. aq. absinthii ʒ iv. Potio ulcus misceantur fiat potio, ex qua frequenter bibat: aut bibat hydromel vetus & clarum.

Ulcere mundificato, per unum & alterum diem, deinde exhibeantur conglutinantia, & ad cicatricem deducantur. Assumat itaque mane ac vespere ʒ s. ol. mastiches cum haustulo hydromelitis, aut ʒ iiii. terebinthinæ cum aq. symphyti novies ablutæ, cum haustulo hydromellis resolutæ.

9. Cruditās ventriculi quid, quæ ejus causas, quæ signa, & quomodo curanda?

Ἀπείψια id est concoctricis facultatis ventriculi labefactio & amissio, Δυσπείψια id est difficultas concoctionis, & βεβόνησις id est.

R r 3.

Abscesse.

Rupto apostemate ut pus educendum.

Enema.

Consolidantia ulcus.

Vitia concoctionis ventriculi.

*inter se
differant.*

*Varia ali-
menti co-
ctio & al-
teratio.*

Causæ.

*Signa cru-
ditatis ge-
neralia.*

*Nidorosus
ructus
quid deno-
tet.*

*Acidus ru-
ctus quid
significet.*

*Quis hu-
mor in
ventriculo.*

Curatio.

id est tarditas concoctionis, extensione & remissione tantum differunt. Est autem concoctio alimenti ejus ab innato calore ventriculi in substantiam cremori prisanæ similem conversio. Porro alimentum antequam in corporis naturam & partium substantiam convertatur, quatuor sustinet concoctiones sive alterationes, primam in ventriculo, secundam in epate, tertiam in venis, quartam in ipsis membris, ad quæ in forma sanguinis per venas deferuntur alimenta. Sed hoc loco de vitiata concoctione ventriculi loquimur tantum.

Causæ cruditis sive vitiatæ concoctionis in ventriculo *προνυγδυσαι* sunt, aut intemperies frigida vel calida ventriculi, aut humores vitiosi in ventriculo collecti, aut abcessus in ventriculo.

Προνυγδυσαι causæ sunt, cibi potusque assumpti vitiosæ qualitates, aut nimia durities, & velox corruptibilitas, aut assumptorum immodica copia, aut intempestiva assumptio. Item vigiliæ & lucubrationes intempestivæ, quæ perpetuo cruditates & appetentiæ prostrationem generant.

Signa cruditis perpetua sunt, eructationes crebræ, nausea & gravitas ventriculi, vitiosique corruptorum ciborum in ore sapores, scædi coloris ac graveolentia excrementa, speciatim autem nidorosæ eructationes, aut intemperiem calidam ventriculi, aut vitiosorum humorum in ventriculo inflammationem, aut alimenta calidæ qualitatis assumpta esse docent. Acidæ vero eructationes generantur aut ob frigidam ventriculi intemperiem, aut humores frigidos & pituitosos in ventriculo collectos, aut alimenta frigida, & ad pituitam generandam apta assumpta. Præterea oris humiditas & continua expunitio, pituitosa excrementa: oris autem amaritudo & siccitas linguæ, bilem flavam in ventriculo contineri ostendunt. Alia signa cruditis ventriculi ex relatione ægrotantis investigari possunt.

Curatio pro causarum diversitate variabitur. Ac primum cognita intemperie, aut vitiosorum humorum qualitate, remedia sunt adhibenda; frigidæ intemperiei cali-

da, calidæ frigida, & vitiosi humores convenientibus remediis evacuandi, quorum copiam paulo ante in curatione imbecillitatis ventriculi enumeravimus. Generatim autem, si hominis natura sit prona ad evomitionem, vomitus præsentissimum est remedium omnis cruditis ventriculi. Procurabitur autem vomitus aut haustu aq. tepidæ, aut pulvisculi florum juglandium 3 i. in aqua tepida assumpti. Post evacuationem autem per vomitionem, corroborandus est ventriculus, & calor ejus natus restaurandus, præsertim in frigida intemperie, id quod probe præstat semisrupulus olei vitrioli cum vini haustu commixtus, & jejuno ventriculo per paucos dies ebibitus, aut si jejuno ventriculo quotidie assumantur tria cochlearia aq. juniperi aut aq. cinamomi.

Ubi vero intemperies calida ventriculum infestat, loco prædictorum remedium calidam intemperiem mitigantia quotidie sunt assumenda, qualis hæc est potiuncula.

℞. Syr. granatorum, acetositis citri an. 3 i. s.

Aq. stillat. absinth. 3 vii. commisceantur & fiat potio.

Acida omnia cum edulia tum medicamenta, ac potissimum omphacia in jusculis cocta, calidam intemperiem mitigant, & cruditatem inde ortam auferunt. Reliqua remediorum genera huc transferenda sunt pro causarum varietate, ex curatione imbecillitatis ventriculi.

10. *Appetentia prostratio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?*

Ανοξεία, id est appetitionis amissio, sive cibi fastidium, est ubi homines ad cibi mentionem exhorrescunt, aspectumque cibi averfantur, & nauseabundi efficiuntur.

Causæ hujus symptomatis *προνυγδυσαι* infinitæ fere sunt: Omnis siquidem morbus, præsertim interiorum viscerum, & membrorum nutritioni servientium; omnis denique dolor, per *συμπάθειαν* ac consensum prosternit appetentiam.

Præcipuæ autem internæ causæ, de quibus hic nobis sermo, est orificii ventriculi

*Vomitus
cruditis
remedium
præsentiss.
Vomitoria.
Decoctum
asuri quæ
in hoc casu valde
juvat.
Ventricu-
lum robo-
rantia.*

*Potio ven-
triculum
calidum
alterans &
corrobo-
rans.
Acida ven-
triculum
roborant.
Conserva
rosarum
cum spir.
vitrioli, ut
& conserva
citri
eodem
modo con-
veniant.
Appetitus
læso quid.*

*Causa in-
terna an-
tecedentes.*

Proxima.

& re-

& venarum mēfaraicarum intemperies & a vitiosis humoribus obstructio. Venarum enim mēfaraicarum actio est chyli ex ventriculo & intestinis suctio, & ad ep̄ar delatio, quæ ubi à crudis alimentis obstruuntur, amittitur appetentia.

Externa.

Προγναστικῆς causæ sunt plerunque omnes accidentales, veluti sunt ingluviēs, ebrietas, & contrectatio rerum abominabilium, veluti cadaverum, item ciborum venenata qualitate imbutorum assumptio.

Signa.

Signa prostratæ appetentiæ manifesta sunt, ejusque causæ ex ægri narratione explorari possunt. Communiter tamen perpetuo ad ciborum mentionem & oblationem nausea subsequitur.

Prognostica.

Signa prognostica sunt, si appetentiæ prostratio in principio alicujus morbi aut acerbioris doloris accidat, nihil aut parum mali significat: Tum enim modico alimento natura indiget. At si vero in morbi declinatione, aut post diuturnam imbecillitatem, aut post violentam evacuationem amittatur appetentia, tum periculo minime vacat.

Curatio.

Curatio hujus symptomatis consistit in causarum, hoc est, morborum præcedentium ablatione. Quomodo autem & quibus remediis singuli morbi persanandi sint, suis in locis indicabitur. At si ex orificii ventriculi aut intemperie, aut vitiosorum humorum impactu, aut mēfaraicarum venarum obstructione, amittatur cibi appetentia, pro ratione intemperiei, & vitiosorum humorum qualitate, curatio instituitur, & remedia ex imbecillitate ventriculi huc transferantur. Utilissimum autem est statim ventriculum venasque mēfaraicas vomitoria potione, quæ supra commemorata est, evacuare: aut potiuncula ex ʒ i. hieræ & ʒ s. cassiæ recenter evulsæ cum haustu aq. absinthii commixtæ, subducere. Egrege autem venas mēfaraicas ab obstructione liberat sequens Clyster.

Vomitoria.**Horum****formulas****vide sēct.****hujus q. 5.****de ventr.****imbecillitate.****Hac potio****cum ad-****modum****ingrata****sit, scrup.****semis****gummi**

ʒ. Flor. chamæmeli, absinthii, centaurii minor. menthæ an. M. i. concisa decoquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, & colati juris accipiuntur ʒ xiv. eisque admiscean-

tur hieræ simp. ʒ i. s. ol. absinth. ʒ iiii. salis ʒ i. fiat enema, quod jejuno existente ventriculo tepidum recto intestino infundatur.

Post ventriculi venarumque mēfaraicarum evacuationem, exhibeantur ægro guttulæ xv. ol. vitrioli rectificati, aut guttulæ ix. tincturæ corall. cum haustu vini generosi. Aut si non obstet calida corporis intemperies mane ac vesperi exhibeantur 2. cochlearia aquæ cinamomi, aut aq. juniperi, aut sequens tragea.

ʒ. Cinamomi electi ʒ ii. macis, cardamomi, galangæ, zinziberis an. ʒ i. coralliorum rubeorum præparatorum ʒ i. sacchari albißimi ʒ ii. pulverata commisceantur, fiat tragea, cujus unum cochlear super laminam panis simillacei tostam, & in vinò generoso maccratam inspergatur, & ægroto edendum offeratur.

In appetitus prostratione fercula varia, sed modica, & exquisite apparata ægroto offerantur. Et si quæ expetat, etiam si sint paulo deteriora, & naturæ minus convenientia, edere tamen concedantur.

Foris ventriculus & dextrum hypocondrion inungendum est oleis ac linimentis supra in imbecillitate ventriculi commemoratis, & imponendum ventriculo emplastrum de crusta panis, cujus conficiendi ratio in mytopoliorum dispensatorii libellis extat.

ii. *Voracitas sive canina appetentia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Κυνόδης ὀρεξίς, Canina appetentia est insatiabilis vorandi cibi cupiditas: Quæ laborant, iis ventriculus ab assumpto cibo gravatus, alimenta adhuc cruda evomere coguntur, nec tamen inde remittit fames nostratibus, vel vorandi desiderium, & ita alternatim vorando ac vomendo semper occupati sunt, veluti canes aut lupi cadaveribus incumbentes. Mihi per 40. annos jam Medicinam facitanti nullus unquam in hisce septentrionalibus regionibus hujusmodi affectione laborare visus est.

gutta noviter ex India alati cum syr. rosato vel ex infusione violarum hic posset exhiberi. Enema. Appetitum excitantia. Tragea stomachalis.

Diata qualis insituenda. Hipp. aph. 38. l. 2.

Inunctio ventriculi.

Appetentia canina Die Schlink suchit! nostratibus, qualis affectus.

Vnicum

Vitium tamen exemplum anno 1616. in foemina quadam ego M. B. observavi, quæ post febrim continuam misere per aliquot septimanas hoc molestissimo affectu afflictæ fuit, tandem tamen Dei beneficio remediis à me præscriptis integra sanitati fuit restituta.

Quam plurimi autem, maxime in nobilium conviviis & heluationibus, canina laborare ingurgitatione visi sunt, qui vomendo & regurgitando integras noctes consumeabant.

Causa. Causæ *αετηνική* Caninæ appetentiæ sunt, acidus aliquis humor ac tenuis, veluti sunt ferola pituita, & tenuior pars melancholici humoris, ventriculi orificio, tanquam aqua spongiæ impactus, continue orificium ventriculi vellicans. Alii falso addunt frigidam intemperiem ventriculi.

Signa. *Ηγορστική* causæ nullæ possunt dari, nisi forsitan sint venenatæ potiones, ventriculi tunicas vellicantes atque corrugantes.

Signa caninæ appetentiæ ex ipsa descriptione manifesta sunt, & post vomitum ut plurimum acidi ructus subsequuntur.

Curatio. Curatio consistit in moderatione ingerendi alimenta, victus ratione & medicamentorum adhibitione.

Dieta. In victus ratione conveniunt iis quæ cito saturare possunt, veluti sunt alimenta pingua, carnes & sorbitiones pingues aut butyro, aut oleo copioso conditæ. Potissimum autem conveniunt oryza cum mæsto butyro cocta, & ova in sartagine cum butyro cocta.

Vinum generosum. Et quia Hippocrates 2. Aphor. 21. dicit, famem vini potione solvi, præstantissimum remedium est in canina appetentia frequenter micam panis vino generoso imbutam, vacuato ventriculo devorare, & haustum vini tepidi assumere.

Remedia. Medicamentis catharticis in tali affectione parum efficere possumus: præstat tamen quotidie jejuno ventriculo assumere 3 i. specierum hieræ simpl. cum haustulo vini; aut elect. hieræ simp. 3 s. in aqua tepida resolutam, propinare. Hieræ enim, Galeno teste, præterquam quod ventriculum mirifice corroboret, etiam exsiccat & absomit

vitiosos humores ventriculi tunicis impactos. Sed longe efficaciora remedia sunt ad profligandum hoc malum, si indies guttulæ vir. ol. virioli, aut 3 s. tincturæ coralliorum cum haustulo vini generosi commixtæ & post vomitum assumendæ offerantur. Compescit quoque vomitum post saturitatem 3 s. ol. caryophyllorum aut ol. è mastiche chymica arte destillati, & cum haustulo vini assumpti. Neque negligenda est externa inunctio ventriculi. Inungendus autem est ol. è mastiche, citoniorum & myrtillorum aut sigillatim aut simul mixtis.

12. *Pica ventriculi quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Kitta, pica est vehemens appetentia infuorum & vitiosæ qualitatibus eduliorum, aut rerum talium à quibus edendis alias natura sana abhorret, veluti sunt argilla, carbones, pix liquida, carnes crudæ, frustula humanæ carnis & similia. Et tanta est vis hujus satæ appetitionis in quibusdam mulierculis, ut nisi satisfiat earum desiderio, aut abortiant, aut stigmata rei desideratæ sæturi imprimantur. Solet autem gravidis hoc malum accidere quadragesimo die à conceptu, & durare ad quartum usque mensem ac tandem cessare.

Causæ *αετηνική* sunt humores excrementitii sanguini menstruo commixti, in ventriculum ascendentes & orificio ventriculi impacti: *αετηνική* causa in foeminis plerumque est seminis in utero concepti.

In viris si contingat, uti Fernellius etiam observavit, ex humore præternaturali, sui similis rei appetitum excitante oritur.

Signa picæ sunt manifesta; & ut plurimum pica laborantes mulierculæ crebro expuunt, moriones circa orificium ventriculi, nauseam & anxietates sentiunt, quandoque etiam evomunt. Vitiosi vero humoris genus & qualitas ex iis, quæ per vomitum sunt ejecta, deprehendi possunt. Securi enim humores & pituitosi ex albo, biliosi ex croceo atque viridi, melancholici & menstruosi ex nigredine discernuntur.

Vomitioria eradicativa, quæ impactam acidam materiam plane tollunt, magis hic conveniunt.

Inunctio ventriculi.

Pica qualis affectus.

Gravidis familiaris quamvis & in viris quibusdam etiam observetur.

Causa.

Signa effectus.

Signa maris tertia pectus cantis.

Curatio

Curatio.

Vomitum
provocan-
dus.

Curatio in hoc malo instituenda est vitus ratione, & usurpatione medicamentorum. Omnium autem primum ad evellendos vitiosos humores vomitus facilis haustu aquæ tepidæ aut haustu hydromelitis, in quo decoctæ sunt radices raphani assumpto pro-ritandus erit.

A purgantibus enim medicamentis per inferiora in gravidis penitus abstinendum est, monente Hippoc. l. 4. Aphor. 1.

A validioribus quidem, sed à benignis & lenioribus, quales jam in usu sunt, non adeo abstinere oportet, cum eorum usu sæpe pica tollatur & rectius degant gravida, sicuti sapius ipsemet expertus sum. Quod & Ferrius suadet l. 5. Phisic. c. 19.

Post vomitum offeratur patienti buccella panis tosti, in succo cytoniorum aut in succo granatorum macerata.

Cibi offe-
rendi pica
laboranti-
bus.

Cibis utatur qui non facile putrescant ac corumpantur in ventriculo, tales sunt pedes suilli, & tali ovium probe cocti, & aceto conditi: conveniunt & pisces saxatiles atque squamosi: convenientissimum autem edulium est picæ laborantibus pulmentum ex amylo recenti factum, & sæpe esitatum. Ex fructibus conveniunt fructus olivarum immaturarum muria conditarum. Item amygdalæ amaræ frequenter esitæ. Pro claudendo autem ventriculo post cibum assumptum utatur prunis sylvestribus saccaro conditis, aut cytoniis conditis. In potu utatur vino moderatè austero ac potissimum rubeo, aut si vinum averlantur, convenientissima potio est aqua, in qua cinamomi frustula, & femina coriandri sunt incocta.

Olivæ.

Potus.

Loco remediorum utantur mane ac vesperi radicibus cichoræ conditæ aut sequenti electuario.

℞. Cytoniorum conditorum, rad. cichoræ conditarum an. ʒ i. carnis prunorum silvestrium ʒ s.

Concidantur minutissime & cum q. s. Rob. è ribes, fiat electuarium, cui admisceantur coralliorum rubeorum præparatorum, cornu cervi usti & præparati an. ʒ s. ol. caryophyllorum ʒ s. fiat electuarium, de

quo assumat ægra mane ac vesperi q. semijuglandis.

Interim nec topica externaque remedia in hoc malo prætereunda erunt. Inungatur itaque ventriculus oleis ex cytoniis aut nardino aut mastichino, sive solis, sive inter se mixtis, foveaturque ventriculus sacco concinnato.

℞. Menthæ, rosarum an. M. ii. abinthii M. i. mastiches ʒ s. caryophyllorum ʒ ii. concisa & contusa confuantur in sacculum, & concoquantur cum vino rubeo, & exprimatur, tepidusque ventriculo imponatur.

13. Intolerabilis & cito in syncopen conjiciens fames quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?

Βελιμία, ingens & subita fames est: λι- Bulimos enim famem significat, βε autem par-ticula extendit & auget significationem vocabuli. Differt autem βελιμία à canina appetentia: Non enim in βελιμία assumpta appetentia removet æger, nec ita diu, ut in canina appetentia, perseverat fames, sed nisi statim alimento convenienti aut remediis succurratur, paulo post prosternitur appetentia, & averfatur oblata cibaria, ita ut nec coacti assumere queant, ac deinde incidunt in animi deliquium, quo & sæpe extinguuntur. Βελιμία & canina appetentia in borealibus regionibus rarissima sunt, & mihi quidem nunquam visa symptomata.

Memini tamen aliquot exempla bulimo laborantium, unicuique tantum canina appetentia.

Causam τῆς βελιμίας omnes ferè Medici unam tantum eamque ponunt, officii videlicet ventriculi ab externa aëris frigidityte vel nivis vel glaciei, refrigeratione, ajuntque iis præsertim accidere, qui iter in Alpibus nivosisque locis faciunt, quod sane mihi verisimile non videtur, cum quotidiana experientia testetur, quod ii, qui in Alpibus aut frigidis locis iter faciunt, vehementer refrigerati non fame, sed potius profundissimo & inevitabili sopore

Topica.

Inunctio
ventriculi.

Sacculus.

A canina
appetentia
differt.Opinio a-
liorum.Hac causa
si admit-
tenda, bu-
limon ex-Electua-
rium ven-
triculorum
post ova-
nationem
robotans.

citāt calo-
rem intro
propellendo
ibique au-
gendo, ut
eo citius af-
sumpta
concoquat,
& novi a-
limenti
appetitus
consequa-
tur.
Authoris
opinio.
Signa.

re oppressi extinguantur. Ego vero hujus mali causas *αὐτογενεῖς* putarem esse humorem gypseum aut acidum, eumque venenata qualitate imbutum, ventriculi interiorē tunicam convellentem, aut lumbricos ventriculi orificio inhærentes idque erodentes & vellicantes, teste Alexandro Traliano l. 7. c. 6.

Signum hujus symptomatis est repentina & intolerabilis fames, quæ non usque adeo diu durat, sed nisi statim convenientibus alimentis odoramentisve, aut medicamentis succurratur, repente prosternitur appetentia, & in animi deliquium incidit æger: quod subsequitur externarum partium refrigeratio & sudor frigidus. Si lumbrici *βελγίαι* causæ sunt, erosio orificii ventriculi semper adest.

Curatio.

Curatio. Ni subito huic malo occurratur, actum erit de salute patientis. Statim itaque & victus ratio, & medicamenta calefacientia, gypseumque humorem resolutiva, & venenosam qualitatem discutientia adhibenda erunt.

Remedia
famæ syn-
copalis.

Præstabit itaque patienti statim ubi conqueritur, buccellam panis in vino generoso sive Cretico maceraram offerre, & paulo post exhibere tria aut quatuor cochlearia aq. juniperi chymica arte destillatæ, aut duo cochlearia aq. cinamomi, aut 3 r. Theriacæ Andromachi. Hæc enim omnia frigidos & venenosos humores recalefaciunt, extenuant & discutiunt. Postea cibare eos convenit, si adhuc fames eos urgeat, carnibus porcinis assatis, ovis forbilibus & caseo, non tamen rancido, nec recenti, aut nimia vetustate corrupto, sed paululum subdureo & bene odorato, quales sunt casei Helvetici aut Rugiani.

Lotio ma-
nuum ac
pedum.

Præterea utile est in hoc symptomate pedes ac manus aqua calida, in qua incoctæ sunt mentha, pulegium & folia rorismarini, lavare ac fovere. Naribus autem admovenda sunt odoratissima quæque, veluti sunt ol. spicæ, nucum moscatarum, moscus, & acetum in quo pulegium & caryophylli sunt incocti. Sed mirifice confert & nidor recenter pisti panis. Notandum quod nihil

Odora-
menta na-
ribus adhi-
benda.

æque celeriter vires collapsas rescire & spiritus vitales dissolutos potest colligere & colligere odor. *Hippoc. l. de alimentis.* Restaurant ro. quoque vires collapsas rotula una aut duo confectionum diamoschi, diambrae, aromatici rosati, & similibus bis terve in die assumptæ. Post vires aliquantulum restauratas, præsertim in gypseo humore discutiendo præsentissimum remedium est, singulis diebus gutt. x. ol. vitrioli aut tincturæ corall. chymica arte confectæ & cum haustu- lo vini assumptæ. *Si ol. cinamomi irruentur, efficiuntur resistent.* Pro ol. vitrioli spiritus assumendus.

Ubi prostrata est appetentia, varia cibaria optime condita sæpiusculum sunt offerenda. *Ad prostratam appetentiam.*

Foris inungendum est orificium ventriculi calidis oleis aut Nardino aut Mastichino, aut è mentha, quibus pauxillum aq. juniperi est admixtum. Viribus tandem paululum resectis, expurgentur è ventriculo vitiosi ac venenati humores potiunculis vel vomitoriis paulo ante aliquoties commemoratis aut seq. bolo.

24. Cas. recenter evulsæ 3 s. cui admisce

3 r. spec. hier. simpl. & devoretur in aurora. Aut si propter amatorem comedi nequeat, resolvatur cum haustu- lo aq. absinthii & ebibatur tepidus. *Bolus. Haustus catharticus.*

Si vero *βελγίαι* causam lumbricos esse suspicio est, exhibeatur per triduum mane ac vespere 3 r. aut 3 r. spec. hier. simpl. quibus admixta sint olei vitrioli guttulæ vi.

10. Nausea & vomitus quid, quæ horum symptomatum causæ, quæ signa, & ut curanda?

Nausea & vomitus sunt symptomata cohiberi in gnata, in quibus ventriculus depravato motu conturbatur, & nausea quidem est vomendi desiderium & conatus, quæ ut plurimum præcedit vomitum, quamquam sæpè non subsequitur vomitus, sed est sterilis & inanis vomendi appetentia, & nihil præter aquam pellucidam ex ore profluit. Vomitus autem est eorum, quæ in ventriculi capacitate continentur, violenta per os rejectio & expulsio. *Lumbrici quibus expellendi. Possunt & turpes mineralis aliquot grana ex hoc casu. Nausea quid.*

Nausea itaque & vomitus extensione tantum & remissione differunt, ex iisdem enim causis oboriuntur. *Vomitibus. Horum symptomat. differentia.*

Causæ horum symptomatum *αὐτογενεῖς* Cause in-
vici terna.

vix quidem sunt dissolutio & lubricitas ventriculi ab aliquo vitioso humore venenato pestilentique in ventriculo contento, sive is humor sit pituitosus, sive biliosus, sive melancholicus, sive simul mixtus. Tales autem humores aut generantur in ipsa capacitate ventriculi ex intemperie aliqua, aut in ventriculum aliunde ex aliisque visceribus, ex capite, epate, liene, matrice & intestinis influunt.

Causæ externe.

Προγινωσκτικαυ causæ sunt cibi facile corruptibiles ut anguillæ, aut venenata acrique qualitate imbuti, aut majori copia quam natura tolerare potest ingesti & in ventriculo corrupti in bilemque prassinam aut pituitam vitiosam conversi. Item horribilium rerum aspectus, & totius corporis gyratio diuturnior circularisque motus, & insueta navigatio.

Signa causarum diversarum.

Signa nausæ vomitionisque conspicua sunt: ex quibus autem causis oboriantur, varia ad earum cognitionem signa sunt consideranda. Ut primum, si dissolutio ventriculi ex intemperie aliqua, causa est humorum vitiosorum, quos natura per vomitum expellere conatur, ventriculi molestiæ ac dolores manifeste sentiuntur. Ubi vero per

An per sympathiam alterius partis.

sympathiam ventriculus conturbatur, id est, ubi ex aliis visceribus profluunt humores vitiosi in ventriculum, aut præcessit aut simul adest partium illarum gravitas & ægritudo, & sentitur dolor aut capitis aut dextri hypochondrii, ut in epatis affectione, aut sinistri in lienis debilitate. Humores autem vitiosi in ventriculo contenti & vomitum proritantes cujusnam sint generis, cum ex ructu, tum etiam ex colore evomitum internoscuntur. Ructus siquidem acidus pituitam, nidorosus adustam materiam, amarus bilem flavam, in ventriculo hæere indicat; ita color albus pituitam, flavus bilem flavam, prassinus bilem viridem inhæere ventriculo significat.

Prognostica.

Prognostica signa & breves hæ præceptiones in vomitionibus studiose sunt observandæ. A vomitu singultus & oculorum rubor malum, id est, perniciosum est signum; Hippocrat. Aphor. 3. l. 7.

Vomitum quinam perniciosus.

Item vomitus à tuberculorum id est apostematum interiorum viscerum ruptione, & in febribus pestilentibus, & in ilio morbo communiter perniciosus est; Hippocrat. 8. Aph. l. 7.

Vomitio salutaris est si pituita non adeo crassa bile permixta evomatur; deterior autem si sincera bilis, aut prassina aut colluvies humorum nigra lividaque projiciatur.

Omnis suppuris & foetida vomitio exitiosa habenda est; Hippocrat. l. 2. prognostic.

Si vomitiones spontaneæ sint, ac potissimum à cibis, æger melius habet. Vomitio in initio morbi accidens, aut die critico, aut in repletionem ventriculi minime est reprimenda, nisi vires nimium prosterнат. Nam, Hippoc. l. 1. Aph. 2. teste, in vomitionibus spontaneis si talia evacuentur, qualia purgari oportet, confert plurimum, & leniter fuerunt, sin minus contra.

Qui facile vomunt, ii si vere & autumno ventriculum per vomitum evacuent, plurimum conducit ad valetudinem: crebro autem qui vomunt, cloacam ex ventriculo faciunt, & citam senectutem adsciscunt, Avicenna & Celso testantibus. Immoderata vomitio si vires prosternere incipiat, statim cohibenda erit.

Curatio pro causarum diversitate varianda erit. Si igitur ventriculus vel colluvie vitiosorum humorum, vel alimento à pestilenti qualitate imbuta vel corrupto gravatur, non modo non cohibenda est vomitio, sed & mox per haustum aq. tepidæ cui sal sit admixtum, aut haustulo decocti rad. raphani epoto, ac paulo post digito in fauces immisso, vomitio irritanda erit. Vomitum enim vomitu frequentissime curari solet.

Post sufficientem vitiosorum humorum evacuationem, si & intemperies ventriculi sit frigida, & evomiti humores sint pituitosi, plurimum conferunt guttulæ 5. aut 7. ol. vitrioli aut tinctura coral. cum haustu vini generosi, aut aq. stillat. menthæ commixta & exhibita.

Verum si corrupti humores calidiores atque biliosi extiterint, abstinendum est à supra dictis liquoribus, & loco eorum quod

Quisnam vomitus sit reprimendus.

Vnde vomitus salubris agnoscendus.

Tempus conveniens vomitioni. Crebra vomitionis incommoda.

Curatio.

Vomitum vomitu curandus.

*vomitum
exhiben-
da.*

Pulvis.

*Vomitio-
nis, per
consensum
alterius
partis, cu-
ratio.*

*Partes
mittentes
primum
curanda.*

*Ventriculo
convenien-
tia reme-
dia.*

Dieta.

*Cibi salu-
bres.*

*A cibo as-
sumenda.*

Naribus

tidie post vomitionem offerenda est patienti
3 r. sequentis pulvisculi commixti cum
haustulo aq. menthæ.

24. Aloës puriss. 3 r. Mastich. corall.
rub. præparat. an. 3 r. Misce tenuis-
sime pulverata, cujus 3 r. cum cre-
more ptisanæ, aut jusculo in quo u-
væ immaturæ sunt incoctæ ebibenda
propinetur.

Porro si humores vitiosi ex toto corpore in
ventriculū defluentes sint vomitionis causæ,
tum per humoris vitiosi speciem quæ ex uri-
na & colore corporis internosci potest, e-
jus humoris vitiosi methodica curatio susci-
pienda concoquendo, & ex universo cor-
pore evacuando convenientibus remediis,
quorum copia ex generalibus tabellis supra
annotatis, & ex his quæ infra in universali-
bus morbis curandis dicentur, petenda est.
Simili ratione si vomitionis materia vel ex
cerebro vel ex epate, liene aut matrice vel in-
testinis defluant, primum affecta pars quæ
materiam in ventriculum ablegat, diligenter
curanda est remediis in particul. singularum
morbis curandis descriptis. Nisi enim par-
tes corporis quæ vomitionis causam vitio-
sosque humores in ventriculum demittunt
prius probe purgentur, frustra vomitum
compescere conamur.

Interim tamen dum vel universum corpus
vel partem affectam curare studemus nec i-
pse ventric. negligendus erit. In vomitu ita-
que omnium primum victus ratio conve-
niens & causæ contraria concoctu facilis,
& à qua debilis ventriculus minime offenda-
tur, instituenda est. Conveniunt autem
potissimum cremor ptisanæ, carnes pullo-
rum, vitulorum, columbarum, & lepo-
rum, jusculaque, quæ omnia pro qualitate
vitiosi humoris, aromatibus, aceto, melle
defæcato, vel saccharo condiri, vel non
condiri debent. His addi possunt & pruna
Ungarica vel Damascena & lac amygdali-
num. Post cibum sumptum utatur æger py-
ris moscatellinis conditis, aut cytonis, aut
diacytonite simp. ex succo confecto. Cor-
roborant enim ventriculum & claudunt ejus
orificium. Prodest & odoramentis suavis-

ribus naribus ad motis frequenter uti, præ-
sertim ubi nausea infestat hominem, inter
quod præstantissimum est panis tostus aceto-
rosac. & pulvere caryoph. aut menthæ sic-
cæ aut rosarum conspersus. Odor quoque
mali cytonii confert plurimum. Foris au-
tem semper ante cibi assumptionem inunga-
tur ventriculus, in frigida quidemejus intem-
perie, ol. è mentha, absinth. mastich. nard.
similibus singulatim per se aut simul ni-
xtis. In calida vero intemperie ol. rosarum,
ex myrtillis, cyton. ac similibus. Post
sumptum cibum applicentur orificio ven-
triculi emplastr. scutiforme de crusta panis,
cujus descriptio extat in lib. pharmaco-
polorum, quos dispensatoria vocant. Aut
imponatur crusta panis tosti digiti crassitiem
æquans vino generoso imbuta, si intem-
peries adest frigida; aut aceto rosac. si calidi-
tas in ventriculo sentitur, cui pulvis menhæ,
rosar. mastich. & caryophyl. inspersus.

In frigida intemperie ante cibi assumptio-
nem utilis. exhiberi possunt 2. cochlearia
aq. cinamom. aut 1. cochlear. aq. juniperi,
aut guttulæ 5. ol. caryophyl. cum haustulo
vini mixtæ. Omnium autem præstantissi-
mum remedium omne genus vomitionis
compescens est sequentis potiunculæ duo
cochlearia à cibo sumpto ebibita.

24. Caryophyl. crassiuscule concisorum
3 r. Mastich. 3 s. Ros. p. 1. simul
mixta cum vini rub. lb s. In olla sub
operculo coquantur ad medias, fiat
potiuncula. In vomitionibus unice
procurandum est ne alvus sit adstri-
cta, sed alternis ad minimum diebus
vel arte vel natura dejectio alvi est
procuranda.

25. Cruenta vomitio quid, quæ ejus
causæ, quæ signa, & quæ ratione
curanda?

Acute & hæmorrhagica, sanguinea vomitio
est, ubi quis cruenta vel cruorem sincerum
per os cum vomitu projicit. Differt ab æ-
morrhagica id est sanguinis cum tussi rejeccio-
ne, de quo symptom. supra in morbis tho-
racis ac pulmonum curandis tractatum est.

Vomi-

*Inunctio
ventriculi.*

*Emplast.
de crusta
panis.
Aliud epi-
thema.*

*In frigida
ventriculi
intemperie
remedia.*

*Alvus ne
sit adstri-
cta.*

*Vomitio
cruentus
quid.*

*Differe-
ntia ab hæ-
morrhagica.*

Duplex
vomitibus
cruentis.

Vomitio enim est ventriculi actio, sicuti
tussis pulmonum ac thoracis. Contingit
autem ut ventriculus sanguinem evomat,
aut per *ιδιοπαθειαν* id est propriam affectio-
nem, aut per *συμπαθειαν* id est sanguinis in
ventriculum velex epate vel ex liene velex
matrice influxione.

Causa.

Causæ *αετηνημεναι* sunt venarum in ipsa
ventriculi capacitate sitarum, aut venarum
communium cum visceribus ventriculo con-
nexis ruptiones ex lapsu vel casu motuque
alto violento, aut apertiones & erosiones
ex redundantia, tenuitate & acrimonia san-
guinis in ipsis venis contenti.

Causæ *αετηνημεναι* sunt violenta vi-
scerum commotio, lapsus, acris eroden-
tesque cibi, & venena assumpta, venas vi-
scerum aut ventriculum vulnerantia. Quo-
modo autem & quibus indicibus internoscen-
da sit, utrum sanguinolenta vomitio per *ι-
διοπαθειαν* aut *συμπαθειαν* fiat, supra in tra-
ctatione de *αιμοπτύσιν* abunde declara-
tum est.

Signa.

Vomitibus
cruentis
per sym-
ptiam.

Signa autem certiss. sunt ventriculum per
συμπαθειαν affici, quando per vomitum gru-
mus, id est, concretus sanguis niger, li-
vidus, & corruptus evomitur. Perpetuo
enim ubi sanguis ex propriis vasculis elabitur,
concrevit, niger ac lividus redditur, ac
corruptur.

Curatio.

Vena se-
ctio præ-
cipuum hic
remedium.

Curatio semper à venæ sectione auspi-
canda est, ac si dolor punctionesque in si-
nistro hypochondrio sentiantur, vena sini-
stræ manus inter parvum & annularem digi-
tum secanda erit; si in dextro hypochon-
drio malum percipiatur, dextræ manus ve-
na est aperienda. Et quia ut plurimum san-
guis in crassos grumos in ipsa capacitate ven-
triculi concrevere coagularique solet, ad
dissolvendos grumos exhibenda erit 3 i.
coaguli leporis, & tandem vomitio cienda.

Sanguini-
nem gru-
mosum
dissolven-
tia.

Sanguini-
nem sisten-
tia.
Optimum
ad vomitum
cruentum ju-
vamentum.

Ac post vomitionem & internis & ex-
ternis remediis apertæ, ruptæ erosæque ve-
næ consolidandæ, sanguinisque stillatio in
ventriculo refringenda. Quibus autem re-
mediis perfici ea queant, supra in curatio-
ne *αιμοπτύσεως* ostensum est, ubi remedia
cum interna tum externa certa experientia

comprobata sufficienter sunt enumerata. *tum præ-
stat, si
essentia
croci
Martis
drachma
1. cum
gelatina
cydonio-
rum &
cons. ros-
cæ exhibi-
beatur.*
*Χολέρας
quid deno-
tet.
Cholera
morbus
quid.
Causa in-
terna.*

Χολέρας vocabulum propriè bilem fla-
vam significat, sed apud Medicos nonnun-
quam pro morbo ventriculi, quem bilis ru-
bra aut prassina in ventriculo contenta, ut
plurimum excitare consuevit, usurpatur.
Est autem cholera ventriculi vehemens per-
turbatio, & acutus morbus ventris, in quo
natura & vomitu per gulam, & alvi excre-
tione per intestina simul noxios humores
immoderatus propellit & excernit.

Causæ *αετηνημεναι* cholerae sunt corrupti
vitiosique humores, veluti sunt bilis rubra
sive vitellina & bilis prassina ex cibis corru-
ptis in ventriculo generata, qui vel sua co-
pia vel pondere vel acrimonia vel mordica-
tione utrumque ventriculi officium, sto-
machum videlicet & pyloron dilatant, &
ad excretionem concitant.

Causæ *αετηνημεναι* sunt alimenta fa-
cile corruptibilia & in bilem prassinam de-
generabilia, copiosius assumpta, veluti
sunt anguillæ, & mollis carnis pisces, ma-
la persica, cerasa; nuces juglandes recen-
tes, allia, cæpæ, & venenata cum eda-
lia tum pharmaca, veluti est scammonium
(quod malignam, nisi probe corrigatur, &
adversam principalibus visceribus qualita-
tem continet.)

Signa cholerae sunt satis manifesta, vi-
delicet vomitus immoderatus, & alvi ege-
stio copiosa simul vomitui juncta, in qui-
bus vel aquosa, vel nidorosa, vel acidâ, vel
amara, vel flava viridisque materia projici-
tur, & tales quidem egestiones ad plures
horas perseverant, quas sequitur vehemens
sitis & sudoris eruptio. Item musculo-
rum in brachiis & pedibus actis tensio &
laceratio, & tandem subsequitur virium
prostratio & syncope.

Signa externarum causarum, videlicet ci-
bi ac potus vitiosi, dignoscuntur ex relatio-
ne patientis: corruptorum vero humorum
species ex colore excretorum deprehendi
possunt.

Si 3

Signa

Prognosticon.

Signa prognostica observanda erunt, cholera morbus celerrimam postulat curationem: neglecta enim, aut per crebram syn-
copen subito extinguit, aut in tabem con-
jicit patientem.

Curatio.

Curatio itaque statim in initio est auspi-
canda, quæ in cita evacuatione noxiorum
humorum, & in victus ratione convenien-
ti consistit. Cavendum autem ne vomitus
aut alvi egestio statim in principio cohibea-
tur. Nihil enim perniciosius vomitus aut e-
gestionis in cholera cohibitione, donec
prius noxii humores ventriculi inhaerentes
probe sint evacuati atque purgati.

*Ab astringentibus in initio abstinendum.**Vomitum primum exhibenda.*

Quare si nausea continua à vomitione in-
fester ægrum, quod vitiosum humorem in
orificio ventriculo impactum esse ostendit,
statim haustu largiori aq. tepidæ assumpto,
aut 3 i. julorum, id est, florum juglandis
cum mulla epota, ac paulo post digito fau-
cibus inserto vomitus est proritandus & af-
fatim vomendum. Vomitus enim sæpe non
nisi per vomitum sisti potest.

Purgantia lenitiva.

Ubi vero in capacitate ventriculi corru-
pti humores contineantur, quod ex dolo-
re totius ventriculi agnoscitur, remedia
levissima purgantia, veluti sunt 3 x. pulpæ
cassiae recent. evulsæ, aut 3 i. aloës pu-
riss. aut 3 i. spec. hieræ simpl. cum haustu
aq. absinth. aut menthæ commixta exhi-
beantur. Si vero *Πυλός* inhaereat vitiosus
humor, id quod ex mordicatione paulo su-
pra umbilicum deprehenditur, sequens e-
nema commodissime applicari potest.

Enema.

℞. Flor. chamæm. anethi an. M. i.

Herb. Mercurial. malvæ, violariæ an.
M. s.

Hordei excorticati & crassius moli-
tip. i.

Coquantur ad medias cum q. s. aq.
& colentur, colati juris accipe
℞ xiiii. quib. admisce hier. simpl.
℞ ii. ol. viol. ℞ iii. salis 9 ii. fiat
enema, quod jejunio patienti te-
pidum infundatur.

Inunctio ventriculi.

Post evacuationem vitiosorum humo-
rum, venter & hypochondria inungantur
ol. mastich. cyton. rosar. nard. aut absinthii,

singulatim acceptis aut simul commixtis, ac
deinde somnus & quies præcipiatur patien-
ti: demum conveniens victus ratio, quæ &
corrobores & moderate confringat ventri-
culum, & simul vires reficiat, instituat. *Victus ratio.*
Probe autem faciunt in victu exhibere cho-
lera laborantibus lac amygdal. cum aq. in
qua candens ferrum est extinctum, præpa-
ratum, item amygdalæ excorticatæ per se
comestæ, similiter & juscula prunorum,
pullorum cum aq. chalybeata, & cum uvis
immaturis cocta. Panis quoque tostus, & *Cibi ad-*
in vino rubro maceratus, conducit pluri-
mum, similiter & ova duriuscula, pullo-
rumque & columbarum caro assa. In potu *Posus.*
vitandum est vinum: In cerevisia autem
semper maceretur crustula aut lamina panis
tosta. Ex fructibus maxime conveniunt me-
spila & mala cytonia saccharo condita, si-
militer & diacytonion simplex ex succo &
saccharo confectum; Item mala punica &
pyra astringentia post & ante cibum assu-
pra conveniunt. Si autem à bilis flavæ seu
rubeæ aut prassinæ copia oborietur cholera,
plurimum confert cremor ptisanæ cum aq.
chalybeata paratus.

Ex remediis profunt in cholera syrup. a-
cerositaris citri, syr. granorum granatorum, *Remedia*
syr. ex immaturis uvis, ex Rob. è ribe cum *adstrin-*
haustu aq. plantag. commixtum. Sed vo-
mitui & alvi immoderate defectioni nullum
præsentius remedium inveniri potest, quam
crocus Martis à Paracelso inventus & ritè *Crocus*
præparatus, aut decoctum caryophyll. & *Martis.*
mastich. cum vino rubeo ante & post sum-
ptum cibum bibitum, ut paulo ante in vo-
mitionis curatione commemoratum est.

Porro topica sive externa remedia subse-
quentia choleram mirificè compescunt. *Topica.*

℞. Limi in vasis fabrorum ferrarioium, *Catapla-*
in quibus ferrum candens extin-
guitur, reperti, qui cum pauxillo *ma ad-*
aceto vini mixtus tepidus ventri- *modum*
culo instar cataplasmati imponatur. *adstrin-*
Aut panis tostus cum succo poly- *gens.*
goni sive sanguinaræ, quam & cor-
rigiolam vocant subactus, qui te-
pidus ventri simili modo impona-
tur.

Cataplasma vomitum compositum.

tur. Item præstat & epithema ex succo prunell. sylvest. & pulvere boli Armeni permixtis confectum, & dupl. linteolis exceptum ventrique impositum. Item fermentum acre cum succo menthæ in formam cataplasmi. redactum & ventri impositum sistit choleram, ac potissimum vomitionem.

Si vero vomitus sit sublati, alvus autem adhuc immoderatus egerat, clyster hujusmodi alvi infundendus.

Enema alvum sistens.

℞. Lactis chabbeati in quo amyllum & sem. papav. albi contusa sunt incocta 3 xv. quæ tepida recto intestino infundantur.

Prodest quoque sequens cerotum ventri impositum.

Cerotum pro ventre adstrictivum.

℞. Ol. rosar. cyton. myrtill. è mastiche an. 3 s. Ceræ q. s. fiat emplastr. five cerotum, cui antequam indurescat refrigereturque, admisce pulacatiæ, hypocistidos, mastichis an. 3 ii. cornu cervi usti, boli armeni, sanguin. Dracon. balaust. an. 3 i. fiat ceretum, quod per alutem extensum sindone obducatur, ventrique imponatur.

Symptomata cholera præcipua. Sitis remedia.

Symptomata hujus mali, veluti sunt sitis & musculorum lacerationes, hisce prædiis mitiganda veniunt.

Sitim sedat commasticatio trifolii acidi, succus arantiorum & syr. acetositis citri vel granatorum, & ea remedia quæ in sequenti sitis curatione descripturi sumus.

Dolores musculorum ut sedandi.

Dolores musculorum levant calidæ inunctiones cum ol. Irino, anethino, rutæ, castor. & similibus.

17. Singultus quid, quæ ejus causa, quæ causarum signa, & quibus mediis sistendus?

Singultus quid.

Ανγισσιν, singultus, nostris **der Schnuck** auff / est motus præternaturalis & violentus ventriculi, quo expultrix & retentrix facultas inter se pugnant, quoque natura in ventriculo noxia contenta propellere & extrudere conatur: Et hic quidem motus si-

milis est convulsioni, quæ in musculosis partibus accidere.

Causæ αἰτιολογίας singultus sunt, aut causa. frigida aut calida intemperies ventriculi; aut humores calidi acresque; aut humores frigidi ac serosi ventriculi tunicis impacti, aut flatulenti spiritus in ventriculi capacitate excitati. Προνόστικα sunt cibi potusque corrupti frigidi statusque generantes. Hippocrates causas omnes ad duo genera refert, 6. Aphor. 39. inanitionem videlicet & repletionem.

Signa sunt manifesta. Causæ autem αἰτιολογίας calidæ ex mordicatione orificii ventriculi, frigidæ ex eructationibus dignoscuntur. Προνόστικα vero ex patientis relatione intelligi possunt. Et quidem si singultus causa est inanitio, tum copiosa præcessit evacuatio, aut alvi, aut sanguinis profluvium. Si ex repletionem singultus sit obortus, repletionis signa præsto sunt, & à vomitu statim liberantur, id est, post vomitum liberantur à singultu.

Prognostica signa in singultu hæc observanda veniunt. Singultus post vehementes evacuationes, veluti in dysenteria, in vomitu perseverante, in sanguinis profluvio, similiter & in morbis acutis, in quibus vires sunt delapsæ, aut in ilio morbo, in colica, in cerebri inflammatione, in caro, in tetano, in animi deliquio, perpetuo præsentem mortem significat: Hippoc. l. 5. Aphor. 3. & 4. A singultu sternutatio superveniens, cessat singultus: Hipp. 6. Aphor. 13.

Curatio pro causarum diversitate dirigenda est.

Si itaque adsint in singultu signa repletionis, aut obortus sit singultus ab acerbis mordicantibusque cibis, statim vomitio est excitanda, aut per largum haustum aq. tepidæ, aut per assumptionem oxymellis scillitici, aut assumpta 3 r. pulveris julorum five florum juglandium, aut aliorum remediorum supra de vomitione descriptorum.

Ubi vero per inanitionem singultus est excitatus, omnis cura ad evacuationis cohibitionem ac repressionem est convertenda, cujus remedia partim supra, partim in

Signa causarum.

Prognostica.

Curatio.

Si à repletionem vomitus excitandus. Vomitoria.

Singultus ex inanitione ut curandus.

in sequentibus suis in locis commemorantur.

Ex frigida causa si oritur, quæ conveniant. Pillule. Si ex frigidityte ventriculi, frigidisque humoribus ventriculo impactis excitatur singultus, vomitum quoque adhibere oportet, aut, si qui vomere nequeant, ventriculum evacuare 3 i. pillularum ex hiera cum agarico confecta, & mane deglutita.

Enema. Aut per Clysterem ex decocto absinthii & hiera picta confecto, alvum subducere. Postquam autem pituita est educta, utatur æger haustulo vini Cretici, aut assumat sequentem pulvisculum.

Vinum Creticum. Pulvis contra singultum.

℥. Pul. rutæ, cymini præparati, cynamomi an. ʒ i. castorei ʒ s. commisceantur, fiat pulvis, propinetur cum vino. Aut

Ol. Cymini. ℥. Ol. cymini ʒ s. misceantur haustulo vini & tepidum exhibeatur. Aut devoret patiens rotulas 2. diatrion pipereon.

Rot. diatrion pipereon. Inunctio ventriculi.

Foris vero inungatur ventriculus sequentibus oleis.

℥. Ol. è mastiche, ol. nardini, è mentha an. 3 ii. ol. castorei 3 i. commisceantur, quo tepido fiat inunctio.

Sacculus. Utilissime quoque ventriculo sacculus ex foliis menthæ, pulegii, florib. absinthii an. M. ii. & cymini 3 i. confusus & in vino calefactus & expressus, imponitur.

Ex causa calida orti singultus remedia. Porro in calida ventriculi intemperie, aut biliosis humoribus ventri impactis, primum infusione Rhabbarbari, & electuario lenitivo bilis subducatur. Deinde in ratione victus utatur cremore ptisanæ, lacte amygdalino, jusculis ex carnibus pullorum contusis &c. Deinde frequenter utatur rotulis diatrion sandalon, aut ebibat pulverem seminum portulacæ cum haustulo aq. cichoreæ, & si æstuet ventriculus exhibeatur

Laudanum opiatum hisce pill. præferendum. Inunctio ventriculi. 3 i. pillularum de cynoglossa. Foris vero inungatur ventriculus oleis sequentibus.

℥. Ol. rosar. nymphææ, cytoniorum, è mastiche an. 3 i. commisceantur. Post inunctionem imponatur ventriculo sacculus ex rosis, floribus absinthii, spica celtica an.

Sacculus.

M. ii. & caryoph. contusorum 3 ii. confectus, ac cum aceto rosaceo madefactus.

Laudatur in singultu & lac caprinum recens emulsum & jejuno ventriculo haustum. Item diacytonium ex succo confectum.

In omni autem singultu præsentiss. adfert remedium 3 i. pulveris cornu cervini adusti cum vino rubro exhibita. In levioribus singultationibus spiritus retentio & sternutatio sistunt singultum.

Galenus generale remedium contra omnis generis singultum commendat l. 8. compos. medic. local. c. 3. ex costo, spica nardi, chryso-balano, rosis, mastiche, aloë, asaro & opio, ex quibus cum succo psyllii pastillos format, eosque singultientibus offert.

18. *Sitis vehemens quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo sistenda?*

Διψήσιος, siticulositas seu intolerabilis sitis, est humidi ac frigidi assidua ac moderata vehemens appetentia. Nam juxta Gale-

num in comm. aphor. 19. l. 4. Hipp. Sitis oritur ob penuriam humiditatis & abundantiam caliditatis. Sitis multorum morborum, potissimum autem ex caliditate & siccitate ortorum, veluti sunt ardentes febres, jec-

noris ac pulmonum inflammationes, item hydrops, diabetes. i. e. urinæ continua fluxio, qui omnes per sympathiam sitim inferunt, symptoma & comes est. Verum hoc loco de siti potissimum, ex caliditate siccitateque ventriculi oborta, nobis sermo est.

Causæ sitis vehementioris πονυρική Cause internæ sunt, ventriculi aut oesophagi, aut oris ventriculi calida & sicca intemperies, vel humores calidi & falsi, veluti sunt bilis & falsa pituita prædictis partibus impacti.

Causæ πονυρική sunt falsi & exicantes cibi, vini veteris aut plenioris cerevisiæ immodica helluatio, corporis fatigatio, in æstu calidioribusque locis conversatio, aq. marinæ potatio, medicamentorum impensus calidiorum aut veneni calidioris assumptio.

Signa sitis ex querimonia ægrotantis dignosci possunt: causarum vero internarum diver-

Sitis im-
moderata
quid.
Quorum
morborum
symptoma
si per sym-
pathiam.

De siti ex
ventriculi
intemperie
hic agi.
Cause in-
terna.

Externa.

Signa di-
versarum
diver-

*sitis cau-
satum.*

diversitatem hisce notisprehendimus. Signa caliditatis siccitatisque ventriculi & quæ per *συνπνέουσαν* sitim inferunt, affectiones, ex æstu ventriculi dignoscuntur. Signa vero sitis quæ comitatur alios morbos, ex eorum morborum descriptionibus peti debent. Humoris biliosi copiam in ventriculo sitim referentem, linguæ siccitas & amaritudo indicant, sicut & salsi humoris falsedo linguæ ostendit.

*Curatio.
Sitis ex
causis ex-
ternis orta
us propel-
lenda.*

Curatio immoderatæ sitis pro diversitate causarum varianda erit. Si itaque sitis sit superficialis tantum ex causis procatarticiis, veluti ex ciborum calidorum salforumque assumptione, uberiori helluatione, similibusque oborta, huic largior somnus medicamentum erit, testante Hippocr. lib. 6. de morbis vulgaribus sect. 4. aph. 23. ubi inquit: siti superficiali, quæ ex vigilia oritur, somnus medela est, siti vero quæ ex somno, vigilia nonnullis. Item l. 5. Aphor. 27. Qui noctu bibere appetunt, si superdormierint, sitis sedabitur.

*Sitis o-
mnis con-
variis cu-
ratur.
Hume-
stantia &
refrigeran-
tia ali-
menta.
Iulapi-
um ad
sitim re-
stinguen-
dam.*

In genere autem sitis ex siccitate orta, humectantibus; ex caliditate, refrigerantibus; ex nimia evacuatione, refectione ex refrigerantibus alimentis, curabitur, in quem usum præsidio sunt cremor ptisanæ, juscula ex contusis pullis, aqua hordei, lac amygdalinum, & ʒ i. syrup. violacei cum ʒ viii. aut aq. frigidiss. aut aq. hordei, admixta & bibita.

Porro si ex biliosorum humorum copia sitis sit exorta, sequenti portione bilis primum evacuabitur.

*Ex bilis
copia.
Haustus
cholago-
gus.*

ʒl. Rhabarbari electi contusi ʒ ii. macerentur in haustulo aq. cichoreæ per noctem, sequenti die leniter ebulliant, colentur, colato jusculo admisceantur elect. lenitivi ʒ ii. fiat haustus, qui tepidus in aurora offeratur. Bilioso humore evacuato subinde bibat pitissando aquam hordei in hunc modum præparatam.

*Aqua hor-
dei.*

ʒl. Glycyrrhizæ, rad. cichoreæ an. ʒ ii. sem. anisi ʒ iii. cinamomi electi ʒ i. sem. portulacæ, plantag. an. an. ʒ i. & s.

Conser. rosarum ʒ i. hordei M. i. cum aq. lb. viii. in duplici vase concoquantur ad 2. horas.

Aut utatur lacte ex quatuor semin. majo-rib. contusis, & aq. stillatit. acetosæ com-mixtis, expresso.

Ubi vero pituita falsa ventriculum obfi-dens sitim excitet, tum si æger ad vomitio-nem est pronus, ebibat haustum aq. tepidæ, cui sal copiose est admixtum, & paulo post rursus evomat. Aut si non facile æger vomere queat, subducatur pituita sequenti haustu.

ʒl. Fol. Senæ Alexandrinæ ʒ iii. mace- rentur per noctem in haustulo aq. ab-sinth. mane ebulliant, & colentur, & colato jusculo admisceantur elect. Diaphæniconis ʒ s. fiat haustus, qui tepidus summo mane ebibatur. Ac tandem ad sitim sedandam præscriptis remediis, aq. hordei aut lacte semini-um utatur. Aut aqua hordei, cu-jus libræ admixtæ sint ʒ ii. aceti ro-sacæ.

Si vero serosi humores epar oblesserint, & sitim vehementem induxerint, veluti fit in hydropicis, hi humores sequenti portione de-trahendi sunt.

ʒl. Iridis hortulanæ recentis ʒ ii. rad. ebuli ʒ iii. Cort. sambuci interno-dragogi. Potio hy-ebuli ʒ iii. Cort. sambuci interno-dragogi. rum, herb. cardui benedicti, cent. mi-nor. an. M. s. sem. carthami ʒ iii. de-coquantur in lb i. & s. aq. absinthii ad semilibræ absorptionem, colen-tur, & in jusculo macerentur ʒ i. Rhabarbari & fol. senæ ʒ ii. altero die ebulliant, colentur & iisdem ad-misceantur syr. Bysantini ʒ ii. quæ in tres partes divisa, ternis diebus sum-mo mane ebibatur.

In februm paroxysmis perpetuo sitis & sitis in fe-
grum infestat, in qua potus non modo sitim bribus qua
sedat, sed auget plurimum & calorem ac- ratione ex-
cendit. Præstat itaque sitim levare aut su- tinguenda.
ctione pulpæ arantiarum, aut collutione oris cum aq. hordei, cui acetum rosa-ceum ad libitum est admixtum. Aut arsef-ctam linguam faucesque illinire mucagine

*Lauda-
num quo-
que opia-
rum sitim
restringit
in febribus.
Ex hepate
obstructo.*

ex sem. cytoniorum in aq. rosacea acetoque rosaceo pauxillo admixto maceratorum confecta.

Si sitis ex obstructo epate proveniat, præstat singulis diebus ol. vitriol. guttulas ix. exhibere.

Reliquos morbos si sitis ut symptoma sequatur, ex eorum morborum curatione remedia sunt petenda. Primum enim semper morbus curandus est, quo curato, symptomata facile cessabunt.

*Generalia
sitis reme-
dia.
Potio con-
tra sitim.*

In universum autem omnibus sitis generibus sequentia remedia conveniunt.

℞. Succ. portulacæ ʒ vi. succi cytoniorum ʒ iiii. aq. acetosæ lb i. acet. rosacei ʒ ii.

Saccari candi in prædictis liquoribus resoluti ʒ iiii. Fiat potio, quæ pitisando assumatur.

Sedant sitim mirifice & sequentes pastilli.

*Pastilli
sublingua-
les.*

℞. Sem. excorticorum cucumeris minutiss. concisorum ʒ ii. sem. lactucæ, portulacæ an. ʒ i. tragacanthi ʒ i. & s. mucaginis ex sem. cytoniorum in aq. rosacea maceratorum q. s.

Conficiantur pastilli, & in umbra exiccantur, qui sub lingua contenti paulatim resolvuntur, & sitim sedant.

SECTIO III. DE INTESTINORUM MORBIS.

I. Intestinum quid, & quibus morbis afficitur?

*Intestini
descriptio.*

ENTEON, intestinum unicum ac continuum corpus est cum ventriculo, teres, cavum & in homine xv. ulnarum longitudinem æquans, quod ex pyloro, sive infimo orificio ventriculi exoritur, & in peritonæo in multiplices spiras & circumduktiones convolvitur, ejusque extrema pars in podicem sive anum definit. Quod, quia ejus aliæ partes alias habent figuras aliam-

que crassitiem ac situm, eam ob causam in plurali numero intestina vocantur, & à Medicis in sex species seu partes dividuntur, quarum prima à pyloro progrediens duodenum, secunda jejunum, tertia ileos, quæ partes tenues sunt atque graciles; quarta cæcum, quinta colon, sexta rectum nominatur, quæ posteriores crassiores sunt prioribus: Rectum autem intestinum in anum definit.

*Differen-
tia intesti-
norum.*

Morbi intestinorum præcipui sunt:

1. Διάρροια lævitas intestinorum,
2. Διάρροια profluvium humorum ex intestinis,
3. Δυσεντερία Cruentum profluvium intestinorum,
4. Τηνέχμησ Affidua sed inanis excernendi cupiditas & conatus,
5. Έιλεός gracilium intestinorum cruciatus,
6. Κωλική coli intestini dolor,
7. Έλμινθες lumbrici intestinorum.

*Morbi in-
testinorum
præcipui.*

Quia vero intestina in anum desinunt, an quoque affectiones hoc loco subungi non ineptè possunt. Ani autem sive podicis morbi ac symptomata sunt:

1. Ραγδαίς scissuræ podicis,
2. Κονδυλώματα tubercula in ano sive sphinctere,
3. Αιμορροΐς venarum in ano apertio & sanguinis ex eis effusio,
4. Πρόπτωση σφιγκτήρος procidentia ani.

*Ani affe-
ctus.*

2. Lævitas intestinorum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus præ- sidiis curanda?

Διάρροια lævitas intestinorum est, quando aut in pyloro, aut in ipsis intestinis rentrix potentia adeo est debilitata & resoluta, ut ingestum alimentum retinere usque ad perfectam concoctionem nequeat, sed vel prorsus cruda vel semicruda dejicere cogatur. Et hinc hæc affectio jure celeris ciborum ingestorum egestio dici potest.

Porro lævitas intestinorum, profluvium alvi, & cruenta excretio, intensione & remissione inter se differunt. Congeneres enim

*Cognati
affectus.*

nim

nim sunt morbi, & alter alterius causa esse potest, & iisdem fere prædiis tolli possunt.

Causa interna. Causæ ænervæ lævitatibus intestinum sunt, frigida intemperies, & nonnunquam calida, sed raro, pylori & intestinum: nonnunquam cum inactione lentæ pituitæ. Item superficialis exulceratio ab acris humoribus internæ tunicæ intestinum, obstructio venarum Mesaraicarum à frigidis & crassis humoribus. Item hydrops per ventrem evacuatæ.

Externa. *Πεπονυμηνία* causæ sunt, diuturna mora in aqua frigida, & cibi lubrici concoctique difficiles copiose comesti, quales sunt nuces juglandium, pepones &c.

Signa. Signa lævitatibus intestinum manifesta sunt, vexatur siquidem æger assidua excretionem ciborum adhuc crudorum, vel vix semicoctorum, quam deinde subsequitur appetentiæ prostratio, nutritionis frustratio, & malus totius corporis habitus cum extenuatione: adest nonnunquam & sensus ardoris circa hypochondria.

Signum debilitatæ retentricis potentiaæ pylori aut intestinum, item obstructarum venarum mesaraicarum est, quod excretionem alimentis fiat sine dolore. Ubi autem exulcerata sunt intestina, cum mordicatione dejiçuntur alimenta, & tum subsequitur dysenteria, sive cruenta excretio.

Prognostica. Prognostica signa ex lienteria observanda hæcerunt. Lienteria diutius perseverans in corporibus cacochymicis in dysenteriam transit: In longioribus intestinum lævitatibus si ructus acidus supervenerit, Hipp. l. 6. Aph. 1. teste, signum est bonum. Alimenti enim assumpti longiorem moram in ventriculo, & concoctionis inchoationem qualemcunque ostendit: Intestinorum lævitas cum ardore hypochondriorum aut punctura partium sub costis, & spirandi difficultate, in phthisin sive tabem ut plurimum desinit.

Curatio. Curandi ratio lævitatibus intestinum omnis dirigenda est ad retentricis atque concoctricis facultatis ventriculi, ac intestinum corroboracionem ac restaurationem, id quod perficitur aut convenienti victus ratione, aut aptis remediis.

In victu itaque utatur æger paucissimis cibis eisque concoctu facilibus, quales sunt viçtus ra. carnes avicularum montanarum, columbarum ac pullorum gallinaceorum, qui referti sint mastiche & caryophyllis cum eisque affati. Conveniunt præterea & carnes leporum, capteolorum, & vitella ovorum duriusculæ affata & cum aceto rosaceo intincta, item oryza & milium lacte caprillo chalybeato cocta, item lac caprillum per se chalybeatum, panis sit bis coctus. Proderit & gustare pyra tosta, & assa cytonia. Potus sit exiguus, isque vinum rubeum tenue, in quo macerati sunt caryophylli.

Quantum ad medicationem attinet, utatur æger pro corroborando ventriculo & intestinis mane ac vespere pro una vice syr. de absinthio, de mentha an. ʒ i. cum haustulo vini rubei commixta. Ante cibi vero assumptionem assumat seq. pulvisculi ʒ i. cum vino rubeo.

ʒ. Mastiches, caryophyllorum, corn. cervi usti ac præparati an. ʒ s. Fabarum in aceto maceratarum & rursus siccatarum ʒ i. Fiat pulvis subtilissimus, & cum vino rubeo hauriatur.

Post cibum vero assumptum, rotulæ 2. aromatici rosati, aut frustulum cortic. citrii mali saccaro conditi devoretur.

Porro si intestina aut ventriculus frigidis & crassis humoribus refertus reprehendantur, sequenti haustulo primum concoquatur vitiosus humor per biduum, mane ac vespere pro una vice assumendo.

ʒ. Syr. de mentha, ex absinthio an. Digestivum. ʒ i.

Aq. menthae & absinthii an. ʒ i.

Commisceantur, fiat haustus. Tertio tandem die subducatur pituitosus humor sequent. pillulis.

ʒ. Maf. pill. hieræ simp. è mastich. a. gar. trochiscati an. ʒ i. ex quibus conformentur pill. num. 27. & 6. horis ante cibum deglutiantur.

Post eductam pituitam exhibeantur remedia corroborantia & constringentia, qualis est sequens potiuncula.

T t 2

ʒ. Vini

Potio ad-
stringens
& robo-
rans.

℥. Vini rub. ʒ ix. In quo decoquan-
tur ad tertias caryophyll. mastich.
an. ʒ i. De quo colato assumat
æger ante cibum tria cochlearia:
aut utatur sequentis pulviscu-
li ʒ i.

Pulvis fi-
pticus.
Pulvis
scripticus.

℥. Seminis plantaginis, torrefacti,
pul. rad. pæoniæ, corallor. rub.
præparator. cornu cervi usti an.
ʒ ii. Commisceantur, fiat pul-
visculus, qui cum vino, in quo
chalybs extinctus, assumatur.

Opiato-
rum ma-
gnorum u-
sus in hoc
affectu.

Prodest quoque in lienteria ex causa fri-
gida orta uti ʒ i. aut theriacæ Andromachi,
aut Mithridatis, aut confectionis Mi-
cleræ per intervalla, quaternis quibuslibet
diebus cum vino chalybeato.

Externa.

Extrinsecus vero totus venter sequenti li-
nimento bis per diem inungi commodè
potest.

Linimen-
tum pro
ventre.

℥. Ol. è mastiche, absinthio, è mentha,
nardini an. ʒ i. Cere candidæ q.
s. fiat linimentum, cui admiscean-
tur oleorum chymica arte parato-
rum è cinamomo guttul. ii. è nu-
ce moscata ʒ i.

Aut conficiatur sequens sacculus.

Sacculus.

℥. Herb. menthæ, absinthii an. M. ii.
rosar. rubearum M. i.
Fabarum crassiuscule contusarum ʒs.
Caryophyll. mastiches, calami aro-
matici an. ʒ ii. sem. cymini ʒ i. s.

Contundenda contundantur & conscin-
denda conscindantur, atque simul commi-
xta in sacculum lineum quadratum imposi-
ta, interfuantur, fiat sacculus, qui cum
vino Cretico aut Rhenano conspergatur,
per calidumque laterem subinde calefactus
ventri imponatur.

Empl. de
crusta pa-
nis.

In eundem usum confert emplastrum de cru-
sta panis, cujus descriptio & conficiendi ra-
tio extat in dispensatoriis lib. Myropolaram.

Remedia
lienteria
ex colluvie
acrii humo-
rum in ven-
triculo
circa præcor-
dia.

Porro si in lævitate intestinorum circa
præcordia ardor sive æstus percipiatur, id
quod ex colluvie acrii ac putridorum hu-
morum in ventriculo & intestinis hæren-
tium contingere consuevit, antequam vires
collabantur, præstat per biduum mane

ac vesperi sequenti haustu exhibito humo-
rum pravam qualitatem confringere ac præ-
parare.

℥. Syr. rosar. myrtillorum, cytoniorum
an. ʒ s.

Aq. plantaginis, foliorum querci
an. ʒ ii.

Fiat haustus, qui tepidus una vice ebi-
batur.

Tertio postea die subducatur humor pu-
tridus ʒ x. pulpæ cassiæ recenter evulsæ una
hora ante cibi assumptionem devoratis.

Post evacuationem humorum ad ege-
stionem irritantium sequentia alvum astrin-
gentia remedia plurimum opitulantur.

℥. Sem. plantag. acetosæ ad ignem tor-
refact. an. ʒ s.

Sem. papaveris albi ʒ i. Cornu cer-
vi usti ʒ ii.

Mastichis, corallor. rub. præpara-
tor. an. ʒ s.

Tenuissime pulv. commisceantur,
de quo assumat æger ante pastum
mane ac vesperi ʒ i. cum vino
rubeo chalybeato; aut assumat ʒ i.
Mororum Celsi, aut mororum ru-
bei immaturorum, siccatorum &
in pulverem redactorum, cum
haustulo vini in quo incoctæ sint
radices pentaphylli: Aut assumat
ʒ i. Trochiscorum è spodio cum
vino præscripto.

Foris autem illiniatur vent. & intestina
atque hypochondria sequent. oleis simul
commixtis.

℥. Ol. cytoniorum, è mastiche, è rosis
an. ʒ ii. Ac post inunctionem
buccella crassa panis tostii calida &
aceto rosaceo conspersa, cui pui-
vis mastiches & acatiz est insper-
sus, loco inuncto alligetur.

Reliqua remediorum genera ad proflu-
vium alvi facientia ex sequentib. curationi-
bus diarrhææ & dysenteriz petenda sunt.

3. Alvi profluvium quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quibus remediis
sistendum?

Διάρρœα, Alvi profluvium est quando
non quid.

Digesti-
vum

purgans.
Diligenter
hic obser-
vandum

ne ante
evacuati-
onem hu-
morum mar-
bifici a-

stringentia
adhibean-
tur,

plus enim
nocent
quam pro-
sunt.

Pulvis a-
stringens.

Alia a-
stringen-
tia.

Crocus
Martis
cum essen-
tia coral-

rub. id præ-
stat effica-
cius.

Inunctio
ventris.

Solenander
confil. 9.

seil. 4. em-
plast. de-

scribit,
quod toti
ventri im-

ponitur,
mira cum
efficacia:

qui videri
poterit.

Vi differt à lientèria & dysenteria. non, ut in lientèria, crudum alimentum, nec, ut in dysenteria, cruenta colluvies, sed humor corruptus & liquidus circa intestinorum exulcerationem, per alvum in tempestivius, & solito crebrius deiecitur.

Causa. Causæ αἰσχυρὰς διαρροίας sunt imbecillitas partium nutritioni servientium, aut unius aut omnium, videlicet ventriculi, intestinorum jecinoris & lienis: vel totius corporis κακοχυμία vel catarrhus capitis ex cerebro, aut ex toto corpore humor profluens. In pueris dentitio est causa profluvii alvi.

Προγεγενηται five extrinsecæ causæ sunt cibi potusque mali succi, venenati & facile corruptibiles, si ultra modum ingerantur. Cerevisia item recens minime defæcata & cruda.

Signa diversarum causarum. Signa causas distinguunt hæc sunt, si vitiosi humores ex toto corpore in alvum confluant, id ex habitu & colore corporis & κακοχυμία deprehendi potest, & quis humor præternaturalis in corpore redundet, ex ipsius incrementi colore & qualitate cognoscimus. Si ex cerebro humorum fiat in alvum defluxio, gravitas capitis & catarrhus procedunt, & excretus humor ut plurimum spumofus cernitur.

Catarrhi. Si vitio epatis contingat alvi profluvium, chylosus excernitur humor & biliosus, ac dolores punctionesque circa dextrum hypochondrion sentiuntur. Si à splene alvi profluvium contingat, aut fusca aut nigra apparent excrementa, & punctiones in sinistro hypochondrio sentiuntur. Ventriculi autem & intestinorum imbecillitatem ventris tormina, nausea & eructationes ostendunt.

Imbecillitatis hepatis. Si vitio epatis contingat alvi profluvium, chylosus excernitur humor & biliosus, ac dolores punctionesque circa dextrum hypochondrion sentiuntur. Si à splene alvi profluvium contingat, aut fusca aut nigra apparent excrementa, & punctiones in sinistro hypochondrio sentiuntur. Ventriculi autem & intestinorum imbecillitatem ventris tormina, nausea & eructationes ostendunt.

Imbecillitatis lienis. Si vitio lienis contingat alvi profluvium, chylosus excernitur humor & biliosus, ac dolores punctionesque circa dextrum hypochondrion sentiuntur. Si à splene alvi profluvium contingat, aut fusca aut nigra apparent excrementa, & punctiones in sinistro hypochondrio sentiuntur. Ventriculi autem & intestinorum imbecillitatem ventris tormina, nausea & eructationes ostendunt.

Ventriculi & intestinorum. Si vitio ventriculi contingat alvi profluvium, chylosus excernitur humor & biliosus, ac dolores punctionesque circa dextrum hypochondrion sentiuntur. Si à splene alvi profluvium contingat, aut fusca aut nigra apparent excrementa, & punctiones in sinistro hypochondrio sentiuntur. Ventriculi autem & intestinorum imbecillitatem ventris tormina, nausea & eructationes ostendunt.

Prognostica. Signa prognostica in alvi profluvio observanda sunt: Alvi profluvio spontaneus vomitus superveniens morbum solvit: Hipp. lib. 6. Aphor. 5. In alvi profluvio excrementa nigra, livida, pinguis, & fetida ut plurimum exitiosa sunt. Alvi dejectiones junctæ febribus difficiliter curantur. Alvi profluvia, quæ sunt per crisin, id est, à natura excitantur, non sunt cohibenda: item alvi profluvia viribus consistentibus

non temere sunt cohibenda: sæpe enim pro valetudine sunt, Celso teste.

Curatio alvi profluvii pro humoris profluens natura varianda est. Si itaque biliosa aut crocea in fluore alvi excernantur, tum, nisi vires deficiant, non tam cito sunt sistenda: Cohibita enim ventriculum subvertunt, & viscerum interiorum inflammationem inferunt, & malum reddunt gravius. Itaque in biliosa alvi profluxione, in principio præstat naturam ad biliosorum excrementorum perfectam expulsionem benignioribus remediis excitare: talia autem sunt hæc sequentia.

℥. Pulpæ cass. recenter evulsæ 3 x. quæ saccharo conspersa in aurora devoretur. Aut ℥. Rhabarbari electi 3 ii. quod contusum maceretur per noctem in 3 vi. aq. cichoreæ, tandem ebulliat leniter, exprimatur ac coletur, colatum jus dulcoretur 3 ii. syr. rosar. solutivi, fiat haustus, qui in aurora tepidus ebibatur.

Aut biliosa excrementa tunicis intestinorum inhærentia sequenti enemate abstergantur.

℥. Aquæ hordei ℥ i. ol. rosacei 3 ii. Enema Saccari crudi quod rubeum vocant 3 ii. vitell. ovorum num. ii.

Commisceantur, fiat enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Post elutionem biliosi humoris, si absit febris, crebro potandum offeratur ægrotanti lac capillum, in quo candens ferrum bis terve sit extinctum. Ubi vero adest febricula, lactis usus est vitandus, juxta Hipp. qui inquit, lac dare febricitantibus ac caput dolentibus, malum. Præstat itaque pro lacte uti amygdalarum dulcium, confusarum emulsione cum aq. chalybeata, parata, quam lac amygdalinum vocant. Prodest & aqua hordei parata, in qua candens ferrum est extinctum. Pro corroboratione viscerum & obstructione meatuum frequenter in die commanducandum præbeatur ægrotanti sequentis electuarii semijuglandis magnitudo.

℥. Conf. rosarum, diacytoniton ex succo sine speciebus an. 3 i.

Tt 3

Tro- scera cop-

Curatio diarrhæa biliosa.

Admodum necessaria observatio.

Bolus chologogus.

Haustus purgans.

Enema abstergens.

Lac capillum chalybeatum.

Lac amygdalinum.

Electuarium virum.

roborans,
& adstringens.

Trochiscorum è spodio, è terra sigillata an. ʒ i. s.

Syr. è myrtillis q. s. fiat electuarium.

Extrinsicus vero totus venter inferior bis in die inungatur sequentibus oleis simul mixtis.

Linimentum pro ventriculo.

Enema ex lacte chalybeato.

Curatio diarrhæe pituitosæ.

Potio digestiva.

Hauftus phlegmagogus. Panchymagegon suum absque omni molestia hoc præstare testatur Crollius.

Enema.

℥. Ol. rosacei, cytoniorum an. ʒ s. è mastiche ʒ i. r. misceantur.

Quin ad obstruenda intestina in bilioso fluore plurimum conducit si ℥b i. lactis caprilli in quo candens ferrum est extinctum, vel in quo succus acatizæ aut hypocistidos est incoctus, instar enematis intestinis infundatur.

Ubi vero excretus humor pituitosus esse conspicitur, tum prius viribus consistentibus concoquatur & ad educationem præparatur sequentibus remediis.

℥. Syr. de ʒ. radicibus, è cort. citri an. ʒ i. s.

Aq. stillat. hyssopi ʒ i. r. misceantur, fiat haustus pro una vice, quem tepidum ebibat æger, utatur autem eo per 2. tresve dies mane ac vesperti ante subductionem pituitæ. Quarto autem tandem die impacta intestinis pituita detrahatur sequenti haustulo.

℥. Agarici trochiscati ʒ ii. fol. senæ Alexandrinæ ʒ i.

Spicæ Indicæ, cinamomi an. ʒ i.

Contusa macerentur in aq. menthæ ʒ vi. per noctem mane ebulliant leniter, colentur, colati juri admisceantur diaphæniconis ʒ iii. fiat haustus, qui tepidus ebibatur in aurora.

At si vires debiliores existant quam ut æger purgans remedium ferre queat, pituita tamen per enema sequens ex intestinis omnino elicienda erit, alias enim frustra adhibentur astringentia.

℥. Hyssopi, centaurii minoris, majoranæ, rutæ an. M. s. aq. ℥b s. concisa decoquantur ad media, colentur, colati juri accipe ʒ xiii. cui admisce hieræ simpl. diaphæniconis an. ʒ i. mellis rosati ʒ s. ol. rutæ ʒ i. r. salis communis ʒ i. r. mi-

sceantur, fiat enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Simili quoque ratione si humor profluens subniger & melancholicus existat, ante subductionem præparandus ac concoquendus sequenti potione est.

℥. Syr. de fumarizæ, de epithymo, è lupulis an. ʒ i.

Aq. fumarizæ, melissæ an. ʒ i. r.

Misceantur, fiat haustus pro unica vice, quo per triduum aut quatrimum utatur mane ac vesperti: quibus peractis, evacuetur humor melancholicus sequenti haustu.

℥. Epithymi ʒ i. r. hellebori nigri prius in aq. cocti atque ex eadem exempti ʒ i. cinamomi electi ʒ s. myrabalanorum Indorum ʒ i. s. contusa macerentur per noctem in aq. fumarizæ ʒ vi. tandem decoquantur leniter, colentur, colato jusculo admisceantur diacatholici ʒ i. r. fiat haustus, qui mane vi. ante prandium horis, tepidus ebibatur. Aut evacuetur melancholicus humor sequenti clystere.

℥. Rad. polypodii ʒ i. thymi, epithymi, fumarizæ an. M. s. decoquantur in ℥b i. r. juris pulli non pinguis ad medias, colati hujus juris accipe ʒ xiii. quibus admisce diacatholici ʒ i. s. ol. anethini ʒ i. r. salis ʒ i. fiat enema.

Supra monuimus non esse alvi profluvium cito temereque sistendum, ita hic hortamur tyrones, ut concoctiones & evacuationes humorum profluentium in initio statim adhibenda. gritudinis post alterum aut tertium diem antequam vires deficient exhibeant. Ubi enim jam vires per patientis negligentiam sunt penitus prostratæ, à purgationibus abstinendum erit, & omnis opera ad corroboracionem viscerum, & obstructionem meatuum convertenda, cum ratione victus, tum remediis & intra & extra corpus adhibitis. Corroborant autem & constringunt, fluoremque alvi cohibent in omni genere fluoris hæc sequentia.

In victus ratione utatur æger pane bis cocto, aut placentulis spirisve ex farina hordei paratis.

Curatio diarrhæe melancholicæ.

Digestivum.

Hauftus melanagogus. Vinum Helleboratum. Quercetani non incommode hic quoque exhibetur.

Enema melancholicum humorem subducens.

Præparantia & evacuationia quando adhibenda.

Corroborantia & obstruentia. In omni genere diarrhæe convenientia.

Victus ratio ad-

*stringens
& ob-
struens.*

paratis. Item oryza cum lacte caprillo parata, lacte amygdalarum, ovorum luteis in duritiem assatis, & in aceto maceratis, item lacte caprillo in quo ferrum candens est extinctum. Carnibus vescatur assis potius quam elixis, pingua omnia vitet.

Deinde intestinis sequens clyster adstringens infundatur.

*Enema
adstringens.*

℞. Rad. pentaphylli, tormentillæ an. 3 s. Fabarum 3 vi.

Balaustiorum, sumach an. 3 ii. Acatiæ, hypocistidos an. 3 i.

Plantaginis, rosarum an. M. s.

Contusa coquantur in lb̄ i. s. aq. ad

tercias, coletur, colati juris acci-

pe 3 xiiii. olei cytoniorum 3 i.

fucci plantaginis 3 s. pul. trochisco-

rum è terra sigillata 3 ii. mi-

sceantur, fiat enema, quod tepi-

dum administretur. Per os sequen-

tis pulvisc. 3 i. mane ac vespri cum

vino rubeo exhibeatur.

*Pulvis ob-
struens al-
vum.*

℞. Cornu cervi usti præparati 3 s. sem.

plantag. torrefacti 3 i. trochisco-

rum è spodio, è terra sigillat. an. 3 s.

Commisceantur optime pulverata. Die mane ac vespri exhibeatur haustus lactis caprini, in quo incocta est stæchas citrina aut gnaphalion, aut auricula muris.

Foris autem totus venter inungatur sequenti linimento.

*Linimen-
tum.*

℞. Ol. è mastiche, cytoniorum an. 3 s.

cera parum, fiat linimentum, huius

admisceantur pulveres trochisco-

rum è spodio, è terra sigillat. an. 3 s.

*Catapla-
sma sipti-
sum.*

Post inunctionem cataplasma ventri imponatur ex farina fabarum, & limo ex aqua, in qua fabri ferratii candentia ferra extinguere solent, excepto, simulque mixta atque calefacta.

Si vero adsint fluori tormina ventris, adiciatur præscripto cataplasmati pulveris cymini & acetij nonnihil. Aut

*Aliud
catapla-
sma etiam
anodyn.*

℞. Cytoniorum, mespillorum an. lb̄ s.

cymini præparati 3 i.

Contusa coquantur in aceto ad pulvis formam, quibus admisceantur acatiæ pulveri-

sata 3 i. mastiches, caryophyllorum an. 3 s.

fiat cataplasma, quod per duplicatum lin-teum extensum, calidum ventri imponatur.

Reliqua constringentia alvi fluorem, in curatione dysenteria enumerabuntur, quæ huc adferri possunt.

4. *Cruentum alvi profluvium quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus mediis cohibendum?*

Δυσεντερία est cruenta alvi cum dolore & *Dysenteria* torminibus ventris dejectio, ab intestino quid. rum exulceratione orta.

Hoc malum ut plurimum per gradus ob- *Gradus dy-*
oriri solet. Primum enim crebrius ex inte- *senteria 4.*
stinis mucus egeritur; deinde pinguedo par-
vo sanguine tincta; tertio in bilioso excre-
mento, aut varii coloris fibræ ac pelliculæ
intestino abraasæ & cruentæ conspiciuntur;
quarto effluunt cum sanguine & particulæ
intestinatorum exesæ atque putrefactæ.

Causæ *Δυσεντερίας* sive exulceratorum *Causæ in-*
intestinatorum *τεντερίας* sunt acres, mor- *terna.*
daces & erodentes humores, vel ab univer-
so corpore, vel à visceribus quibusdam ut e-

pate & liene in intestina profluentes, ori-
ficiisque venarum mesaraicarum inhæren-
tes, aut in ipsis intestinis generati.

Περοντεριαι causæ sunt venenatorum *Externa.*
medicamentorum, veluti sunt scamonium,
colocynthis, euphorbium, imprudens u-
surpation, fructuum cito putrescentium, ci-
borumque acrium & venenatorum copio-
sior usus.

Signa sunt: ante cruoris profluvium, ex- *Signa.*
crementa biliosa & acria, aut spumosa ex-

eunt, deinde pingua, cruore tincta, tan-
dem cruor ipse, in quo nonnunquam aut
ramenta, aut particulæ tunicarum intestini
conspiciuntur. Ubi autem ex epatis imbe-
cillitate dysenteria originem habet, tum
excrementa diluta, tenuia & loturæ car-
nium recens maceratarum similia apparent,
cum dolore & punitione dextri hypochon-

*An ex he-
pate origi-
nem ha-
beat.*

drii. Si vero cruor apparet & sinistrum hy-
pochondrium gravatur, fluxus est splenetici-
cus, ex lienis imbecillitate ortus.

*An ex lie-
ne.*

Porro cum ad felicem dysenteria cura-
tionem plurimum faciat nosse quæ intestini
pars, superiore, quam tenuem; aut infe-
rior, rari.

*Quanam
intestino-
rum pars
sit exulce-
rior, rari.*

rior, quam crassum intestinum vocamus, sit exulcerata, per hæc notas deprehendimus.

An crassiflora.

An graciliora.

An intestinum coctum vel hæmorrhoides.
Prognostica.

Si itaque rasura intestinorum & pinguedo excernatur, & dolor in hypogastrio, crassiora; si vero cruor excernatur & excremento toti sit permixtus, & dolor circa umbilicum percipiatur, graciliora intestina ulcerata esse statuendum est. At vero si cruor excremento supernatet tantum, ulcus aut in recto intestino esse, vel venas hæmorrhoides in podice apertas esse ostendunt.

Prognostica signa hæc sunt observanda. In dysenteria si veluti carunculæ partes tunicae intestinorum simul excernantur, lethale est signum.

In longa dysenteria cibi fastidium & febris & singultus perniciose sunt signa, Hippocrat. 6. Aph. 3. teste.

Viridia aut nigra excrementa in dysenteria exitiosa judicantur.

Ulcere in crassis intestinis existente, facilius, in gracilioribus difficilius curatur dysenteria.

Ab atra bile orta dysenteria lethalis est, nam ut Hippoc. 4. Aph. 2. 2. inquit, morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis vel superne vel inferne exierit, lethalis est, excipiendi tamen sunt morbi lienis, ut obstructio ejus, & febris quartana, in quibus interdum salutariter excernitur.

Curatio.

Curatio dysenteriae in venæ sectione, victus ratione, & remediorum adhibitione consistit.

Vena sectioni quando locus.

In initio itaque morbi, si corpus est plethoricum, aut si adsit febris, & vires adhuc consent, venæ sectio est molienda, & epatica vena dextri lateris est aperienda: sanguis autem nec ultra modum, nec confertim est detrahendus.

Dieta.

Quantum ad victus rationem, Aëtius principium curationis dysentericorum à quiete, modico cibo & somno prolixiore fieri debere docet. Cibus vescatur æger facile concoquibilibus & nonnihil adstringentibus, tales sunt carnes avicularum, columbarum, leporum & caponum, quæ as-

Cibi euepti astringentes.

Lac Chyl-beatum.

sæ porius quam elixatæ edi debent, lac amygdalarum cum aqua chalybeata paratum,

lac caprillum in quo aut lapilli silicesque igniti, aut ferrum candens aliquoties est extinctum: tale lac est cibus & remedium dysentericis convenientissimum. In lacte panis bis coctus aut torrefactus comminundus est. Conveniunt & pulres ex oryza & amylo, & pane contrito, & farina fabacea cum lacte paratæ. Admisceantur quoque lacti ovi lutea. Plurimum prosunt & pyra tosta & fructus mespyllorum ac sylvestrium rosarum esitati. Optime constringunt & vorum assatorum lutea in aceto macerata.

Potus ejus sit aqua hordei, in qua candens ferrum extinctum est, & in qua semina plantaginis & sumach incocta sunt, ac si absit febris concedi potest & vini rubei tenuis & astringentis usus, similiter & lactis caprilli chalybeati.

Quantum ad remediorum rationem attinet, primum consistentibus adhuc viribus, antequam fluorem sanguinis sistere conemur, acres & erodentes humores cum sanguine profluentes ipsis intestinis impactos detrahare & eluere oportet. Fieri enim nequit ut intestinorum ulcera curentur, aut sanguinis profluvium sistatur, donec causa exulcerans in intestinis hæreat. Commode autem acris eluvies per sequentia pharmaca expurgabitur.

℞. Pulpæ cassiæ recenter evulsæ ʒx. Quæ una hora ante prandium devorandæ offerantur: aut offeratur sequens haustus.

℞. Rhabarbari electi ʒ i. fol. senæ ʒ ii. Contusa macerentur in aq. plantaginis ʒ v. per horas 12. deinde ebulliant leniter, & expressa colentur,colato juri admisceantur (si profluvium est biliosum) electuarii rosati Mesuei ʒ i. si pituitosum, diaphæniconis ʒ i. si nigrum ac melancholicum, diacatholici ʒ s. fiat haustus, qui tepidus in aurora exhibeatür. Aut eluatur colluvies virulenta ex intestinis sequentibus enematis.

℞. Herb. violariæ, malvæ, mercurialis an. M. s.

Rosarum rubearum, plantag. an. M. s. Con-

Fructus astringentes. Pruna quoque sylvestria corna condita pl. prosunt.

Potus. Vinum etiam Ciconiatum vel cum succo granatorum immaturorum paratum. Remedia. Purgatio humoris erodentis ante omnia necessaria.

Solus.

Haustus cathartici.

Enemata elusentia intestina & asstringentia.

Concisa decoquantur in q. s. aq. hordei ad med. colentur, colati juris accipe ꝯ xiiii. quibus admisce hier. simpl. ꝯ i. s. ol. rosacei ꝯ i. fiat enema, quod tepidum infundatur. Aut

ꝯ. Lactis caprini ꝯ i. cui tepido admisce lutea ovorum num. iiii. sacchari ꝯ i. fiat enema.

Remedia ad exulcerationem crassorum intestinorum.

Enemata mitigantia, conglutinantia & astringentia.

Vitiosis humoribus evacuatis, tandem si crassiora sive inferiora intestina sint exulcerata, tum per inferiora medicamenta mitigantia, conglutinantia & astringentia instar enematum crebro sunt adhibenda: ut

ꝯ. Lactis caprini in quo ferrum candens est extinctum ꝯ xiiii. cui admisce ol. rosacei, adipis caprini an. ꝯ i. s. fiat enema. Aut

ꝯ. Aq. hord. chalybeati ꝯ ii. in qua decoquantur rosarum rubearum M. i. sem. plantaginis, rad. symphyti majoris an. ꝯ i. ad medias, decocti juris accipe ꝯ i. cui admisce succorum polygoni, symphyti an. ꝯ ii. in eo liquore resolvaturl boli amenii ꝯ s. adipis caprini ꝯ ii. fiat enema, quod tepidum crebro infundatur.

Remedia ad exulcerat. graciliorum intestinorum.

Decoctum pro potu, consolidans & astringens. Langius lib. 3. ep. medicinal. julapium describit dysenterici quoque similiter valde utile.

Tulvis stipiticus.

At vero si graciliora intestina ulcere laborent, tum per os utilissimum erit exhibere sequentia remedia.

ꝯ. Consolidæ majoris, polygonii, plantaginis omnium viridum an. M. iiii. contundantur minutissime eis que affundantur lactis caprini chalybeati ꝯ ii. quæ simul probe commixta per torcular fortiter exprimantur, in eo liquore concoquantur sem. plantag. myrtillosum an. ꝯ ii. rad. tormentillæ, Balau. stior. an. ꝯ i. s. herb. veronicæ, stæchados Arabicæ an. M. s. colentur & clarificentur, fiat potio, huius potionis mane ac vespere ebbat æger haustum unum, cui prius admisceatur ꝯ i. sequentis pulvis.

ꝯ. Gummi Arabici, Tragacanti, lapidum hæmatitis an. ꝯ i.

Cornu cervi usti ac præparati, sanguinis draconis an. ꝯ i.

Boli Armeni veri, rhabarbari probe torrefacti an. ꝯ s.

Trochiscorum è carabe, de terra sigillata an. ꝯ iv.

Commisceantur, fiat tenuissimus pulvisculus. Sæpe contulit pulvisculus stercoris canini, per triduum cum ossibus nutriti cum lacte caprillo haustus. *Experimentum singulare.*

In vehementissimis cruciatibus ad supfacientia remedia confugiendum est, sed intra corpus non temere administranda.

Nos sapissime glande sive supposito vocato, ex opio facta, & intestinis inserto, hæc tormina abstulimus, & dysentericum profluvium cohibuimus, & somnum ægroto conciliavimus. Crebro autem glans ex opio podici inferatur, sed ultra quadrantem horæ in intestinis non est dimittendus, sed rursus appenso filo eximendus.

Ad doloris torminum mitigationem. Suppositorium narcoticum.

5. *Continua excernendi inanis cupiditas quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Tenesmus, id est vehemens tensio recti intestini, quam Plinius Tenasum vertit, alio enim vocabulo Latino destituimur. Est autem Tenasmos assidua cacandi cupiditas, sed inanis, cum dolore recti intestini: nihil enim aut perexiguum, idque mucosum aut cruentum aut biliosum egeritur. Quantum ad causas attinet, non dissimilis est affectio dysentericæ, differt tamen loco affecto. Nam dysenteria in omnibus intestinis excitatur, tenesmus vero soli recto intestino accidit. *Tenesmus quid.*

Causæ Tenesmi *causæ* sunt, humores acres, erodentes ac titillantes, quales sunt pituita salia, bilis flava, atra bilis corrupta, tunicis recti intestini impacta, eam erodens & exulcerans. *Causa.* *Περίσπυρται* sunt vehemens refrigeratio podicis & recti intestini ex aëris ambientis frigiditate, aut ex mora longa in aqua frigida, aut ex sessione nudi podicis super frigidum saxum.

Signa hujus symptomatis manifesta sunt: *Signa.*

Vu Perpe.

Perpetua enim punctione ac pruritu tensivoque dolore & desidendi cupiditate molestat an. Causarum *αἰτιατικῶν* signa ex ægri relatione dignoscuntur. Speciem autem vitiosorum humorum, & causarum *αἰτιατικῶν* ab excretis discere possumus. Excrementum enim exiguum si sit, album & mucosum salis pituitæ, flavum autem bilis corruptæ; saniosum vero & cruentum, exulcerationis est signum.

Prognostica.

Signum prognosticum Tenesmi. Uterum gerenti Tenesmos superveniens abortum facit, Hipp. 7. Aphor. 27.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate variari debet. Si itaque corpus laborantis plethoricum sit, & adsit simul inflammatio recti intestini, vena est secanda epatica, & sanguis per vices repetitas averisionis gratia detrahendus. Corpore vero cacochymico existente, redundantis humoris vitiosi debet fieri evacuatio per convenientia pharmaca.

Vena sectio.

Cathartica.

Hausus phlegmogogus. Cholagogus.

Molana-gogus.

Enemata.

Ad intestini inflammationem & erosionem.

Ut pituitam salis egregie evacuant 3 x. Diaphæniconis cum aq. stillatitæ absinthii 3 iv. solutæ, & sex horis ante prandium exhibitæ: sic bilem flavam deiciunt 3 v. elect. rosati mesuæ cum 3 iv. aq. cichoreæ commixtæ. Idem præstat & liquor in quo rhabarbari 3 ii. per noctem sunt maceratæ, cui 3 iii. elect. lenitivi sint admixtæ. Melancholicus autem humor subduci potest 3 vi. liquoris in quo coctæ sunt 3 iii. polipodii myrabulanorum nigrorum 3 ii. cui liquori admiscendæ sunt 3 vi. diacatholici. Porro si humor putridus aut acris tenesmon inferens in solo recto intestino hæret, tum sequentibus enematis elui debet, ac si adsit inflammatio & intestini erosio,

℞. Aq. hordei 3 xiii. in ea ebulliant rosarum siccarum, fol. plantaginis an. M. i. colentur, & admisceantur ol. rosacei 3 iii. fiat enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Aut infundatur lactis vaccini recentis multum 3 i. cui admixtæ sint 3 iii. ol. rosacei.

Salsa vero ac putrida pituita eo in loco hærente, & tenesmon excitante, primum eluatur pituitosus humor sequenti clystere.

℞. Malvarum, violarum, Mercurialis an. M. s.

Flores verbasci, chamæmeli, centaur. minoris an. M. i.

Pulp. colocynthidos in linteolo ligatæ, & in fine coctionis injectæ 3 i.

Decoquantur cum aq. q. s. ad medias, colati juris accipe 3 i. cui admisce hier. simpl. 3 s. pulp. cassiæ 3 i. ol. absinthii, anethini an. 3 i. s. fiat enema.

At si biliosus humor excitet tenesmon, omisso ex præscripta decoctione colocynthide & flor. centaur. 3 i. liquoris præscripti admisce pulp. Cassiæ 3 ii. ol. violarum, rosarum an. 3 i. s. fiat enema, quod perpetuo tepidum infundi debet.

Subductis ex intestinis vitiosis humoribus, post unam & alteram horam rursus intestino infundantur mitigationis, constrictionis & consolidationis gratia hæc sequentia.

℞. Lactis vaccini 3 i. cui admisce 3 iii. ol. myrtini, & infunde recto intestino. Aut

℞. Hordei, cicerum rubeorum an. 3 s. flores verbasci M. i. Nucum cupressi, corticum granatorum an. 3 i.

Furfuris triticeï M. s. decoquantur in q. s. aq. pluvialis ad med. colati juris accipe 3 i. admisce ol. anethini 3 iii. luteorum ovorum n. ii. fiat clyster, quo crebrius est utendum. Et si exulceratio adsit, ut ulcus emundetur, adjici possunt 3 i. melis rosacei.

His ita bene procuratis, ad topica remedia accelerandum erit, & si adsint exulcerationis notæ, sequens unguentum sedi est inferendum.

℞. Ol. rosacei 3 s. mucag. tragacanti & Gummi Arab. in aqua rosacea macerati 3 iii. pul. cerussæ, plumbiusti an. 3 s. thuris, aloës an. 3 i. Boli Armenii 3 ii. ceræ q. s. fiat linimentum, cui si dolor vehemens & cruciatus adest, admisceri potest, opii in aqua rosacea soluti 3 s. hoc unguentum floccis à linteo

Ad ulcerationem salis pituitæ.

Ad biliosum humorem abstergendum.

Enemata mitigantia, adstringentia & consolidantia.

Topica.

Unguentum anodynum inferendum.

linleo mundo abrasis exceptum a-
no intrudatur.

Περὶ τοῦ νῆρου, hoc est interstitium in-
ter anum & pubem & simul adjacentes par-
tes sacrumque os oleo rosaceo & violaceo
an 3 s. simul commixto.

Si vero absit adhuc ulcus & exulceratio,
& tenesmos ortum habeat à pituita aut fri-
gore, æger insideat sacculo ex sequentibus
herbis parato.

℥. Flor. verbasci M. iii. chamæmeli,
meliloti, anethi an. M. i.

Sem. Lini, Fænugræci an. 3 i. Fur-
furis M. i.

Contusa confuantur in sacculum, & de-
coquantur in vino rubeo, cui probe expres-
so & adhuc calente, insideat æger, & ubi
refriguit rursum in eodem vino recalefiat.
Possunt quoque ex præscriptis herbis in ma-
jori copia sumptis adjectisque radicibus ac
foliis malvæ & althææ balnea in folio parari,
in quo æger quotidie insideat.

6. *Gracilium intestinorum cruciatus sive
volvulus quid, quæ ejus causa, quæ
signa, & quæ ratione curandus?*

Ἐιλεός, Latinis volvulus, & καλὴκὴ con-
generes sunt intestinorum affectiones, nisi
quod εἰλεός in gracilioribus καλὴκὴ, in cras-
sioribus intestinis oboritur. Ἐιλεός vero vo-
cabulum derivatur ab εἰλέω id est volvo vel
circumago. Est autem εἰλεός acutissimus &
ut plurimum lethalis morbus, & tantos in-
fert cruciatus, ut vulgus miserere mei ap-
pellare consuevit, in quo omnis excernendæ
fæcis facultas per inferiora aufertur.

Causæ ἀσυννῆδράς sunt, aut intempe-
ries extrema tum frigida tum calida, scirrhus
& apostema gracilium intestinorum: item
crassi & lenti humores, fæces induratæ, &
stercus aridum ac compactum, meatus in-
testinorum obstruens, in eisque inflamma-
tionem ac flatum excitans.

Προκατακνηκὴ causæ sunt frigus vehe-
mens, intestinaque constringens: cibis fa-
cile corruptibilis & putrescens: carnes pin-
gues rancidæ, ictus violentus gracilium in-
testinorum, venenata pharmaca ac potio-
nes, veluti sunt colocynthis & esula.

Signa volvuli sunt, ineffabilis dolor circa Signa.
umbilicum & præcordia; tumor & extra
cutem tenuiorum intestinorum instar chor-
dæ eminentia, excernendi stercoris impo-
tentia, crebræ sed nihil juvantes eructatio-
nes, vomitiones, & quandoque per os ster-
coris evomitio, & totius corporis frigiditas.

Prognostica signa juxta Hippo. 7. Aphor. Prognosti-
ro. sunt, ab ileo vomitus, singultus, desi- ca.
pientia & convulsio malum. Stercoris evo-
mitio in volvulo semper est lethalis; sudor
frigidus & urinæ suppressio, miseram mor-
tem præcedunt.

Curatio pro diversitate causarum varian- Curatio.
da erit. Atque si adsit inflammatio & cor-
pus sit plethoricum, statim vena hepatica est Vena se-
secanda, & altero die pulpæ cassiæ 3 ii. ōlio.
sunt exhibendæ.

Si vero à corruptis putridisque alimentis
aut venenatis pharmacis volvulus originem
ducatur, tum statim vomitio est procuranda, Vomitus
haustu aquæ tepidæ, aut remediis vomitum quando
provocean-
dus.

Si vero intestina ab arido stercore sunt in- Obstructio-
tercepta obstructaque, tum & excrementa ni pertina-
& flatu ex gracilioribus intestinis subdu- cius remedia.
cenda erunt, & quidem primum in cibo ex-
hibenda erunt, quæ ventrem emolliant, ve- Emollien-
luti sunt pruna, ptisana, & jus pingue gal- tia.
linarum. Ac deinde in pueris quidem glan-
dibus sive suppositoriis ex melle cocto, sale Supposito-
& pulvere colocynthis factis: Aut rad. ria.
betæ instar suppositorii formati, podicique
infertis: in adultis autem sequenti enemate
perfici possunt.

℥. Fol. rutæ, mercurialis, malvæ, al- Enema e-
thææ, flor. centaur. min. an. M. i. molliens,
Flor. absinthii p. r. rad. althææ 3 i. statumque e-
Sem. fænugræci, cymini an. 3 ii. ducens.

Baccarum lauri 3 i. Concisa & con- Oleum dia-
tusa ebulliant in q. s. aq. & in fine colocynti-
coctionis imponatur 3 i. colo- dos Querce-
cynthidos, ac post unam ebulli- tani posset
tionem colentur, colati juris acci- admisceri.

pe 3 xiii. Quibus admisce bene-
dictæ laxativæ 3 i. Ol. rutacei, a-
nethini an. 3 i. s. Salis 3 i. Fiat e-
V u 2 nema,

Sacculus
in tenesmo
a frigore &
pituita ad-
hibendus.

Insessus u-
tilis.

Supposito-
ria quoque
cum ol. ca-
lidis, ut
sunt men-
tha, ma-
stich. still.

6. similia
profunt.

Differen-
tia inter
ileum &
colicam.
Ileus qua-
li affectus.

Causæ.

nema, quod tepidum recto intestino infundatur. Atque si necessitas expostulet, crebrius applicetur.

Postea si ventriculus adhuc bene se habeat, non erit alienum ægrotanti ꝑ. iii. recentis butyri devorandum, aut ꝑ. iii. ol. olivarum recentis exhauriendum præbere. Si autem hisce remediis induratum excrementum protrudi nequeat, tum præstat ex lenioribus purgantibus phar್ಮacis, veluti sunt ꝑ. i. s. pulpæ cassiæ recenter evulsæ, aut ꝑ. x. elect. lenitivi vocati, aut ꝑ. iii. syr. rosacei solutivi, cum haustulo decoctionis prunorum dulcium resoluta, exhibere. Aut decoquantur prunorum dulcium num. x. & ꝑ. ii. fol. senæ in ꝑ. vi. juris gallinæ, & colatum jus ebibatur.

Qua vehementer ca-
lida sunt
& tormina
excitare
solent pur-
gantia vi-
tanda,
insessus.

A violentis enim & vehementer purgantibus in hoc malo omnino abstinendum erit, quod hæc excitant flatu, & augent malum.

Vinibus adhuc consistentibus convenientissimum erit ægrotantem in balneum aquæ calidæ locare, in qua decoctæ sint malva, althea, flores chamæmeli, meliloti, anethi & mollis acanthi, singularum q. s.

Si vero propter virium debilitatem balneum ferre nequeant, foveantur hypochondria sacculis, quibus insutæ sunt sequentes herbæ.

Sacculi
pro hypo-
chondriis
& vent.

ꝑ. Flor. chamæmeli, anethi, rutæ, malvæ, altheæ an. M. ii.

Sem. lini, fænugræci, cymini an. ꝑ. i. Baccarum lauri ꝑ. iii. Concisa & contusa insuantur sacculis & intersuantur & ebulliant in aq. calidique hypochondriis applicentur.

Sequens pulvisculus sæpe solus abstulit malum.

Pulvis ex-
pertus ad
dol. ilia-
cum.
Spiritus
salis ali-
quot gut-
tulus exhi-

ꝑ. Flor. luteorum chamæmeli, sem. malvæ, an. ꝑ. i.
Pulverisata commisceantur, & cum haustulo decocti florum anethi tepide exhibeantur.

Si absit inflammatio, commodissime exhiberi possunt ꝑ. i. aut ꝑ. i. s. Theriacæ an-

dromachi cum haustulo vini tenuis, item guttulæ vii. aut ix. ol. vitrioli vino admixtæ, aut aqua scordii.

bet cura
Malvatico
Crollius.

Sanguis vespertilionis hypochondriis illitus mirifica experientia ilei dolores sistere creditur.

Experi-
mentum
singulare.

Reliqua quæ ad hujus sævissimi mali curationem spectant, ex sequenti curatione colici doloris petenda erunt.

7. Coli intestini cruciatus quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandus?

Κολικὴ δὲ πάθος, colicus affectus, sive Colica passio quid. dolor crassioris intestini, quod κρόν nomina-
natur, & inde vulgus colicam passionem vocat, est intolerabilis cruciatus in infimo ventre, in quo, quasi intestina terebro perforarentur, aut palus infingeretur, dolorem inferit: ileo morbo non dissimilis.

Et inde vulgus utramque affectionem confundens, colicam vocat. Vix quoque à nephritide morbo seu calculo in ureteribus hærente, hæc affectio discerni potest, nisi quod in nephritide dolor fixus est & stabilis; in coli autem affectione ut plurimum circulationem habet, & modo in hac, modo in illa parte ventris vehementius affligit, & plerumque dolor coli altius percipitur quam sunt renes sui: Item quod urinæ nephriticorum sabulosa aut sanguine tincta conspicitur; in coli autem cruciatu, pro diversitate causarum, aut humor crassus ac pituitosus hypostasim præbet, aut bile tincta est urina.

Causæ cruciatus coli communes sunt cum causis ilei, & quidem sunt crassi & pituitosi humores, aut pituita vitrea intra membranulas coli intestini collecti & impacti, aut acres & mordicantes humores, veluti est bilis præstina, in colo coacervati, & intestinum extendentes; aut inflammatio crassiorum intestinorum, aut lumbrici in intestinis generati: vero sunt cibi ac portiones frigide, crassæ, obstruentes flatusque generantes & facile corruptibiles, ut cerevisia recens, cruda & non defæcata.

Signa causas colici doloris indicantia hæc sunt. Quibus crassus & pituitosus humor, verarum causarum.

Pituita vitrea. mor, aut pituita vitrea cruciatum excitavit, iis dolor per totum abdomen seu ventrem extenditur & intestina quasi terebro perforari sentiuntur, & cum torminibus adsunt ructus, nausea & vomitiones pituitosæ, sine tamen doloris mitigatione; per alvum nihil dejicitur, nec flatus quidem, & si quid dejiciatur excrementi, id parum est, & plenum flatibus. Ubi vero acres humores dolorem excitarunt, una cum acerbissimo dolore adsunt ardor ventris, sitis & vigiliæ, nonnunquam & biliosæ vomitiones, ac post alvi defectionem majoribus infestatur æger cruciatibus. Causa doloris colici inflammatione existente, internus fervor in abdomine sentitur, & urina alvusque supprimitur, & simul adest febricula & sitis. Si flatus in colo coarctati, intestina extendentes & dolorem inferentes sint causæ doloris, tum ventris rugitus frequentior adest. Propter lumbricos si coli dolor oriatur, per intervalla magis minusque affligit.

Inflammationis. Signa prognostica in coli doloribus hæc observanda veniunt.

Flatuum. Inter omnes coli cruciatus gravissimus est, qui ex inflammatione intestinorum originem habet.

Lumbricorum. In coli dolore, si clystere injecto, excrementa & flatus subducantur, dolorque postea mitigetur, minus erit periculi.

Prognostica. Curatio pro causæ diversitate varianda est, & cum victus ratio, tum medicatio causæ contraria erit instituenda. Verum cum cruciatus coli extremè affligant, eorum curatio moram & inducias non fert. Citissimè itaque, & antequam dolores vires prosternant, ad mitigandos leniendosque dolores properandum erit. Si itaque à crassis pituitosisque ac frigidis humoribus adeoque à vitrea pituita ortum ducant coli dolores, statim sequens enema recto intestino tepidum infundatur.

Curatio. 2. Malvæ, althææ, origani, calaminthæ, rutæ Mercurialis an. M. s. Sem. cymini, Baccarum lauri an. 3 ii. Pulpæ colocynthidos ʒ i. in linteolo ligatæ.

Colica à frigidis humoribus remedia.

Enema.

Concisa atque contusa concoquantur in q. s. aq. ad tertias, decocti juris accipe ʒb i. Cui admisce benedictæ laxativæ, elect. indi, hieræ simpl. mellis rosæci an. 3 s. Ol. chamæmelini, rutacei, anethini an. 3 s. Salis ʒ i. Commisceantur, fiat clyster, quo si necessitas postulat crebrius uti possumus, donec conquiescant dolores, & pituitosi humores detrahantur.

Foris autem abdomini applicentur sacculi ex sequentibus confuti.

2. Florum chamæmeli, anethi, meliloti an. M. ii. rutæ, origani an. M. i. furfuris M. iii. sem. cymini ʒ i.

Sacculi ventri applicandi.

Concidantur & in sacculum consuantur, qui decoquatur in q. s. aq. & expressus calidus applicetur.

Commodissime quoque sacculi ex milio & sale simul mixtis, & in sartagine calefactis applicari possunt.

Sacculi ex milio & sale.

Aut imponatur ventri cataplasma ex stercore equino cum q. s. ol. rutacei confectum calidumque applicetur. His si non levetur dolor, tum præstat ægrum in balneum aq. calidæ deducere in qua decocta sunt flores chamæmeli, anethi, origani, malvæ & rad. althææ atque semina fenugræci. Sumantur autem singularum q. s. pro arbitrio Medici, & antequam descendat æger in balneum, exhibeantur sequentia remedia.

Cataplasma.

Infusus.

2. Elect. de baccis lauri ʒ ii. Commisceantur cum haustulo vini. Aut exhibeatur ʒ i. & s. theriacæ antidromachi. Aut ʒ i. Pul. castorei.

Assumenda ante balneum.

Aut ʒ i. Pul. Dauci Cretici.

Præstat quoque post alvi defectionem per clysterem, ix. guttulas spiritus viatrioli cum haustulo vini generosi ebibere.

Spiritus sulphur. Ol. item cort. arran-

riorum cum vino

exhibitum ad gutt. xv.

pl. jureat.

Vinum absinthite.

Doloris tempore absteineat æger à cibo ac potu, quiescente autem dolore convenientissimus illi potus erit vinum absinthite. Fugiat autem omnia alimenta refrigerantia & stupefacientia quæ in aliis speciebus colici doloris exhiberi possunt.

Processu temporis ubi dolor conquieverit purgans pharmacum exhibeatur.

Bolus catharticus.

℞. Pulp. cassiæ ʒ i. pul. hieræ simpl. ʒ ii. misceantur, fiat bolus, qui sex ante prandium horis devoretur.

Remedia colici doloris ab acribus humoribus.

Acribus autem ac biliosis humoribus dolores in colo excitantibus, statim sequenti enemate humores eluendi ac subducendi erunt.

Enema emolliens.

℞. Violariz, malvæ, althææ, Mercurialis an. M. i.

Flor. chamæmeli M. s. sem. fœnugræci, lini an. ʒ s.

Concisa & contusa coquantur in aq. q. s. ad tertias, ejus juris colati accipe ℞ i. cui admisce cassiæ fistularis ʒ i. hieræ picræ ʒ vi. ol. rosacei ʒ ii. pinguedinis gallinæ, anseris an. ʒ s. vitellorum ovi n. ii. commixta omnia tepida intestino infundantur.

Solium aq. calida.

Convenit quoque ægrotantem in solium aq. calid. collocare in qua concocta sunt flores chamæmeli, malva, althæa, & violaria.

Laudanum opiatum in forma pillularum ad gr. iiii. & iv. vel elos.

Laudani Crolii ad trag. i. s. in vino vel alio liquore convenienti, multo rutilius horum loco exhibetur.

Doloris ex vitrea pituita intestinis impacta remedia.

Enema.

In cibo autem utatur patiens cremore ptisanæ, & piscibus saxatilibus.

Sed ubi hisce dolor non remiserit, tum ad stupefacientia, quæ opiata dicuntur, confugiendum erit, quorum beneficio & sensus doloris aufertur, & acredo humorum extinguitur, tenuitasque crassior redditur, & calor immodicus penitus extinguitur. Inter opiata autem præstantissimum est in coli dolore ʒ i. aut ʒ i. s. philonii Romani, similiter pillulæ de cynoglossa, si ejus ʒ i. in globulos ix. conformetur, & ante cibum deglutatur.

Si ex vitrea pituita intra tunicas intestinorum impacta, orti sint dolores coli, qui intensissimos acerbissimosque inferant cruciatus, & præsentissimum exitum minantur, tum juxta præceptum Hippocrat. extremis morbis extrema sunt adhibenda remedia. Sequens itaque enema statim est injiciendum.

℞. Centaurii minoris, card. benedicti, fol. lauri, rutæ an. M. s.

Sem. carthami, urticæ an. ʒ s. pulp. colocynthidos in linteolo colliga-

tæ ʒ i. concoquantur simul in ℞ i. aq. ad tertias, cujus liquoris colati accipe ʒ x i. quibus admisce ol. laurini, rutæ, anethini an. ʒ i. diaphaniconis ʒ i. elect. de baccis lauri ʒ i. vitellorum ovorum num. ii. salis ʒ i. misceantur, fiat clysterium quod tepidum infundatur.

Per os autem commodissime exhibentur ol. vitrioli guttulæ x. cum haustulo generosi vini mixtæ.

Foris venter & umbilicus illiniatur ol. ex euphorbio calido, cui oleum vitrioli est admixtum.

Remisso aliquantisper dolore, quotidie ægrototo propinetur vinum in quo ramentali-
gni guajaci hac ratione præparata sunt.

℞. Ramentorum ligni guajaci ʒ ii. quæ in ℞ vi. vini Rhenani macerentur xxiv. horis, deinde in cantharo oblinito seu duplici vase per ii. horas coquantur, ex quo mane ac vesperi ʒ vi. exhauriat. Alias in potu uti potest patiens vino absinthite.

Porro si colicus cruciatus ex lumbricis in alvo reptantibus excitetur, hæc conveniunt. Primum infundatur clyster ex ℞ i. lactis, & ʒ i. mellis confectum, ac post tres quatuorve horas, non obstante quod prius eorum lumbricos enecantia & exturbantia remedia in sequentibus enumerabimus.

℞. Rutæ, absinthii, anethi an. M. i. decoquantur in q. s. aq. ad tertias, hujus decocti ℞ ʒ vii. quibus admisce hieræ simplicis ʒ ii. ol. rutæ ʒ ii. salis ʒ i. fiat clyster. Verum lumbricos enecantia & exturbantia remedia in sequentibus enumerabimus.

Sunt præter hæc & remediorum quædam genera quæ ætherea sua qualitate occultis-
que viribus, vel, ut dicunt, tota sua substantia coli cruciatibus, quibuscunque ex causis ortis, mirifice opitulantur: inter quæ laudatur à Galeno stercoris lupini, in quibus lupinum.

Vinum guajaci.

Colici doloris ex lumbricis remedia. Enema lumbricis eos alliciens.

Enema vermes necans.

Remedia propria te quadam occultis colicis conducentia. Stercus lupinum.

Cingulum. bus ossa continentur, arefacti & in pul-
verem redacti, si 3 r. cum vino crebro biben-
dæ offerantur ægrotis. Celebratur & lorum
sive cingulum ex corio cervi factum, cui
stercus lupinum est insutum, si levis & ven-
tri circumligetur. Similiter mirifice confert
Alauda ci- 3 r. cineris alaudæ avis cum vino exhibita.
vis. Sed si frigida ex causa abortus sit dolor coli-
Castoreum. cus per aliquot dies 3 r. pulveris castorei
cum vino exhibere mirifice prodest.

Certa quoque experientia cum à veteri-
bustum recentioribus Medicis comproba-
tum est, si 3 r. intestini lupini arefacti &
pulverati cum vino Rhenano exhibeatur.

Intest- Foris præsertim in frigida colica utilissime
um lupi. applicatur ventri cataplasma ex stercore e-
catapla- quino & floribus lavandulæ æ. p. simul mi-
ma. xtis, & in frixario sive sartagine cum q. s. ol.
rutacei confectum.

8. *Lumbrici alvi quid, quæ causæ genera-*
tionis eorum, quæ signa, & qui-
bus remediis interficiendi &
expellendi?

Lumbrici Εἰς τὸν αὐτὸν *die Spulworm*/sunt
quid. vermes in intestinis generati, differentes
tamen ab aliis vermibus, qui nonnunquam
& in aliis partibus corporis generari ani-
madvertuntur. Quemadmodum enim in
majoris mundi locis cænosis ex putri mate-
ria citra ullum seminale principium à solis
calore vermes & alia animantia genera-
ntur; ita in hominis μικροκόσμῳ partibus
cavis, raris calidisque & humidis, veluti
sunt intestina, pulmones, renes, cavernosi
dentes, pori cutis, & fœdida ulcera in car-
niosis partibus, vermes diversi ex putre-
facta materia, caliditate partium perfusa
generantur; ejus generis sunt vermes den-
tium, pediculi & exilissimi ventriculi qui
cuticulam erodentes pustulas excitant, à
nostris *die Sühren* nominantur. Sed
hoc loco nobis de lumbricis tantum alvi in
intestinis generatis sermo erit. Generantur
autem lumbrici non tantum in hominum
alvis, verum & in brutorum quorundam
corporibus, veluti sunt equi, boves, porci,
ovæ, &c. Lumbricorum porro tres

Vermium diversa ge-
nera.

Lumbrici in aliis
quoque a-
nimalibus.

Lumbrici eorum tres

generationis locis inter se differentes. Quo-
rum primi longi sunt & rotundi, lumbrici
terrestribus similes, qui Græcis ἄλμυ-
βες σπρωγύλαι, id est teretes lumbrici nomi-
nantur, qui in gracilioribus intestinis ge-
nerati, sæpe in ventriculum irrepunt, &
gravissima inferunt symptomata, & non-
nunquam per vomitum ejiciuntur. In ven-
triculo etiam hosce generari observatum à
Johan. Jacobo Crafftio Medico Neoco-
mensi, ut testatur ejus epistola, centur. 2.
obs. Chirurgicarum Fabricii Hildani, 70.
Secunda species lumbricorum Græcis ἑλ-
μινες πλατείαι id est lati lumbrici dicuntur,
qui breves sunt & lati, similes seminibus
curcubitæ, qui in colo intestino genera-
ntur. Tertia lumbricorum species Græcis
ἑλμινες ἀσκηίδες, id est, tineæ alvi, qui
& ipsi exigui sunt, & teretes, vermibus in
cæcis corruptis generatis non admodum
dissimiles, qui in ano sive extremitate re-
cti intestini quæ σφιγκτήρ nominatur, pro-
nascentur, & cum excremento dejecti sua
multitudine fæces conspergunt. Præter hæc
tria lumbricorum genera, vidimus nos
Rostochii in cujusdam honesti civis cu-
ratione excretum fuisse lumbricum trium
ulnarum longitudinem æquantem latum,
& instar fasciæ tenuem, mortuum tamen:
erat enim disruptus, qui forsitan ad latorum
lumbricorum genus referri potest.

Causæ προγενέσθαι sunt caloris nativi &
vaporosi in ventriculo & intestinis inæqua-
litas; qui alimenta assumpta non probe
concoquit, sed potius corrumpit, & in
cænosam materiam convertit, in qua tan-
dem corpora conformat & vivificat copia
materiæ cænosæ, pituitosæ, viscosæque
intestinatorum interioribus tunicis adhære-
scens. Προγενέσθαι sunt crapula, crudi-
tas & alimentorum facile putrescentium,
veluti sunt fructus dulces & fugaces, lac,
caseus, & similia, crebrior & copiosior esus.

Signa lumbricorum sunt ventris distensio,
crebra tormina cum murmure, lientericum
alvi profluvium, pallor oculorum, malæ
crebro rubescunt, & statim rursus pal-
lent, narium continuus pruritus per in-
diam,

Species.
Rotundi.

Lati.

Quartum
genus
τενίων
vocant
Græci,
German.
Ben
Spick /

de quo vi-
de Guili.
Fabr.

Hild. ob-
serv. Chi-
rurg. 70.
ex sequent.
centur. 2.

In Holsa-
tia exhi-
bito cui-
dam ma-
trona pri-
maria à
me catar-
rho, ex-
cretus hu-
jusmodi
lumbricus
fuit, 6.
ulnarum
longitudi-
ne.

Causa.
Signa ge-
neralia
lumbrico-
rum.

Sympto-
mata ver-
mium
stoma-
chum ar-
rodentium
Signa
singula-
rum.
Longorum
Latorum.
Ascari-
dum.

Prognostica.

Curatio.

*Pulvis
contra ver-
mes omnis
generis.
Gille
Theophr.
vel salis
vitrioli gr.
vi. vel
viii.
Chymici
exhibent
cum vino
maltico.
Spiritus
vitrioli
vermes ne-
cat.
Idem præ-
stat spir.*

diam, morfus intestinorum, tussis sicca, punctiones oris ventriculi, nausea, & aquosi humoris ex ore profluvium, præsertim ubi lumbrici in ventriculo irreperunt, nonnunquam febricula adest & in somno aliena loquuntur, sæpe & exclamant & è lecto, exiliunt tremantes. Porro ubi lumbrici in orificium ventriculi surreperunt, hæc gravissima symptomata inferunt, *λασθημίας, συγχωπὴν & ἐπιληψίαν*, quibus si addit & febris, frequenter pueruli extinguuntur. Singulatum autem longorum ac teretium lumbricorum signa sunt, morfus & vellicatio in intestinis: latorum vero famis intolerantia & vermium instar seminum cucurbitæ in excremento reptantium: *ἀσχελίδων* signum, ingens in ano pruritius, & exigui vermiculi per totum excrementum.

Prognostica signa notatu necessaria hæc sunt. Lumbrici vivi per alvum dejecti minus sunt periculosi quam mortui. Extincti enim lumbrici, extremam putrefactionem & venenositatem humorum in alvo contentorum ostendunt. Ex ore prorepantes lumbrici, in morbis gravioribus, vitæ periculum minantur. Sæpe tamen ita excretos vidi ægris restitutos.

Curatio lumbricorum in eorum enecatione & exturbatione consistit. Enecant autem communiter lumbricos omnes sequentia remedia.

24. Sem. fantonici ʒ ii. cornu cervi usti
preparati ʒ i. portulacæ ʒ s. Pul-
verifentur tenuissime, & pro æta-
tis ratione vel ʒ i. vel s. cum hy-
dromelite, aut lacte dulci per tri-
dium mane ac vesperi exhibeatur.

Aut comedendum praefertim puerulis
offerantur mane ac vespere seminum santo-
nici saccharo in crustati 3 ii. aut plures. Prae-
fertissimum remedium adversus lumbricos
est oleum vitrioli, si ejus guttulæ 5. 6. aut
7. pro ætatis ratione mane cum pauxillo vi-
ni præbeantur. Ubi ita enecati sunt vermes,
statim ex alvo evacuari debent aut per ele-
ctuarium diaphanicon, aut per pulpa-
massæ cum aq. absinthii, pro ætatis ratio-
ne $\delta\delta$ aucta aut detracta. Topicum autem

& præsentissimum remedium est lumbricos salis ad
eneas & expellens fel bubulum, cui non- guttulas
nihil pulveris aloës & cymini est admixtum, 6. cum ag.
quod calefactum & lino carpto exceptum Athenas
umbilico applicetur. Præter hæc lumbricos exhibetur.
alvi mirificè expellit 3 r. pulveris lumbrico- Evacuanti-
corum terrestrium cum haustulo hydrome- tia.
litis sumpta. Topicum
umbilico

Speciatim ad lumbricos latos seu cucurbitinos propellendos confert ꝑ i. aut s. pro ætatis ratione sequentis pulvisculi cum hydromelite sumpta.

℥. Rad. filicis, sem. fantonici, fol. auriculæ muris, flor. centaurei minoris an. ̄ i. conterantur tenuissime, fiat pulvis.

Aspergillus speciatim vermiculos in ano
interficiunt & extrahunt glandes seu sup-
positoria ex melle cocto & speciebus hie-
ridis simpl. & sale confecta, crebroque podi-
ci inserta, & paulo post rursus extracta.
Vel inferatur podici suppositorium forma-
tum ex caseo Belgico & melle illinatur, sub-
indeque alvo inferatur & extrahatur. *As-
pergillus* enim catervatim caseo adherentes
evellantur.

Porro si cum lumbricis & alvi fluxio ad-
sit, tum utile erit frequenter exhibere lutea
ovorum in cinericeo foco ad duritiem
affectorum, cui admixtum sit semen planta-
ginis.

Evacuatis lumbricis & putrida eorum materia, prodest ʒi. aut s. aut ꝑi. pro ætatis ratione exhibere theriacæ andromachi, & venenofas qualitates per sudorem discutere.

S E C T I O. IV.
DE ANI AFFECTIONIBUS.

I. *Ani affectiones quæ?*

ANus, podex, Græcis σφιγκτης est musculosa pars, ad extremitates intestinorum, in quam rectum intestinum & venæ hæmorrhoides terminantur, cujus præcipuæ affectiones aut symptomata sunt:

1. Scissu -

1. Scissura ani,
2. Apostema seu tumor in Ano,
3. Ulcus fistulorum in ano,
4. Venarum hæmorrhoidalium apertio & fluor,
5. Ani proidentia.

2. Scissura ani quid, quæ ejus causa, & quibus mediis curanda?

Scissura
ani quid.

ῥαγίδες, scissuræ seu rimæ in ano sunt ulcuscula oblonga, quibus *σφιγμένης* dilaceratur, acerrimum excitantia dolore.

Causa.

Causa *αεχνηταινία*, id est primitiva vel externa est illapsus vel contactus venenati humoris in ano, aut infessus nudo podice in locum virulenta contagione infectum. Causæ *αεχνηταινίας* id est antecedentes seu internæ sunt aut stercus extreme aridum, & cum summa difficultate excretum, aut humor falsus, acris & erodens circa anum collectus.

Signa.

Signa sunt evidentiæ. Adest enim dolor ardens in ano, & ulcuscula intuitu deprehendi possunt.

Prognosticum.

Prognosticum autem signum erit: si *ῥαγίδες* negligentius curentur, in fistulosum ulcus degenerant.

Curatio.

Curatio *ῥαγίδας* consistit in causarum abolitione, dolorum mitigatione, & ulcerum conglutinatione.

Si itaque feces in alvo duriores existant, instituenda est victus ratio alvum emolliens.

Emollientia & lubricantia alvum.

Utatur itaque patiens & quidem crebro prunis dulcibus, quorum jusculum saccharo condat; item jusculis pinguibus, & oleribus, cum quibus concoctæ sunt bera, malva & atriplex rubea hortulans: hæc enim emolliunt arida excrementa in intestinis. Aut concoquantur ʒ ii. fol. senæ in linteolo ligatæ cum prunis Ungaricis, quorum jusculum dulcoretur saccharo, & pruna quidem esiret, jusculum vero bibat patiens.

At si acres & erodentes humores causa sint *ῥαγίδας* in ano, quales sunt bilis exusta & pituita salsa, tum salsa quidem pituita sequenti potiuncula subducatur.

Hausus
catharticus
ad pituitam.

ʒ. Fol. senæ, agarici trochiscati an. ʒ i. s. Contusa macerentur in ʒ i. oxymellis simpl. & ʒ v. aq. hyssopi per noctem, mane e-

bulliant leniter, colentur, & colato jusculo admisceantur elect. diaphaniconis ʒ ii. confectiois hamech ʒ i. fiat haustus, qui ebibatur tepidus in aurora, seu sex horis ante prandium.

Si vero fervens bilis erodat anum, hæc sequenti haustulo purgetur.

ʒ. Rhabarbari electi ʒ ii. fol. senæ ʒ i. Contusa macerentur per noctem in aq. ci-choreæ ʒ iv. mane ebulliant leniter: expressa colentur, colato jusculo admisceantur ʒ iii. elect. rosati Mesue, fiat haustus, qui tepidus in aurora ebibatur.

Reliqua remediorum genera, quibus falsi, acres, erodentesque humores evacuari debeant, ex tabellis remediorum purgantium, quibuslibet humoribus evacuandis destinatum, peti debent.

Humoribus vitiosis evacuatis statim ad mitigationem dolorum & ulcerum consolidationem topicis remediis accedendum erit. Primum itaque fomentetur ac foveatur, laveturque locus affectus singulis diebus ad minimum bis sequenti decocto.

ʒ. Rad. althææ ʒ iii. sem. lini, sænu-græci an. ʒ ii. Flor. chamæmeli, meliloti, malvæ, violarum an. M. iii.

Furfuris hordeacci M. i. Flor. verbas-ci M. iii.

Thuris, aloës an. ʒ i. aluminis ʒ ii.

Contusa & concisa decoquantur in q. s. aq. ad tertias, cui nudo podice infideat æger, substratis prædictis herbis. Aut ejus liquore spongia excepto abstergat & cluat scissuras ani.

Tandem scissuræ absterfis & exiccatis inungantur scissuræ sequenti linimento, aut lana xyliina exceptum imponatur.

ʒ. Ol. lini, violarum an. ʒ ii. Mucilaginis sem. cytoniorum cum aqua rosacea factæ ʒ i.

Ceræ albæ parum, fiat linimentum, cui admisceantur tenuissimi pulveres thuris, mastichis an. ʒ i. aluminis ʒ s.

Præstat quoque scissuras illinire oleo ex vitellis ovorum, aut ol. lini, vel psyllii, aut liliorum alborum. Aut

Xx

ʒ. Al-

iam sal-
sam eva-
cuandam.

Hausus
cholagogus.

Decoctum
pro fomen-
tatione loci
affecti.

Linimen-
tum.

Ol. ove-
rum.

Empla-
strum.

℥ Albuminis ovi unius, mucaginis, sem.
psyllii cum aq. rosac. factæ ʒ ii.

Medullæ ossium vitulinorum ʒ iii.

Agitentur simul in plumbeo mortario,
cum pistillo plumbeo, donec incalescant
nigrescantque instar unguenti, cui admi-
sceantur cerusæ, lithargyrii tenuissime pul-
verati an. ʒ i. Tutæ præparatæ, thuris an.
ʒ s. fiat emplastrum.

Ol. Salmi-
ni hic à
Chymicis
adhibetur.

Addi quoque potest huic unguento vel
emplastro, si acerbitas doloris efflagiter, opii
thebaici ʒ i.

Si ulcuscula sive scissuræ humidiores ex-
titerint, inspergatur scissuris sequens pulvis
tenuissimus.

Pulvis scis-
suris insper-
gendus.

℥ Aloës, plumbi usti an. ʒ s. Thuris,
tutæ præparatæ an. ʒ i.

Cerusæ ʒ ii. Fiat pulvis tenuissimus.

Porro *paradus* omnes vel scissuras tam in
manibus quam in ano aliisque partibus ci-
tissime persanat, fervens vapor scorizæ sive
excrementi ferri candentis, in majusculam
ollam positi, si subinde inspergatur vini ru-
bei pauxillum, & vapor excitatus ex undi-
que objecta olla in partes affectas exci-
piatur.

Vapor sco-
rizæ ferri
omnes scis-
suras sa-
nat.

3. Tumor circa anum quid, quæ ejus cau-
sa, quæ signa, & quæ ratione cu-
randus?

Condyloma
quid.

Κονδυλώματα, tuberculum, est tumor in
margine ani excitatus, similis pugno digi-
torum, aut maturis moris, aut ficui, aut
grano uvæ nigriæ.

Causa.

Causæ *κονδυλώματων* *απορρυμένων* sunt,
aut crassus, niger & melancholicus sanguis
per venas ad anum derivatus ac collectus,
aut sanguis fervens & biliosus.

Signa.

Signa tumoris in ano sunt evidentia, sed
qui ex melancholico sanguine est genera-
tus, nigrior est, & minus dolet: qui vero
ex bilioso sanguine est excitatus, rubi-
cundiore ac flaviore colore cum vehementi
cruciati & inflammatione conspicitur.

Prognosti-
ca.

Prognosticum hujus tumoris signum est, in
condylomate semper adest alvi & urinæ sup-
pressio. Condylomatis curatio si negligenti-
us tractetur, tumor in ulcus fistulosum
transit.

Curatio condylomatis per victus ratio- *Curatio.*
nem, venæ sectionem, causæ ablationem, &
topicorum remedium applicationem per-
ficitur. Si itaque tumor niger vel lividus ap-
paruerit, in victus ratione cibi ac potiones *victus ra-
tio.*
sunt adhibendæ, quæ alvum emolliant, veluti
sunt pruna dulcia, poma assata & saccaro
conspersa, & juscula pingua.

Venæ sectio statim in initio est molienda, *Venæ se-
& lienis vena sinistri lateris est incidenda, & c.*
deinceps causa tumoris, humor melancholi-
cus sequenti potione sensim est evacuandus.

℥ Rad. glycyrrizæ, polypodii, fæni- *Potio me-
culi, petroselinian. ʒ iii.* *lanagoga.*

Corr. capparum ʒ ii. sem. anisi, petro-
selini an. ʒ i. s.

Ceterach, scolopendriæ, scordii, Car. *Vinum
dui benedicti an. p. i.* *hellebo-
ratum*

Conserv. Fumarizæ ʒ ii. fol. senæ ʒ s. *Querceta-
Myrabulorum Indorum, chebulo-
rum an. ʒ s. prunorum dulcium num. ix.* *ni efficacius
hoc præstat.*

Concisa & contusa coquantur cum lb ii.
aq. in duplici vase seu cantharo ad duas ho-
ras, colentur: colati juris omni diluculo, do-
nec potio durat, ebibat æger ʒ v. tepesactas.

Interim vero dum hæc potio usurpatur *Topica.*
tumor foris applicentur emplastra & cata-
plasmata maturantia & discutientia, ut

℥ Rad. althææ ʒ s. sem. fæougræci, li- *Catapla-
ni an. ʒ ii.* *sma.*

Flor. chamæmeli, meliloti an. M. s.

Rad. liliorum albor. cæparum an. ʒ i.

Contusa omnia coquantur in q. s. aquæ
ad molliciem usque, deinde per cribrum ra-
rum transigantur, & ad pulsas formam re-
diganur, quibus admisceantur sevi hircini
ʒ ii. fiat cataplasma, quod calidum per du-
plicatum linteolum extendatur, & bis sin-
gulis diebus tumori applicetur: aut impona-
tur emplastrum diachylon simplex vocatum. *Empla-
strum.*

Porro ubi emollescere incipit tumor, in-
cidatur, & virus ac pus omne exprimatur, *Apertio
tumoris.*
mundificetur, & emplastro tetrapharmaco
vocato, unguentoque Apostolico imposi-
to, artificiose curetur.

Reliqua remedia hujusmodi tumoribus
convenientia, infra in curatione apostema-
tum indicabimus.

Si autem ex bilioso sanguine *κρδύλωμα* est progeneratum, & acerbum excitet do-
lorem, similiter utatur ager cibis lenienti-
bus, & alvum facilem reddentibus, statim-
que in principio secetur vena epatica dextri
lateralis, & purgetur sanguis biliosus sequen-
ti haustulo.

Vena se-
ctio.

Hausus
cholago-
gus.

℞. Rhabarbari elect. ʒ ii. fol. senæ ʒ s.
Contusa macerentur in aq. cichoreæ ʒ i v.
horis 12. deinde leniter ebulliant, expres-
sa colentur, colato juri admisceantur elect.
rosati mesuei ʒ ii. Fiat haustus, ebibatur in
aurora tepidus.

Inseſſus ad
doloris mi-
tigatio-
nem.

Post evacuatas impuritates mitigetur do-
loris acerbitas, per infessionem calidæ aq.
in qua incoctæ sint rad. altheæ, malvæ an.
M. ii. Fol. malvæ, violariæ, flor. chamæ-
meli, meliloti, an. iv. sem. lini, sænugræci
an. ʒ i. Concisa & contusa coquantur ut di-
ctum est.

Inunctio.

Post lotionem inungatur fervens tumor
unguento populino, cui si vehementia do-
loris flagitet, admisceri potest aliquid opii
thebaici in aqua rosacea soluti. Postea im-
ponatur cataplasma refrigerans & repercu-
tione, veluti est:

Catapla-
sma refri-
gerans
& repel-
lens.

℞. Ovi unius luteum cum albumine, cui
probe conquassato admisce ol. rosacei ʒ i.
mucaginis psyllii, cum succo plantaginis &
semper vivæ extractæ ʒ i. commisceantur,
& duplicato linteolo excipiantur, locoque
affecto applicentur tepida. Aut

Catapla-
sma ano-
dynon.

℞. Medullæ panis similacei ʒ ii. mace-
rentur in lacte caprillo, ex quo exceptæ
contundantur in mortatio, & admisceantur
cerussæ lotæ ʒ ii. succi hyoscyami ʒ s. Al-
bumen ovi-unius, fiat cataplasma.

Maturans
& emol-
liens.

Apertio tu-
moris non
est negli-
genda si
per se non
tumpatur.

Sedato dolore cataplasma maturans & e-
molliens imponatur ex rad. liliorum albo-
rum & ceparum assatarum, simulque con-
tusarum cum q. s. ol. rosacei, in catapla-
smatis formam redigantur & tumori im-
ponantur. Aut applicetur diachylon simplex,
& ubi cinaturit tumor, incidatur, pus-
que exprimitur, mundificetur, & conso-
lidetur chirurgico processu.

Plura de tumoribus biliosis, Deo auxi-
liante, infra dicturi sumus.

4. *Fistula sive ulcus fistulosum in ano quid,
qua ejus causa, qua signa, & quo-
modo curandum?*

Σύριγγι ἢ σφιγκτήρι, ani fistula, est ul-
cus arctum & instar fistulæ oblongum atque
callosum, sed non admodum dolorificum.
Accidit fistula in partibus carnosus in quo-
cunque loco, quæ foris quidem constricta
coarctatur, intus autem latius se expandit &
sinuosa redditur.

Causæ *πρηγµέναι* sunt vitulenti & ero-
dentes humores, veluti est bilis flava adu-
sta, aut atra bilis in cinerem conversa: *απο-
κατεκτικαί* sunt ineptæ aut neglectæ cura-
tiones apostematum, aut hæmorrhoidum
apertarum & exulceratarum in ano.

Signa sunt evidentia. Hoc enim ulcus ar-
ctum habet osculum ac rotundum, orificio
fistulæ instrumenti simile, durum ac cal-
losum.

Prognostica signa hæc habentur. Fistulo-
sum ulcus, si non in tempore curetur, exce-
dit subjectas partes usque ad nervos & ossa.

Fistula in ano neglecta penetrat aut cavi-
tatem recti intestini, & tum excrementum
alvi per ulcus prodit, aut penetrat in capa-
citatem cervicis vesicæ, & tum urina per fi-
stulam profluit, aut pertingit ad os coccy-
gis, & tales quidem fistulæ ut plurimum in-
sanabiles sunt, frustra que eis admoventur
manus Medicæ. Sed si sunt recentes, & non-
dum penetrantes, remediis convenienti-
bus, & industria Chirurgica probe curari
possunt.

Curatio ulceris fistulosi consistit in proba
victus ratione, quæ instituenda est pro cor-
poris intemperie, quæ ex superioribus cu-
rationibus morborum biliosorum & me-
lancholicorum est petenda & huc adfere-
nda. Vitent autem hoc malo affecti in uni-
versum omnia intensius calefacientia & a-
cria. Vena secetur sub talo sinistri pedis.
Postea virulentus humor, ac potissimum a-
tra bilis adusta concoquatur, & ad edu-
ctionem præparetur medicamentis, supra
in tabellis medicamentorum atram bilem
extenuantium, descriptis, & statim eva-
cuetur ʒ i. conf. hamech. cum haustulo aq.
melanag-
car-
gus.

Ani fistula
quid.

Causæ.

Signa.

Prognosti-
ca.

Fistula
quænam
incurabi-
les.

Curatio.

Dietæ.

Vena se-
ctio.

Hausus
melanag-
car-
gus.

cardui benedicti mixta. Aut ꝓ r. pill. è fumo terræ aut de lapide lazuli, aliisque remediis vacuationi atræ bilis ibidem dicatis. Postea procuretur ut patiens quotidie exhauriat haustum unum vulnerariæ potionis, quæ ita confici poterit.

Potio vulneraria.

℞. Agrimonix, veronicæ, centaurei minoris an. M. i.

Plantaginis, fol. olivæ an. M. s. rad. chinæ ꝓ r.

Rad. filicis, gentianæ an. ꝓ s.

Contusa coquantur in vini Rhenani ꝑb vi. in duplici vase per 2. horas, colentur, cujus sumat æger omni diluculo ꝓ vi. in quibus tepidis resolvetur spermat. Ceti ꝓ r.

Topica.

His studiose peractis, ad topica remedia & chirurgicam apertionem accedatur, ac primum strictum os ulceris dilatetur, id quod confici potest, si in os ulceris inseratur fistulum radice Gentianæ aut Bryoniæ. Deinde quotitè bis fordidum pus ex ulcere eluatur, abstergetur, exprimatur, ac mundificetur, postea corrupta collapsaque caro extirpetur ac removeatur, dolorque, qui incidit, subinde leniatur, ac postremo ulcus ipsum consolidetur ac conglutinetur.

Mundificantia & abstergentia.

Abstergit & mundificat ulcus fistulosum, vinum rubeum in quo incocta sunt herbæ veronicæ, agrimonix, persicariæ, & saniculæ, radixque chinæ, cujusque colaturæ admixtum sit nonnihil mellis rosacei, quo tepido singulis diebus bis eluatur vulnus.

Callosam & corruptam carnem confusimè.

Porro corrupta & callosa caro auferri potest sequentibus remediis, illinitione unguenti Ægyptiaci, aut unguenti viridis, aut insertione in ulcus radicum veratri nigritib. diebus, aut inpersione pulveris Aristolochiæ rotundæ, aut impositione sequentis suppositorii.

Spiritus salis Chymici adhibent.

℞. Aloës purissimæ, thuris, sarcocollæ, sanguinis draconis, antimonii, aluminis ultimi an. ꝓ r. pulverata misceantur, quæ cum q. s. succi fumarix, in quo nonnihil tragacanti resolutum est, excipiantur, & pro amplitudine ulceris glandes formentur, ulcerique putrido inserantur.

Anodyna.

Dolorem, qui ex remedium acrimonia in ulcere excitatur, subinde lenire possumus

ac mitigare, externis illitionibus olei rosacei, aut populini unguenti, cui si necessitas exigit, admisceri potest parum opii thebaici. Consolidant & ad cicatricem deducunt omnia ulcera putrida & fistulosa hæc sequentia: Inspargatur ulceri pulvis Mercurii præcipitati, & imponatur emplastrum commune: vel

℞. Terpentinx in vino sublimato septies elotæ ꝓ r. Succu arnoglossæ, veronicæ an. ꝓ s. mellis rosacei ꝓ r. decoquantur ad fucorum adsumptionem, ac tandem admisceantur pulveris aristolochiæ rotundæ, peucedani an. ꝓ r. sarcocollæ, myrthæ an. ꝓ r. fiat unguentum, quod tepidum ulceri instilletur. Aut

℞. Ol. laterini, terpentinx, caryophyllorum chymica arte præparatorum, ol. è myrthæ, è mastiche destillatorum an. ꝓ r. Commisceantur & tepida ulceri instillantur, ac quidem bis in die, semper prius ulcus vino eluendo.

Foris autem applicetur emplastrum basilicum vel Apostolicum. Porro auripigmentum præparatum solum omnia fistulosa ulcera sanare potis est. Hac autem ratione præparatur.

℞. Auripigmenti ꝓ r. tartari calcinati ꝓ r. Pulverentur, ac in crucibulo aurifabrorum comburantur in igni forti per horas xxiv. deinde excipiantur ex regula & conterantur, adfusaque aqua sufficienti conquantur usque ad evaporationem aquæ. Reperitur tandem in fundo illa calx albissima, quæ auripigmentum præparatum vocatur. Hujus pulveris justa quantitas ulceri fistuloso inpersa mirifice sanat: aut calcem auripigmenti vitro imposito in humidumque locum collocato, & resolvitur calx in oleolum liquorem, quem ulceri instillato, aut linteolis tenuissimis exceptum, imposito, emplastrumque præscriptum, aut aliud transfixioni dicatum Strichplaster/ ulceri imposito.

5. Hamorrhoidum apertio ac fluor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandus?

Aἰμορροΐς est venarum in sphinctere & Hamorrhoids quid.

margine ani terminantium, ex cumulato melancholico sanguine dilatatio primum & intumescencia; ac paulo post earum apertio, ex eisque sanguinis effluxio. Hæ venæ cum adhuc tument, & nec dum sunt apertæ, cæcæ hæmorrhoides nominantur, & vehementes inducunt dolores; quando vero apertæ sunt, in egerendi conatu, sanguinem copiose eructant: hic sanguinis profluxus, si sit moderatus, salutaris est, ac à gravissimis morbis hominem præservat. Sed si immoderate & præternaturaliter fluat, aut si fluxus consuetus supprimatur, varia inducit symptomata, & plurium morborum est causa.

Hæmorrhoidum nomenclatura & venis ipsis & earum affectionibus singulis attribuitur. Venæ hæmorrhoides sunt ramuli & propagines venarum, quæ ex porta vena ortæ in lienem implantantur, indeque veluti furculi quidam per mesenterium ad rectum intestinum descendunt, & in anum implantantur.

Causa fluxus hæmorrhoidum. Causæ αἰσθησιμὰι tum intumescentiæ, tum apertionis harum venarum, & profusionis sanguinis, sunt humores melancholici, sanguinisque melancholici, sæculenti, adustus & acris, qui primum in epate conficitur, deinde in liene colligitur, hincque per venas prædictas ad anum defertur: αἰσθησιμὰι, sunt cibi crassi ex quibus melancholicus sanguis generatur, & rerum erodentium naribus applicatio vel adhæsiō, veluti sunt hirudines, & glandes ex melle adusto ac sale paratæ & naribus insertæ.

Causa suppressionis. Suppressionis consueti fluxus hæmorrhoidum causæ sunt contrariæ, nimirum sanguis melancholicus crassus & refrigeratus, & refrigeratio ani ex rebus externis.

Signa cæcarum. Signa hæmorrhoidum sunt manifesta. Hæmorrhoides enim vel exuberantiæ quas cæcas hæmorrhoides vocant, intensissimos inter excernendum excitant dolores. Ex apertis autem hæmorrhoidibus sanguis cum excremento profluit, & excrementi superficies cruore conspergitur tantum. In aliis autem sanguinis ex alvo effluxionibus, cruor excretus toti excremento commisceatur. Præterea cæcarum hæmorrhoidum signa

sunt, verrucis similes tumores vel in sphinctere delitescentes, vel in margine ani conspicui, ut dictum est, cum acerbo cruciatu inter egerendum. Suppressionis consuetarum fluxionum signa sunt malus corporis habitus, dolor lumborum & gravitas, ac intumescencia pedum. Signa prognostica sunt, hæmorrhoidibus immoderate fluentibus, nisi cohibeantur, succedit γαγγραινα, & deinde hydrops.

Suppressionum consuetarum moderatarumque fluxionum comites sunt fœdus & lividus color, corporis intumescencia, quartana, & alii morbi melancholici. Cæcas hæmorrhoides vel verrucæ instar intumescentes, nonnunquam lepra aut morbus Gallicus subsequitur.

Curatio cæcarum hæmorrhoidum five tumorum aut verrucarum in ano. In tumoribus five verrucis ani, primum omnium vena sub poplite, aut sub talo sinistri pedis est aperienda: Deinde victus ratio alvum leniens est præscribenda; & procurandum, ne stercus in intestinis in σπύλα indureseat. Crebro itaque esiet æger juscula pingua, pruna Ungarica, poma assata, pulmenta ex amylo & hordeo excorticato. Sint autem hæc omnia saccharo copiose conspersa. Ac si senserit æger constipatam alvum habere, ante prandium devoret ʒx. pulpæ cassiæ recenter evulsæ & saccharo conspersæ.

Post victus rationem, venæque sectionem dolor omni curâ est leniendus. Nihil enim magis vires prosternit, quam dolor. Insideat itaque patiens in solium aq. calidæ, in qua concoctæ sint herbæ sequentes.

℥. Malvæ, althææ, violariæ, flor. meliloti, chamæmeli, an. q. s. fiat balneum: aut insideat sacco tepido in aq. s. cocto, in quo insutæ sint sequentes herbæ.

℥. Herb. malvæ, althææ, viol. an. M. ii. Sacculus.

Flor. verbasci, meliloti, chamæmeli an.

M. i.

Sem. Fænugræci, lini an. ʒ ii.

Concisâ & contusâ imponantur sacco, & consuantur. Aut si in margine ani verrucæ promineant, cataplasma imponatur ex mica

panis.

rum signa.

Suppressionum signa.

Prognostica.

Victus ratio.

Emollientia.

Anodyna.

Infusum.

Sacculus.

Cataplasma.

panis simillacei in lacte macerata, cui ovorum duorum lutea sunt admixta. Aut

Epithema.

℥. Mucilaginis psyllii cum aq. rosacea & plantag. confectæ, quæ linteolis excepta tumoribus imponatur, aut per syringa in sphincterem infundatur. Aut

℥. Ol. rosarum, myrtillorum an. ʒ ii. candidi ovorum n. r. Hæc simul in plumbeo mortariolo diutissime agitentur, donec incrassescant, & nigrum acquirant colorem, & linteolis excepta, tumoribus applicentur, cui si extrema necessitas efflagitat, admisceri potest ʒ i. aut ʒ s. opii thebaici, in aqua rosacea soluti.

*Aperientia
cacæ hæ-
morrhoi-
des.*

Mitigato dolore hæmorrhoidum, statim in principio & aperiendi sunt tumores, & sanguis crassus evacuandus. Aperiunt autem cæcos in ano tumusculos hæc sequentia.

℥. Succu cæparum, centaurii minoris, fellis bubuli an. ʒ i. Commisceantur, & tenui lana excepta, tumoribus imponantur. Aut

Cataplasma.

℥. Stercoris columbini ʒ s. sem. staphisagrie, lupinorum an. ʒ ii.

Amygdalarum amararum ʒ i. pulp. colocynth. ʒ s.

Quibus commixtis admisceantur olei amygdalarum amararum, & succi cæparum an. q. s. fiat cataplas. quod tepidum & per linteolum extensum verrucis applicetur.

*Hirudinum
usus
commodis-
simus.*

Aut applicentur tumusculis hirudines in calamus arundinaceum insertæ. Ubi vero verrucæ in ipso intestino latitant, glans seu suppositorium ex radice cyclaminis formatum, in intestinum inferatur, aut pulpa colocynthidos in sindone ligata, & bubulo felle illita intestinis inferatur. Aut infundatur enema ex ʒ ii. fellis bubuli & ʒ iii. hieræ picræ confectum.

*Melanago-
ga.*

Interim melancholicus succus in corpore contentus extenuetur, concoquatur, deindeque evacuetur pharmacis supra cum in tabellis generalibus, tum in melancholicis capitis affectionibus præscriptis. Probe autem evacuat adustam melancholiam ʒ i. confectionis hamech in q. s. aq. fumariz re-

soluta, tepidaque jejuno ventre exhausta.

Curatio præter naturam fluentium hæmorrhoidum. Ubi apertis venis hæmorrhoidibus, sive ob sæculenti, sive biliosi sanguinis copiam acrimoniamque, & sanguine copiosius præter naturam effluente, nisi fluxioni intempestivæ cito occurratur, calor totius corporis, ac potissimum epatis extinguitur, hydropsque & *ærgo-pla* sequuntur.

Si itaque in hujusmodi fluore corpus plethoricon fuerit, statim vena epatica dextri humeri averfionis gratia secanda erit; aut si vires non ferunt, cucurbitulæ cæcæ, id est sine scarificatione, dextra hypochondrio applicandæ erunt, & si sanguis sit sæculentus, intestinaque excrementis sint imbuta, sequens enema infundatur.

℥. Fumariz, ceterach, betoniz, flor. chamæmeli, meliloti, malvæ, furfurum filiginis an. M. s.

Concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, colati juris accipe ʒ i. cui admisceantur confect. hamech, mellis rosacei an. ʒ i. butyri recentis ʒ ii. fiat enema, quo post dimidiam horam excreto, imperetur ægrotanti conveniens victus ratio, exsiccandi & constringendi facultate prædita.

Tales sunt cibi ex oryza, lacte amygdalino cum aq. chalybeata parato, & similes. Condiantur vero alimenta vel succo uvarum immaturarum, aut cytoniorum. Vinum bibat rubeum & astringens. Medicamenta sint constringentia, electuaria vel pulveres, ut

℥. Conser. symphyti majoris, rosarum an. ʒ s. diacyton. simpl. ʒ i.

Pul. boli armeni, terræ sigillatæ, sang. draconis an. ʒ i.

Coral. rub. præparat. ʒ s. cum syr. cyto. q. s. fiat electuarium, de quo crebro patiens devoret semijuglandis quantitatem. Aut

℥. Croci Martis, coral. rub. præparati, pastill. de succino an. ʒ i.

Misceantur, fiat tenuissimus pul. cujus ʒ i. alternis diebus cum haustulo vini rubei exhibeatur jejuno existente pariente.

*Hæmor-
rhoidum
immodice
fluentium
mala.*

*Curatio.
Vena sã-
ctio.*

*Cucurbitu-
la.*

Enema.

*Cibi a-
stringentes.*

*Electuari-
um stipti-
cum.*

*Sal coral-
lorum cum
aq. planta-
ginis ad
scrup. i. vel
ii. exhibent*

*Chymici.
Pulvis ad-
strictivus.*

Inte-

Topica. Interim nec externa ac topica remedia negligenda erunt, sed quotidie bis hæc frequentia loco affecto applicentur. Si ardor & acredo quædam in fluore percipiatur.

Epithema anodyn. ℞. Muccilag. ex sem. lini & sænugræci in q. s. aq. symph. aut plantaginis macerat. factæ ʒ s. album. unius ovi: hæc simul commisceantur, & in plumbeo mortario diutius agitentur, donec crassescant instar liniamenti, & cum lana xylyna excepta, apertis osculis hæmorrhoidum imponantur.

Dolore nonnihil mitigato, constringentia sanguinemque cohibentia applicentur, ut

Cataplasma sanguinis fluxum cohibens. ℞. Ovum in duritiem assatum, à quo testam cum pellicula detrahito, & in tenuiss. pul. conterito, eique admisceto ejusdem assati ovi dimidiam partem, admisce quoque pul. boli armeni, sang. dracon. terræ sigillatæ an. ʒ s. telæ araneæ mundarum ʒ i. suc. plantaginis q. s. quæ omnia in mortario plumbeo diligenter conterito instar cataplasmatismatis aut unguenti, locoque affecto applicato. Aut

Epithema. ℞. Succi plantag. polygonii, symph. verbasci an. ʒ i. quibus admisce tenuiss. pul. sang. dracon. boli armeni, terræ sigillatæ an. ʒ i. misceantur & incoquantur ad medias, fiat epithema, quod duplicatis linteolis exceptum affecto loco applicetur. Aut

Tulvis. ℞. Testæ ovorum tenuissime pulveratorum ʒ i.

Ramenta fungi betulini inspersa ad miraculum hoc præstant. Linimentum. Thuris, sang. dracon. an. ʒ s. aloës ʒ i. misce, & venarum fluentium osculis vel, orificiis inspergantur, aut cum albu. ovi commisceantur, & cum q. s. sang. ex hæmorrhoidibus profusi, fiat linimentum, quod pilis albicantibus inter femora leporum hærentibus excipiat, locisque fluentibus imponatur. Aut

Emplastrum. ℞. Plumbi usti, acatiæ, cerussæ an. ʒ i. psidæ ʒ s. pulveriscentur tenuissime & cum succi pentaphylli q. s. addita farinæ fabarum ʒ s. fiat emplastr. Si autem apertæ venæ, intra intestina delitescant, & supra scriptis remediis suppositoria & linimenta,

xylyna lana excepta parari possunt, & intra anum inferi.

Porro si vires ferant, collocetur æger in *Infectio.* solio aq. calidæ, in qua sæpiusculè extincta sunt excrementa ferri candentia, & in qua incoctus sit sacculus ex sequentibus herbis concinnatus.

℞. Symphyti, plantag. polygonii an. M. i. r. rad. tormentillæ, verbasci an. M. i. r. veronicæ, stachados citrinæ an. M. i. r. Sem. vel baccarum rubentium ex rosas M. i. r.

Contundenda contundantur, & concidenda concidantur, fiat sacculus, cui in *Ligatura brachiorum.* fo-lio infideat æger.

Facile quoque constringit apertas venas, & adfluentem sanguinem retrahit dolorifica colligatio cum fasciis brachiorum.

Curatio suppressionis consueti fluoris hæmorrhoidum. Qui sæculento melancholico sanguine redundant, & lienem habent imbecillem, si singulis aut alternis annis semel, bis terve fluore salutari & periodico laborant, in quibus effuso impuro sanguine sua sponte venæ rursus subsistunt, eas fluxiones leviter ferunt. Minime itaque medicamentis cohibendæ sunt. Reddunt enim eos tutos ac liberos à gravissimis melancholicis morbis, teste Hipp. Epidem. particula tertia Aphor. 19. inquit: habentes hæmorrhoidas videlicet consuetas ac periodicas *Modicus & consuetus fluxus minime cohibendus.* neque pleuritide, neque peripneumonia, neque depascentibus ulceribus, neque lepra, neque furunculis corripuntur. Tuti quoque sunt à quartanis febribus & mania, aliisque melancholicis morbis.

Verum si hujusmodi consuetæ fluxiones ob crassitiem sanguinis aut constrictionem venarum consistant, præcitati morbi, & alia plurimæ affectiones melancholicæ subsequuntur.

Ubi itaque signa suppressarum hæmorrhoidum consuetarum comparuerint, venarum videlicet in cruribus & circa anum intumescencia, aut gravitas tibiæ, aut dolor circa lumbos, & pruritus in ano, tum statim crassius & melancholicus humor post concoctionem cum ʒ x. diacathol. cum aqua

Vena se-
ctio.

Hirudines.

Ani pro-
cidencia
quid.

Quibus
frequen-
tius acci-
dat.

Causa.

Signa.

Curatio.

Modis re-
ponendi
sphincte-
rem prola-
psum.

Topica.

qua sum. solutis evacuetur, & vena sub po-
pliche aut sub talo sinistri pedis aperiatur, aut
ano, præsertim ubi venæ intumescences
Hirudines. conspiciuntur, hirudines applicentur, aut
remediis paulo ante in curatione cæcarum
hæmorrhoidum recitatis aperiatur.

6. Ani procidencia quid, qua ejus causa,
qua signa, & quomodo curanda?

Πρόπτωσης, prolapsus sphincteris est, ubi
musculi rotundi in extremitate recti intesti-
ni, quibus intestina podici sunt colligata,
extra anum elabuntur & invertuntur, ut per
se se sursum retrahi nequeant. Elabitur autem
sphincter aut sua sponte aut ob conatum ve-
hementiorem inter egerendum, quod cre-
bro gravidis parturientibusque, & pueru-
lis accidere consuevit.

Causa communis est laxitas sive resolutio
ligamentorum, quibus sphincter podici est
alligatus. Causæ autem ἀσθενείας resolu-
tionis ligamentorum sunt frigidi & pitui-
tosi humores sphincteri impacti. Περὶ τῆς
ἐκείνου sunt extremum frigus ætis in anum il-
lapsi, aut frigus aquæ in qua diutius com-
moratus est æger, aut contusio musculorum
ani ex violento ictu casuque.

Signa. Signa prolapsi ani manifesta sunt, tactu
enim visuque apprehendi potest.

Curatio. Curatio prolapsi sphincteris non patitur
longas inducias ad remotionem causarum
internarum. Statim itaque ad ejus impul-
sionem tum χειρουργία industria, tum topi-
cis remediis, antequam refrigeretur & intum-
escat, accedendum erit.

Elapso itaque ano, homine in ventrem
prono decumbente, sphincter manibus stu-
diose intrudatur. Sed si jam non nihil refri-
geratus intumuisse conspiciatur, lacte tepi-
do, aut vino rubeo, aut cerevisia tepida in
quibus cymini nonnihil, aut balaustiarum, aut
rosæ siccæ sunt incoctæ, spongia excepto
sedulo fomentetur sphincter, deinde digi-
tis introtrudatur, aliquamdiuque patiens
pronus quiescat.

At vero si surgenti aut obambulanti ægro-

to iterum anus prolatabatur, uno de comme-
moratis liquoribus tepidus fomentetur, &
sequens pulvisculus ante reductionem in-
spargatur.

℞. Acatiz, hypocistidos, sang. dracon. Pulvis ad
an. ℞ i. fiat pulvis subtilissimus. stringens.

Si vero tumidior est sphincter quam ut
commode reponi queat, & accessit aliqua
inflammatio, primum fomentetur tumor Fomenta-
sacculo ex sequentibus herbis concinnato. tio.

℞. Violar. mal. alth. an. M. i. plantag.
rosar. chamæmeli an. M. s.

Sem. cymini, fenugræci an. ℞ s.

Concisa & contusa insuantur sacculo, qui
cum q. s. vel vini rubei, vel cerevisiæ, vel la-
ctis ebulliat, deinde expressus tumentis loco
applicetur, & subinde in eodem decocto
concalefiat. Tandem absterfo sphinctere
cum spongia, inungatur ol. rosaceo, aut
cyton. & inspergatur sequens pulvisculus, &
ita reponatur intra corpus.

℞. Boli armen. acatiz, sanguinis dra-
con. an. ℞ i.

Cort. granatorum, cornu cervi usti
an. ℞ s.

Fiat pulvis tenuissimus.

Ubi vero sphincter ab humoribus frigidis
impactis resolutus prolatabatur, abstergendi
erunt humores enemate ex ℞ i. decocti li-
quoris centaur. minor. & veronicæ, cui ad-
mixta sit ℞ i. s. hieræ simp. & salis ℞ i. quod
recto intestino infundatur, & post impulsio-
nem sphincteris prolapsi sequens empla-
strum podici subinde applicetur.

℞. Resinæ, ceræ an. ℞ s. serpentinæ ℞ i.
liquefiant simul eisque tepentibus
adhuc admisceatur sequens pulvi-
sculus.

℞. Cort. granat. nucis cypressi, glandi-
um, gallorum an. ℞ s. sang. dra-
con. acatiz, albuminis ovi an. ℞ s.

Fiat pulvisculus tenuissimus, quo simul
bene cum præscriptis commixto conficitur
emplastrum quod per alutam podici adaptatam,
extendatur, eique imponatur.

FINIS LIBRI QUARTI.

FRAN-

FRANCISCI JOELIS
OPERUM MEDICORUM
TOMVS QVARTVS,

In quo

LIB. V. VI. VII. VIII. IX. ET X.

De

MORBIS ET AFFECTIBUS HEPATIS,
LIENIS, RENUM, VESICÆ, GENITALIUM
MULIERUM, PUERORUM, ET EXTER-
NARUM PARTIUM.

SECTIO I.

DE HEPATIS AFFECTIBUS.

I. *Hepar quid, & quibus afficitur morbis, symptomatibusve?*

*Hepatis
descriptio.*



ECUR in infimo ventre principalissimum est organon nutritionis, cujus substantia concreto sanguini similis est, & est primum membrum quod in nobis gignitur, estque officina sanguificationis, tons sanguinis, & radicatio omnium venarum. Situm est Epar sub diaphragmate, illi appensum, quod sua cavitate ventriculum in tota dextra & postica & antica media parte, tanquam manū complectitur.

Situs.

*Hepatis af-
fectus pra-
cipui.*

Morbi atque symptomata Epatis sunt:

Imbecillitas Epatis ex aliqua intemperie,
Inflammatiō,
Obstructio,
Intumescētia,
Corruptio substantiæ ejus seu ulcus vel
exulceratio,
Cachexia,
Morbus Regius,
Hydrops,
Fluxus alvi Hepaticus.

2. *Epatis imbecillitas quid, quæ ejus causa, quæ signa causarum, & quibus remediis succurrendum?*

Ατονία τῆς ἡπατος est quanda facultates naturales in epate languescunt & minus propriè suas exerunt actiones. Sunt autem facultates epatis naturales, ut & aliarum partium omnium, Attractiva, Retentiva, Alterativa & Expulsiva. Propriissima autem epatis actio est αἰμολύσις, id est alimentum in sanguinem convertere. Ubi itaque χυλὸς succus in epate ex ventre attractus, in purum & laudabilem sanguinem converti nequit, epar imbecille dicitur, & ita affectos homines Hepaticos nominamus. Galen. lib. 8. medic. loc. cap. 6. ubi viscus nullo manifesto malo in ipso apparente ad actiones qui dicantur proprias invalidum est, tum laborantem Hepaticum nominant. Qualis autem est temperies & distemperies jecinoris, talis quoque est sanguis in toto corpore. Etsi autem in omni affectione jecinoris adest ejusdem imbecillitas: tamen hoc loco de illa duntaxat imbecillitate tractabimus, quæ ex ejus

*Atonia he-
patis quid.*

*Propria
hepatis ac-
tio.*

*Hepatici
manifesto malo in ipso apparente ad actiones qui dicantur proprias invalidum est, tum laborantem He-
tur.*

*Qualis
temperies
hepatis, ta-
lis in cor-
pore san-
guis.*

Y y ejus

ejus intemperie calida, humida, frigida, sic-
cave oboritur. Porro quæ alitates hæc jecinoris
rarissimè in epate possunt hæere diu, sed
mox humores in eo generati corrumpuntur,
sustinenteque intemperiem epatis. Antequam
autem ad causas imbecillitatis hepaticæ nu-
merandas accedam, signa imbecillitatem
ostendentia commemorabo.

*Signa fa-
cultatum
in hepate
laesurum.
Attracti-
va.
Retentiva.*

Si itaque attrahendi facultas in epate de-
bilitata sit, tunc per alvum excernitur hu-
mor cremori ptisanæ similis: Interim tamen
ventriculus nihil sentit offensionis. Si vero
retentiva vis epatis est languida, per alvum
rubescens humiditas loturæ carnis recens
mactatæ liquidior profluit, & frequenter san-
guis liquidior & dilutior aut per nares aut
hæmorrhoides aut ex ore cum spato erum-
pit. Si autem alteratrix sive sanguificatrix e-
jus virtus est prostrata, tunc crudus & aquo-
sus sanguis per corpus digeritur, ex quo pri-
mum pedes, deinde & reliquæ corporis par-
tes intumescunt. *Excretrix si debilior, ex-
crementitios humores, ut biliosum & facu-
lentum, à sanguine non secernit, qui postea
in hepate retenti illius temperiem immutant.*

*Alteratri-
cia.*

*Excretri-
cia.*

Causæ.

Causæ imbecillitatis jecinoris *αργον γυνέται*
sunt, ejusdem intemperies calida, frigida,
humida, sicca, cum quibus ut plurimum con-
junctus est vitiosus aliquis humor, ut supra
dictum est, aut biliosus, aut serosus, aut pi-
tuitosus.

Περὶ τῆς ἐκείνης sunt alimenta impensè ca-
lescentia, refrigerantia & humectantia,
venulasque epatis obstruentia, & intempe-
stiva talium alimentorum usurpatio. *Huc
pertinet nimia frigidi ingurgitatio, quævis
larga sanguinis fluxio, & Venus nimia.*

*Signa in-
temperiei
calida.*

Signa calidæ intemperiei sunt totius cor-
poris incalescentia, adest sæpe & febris ar-
dens, item scabrities linguæ, squalor corpo-
ris, & ut plurimum per alvum fit excretio bi-
liosa, crassa & graveolens, vomitu quoque
præfina bilis sæpe evomitur; præterea quibus
nimium calefactum est epar, iis ardent vel
intolerabili æstu laborant volæ manus &
plantæ pedum, quod certissimum est calidi
hepatis indicium, ut & color corporis citri-
nus, sitis crebra, iracundia, urina biliosa &
mordax.

Signa frigidæ difcrasie jecinoris sunt to-
tius corporis frigiditas cum quadam intu-
mescentia, excrementa liquida sunt varique
coloris & nonnunquam vini rubei feci simi-
lia, minus tamen foetida, quæ primum qui-
dem diu in alvo detinentur, postea vero co-
piosius profluunt. Appetentia in frigida in-
temperie Epatis non prorsus aufertur. *Urina
alba sunt & tenues.*

*Signa in-
temperiei
frigida.*

Signa siccae intemperiei Epatis sunt cor-
poris habitus squalidus & siccus, excremen-
ta pauca & indurata, linguæ labiorumque a-
riditas & asperitas, sitis continua, cror ex
venis emissus ubi concrevit, siccus prorsus
conspicitur.

*Sicca in-
temperiei.*

Signa humidioris intemperiei Epatis sunt, *Humida
humiditas linguæ, sitis nulla, nulla faciei col-
lapsio, & dejectiones ventris crebrae, liqui-
diores aquosioresque. Prognostica signa hæc
sunt observanda. Calidum Epar ὁρῶν attrah-
tum statim in bilem convertit, ideo calidum
Epar habentes biliosi sunt. Calida intem-
peries Epatis nisi cito tempestivè curetur,
totum Epar colliquatur & universum
corpus absorbetur. Frigida intemperies Epatis
diutius neglecta in hydropem conjicit.*

*Humida
intem-
periei.*

*Prognosti-
ca.*

Curatio pro specie intemperiei varianda
erit, & semper cum alimentis tum medica-
menti præsentis intemperiei aut superanti
qualitati contrariis succurrendum erit. Si ita-
que intemperies calida labefactæ actiones
Epatis, & hujus caliditati adjunctus sit hu-
mor biliosus, tum omnium primum bilis se-
quenti haustulo per biduum mane ac vespere
tepidus exhausto diluatur & obtundatur.

Curatio.

℞. Aq. cichor. card. bened. Absinth. an.
℥ 1.
Syr. è succo cicho. Acetof. citri. an. ℥ s.
Potio bi-
lena alie-
rans.

Misceantur, fiat haustus pro una vice. Ter-
tio tandem die biliosus humor evacuandus
est, aut ℥ iij. syr. rosar. solutivi, aut ℥ s. E-
lect. rosati mcl. aut ℥ x. pul. cassiæ fistularis
recenter evulsæ, cum haustulo aq. cichor.
commixtis, fiat haustus, qui tepidus ebiba-
tur, abstineatque æger à cibo potuque per
6. horas. Tandem instituaturs victus ratio re-
frigerans & epar corroborans. Vitentur au-
tem omnia aromata & alimenta calefacientia,
ac in-

*Cholagoga.
Extrac.
rhabarbari
hic quoque
utiliter uti-
surpari po-
test.*

*Dietare-
frigerans.*

ac imprimis vini *meñacioris* potio & quicquid melle & *saccharo* est conditum. Convenientissima alimenta sunt cremor prisanæ, pruna Ungarica acida, cerasæ cum recentia tum arida cocta & saccharo conspersa, lac amygdalinum, & ex piscibus percaræ aculeatæ, caro pullorum & avicularum. Sint autem alimenta condita uvis passis Corinthiacis & aceto aut omphaceis. Potus in epatis recalcificatione convenientissimus est aq. hordei cum pauxillo Cinamom. cocta, cui admisceatur acetum vini paululum, aut offeratur sequens potio.

Potus.

Emulso
refrige-
rans.

℥. Amygdal. dulcium excorticatarum
℥ ii. sem. 4. frigid. major. an. ℥ s.
Saccari candi in syrup. violar. concreti ℥ i. s.

Contundantur simul in mortario minutiss. quibus admisc. aq. stillat. cich. endiv. veræ an. lb. i. s. & probe agitata exprimendo colentur, fiat lac refrigerans quo pro potu utatur. Aut

Aqua hor-
dei compo-
sita.

℥. Conf. rosar. violar. nymph. an. ℥ i. quæ commixta in colum ponantur per easque lb. iiii. aq. hord. ferventis transcolentur ac refrigerentur, fiat potio. Interim quotidie bis terve assumat æger frustulum unum aut plura rad. cicho. condit. aut rotulas duas diatragan. frig. aut diatrion sandalon, aut sequent. electuar. semijuglandis quantitatem.

Electua-
rium.

℥. Conf. rosar. nymph. an. ℥ s. rad. cich. condit. citrinati condit. an. ℥ i. concidantur minutissimè, eisque admisc. spec. diatrion sandalon, diatrag. frig. an. ℥ i. & cum syr. acetos. citri, fiat electuarium.

Topica.

Extrinfecus topica remedia refrigerantia dextro hypochondrio applicentur, veluti sequens Epithema, unguentum & cataplasma.

Epithema.

℥. Aq. rosar. cichor. plantag. an. ℥ iiii. mucag. sem. psylli cum succo semper vivi confectæ, ℥ i. Aceti rosar. ℥ ii. spec. diatr. sant. ℥ ii.

Commisceantur & excepta duplicatis linteolis tepida applicentur: Aut

Linimen-
tum.

℥. Ol. rosar. nymph. violar. an. ℥ ii. cy-

ton. absinth. an. ℥ i. ceræ albæ q. s. fiat unguentum, quod ter cum succo rosarum eluatur, tandemque admisc. mucag. psylli cum aceto rosar. facti, fiat unguentum, quo inungatur epatis regio & verberæ dorsi: Aut

℥. Fol. cich. acetosæ, plantag. omnium Catapla-
viridium an. m. i. contusis admiscean-
tur farinæ hordei q. s. & acetum rosar.
parum, fiat cataplasma, quod dextro
hypochondrio applicetur tepidum.

Curatio siccæ intemperiei epatis quæ ejus
actiones vitiantur. Sicca epatis intemperies
comes est caliditatis, ex frigidityte enim
nunquam in epate sine interitu animalis ob-
oriri potest. Siccitatis causæ sunt vapores sic-
ci & venenati, febres ardentes, cibi potusque
exsiccantes & medicamenta exsiccantia. Si itaque
ex inflammatione redditum sit epas
siccum, eadem victus ratio, & eadem reme-
dia quæ in calidæ intemperiei curatione
commemorata sunt, usurpanda erunt. Hu-
meccantia quoque talia erunt, lac caprinum
quod per confer. rosar. borag. & violar. co-
latum est, & cremor prisanæ. Plurimum con-
venit balneum in folio aq. dulcis, in qua in-
coctæ sunt rad. alth. fol. mal. & violarum: à
balneo inungendum dextrum hypochon-
drium, sive regio epatis, sequenti linimento.

Remedia
sicca in-
temperiei
hepatii.

℥. Ol. rosar. violar. amygd. dulcium an. Linimen-
tum. ℥ ii. mucag. alth. ℥ i. ceræ q. s. fiat linimentum.

Intra corpus misce epar corroborant & humectant sequentes morsuli.

℥. Carnium cancrorum benè coctorum Morsuli.

& incisorum ℥ ii. pinearum, amygd. dul. concisarum an. ℥ i. 4. sem. frig. major. incisorum an. ℥ ii. confer. rosar. ℥ s. cinam. el. pul. epatis lupini an. ℥ i. sacc. albi in aq. cich. soluti, & ad sufficientiam cocti lb. i. fiant morsuli juxta artem. Plura remediorum genera epati siccantia conferentia, ex curatione febris hæcticæ, quam infra tradituri sumus, huc transferenda erunt.

Frigiditas epatis rarissimè & non diu persistit sine frigidorum pituitosorumq; humorum præsentia, & sine obstructione venula-
ur curanda.

Frigida
hepatii in-
temperies
ur curanda.

Y y 2 rum

rum per substantiam epatis disperfarum, cui & statim accedit tumor & gravitas epatis, nisi hæc intemperies frigida à causa aliqua externa, videlicet applicatione frigidorum remedium oboriat. Curatio frigida intemperiei epatis consistit in victus ratione & medicatione. Plurimum confert uti vino Malvatico aut alias vino generoso, aut clareto vocato vino, quod Plinius sacharatum vinum appellat, in quo buccellæ panis sunt madefactæ, item jusculo carnibusque gallinarum, caponum, perdicum, vitulorum & similibus. Pisces autem omnino vitandi erunt, nam pituitosum suppeditant alimentum. Alimenta condiantur cinamom. zinzib. croc. macé. & caryophyl. aut coquantur cum alimentis rad. petrosel. fol. major. satur. & uvæ passæ. Porro quantum ad medicationem attinet, si frigiditati subit lenta crassaque pituita, eam extenuare, incidere & calefacere oportet, & ad educationem præparare, id quod sequenti potione commodissime effici potest.

Potio pituitam digerens.

℞. Rad. petrosel. fenic. apii, cichor. an. ʒ s. Asari, dauci cretici an. ʒ ii. Pimpinellæ ʒ iii. herb. hyssop. card. bened. flor. centaur. minor. roris-mar. an. M. s. sem. fantonici, fenicul. anisi, carvi an. ʒ ii. Cinam. ʒ i. spicæ Indicæ ʒ ii. Granorum Juniperi ʒ s.

Contundenda contundantur & concidentia concidentur & concoquantur in duplici vase sive cantharo benè oblinito cum vini ʒb iii. ad duas horas, postea refrigerata colentur, colaturæ admisc. syr. de eupatorio ʒ ii. de absinth. ʒ i. de succo card. bened. ʒ i. s. fiat potio, de qua sumat æger diutiusculo, & tribus à prand. horis ʒ iii. tepescitas. Qua potione exhausta subducatur pituitosus humor sequenti haustu.

Phlegmagon.

℞. Agaric. trochisc. ʒ ii. contus. mace-rent. per 24. hor. in aq. absinth. ʒ iii. deinde leniter ebulliant, colentur, & exprimantur, liquori colato admisc. diaphæn. ʒ s. ol. anisi gutt. v. fiat haustus, qui tepidus 6. horis ante prandium ebibatur.

Corrobo-retur, & obstructione venarum exilium liberetur epar sequentibus pharmacis alternatim assumptis, mane ac vesperi devoretur aut ʒ s. rad. pimpinellæ condit. aut cort. arantiorum condit. aut zinzib. conditi, aut rotulæ duæ tresve diacianam. aut Ther. androm. aut guttulæ 7. ol. vitriol. cum haustuulo vini generosi mixtæ, aut cochlear unum aquæ juniperi.

Aperientia & corroborantia epar frigidum.

Crollius utitur etiam hic specifice suo ad

Topica vero calefacientia jecur minimè negligenda sunt. Inungatur itaque dextrum hypoch. mane ac vesperi sequenti linimento.

Septem membra principalia. Linimentum.

℞. Ol. absinth. mastich. nard. an. ʒ s. in quib. ebulliant spicæ Indicæ, celticæ, cinamom. contusi an. ʒ i. exprimantur & oleo colato adjiciatur q. s. ceræ, fiat linimentum. cui rursus admisc. ol. anisi ʒ i. aqua Juniperi gutt. x. fiat linimentum.

Sacculus sequens epar refrigeratum mox calefacit & corroborat.

℞. Rad. capparum, filicis an. ʒ ii. cicho. ʒ s. flo. chamameli, Meliloti, majoranæ, Rorisinar. schordii, chamædris, campepyos an. M. i. sem. fenicul. anisi, fanugræci an. ʒ s. spicæ Celticæ ʒ v. Bach. juniperi M. s.

Sacculus.

Concidentia concidentur & contundenda contundantur, & in sacculo linteo consuantur, interfuanturque, qui in Vino rubeo decoctus & rursus expressus subindeque calefactus in eodem Vino dextro hypochondrio imponatur.

Curatio humidæ intemperiei epatis sumenda est ex curatione hydropicorum, quæ paulo post recitabitur.

Humida intemper. remedia unde petenda.

In genere, omni epatis intemperiei & inde obortæ imbecillitati mirifice conducunt ʒ i. pul. epatis lupini recte exiccati & præparati, & ʒ ii. rad. aut sem. cicho. cum haustuulo aq. stillat. Card. bened. crebro usurpatæ: *ut ita item passa longiores quas zibeas vocant, crebro comesta, & senecionis decoctum de quibus vide Gal. l. 8. med. loc. c. 7. & 8.*

Hepatica remedia generalia.

3. Inflammatio jecinoris quid, quæ ejus causæ, quæ signa, & quomodo curanda?

Φλεγμὴ τῆς ἡπατὸς est ubi primum sanguinea massa in ipso epate, deinde & ejus

Inflammatio hepatis quid.

substantia effervesceit & accenditur. Differt ab ejusdem simplici calida intemperie, & intensione & materiali Cauſa.

Cauſa.

Cauſæ inflammati jecinoris *αὐτογενεῖς* sunt copioſior & craſſior ſanguis in epate generatus, per ejusdemque membranas exudans, quem ut plurimum ſequitur Venularum epatis obſtructio, obſtructionem putrefactio, putrefactionem inflammatio & febris ardens. *Προγενεῖς* sunt meracioris vini, aromatum, pharınacorumque calidorum crebra uſurpatio, & intempeſtiva immoderataque in Venere laſcivia. *Vehemens etiam commotio humorum ab animi affectibus ut iracundia, agonia, conſternatione, amore.*

Signa.

Signa communia inflammati jecinoris ſunt, urina rubea ſeu flammea cum dolore & tumore dextri hypochondrii, linguæ primum rubedo, deinde & nigricies cum ſcabricie, appetentiæ proſtratio, ſitis vehemens, quibuſdam vomitiones vel flavæ vel vitellinæ vel æruginosæ bilis, adeſt & febris acuta: habitus corporis ſqualidus ejusdemque color ad flavitatem vergens, & gena dextra rubore perfunditur. Signa vero quibus dignoſcimus quanam jecinoris pars inflammata ſit, hæc ſunt: ubi gibba pars epatis magis laborat, tum adeſt tuſſicula ſicca, ſpirandi difficultas & dolor ad tactum dextri hypochondrii, *ad jugulum aſcendens & magis punctorius*: ſed ubi concava epatis pars magis inflammata eſt, tum dolor magis eſt gravans, majus cibi faſtidium, crebrioresque vomitiones, ſingultus & vehementior ſitis moleſtat patientem.

Prognostica.

In epatis inflammatione ſingultus peſſimum eſt indicium, teſte Hipp. lib. 7. Aphor. 12. Tum enim ventriculi ſimul eſt affectus, & ut plurimum perniciem adfert.

Curatio.

Curatio inflammati jecinoris victus ratione convenienti, venæ ſeſtione, & remediorum adminiſtratione feliciter perficitur. Victus ratio debet eſſe tenuis, alimentaque proſunt, quæ nec obſtruunt, nec mordicant, ſed corroborant & refrigerant: Talia autem ſunt priſana & cremor ejus, item avenæ, juſculaque & carnes pullorum, avicularum, columbarum, perdicum, vitulo-

rum, & ex piſcibus ſoli melanuri comedantur. Concoquenda autem ſunt in alimento rad. cichor. & paſſulæ minores. Potus ſit aq. hordei, in qua ſaporis gratia pauſillum cinamom. incoctum ſit, & rad. cichor. glycyrrizæ & paſſulæ. Utiliſſimum quoque eſt lac ſive liquor lacteus ex ſem. frigidis majoribus hunc in modum conſectus.

℞. 4. Sem. frigid. major. an. ʒ s. con-
tundantur tenuiſſimè, eiſque admiſceantur
ʒ i. ſaccari candi pulveriſati, ac deinde ad-
fundantur lb iiii. aq. cicho. ſtillar. ſimul-
que omnia coagitentur, tranſcolentur & ex-
primantur, fiat lac, quo vice potus uratur.

*Emulſio
4. ſem.
frig. majorum.*

Venæ ſeſtio ſtatim in principio inflammationis, ſi ætas & vires patiuntur, magnum adfert ad curationem momentum; ſecanda autem eſt epatica dextri humeri, aut ſi ea viſu deprehendi nequit, mediana ejusdem lateris. Præſtiterit autem una vice parum ſanguinis detrahare, ac deinde alternis diebus venæ ſeſtionem terve quaterve reiterare. Poſt venæ ſeſtionem, ſi cava epatis pars ſit inflammata, & vent. ſimul compatiatur, tum bilioſa eluvies primum per clyſtere ſequens, deinde per ſubſequentia cathartica remedia eſt ſubducenda.

*Venæ ſe-
ctionis.*

℞. Fol. Malvæ, alth. violar. Mercur. *Enema.*
centaur. minor. an. M. s. decoquantur concifa in q. s. aq. ad med. colentur, colati juris accipiantur ʒ xiiii. cui admiſceantur hieræ ſimpl. ʒ vi. caſſ. extractæ ʒ i. s. elect. roſat. meſ. ʒ iir. mellis roſati ʒ s. ol. abſinth. ʒ iir. ſalis ʒ i. miſceantur fiat enema quod tepidū recto inteſtino infundatur: altero vel tertio tandem die exhibeatur ſequens bolus.

℞. Pulp. caſſiæ recenter extractæ ʒ vi. *Bolus cho-
elect. roſat. meſ. ʒ i. miſceantur, fiat bolus, lagopus.*
qui ſaccaro conſperſus diluculo devoretur: aut exhibeatur ſequens hauſtulus.

℞. Rhabarb. el. ſenæ Alex. an. ʒ i. s. ſpi- *Hauſtus.*
cæ Indiæ ʒ s. contuſa macerentur per noctem in aq. cicho. ʒ v. mane vero leniter ebulliant, expreſſaque colentur, colatō juſculo admiſceantur aut electua. lenit. ʒ iir. aut elect. roſat. meſ. ʒ i. aut ſyr. de cicho. cum rhab. ʒ i. fiat hauſtus, qui tepidus in aurora 6. ante prand. horis ægotanti propinetur.

*Inflam-
mati hepa-
tiu ex ni-
mia Venere
remedia.*

*Experi-
mentum
singulare.*

Potio.

Inseffus.

Topica.

*Unguen-
tum.*

*Catapla-
sma.*

Porro ubi inflammatio epatis ex immo-
derata Venerea salacitate est oborta, cui nisi
tempestive occurratur, subsequuntur epatis
corruptio & resolutio. Quare statim post
venæ epaticæ sectionem & colluviei in epate
coacervatæ per præscripta remedia expur-
gationem, sequens haustus est exhibendus.

℞. Gallum nigrum viventemquæ per
medium pectus dissecatum, jecurque ejus
adhuc calens in ℥ v. aceti rosat. conjicito,
ac minutiss. conterito, ut tota ejus substantia
in acetum resolvatur, tandem coletur & te-
pidum laboranti propinetur. Deinde sequen-
tis potionis quotidie haustulus tepidus sum-
mo mane offeratur.

℞. Rad. Glycyrrhizæ, cichor. an. ℥ s.
Rhabarb. ℥ ii. Flo. cent. minor. epa-
ticæ an. M. s. cort. interium samb.
M. i. contusa cum aq. ℔b. iiii. in can-
tharo obturato sive duplici vase deco-
quantur per 2. horas, cujus colati li-
quoris singulis diebus accipe ℥ iiii. in
quibus dissoluto sperm. ceti ℥ i. vel
si desit, adipis suilli recentis ℥ i. fiat
haustus. Interim prodest ægrotum ali-
quoties in solum aq. dulcis, in quo in-
cocta sunt fol. mal. violar. rosar. rub. in-
troducere & lavare.

Nec topica negligenda erunt videlicet in-
unctiones vel cataplasmata. Verum in topi-
corum remediorum applicatione perpetuo
hæc duo sunt observanda: I. Ut remediis ad-
misceantur astringentia. II. Cavendum dili-
genter ne remedia actu frigida, sed semper
prius nonnihil calefacta applicentur. In in-
flammatione itaque epatis singulis diebus
inungatur dextrum hypochondrion usque
ad spinam dorsi, ac *ἐν ποσὶ δὲ* cartilago se-
quenti unguento.

℞. Ol. Rosa. Nymph. an. ℥ ii. cyton. è
mastich. an. ℥ i. ceræ candidæ q. s. fiat un-
guentum, quod ter eluatur cum aq. rosacea
& postremo cum succo cytoniorum: inun-
gatur autem ad calidum focum parumque
calefacto unguento: aut applicetur sequens
cataplasma.

℞. Carnium cytonior. ℥ ii. farinæ faba-
rum ℥ i.

Farinæ sænugræci, sem. lini an. ℥ s. Ma-
stich. ℥ ii. Decoquantur simul in acet. rosa.
& aq. rosa. p. æq. usque ad pulvis formam,
fiat cataplasma, quod per linteolum exten-
sum, singulis diebus bis calidum applicetur.
In penuria autem aliarum rerum commodè
applicari possunt dextro hypochondrio fol.
viridia plantag. cicho. & acetosæ simul con-
tusa addito parum aceto rosaceo, quæ calida
applicentur: aut applicetur sequens epithema.

℞. Aq. solani, rosar. cichor. an. ℥ iiii. *Epithema.*
succ. plantag. ℥ ii. aceti rosa. ℥ i. spec.
diatrion sandalon ℥ iiii.

Commisceantur, fiat epithema, quod ca-
lidum duplicatis linteolis exceptum hypo-
chondrio dextro applicetur.

Per os autem in inflammatione epatis uti-
lissimè exhiberi possunt singulis diebus re-
media epar refrigerantia & simul corrobora-
ntia, veluti sunt ℥ s. rad. cicho. conditæ, aut
confer. cicho. aut rosatum, aut rotulæ dia-
trion sand. aut ℥ s. sequentis electuarii.

℞. Rad. cicho. conditæ concis. pyrorum
molcatelli condit. conf. cichor. rosa. an. ℥ s.
concidantur eisque admisceantur spe. dia-
trion san. ℥ ii. pul. epatis lupini, sem. cicho.
pul. an. ℥ i. syr. acetos. citri q. s. fiat elect. de
quo in die bis semijuglandis q. assum. æger.

4. *Obstructio epatis quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quomodo curanda?*
Ἐμφραξίς ἢ πύκνσις, oppilatio jecinoris
est ubi vasa instar capillorum exilia, ex radi-
cibus aut venæ cavæ aut venæ portæ exorta,
& in substantiam epatis sparsa, aut ubi ipsæ
radices venarum id est initia cavæ aut portæ
venæ obturantur & intercluduntur, ut chy-
mus per ea liberè profluere nequeat. Fit au-
tem obstructio epatis aut in ejus cava parte,
aut in gibba.

Causæ obstructionis epatis *αἰτίαι*
quidem sunt *χρῆσις* aut *χρῆσις* id est liquor
in vent. coctus & per venas melsaricas in epar
deductus: aut sanguinea massa in ipsa sub-
stantia epatis confecta. Utraque si lenta, te-
nacia aut crassiora exstiterint: aut vapores,
flatusque crassiores arteriolas opplentes.

Προσγεγραμμέναι sunt omnia alimenta cras-
sum, glutinosum & pituitosum sanguinem
vel

*Hepar re-
frigerantia
& corrobora-
ntia.*

*Elect. he-
paticum.
Spir. vi-
trioli vel
sulphur. a-
liquor gus-
tula pos-
sunt addi,
ut effica-
cius opere-
tur.*

*Oppilatio
hepatis
quid.*

*Differen-
tia.*

Causæ.

*Chymici à
Tartaro
hasce oppi-
lationes
fieri asse-
runt.*

vel *χολον* reddentia. Item alimenta in ventriculo parum bene concocta; præterea exercitia commotionesque corporis vehementiores statim à sumpto cibo: similiter & balnea ante perfectam cibi concoctionem. Item vinum meracius largiter bibitum post esum crassiorum & facile corruptibilem ciborum, ut sunt caesus, anguillarum caro, & pisca. Vinum enim bibitum citissime meatus penetrat, ad eparque & renes defluit, secumque crudiores partes & femicocta alimenta per venas melfaricas ad epar defert, *qua obstructionis potest causa sunt.*

Signa.

Signa obstructi jecinoris communia sunt, coloris faciei in pallorem commutatio, quod ut plurimum flavæ bilis est indicium; aut in albidiores, quod obstructionem à pituita & frigiditate ortam indicat. Si venulæ in gibba epatis parte, quæ propagines sunt venæ cavæ, sint obstructæ, dolor & quandoque tumor dextri hypochondrii sentitur: si autem venulæ in cava epatis parte, quæ siboles sunt venæ portæ, tum nec dolor nec tumor perlentificetur sed appetentiæ prostratio, & fluxus alvi chylosus ut plurimum subsequitur, gravans dextri hypochondrii dolor crassiem obstruentis humoris, tensivus vero crassos vapores & flatulentos spiritus sub membrana epatis collectos obstruentesque offendit.

Prognosti-
ca.

Signa prognostica sunt. Obstructio epatis diuturna si in scirrhum convertatur, ut plurimum lethale est: obstructionem & in epate & in reliquis visceribus comitatur putrefactio, putrefactionem calor febrilis. Diuturna obstructio epatis, obstruente materia calida existente, aut febrem aut *atrophiam* macilentiam, nutritionis frustrationem; frigida vero hydropem, aut alvi fluxum concitat. In omnibus epatis affectionibus, potissimum autem in febribus calidis semper adest obstructio epatis. *Hinc Paracels.* l. 1. de *tartaro*; quæcumque medicina *tartarum* resolvit, vel expellit, curat febrem.

Curatio epatis obstructi, venæ sectione, convenienti victus ratione, & remediorum usurpatione perficitur. Venæ sectio non in omni genere obstructionum epatis mo-

lienda est, sed in corporibus plethoricis *cum ha-*
tantum, & ubi febris obstructioni est adjun- *beat.*
cta, aut ubi humores obstruentes calidiores
biliosioresque extiterint, secunda erit vena.
Si obstructio gibba epatis partem occupa- *Qua vena*
vit, cubiti dextri quam hepaticam vocamus; *aperienda.*
ubi vero cavæ partis venulæ sunt oppilatæ,
aut ubi obstructioni adjuncta est mensium
suppressio aut hæmorrhoidum, tum præstat
venam lateralem interna pedis parte, quam
saphenam Arabes vocant, incidere.

Victus ratio statim in principio præscri- *Victus ra-*
benda est pro ratione intemperiei totius cor- *tio.*

Potus autem ejus sint vinum Rhenanum, & aromaticum, atque hydromel. A sumpto cibo frequenter utatur radice pimpinellæ condita, viter pisces & omnia refrigerantia & incrassantia, ut lac, pisa, & quicquid concoquitur difficulter. Moderato ante cibum utatur corporis exercitio, & alvi obstructionem præcaveat diligenter. Porro calida existente materia obstruente, & apparentibus signis ex urina calefacti epatis, refrigerantia minime tamen obstruentia alimenta sunt offerenda, in quibus præcellit pisana, in qua passulæ & cinam. frustul. est incoctum, pruna acida Ungarica, caro vitulina, avicularum & pullorum, sine aromatibus cocta, quæ commodè condiri possunt aceto, ex piscibus perca aculeatæ quas melanuros Græci vocant. In potu conveniunt aq. hordei, in qua cinamom. & rad. cichor. sunt incoctæ. Aut loco potionis utatur lacte ex 4. sem. frigid. majoribus, cum aq. card. ben. cujus parandi rationem in superioribus commemoravimus. Vix autem aliud

Dietæ in causa calida.

Potus.
Decoctum rad. cichor. cum sero lactis infusæ quæque adjuvantur hic præstat.

Quæ vena
aperienda.

In causa frigida.

*Dieta in
causa ca-
lida.*

*Potus.
Decoctum
rad. cichor.
cum sero
lactis in
igne quo-
que adju-
mentum
hic praestat.*

aliud salubrius in calida obstructione experimur, quam ante prandium ac cœnam uti 3 s. rad. cichor. conditæ.

Remedia.

Quantum ad medicamentorum rationem attinet, statim in initio habenda est ratio alvi, quæ si sit sicca & obstructa, sequenti Clystere aut prunis Ungaricis comestis lenienda erit.

Enema emolliens.

℞. Malvæ, viol. Alth. Mercur. an. M. i. flor. chamæ. anethi, centaur. minor. an. P. i. concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, colati juris accipe 3 x iiii. in quibus dissolve hier. simpl. 3 i. s. ol. chamæ. 3 ii. salis 3 i. quod tepidum recto intestino infundatur ventriculo jejuno existente.

Solus lenitivus.

Altero tandem die exhibeat hora ante prandium pulpæ cassiæ 3 i. s. vel 3 i. cui admixti sint pulv. rhabarb. 3 ii.

Decoctum aperiens & extenuans.

Si vero obstruens materia sit pituitosa, admisc. 3 i. cass. 3 s. Trochis. ex Agarico. In obstructione enim initio violentiora pharmaca sunt vitanda. His peractis utatur æger in frigida obstructione sequenti haustu obstruentes humores extenuante.

℞. Rad. cichor. petrosel. fœnic. glycyrr. an. 3 iiii.

Sem. anisi, apii, petrosel. an. 3 i. Herb. card. bened. agrimon. centaur. minor. an. M. i. pass. min. 3 s. pruno. Ungar. dulc. n. x. fol. senæ 3 ii.

Sem. carthami 3 iiii. cinam. 3 i.

Concisa & contusa in aq. & aceti vini an. 3 xvi. in duplici vase seu cantharo oblito in lebeate ad 2. horas concoquantur, deinde refrigerata colentur & admisceantur syr. de succo cichor. & card. bened. an. 3 iiii. Hujus potionis ebeat æger 3 v. tepidas mane & tribus horis ante cœnam. Hæc potio mirabiliter solvit obstruct. & leniter educit materiam obstruentem.

Porro si obstructionis causa sit calida & biliosa, hac ratione potio est præparanda.

℞. Rad. cichor. Glycyrrh. an. 3 s. herb. cichor. card. bened. rad. graminis an. M. s. sem. 4. frig. minorum an. 3 i. tamarindorum

Decoctum aperiens in causa calida.

3 i. pass. min. 3 s. epat. M. s. rhab. 3 i. hord. M. i. coquantur cum aq. & aceti vini an. lb. i. in duplici vase per duas horas, colentur, colato admisc. syr. bisantini, de cichor. an.

3 iiii. fiat potio, usus ejus est ut superioris. Post exhaustam potionem si adhuc obstruentis materiæ reliquiæ in epate hære videantur, hæc sequentibus cathartics, id est purgativis subducendæ evacuandæque veniunt. Ubi itaque obstructio in cava epatis parte hæret, & materia est pituitosa,

Evacuanda in obstructione cava partis hepatis.

℞. Fol. senæ 3 i. Agar. trochis. 3 i. s. Phlegma- contusa macerentur in 3 v. aq. absinth. per gogon. noctem, mane leniter ebulliant, expressaque colentur, colato admisceantur diaphæ. 3 iiii. fiat haustus qui tepidus ebeat in aurora.

Si vero colluvies biliosa venas obstruat, sequenti haustu expurgetur.

℞. Rhab. 3 ii. fol. senæ 3 i. contusa macerentur per noctem in aq. cicho. 3 v. mane ebulliant & exprimantur, colato jusculo admisceantur, aut elect. lenit. 3 iiii. aut rosati Mef. 3 ii. fiat haustus.

Cholagoga.

Verum ubi obstructio in gibba epatis extiterit, præstat medicamentis diureticis, quam per alvum purgantibus uti.

Subductis humoribus obstruentibus, sequentia medicamenta cum suis specificis virtutibus, tum compositionis temperatura epatis obstructionem tollunt.

Diuretica in gibba Hep. parte obstructa usurpanda. Specifica aperientia.

In frigida obstructione mirum in modum conferunt singulis diebus jejuno vent. 9. gut. ol. seu spiritus vitrioli, cum 2. cochlearib. vini generosi assumtæ, quæ & aperiant venulas obstructas & materiam crassam in gibba epatis parte incidunt & per urinam evehunt. Idem præstant 3. cochlearia aq. Juniperi hausta ventriculo jejuno. Gibbam epatis partem obstructam frigida crassaque pituita, sequens confectio brevi temporis spatio referat.

In obstruct. frigida. Ejusdem efficacia est spiritus tartari, cum liq. convenienti exhibitus.

℞. Gent. pimp. rhab. an. 3 ii. Zinzib. Cinamom. an. 3. i. Rad. Afati, Dauci cretici an. 3 s.

Tragea hepatica aperiens.

Concidantur crassiusculè eisque admisceantur Confect. Anisi, fœnic. carvi, an. 3 i.

Ex hac mixtura mane ac vesperi assumat æger quantum 4. digitis comprehendere potest.

In obstruct. In calida obstructione præscripta remedia omitti debent, & eorum loco utendum est rad. Cichor. condit. aut rotulis Diarhodon abbat. aut Diatrion sandalon, cum ante cœnam tum ante prandium: laudatissimus autem est sequens pulvisculus in aperienda calida obstructione.

Pulvis. Rhab. 3 s. sem. fuma. 3 i. s. Glycyrr. 3 i. Pulveriscent. tenuissimè ac commisceantur, ejusque 3 i. singulis diebus jejuno ventriculo, aut cum haustu aq. Cichor. aut Card. bened. exhibeatur.

Croliis. Mirum in modum omnia obstructionum genera Epatis specifica virtute tollere expertum est 3 i. pul. hepatis lupini arefacti cum decocto centa. minor. sumta. Utilissimè quoque adhibetur 3 i. Trochisc. de Rhab. vel de Eupato. in pul. redactorum, & cum haustulo decocti Agrimon. bibita.

Præmissis. Interim nec Topica externa negligenda erunt, sed singulis diebus bis ante pastum dextrum hypochondrion inungendum erit. *Assen-* In frigida quidem obstructione sequenti linimento.

Assen- 3 i. Ol. Absinth. è Mastich. Nardi an. Ceræ parum, fiat linimentum, quod ter eluatur cum aq. Juniperi. In calida verò obstructione,

Assen- 3 i. Ol. Rosar. Nymph. Cyton. an. 3 ii. Ceræ parum, fiat linimentum, eluatur ter cum aceto rosaceo. Plura remedium genera ad hoc malum facientia in curatione obstructionis Lienis commemorabimus.

Assen- 5. *Corruptio epatis quid, quæ ejus causa, & quibus remediis succurrendum?*

Corruptio hepatis quid. Corruptio sive putrescentia Epatis est, ubi ipsa substantia Epatis, quæ nihil ferè est aliud quam concretus sanguis, resolutur, & in saniem convertitur, cui nisi tempestivè succurratur, primò in *neq̃zēliu*, deinde in præsentissimam mortem conjicit.

Causa. Causa *απονεκρωσις* est obstructionis aut tumoris Epatici neglecta aut perperam adhibita curatio; virulenti humores ex morbo Gallico in Epate collecti.

Προκαταληπτικῶν causæ sunt violenta per-

cussio, aut vulneratio in dextro hypochondrio, & intempestiva immodicaque Venus, item venenum haustum.

Signa corrupti Epatis sunt, decoloratio Signa. & extenuatio totius corporis, appetentiæ prostratio, foetida respiratio, crebriores sudores per totum corpus erumpentes, lenta febris, virium debilitas, urina sæculenta, cujus sedimentum simile conspicitur bolo Armeno contrito, vel substantiæ hepatis, & alvi excrementum sanguinolentum ac saniosum est, & recentis carnis diluto simile. Prognostica signa sunt: In corruptione Epatis si sudores perseverent, viresque magis ac magis debilitentur, & accedat in somnium, propinquæ mortis sunt indicia. Si Epatis substantia exulceretur, ejusque membrana rumpatur, id lethale est.

Curationem corrupti Epatis, partim in Curatio. superioribus, in curatione inflammationis ejus, partim in sequentibus, de ejusdem tumoris curatione tradituri sumus. Hoc loco satis est repetivisse curationem, quando corruptio Epatis ex colluvie venenatorum humorum aut ex Venere originem habet; hæc enim in initio facile curari potest. Statim itaque ubi primum notæ putrefactionis Epatis comparuerint, incidenda erit vena hepatica dextri lateris, & subsequens portio, cujus antea meminimus, quotidie bis usurpanda erit.

Decoctum ad corruptionem hepatis. 3 i. Rad. glycyrr. cicho. an. 3 s. rhab. 3 ii. flo. centau. minor. Hepati. an. M. s. concisa & contusa coquantur in duplici vase cum lb. i. i. aq. stillat. card. bened. per 2. horas, cujus colati juris 3 i. i. i. in quibus 3 s. sperm. ceti est resoluta, mane 2. horis ante cœnam exhibeantur, 3 i. subsequenti pul. quotidie cum haustulo aq. card. bened. bibatur.

Pulvis. 3 i. Jecinatoris lupini 3 ii. rhab. 3 ii. cor. ral. rub. præpar. 3 i. glycyrr. 3 i. s. fiat pulvis tenuissimus.

Indubitatum quoque in corruptione epatis auxilium adfert, Epar galli nigri vivi experimentum, & in haust. aceti rosar. vel aceti simp. adhuc tepens resolutum contritumque & a fibris colatum tepidumque exhibitum.

Infectus.

Conducit plurimum corruptione epatis laborantem in solium seu balneum aquæ dulcis, in qua concocta sunt fol. salicis, violar. Malvæ & flo. rosarum, & chamæmeli deducere. Indies autem spina dorsi & hypochond. dextrum inungatur bis sequenti linimento.

Linimentum.

℞. Ol. rosar. nymph. cyton. an. 3 III. Mucag. ex sem. pſylli contusi in pauc. rosa. aq. confectæ 3 II. ceræ albæ parum, quibus simul bene commixtis & subactis fiat linimentum.

Ante prandium & cænam devoret æger sequentis electuarii semijuglandis quantitas.

Electuarium.

℞. Conser. Rosar. symph. an. 3 s. spe. Diatrion sandalon 3 I. pul. jecinoris lupi, coral. rub. præparat. an. 3 I. s. Boli Armen. veri 3 I. cum syr. violarum, fiat Electuarium.

Paracelsus cheiri metal. seu Mercur. vita cum vino vita exhibet ad corruptionem hepatis tollendam, illudque à putrefactione præservandum.

6. Tumor epatis quid, quæ ejus species, causa, causarumque signa, & quid in ejus curatione tendendum?

Tumor seu abscessus quid. Tumorum differentia

Απόστημα, tumor & abscessus significat omnem elevationem ac distensionem cutis, aut superficiæ alicujus partis sive visceris, ac divulsionem ejus à subjecta substantia cum qua prius unita & continua erat, idque vel interventu alicujus humoris vel flatulenti spiritus. Tumorum quatuor sunt genera, sumpta differentia à materia interveniente.

Tumor seu abscessus quid. Tumorum differentia

Φλεγμώδης tumor est ex copioso & ferventi sanguine ortus *ein Blutschwer / Ew-dax heilige Dinnk / ΐδμω* ex pituitoso sanguine & flatulenti spiritibus *ein weich geschwel.* Σκληρόδης, durus tumor ex feculento & melancholico sanguine *ein Stein hart Geschwel.* Hi omnes juxta magnitudinem rursum distinguuntur. In jecinore enim duplices tumores oboriuntur: Parvi & bullis seu vesiculis similes, ὀδοντιδες Græcis dicti, qui ut plurimum complentur flatulento spiritu aut seroso humore. Alii majores totam superficiem vel aliquam ejus partem, cavam videlicet, aut gibbam occupantes.

*Hepatis tumores duplices.**Causa.*

Causæ pustularum vel exiguorum tumu-

sculorum in Epate *ασηνυμέναι* quidem sunt sanguis serosus aut biliosus, aut flatulenti spiritus sub tenuis. pellicula, qua vestitur Epas, collecti sicut cernere est in jecinore matatarum pecudum malè habentium.

Προστυρεκτικαί, vero sunt creber usus alimentorum acrium ac flatus generantium, veluti sunt cæpe, piper, pisa, sinapi, salsamenta. Item ictus violentus in dextrum hypochondrium: Signa pustularum Epatis in gibba seu exteriori parte excitatarum sunt dolores pungentes dextrum hypochondrion, qui usque ad claviculam sursum protruduntur: Nonnunquam internus pruritus, quibus ut plurimum sicca tussis, & totius corporis macilentia supervenire consuevit.

Signa apostematum vel pustularum in concava Epatis parte sunt dolores pungentes in dextro hypochondrio, qui deorsum versus Iliæ se extendunt, præsertim ex decubitu in dextrum latus, appetentiæ prostratio, crebræ eructationes, nonnunquam singultus, corporis extenuatio, & si digiti hypochondrio dextro sub costis mendosis inseri tententur, præ dolore id fieri nequit.

Omnes enim tumores Epatis adest continua & lenta febris. Signa prognostica: Pustulæ ruptæ Epas exulcerant, & nisi maturè succurratur priusquam substantia Epatis consumatur, lentam mortem adferunt. Omnis enim continui solutio sive vulnus (nempe vulnus aliud penetret, alioquin exempla sunt restitutorum) Epatis, restificante Hippo. 6. Aphor. 18. lethale est. Is enim inquit: vesica aut cerebro aut corde aut ventriculo aut aliquo ex tenuioribus intestinis aut jecinore vulnerato lethale est. Alvi fluxus tumoribus Epatis superveniens mortis signum est. Apostematum Epatis comites sunt ἀστροφία, hydrops & tandem lenta mors.

Curatio Apostematum jecinoris difficilima ac periculosa est. In ejus itaque curatione principio consideranda est intemperies & totius corporis & ipsius Epatis: sed præstat Medico aut prorsus abstinere à curatione Apostematum jecinoris; aut curationem ordiri cum prædictione periculi. Ubi enim eorum curatio est neglecta, & Epas

*Signa tumorum in gibba hepatis parte.**Signa tumorum in concava ejus parte.**Prognostica.**Curatio.*

Epar jam est exulceratum, curari nulla industria potest: (refert tamen Cornelius Gemma hepatis magnam portiunculam per illi dextri vulnus cuidam juveni Hispano exfudasse, & tamen agrum decoctis vulnerariis & manuali industria saluum evasisse.) Et tum, si consolationis gratia ad curationem urgeatur Medicus, victus rationem præscribat primum convenientem naturæ corporis, frigida calidam, calida frigidam, & abstinere præcipiat a salsis, pipere, & crassiss alimentis: tandem instituitur venæ sectio Epaticæ in dextro humero, deinde corpus ipsum à vitiosis humoribus evacuetur, si apostema in cava parte Epatis extiterit, per Clysteria, aut per potionem cathartica: si vero gibba pars Epatis est affecta, magis per urinam moventia debet fieri evacuatio. Clystere itaque in hunc modum parari potest.

Dieta.

Evacuatio-
nes in cava
hep. parte
affecta.

Enema.

℞. Mal. Mercu. Violar. an. M. i. Flor. Chamæm. Absinth. an. M. s.

Coquantur in q. s. aq. ad medias, colati juris accipe ℞. i. cui admisce, si calor adsit, Elect. lenit. ℞. ii. Ol. rosa. ℞. i. Si vero frigidum corpus extiterit, hier. simpl. ℞. i. s. Ol. absinth. ℞. i. Salis ℞. i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Haustus
purgans.

Aut in calido corpore ℞. Rhabar. ℞. ii. Macerentur in aq. cichor. per noctem, manè leniter ebulliant, & expressa colentur, colato juri admisceantur Elect. Rosa. Mes. ℞. i. fiat haustus, qui jejuno ventriculo 6. horis ante prandium ebibatur.

Remedia
apostema-
tum in
gibba hep.
parte.

Si vero frigida sit corporis constitutio, nullaque adsit febricula, ℞. Diaphæn. ℞. s. aquæ stillat. absinth. ℞. i. Commisc. fiat haustus. In gibba parte Epatis existentibus apostematib. post levem purgationem alvi, præscripta remedia urinam moventia administranda erunt. Pro detrahenda itaque impuritate Epatis per urinam plurimum conducit in calidis corporibus sequens pulvis.

Pulvis
diureticus.

℞. 4. Sem. frag. maj. minutiss. concisum, an. ℞. i. pul. succini albi. Sem. Alkakenki an. ℞. i. lapil. Cancrorum ℞. s. lapillorum ex capitib. melanuri piscis ℞. ii. Misceantur

exquisitissimè pulverata, & ejus ℞. i. cum aq. petrosf. haustulo, exhibeatur per aliquot dies.

Urinam movent & ulcera Epatis conglutinant ℞. ii. Terebinth. claræ, & septies in aq. petrosf. claræ, cum haustuloque aq. petrosf. ebibita.

In frigida Epatis constitutione prodest exhibere ol. succini gutt. 7. cum tenui vino.

Verum inter omnia medicamentorum genera nullum præclarius humores & flatus in tumoribus & vesiculis contentos exiccat, se & discussisse experientia deprehendimus, quam decoctum sudorificum in hunc modum paratum.

℞. Rad. chinæ ℞. i. cichor. ℞. s. minutissimè concisa coquantur in ℞. 4. aq. in duplici vase per 2. horas. Tandem cantharo refrigerato colentur; hujus decocti singulis diebus per spacium 4. dierum mane ebibat æger ℞. vi. calidas, & bene coopertus sudet per horulam. Id tandem observet patiens ut per totum hoc tempus nec cerevisiam, nec vinum, aut alium liquorem gustet, ac pro potu admittat, nisi secundarium decoctum præscriptarum rad. quod ita præparari potest.

℞. Eisdem rad. antea semel decoctas, quib. saporis gratia admisce ℞. i. úvarum pass. minor. & in aq. ℞. 8. ut prius in cantharo per 2. horas. coquantur ac colentur: Qua portione pro siti sedanda subinde utatur. Deficientibus autem præscriptis potionibus, rursus eadem ratione præparatio reiteretur.

Quod ad topica remedia attinet, utilissimum est dextrum hypochondrion singulis diebus bis, mane videlicet & vespere, in calida quidem intemperie, sequenti linimento inungere & confricare.

℞. Ol. rosa. è mastic. Cyton. an. ℞. i. Linimentum. Ceræ albæ parum, fiat linimentum, quod ter eluatur cum aq. rosa. ac postremo cum acet. rosa. In frigida autem Epatis constitutione,

℞. Ol. absinth. de hypericone, Nini an. ℞. ii. ceræ parum. Fiat linimentum, & eluatur ter cum vino Rhenano. Cætera Topicorum remedia ad tumores Epatis facientia

Heparro-
borantia.

in sequenti tractatione de Epatis duricie commemorabimus. Pro corroboratione autem epatis quotidie gustet æger, in caliditate epatis, rad. cicho. cond. confer. Rosa. rotul. diarhodon Abbatis & diatrion fantalon. In frigida ejus intemperie, degustet Aromaticum rosatum & aquam cinamomi.

7. Durus tumor epatis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis persanandus?

Scirrhus
hepatis
quid.

Scirrhus in genere omnis durus tumor in qualibet parte nominatur, qui dum adhuc recens est & sensibilis dolensque, scirrhosus tumor nominatur, sed ubi progressu temporis in lapideam duriciem est conversus, ac sensu omnique dolore caret, tunc exquisitus scirrhus dicitur.

Hepar &
lien scirrhus
obnoxia.

Inter omnia viscera Epar & lien obnoxia sunt duro Tumori sive scirrhus. Epar quidem, quia impuriore nutritur sanguine & exiles habet venas, quæ faciliè obstruuntur; lien autem, quia sæculento & crasso nutritur sanguine. Omnis autem tumor durus prognascitur, aut exsiccatione, aut concretionem, aut repletionem humorum: Insensibilis autem & doloris expertus redditur ob materiarum frigiditatem.

Generatio
scirrhi.

Paracelsi
de scirrhus
hepatis sen-
tentiam
vide l. 1. de
Tartaro
tr. 2. c. 3.
ubi ex car-
taro oppo-
sitionem
fieri asse-
rit.

Causæ scirrhi seu Intumescentiæ epatis tres præcipuè sunt, magna & diuturna obstructio, humores lenti ac crassi, aut nimio calore exsiccari, aut nimia frigiditate indurati, intra membranulam epatis collecti. Tales autem humores magna ex parte sunt aut pituitosi aut melancholici. Interdum etiam bilis sensim incrassescens, ut in scirrhus qui icterum insequitur. Progenitæque sunt alimenta obstructiva & indurantia, qualia ferè sunt omnium leguminum genera, præfertim pisa, fabæ & similia: Item medicamentosa Topica impensè refrigerantia & adstringentia seu repellentia dextro hypochondrio quoque modo imposita. Proinde perpetuo cavendum est, ne in inflammatione epatis hypochondrii actu frigida applicentur, sed modice recalescenda aut tepida. Oritur quoque, apostema ex casu, aut violento ictu in dextrum hypochondrium illato.

Cautela.

Signa indurati Tumoris in qualibet parte manifesta sunt; tactu enim deprehenduntur. Ita & epatis scirrhus per extuberantiam duriciemque dextri hypochondrii deprehenditur, nec digiti tumescente epate sub costas mendasas immitti intrudique possunt. (Vidi Lunab. in opifice quodam adeo tumidum & scirrhosum hepar, ut costas mendasas dextri lateris elevareret, & totum ferè abdomen excepto sinistro hypochondrio compleret & in insignem tumorem attolleret, qui affectus ex malè curato ictero à lithotomo quodam subsecutus est, agrumque tandem suffocavit.) Præterea color totius corporis defædatur & ex nigro flavus conspicitur, pedes & venter intumescunt, superiores corporis partes gracilesunt. Accedit nonnunquam ex alvo chyli profluvium. (Nam hepar propter obstructionem nihil attrahit.)

Porro ex quo potissimum humore scirrhus in epate generatus sit, ex colore totius corporis faciliè deprehenditur. Albus enim color pituitæ, subniger & plumbeus sæculenti sanguinis, nigraque bilis sunt indicia. Cum enim Jecur fons sit alimenti totique corpori sanguinem distribuat, qualis fuerit sanguis in Jecinore, talis erit & totius corporis color.

Prognostica notatu digna sunt: Scirrhus tumor omnis cum jecinoris tum aliarum partium difficilissimam, & non nisi in morbi principio curationem admittit. Emollientibus enim solis magis augetur tumor. Exquisitus autem Jecinoris Tumor qui sine sensu persistit, omnino insanabilis est: proinde præstat Medicum ab ejus curatione abstinere, ac Deo naturæque curam committere.

Tumorem epatis, si paulo diutius perseveret, necessitate consequitur hydrops, Ventris profluvium tumori Epatis superveniens ut plurimum lethale est.

Curatio duri Tumoris Epatis statim in morbi principio, antequam malum radices egit, tentanda est, (tales enim sæpius se curasse Galenus testatur; ubi vero ad plures dies extensus esset scirrhus, nec se curare potuisse, nec alium qui potuerit vidisse:) ac primum quidem Epatis obstructio studiosè

Malum
quando in-
curabile.

Curatio.

est amolienda, cujus curationem paulo ante tradidimus; deinde univerſa curatio tumoris perficienda eſt venæ ſeſtione, victus ratione, & remediorum tum intra tum extra corpus ultrapatione.

Phlebotomia.

Dietæ.

Venæ ſeſtio in plethoricis corporibus eſt inſtituenda. Secunda eſt autem vena epatica dextri lateris. In victus ratione cibi concoctu faciles, veluti ſunt cremor avenæ & hordei, & carnes pullorum, avicularum, vitulorum, & reliqua, quæ in obſtructione Epatis ſunt commemorata, ſunt offerenda. Conſtant autem alimenta rebus aperientibus & abſtegentibus, veluti ſunt acetum, (ex optimo vino conſectum, alioquin magis adſtringit quam aperit,) ſemen aniſi, fœniculi & radices petroſelini ac crocus. Vitanda autem ſunt omnia dulcia, (paſſulis majoribus exceptis quæ valde hic proſunt,) pinguiſſima, viſcida, craſſa & concoctu difficilia. Pro potu vinum tenuè reliquis liquoribus præſtat.

Remediorum formula unde deſumenda.

Hauſtus purgans.

Medicamenta in ſcirrho Epatis ea omnia conveniunt, quæ ſupra in obſtructione Jecinoris enumerata ſunt, & quæ infra in lienis Tumore enumerabuntur. Principio itaque poſt venæ ſeſtionem ſequenti hauſtulo ex venis Meſaraicis & ipſo epate vitioſi humores ſubducendi erunt.

℞. Syr. roſat. ſolut. ſyr. de cichor. an. ʒ i i. diacathol. diaph. an. ʒ i i i. aquæ cichoræ abſinth. an. ʒ i i. Fiat hauſtus, qui tepidus in aurora ebibatur. Altero die ruſum reliquæ commoti humoris ſequenti clyſtere ex inteſtinis eluantur.

℞. Mal. Alth. an. M. i. flo. abſinth. centau. min. chamæm. an. M. s. coquantur in q. s. aq. ad médias, colati juris accipe ſb. i. in quo jure diſſolve Diaph. hier. ſimpli. an. ʒ i. s. ol. chamæm. abſinth. an. ʒ i. ſalis ʒ i. commiſceantur, fiat Enema, quod tepidum recto inteſtino inſundatur. Poſtea ſingulis ſeptimanis bis utatur ſequentibus pillulis.

Pillule aperientes.

℞. Myrrhæ el. ſtyracis calam. an. ʒ i. ſpicæ Celticæ, ſchænantus an. ʒ s. Cinam. croci an. ʒ i. Tenuiſſimè pulverata excipiantur cum q. s. Terebinth. in aq. Agrimon. ſepties

elotæ, conformentur pill. xv. & pro una vice in aurora deglutiendæ offerantur. Tandem intermediis, inter aſſumptionem pill. diebus, mane ac veſperi quotidie exhauriat æger ʒ i i i i. ſequentis potionis.

℞. Rad. Alth. Cichor. graminis, petroſel. Aſpar. Iridis Eryngii an. ʒ s. Herb. Card. Bened. Cichor. Marrubii an. M. s.

Sem. petroſelin. Halicacabi, viticis an. ʒ i i i. ſem. Malvæ p. i.

Dactyl. paſſul. min. an. ʒ i. Quat. ſem. frig. maj. an. ʒ i i.

Conſ. Roſar. violar. an. ʒ i. concifa & contuſa decoquantur in duplici vaſe cum ſb i i i. aq. colentur, & colato juri admixceantur ʒ i i i. aceti vini, ſyr. de cichor. de ſuc. card. benediſt. an. ʒ i i i. fiat porio: Interim ſequentibus Topicis commodè utimur. In Topicorum autem adminiſtratione diligenter cavendum eſt, ne vehementer calefacientibus & exſiccantibus nec nimium fortibus medicamentis, propter Jecinoris generoſitatem ac ſubtilitatem utamur, ſed iis quæ udo tepore duriciem emolliunt & obſtructionem referant; qualia ſunt hæc tria remediorum genera, Fomentum, Unguentum, & Emplaſtrum ſive cataplaſina. Fomentum ita parabimus.

℞. Abſinth. ſpicæ Celticæ veræ an. M. i. Rad. Alth. contuſæ ʒ i. lilior. albor. ʒ i. ſ.

Chamæmel. Roſar. an. M. s. Cyton. exſic. ʒ i. Rad. Aſar. contuſi ʒ s.

Concoquantur ſimul in q. s. aq. ad medias, cujus liquor colatus calefactusque ſpongia excipiat, cum eoque mane ac veſperi tumor ſeu dextrum hypochondrion per ſemihoram fomentetur. Tandem ejus liquoris humiditate abſterſa inungatur tumor ſequenti unguento.

℞. Ol. Abſinth. è Maſti. an. ʒ s. Nard. Cyton. an. ʒ i i. Medul. vitulinæ ʒ i i i.

Mucag. rad. alth. cum acet. roſa. conſect. ʒ i i.

Ceræ q. s. fiat unguentum molle, & eluatur ter cum ſucco Abſinthi. Poſt inunctionem imponatur tumentum Jecinori ſequens Emplaſtrum.

℞ ʒ ʒ

℞. Gum-

Idem præſtat pill. ex Ammoniaco & Maſtice.

Decoctum aperiens, emolliens, & diureticum.

Essentiam croci ʒ cum aq. cichor. vel endivie nonnulli hujus decocti loco exhibent.

Topica quæ conveniunt.

Fomentum. Emollientia & reſolventia, quæ acetum quoque recipiunt, alternatim eſſe adhibenda Galenus ſuaſet.

Linimentum. Adipem leonis etiam Galenus valde commendat l. 2. art. curat. ad Glaucôn.

Empla-
strum.

Ol. cera
quoque hic
utile, si eo
locus affi-
nuntur.

Catapla-
sma re-
solvens
& discu-
tiens.
Pareus e-
tiam sus-
simigio u-
titur ex a-
ceto aceri-
mo & aqua
vita lateri
ignito in-
fusa, ad
scirrhusos
tumores
resolven-
dos.
Icterus
guld.

Ejus gene-
ratio.

Differen-
tia.

℥. Gummi Ammon. Bdellii an. ʒ iii.
quæ cum aceto Rosa. ad ignem liquefiant
ac resolvantur, postea misce. ol. Absinth.
ē masti. an. ʒ ii. Ol. ē croco, styracis liqui-
dæ an ʒ i. quib. omnibus mixtis adde ceræ
q. s. ad duriciem Emplastri & fiat Empla-
strum, quod per alutam extensum dextro
hypochond. alligetur, nec inde removeatur
nisi cum tumor fomentatur atque inungi-
tur. Vel imponatur sequens cataplasma.

℥. Farinæ seu pul. Lupinorum, hordei,
flo. Chamæ. absinth. an. ʒ s.

Croci ʒ ii. spicæ nardi ʒ i. schænanthi
ʒ s. commixta simul coquantur in q. s. ace-
ti rosa. donec redeat in formam pultis. Qui-
bus tandem admisc. ol. nardi, absinth. & ē
mastic. an. ʒ s. fiat catapl. instar crassioris
pultis, quod calefactum extendatur per du-
plicatum linteum, & mane ac vespere reca-
lesfactum tumenti Jecinori alligetur. Cæ-
tera in scirrho Lienis commemorabi-
mus.

8. Morbus Regius quid, quæ ejusdem
causa, quæ signa, & quibus præ-
sidiis sanandus?

Integ. Aurigo, & Celso Arquatus, quem
vulgus corrupta Græca appellatione icteri-
ciam, nostri **die Gelbesucht** / vocant,
est bilis vel flavæ vel nigræ per totum corpus
effusio. Fit autem quando segregatrix facul-
tas epatis debilior in purificatione sanguinis,
vel bilem flavam in vesiculam felleis, vel
nigram fecemque sanguinis ad splenem, tan-
quam ad propria receptacula, propellere
nequit: vel quando meatus alteruter, tum
qui ex Epate in vesiculam, tum qui in inte-
stina protenditur: vel cum meatus qui ex
splene in fundum ventriculi insertus est, ob-
struitur, & vel bilis flavæ vel nigræ, vel simul
utraq; in epar regurgitant, sanguinemque
in venas distribuendum suo colore aliisque
qualitatibus inficiunt. Tres itaque species,
à causa materiali & colore sumpta differen-
tia, morbi Regiiprehenduntur. 1. Lu-
tea ex flavâ bile. 2. Nigra seu fusca & a-
tra. 3. Subvirescens, ex utriusque humoris
commixtione. Hoc autem loco de Luteo
tantum ex bile flavâ orto nobis sermo e-

rit. De Nigro autem ictero in splenis af-
fectionibus paulo post tractaturi sumus.

Causæ *αἰτιολογία* Regii morbi sunt, *Causa*.
epatis segregatricis facultatis imbecillitas,
epatis inflammatio, obstructio, durities,
bilis flavæ regurgitatio in epar ob meatuum
vesiculæ bilis obstructionem, quæ con-
tingit à crassis humoribus in eis impactis,
aut propter calculos qui frequenter in ve-
sícula bilis generari solent: Item critica ex-
pulsio in febribus biliosis, & totius corporis
calidior intemperies.

Περίτρεξις, crebrior & intempesti-
vior usus alimentorum & remediorum faci-
le in bilem convertibilium, quale est mel,
item venenum haustum, & virulentorum
animantium serpentumque morsus.

Signa morbi Regii communia quidem
manifesta sunt. Deprehendi enim possunt
ex luteo aut virecente colore faciei totius-
que corporis, ac potissimum albuginis o-
culorum mutatione in luteum colorem:
præterea adest & pigrities ad motum cor-
poris, quam semper sequitur difficultas re-
spirationis, & urina extensissimè flavescit
bileque tingitur, adeo ut in ea madefactum
lintheum aut charta proflus croceo colore
tingatur.

Causarum vero & loci affecti signa hæc
sunt potissima. Si icterus ex inflammatio-
ne epatis & segregatricis facultatis debili-
tate originem ducat, ex signis de inflam-
matione Epatis commemoratis, ex ardo-
re videlicet dextri-hypochondrii, siti & in-
solita flavedine excrementi, & crebra su-
doris eruptione & febris præsentia depre-
hendi potest. Verum si morbus Regius ex
vesiculæ bilis, quæ epar subjacet, obstru-
ctione, bilisque in epar regurgitatione or-
tum habeat, tum nulla adest febris, sed
gravitas quædam in dextro hypochondrio
percipitur, ac respirationis difficultas post
corporis commotionem, dolores capitis
& creber singultus, feces autem alvi albi-
cantes excernuntur, Urina autem vehemen-
ter flavescit.

Si vero morbus Regius propter calidam
& biliosam constitutionem sit generatus,
Ex calida
& biliosa
intempe-
tum rie.

Signa
morbi.

Signa cau-
sarum &
loci affecti.
Ex in-
flam. hepa-
tis.

Ex ob-
struct. ves-
felleis.

*Ex critica
expulsione
in febri-
bus.*

tum non repente sed paulatim cutis corporis luteo colore defædatur & corpus totum pruriginosum & aridum redditur. Ubi vero ex critica expulsione in morbis excitatur *ictus*, tum ictus præcessit biliosa febris aut alius morbus calidus, & color cutis non sensim, sed repente immutatur, tumque excrementa alvi & urina naturaliter se habent.

A veneno.

Ab Externis causis, videlicet à veneno hausto aut morsu virulento ortum Icterus, ex relatione patientis & symptomatis diversitate dignoscere licebit.

*Pronostici
ca.*

Pronostica in Ictero hæc sunt observanda. Criticus Icterus naturæ robor, vitiosus humoris concoctionem & antecedentis morbi finitionem ostendit, & non eger curatione. Quibus in febribus, teste Hipp. 4. Aphor. 62. morbus Regius ante diem septimum accedit, malum; tum maxime ubi natura est imbecillis. Et sane nec post septimum diem Regius morbus in febribus exortus vacat periculo, nisi adsint alia signa concoctionis. Nam tum interdum ut *in aliis morbis diuturnus ictus est prodromus mortis*. Item quibus in febribus morbus Regius 7. vel 9. vel 11. vel 14. supervenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium obduerit, Hippoc. loco citato. Celsus febrem post morbum Regium ortam perniciosam esse dicit.

*Curatio
ictus critici.*

Curatio pro diversitate causarum varianda est. Icterus itaque per crisin exortus, non medicamento, sed naturæ beneficio facile curabitur; sædus vero color cutis balneis aq. dulcis, quibus incocti sunt flor. chamæm. & Anethini, non difficulter discutitur.

Ejus morbi Regii qui ex obstructione aut inflammatione epatis est obortus curatio, ex superioribus peti debet. Similiter & ejus Arquati, qui ex veneno hausto aut morsu venenati animantis contingit curationem infra suo loco descripturi sumus.

*Curatio
ictus ex
obstructione.*

Porro curatio communissimi Ictus qui ex obstructione meatuum vesiculæ & regurgitatione flavæ bilis in epas generatur, consistit in venæ sectione, victus ratione, & remedium usurpatione.

Vena itaque in corporibus plethoricis secetur statim in principio jecoraria dextri humeri, & sanguis nec semel aut assatim, sed particulatim & per vices 3. 4. ve diebus, semper iterata sectione detrahatur.

In victus ratione non tantum cibi ac po-

tus, sed & affectuum animi & exercitiorum corporis habenda est ratio. Quantum igitur possibile est, serenitati mentis est studendum, ægrotique animus subinde ludis, Musica, jucundisque confabulationibus amicorum exhilarandus erit. Corporis exercitatio consistit in moderata obambulatione, & cutis universi corporis confractione, & lavacrorum tepidorum in aq. dulci usurpatione. His enim remediis obstructions aperiuntur, sanguis infectus purificatur, & color cutis sædus discutitur. Unicè autem procurandum est, ne alvus obstruatur, sed vel quotidie vel alternis diebus excrementa alvi dejiciantur.

Ubi vero alvus obstructa fuerit, sequenti Clystere commodè emolliri expurgarique poterit, quod & meatuum vesiculæ obstructionem aperit.

℞. Flor. Chamæm. Anethi, Roris marcentaur. min. Absinth. an. M. s. Malvæ, Mercur. an. p. r. concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, colati juris accipe ℞. i. cui admisc. hieræ simpl. Elect. de succo rosar. an. 3 r. s. Ol. chamæm. Anethi an. 3 r. s. salis 3 r. fiat enema, quod jejuno ventre recto intestino tepidum infundatur. In hunc quoque usum conferunt pruna Ungarica cocta, sæpeque esitata.

Cibi & fercula sint, aviculæ montanæ, perdices, carnes pullorum, hædorum, capreolorum, leporum, ova recentia, ex ovisque parata juscula. Ut autem magis ex- tenuent & obstructions aperiant, cum e- duliis concoquantur rad. petrosel. caroræ, fenic. & cichor. semenque anisi. Condiuntur præterea edulia copioso croco, pauxillo cinamom. passulis minoribus & amygdalis dulcibus. Mel autem, fructus arborum crudi, pisa, caseus & omnia obstruenda, studiosè vitentur.

In potu utatur æger vino tenui & subaustero,

stero, & cerevisia probè lupulata, & in qua vel fol. Rorismar. vel Absinth. flor. sunt macerata, non tamen sit nimium amara. Post venæ sectionem biliosus humor ad educationem præparetur & obstructi meatus sequenti portione referentur.

℞. Rad. cichor. Apii, Petrosel. an. ʒ ii. Rad. vitis nigræ, Oxalidis sive acetosæ an. ʒ i. fol. Card. benedict. fragariæ cum radicibus Absinth. an. P. ii. Contusa & concisa coquantur in duplici vase cum ℥b ii. aq. per ii. horas & colentur, hujus colati juris per triduum mane & duabus ante cænam horis ebibat æger ʒ i v. calefactas: quinto tandem die flava bilis subtrahatur, & ad intestina derivetur semel atque iterum sequenti cathartico haultu.

℞. Rhab. el. ʒ ii. Agarici Trochif. ʒ s. spicæ Indicæ ʒ s. contusa macerentur in aq. Card. benedict. ʒ iv. per noctem, mane ebulliant leniter, colentur, colatoque juri admisc. Elect. rosat. Mef. ʒ s. fiat haustus, qui tepidus sex horis ante prandium ebibatur.

Post purgatam bilem rursus obstructiones meatuum sequenti portione magis aperiantur.

℞. Flor. Rorismar. M. i. Herbar. fragariæ cum rad. M. s. Schænoanthi, Nard. Indicæ an. ʒ i. Croci ʒ i. Rad. Aristoloch. rotundæ ʒ ii. chamæpites P. i. concisa & contusa coquantur in ℥b ii. vini in duplici vase per duas horas, colentur, colato juri admisc. ʒ iv. syr. de fucco Card. bened. fiat potio, ex qua bibat æger mane ac duabus ante cænam horis ʒ i v. tepesactas.

Ego vero post bilis purgationem sequentibus solum remediis Icterus ex bilis regurgitatione ortum semper felicissimè curavi.

℞. Rad. chelidon. maj. recentis optimè lotarum & concisarum M. ii. Granor. Juniperi M. i. simul in mortario conterantur, contritisque adfundatur vini Rhenani ℥b. i. Quibus simul subactis beneque agitat, validissimè exprimantur & colentur, cujus ʒ iv. mane & ante cænam ebibantur. Aut

℞. Croci pulv. ʒ i. cujus singuli ʒ. in ceram novam & mundissimam, in tenuissimamque laminam extensam involvantur & in globulum informantur, singulique globuli in pomum excavatum imponentur, & torreantur, vel ad ignem, vel in cacabo, donec cera simul & crocus in pomi carnem resoluti fuerint. Ex his pomis unum per triduum mane devoret æger.

Topica remedia. Prodest plurimum, præsertim si calida intemperies adfuerit, inungere dextrum hypochondrium ol. rosar. cui pauxillum aceti sit admixtum, aut, si nullus adsit sensibilis calor, inungatur ol. chamæm. cui admixtum sit nonnihil aceti. *Oleum cera etiam propter insignem vim penetrandi, emolliendi & discutendi, hic utiliter adhiberi potest.*

Fædus totius corporis color per balneum aquæ dulcis in qua flores chamæm. Anethi & herba parietaria est incocta, facile discutitur. In facie autem flavum coloris tollit vapor aceti ferventis, si quis eo post lotionem utatur.

4. *Malus corporis habitus quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandus?*

Καχεξία est partium carnosarum subcutanearumque universi corporis mollior laxiorque constitutio & quasi inflatio cum fædo colore totius cutis, quale corpus *καχεξίον* Medicis nominatur. Oritur enim hoc malum ex suffusione vitiosorum humorum impurique sanguinis in partes subcutaneas. Talis constitutio ut plurimum comitatur intemperiem aut scirrhum aut obstructionem Epatis & lienis, præceditque aquam intercuraneam.

Causæ hujus mali *αἰτίαι* sunt epatis aut lienis imbecillitas ex frigida intemperie aut scirrhum aut obstructione, facultatisque sanguificatricis & purificatricis seu segregatricis prostratio: item sanguinis undecunque uberior profusio: aut ejusdem consuetarum fluxionum per hæmorrhoidas aut menses suppressio.

Decoctum præparans & aperiens.

Haustus cholagogus.

Decoctum magis aperiens.

Experimenta auctoris singularia.

Potus.

Euporiston est optimum remedium.

Pomum.

Topica.

Coloris flavi remedia.

Ejus origo.

Quos morbos comitatur.

Causa.

Προγενετικαί causæ sunt cibi mali succi & calorem nativum refrigerantes, crebra heluatio & ingurgitatio. Lucubrationes nimix & nocturnæ vigiliæ (*Qua de causa frequens literatorum malum est.*) Veneni haustus, & venenati animantis morsus.

Signa.

Signa *καχεξίας* sunt, cutis sufflatio per universum corpus cum colore fædo ex albo flavescente aut ex pallido virescente, carnis laxitas & virium imbecillitas pedumque inter ambulandum vacillatio: concoctionis alimenti primum, deinde & appetentiæ prostratio, & excrementorum alvi inæqualitas & dissolutio. Prognosticum *καχεξίας*. Nisi malo corporis habitu tempestivè succurratur, in hydropem faciliè transmutatur.

Curatio.

CURATIO. Cognita causa *καχεξίας* facile curandi methodus se offeret. Semper enim in curando primum causæ remotioni suis contrariis studendum erit. Malus itaque corporis habitus, qui ex imbecillitate frigidaque intemperie, aut sanguificatricis facultatis in epate debilitate, aut qui ex nimia sanguinis per menses aut hæmorrhoidas, per nariumque fluorem profusione ortum habet, earum affectionum curationem in superioribus tradidimus. Quæ vero curatio suppressioni Mensium debeat: item quibus mediis externis causis subveniendum sit, infra suis in locis explicabimus.

Generalis curatio.

Hoc loco satis erit notasse generalem *καχεξίας* curationem consistere in victus ratione, venæ sectione, vitiosorum humorum expurgatione, & remedium epat lienemque corroborantium usurpatione.

Victus ratio.

In victus ratione præcipiatur patienti ut versetur in aëre moderatè calido & sicco, ut somnum fugiat diurnum ac longum, nocturnoque sit contentus, ut corporis exercitio moderato & frictionibus cutis cum calidis linteolis utatur, ut alvum studeat retinere lenem & apertam, & si obstructior reddatur, vel glande seu suppositorio ex melle, sale & pul. colocynth. confecto, aut communi aliquo enemate in superioribus sæpius præscripto alvus aperiatur subducaturque.

Cibi utiles.

Cibis utatur faciliè concoquibilibus & pu-

rum sanguinem generantibus, veluti sunt Ova sorbilia & recentia, carnes pullorum, vitulorum & avicularum; ex piscibus melanuri & squamosi in rivulis degentes solum concedi possunt. Vitet fructus arborum & omnia edulia corruptioni obnoxia, flatulenta & obstructiva, veluti sunt lac, olera, pisa, caseus & piscium genera non squamata. Ferula condiantur croco, cinamom. macere, & zinzibere. Potus sit vinum album tenue & fragrans, vinum absinthite & cerevisia plenior & clara, & in qua macerata sunt flo. absinth. aut fol. rorismarini.

Venæ sectio in his tantum *καχεξίας*, quæ ex obstructis mensibus aut hæmorrhoidibus originem ducunt, convenit. Secundæ autem erunt venæ talaris sub malleolis pedum, & quidem in hæmorrhoidum suppressione præstat magis, quam venæ sectio, hirudines ano applicare, in reliquis *καχεξίας* causis, commodè pro venæ sectione frequenter cucurbitulas cuti applicabimus.

Ad medicamentorum rationem quod attinet, vitiosi humores sensim sequenti potione expurgandi subducendique erunt.

℞. Cort. medianarum sambuci M. ii. Rad. Cich. Glyce. polypo. Ebuli an. ʒ s. sem. Anisi ʒ v. Herb. card. bened. Flor. centa. min. an. M. i. sem. Cartami ʒ vi. Agar. Trochif. ʒ i. s. Rhab. ʒ ii. fol. fenæ ʒ s. cinamom. cl. ʒ ii. pass. min. ʒ i.

Concidenda concidantur & contundenda contundantur, simulque mixta macerentur in sero lactis caprini ℥b iiii. per integrum diem naturalem, deinde cantharo imponantur. Cujus junctura farinacea pasta sit oblita, & in duplici vase per duas horas coquantur, deinde colentur, hujus colati juris singulis diebus ebeat æger ʒ ii. donec hæc potio durabit, ita tamen ut quarto quolibet die intermittat haustum. Mirum in modum conferunt quoque sequentes pillulæ.

℞. Trochis de Rhab. ʒ i. Agar. Trochif. ʒ ii. Trochis de Absinth. ʒ s. pul. pellicularum internarum ex ventriculis pullorum detractatum ʒ iv. ex quibus omnibus formentur pillulæ cum q. s. syr. de absinth.

Cibi vitandi cachecticis.

Venæ sectioni quando locus.

Medicamenta.

Decoctum sanguinem impurum subtrahens & evacans.

Pillula cachecticis utilissima.

ex singul. 3 xv. ex quibus deglutatur 3 i. singulis septimanis bis. Postea utilissimum erit semper altero die post purgationem patienti exhibere 3 v. decocti rad. Chynæ in quo resolutæ sunt Ther. 3 i. s. & jubere ut sudet per integram horam.

Decoctum
Rad. Chynæ.
Corroborantia hepatis & Lienem.

Corroborantia quoque jecinoris ac lienis singulis diebus exhibenda sunt, rotulæ videlicet ii. dialacæ aut diacurcumæ, aut diarhodon Abbatis. Verum inter reliqua remedium genera vix aliud ad *καρχήλιον* tollendam salubrius est quam potatio aq. Thermarum aluminosarum & sulphurearum, quales habentur prope vallem Joachimicam, Carolina vocatæ.

Therma
Carolina.

Topica.

Porro extrinsecus Topicis remediis hypochondria fovenda & inungenda sunt, inter quæ celeberrimum est sequens Linimentum.

Linimentum.

℞. Ol. Absinth. Nardi, è Mastich. Citon. an. 3 ii. ceræ parum, fiat linimentum, eluatur cum aceto Rosar. & deinde admisceatur pulvis trium sandalorum an. 3 i.

Cum verò *καρχήλια* principium sit aquæ intercutaneæ, ea remedium genera, quæ in hydropis curatione commemorabuntur, huc commode transferri possunt.

10. *Aqua intercutanea quid, quot ejus species, quæ earum causa, signa & quibus singulæ species curanda remediis?*

Ἰδρωπ
quid.

Hydrops est tumor vel intumescencia corporis, aut ab aquosa humiditate aut flatulento spiritu cutem corporis distendente obortus.

Ejus differentia.

Hydropis species omnes eruditi Medici tres constituunt, sumpta differentia à materia tumorem excitante, & loco tumefcente, graduque frigiditatis Epaticæ. Prima est *Ἀναστροφὴ καὶ ποσὶ κεκλιμένη, σπυγίτης* seu *ἀσθυροπλευρία*. Albæ pituitæ in corpus perfusio dicitur, in qua universæ corporis partes intumescunt. Altera *ἀσπίτης*, in qua abdomen sive venter tantum ac pedes intumescunt. Tertia *πυμπανίτης* & *πυμπανία* in qua venter inflatur & extenditur, ut in *ἀσπίτη*, non tamen ab aquosis humoribus sed à flatulentis vaporibus, unde Hippocrates hanc speciem *ὑδρωπὶ ξηρῇ*, id est siccam hy-

dropem nominat. Cum autem hæ intumescencie Hydropicæ species & causis & signis & curandi modis aliquo modo inter se differant, de singulis seorsum tractabimus, ubi prius, quæ earum omnium communes causæ, signa, & curandi modus sit, declaraverimus.

Causa communissima efficiens omnium specierum hydropis est extinctio caloris nativi in Epate, & frustratio sanguificationis. Extinguitur autem nativus Epatis calor ab omni genere intemperiei, quam vel per se vel per consensum acquirit, ut ab intemperie lienis, ventriculi, pulmonis, septi transversi, vel Renum. Utrum autem in Hydrope Epar per *ἰδρωπὶ δειν* vel *σπυγί δειν* laboret, & sanguificationis virtute destituatur, ita inter noscitur. In propria Epatis affectione laborantes hydropes propensi sunt & subinde excitantur ad Tussim siccam, sed brevissime durantem, idque ex compressione diaphragmatis; item alvi excrementa ita laborantibus dura, pauca & arida sunt. Si vero epar per consensum sit affectum, tum alvus est fluida, & singulorum viscerum, lienis, pulmonum, diaphragmatis vel Renum morbi, dolores ac molestiæ, locum affectum declarant. Causa itaque efficiens omnis hydropis est caloris nativi in epate extinctio ac refrigeratio. Sine refrigeratione enim jecinoris impossibile est aquam intercutaneam generari. Extinguitur autem nativus jecinoris calor non tantum ab excellenti ejus refrigeratione, sed & ab ejus inflammatione ut in febribus accidere consuevit, & aliis acutis morbis, quæ refrigeratio accidentalis est: extincto calore nequit epar ex cibo potuque in ventr. in chylum converso & per venas mesar. attracto sanguin. conficere, sed id totum convertit tantum aut in puitosam humiditatem, aut in serosum liquorem, aut in flatulentum spiritum. Per extensionem itaque frigiditatis epatis tres species Hydropis generantur, *Ἀναστροφὴ* ex frigiditate epatis in summo gradu, *Ἀσπίτης* à medio gradu frigiditatis, *Πυμπανίτης* ab imbecilliore frigiditate.

Causa communis omnis intumescencie.

An ex primario vizio hepatis vel secundario oriatur, unde cognoscendum.

Calor nativus in hepate quomodo videtur.

Gratus refrigerationis hepatis 3. spec. hydropis constituant.

Causæ itaque *σπυγί μενέου* aq. intercutaneæ

Causa intumescencie

terna antecedentes. taneæ sunt epatis refrigeratio, epatis aut Lienis scirrhus, nimia profusio sanguinis per nares aut per vulnera, dysenteria, fluxus immoderatus hæmorrhoidum, & mensium; consueti fluoris eorundem diuturna suppressio, febris quartana, & morbi alii acuti.

Causa externa hydropis in genere. *Περον (περύνη)* sunt intempestiva & nocturna heluatio, intempestivæ vigiliæ, stationesque nocturnæ, aq. frigidæ corpore æstuante potatio, nocturnæ & a somno bibitiones, à balneo, æstuante adhuc corpore, potatio.

Signa communia. Signa communia omnium specierum hydropis sunt, tumor pedum cum in tumescencia totius corporis, ut in Anasarca, aut cum intumescencia abdominis ventrisque tantum, ut in Ascite & Tympanite, respirationis difficultas post corporis commotionem, potus largioris intolerabile desiderium, totius corporis decoloratio, & appetentiæ prostratio.

Signa cujusque speciei. Signa species hydropis distinguuntia sunt, in Tympanite & Ascite solus venter & pedes intumescunt, in Anasarca vero universum corpus, in qua ex digitorum impressione cavitas, & digitorum vestigium in cute remanet. In Ascite solus venter ab aqua subcutanea extenditur cum pedum tumore, in qua verso corpore in alterutrum latus sonus aq. fluctuantis, tanquam in utre semipieno hinc inde agitato, exauditor. In Tympanite intumescit venter & pedes, & non ab aqua, sed à collectis flatulentisque spiritibus: quare digito percussus venter tumens tympani modo strepitum edit.

Ascitis.

Tympanitis.

Prognostici. Prognostica communia sunt: Omnis hydrops in principio difficilis est curationis, inveteratus autem est insanabilis. Tympanites periculosior est cæteris speciebus, dein Anasarca; Ascites vero in principio quandoque cum difficultate curari potest. (*Vbi vero ex fissura hepatis oritur, incurabile malum est, juxta aph. 55. l. 7. Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua repletur, & moriuntur.*) Anasarca, quæ & λευκοπλευρία nominatur, correptis, si diuturnior alvi fluxus supervenerit, à morbo sponte liberantur, Hipp. 7. Aph. 29. & 6. Aphor. 14. Aqua intercute corre-

pto, si aqua qua in venis est ad ventrem defluerit, mali sit solutio.

Curatio communis aq. intercutaneæ consistit in victus ratione, venæ sectione, & remediorum materiam tumefacientem & per alvum & per vomitum & per urinam sudoremque evacuantium intra & extra corpus usurpatione, & jecinoris lienisque corroboratione.

In victus ratione omnia debent esse exiccantia, somnus moderatus, exercitium & crebra commotio corporis, crebræ frictions tumefactarum partium cum calidis & asperioribus linteolis, sitis tolerantia, frequentes sudorum provocationes, vel in clibano, aut sicco balneo, aut arena calida, cui sal marinum est admixtum, qua obruenda est tumefacta pars. Nihil autem est in hydrope salutaris quam frequens sudatio, & sitis tolerantia: Alvus perpetuo sit lenis, & si forte obdurescat, sequenti enemate eluenda erit.

℞. Fol. Ebuli, Mercur. an. M. i. Flor. Enemachamæ. Absinth. centau. min. an. M. s. Ficum sol-
cum n. v. Fol. senæ ʒ s. concisa coquantur in q. s. ad medias, colati juris accipe ʒ xii. Quibus admisceatur hier. simpl. Benedict. laxativ. an. ʒ i. ol. rutæ, anethi an. ʒ i. s. Mell. rosar. ʒ s. salis ʒ i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

In cibo hydropicorum omnia debent esse concoctu facilia & exsiccantia. Conducunt itaque panis bis coctus, spiræ, & panis probe fermentatus, cui inspersa sunt semen Anisi, carvi & cymini: Carnes salubriter administrari possunt assatæ potius quam elixæ, pullorum, perdicum, & avicularum montanarum, leporina, cervina, bovilla, capreolorum. Esculentia condiantur rad. petrosel. sem. carvi, fœnic. Cymini, cinamomi. caryoph. amygdal. & uvis passis. Concedi quoque possunt ova assata. Pisces, legumina, lacticia, & pinguis omnia atque humectantia, sedulo sunt vitanda.

Potus sit vel vinum tenue & vetus, vel cerevisia lupulosa & absinth. condita. Ut autem dictum est in hydrope, quam minimum bibere salutare est.

Vena sectioni
quando locus.

Venæ sectio in iis tantum intercutaneis aquis conceditur, quæ originem ducunt ex suppressis mensibus aut hæmorrhoidum suppressione. Tum enim ante omnia fluxio per menses & hæmorrhoides per venæ sectionem ex talari vena est commovenda: & quando hydrops ex inflammatione Epatis, febribusque est orta, admittitur quoque in principio Anasarca. Porro medicatio à purgatione & ab *idagogæ* remediis i. e. aquam ducentibus auspicanda est, & alternatim semper in 14. diebus, vel etiam citius pro virium ratione reiteranda erit purgatio & aq. subductio in omnibus hydropis speciebus. Hydragogæ autem purgationes præcipuæ hæc sunt.

Hydragoga
Remedia.

Hauftus.

℥. Agar. Trochif. Rhab. cl. an. 3 i. Fol. senæ 3 ii. confusa macerentur in aq. flor. sambuci 3 v. post 24. horas ebulliant leniter, colentur, & colato jusculeo admisc. diaphan. Benedict. laxativ. an. 3 ii. fiat haustus.

Pulvis.

℥. Herb. Graciolæ 3 ii. cinamom. Anisi an. 3 i. sacchar. 3 s. fiat pulvis, qui mane cum vino assumatur: Aquam enim validissimè educit.

Experi-
menta va-
ria hydra-
goga Eu-
porisæ.

℥. Graciolæ 3 s. uvarum pass. absque acinis vel sem. 3 s. Anisi, cinamomi an. 3 s. coquantur in lb. i. vini ad medias, expriman-
tur ac colentur, ac saccharo sufficienti dul-
corentur, fiat haustus, & mane ebibatur.

Vel ℥. succi Rad. palma Christi 3 ii. vel 3 ii. s. exhibeatur cum saccharo, vel sine saccharo: potenter enim aquas evacuat. Idem præstat succus cort. rad. sambuci, vel cortic. median. & florum ejus.

℥. Graciolæ 3 s. Soldanellæ vel brassicæ marinæ 3 i. pass. mi 3 s. coquantur in vini 3 x. ad medias, expressa colentur ac ebibantur.

℥. Succ. Ireos nostratis vel hortulanæ 3 s. syr. rosar. solutivi 3 i. Cinamomi. cl. 3 i. misceantur, fiat haustus.

Hæc præscripta remedia omnia validissimè aquam educere possunt per alvum, & pro ratione virium semel aut bis in septimana eis uti licebit.

Antimonii

Viribus adhuc consistentib. mirifice hy-

dropicorum aquam evacuat Paracelsicum vitrum Antimon. si ejus iii. aut iv. gr. minutissimè pulverata, & cum 3. i. Theria. Andro. commixta devorentur: Sed quia sævissima inducere consuevit symptomata, ut anxietatem, cordis compressionem, vertiginem & lipothymiam, non libenter, nisi in rusticis & rigidis corporibus eo utendum suaserim.

Postea in diebus liberis à purgatione prodest semel in septimana per vomitum corpus ab impuritatibus aquosis evacuare. Convenientissimus autem hic potus vomitorius erit.

℥. Cort. rad. sambuci, cort. rad. jugland. an. M. s. Concisa macerentur per noctem in haustulo vini: Altero die leniter ebulliant, colentur, & colatum jusculeum tepidum ebibatur.

Reliquis diebus utatur æger alternatim aut urinam ciente remedio aut sudorem moventè. Utinam autem probè movet, & aquam per vesicam evacuat haustus vini, cui admixtæ sunt gut. 9. ol. vitr. aut si absit febris calorque præternaturalis, iii. cochlearia aq. juniperi jejune assumpta.

Sudor autem & simul Urina sequenti portione excitari possunt.

℥. Cort. medianarum sambuci viridium, rad. asari, Dauci creti. an. 3. ii. rad. Ebuli, elenii an. 3 s. Bacca. lauri. sem. fescelios an. 3 i. Herb. scordii, card. bened. puleg. Flo. centau. mi. an. M. s. pass. min. 3 i. cinamomi 3 ii.

Contundendis confusis & concidendis concisis coquantur in duplici vase per 12. horas cum vini lb. iii. cui mellis puri & defecati ii. cochlearia sunt admixta, deinde colentur, & colati juris ebibat æger diebus vacuis à purgatione 3 v. mane & se ad sudorem componat. Efficacius autem erit remedium sudorificum, si illi 3 i. Theriacæ admisceatur.

Inter reliqua aquam intercutaneam exsiccantia remedia experientia comprobatum est lapis serpentis, qui hac ratione acquiri potest. Capiatur coluber aquaticus, hujus cauda funiculo constringatur ac suspendatur, cujus capiti deorsum pendenti

vitrisifica-
ti usus in
robustis.
Tartari
vitriola-
ti 3 i.
cum vino
enulato: I-
tem turpes
mineralis

gr. iiii.
ad 6. item
Mercur.
sublim.
rub. gr.

iii. ad 5.
cum rha-
riaca: I-
tem speci-
ficum
suum hy-
dropicum,

Crollius ad
eundem us-
um com-
mendat.
Quæ frictæ
preparata
sunt, non
infelicitate
adhiben-
tur.

Elect. &
flor. Anti-
monii hu-
jus loco
Chymici uti-
suntur, uti
& gissa.
Theophr.

Diuretica.
Spir. Tar-
tari, cum
ol. vitrioli.
idem præ-
stat.

Dacotum
sudorifi-
cum.

Experi-
mentum
aquam ex-
siccantem.

vas

vas aut pelvis aqua plena subjiçiat, in quam serpens lapidem evomet, qui aquam in pelvi brevissimo tempore totam exiccat: hunc lapidem ventri tumentis alligari oportet, qui aq. intercutaneam cito absumit. (Hollerius idem asserit c. de hydrope. Ast Gesner. l. 4. hystor. animal. c. de hydro. dubitat de hoc lapide an ex serpentis capite excidat. Existimat potius eum esse qui in ericeto Lunenburgensi reperitur, & communiter à forma pyramidalis *Pater Zunge* vocatur, à Plinio *Glossopetra dictus* l. 37. c. 10.)

Topica communia in omni hydrope. Cataplasma

Externa Topica remedia omnibusque speciebus hydropis communia hæc sequentia conveniunt.

1. ℞. Farinæ fabarum, lupinorum, fœnugræci, pul. rad. Alth. an. ʒ ii.

Pul. Absint. Hyss. an. ʒ i. ficum probe contusorum ʒ iiii. Commixtis omnibus coquantur in aceti & aq. æ. p. ad pulvis formam, fiat cataplasma, quod in die bis per linteam duplicatum extensum prius calefactum tumentibus partibus applicetur.

2. Aut fiat cataplasma ex stercore armentarii bovis, cum quarta parte pul. sulphuris admixti, & q. s. aceti. Aut

3. ℞. Stercoris caprini, columbarum an. ʒ iiii. Flor. Buphtalmi ʒ ii. aceti & mellis q. s. fiat cataplasma. Aut imponatur loco tumenti sequens emplastrum.

Emplastrum. ℞. Thuris, Mastic. Myrrhæ an. ʒ s. Granorum lauri ʒ i. Gran. Juniperi ʒ i. s. rad. Angel. ʒ i. s. mellis q. s.

Fiat emplastrum, quod per linteam extensum loco tumenti applicetur. Aut sequens sacculus ventri imponatur.

Sacculus. ℞. Rutæ, flo. chamæ. Anethi, calamentæ puleg. Major. Rorismæ. saturejæ, Hyss. an. M. i. sulphu. ʒ vi. salis marini ʒ ii. Baccar. lauri, Juniperi an. ʒ i. s. rad. Bryoniæ, ireos an. ʒ i.

Contundenda contundantur & concidentur, & in saccum linteam tumentis ventri adaptatum consuantur & intersuantur, fiat sacculus, qui vel vino vel aceto irroratus, & per lapidem aut lateres calidos calefactus sæpe tumori imponatur.

Plurimum conducit in loco tumentis vesi-

culas excitare rad. virid. scrophulariæ major. & rad. ranunculi seu flammulæ palustris simul aut singulatim cum pauxillo aceto contusis, & emplastri modo tumentis loco per x. horas impositis; postea compungantur vesicæ & apertæ retineantur per 60. dies, ex iis enim indies aqua extillat.

Vesicarum autem foramina aperta retineri possunt, si eis radix Gentianæ foramini adaptata imponatur, & fol. brassicæ butyro recenti illitum superponatur, & singulis diebus bis Gentiana extrahatur, & post aquam extillatam rursus imponatur.

Laudatur à plurimis, & frequenter quoque usurpatur incisio sive vulneratio cutis & carnis usque ad viscera interiora. Magna enim statim copia ex perforata cute profluit & omnis tumor paulatim residet, ita ut se patiens jam prorsus liberatum putet. Hanc incisionem cutis Græci Medici *παρυέντων* vocant. Ego vero hanc curandi rationem minimè probare possum. Ex quam plurimis enim quibus hac ratione aquam detractam vidi, unicam honestissimam matronam D. Martini Hannemannii conjugem (quæ Hydropica uterò gerebat, & post extractionem aquæ per vulnus Abdominis feliciter peperit) evasisse sanitatique restitutam esse, reliquos omnes tum viros tum mulieres ita curatos paulò post extinctos animad-

*Paracente-
sis seu ven-
tri incisio.*

*Necessaria
admonitio.*

*Vide Pa-
raum l. 7.
chir. c. 12.*
verti. Vbi viscerum adsuit integritas, nec malum diuturnitate radices egit, nonnullos restitutos fuisse experientia testatur. Vix autem unus è centum hoc remedio servatur, quod plerumque hepar corruptum est in hydropicis. Etsi enim venter detumescat, & effluat aqua, tamen paulo post rursus colligitur & redit Tumor. Qui vero autoritate Hippocratis & Galeni, qui nonnunquam in hydrope paracentesi usi sunt, motus, hac ratione curari velit, ei cavendum est ne multum aquæ simul effluat, sed sensim & singulis diebus aliqua portio detrahatur.

Nam cum multa aqua & reliquiæ caloris nativi interiorum viscerum & vitales spiritus elabuntur ac dissipantur, moritur patiens. In pede tamen tumentis in plano pedis paulo supra digitos tutius incisio fieri potest.

potest. (Raro & hac incisio feliciter succedit. Scio tamen tria exempla tali incisioe restitutorum.)

Toto curationis tempore quotidie præter enumerata remedia, interna viscera, ac potissimum Epar ac lien corroboranda erunt duabus pro vice rotulis diacurcumæ aut diallacæ vel Diarhodon Abbatis & similibus devoratis. Sitis autem Hydropicorum, quod infestissimum est symptoma, federur continua in ore masticatione radicis Glycyrrhizæ. Nulla enim radix Glycyrrhizam facultate humectandi superat.

Hæc de communi Hydropicorum curatione in genere sint satis, nunc pauca de singulis speciebus addam.

11. *Qua sunt species aqua intercutanea, & quid in singulis speciebus observandum?*

Ἀναισθησις quæ & *ἀδυνασφλεγμωτία* id est pituitosa aqua per se universam carnem diffusa, ut plurimum post alios graves morbos ex epatis imbecillitate generatur. In hac specie totum corpus intumescit, & ex impressione digitorum tumorem vestigium relinquit. Ejus curatio consistit in præscriptorum remediorum usurpatione, sed hæc propria habet, quod in sola Anasarca interdum venæ sectio concedatur, in aliis autem speciebus noxia est. Cum itaque Anasarca ex suppressione consuetorum mensium aut hæmorrhoidum originem ducit, & vires adhuc consistunt, secari potest vena jecoraria primum, deinde & vena talaris, eaque sæpius reiteranda, post venæ sectionem pituitosi simul ac serosi humores subinde expurgandi veniunt remediis paulo ante & in obstructi epatis curatione enumeratis: singillatim autem sequens portio pituitam aquosam simul concoquit & egregie educit.

℞. Rad. Valerianæ, pimpinellæ, Elenii, Ebulian. ʒ s. Medullæ Sem. cartami ʒ v. sem. anisi ʒ s. Veronicæ, scabiosæ, betton. Card. bened. flo. Genist. flor. sambuci an. M. s. Agar. Troch. ʒ ii. fol. Senæ, Soldanellæ an. ʒ s. concidendis concisis & contundendis contusis decoquantur cum lb̄.

iiii. vini, & mellis puri lb̄ s. in duplici

vase ad duas horas, colentur & colato liquori macerandus imponatur nodulus ex ʒ ss. Rhab. parum contusi, & in sindonem colligati. Hujus potionis singulis ternis diebus eibat æger haustulum tepidum ʒ iiii. reliquis diebus mane ac vespere hauriat patiens unum aut duo cochlearia aq. Juniperi, aut gut. 9. ol. vitr. cum haustulo vini commixti. Hæc enim singulariter pituitam incidunt, obstructions aperiunt, & urinam movent supra modum, ea de causa & cicadarum præparat. pulvis exhibetur, ut aquam per urinam expellat.

Tympanites est ventosus hydrops aut aqua intercutanea, in qua intestina ex collecto nubiloso aëre aut flatibus repleto distenduntur. Venter pulsatus in Tympanite sonum instar Tympani edit, & ut plurimum dolores circa umbilicum percipiuntur, qui nullis remediis applicatis mitigantur. Hi dolores qui prodromi esse solent tympanitidis, ut plurimum lethalem & incurabilem morbum portendunt. In Tympanitide uti licebit communibus remediis supra annotatis, quibus tamen cum foris tum intra ventrem administrandis admiscenda erunt flatus discutientia. Intra corpus itaque crebro assumat rotulas Diacymini; venter vero inungatur sequentibus oleis.

℞. Ol. nardi, rutæ de Absinth. an. ʒ s. Post inunctionem ventri imponatur ceterum stomachicum, cujus descriptio in officinis extat. Paracentesis sive cutis incisio aut perforatio usque ad peritonæum, magis in Tympanite quam aliis speciebus hydropis convenit, sed cavendum ne intestina lædantur.

Ascites est aquosi humoris plurima inter membranean peritonæi tunicam & intestina collectio. Ab *ἀσцитη*, id est, utre repleto nomen habet. Ad hanc speciem omnia remedium genera, quæ supra annotavimus & *ὀδράγωνα* dicuntur, potissimum autem ex Gratiolæ herba confecta, conveniunt. Quid enim hac herba possit in ascitide præter experientiam etiam Ioh. VVierus in cura hydropis testatur.

Sitis remedia.
Cortic.
Guajaci decoctum etiam si-
zim poter-
er restin-
guat.

Anasarca
peculiaris
remedia.

Vena se-
ctio.
Sunt qui
decoctum
rad. vince-
toxi cum
vino mira
præstare in
hoc affectu
asserant.
Decoctum
pituitosam
materiam
digerens &
evacuans.

Spir. Ju-
nip.

Tympani-
tidis sin-
gularia.

Ol. cymi-
ni stillat.
multo id
præstat
efficacius.

Paracen-
tesis tym-
panitidis
utilis.

Ascitidis
remedia.

12. *Sanguinolenta Fluxio epatis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Fluxus hepaticus quid.

Alvi profluvia, excepta Dysenteria, lienteria, & quæ ex corruptis cibis in ventriculo oriuntur, omnia ferè ex vitio Epatis originem ducunt. Ex ejus enim imbecillitate & vitiosorum humorum in eo redundantia profluit per alvum materia biliosa, mucosa & pituitosa, nigra & melancholica, & nonnunquam sanguinolenta. De qua alvi pro-

Quomodo à dysenteria differat.

fluxione nunc nobis sermo erit. Differt autem plurimum sanguinolenta per alvum excretio, quæ ex imbecillitate epatis profluit, à cruento alvi profluvio, quod ex erosione intestinorum provenit & dysenteria nominatur. In Dysenteria enim una cum sanguine rasuræ quædam sive ramenta profluunt, & quidem insigni cum dolore ventris; sed in Epatico fluxu nihil tale conspicitur, sed profluit sanguis dilutus, tanquam aqua sanguine tincta, maxime ex parte absque dolore, vel levi saltem cum dolore dextri hypochondrii, & is fluxus nonnunquam per 2. vel 3. dies supprimitur, & rursus redit, quod in dysenterica fluxione minimè contingit. Est itaque sanguinis ex Epate fluor sanguinis nondum perfectè cocti & ob retentricis Epatis facultatis imbecillitatem excretio, primum per venas Mesaraicas ad intestina, ac deinde per alvum.

Quid excernatur in hoc affeetu.

Causa.

Causæ *αἰσθητικαὶ* sanguinolenti ex Epate fluxus sunt, imbecillitas Epatis ex aliqua intemperie, aut imbecillitas & dilatio venæ portæ & Mesaraicarum. Item venenosa qualitas in substantia Epatis aut venis ejus impacta. *Παθητικαὶ* causæ sunt violentæ Epatis compressiones & venenosa alimenta potionisque haustæ.

Signa.

Signa profluvii Epatici: Sanguis per alvum profluens dilutus est, & aquæ, in qua recenter mactatorum animantium carnes sunt elotæ, similis, nihilque abrasum in eo conspicitur, qui fluxus nonnunquam duorum aut trium dierum spatio supprimitur, deinde rursus redit malum, excernunturque cum sanguine excrementa priotibus multo pejora.

CURATIO Epatici fluoris potissimum consistit in remotione intemperiei Epatis & corroboracionis facultatum tum sanguificatricis, tum retentricis. Quibus autem mediis & remediorum generibus utrumque perfici debeat, & quomodo singularum intemperierum contraria remedia sint adhibenda, supra in curatione imbecillitatis Epatis abundè declaratum est. In genere autem primum vena Epatica dextri humeri est secanda, deinde ex venis Epatis, vitiosi humores sunt subducendi sequenti haustulo.

Curatio.

Vena secatio.

℞. Rhab. el. ʒ 11. fol. senæ ʒ 1. spic. Indic. ʒ 1. contusa parum macerentur in aq. Veronica ʒ v. per noctem, deinde leniter ebulliant, & post unam ebullitionem exprimantur, liquorque percoletur, colato jussculo admisceantur Elect. lenit. ʒ s. Postea corroboretur Epar singulis diebus, devoratis duabus rotulis Aromatici rosati; ac tandem exhibeantur, supprimendi sanguinis gratia, ea remedia, quæ supra in dysentericæ curatione sunt commemorata: aut exhibeatur sequens pulvisculus.

Haustus purgans.

Epar corroborantia.

℞. Rhab. torrefacti ʒ 1. visci quercini, Pulvis coral. rub. an. ʒ 11. cornu cervi usti præparati ʒ 11. pulverata commisceantur, cujus ʒ 1. mane ac vespere cum aqua Veronica potanda exhibeatur & detur.

Pulvis egregius.

Sal coralorum

& essentiam croci

Topica remedia dextro hypochondrio applicanda, in curatione imbecillitatis Epatis sunt præscripta. Confert autem dextrum hypochondrium sequentibus oleis bis singulis diebus inungere & confricare.

Chymice hic exhibent felicitatem.

℞. Ol. cyton. & Mastic. an. ʒ s. ol. Absinth. ex flor. destillat. ʒ 1. commisceantur; fiat linimentum.

Linimentum.

SECTIO II. DE MORBIS LIENIS.

1. *Splen sive Lien quid, qui ejus Morbi?*

Splen est viscus ex terrestriore parte seminis concretum, & ad recipiendam terrestriorem partem sanguineæ massæ, quam plurimum delectatur & nutritur, in sangu-

Lien qualis viscus.

nis.

Ejus sius. nis purificationem conditum. Situm habet in sinistro hypochondrio, suaque cavitate ventris sinistram partem, tanquam manu complectitur, in ejusque fundum insignem meatum defigit, per quem aliquo modo suum nigrum excrementum exonerat. Afficitur autem omnibus fere morbis ac symptomatibus quibus Epat affici diximus. Sunt itaque Lienis præcipui morbi:

*Affectus
Lienis
principa-
les.*

Imbecillitas Lienis,
Inflammatio,
Obstructio,
Tumor durus,
Apostema,
Icterus niger,
Scorbutus.

2. *Imbecillitas lienis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & ut curanda?*

*Splenetici
qui.*

Ἀσπλιν & *Ἀσπλυνός* est ubi suis naturalibus facultatibus aut attractiva aut retentiva, aut alterativa aut expulsiva diminuitur splen: ita affecti *Ἀσπλυνός*, id est lienarii nominantur.

Causa.

Causæ *Ἀσπλυνίας* imbecillitatis Lienis sunt aut excellens caliditas, frigiditas, humiditas & siccitas: aut vitiosus aliquis humor cum hisce intemperiebus junctus.

Προσγενητικὰ sunt alimenta *συμμελῶν* ac temperiem nativam lienis destruentia, & remediorum insigniter alterantium sinistro hypochondrio applicationes.

*Signa.
Intempe-
ricis frigi-
dæ.*

Signa *Ἀσπλυνίας* & inde natam imbecillitatem indicantia sunt: Frigida intemperies, qua ut plurimum afficitur lien, eo quod natura sit viscus frigidum, & frigidiore parte sanguinis nutriatur, dignoscitur, quod ab omnibus alimentis & medicamentis frigidis lædatur, & in eo molestus dolor exci-
Calida. tetur, juvetur vero calidis. Calidam ejus intemperiem demonstrat, alimenta & medicamenta calidiora si adhibeantur, itidem læditur Lien, frigidis autem juvatur. Similiter ejus sicca intemperies ex offensione ab exsiccantibus, & humida ab humidorum usurpatione noxia, & contrariorum auxilio apprehenditur.

Signa hu-

Hæ intemperies Lienis si simul adfluen-

tem sibi habeant ex Epate superfluum ali-
quem humorem, tum in dextro hypo-
chondrio pro ratione quantitatis tumescen-
tia percipitur, & siquidem biliosior sanguis
in lienem defluat, tum totum corpus cali-
dius squalidiusve redditur, & laborantem
subinde infestant suis molesta, vigiliæ &
oris amaror, pronique sunt ad tertianam
febrim. Si vero copiosa ac vitiosa atra bilis
in eundem profluat, lingua & facies subni-
gra apparebit, febrigue quartana corrip-
api sunt. Pituitosum sanguinem in Lienem
defluere arguit linguæ continua humiditas,
cibique, potusque fastidium; & si febrici-
tare eis contingat, quotidiana apprehen-
duntur.

Prognostica sunt: Debilitas lienis, si e-
jus curatio tempestiva negligatur, in fe-
brem quartanam vel Icterum nigrum aut
scorbutum, vel Hydropem agrotantem
conjicit. Sapissimè & melancholiam hypo-
chondriacam comitem habet.

Curatio Imbecillitatis Lienis pro diver-
sitate intemperiei & affluentis humoris spe-
cie varianda erit. Porro in curatione o-
mnium affectuum Lienis observandum est,
curationem similem esse debere curationi
affectuum Epatis, nisi quod in Lienis
curatione remedia tanto debent esse ya-
lidiora & magis penetrantia, quanto Lie-
nis substantia crassior & rigidior est substan-
tia Epatis. Id quoque observatione dignum
est, vehementer calefacientia & in alimen-
tis & medicamentis, in Lienis curatione
vitanda esse. Calida enim exsiccando fa-
cillimè indurare possunt materiam in eo
contentam. Tota itaque curatio Lienoso-
rum consistit in victus ratione, & medi-
camentorum, tum intra tum extra cor-
pus, usurpatione, & adfluentium humo-
rum subductione, quæ omnia enume-
rata sunt paulò ante in curatione imbe-
cillitatis Epatis per diversitatem intempe-
rierum & humorum adfluentium. In uni-
versum autem imbecillitati Lienis ex cali-
da intemperie ortæ perpetuo & alimenta
& remedia refrigerantia sunt adhibenda,
ex frigida ortæ calida, ex sicca humida,

Specificum ex humida sicca. Humores simili ratione
ad 7. affluentes primum ad educationem præpa-
membra randi, deinde convenientibus remediis e-
principalis vacuandi sunt, adjectis semper Lienem sua
lia, hic non incon- proprietate confortantibus atque respicien-
venienter adhibe- tibus.

Talium remediorum copiam supra in ta-
bellis nostris medicamenta complectenti-
bus, & in curatione imbecillitatis Epatis
ex humorum coactione ortæ, & in
Vide Tom. sequentibus lienis affectionum curationibus
1. p. 129. præscribimus & enumerabimus.

At ubi venæ sectione opus fuerit (opus
autem est in plethoricis corporibus) Im-
becillitate Lienis laborantibus, vena Lie-
naria seu Epatica vocata, semper est ape-
rienda, & quidem in sinistro humero aut
sinistra manu inter minimum & annularem
digitum.

3. *Inflammatio lienis quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quomodo cu-
randa?*

Φλεγμονή τῆς σπλῆνός. Etsi rarius, affici-
tur tamen nonnunquam & Lien, uti reliqua
viscera, inflammatione.

Lienis in- Differt autem inflammatio à calida in-
flammati- temperie extensione & symptomatum gra-
o ut à calida vitate. Inflammatio enim magis urit & acer-
intemperie bat partes affectas, quam simplex calida in-
differat. temperies.

Causa. Causæ αἰσχυρμέναι sunt massæ sangui-
nez in Epate ante segregationem vel putre-
factio, vel accentæ bilis flavæ una cum
terrestriori parte defluxio ad lienem: αἰσχυ-
τερικαὶ sunt cibi ac potiones, aut etiam
medicamenta impense calefacientia, si po-
tissimum in imbecillitate lienis à calida in-
temperie orta usurpentur.

Signa. Signa inflammati lienis sunt, fervor,
gravitas, distensio, intumescencia, & dolor
in sinistro hypochondrio, quæ signa, uti &
interdum delirium, veluti symptomata, in-
flammationi lienis per vices succedunt.

Prognosti- Prognostica in Inflammatione lienis: Si
ca. ex sinistro nare sanguis copiose profluat,
magnum adfert juvamentum, & plerum-
que morbum solvit. Si vero ex dextro nare

paucus sanguis extillet, nullum adfert ju-
vamentum, & ut plurimum perniciosum est
signum. Nisi inflammationi Lienis tempe-
stivè succurratur, in scirrhum indurescit
Lien, & in perniciem vitæ vergit.

Curatio inflammati Lienis consistit in *Curatio.*
victus ratione, venæ sectione, inflamma-
torum humorum evacuatione, & viscerum
adeoque lienis corroboracione, caloris-
que in eo mitigatione per remediorum &
intra & extra corpus usurpationem.

Victus ratio instituenda est qualem in *Dieta.*
inflammatione Iecinoris præscriptimus, ni-
mirum refrigerans & corroborans. In cibo
itaque potissimum conveniunt cæmor Pri-
sanæ, Pruna Ungarica acida, carnes pullo-
rum, vitulorum, avicularum: Ex piscibus
melanuri & in saxosis rivulis degentes. Con-
dienda sunt alimenta uvis immaturis, po-
mis arantibus & Limoniis vocatis, atque
aceto, quibus addi possunt fructus cappa-
rum, cum aceto & pauxillo olei. In Potu
concedi potest vinum tenue aut Rhena-
num cum aqua hordei probe dilutum.

Ante venæ sectionem non tantum in hoc *Lenitiva*
malo, sed & in omnibus affectionibus *ante venæ*
venæ sectionem efflagitantibus semper al- *sectionem*
vus durior est lubricanda, & feces ex- *usurpanda.*
turbandæ; si id naturali expulsiōe perfici
nequeat, saltem arte est molendum vel
per glandes, vel per Clysterem, vel bolum
catharticum: Glandes autem ita confici
debent.

℞. Mellis crudi ʒ s. coque in vasculo *Supposito-*
vel ferreo vel æneo donec ejus guttula in *ria acuta*
discum stanneum butyro inunctum projecta *ut confi-*
& forti inflatu per discum extensū refrigera- *cienda.*
taque rumpatur. Tandem adhuc calido
melli admisceatur pul. Trochisc. Alhand. ʒ i.
ex quibus tepentibus glandes digiti longi-
tudinem æquantes, & paulo crassiores ca-
lamo arundinaceo conformentur, quorum
unus recto intestino inferatur. Enema pa-
rari potest hoc modo.

℞. Malvæ, Violar. Mercur. an. M. i. flor.
Chamæm. rosar. an. P. i. fol. senæ ʒ s. con-
cisa coquantur in q. s. ad medias, colen-
tur, colati juris accipe ℥b. i. cui admisce

Bbb diaca-

diacathol. 3 i. Elect. rosar. Mes. 3 s. ol. violar. 3 ii. salis communis 3 i. fiat Clyster, ac recto intestino tepidus infundatur. Bolus autem catharticus ita parabitur.

Bolus.

℞. Pulp. Cass. recent. extractæ 3 x. pul. Rhab. 3 ii. commisceantur & pulvere sac-
cari conspergantur, fiat bolus, quem æger una ante prandium hora deglutiat.

*Vena se-
ctio.*

Evacuato alvo, si nec ætas, nec virium imbecillitas obstat, statim vena lienaria sinistri humeri, aut ejus ramus inter minimum & annularem digitum sinistræ manus sece-
tur. Sanguis autem per vices ter vel quater totidem diebus detrahatur. Sæpe enim sola sanguinis missione lienis inflammatio abla-
ta fuit. Post sanguinis missionem humor melancholicus accensus (vel ex sanguine emissio, vel forte per nares erumpente, vel bilis flavæ vel pituitæ signa apparent) vel per pharmaca, vel per frequentem reiterationem Clysteris inflammati humores sub-
ducendi erunt: In hunc usum haustulus convenientissimus ita parari potest.

*Haustulus
melanago-
gus.*

℞. Rhab. 3 i. Fol. senæ 3 ii. Ellebori nigri præpar. id est una ebullitione cocti & rursus exsiccati 3 i. contusa macerentur per noctem in aq. fumia. 3 v. deinde leniter ebulliant, & expressa colentur, colato juri admisceantur diacath. 3 v. fiat haustulus, 6. horis ante prandium exhaustendus. Tandem rursus concoquatur, & extenuetur humor Melancholicus sequenti decocto.

*Decoctum
attenuans,
abstergens
& eva-
cuans.*

℞. Rad. Polypod. Borag. Cichoræ an. 3 s. ceterach. scolopendriæ Card. Bened. Centau. min. an. M. s. Epythymi P. r. conf. Borag. violar. fuma. an. 3 i. hordei M. s. uvar. pass. exemptis sem. 3 i. Ellebori nigri præparat. Rhab. an. 3 ii. concidendis concisis & contundendis contusis coquantur in duplici vase per 2. horas cum lb. iiii. vel aq. puræ aut feri lactis caprini, refrigerata colentur, colato juri admisc. syr. de succo fumar. Borag. an. 3 ii. fiat potio, cujus 3 v. calidæ singulis diebus mane ebibantur. Hæc enim potio in liene crassiores humores attenuat, abstergit, & simul subducit, æstusve eorum refrigerat. Si vero hæc ipsa potio vali-

dus purgare deprehendatur, & sit, qui al-
vum natura lubricam habeat, tum alternis tantum diebus patiens ea uti poterit. Inte-
rim Lien quotidie corroborabitur aut rotu-
lis diatrion fantal. aut diamargaritonis frig. mane ac vesperti devoratis, vel sequenti Elect.

℞. Confer. Borrag. Buglos. flor. fuma. Electua-
an. 3 s. spec. elect. de Gemmis, dia-
rhodon. Abbat. an. 3 s. pul. coral. rium.
rub. præpar. 3 i. syr. acetos. citri
q. s. fiat Elect. cujus semijuglandis
q. devoret æger mane ac vesperti.

Interea & Topica remedia fervorem lie-
nis mitigantia minimè negligenda erunt. Cavendum autem est studiosè, ne Topica
pharmaca actu sive sensibilibiter frigida lienis regioni applicentur. Facile enim lien à frigi-
dis intumescit & scirrhum contrahit. Com-
modissime autem sinistro hypochondrio ap-
plicari possunt linteola duplicata madefa-
cta in vino tepido, eoque austero, cui ad-
mixta sunt ol. cyton. & Anethinum. Vel

*Epithema-
ra.*

℞. Ol. rosar. Masti. an. 3 i. aceti vini
3 s. misce, in quibus tepidis lana carpta im-
buatur, quæ extensa fomenti instar sinistro
hypochondrio imponatur: aut conficiatur
sequens sacculus.

℞. Fumar. Asple. Scolopend. Rosar. Sacculus.
plantarum an. M. r. Flor. Absinth. Anethi
an. M. s. Furfuris filiginei M. r. consuantur in
sacculum & intersuantur, & in q. s. æ. p. a-
ceti & aquæ, vel vino austero ebulliant, qui
expressus ac tepidus sinistro hypochondrio
applicetur. Aut inungatur regio lienis sing.
diebus bis sequentibus oleis simul mixtis.

℞. Ol. Rosar. cyton. è Mastic. an. 3 s. Linimen-
Aceti Rosar. 3 ii. commisc. Reliqua reme-
diorum genera cum interna, tum externa
Topica inflammationi Lienis convenientia,
ex curatione inflammati Jecinoris peti, &
huc transferri possunt.

4. Tumor durus lienis quid, quæ ejus
causa, quæ signa, & quæ ratione
curandus?

Exlip̃ & τσλινος, duricies splenis est, u-
bi post inflammationem aut obstructionem lienis quid.
Lien in duriciem convertitur. Est enim Lien,
cuni

cum propter substantiæ suæ raritatem, tunc propter sanguinis quo nutritur feculentiam & crassitiem inter reliqua viscera maximè duro tumori obnoxius.

Causa. Causæ *αεονυγνεναι* sunt humor melancholicus in lienis poris cavitatibusque collectus, flatulenti spiritus in liene coacervati, obstructio & inflammatio ejus diuturna.

Πεονυγνεναι, crebrior usus crassorum alimentorum & leguminum, medicamenta impensius refrigerantia sinistro hypochondrio intempestivè imposita, & perversa inflammari Lienis ac imperita curatio, violentus ictus in sinistram hypochondrium.

Signa. Signa indurati intumescantisque lienis sunt duricies sinistri hypochondrii, tumor oblongus & eminens per transversum hypochondrii, qui tumor, si ab humoribus melancholicis sit generatus, renitens & pertinax est, nec cedit impressioni digitorum, adest quoque gravitas & dolor. Si autem flatus in liene collecti excitantur tumorem, tum impressioni digitorum non adeo renititur, nec gravitas in sinistro hypochondrio sentitur, sed distensio tantum. His signis processu temporis accedunt hæc sequentia. Inter ambulandum respirationis difficultas, fetor oris, gingivarum exulceratio, & pedes quibusdam intumescunt, & color cutis convertitur in lividum, difficulter patientes in sinistro latere decumbunt, & decubentes dolorem usque ad collum in sinistro latere protensum sentiunt.

Prognostica. Diuturnam Lienis duriciem, intumescentiamve ut plurimum propter sympathiam cum jecinore sequitur hydrops. Exquisitus Lienis scirrhus incurabilis esse judicatur.

Curatio. Curatio intumescentiæ Lienis in victus ratione, venæ sectione, humorum terrestrium ac tenacium præparatione & expurgatione, topicorumque remediorum, duriciem emollientium, applicatione sita est.

Victus ratio. In victus ratione conveniunt ante alia fercula capparum ex aceto esitatio & aceti vinacei crebra gustatio. Ex animalibus conducunt carnes boni succi, & facile conco-

quibiles, veluti sunt vitulorum, pullorum, avicularum, perdicum, ovicularum: & ex piscibus, melanuri seu percæ aculeatæ & grobi **Gründeling** ex sale cocti, & aceto vinaceo intincti. Condiri possunt edulia omnia aceto vini, zinzibere, cinamomo & macere, piperis autem usus parcius esse debet. Vitanda autem sunt omnia pingua, dulcia, & concoctu difficilia. In potu vino utatur potius Rhenano, & diluto cum aqua, in qua chalybs vel candens ferrum aliquoties est extinctum. Cerevisia concedi potest absinthiaca, vel probe lupulata, aut in qua macerata sunt aut fumar. vel ceterach, vel scolopendria.

Venæ sectio administranda est in principio tantum intumescentiæ, & in plethoricis corporibus. Secunda autem est vena Lienaria sinistri humeri, aut ramus lienariæ inter minimum & annularem digitum protensus. Si quid autem venæ sectionem impediatur, consultiſſimum erit, ut hæmorrhoides vel per medicamenta, vel per hirudinum applicationem aperiantur. Porro ante venæ sectionem, si alvus sit adstricta, in omnibus fere affectionibus semper vel glande vel clystere, quod in præcedente curatione descriptum fuit, lenienda & aperienda erit, ex eaque excrementa educenda, & venarum Mefaraicarum orificia eluenda.

Post venæ tandem sectionem & vitiosi succi ex vena portæ, & ex venis quæ ex porta in lienem protensæ sunt sequenti bolo expurgandi.

℞. Cass. recent. extra. 3 x. conspergantur pul. saccari, & hora una ante prandium devorentur. Aut

℞. Fol. fenæ 3 ii. Rhab. 3 i. Amisi 3 s. contusa macerentur per noctem in aq. fuma. 3 v. mane ebulliant, & expressa colentur, colato jusculo admisc. diacathol. 3 v. fiat haustus.

In reliqua medicatione & remedia omnia, quæ in scirrho epatis sunt enumerata conveniunt, nisi quod quanto lien Epate est rigidior, tanto debent esse fortiora. Sequentibus tandem post lenem purgationem 4. vel 5. diebus extenuentur, conco-

Bbb 2 quan-

quantur & præparentur crassi, tenacesque, & terrestres humores lieni impacti. In quem usum plurimum conducit mane ac vesperi uti haustu oxymelitis, non quidem ejus, quod in Myropoliis inter syropos habetur, sed parato ex purissimi mellis lb. i. & aceti vini lb. 4. simul commixtis, decoctis, & subinde à spuma defecatis, ad portionisque formam reductis: aut ubi abest calor febrilis, convenit exhibere mane ac vesperi pro una vice 2. cochlearia aq. Juniperi, aut gutt. 9. ol. Vitriol. cum 4. cochlearibus aq. card. bened. aut 3. v. mane ac vesperi, sequentis portionis.

*Decoctum
digerens &
attenuans.*

℥. Cort. Tamarisci, rad. Ebuli, polypod. an. 3 s. Ireos, cort. rad. fraxini an. 3 ii. scolopend. ceterach. capil. Vener. rosmar. centa. min. an. P. i. sem. agni casti, genistæ, sem. periclymeni an. 3 i. Epithymi, scordii, chamædtris an. p. i. contusa & concisa macerentur per diem & noctem in feri lactis caprini lb. 4. & aceti vini lb. i. quibus addantur mellis puriss. & defecati lb. s. & in cantharo probe obturato per duas horas coquantur, postquam refrixerint, percolentur, fiat potio. Exhausta hac portione rursus validiori purgatione terrestres humores ex liene subducantur.

*Flauus
melanago-
sus fortior.*

℥. Confect. Hamech 3 vii. aq. fuma. 3 v. misceantur, fiat tepida, sex horis ante prandium ebibatur. Reliquis deinde post evacuationem diebus, iis remediis uti possumus cum simplicibus tum compositis, quæ specifica proprietate lienis tumores extenuant, & corroborant ejus substantiam, inter quæ præstantissimum est remedium 3 i. Trochis. è cappare crebro cum vino hausta, aut 3 i. sequentis pulvisculi.

Pulvis.

℥. Rad. Tamarisci, Capparum, Herb. scordii, ceterach. an. 3 i. sem. hyperici, sem. periclym. fol. cent. min. sem. Agni casti an. 3 s. pulverisentur tenuissimè, & commisc. fiat pulvis, de quo una vice 3 i. cum vino, in quo ferrum est extinctum, ebibatur. Similiter plurimum conducere creditur 3 i. ramenti vel rasuræ ferri, cum aceto bene præp. Interea dum hisce utimur remediis internis, Topica quoque foris lienis duriciem

emollientia & resolventia studiosè sunt usurpanda, & quidem omnia tepida sinistro hypochondrio applicanda. Inungatur itaque lienis tumescens regio singulis diebus bis sequenti linimento.

℥. Ol. de cappare 3 s. ol. ex fraxino per descensum destillati 3 ii. medullæ crurum vituli 3 iii. mucag. ex sem. lini, & rad. Alth. in aceto macerat. confecti 3 iii. Gummi Ammon. in aceto resolut. 3 i. s. commisceantur, fiat linimentum. Post inunctionem imponatur Emplastrum tumori, ex gummi Ammon. cum aceto liquefacto, & per linteum instar Emplastri extenso: aut imponatur crebro tumenti loco sequens cataplasma.

℥. Rad. Malv. Alth. lil. alborum, Scyllæ, omnium viridum an. 3 iii. Ficum n. x. concisa coquantur cum aceti q. s. deinde contundantur, & in formam pulvis reducantur, quæ per duplicatum linteolum tepida extensa applicentur Lieni bis per diem.

In hunc ipsum usum conveniunt Emplast. de Meliloto, & Emplast. Diachylon simplex. Prodest & lienem bubalum recentem exemplum & adhuc tepentem tumenti Lieni applicare. Sacculo quoque ita concinnato, & in aceto decocto tumor foveri utilissimè potest.

℥. Flor. ac fol. centau. min. scordii, scolopend. ceterach. an. M. ii. Rad. Alth. sem. Malvæ an. 3 s. cort. rad. fraxini & cort. cappar. an. 3 i. contusa sacculo insuantur, & in aceto decoquantur.

5. *Obstructio splenis sive oppilatio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo referenda?*

Ἐμφραξίς τῆς σπλῆνός ἐστι ὅπου ἢ ἐνὸς ὁσφύος meatus ex Epate in splenem implantatus per ejusdem medietatem ad fundum ventericuli protensus, vel cavernulæ ipsius Lienis (est enim ejus substantia instar spongiæ cavernosa) terrestri melancholicoque humore solo aut crassa pituita commixto, infarciuntur obstructunturque. Causæ ἀσυνεργίαι, intemperies imbecillitasque segregatricis facultatis in Epate, & faculenti melancholicique humoris copia & crassities, vel pituita lenta huic admixta: ἀσυνεργίαι sunt alimenta cras-

*Essen. croci
& a Crollio
in hunc u-
sum com-
mendatur.*

Topica.

*Linimen-
tum.*

*Empla-
strum.*

*Catapla-
sma.*

*Splen bovis
adhuc cali-
dus appli-
candus.*

Sacculus.

*Obstructio
lien quid.*

Causa.

crassum terrestremque ac pituitosum sanguinem generantia, & mœror animi ac tristitia Lienem exsiccat ac refrigerans. Hipp. lib. 4. de morbis aliam addit causam, videlicet nimiam aqua ingurgitationem, quam si expurgetur per vesicam & ventriculum, lienem obstrui & attolli.

Signa.

Signa obstructionis lienis sunt, dolores ac punctiones in sinistro hypochondrio, appetentiæ prostratio, & ut plurimum urina apparet subnigra, respiratioque redditur difficilior, & pedes plerumque intumescunt.

Prognostica.

Prognostica signa ex lienis obstructione: Si ejus curatio diutius protrahatur, gravissima inferit symptomata, duriciem videlicet lienis, icterum nigrum & hydropem.

Curatio.

Curatio obstructi lienis per omnia ferè congruit cum curatione obstructi Eparis, nisi quod hic remedia cum interna tum externa debeant esse paulo validiora. Consistit autem curatio universa in venæ sectione, convenienti victus ratione, & remediorum usurpatione. Ante venæ sectionem emolliatur alvus fecesque subducantur seq. Enemate.

Enema.

℥. Malvæ, Mercur. an. M. r. centau. min. fuma. an. M. s. concisa coquantur in q. s. aquæ ad tertias, colato juri admisceantur confect. hamech ℥ i. s. ol. chamæm. ℥ iiii. salis ℥ i. fiat Enema, quod recto intestino tepidum infundatur: aut exhibeantur una hora ante prandium cass. recent. extract. 3 x. quæ saccato conspersæ devorentur. Post fecum ex alvo educationem, si ætas & vires tolerant, statim in principio obstructionis secetur vena lienaria, & sanguis per intervalla venam subinde comprimendo, detrahatur, donec coloris sanguinis aliqua alteratio compareat. Si autem vena lienaria in humero conspicua non sit, tum ea quæ inter digitos minimum & annularem constituta est, aut sub talo sinistri pedis commode aperiri potest.

Dietâ.

Victus ratio debet esse incidens & extenuans & boni succi, conducunt itaque carnes pullorum, virulorum, avicularum: & pisces Melanuræ & sim. Debent autem edulia condiri aceto vini & aromatibus extenuantibus,

& modicè calefacientibus, ut croco, zinzibere, cinam. rad petros. fol. majo. & saturejæ. In potu vinum gustare Rhenanum utilissimum erit.

Medicatio dirigenda est ad extenuationem crassorum humorum, & potissimum aperientia melancholicorum lienis impactorum. Incidit crassos humores & aperit viscerum obstructiones ol. vitriol. ejus gut. 9. aut paulo plures paucioresve pro robore & constitutione corporis cum haustu aq. card. bened. mane ac vespere per aliquot dies ebibantur. Aut si corporis intemperies ad frigiditatem vergat, commode ad extenuationem crassorum humorum mane ac vespere 2. cochlearia aquæ Juniperi exhiberi possunt: aut sequens potio præparat crassos humores in liene impactos ad educationemque habiles reddit.

℥. Rad. polypod. Glycy. cappa. an. 3 iiii. Decoctum sem. Anisi, fan. viticis an. 11. Ceterach. card. Bened. veronica, cent. min. an. M. s. Thy. mi, Epithymi an. 3 ii. cinam. 3 i. pass. min. 3 i. Concidenda concidantur & contundenda contundantur, quibus admisceantur confect. fuma. 3 ii. quæ in cantharo sive duplici vase cum aq. fß. 11. & aceti vini fß. s. ad duas horas concoquantur, refrigerata colentur, & colato juri admisc. Syr. è succo fuma. è succo Card. Ben. an. 3 ii. fiat potio, de qua per 4. aut 5. dies mane ac vespere ebibat æger 3 v. tepefactas, sexto tandem die extenuati humores detrahantur ex liene sequenti haustulo.

℥. Diacath. el. lenit. an. 3 ß. confect. Hamæch 3 ii. aq. Card. Bened. 3 iv. Misceantur, fiat haustus, qui 6. horis ante prandium tepidus ebibatur. Tandem rursus reliquæ crassorum humorum extenuentur, cum antea descripto remedio, rursusque secundario purgentur: idque singulis septimanis semel, donec lien ab omni liberetur obstructione. Reusnerus in Tractatione de Scorbuto & alii purgant diureticis hic multum tribuunt, uti sunt, Sal parietaria cum liquore oculorum cancri, li- quor Crystalli, Sal ononidis & similia. Interim autem & Topica remedia foris studiosè applicanda, & lien convenientibus remediis corroborandus erit: Foris itaque bis in die

inungatur sinistrum hypochond. sequenti linimento.

Linimentum.

℞. Ol. è Cappar. hyperico. è mastice. nardini an. ʒ i. ceræ parum, fiat linimentum, eluatur bis cum aceto rosar. aut foveatur sinistrum hypoch. seq. remediis in oblongiusculum sacculum confutis, in vinoque coctis expressis, calidisque lieni applicatis.

Sacculus spleneticus.

℞. Flor. Absinth. Chamæm. Melilori, Malvæ an. M. r. Asplenii, Scordii, Major. Valer. an. M. s. Rad. Alth. Cappar. an. ʒ s. Baccharum Junip. ʒ i. Concidenda concidantur, & contundenda contundantur, fiat sacculus.

Lienem confortantia.

Porro inter potionem extenuatoriam & inter expurgantia pharmaca, pro corroboratione Lienis plurimum conducit mane ac vesperi duas rotulas devorandas ægroto exhibere, aut diacurcumæ, aut dialacæ, vel ʒ s. Myrobal. chebulorum cond. Præter præscripta remedia pro calida aut frigida intemperie Lienis uti licebit omnibus remedium generibus quæ supra in curatione jecinoris obstructi, & in curatione duri tumoris lienis paulo ante sunt commemorata.

Vinum scolopendria & chamedrios admodum juvat spleneticos.

6. *Icterus niger quid, quæ ejus causâ, quæ signa, & quæ ratione curandus?*

Icterus niger quid.

Μελανίς regius morbus. Quemadmodum obstructo meatu vesiculæ bilis nequit in Epate flavæ bilis segregatio fieri, sed ipsa regurgitat in Epar, ibidemque sanguineam massam inficit, & inde in universo corpore flavus color extenditur: ita in obstructione meatus, qui ex Epate in lienem, & inde in fundum ventriculi protensus est, aut ubi venæ ac meatus in liene obstruuntur, tum melancholicus humor in Epar regurgitat, & cum sanguine in totum corpus diffunditur, totumque corpus subnigro colore tingit: quæ lienis affectio, Icterus niger seu morbus Regius ater nominatur.

Causæ.

Causæ Icteri nigri *αενυμδία* sunt segregatricis facultatis in epate ob ejus intemperiem, imbecillitatem, aut attractivæ potentiam in liene debilitas, aut copia & crassities limosi & melancholici humoris, meatum venasque ac cavernulas lienis obstruens: *αενυμδία* sunt, frequentior usus alimento-

rum sanguinem crassum generantium, veluti sunt carnes, piscesque fumo durati aut aridi, & leguminum genera crebrius esitata, item morsus violentorum quorundam animalium.

Signa morbi Regii nigri manifesta sunt, universi enim corporis cutis præter consuetudinem fusca subnigraque conspicitur: aliquando etiam propter mixturam flavæ bilis aut pituitæ color cutis ex nigro virescens aut lividus aut plumbeus apparet: His accedit & inusitata animi tristitia sine causa, & nonnunquam Tumor & obstructio lienis, dolor & gravitas sinistri hypochondrii. Semper autem & urina subnigra apparet.

Prognosticon in Ictero nigro: Ater morbus regius perniciosior est Ictero biliolo, qui si diu perseveret, negligentius tractetur, in hydropem terminatur: *Εν πλερυνque est lethalis.*

Curatio Icteri nigri in victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum atrum humorem extenuantium & evacuantium, lienemque & Epar corroborantium usurpatione consistit.

Victus ratio universa dirigenda est ad lienis epatisque intemperiei in contrarium statum commutationem. Calido itaque liene existente, refrigerantia; frigido vero calefacientia alimenta sunt præscribenda, quibus tamen semper extenuantia incidentiaque misceri debent; quæ autem talia sint, supra in imbecillitatis cum Epatis tum lienis curatione enumeravimus, quæ huc referri debent: Inter ea autem maxime excellit crebrior esitatio capparum ex aceto, & usus frequens aceti.

Vena in nigro morbo Regio secunda erit lienaria sinistri humeri, aut ramus ejus inter digitos annularem & minimum, nisi forte segregatricis facultatis in Epate imbecillitas mali causâ existat. Tum enim jecorariam venam dextri humeri præstat aperuisse. Verum sanguis in hoc malo non confertur, sed per vices detrahendus erit, & ante venæ sectionem, ut & in reliquis morbis, semper alvus leni Clystere vel glasse suppositorio exonerandus erit. Enematis autem glan-

Vena sectione.

glandisque conficiendi rationem in superioribus docuimus. Post venæ sectionem humor ater ac melancholicus cum in liene tum in toto corpore extenuetur ac præparetur sequenti potione.

Decoctum digestum.

℥. Asplenii, Scolopend. Fuma. an. M. i. veronicæ, centaur. min. Epithymi an. M. s. cort. cappar. Thamarisci an. ℥ s. veratri nigri in aceto prius macerati rursusque siccati 3 iiii. sem. Anisi, Viticis an. 3 i. s. pass. min. 3 i. contundendis contusis & concidentis concisis, coquantur simul in cantaro vel duplici vase cum lb. 4. feri lactis caprini per 2. horas, refrigerata colentur, colato juri admisce syr. è succo fumar. oxymel. simpl. an. 3 i. fiat potio, de qua mane ac vespere per 4. horas ebibat æger 3 v. calefactas: tandem purgetur crassus & ater humor sequenti haustulo.

Haustus melanagogus.

℥. Fol. senæ 3 ii. epithymi, Rad. Elebori nigri an. 3 i. contusa macerentur per noctem in aq. Fumar. 3 v. mane leniter ebulliant, expressaque colentur & colati juri admisceantur diacathol. 3 iiii. confect. hamech 3 i. fiat haustus, qui ebibatur tepidus in aurora sex horis ante prandium. Porro præscriptæ potiones tum extenuantes tum purgantes bis terve reiterari possunt, donec melancholicus humor probe fuerit eductus.

Vnde pluræ remedia petenda.

Præter hæc autem remedia ea omnia usurpari possunt, quæ in præcedentibus curationibus obstructi lienis & indurati commemorata sunt. Nota autem si melancholico humori bilis flava pituita admixta sit, id quod ex colore nigro in virorem aut cineritium vergente, dignoscere licebit, ea remedia in purgationibus sunt admiscenda, quæ & bilem flavam, ut est Rhab. & ex compositis Elect. rosar. Mes. aut pituitam, veluti est Agaricus & Elect. diaphen. expurgant.

Cautela.

Inunctiones, Fomenta, Sacculi & alia Topica, item lienem corroborantia remedia ex superioribus curationibus lienis petenda erunt.

Epithema.

Rursus notato, si Icterus sive flavus sive niger in resolutione virium aut in mulieribus utero gerentibus oboriat, quibus in-

ternis remediis uti non licet, iis utilissimum erit plantis pedum & carpis manuum ac volis imponere illigareque sequens cataplasma.

℥. Fol. visci quercini *Eichenkinster/* Experimentum
aut alterius arboris viridium, Marrub. virid. rad. chelid. maj. an. M. ii. singulare
conterantur in mortario, adfuso paulo ad omnem
xillo aceti aut vini, fiat cataplasma. icterus
Iisdem herbis si duæ lb. vini adfusæ sanandum.
fuerint, simulque conterantur, beneque subigantur, tandem expressa colentur viribus adhuc consistentibus; si 3 4. per quinque dies tepidæ assumantur, & cum eis sudor eliciatur, omnem icterus dissipat, ægrumque per sanat.

7. *Scorbutus quid, qua ejus causa, qua signa, & ut curandus?*

Stomacace Barbaris Scorbutus, & quibusdam satis ridiculè Gingipedium, eò quod in hoc morbo potissimum gingivæ & pedes afficiantur, nominatur, & sanè nihil est aliud scorbutus, quam gingivarum exulceratio, & pedum circa poplites resolutio, crurumque variis maculis defœdatio. Est autem Scorbutus ex genere morborum, qui

Quibus videtur, id est, populares vocantur, & in familiaris. certis tantum regionibus grassantur. Ita enim Scorbutus omnibus ferè Medicis veteribus incognita est affectio, & nusquam alias homines affligit, quam septentrionalis Oceani accolæ. Quemadmodum autem ex Quomodo effusione bilis flavæ generantur Icterus flavus, & ex effusione melancholici humoris Icterus niger, ita ex effusione sanguineæ massæ, in qua potissimè sanguis putrescit & corruptus est cum utraque bile & pituita mixta, per totum corpus effusa, Scorbutus generatur.

Hujus rei indubitatum indicium est, quod gingivæ potissimum in eo ulcerentur. Cum enim gingivæ inter omnes partes magis puriori sanguine nutrantur, id quod color earum ostendit, eò destitutæ, putrefactum attrahunt sanguinem, à quo statim exulcerantur. Quod vero & pedes in hoc malo afficiantur, inde contingit, quod cum sanguine putrido bilis atra & pituita sunt commixta, qui humores sua gravitate deorsum

ad

Cur gingivæ sanguinem profundant in Scorbutis.

Vnde maculae in cruribus.

ad pedes tendunt, & ligamenta nervosque in poplite gravant ac resolvunt, ac progrediendi facultatem impediunt, unde tandem ad tibias propulsi, in cute tibiarum maculas nigricantes, lividas ac flavas pro humo-

Vide l. 2. s. 6. 2. 4. p. 241. rum commixtorum ratione excitant: Cum autem supra inter morborum gingivæ curationes Scorbuti causas, signa, prognostica & curandi rationem prolixè declaraverimus, ea hoc loco repetere supervacaneum ducimus, sed eo studiosos ablegamus.

8. *Melancholia seu insania Hypochondriaca quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Quomodo hypochondriaca melancholia generetur.

Lien est receptaculum melancholici humoris feculentique sanguinis, ubi autem hic impurus & feculentus sanguis in liene corrumpitur ac putrescit, statim excitat præternaturalem calorem, quo & ipse lien & cir-

cumjacentia viscera inflammantur, primum quidem lien, deinde venæ Melaricæ ex porta epatis lieni implantatæ, tandem & epas & Diaphragma, quibus omnibus inflammatis excitantur in præcordiis flatu & dolores præcordiorum, inde deinceps excitantur fumi, vaporesque accensi, crassi & nigri ex Epate deferuntur primò in cavam venam, ex cava per jugulares in cerebrum, ubi conturbantes animales spiritus cerebrique substantiam insipientes ratiocinationem turbant, & delirii speciem quæ melancholia hypochondriaca dicitur, excitant. Cum autem melancholicæ insanix descriptionem & specierum causas, ejus signa & pro causarum varietate curandi modum, inter curationes morborum cerebri abunde tradiderimus, inde petant studiosi, quæ hic breviter studio omissa sunt. *Vide lib. 1. s. 2. p. 161.*

PRACTICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER SEXTUS.

DE RENUM ET VESICÆ MORBIS.

SECTIO I.

DE RENUM AFFECTIBUS.

I. *Renes quid, & quibus morbis symptomatisve afficiuntur?*

Renum utriusque.



Enes sunt duo receptacula ab Opifice in purificatione sanguinis ad attrahendas aquosiores sanguinis partes condita. Siti autem sunt Renes utrinque circa vertebrae lumborum, eisque & spuriarum costarum initiis firmissimis membranulis annexi, in quos duo rami ex trunco venæ cavæ orti implantantur, qui venæ emulgentes nominantur. Morbi Renum ac symptomata memorabilia sunt octo:

Renum imbecillitas ex intemperie,

Renum obstructio,
Inflammatio,
Renum calculus,
Apostema Renum,
Exulceratio,
Sanguinis ex Renibus cum urina profusum,
Diabetes.

2. *In Renum curatione quæ sunt observatæ necessaria Medico?*

In Morbis Renum curandis semper lenis purgatio, aut Clyster, aut catharticum reme-

Morbi eorum præcipui.

remedium præmitti debet; antequam Diuretica five Renalia medicamenta urinam motuentia adhibeantur.

Regula generalis.

Inter Diuretica remedia liquores tenuissimi, veluti sunt Chemici id est destillati, & pulveres exactissimè contriti, magis conveniunt.

Remedia Renum præstat jejuno ventriculo & in balneo seu lavacro exhibere.

In omni Renum affectione studiosè vententur esitatio casei, pisorum & panis recenter pisti. Vitanda quoque pharmaca cathartica laboriosa, quæ vehementer conturbant.

Retentio excrementorum alvi & flatuum est perniciofa in affectibus Renum.

3. *Debilitas Renum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Nephritis quid.

Nephritis in latiori significatione dicitur, ut *νεφρις* Renum imbecillitas est, quando Renum suas actiones non probè exsequuntur.

Renum officium.

Sunt autem actiones Renum, aquosum sanguinem in purificatione sanguinis ex Epate per venas emulgentes attrahere, & attractum in se tam diu continere, donec reliquias sanguinis liquori attracto mixtas in sui substantiam convertant, ac deinceps sinceram aquam in vesicam destillare & ablegare.

Causa.

Causæ debilitatorum Renum *αδυναμία* sunt aut calida aut frigida intemperies. Nam quæ imbecillitas eorum ex obstructione per crassos humores aut dilatationes oritur, seorsim in sequentibus tractabimus: *αδυναμία* sunt alimenta ac medicamenta diuretica aut intra corpus assumpta, aut foris applicata, quæ justo impensius aut calefaciunt aut refrigerant Renes.

Signa.

Signa calidæ intemperiei Renum sunt, urina vehementer rubicunda, caliditas lumborum ad sensum tactus, & frigidorum foris applicatione levamen. Signa frigidæ intemperiei Renum sunt, urina ad albedinem vergens, frigiditas lumborum ad tactum, & à calidorum applicatione mitigatio.

Prognostica.

Prognostica: Nephritici diu afflicti, ac præsertim quibus congenita est Renum in-

temperies, difficillimè curantur, & post annum 40. prorsus incurabiles evadunt.

Curatio imbecillitatis Renum consistit in alteratione intemperiei contraria, cum victus ratione tum medicamenti. Semper enim in calida intemperie frigidis & in frigida calidis opitulandum erit. In imbecillitate itaque Renum ex calida intemperie orta primum eluatur alvus, fecesque subducantur sequenti Clystere.

℥. Fol. Malv. Alth. Violar. an. M. i. sem. Lini, sænugræci an. ʒ s. Flor. Rosar. Violar. capil. Veneris an. M. s. concidendis concisis & contundendis contritis, coquantur in q. s. aq. ad medias, colati juris accipe ℥b. i. cassiæ recent. extract. ʒ ii. ol. Viol. ʒ iii. salis ʒ s. misce, fiat Enema, quod tepidum recto intestino, ventriculo adhuc jejuno existente, infundatur. Tandem si corpus est plethoricum, vena talaris interna incidatur. Tertio deinde die rursus exhibeatur cass. recent. extract. ʒ i. s. una duntaxat hora ante prandium, ac interea quotidie bis inungantur lumbi & regio Renum sequenti linimento.

℥. Ol. Rosar. violar. myrtil. è mastiche an. ʒ i. ceræ candidæ parum, fiat linimentum, cui admisce ʒ ii. muccilag. ex sem. cyton. & psylli, parum contritis, & in pauxillo aq. rosar. maceratis, confectæ. Post inunctionem imponatur lumbis cerotum infrigidans Galeni, vel cerotum sandalinum, quorum descriptiones extant in libris officinarum quos Dispensatoria vocant.

Exhiberi quoque commodè potest singulis diebus ʒ i. pul. Diuretici frigidi.

℥. Sem. Alkakengi ʒ i. Medullæ sem. fig. minutissimè concisorum, sem. lactucæ, cich. an. ʒ ii. Rasuræ Eboris, Tragacanti, Corall. albi præpar. lap. ex capitibus melanurorum an. ʒ s. tenuissimè pulverata misceantur, cujus ʒ i. cum haust. aq. cicho. tepidè exhibeatur: aut simili ratione ʒ i. Trochis. Alkakengi detur.

Porro si imbecillitas Renum à frigida intemper-

Curatio.

In calida intemperie Renum Enema.

Vena scissio.

Linimentum. Ol. camphoræ etiam hic valde conducit. Cerota. Laminam plumbi tenuiss. & perforatam alii applicant renibus. Pulvis diureticus frigidus.

renum ex
intemperie
frigida re-
media.
Enema.

temperie sit oborta, primum alvus subdu-
cenda erit sequenti Enemate.

℞. Malvæ, Flor. chamæm. Anethi, Me-
liloti, Absinth. an. M. s. carvi, Anisi
an. ʒ s. Agarici in linteolo ligati ʒ ii.
concisa ac contusa coquantur in q. s.
aq. ad medias, colentur, colati juris
sume lb. i. cui admisce Elect. Indi.
major. hieræ simpl. an. ʒ vi. ol. rutæ
ʒ ii. salis ʒ s. fiat Enema, quod usur-
petur ut paulò ante dictum est. Altero
tandem die exhibeantur devorandæ
que præbeantur cass. recent. extractæ
ʒ x. cui admixtæ sint gutt. iii. ol.
stillati Anisi. Tandem quotidie jeju-
no existente ventre exhibeatur ʒ i.
sequentis pul. cum haust. aq. petrosel.

Bolus.

*Pulvis diu-
reticus ca-
lidus.*

℞. Sem. Anisi, petrosel. ligustici an. ʒ ii.
fol. rorism. puleg. an. ʒ i. Galangæ,
baccar. lauri an. ʒ ss. succini albi ʒ s.
redigantur in tenuiss. pulver. & usur-
petur ut supra dictum est.

Foris autem Renum regio bis in die inun-
gatur, & quidem sequenti linimento.

*Linimen-
tum.*

℞. Ol. rutæ ʒ ii. scorpionum ʒ iii. ce-
ræ parum, fiat linimentum, cui admisce aq.
Juniperi ʒ s. Illis ipsis intemperiebus Re-
num si humores putrescentes sint adjuncti,
quâ ratione curari debeant, sequentibus cu-
rationibus obstructorum Renum & difficul-
tatis urinæ fusius docebimus.

4. Obstructio siue oppilatio Renum quid,
quæ ejus causa, quæ signa, &
quomodo curanda?

*Renum ob-
structio.*

Ἐμφραγξὶς τῶν νεφρῶν est ubi vel venæ e-
mulgentes, vel cavitates Renum, vel ureteres
aliqua dura crassaque materia infarciuntur,
ita ut Renes vel non probe attrahant aquo-
sum ex jecinore sanguinem, vel destillare ex
cavitatibus, & expellere in ureteres, ex ure-
tribusque in vesicam propellere nequeant.

*Cause in-
terna.*

Causæ *αἰσθητικῆς* oppilationis Renum
sunt, aut lenti crassique humores, aut pus sa-
niesve ex apostematibus aliorum viscerum
in Renes defluens, aut calculus in Renibus
concretus, aut flatulenti crassique vapores
in Renum cavitatibus inclusi. *Περονία* *πυκνότης*
sunt nimia corporis obesitas frigiditasque,

Externa.

fortes cincturæ lumborum, crassorum flatu-
lentorumque alimentorum crebra esitatio,
qualia sunt caseus ac legumina, potissimum
ubi post eorum usum superbibatur forte vi-
num. Tum enim citissime ante coctionem in
ventric. partes alimenti crassæ cum urina ad
Renes deferuntur, eosque infarciunt & ob-
struunt. *Cerevisia item crassa & non defecata.*

Signa: In obstructione Renum urina per-
petuo est instar lymphidæ aquæ tenuis & al-
ba, nisi obstructio à sanie vel purulenta ma-
teria in Renes defluente ortum habeat. Item
dolor & gravitas dorsii ac lumborum. Reli-
quarum causarum signa in calculi Renum &
urinæ difficultatis curatione indicabimus.

Signa.

Prognostica: Ex Renum obstructione, Prognosti-
nisi tempestivè succurratur, necessario cal- ca.
culus generatur.

Curatio obstructorum Renum pro cau- Curatio.
sarum varietate instituenda erit. Si enim cal-
culus aut pus obstruxit meatus Renum, ejus
oppilationis medicationem in seqq. videli-
cet in calculi, difficultatis urinæ, & exulce-
rationis Renum curatione proposituri sū-
mus. In obstructione vero Renum quæ ex
lentis & crassis humoribus aut flatibus Re-
num meatibus infarctis originem habet, ta-
li methodo est procedendum. Primo do-
lor lumborum mitigandus, status discutien-
di & feces alvi subducendæ erunt, & qui-
dem sequenti Clystere.

*Diligenter
hic obser-
vandam,
purganti-
bus prius
utendum
quam diu-
reticis.*

℞. Malv. Alth. Mercur. an. M. s. Flor. Ab-
sinth. centaur. min. chamæm. Anethi
an. P. i. pulp. colocinth. in linteolo
raro ligatæ ʒ i. Herbis simul concisis,
coquantur in jusclo carnis bovillæ
non salito, neque valde pingui ad me-
dias, colentur, hujus colati juris suma-
tur lb. i. eique admisc. hieræ simpl. ʒ i.
ol. chamæm. scorpionum an. ʒ i. salis
ʒ i. fiat Enema, quod tepidum recto
intestino infundatur. Alvo ita probe
exonerata, altero die, si corpus est
plethoricum, secetur vena vel epati-
ca, vel saphena, quæ habetur sub
malleolo interni pedis. Tertio dein-
ceps die præparetur crassus & lentus
humor sequenti portione.

*Vena se-
ctio.*

℞. Rad.

*Decoctum
digesti-
vum.*

℞. Rad. fœnic. petros. Glycyrr. an. ʒ iii. Asar. Dauri cretic. filicis an. ʒ ii. Eryngii, ononid. an. ʒ i. sem. petrosel. sem. mal. capil. Vener. an. M. s. Flor. centau. min. & sem. lutei chamæm. an. p. i. contundenda contund. ac concid. concidantur & coquantur in duplici vase cum lb. iii. aq. coquantur autem per 2. horas, tandem refrigerata percolentur, colatoque juri admisc. syr. è succo card. bened. & syr. de v. radicibus an. ʒ ii. fiat potio, de qua singul. diebus mane ac 3. horis à prandio ebibat æger ʒ iii. tepescitas, & ita tandem crassis humoribus extenuatis, & meatibus Renum nonnihil dilatatis, exhibeatur lenis purgatio hunc in modum parata.

Bolus.

℞. Cass. recent. extract. ʒ i. pul. Agar. Trochisc. an. ʒ s. spec. hieræ simp. ʒ i. commisceantur, fiat bolus, qui in aurora devorandus præbeatur: vel idem bolus resolvetur in aq. petros. ʒ v. fiat haustus, qui sex horis ante prandium exhibeatur.

*Haustus
purgans.
Diuretica
varia.*

*Tartari
vitriola-
ti ʒ lb.
cum jul.
rosati ʒ
ii. & aq.
cinam. ʒ
s. obstru-
rentur
efficaciss.
tollit.*

Purgatis hac ratione crassis humoribus & liberatis meatibus Renum, tandem tuto uti possumus & diureticis remediis, veluti sunt gutt. 9. ol. vitr. cum haust. vini generosi sumptæ, aut cochlearia duo aq. Juniperi, aut ʒ i. pul. ex succino albo, aut ea quæ in curatione calculi & difficultatis urinæ commemorabuntur.

Interim cum ad dolorum Renum mitigationem, tum ad meatuum dilatationem humorumque extenuationem, plurimum confert patientem in balneum aut folium aq. dulcis usque ad umbilicum aliquoties collocare, in qua aqua concoqui debent sequentes herbæ, avenarum aristæ, in quibus semina adhuc continentur, chamæm. Bethon. Malv. parietar. & similes herbæ. Prodest & post balneum & alias singulis diebus bis hisce oleis Renum regionem inungere.

*Linimen-
tum.*

℞. Ol. chamæm. Anethi, Scorpi. an. ʒ ii. misceantur.

5. Inflammatio renum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus præstis extinguenda?

Inflammat. Φλεγμονή τῶν νεφῶν est præter modum

incalescentia Renum, adeoque sensu perceptibilis.

Causæ *αἰτιολογικαὶ* inflammationis sunt adfluxus humorum corruptorum, præsertim sanguinis biliosi, in Renumque cavernulis collecti: *αἰτιολογικαὶ* sunt vehementiores commotiones lumborum & agitationes inter equitandum, medicamentorum potionumque valde calidarum crebræ potationes, plagæ attritionesque lumborum.

Signa inflammat. renum sunt lumborum caliditas ad tactum, dolor aut alterius, aut utriusque partis circa lumbos, pedum stupor, & extremarum partium frigiditas. Quin & laborantes Renum inflammatione difficulter se erigere ac progredi possunt, parum emingunt, utinaque in initio aquosa est & alba, progressu vero temporis rubescit & incrassescit, quibus accedunt nonnunquam & nausæ, & vomitiones biliosæ & appetentiæ prostratio.

Prognostica: Diu perseverans inflammatio Renum in suppurationem seu exulcerationem terminatur, urinæ aquosæ semper permanentes in Renum inflammationibus pessimæ sunt; cruditatem enim humorum & morbi diuturnitatem significant.

Curatio inflammatorum Renum in victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum tum intra tum extra corpus adhibendorum sedula usurpatione consistit.

In victus ratione conveniunt pristinæ cremor, pruna Ungarica dulcia, ova forbilia, juscula & carnes pullorum ac vitulinæ, ex piscibus melanuri. In potu convenit aq. hordei, in qua cinamom. est incoctum. Porro vitanda sunt studiose cum in victus ratione, tum in medicatione omnia calefacientia, acria, salia, diuretica, omnia denique Renes obstrucentia, ut sunt pisa, caseus, & carnes suillæ.

Venæ incisio statim in initio adhibenda erit. Secunda autem est vena talaris aut sub poplite sita ejusdem lateris in quo dolor & ardor maximè persentiscitur; ac si corpus sit plethoricum, utiliter & vena Epatica incidi poterit: verum ut in aliis affectionibus venæ sectionem efflagitantibus, monuimus,

semper ante venæ sectionem alvus est evacuanda, aut glande supposita ex melle, sale & pul. Alhandali conformata, aut leni clystere, quale hoc subsequens.

*Enema
evacuans
& dolores
leniens.*

℥℥. Mal. violar. Mercur. an. M. i. Flor. viol. Nymph. an. M. s. sem. lini ℥ s. sem. cyton. ℥ ii. Rad. Alth. ℥ iiii. contundendis contusis & concidendis concisis coquantur simul in q. s. aq. ad medias, colentur, colati juris accipe ℥ x iiii. quibus admisc. pulp. cass. ℥ i. Elect. lenit. ℥ i. ol. violar. ℥ iiii. salis ℥ i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur, ac, si necessitas expostulet, hic Clyster per intervalla reiterari potest ob evacuationem humorum calidorum, & ob mitigationem dolorum in Renibus. Post venæ sectionem sanguis biliosus calidusve temperetur sequenti portione per triduum.

*Emulso
refrigerans
utilissima.*

℥℥. 4. Sem. frig. ma. an. ℥ s. sem. portulacæ ℥ ii. Elota exactissimè contendantur, contusis admisceantur saccari candi in syr. violar. condensati ℥ ii. simulque omnibus probè subactis affundatur aq. cich. Alkakengi, aut in ejus penuria, lactucæ an. ℥ x. omnibusque probe subactis & agitatis colentur per filtrum fortiter exprimendo, ut omnis lacteus liquor ex se segregetur, fiat potio de qua mane ac vespere bibat æger ℥ v. quæ & Renum inflammationem & vitiosorum humorum fervorem lenit & mitigat mirificè.

Lenitiva.

Tandem mitigati humores vitiosi ex Epate & venis Melaraicis subtrahantur. Epar enim omnium maximè vitiosos humores in Renum inflammatione communicat Renibus per emulgentes venas. Epar itaque purgetur ℥ x. cass. recent. extr. aut ℥ ii. syr. rosar. solut. cum haustulo decoctionis prunorum. Violentiora autem cathartica remedia & quæ scammonium habent, in Renum inflammationibus, adeoque universis ejus affectionibus studiosè vitanda sunt.

*Diagry-
diata vi-
tanda.*

Topica.

Interim vero nec externa præsidia negligenda erunt. Topica itaque sequentia commodè lumbis renumque laborantium regioni applicari possunt. Inungantur itaque sin-

gulis diebus bis Renes sequentibus oleis simul commixtis.

℥℥. Ol. rosar. Nymph. an. ℥ s. cyton. ℥ ii. Mucag. ex sem. cyton. in aceto rosar. maceratorum factæ ℥ ii. commisceantur: Aut addita cera sufficienti, fiat linimentum: post inunctionem imponatur lumbis sive regioni Renum sequens cerorum.

*Linimen-
tum.*

℥℥. Ol. Ros. nymph. an. ℥ s. ceræ ℥ ii. aut q. s. His simul resolutis fiat cerorum, cui adhuc tepenti admisc. mucag. pŷylii cum succo portula. factæ ℥ ii. omnibus inter se probè subactis extendatur per duplicatum linteolum & applicetur. Ubi dolor fervorque Renum nonnihil remissit, prodest patientem includere in solium aquæ dulcis calidæ, in qua incocta sunt flor. chamæm. Mal. Rad. Alth. sem. lini ac sænugræci an. pro arbitrio, sem. ac radicibus prius parum contusis: post balneum applicetur cataplasma sequens.

Cerorum.

*Solium
aq. dulcis.*

℥℥. Farinæ fabarum, sænugræci, sem. lini, hordei an. ℥ i. pul. rad. Alth. ℥ s. cum æ. p. aq. & aceti, coquantur primum flor. chamæm. & cum ejus jusculo commisceantur prædictæ farinæ, & pul. & coquantur ad formam cataplasmatidis, & expansa per duplicatum linteolum, tepida Renibus affectis applicentur.

*Catapla-
ma.*

Remissis tandem doloribus tuto uti licebit & diureticis moderatis, id est, urinam benigne promoventibus, veluti sunt rad. Eryngii conditi, rad. petrosel. & rad. pastinacæ, quæ & in cibo concoqui possunt. Verum ubi inflammatio diuturna in suppurationem aut exulcerationem mutata est, tum eis utendum erit remediis, quæ paulo post in exulcerationis & apostematis Renum curatione commemorabimus.

*Diuretica
temperata.*

6. Calculus renum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus præsidis exturbandus?

Ἀδίας ἢ νεφῶν, lapidositas sive lapis seu calculus Renum est corpusculum instar lapidis durum, aut in lacunis cavernisque Renum generatum ac concretum. Renum porro calculus nonnunquam accidenta-

*Calculus
Renum
quid.*

*Differen-
tia.*

rarius

Quando
heredita-
rius.

Quomodo
generetur.

Alimenta
materiam
calculi
suppedi-
tancia.

Aquatartaream
& lapidosa.

Fons lapi-
des gene-
rans.

Signa.

rius est, nonnunquam vero hæreditarius, & à parentibus calculosis in liberos derivatus. Notandum autem hic est, ex iustantum parentibus derivari calculum in liberos, quibus calculus non in cavitare Renum sed in ipsa substantia generari consuevit. Sunt enim quorundam Renes proflus sabulose substantiæ. Generationis autem calculi modus huiusmodi est; cum Renes in purificatione sanguinis ferosiores crudioresque partem per venas ex Epate in se trahant, quicquid crassius in ea est, & per ureteres percolari nequit, calore Renum condensatur, assatur, induratur & calculi formam acquirit. Chymici hanc limosam materiam tartarum vocant, de cuius generatione videatur Paracelsi lib. 1. de Tartaro, tract. 3. cap. 1.). Efficiens vero est calor Renum exallans. Vel ut nostro more causas partiamur, αἰτιολογία causa calculi sunt vehementior caliditas renum, crassior pituitosiorque sanguis, & arenarum minutarum in cavernis Renum cohesio: αἰτιατικαὶ sunt cibi ac potiones, ex quibus crassius & lentus sanguis, calculique materiæ aptus generatur. Tales sunt carnes, piscesque fumo durati, pisa & alia legumini difficultis concoctionis genera, caseus, panis recens pistus & adhuc calens esitatus, cerevisia vinumque turbidum ac feculentum: Aqua item limosa, uti in Hollandia & per calces seu terram albam decurrentes, uti in Anglia, & prope Luneburgum, quas Alkalitas Paracelsi lib. 1. de Tartaro Tract. 5. c. 2. vocat, die einen kalkichten grundt haben. Quæ quod multum faciant ad calculi generationem, patet ex copia calculosorum in illis locis. Et manifestè elucet materiam calculi tartaream in aquis delitescere, ex fonte illo prope Francofurtum ad Oderam, qui ex vineis destillans, samenta & quicquid lignosi attingit, brevi tempore vel in lapideâ planè substantiam convertit, vel lapidoso cortice cingit.

Signa arenæ & calculi Renum sunt, fixus & acris dolor circa regionem Renum, stultor femoris, vel alterius vel utriusque, testiculorum retractio, urina in initio tenuis est, & aq. similis, deinceps vero turbida;

fulca, arenosam habens substantiam. Arenulæ verò ut plurimum rubicundæ sunt, (quantum nonnunquam & albæ & flavæ appareant, qui colores redundantis humoris in sanguine speciem ostendunt) nausea & crebræ vomitiones, quandoque etiam cruenta mingunt, ubi asperitas calculi venosas partes exulceravit.

Prognostica signa sunt: Calculus Renum adultos magis, quam pueros infestare consuevit. Nisi calculi cruciatibus tempestivè succurratur, dolor continuus vires prostermit, vigilias infert, & æruginosas vomitiones excitat, in præsentissimumque conjicit periculum. Calculi inæquales æqualibus, asperis lenibus, rotundi angulatis, majores minoribus, acerbiores inferunt cruciatu & difficilius excernuntur.

Curatio calculi Renum consistit in victus ratione, venæ conditionali sectione, & remediorum calculum comminuentium ac propellentium doloremque mitigantium tum intra tum extra corpus usurpatione.

In victus ratione utatur æger moderata deambulatione motuque corporis. Desidia enim auget dolorem; sed cavenda est vehemens corporis commotio, qualis est equitatio & vectio in curru. Alvus sit perpetuo lenis & aperta, sive id natura, sive glandibus ex melle factis subiectisque, aut Enematibus, sive victu perfici queat. Absit omnis animi perturbatio. Cibi sint concocti faciles, qui moderatè assumantur. Huiusmodi sunt juscula & carnes pullorum; pulli contusi, caro vitulina, cremor ptisanæ, pruna, ova sorbilia & juscula ex ovis parata. Videntur autem studiosè omnia dulcia, crassa & glutinosa, videntur & satietas, ingluviæ & cruditas. In potu vinum non obest, quod tamen debet esse tenue, aut aq. hordeacea temperatum. Hydromeli quoque moderatè bibi potest. Ubi calculus à sumpto cibo cruciatus infert, præstat statim vomitum ciere.

In initio doloris calculi protinus alvus e-
luatur sequenti Clystere.

℞. Mal. Alth. Merc. pariet. an. M. s. Flor. Enema de-
chamæm. Anethi an. P. i. Bac. Halicacabi ʒss. lora à cat-
fur-

*culo miri-
fico sedans.*

furfuris filiginei M. i. Ficuum n. vi. concisa & contusa coquantur in q. s. aq. ad tertias, colati juris accipe ℥b. i. cui admisc. ol. chamæm. violar. Scorp. an. ℥ i. pulp. cass. ℥ i. salis ℥ i. Misc. fiat Enema, quod tepidum infundatur, & si necessitas expostulat, crebrius & ad minimum singulis septimanis bis reiterari potest. Mitifice enim dolores calculi & cruciatus Renum mitigat. Si quis autem validius hoc Enema reddere cupiat, pro cass. admiscebit diaphæn. & Hier simpl. an. ℥ i. s.

*Vena se-
tio.*

Post subductam alvum, si corpus sit plethoricum, & vires ferant, aut si adsit calor præternaturalis, id quod ex urinæ rubedine cognosci potest, vena incidatur dextri cubiti, quam hepaticam vocant, primum, deinde alio die incidatur & ea quæ sub poplite aut sub malleolis sita est.

Porro si corpus patientis *νεκροχρυσικόν* fuerit, vitiosi humoris species convenientibus remediis, quorum genera supra in tabellis medicamentorum enumeravimus, subducantur. In genere autem commodissimè sequenti potione in præparandis vitiosis humoribus uti possumus.

*Digesti-
vum.*

℥. Rad. petrosel. sæni. Glycyrr. pimpin. an. ℥ ii. cort. rad. ononis ℥ β. sem. ligustici, Anisi an. ℥ i. s. Bac. Alkængi, lauri an. ℥ i. Herb. scord. Betho. Card. Bened. an. P. i. Flor. luteorum. chamæm. sem. malvæ an. M. s. contusa ac concisa coquantur cum ℥b. iiii. aq. in canthato massa farinacea oblinito per duas horas, postea refrigerata colentur, cujus ℥ v. tepidæ mane & duabus horis ante cænam ebibantur: absumpta hac potione evacuentur vitiosi humores sequenti haustulo.

*Haustus
purgans.*

℥. Fol. senæ ℥ ii. Rhab. ℥ i. sem. Anisi, Glycyrr. an. ℥ i. contusa macerentur per noctem in aq. petrosel. ℥ v. & summo mane ebulliant leniter, expressaque colentur, colato jussculo admisc. Diacathol. Diaphæn. an. ℥ ii. fiat haustus, qui tepidus ebibatur sex horis ante pastum.

*Doloris à
calculo cu-
ra.*

At veto ubi cruciatus calculi inducias usque ad humorum vitiosorum præparatio-

nem non ferat, tum omissa præparatione, si corpus sit biliosum, exhibeantur ℥ x. pul. cal. Aut si pituitosum sit, ℥ x. diaphæn. in haustulo aq. petrosel. resolutæ ac calefactæ, atque statim ubi æger à purgatione aliquantulum vires resumpsit, ad medicamenta cum Topica tum intra corpus remedia, quæ & dolorem mitigare & calculum comminuire ac propellere apta sunt properandum.

Evacuatio.

Primum itaque in calculi cruciatibus statim balneum in solio est instituendum, in eaque aq. dulci decoquendæ sunt sequentes herbæ, fasciculus videlicet aristarum avenæ, Alth. flor. chamæm. anethi an. M. aliquot; in eam aquam adhuc calentem desideat æger, & prædictis herbis dorsum, & totum inferiorem ventrem involvat, & per horam, aut paulo diutius, si vires ferant, immoretur. Et tale quidem balneum, si necessitas postulerit, sæpius reiterari potest, & ter quaterve in una coctione lavare potest. Mitifice enim & dolores mitigat, & meatus quibus calculi sunt impacti, emollit & dilatat.

*Insestus
admodum
utilis.*

Porro paulo ante priusquam patiens in hoc lavacrum descendat, unum aliquod ex sequentibus diureticis remediis ebibat.

*Diuretica
varia.*

℥. Ol. vitriol. ℥ s. Vini aut aq. petrosel. ℥ iiii. misceantur, & ebibat. Committit enim & propellit mirabiliter calculum Renum. Aut

1.

℥. Ol. de succino chymica arte destil. ℥ i. quo eodem modo utatur. Aut

2.

℥. Aq. Juniperi ℥ iiii. quas ebibat æger. Aut

3.

℥. Pul. leporis in olla exusti & in cinerem conversi, tenuissimeque pulverati ℥ i. & cum ℥ i. aq. junip. & ℥ iiii. aq. petrosel. simul commixtis ebibatur. Aut

4.

℥. Pul. succini albi ℥ i. bibat cum haustulo vini. Aut

5.

℥. Sang. hircini ex hircio juvene diebus aliquot herbis diureticis, ut Apio, Petrosel. & similibus nutrito, ac tandem jugulato, excepti, & in sole exsiccati, tenuissimeque pulverati ℥ i. s. & cum aqua Juniperi aut Petrosel. simul mixta haustulo ebibatur. Aut

6.

℥. La-

7. ℥. Lapidis Judaici, lapil. cancrorum an. ℥ ii. conterantur tenuissimè, & prædicto modo exhibeantur. Aut

8. ℥. Aq. stillat. ex Terebinth. ℥ ii. & ebibat. Aut

9. ℥. Ol. Terebint. gutt. x. & cum haust. aq. Genestæ aut Halicacabi assuman-
tur.

10. Aut Terebint. decies prius in aq. petrosel. lotæ, ac deinde in aq. Juniperi probe agitata ℥ ii. cui admisce ol. Vitriol. gutt. 7. ac simul resolvantur in vino calido & ebibantur. Aut

11. ℥. Succu rad. Rapha. ℥ i. r. aq. Juniper. ℥ i. commixta ebibantur. Aut

12. ℥. Sem. Alth. Lithospermi, sem. Hypericon. Asparag. an. 3 s. Rad. Glycyrr. cort. rad. ononis an. ℥ i. Lapid. cancrorum, sang. hirci præparati an. ℥ ii. Lap. Judaici 3 i. succini albi præparati. ℥ i. pulverata tenuissimè commisceantur, hujusque pulv. 3 i. cum vino aut aq. Petrosel. ebibatur.

Nonnulli
quam
Theriaca-
em hic
feliciter
exhibent.
Pulveres
usuales
contra
calculum.

Calculum enim frangit & propellit. Non inefficaciter quoque ante ingressum balnei exhiberi potest 3 i. Ther. Androm. Præter hæc remedia prostant in officinis pulveres ad calculum confringendum & expellendum idonei, sub nomine pulveris Justiniani, ducis, & Lithontribon, quorum 3 i. dicto modo propinari potest.

Ad calculum cum inflammatione remedia.

Verum si calculi cruciatibus admixta sit Renum inflammatio, tum præstat à vehementer calefacientibus abstinere, & patienti ante ingressum balnei ac singulis diebus bis 3 i. s. Troch. de Alkaken. pulverati cum haustulo decocti rad. Glycyrr. Ononydis, graminis & sem. Alth. exhibere.

Emulso.

Singulis quoque diebus bibendæ erunt ægroto mane ac vespere 3 v i. lactis ex sem. 4. majoribus & nucleis persicorum an. 3 s. simul probe contusis & cum aq. Halicacabi, Genestæ, & Petrosel. an. lb. i. confecti, aut cum totidem lb. decocti rad. Ononis, Glycyrr. graminis & sem. Alth.

Topica.

Topica quoque remedia deinde non sunt

negligenda, sed statim à balneo, & sing. dieb. bis Renum regio sequentibus oleis simul mixtis ad focum seu fornacem est inungenda.

℥. Ol. Scorp. ex Italia allati, ol. Anethi, chamæm. an. 3 i. r. aq. Junip. 3 i. commisceantur: post inunctionem applicetur loco dolenti sequens cataplasma.

℥. Rad. Alth. Malvæ an. 3 i. sem. fax-
nugræci, lini an. 3 s. Flor. chamæm. Anethi
an. 3 x. pulverentur, eisque admisceantur
medullæ panis siliginei, & adfusis aq. & aceteti ex cerevisia facti p. æ. coquantur simul, donec in pulvis durioris formam redeant, quibus admisceantur 3 i. r. butyr. rec. salifque experti, & calida per duplicatum linteolum extensa lumbis imponantur.

At vero ubi doloris vehementia vigiliis continuas creet, & vires dejiciat, viribus adhuc constantibus, ne in vitæ periculum conjiciatur æger, pro somno conciliando & dolore mitigando ad Narcotica, id est, stuporem inducentia pharmaca confugiendum erit & exhibendæ 3 i. s. Elect. à Philo-
co laudano
opiato jam
haud infelicititer uti-
mur.

Præservare à generatione calculorum experientia comprobavit usum crebriorem
rad. Raphani, & si quis singulis mensibus
ipso die Novilunii esset bulbum allii in aq.

Juniperi per noctem maceratum, vitatis tamen vitandis, & servata bona inculpatæque victus ratione, & simul adhibitis tempestivis vitiosorum humorum eyacuationibus tum per vomitum tum per alvi dejectionem.

7. Renum abscessus quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?

Αἰσθησις τῆς νεφροῦ, Tumor sive Abscessus Renum
Renum, Geschwulst der Nieren. Af-
ficiuntur Renes tumoribus veluti & alia viscera, qui varia graviaque excitant symptomata.

Secundum qualitatem duæ sunt differentie.

tix tumorum Renum, calidus videlicet & frigidus, inter frigidos tumores & Scirrhus numeratur.

Causa. Causæ αἰσθητικαὶ sunt adfluentium in Renes vitiosorum humorum aut saniei collectio. Vitiosi humores sunt sanguis biliosus aut corruptus, qui calidos excitat tumores, aut sanguis pituitosus & melancholicus, qui frigidos generat tumores, expultricis facultatis imbecillitas, & calculus in renibus hærens. Externæ sunt violentus ictus, percussio aut ex alto delapsus in lumbos, & alimenta omnia sua tenacitate, crassitieque Renes obstruentia, veluti sunt caseus, pisa, anguilla, feculentæque cerevisiæ.

Signa apostematis calidi. Signa apostematis calidi Renum sunt dolor tensivus continuus cum adjuncta febre, alvi, urinæque suppressio, ingens sitis, nausea, urina tenuis & flammea, calorque lumborum ad tactum sensibilis.

Signa frigidi tumoris. Signa frigidi Apostematis sunt dolor gravis & tensivus circa regionem Renum, cruris & coxæ infra Renem affectum stupor, tibiæ extensio, febris nulla adest nec sitis, urinæ color ad albedinem vergit.

Urina oleosa. In calido Apostemate Renum, si diutius duret, una cum urina pinguedo instar punctorum olei profluit & supernat, quæ Renum liquefactionem ostendit, & quandoque pili rubei profluunt, & in urina conglomerantur, qui Renum substantiam assari significant.

Prognostica. Prognostica signa hæc præcipue sunt notanda. Ubi Apostema Renum ruptum fuerit, & pus per ureteres in vesicam & ex vesica cum urina profluit, salutare est signum. In calido Apostemate, si adsit febris, & lingua nigricet, ratioque turbetur, est lethale signum. Scirrhus sive induratus Renum tumor, si perseveret diutius, rarissime curatur, atque si durities ex caliditate sit orta, conjicit ægrum in tabem; si à frigiditate, in hydropem. Quandoque rumpitur Renum Apostema, tum hominem rigor febrilis invadit. Pus cum urina rupto Apostemate profluens, si in matula subsideat, sitque album, leve, & non foetidum, & sequatur

mitigatio doloris, salutare est signum; secus se habens, malum; foetor enim & color foedus saniei, perseverantibus symptomatibus, mortale est signum.

Curatio. Curatio pro materiæ tumorem efficientis & qualitatis calidæ vel frigidæ ratione varianda erit. Perficitur autem Curatio Victus ratione, Venæ sectione, & materiæ subductione, qualitatisque Renum alteratione, symptomatumque mitigatione, cum remedium & intra & extra corpus, quæ apostemata aut resolvunt aut ad maturitatem suppurationemque deducunt, ac indurationem prohibent, administratione.

Dietæ. Victus ratio qualitati calidæ Renum frigida, frigidæ calida præscribenda erit. In universum autem alimenta omnia sint tenuia & concoctu facilia. In calida intemperie juscula, carnes pullorum, vitulorum, avicularum, ex piscibus melanuri, pitisanæ cum hordeacea tum avenacea, cum uvis immaturis aut limoniis concocta conveniunt. In frigida intemperie videntur pisces, & alimenta condiantur cinamom. zinzib. croco, & macere. In calido tumore potio sit aq. hordei: In frigida vinum tenue aut cerevisia clara.

Diuretica quando exhibenda. Diuretica omnia & materiam ad Renes promoventia, non antea sunt alimentis admiscenda, aut per se offerenda, donec Apostematis materia cum clysteribus tum catharticis remediis, sed lenibus subducta sit & expurgata: in urinisque signa maturitatis apparuerint.

Ante itaque venæ sectionem subducatur alvus, & attrahantur vitiosi humores ex venis Mesaraicis & Epate leni clystere, quod in hunc modum parari potest.

℞. Malvæ, Mercur. violar. an. M. i. Enema. Flor. chamæm. Anethi, an. M. s. Flor. Absinth. centaur. min. an. P. i. concisa coquantur in q. s. aq. ad tertias, colati juris accipe ℞. i. cui admisce cass. extr. ℥. i. Mellis rosar. ℥. i. Ol. Aneth. scorp. an. ℥. i. s. salis ℥. i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Evacuata alvo in plethoricis corporibus & a-

Vena se-
ctio.

& apostemate calido existente, molien-
da est venæ sectio, & primo quidem in-
cidatur vena Epatica dextri humeri, deinde
& vena sub poplite, aut sub malleolo exte-
riori. Ubi verò ex aliqua occasione venæ se-
ctio impediatur, applicentur coxis lumbis-
que cucurbitulæ cum scarificatione.

Cucurbitu-
la.

A venæ sectione humor vitiosus sive sit
caliditati seu frigiditati junctus, præparetur
ac subducatur convenientibus remediis, ac
potissimum Clystere, qui magis conducunt
quam pharmaca cathartica. Si itaque calidus
sit humor vitiosus, præparetur sequenti
haustu.

Digesti-
vum in
causa cali-
da.

℞. Syr. de cichor. cum Rhab. ʒ i. Aq.
Halicacabi, ononid. an. ʒ ii. miscean-
tur, fiat haustus pro una vice, qui sub-
inde per quatrimum mane ac vesperi
reiteretur, exhibeaturque tepidus.
Quinto deinde die purgetur humor
calidus aut ʒ x. pul. cass. aut sequenti
haustulo.

Haustus
purgans.

℞. Rhab. ʒ i. s. fol. senæ ʒ i. sem. Anisi
ʒ i. confusa macerentur per noctem
in ʒ v. aq. ononid. ac mane ebulliant,
expressæque colentur, colato jusculo
admisceantur ol. lenit. ʒ vi. fiat hau-
stus, qui tepidus in aurora sex horis
ante prandium exhibeatur. Alia verò
violentiora remedia in Renum affe-
ctionibus studiose sunt vitanda.

Cathartica
fortiora
hic evitan-
da.

Si sitis impensus urgeat ægrotantem, bi-
bat aq. hordei cum pauxillo cinamom. co-
ctam: deinceps quotidie mane ac vesperi bi-
bat liquorem lacteum ex sem. frigid. hunc
in modum confectum.

Emulso
refrige-
rans.

℞. 4. Sem. frigid. major. an. ʒ s. saccari
candi ʒ ii. simul tenuissime conterantur,
misceantur, eis aq. Ononis & aq. cich. an.
ʒ x. diligenter subigantur, & expressa cole-
tur, fiat potio.

Frigidi ab-
cessus re-
media.

Porro ad frigidum apostema sequentibus
tum extenuantibus tum purgantibus uti li-
cebit.

Digesti-
vum.

℞. Syr. de succo Card. Bened. de Eupa-
torio an. ʒ i. s. Aq. Junip. ʒ s. aq. Be-
thon. ʒ iii. fiat haustus, pro una vi-
ce, quo tepido per iii. dies mane ac

vesperi utatur æger. Postea subducatur
alvus aut Enemat. ex decoct. rad. ono-
nidis, petros. & fenic. an. ʒ i. Herb. ab-
sinth. card. bened. an. M. s. hujus liquoris
decocti accipe lb. i. in quo resolve hier.
simpl. ʒ iii. Ol. anethi, hyperici an. ʒ i. s.
salis ʒ i. fiat Enema, quod tepidum recto in-
testino infundatur jejuno: aut subducatur al-
vus sequenti haustu.

℞. Diaphæ. Diacathol. an. ʒ x. aq. pe-
trofel. ʒ v. fiat haustus, qui tepidus ex-
hibeatur in aurora.

Interea nec Topica remedia, in quibus
potissimum præsidium apostem. consistit, negligenda erunt. In calidis itaque Renum
Apost. instituatür balneum aq. in folio, in
ea aq. coquantur fol. salicis, Malvæ, lactu-
cæ, solatri, flor. rosar. ac violar. similesque
refrigerantes herbæ: In tali balneo tepido
quidem, vel quotidie vel alternis diebus in-
sudeat æger. Post balneum autem & simul
singulis diebus bis Renis affecti regio se-
quenti linimento inungatur.

℞. Ol. rosar. violar. Nymphæ, mastich. Linimen-
an. ʒ ii. Mucag. ex se. cyton. & psy-
lli confectæ cum aceto rosar. ʒ iii.
ceræ albæ q. s. fiat linimentum. Post
inunctionem semper affecto Reni im-
ponatur cerotum sandal. aut refrige-
rans Galeni, quæ in Myropoliis pro-
stant. Aut imponatur sequens Epi-
thema.

℞. Suc. lactucæ, solatri, semper vivi an. Epithema.
ʒ i. Album. ovi unius conqussati,
ol. rosar. violar. an. ʒ i. species. dia-
tria sandali ʒ i. commisce, fiat Epi-
thema, cui addatur aceti rosar. ʒ i. s.
& modicè calefactum excipiatür pan-
no novo ceruleo & Renibus applice-
tur. Aut imponatur cataplasma ex vi-
rentibus herbis simul confusis.

℞. Solat. portul. acetosæ an. M. i. Fol. salicis, lactuc. semper vivi an. M. s. confusis
admisce Aceti rosarum ʒ i. s. fiat catapla-
sma, quod tepidum imponatur. Aut com-
modè imponi possunt fol. Nymph. in palu-
dib. natantis, quod subinde commuran-
dum est.

Cautela. Cavendum autem diligenter ne præscripta remedia spinæ vertebris imponantur, sed circa latera tantum ubi hærent renes, ne spinalis medulla refrigeretur, & nervi debilitentur.

Sedato dolore calidi Apostematis, emollientia ad maturitatemque deducenda applicanda erunt, in quem usum facit sequens cataplasma.

Cataplasma emolliens & maturans.

℞. Pul. rad. alth. ʒ i. fænugræci, sem. Malvæ, flo. viol. chamæm. sine stipitibus, meliloti an. M. s. Hyperic. P. r. Omnibus his pulveratis coquantur simul in olla cum æ. p. aceti rosar. & aq. plant. ad pulvis formam, fiat cataplasma. quod tepidum duplicato linteolo exceptum reni affecto applicetur.

Topica in frigido abscessu. In frigido porro renum apostemate balneum paretur ex sequentibus herbis.

℞. Fasciculum aristarum avenac. rad. alth. Malvæ an. M. iiii. flo. chamæm. melil. anethi an. M. iiii. sem. fænugræci, lini an. lb. s. flo. Hypericon. M. iiii. coquantur in aq. folio infundenda, cui tepido crebro infideat æger: à lavacro & alias quolibet die bis inungatur affectus locus sequenti linimento.

Linimentum. ℞. Ol. chamæm. anethi, Hyperico. è scorpio, ol. laurin. an. ʒ ii. ceræ parum, fiat linimentum, quod eluatur cum aq. juniperi, fiat linimentum. Post inunctionem imponatur emplastr. de Meliloto, aut sequens cataplasma.

Cataplasma. ℞. Rad. alth. ʒ ii. iridis illyr. bacca. lauri an. ʒ ii. spicæ celticæ, major. meliloti an. M. i. Pulverata commisceantur cum vino q. s. instar pulmenti, concoquantur, fiat cataplasma, quod tepidum applicetur. In

Cautela. curatione apostematis renum studiosè cavendum est, ne vel nimium refrigerando, vel impensius calefaciendo tumor in scirrhum convertatur. Scirrhosum autem apostema renum, si cui Medico occurrat, præstat eum ab ejus curatione abstinere. Est enim ut plurimum incurabile. Verumtubi Medicus, ut aliquid tentet, rogando cogitur, uti eis poterit remediis, quæ in curatione scirrhii epatici & lienis sunt commemorata.

Rupto apostem. renum, quod ex purulenta urina cognoscitur, mundificantia & consolidantia, simulque diuretica tuto ac commodè exhiberi possunt. Subinde itaque bibat hydromel, & cum haustulo vini assumat crebrius ol. Terebin. gut. 9.

8. *Ulceratio renum quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus mediis curanda?*

Ἐλκωσις τῶ νεφρῶν, ulcus renum. Ulcerantur renes; ut & reliquæ carnosæ partes, maxime intra suas cavernulas, & sicut omnia alia ulcera, ita & renum, ad continui solutionem referuntur. Causæ ἀσυνεργῶν sive internæ sunt, aut apostematis antecedentis ruptio, aut acrimonia puris, aliorumque erodentium humorum in cavernulis renum collectio, aut disruptio venularum & articularum in ipsis renibus, aut lapidis in ipsis renibus contenti asperitas & inæqualitas: ἀσυνεργικαὶ sunt medicamentorum venenosorum renesque erodentium, qualia sunt cantharides, assumptio, & renum violenta compressio ac vulneratio.

Signa communia renum vel amborum vel unius exulceratorum sunt, dolor erodens cum gravitate circa regionem renis affecti. Renes exulceratos habentes, liberè & sine impedimento mingunt, id quod in vesicæ exulceratione minime contingit. Si exulceratio renum ex rupto apostemate orta sit, cum urina pus, sanies, aut ramenta, aut caruncula parvæ & oblongæ, & nonnunquam pili profluunt, ipso Hippocrate attestante qui 4. Aph. 75. inquit; si sanguinem aut pus mingunt homines, aut renum aut vesicæ exulcerationem significat. Quibus statim adjungit, si in urina crassa existente caruncula parvæ aut velut capilli fluitent, ii à Renibus excernuntur. In ulcere ex erosionem rupturæque orto, similiter ex calculi asperitate, ut plurimum sanguis cum urina emingitur sine difficultate.

Prognostica signa: Si ulcera Renum maligna fuerint, tum pus exit foetidum & lividum, & rarissimè curari possunt, præsertim in senibus. Renum exulcerationi sæpè vesicæ ulcus succedit.

Cura-

Curatio. Curatio consistit in proba victus ratione, puris humorisque erodentium expurgatione, in remediorum cum internorum tum externorum applicatione.

Dieta. Quantum itaque ad victus attinet rationem, diligenter vitandi sunt crudi & concocti difficiles cibi. Vitanda & omnia acria impensius calida, & quæcunque bilem genere possunt, potissimum autem vehementia exercitia, commotionesque Corporis & equitatio fugienda sunt. In cibo conveniunt omnia, quæ carnem mollem habent, veluti sunt Volucrum montanarum, caro hædina, pullorum & vitulina, ex piscibus squamosi, veluti sunt perca, melanuri & luci atque cancri. Omnium autem convenientissimum alimentum est exulceratos Renes habentibus cremor pitisanæ & puls ex amylo cum lacte confectus. Conducit quoque lac caprillum cum ovi luteo permixtum, jusculum gallinaceum, & ova forbilis. Ex fructibus uvæ passæ & amygdalæ dulces excoctæ profunt. In potu aq. hordei, in qua uvæ passæ, glycer. & cinamom. incocta sunt, convenit. Concedi quoque potest Vinum dilutum, lac amygdalinum, caprinum & ovillum. Venus ulceribus Renum pestilentissima est.

Potus. Venæ sectio in Renum exulceratione parum conducit nisi in corporibus plethoricis biliosis & recalcactis, in quibus si necessitas exigit, secetur vena epatica affecti lateris primum, deinde & talaris. Ferro ante venæ sectionem, quin & citra eam plurimum confert crebro alvum sequenti Clystere eluere.

Venæ sectioni quando locus. Mal. Alth. violar. Mercur. an. M. s. Furfurum M. i. Concisa coquantur in ii. lb. juris gallinæ pinguis ad tertias, colentur, & colati juris accipe ʒ xiiii. in quibus dissolve Cass. ʒ i. hieræpicæ ʒ i. s. ol. violar. chamæm. an. ʒ i. s. salis ʒ i. fiat enema, quod tepidum infundatur, cum quo supinus jaceat æger, cruribus paululum erectis.

Enema. Multum prædicatur & menstrua vomitio in curando ulcere Renum, & hoc unice

curandum est, ne alvus obstruatur; Si vero constricta fuerit, statim vel jusculeo prunorum dulcium saccharo conditorum, aut jusc. ping. gallinæ, aut glandibus, aut leni enemate lenienda aperiendaque erit.

Tandem studiosè consideretur, qui potissimum vitiosi humores in corpore redundent, salsane pituita, aut retorrida bilis ulcus exacerbans, & primum præparetur redundans humor ad eductionem, deinde evacuetur leniter solventibus pharmacis. Pituita itaque præparetur sequenti portione.

ʒ. Rad. Fæni. petrosel. glycer. an. ʒ s. Hyssop. card. ben. flor. cent. min. an. M. s. sem. Anisi, fænic. alkakengi an. ʒ iii. pass. min. ʒ s.

Contusa ac concisa coq. in lb. ii. aq. in dupl. vase per 2. horas, colentur, colato juri admisc. syr. de bethon. de hyssop. an. ʒ iii. fiat portio, de qua mane ac vespere hauriatur haustulus tepidus ʒ v. Exhausta portione evacuetur pituita sequenti haustulo.

ʒ. Diaphæn. ʒ x. aq. card. ben. ʒ iii. misce, fiat haustus. Si vero biliosus retorridusque humor Renes molester, sequenti portione præparetur.

ʒ. Syr. de cichor. cum Rhabarb. violar. rosar. an. ʒ iii. aq. stillat. cicho. petrosel. an. lb. i. fiat portio simul commiscendo, qua mane ac vespere ebibita, sequenti haustulo evacuetur.

ʒ. Rhab. ʒ ii. fol. senæ ʒ i. Contusa macerentur per noctem in ʒ v. aq. cicho. mane leniter ebulliant, colentur & colato jusculeo admisce, aut ʒ ii. elect. rosa. mes. aut ʒ iii. elect. lenit. fiat haustus, qui sex horis ante prandium tepidus ebibatur. Aut exhibeatur per se, bolus ex cass. ʒ x. confectus.

Evacuatis vitiosis mordicantibus humoribus, quotidie bis medicamenta sunt exhibenda, quæ ipsum ulcus abstergant & mundificent, conglutinent & persanent, inter quæ probatissima sunt lac caprillum cum rosa. melle dulcoratum, quod mane ac vespere bibatur, aut lac equinum recens emulsum, aut hydromel, aut sequens portio.

D d d 2 ʒ. Symp.

Alvus emollienda.

In pituitosa causa digestivum.

Haustus phlegmæ.

In biliosa causa digestivum.

Mundificantia & consolidantia.

Potus.

℥. Symp. maj. rad. glycy. an. M. s. sem. malvæ, Capill. Ven. hippuris, veron. an. M. s. Rad. gram. femin. Alkak. an. 3 iiii.

Contusa ac concisa decoquantur in vase duplici cum lb. i ii. aq. per duas horas, colentur, & jus colatum commisc. cum sem. 4. frig. ma. an. 3 s. tenuissimè contritis, ac tandem rursus percolando fortiter expressis, fiat potio, de qua sumat 3 v. manè ac vesperi. Aut

Pulvis.

℥. Trochis. de Alkak. sine opio 3 i. pulveretur tenuissimè, & cum hydrom. haust. ebibatur singulis diebus bis. Aut exhibeatur manè ac vesperi sequens elect. qu. semijuglandis.

Pulvis
congluti-
nans.

℥. Pul. glycer. Tragac. an. 3 ii. Troch. de Alkak. 3 iii. confert. Symp. rosar. an. 3 i. s. syr. de Symp. Fernelii q. s. fiat electuarium.

Ulcere sufficienter emundato, id quod deprehenditur, si non amplius pus cum urina profluat, tum seq. pulvisculo ulcus facile conglutinari potest.

℥. Corall. rub. usti & cum aq. plantag. sexies eloti 3 ii. Hippuris adusti & in cinerem redacti 3 i. Mastic. sarco. collæ, sang. dracon. an. 3 i i. sacca. cand. 3 ii. Misce tenuissimè pulverata, cujus 3 ii. assumentur manè ac vesperi cum cremore ptisanæ. Omnium autem præstantissimum est remedium ad renum ulcera persananda, decoct. rad. chinæ, cujus conficiendi & utendi rationem infra in morbi Gallici curatione descripturi sumus.

Decoctum
china.

Topica.

Infectus.

Nec interim Topica prætereunda erunt. Erit itaque commodiss. patientem crebro in lavacrum collocare, in quo concocta sunt rad. Alth. Malv. cum rad. herb. chamæm. fasciculus avenæ, semen fanugraci, lini an. ad libitum, ac ita coquenda sunt, ut aq. ipsa in se recipiat & vires & lentorem rerum præscriptarum. Post balneum inungatur affecta regio oleis sequentibus & non tantum post balneum sed & singulis diebus bis.

Linimentum.

℥. Ol. rosar. violar. amygdal. dulcium

an. 3 s. Mucag. rad. Alth. cum aq. rosar. factæ 3 iiii. Misceantur. Post inunctionem imponatur loco affecto sequens cerotum.

℥. Ol. rosar. Myrtillo. amygd. dulcium an. 3 i. ceræ q. s. Fiat cerotum, cui adhuc tepido admisc. pul. mast. thuris an. 3. i ii. farinæ hordei q. s. ad condensandum cerotum, quod extendatur per alutam & syndone obducatur.

Cerotum.

Reliqua huic affectioni convenientissima phatmāca in curatione exulceratæ vesicæ, (utrumque enim viscus exulceratum iisdem remediis curari potest) commemorabuntur.

2. Sanguinis ex renibus mictio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Αἱμορραγία ἢ νεφρῶν, sanguinis ex renibus profluvium est, ubi ex Renibus per urinarios meatus cum lotio sanguis emingitur. Sciendum autem sanguinem omnem per virgam profluentem, procedere aut ex renibus, aut ex ureteribus, aut vesicæ collo, aut pudendo, exulceratis aut vulneratis, id quod earum partium acrior dolor & purulentus sanguis indicat. Dolor quidem ad est in Renum exulceratione circa lumbos, in ureterem circa Illia, in colle vesicæ circa pectinem, in pudendi verò in ipsa virga. Ubi vero sanguis sine dolore ac purulentia profluit, id contingit aut propter dilatationem venarum emulgentium ureterumque, aut propter retentricis facultatis in Renibus imbecillitatem, aut propter rupcionem venarum, aut propter ἀνατομὴν seu transudationem, aut propter ἀσθενεῖαν, id est erosionem, aut propter ἀνατομὴν, id est orificiorum venarum apertionem in enumeratis partibus. Omnis autem sanguis emictus aut est sincerus & repente profluens, qui ex dilatatione aut ruptione venarum oritur, aut est purulentus, & cum dolore excernitur, & exulcerationem dictarum partium ostendit, aut dilutus ac serosus, sensimque ac paulatim profluit & ἀνατομὴν, aut si adest in meiendo acredo ἀσθενεῖαν indicat. Verum hoc

Mictio
cruenta.Vnde san-
guis pro-
fluat.Differen-
tia loci
affecti.Differen-
tia sangui-
nis excreti
quid deno-
tet.

hoc

hoc loco nobis de sanguinis mixtione ex Renum duntaxat affectionibus proveniente sermo erit.

Causæ interna.

Causæ *αἰσθητικῆς* sanguinis ex Renibus profluentis sunt venarum emulgentium laxitas, facultatis retentricis in Renibus imbecillitas, Renum Ureterumque exulceratio, asperitas calculi in Renibus aut ureteribus hærentis, humores acres sanguini, qui ad Renes defluit, commisti, orificia venarum in renibus aut aperientes aut erodentes.

Externa.

Προγενετικῆς causæ sunt alimentorum acrium ac potissimum vini meracioris immoderata usurpatio, venarum orificia aperiens aut erodens; balnea calida crebriora venas laxantia, venenatorum remediorum, præsertim cantharidum, qui Renes & vesicam suam *ἀντιπυρετικῆς* ac proprietate urenteque qualitate, reliquis partibus illæsis, exulcerant, assumptio lapsus aut ictus lumbis illatus, saltatio & equitatio violenta, Venusque immoderata.

Signa

causarum diversarum.

Signum sanguinolentæ mictionis est evidens, sed causarum signa sunt paulo obscuriora. Dignoscitur tamen laxitas venarum emulgentium & retentricis facultatis Renum imbecillitas ex profluvio sanguinis diluto ac seroso, qui sine dolore profluit, & quidem paulo post assumpta alimenta copiosè emingitur. In Renum exulceratione vero aut calculi asperitate, sanguinis mictioni adest acris dolor circa lumbos, & sanguis profluit purulentus. In apertione orificiorum aut erosione venarum sanguis profluit serosior ac aquosior, & sine quidem insigni dolore. Ita & in ruptione purus sanguis & confertim repentè mingitur. Externæ causæ ex ante actis vitæ actionibus, & relatione ægri investigari possunt.

Prognostica.

Prognostica signa sunt: Sanguinis mictio non statim curata in *νεφροστικῶν*, & totius corporis macilentiam conjicit. Hippocrat. 78. Apho. l. 4. Quicumque sponte sua repente sine manifesta causa sanguinem emingunt, iis à renibus venula rupta est.

Curatio.

Curatio pro causarum varietate variabitur. Consistit autem in victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum cum

internorum tum externorum administratione.

In victus ratione usurpanda sunt alimenta quæ Renes corroborant, constringunt & consolidant. Primum itaque ab omni vehementiori exercitatione ac potissimum à Venere & equitatione absteineat se æger. In cibis assa quam elixa magis conveniunt. Ex carnibus profunt, capreolorum, Anserina, anatina, pullorum, columbarum & avicularum. Ex leguminibus oryza cum lacte ovillo aut caprino. Ex fructibus amygdalæ dulces, lac quoque caprillum aut ovillum in quo ferrum aut silices candentes sunt extincti, esitari ac bibi potest. Potio sit vinum rubeum, cerevisia non adeo plena, probè tamen cocta, in qua macerati sunt caryophylli. Omnia urinam moventia vitentur, item acria omnia & aromata exceptis caryophyllis: Alimenta aceto præsertim rosar. condiri possunt. Profunt & ovorum lutea in aceto macerata.

Venæ sectio in ea sanguinis mictione duntaxat est adhibenda quæ plethoricis corporibus contingit, & quæ ex ruptis venulis in Renibus profluit. Secabitur autem vena epatica aut mediana dextri humeri: debet autem sanguinis emissio per venam sectam per vices fieri, nimirum venam sectam digito subinde comprimendo aliquandiu & rursus laxando. Quin si calor circa lumbos sentiat in mictione urinæ, possunt cucurbitulæ lumbis commodè affigi.

Quantum porro ad medicationem attinet, si sanguis cum urina defluens ex erosione aut apertione venarum à renibus ortum habeat, primum biliosus aut acris salsusque humor venas erodens, neglecta ejus præparatione, leni purgante haustulo subducendus est, qui hoc modo parabitur.

℞. Decoctionis florum ac fructuum, cujus descriptio parandique ratio extat in Dispensatoriis, *℥. v.* in quibus macerentur per noctem Rhab. fol. senæ an. *ʒ. i.* Mane ebulliant leniter, colentur, fortiterque exprimantur, expresso liquori admisce el. rosati, Diacatho. an. *ʒ. i.* & tepidus sex horis ante prandium ebibatur.

D d d 3.

Omne

Sanguinem cum urina profluentem sistens. Potio.

Omne genus profluvii sanguinis cum urina reprimunt ac sistunt sequentia phar-maca.

℞. Succī Rad. symph. ma. polygoni si-ve corrigiolæ, lysimachiz luteæ an. ℥b. i. aut si tempore hyberno haberi nequeant succi, loco eorum ℞. Rad. symph. ma. ℥i. corrigiolæ, veronica an. M. i. caryoph. ℥i. co-quantur cum vini rubei ℥b. iiii. in du-plici vase ad 2. horas, colato vino, aut succis præscriptis admisce saccari ℥iv. simul ebulliant, ac rursus co- lentur, fiat potio, cujus mane ac ve- sperī ebibat æger ℥iv. calefactas: aut apparabitur sequens pulvisculus.

Pulvis.

Essentiam croci & Chymici hic exhi- bent.

℞. Rad. Symp. ma. veron. cornu cer- vi usti, corall. rub. præpar. an. ℥i. Boli Armeni, lap. hæmat. Tragacan- thi, sanguin. Dracon. an. ℥s. omni- bus tenuissimè pulveratis & commi- xtis, fiat pulvis, cujus ℥i. mane ac vesperī cum haustu tepido vini rubei assumantur.

Simili ratione prodest ℥i. Trochis. è suc- cino cum ovillo lacte assumpta. Aut

℞. Fol. falicis, lysimach. glandularum an. ℥i. fiat tenuiss. pulvis, cujus ℥i. mane ac vesperī ebibatur.

Ad ardo- rem renum cum urina sanguinolenta mictione, tum & mict. cruentam. Potio.

Si ardor Renum circa lumbos percipitur cum urina sanguinolenta mictione, tum & mict. cruentam. ℞. Aq. stillat. rosar. plantagin. portul. an. ℥i. quibus admisce philonii Romani ℥i. fiat haustus. Aut

Electua- rium.

℞. Mucilag. ex sem. papaveris albi cum aq. rosar. confectæ ℥s. Dyacyton. ex succo sine aromat. confecti, con- serv. rosar. an. ℥i. Trochis. è carabe ℥i. Rasuræ eboris, cornu cervi an. ℥s. caryoph. ℥i. fiat elect. cujus semper 2. horis ante prandium cæ- namque assumat æger q. semijuglan- dis. *Hic unica cura est, inquit Para- cels. l. i. de Tartaro tr. 3. c. i. ut urina fiat incarnativa; per ea que habent vim salis in se cum incarnatione, ut sunt potiss. thus, mastix, mumia, &c.*

Topica.

Interim nec Topica negligenda erunt re-

media, sed subinde regioni Renum appli- centur sequentia pharmaca. Si calor sentitur in Renibus, lumbis imponentur fol. querci aut rubi per se aut simul juncta, aut sequens cataplasma.

℞. Fol. querci, rubi an. M. ii. rad. tor- ment. Balauft. cort. granatorum an. *Catapla- sma.* ℥i. gland. myrtill. an. ℥s. Pulverata concoquantur in vino rubeo ad pulvis formam, eisque admisce ol. rosar. cyton. an. ℥i. farinæ hordei, faba- rum an. q. s. ad formæ cataplas. indu- ctionem, fiat cataplasma, quod bis singulis diebus recalefactum lumbis imponatur.

Porro si post cohibitionem sanguinolen- tæ urina maneat exulceratio in renibus, ipsa exulceratio methodo & medicamentis pau- lo ante in curatione exulcerationis renum dictis, persanabitur.

10. *Vrina profluvium continuum seu Dia- betes quid, quæ ejus causa, quæ si- gna, & quomodo curan- dum?*

Διαβήτης à Διαβαίνω id est transeo vel tra- jicio dicta, est potus ut assumptus est sine ulla alteratione per Renes & vias urinae transmissio, cum vehementissima continua- que sitis: Cognationem habet hoc malum cum hydropo & cum lienteria. Ut enim hy- dropi vehementiss. adest sitis, & in lienteria assumptus cibus nondum alteratus per al- vum dejectur: ita in Diabete semper adest intolerabilis sitis: & potus assumptus mi- nimè alteratus per viam urinae perfluit, un- de hoc malum & ὀδραντιον νεφρον, & ὀδραν- τισ, id est siticulosam affectionem vocant. Rarus est affectus, quem Galenus se tantum bis in vita sua vidisse testatur l. 6. de loc. af- fectis.

Diabetes quid.

Ejus co- gnati af- fectus.

Siticulosus affectio.

Causa in- terna.

Causæ πονηρικæ sunt immoderata ca- liditas & sicca intemperies Renum aut so- la aut conjuncta cum aliquo humore æcti vel bilioso, vel pituita serosa ac salia, qui- bus aut Renes aut totum corpus est imbu- tum: qua intemperie & humorum acrimo- nia labefactantur facultates naturales Re- num; Attractiva & Expulsiva præter natu- ram

externe.

Modus generationis
diabetes.

ram excitantur, Alterativa & retentiva profus extinctæ jacent. *Προγρητική* sunt vini meracioris immoderata potatio, & falsamentorum crebrior estatio.

Generatur autem hoc modo diabetes. Renes sicci & calidi extensa nimium facultate attractiva citissime serum sanguinis vel aquosam humiditatem, non tantum ex epate, sed ex venis totius corporis & ex ventriculo attrahunt & sugunt, sensimque sitim in orificio Ventriculi ingentem excitant, oblatumque ventriculo haustum, statim rapiunt, & per venas Melaraicas & epat attrahunt, sed attractam humiditatem propter Retentivæ & Alterativæ potentie extinctionem, nec retinere nec alterare possunt, sed potum crudum statim à sumptione deiciunt ac transmittunt. *Interdum etiam plus quam assumpserunt, sicuti Gatianaria meminit cujusdam puella Mediolanensis, qua quotidie mingeat 16. lagenas urina, cum tamen vix unam potarat.*

Signa.

Signa Diabetis sunt, pertinax & insatiabilis sitis, potionisque desiderium, multa & frequens urinae crudæ statim à potu sumpto mictio, animi anxietas, lumborum coxarumque intumescencia, ardor ingens viscerum, salivæ albæ & spumosæ crebræ expuitiones, postea subsequitur totius corporis tabes.

Prognostica.

Prognostica signa sunt: si Diabetes paulo diutius duret, ob exiccationem omnium venarum, tabes totius corporis, & tandem mors subsequitur. Diabetes febribus ardentibus superveniens mortalis est. *Vbi tamen diligenter hic affectus à critica urina copiosa excretionem discernendus est. Contingit namque interdum ut aliquot libra urina paucarum horarum spacio excernantur, in febribus ardentium declinatione, absque ulla noxa, sed potius cum levamine & restitutione agri.*

Curatio.

Curatio Diabetis etsi difficillima sit, in initio tamen quidam curati sunt, subsequentibus præsidiiis adhibitis. Constitit autem curatio in victus ratione, venæ sectione, & remediorum cum internorum tum externorum adhibitione. Omnia autem hæc institui ac dirigi debent ad refrigerationem ac

humestationem renum reliquorumque viscerum.

Diatæ.

In victus ratione itaque aer in quo decumbit æger debet esse frigidus vel natura vel arte, somnus ægro imperandus est quam fieri potest longissimus, alvus sit lenis, vitetur exercitium motusque corporis & quicquid calefacit & exsiccat. Alimenta sive cibi sint crassioris substantiæ, & qui difficilius concoquantur, temperamento vero sint frigidi & humidi, & qui in ventriculo diutius hædere queant. Laudantur itaque suillæ carnes macræ, potissimum autem pedes & rostra suilla, item pedes vitulini & capita, caro leporina, caseus recens sine sale compactus, lac per silices aut ferrum candens concretum, sero abjecto, lac amygdalinum, oryza cum lacte cocta, ova dura, olera cocta ex intybo ac lactuca, ex piscibus lupi, synodontes, & cancri fluviatiles, ex fructibus pyra, atque mala punica, castanea, & nuces avellanæ. Vitentur autem omnia salsa & acria atque diuretica. In potu

Cibus utilis.

Potus.

Venæ sectio non nisi in morbi principio est adhibenda. Inveterato enim malo plus nocet quam conducit. Secunda autem erit vena epatica dextri humeri & sanguis parce moderateque extrahendus est.

Venæ sectio.

Quantum autem ad medicationem attinet, aq. frigidiss. largius hausta & statim iterum per vomitum rejecta, idque crebro tentatum, refrigerando viscera, plurimis auxilium tulit. Præterea, etsi rationi adversum est, tamen in diabete sitim mirifice sedare creditur Theriacæ Androm. non-nihil, crebro usurpatum. In principio morbi si renes aut bile aut serosa salsaque pituita imbuti esse deprehendantur, aut totum corpus iisdem humoribus sit refertum, bilis quidem acrimonia mitigetur, sequenti phar-

Frigida potus utilis.

Theriaca sitim hie sedat.

maco.

Potio tem-
perans a-
crim. bi-
lis.

maco, ter quaterque assumpto. ℞. Syr. de Nymph. rob. de berberis an. ʒ i. s. aq. card. bened. cichorii an. ʒ ii. fiat haustus. Tercio deinde die subducatur biliosus humor sequenti haustu.

Hauſtus
cholagogus.

℞. Rhab. ʒ ii. sem. anisi ʒ i. contusa macerentur in ʒ v. aq. cichor. post 24. horas tepescant, & fortissimè exprimantur ac co- lentur, cui iusculo admisc. elect. rosat. Mes. ʒ ii. fiat haustus, & assumatur sex horis ante prandium.

Potio di-
gerens pi-
ritam
salsam.

At si pituita salsa infestet renes, præpa- retur primum ad educationem sequenti hau- stulo.

℞. Syr. ex succo card. bened. ʒ ii. aq. ab- sinth. ʒ iv. misceantur, fiat haustus, qui quater reficiatur, & mane ac vesperi tepidus ebibatur per 2. dies, tertio die subduca- tur serosa pituita sequenti haustulo.

Hauſtus
phlegma-
gogus.

℞. Agar. troch. ʒ i. s. fol. senæ ʒ i. sem. anisi ʒ i. contusa macerentur per noctem in ʒ v. aq. stillat. flor. sambuci, deinde expressa colescentur, co- lato iusculo admisc. diaphæn. Fern. ʒ ii. s. fiat haustus, qui tepidus in aurora 6. ante prandium horis ebiba- tur.

Balneum
sudorife-
rum.

Post subductos vitiosos humores uti- lissimum erit & sudorem prolicere in dolio per vaporem silicum candentium cum decocto chamæm. aspersorum. Inter sudandum autem caput dolio exerendum est, & frigidus aer per respirationem hauriendus. Post sudorem ac deinde mane ac vesperi offeratur bibendus haustus aquæ hordei torrefacti tepidus, in quo prius resolvantur ʒ i. s. conserv. rosarum, & rursus percolatus: aut offeratur frequenter sequens potio.

Potio à
balneo u-
surpanda.

℞. Succ. acetosæ ʒ iii. syr. è succo bo- rag. ʒ i. aq. cichor. ʒ ii. misceantur, fiat haustus, qui crebro reiteretur.

Porro ad retentricis renum facultatis re- stitutionem valde conducere testatur Ama- tus Lusitanus, si singulis diebus in aurora sequens haustulus offeratur.

Potio re-
tentricem
renum sa-

℞. Syr. myrtill. rosati, ex infusione rosa- rum siccarum facti, an. ʒ s. Pul. troch. è terra sigillata, de spodio an. ʒ i.

aq. stillat. calicum rosarum plantagi- nis, polygonian. ʒ i. s. fiat haustus. Aut

℞. Succ. corrigiolæ, symph. defecati, vini rubei austeri an. ʒ i. fiat haustus. Ubi vero hæc præscripta nullum ad- ferunt præsidium, tum præstantissi- mum est pharmacum si ʒ ii. aut ʒ i. elect. philonii Persici aut Romani vo- cati cum decoct. Polygoni cum vini nigri ʒ iii. exhibeatur. Refrigerat e- nim & stuporem infert renibus, at- tractivamque ejus vim frenat.

Philo-
nium.

Interea nec Topica negligenda erunt, Topica. sed Renum regioni subinde imponenda sunt sequentia remedia.

Indies inungantur lumbi bis sequenti lini- mento, ac non tantum lumbi sed & hypo- chondria & pecten.

℞. Ol. rosar. Nymph. cyton. papaveri- ni an. ʒ ii. unguenti populini ʒ i. s. ceræ albæ parum. Fiat linimentum, quod eluatur cum succo plantaginis & postremo admisc. parum aceti ro- sar. Tandem post inunctionem de- xtro hypochond. five regioni epatis sequens emplastrum imponatur.

Linimen-
tum.

℞. Ol. rosar. Nymph. an. ʒ i. ceræ q. s. Empla- strum e- pati im-
ponendum. fiat emplastrum, quod tepidum elua- tur in succo plantag. & cichor. & deinde admisceantur tepido pul. ro- sar. sandalor. omnium an. ʒ s. exten- datur per alutam & syndone rubea obducatur, & artificiosè intersuatur epatique applicetur. Renibus autem & pectini, ureterumque regioni se- quens cataplasma imponatur.

℞. Suc. portulacæ, lactucæ, capiti pa-
Catapla-
sma reni-
bus & pe-
ctini ap-
plican-
dum. paveris, solani, polygoni, aceti rosar. an. ʒ i. in quibus macerentur sem. hyosci. Cyton. papav. an. ʒ ii. tra- gacanti ʒ s. fiat mucilago quæ forti- ter exprimatur, cui admisc. ol. rosar. ʒ ii. farinæ hordei, quantum ad in- corporationem sufficit, fiat catapla- sma, quod quotidie bis per duplica- tum linteolum extendatur, & tepi- dum prædictis locis applicetur. Aut

℞. Viridium herbarum videlicet hyo- sci. pa-

ci. papav. folani, pampin. five fol. vitis, portulacæ, umbilic. Veneris, lentium aquaticarum an. M. s. contundantur eisque admisc. Santalorum rub. balauft. an. ʒ s. farinæ hordei q. s. fiat cataplasma. Epati quoque præter scriptum emplastr. commodè imponi possunt singulæ vel simul mixtæ sequentes herbæ.

Epithema
pro hepate.

ʒ. Fol. Taraxaconis, cichor. Acetosæ an. M. i. contusa imponantur. Renibus & ureteribus si alia ad manus non sunt, commodissimè imponi possunt fol. plantag. aut fol. Nymph. per aquas natantia.

Pro renibus.

SECTIO II.

DE VESICÆ MORBIS.

1. Vesica urinaria quid, & quibus morbis afficitur?

Vesica
quid.

Vesica, κύστις, est receptaculum urinæ, ex tribus membranis constructum, situm inter ossa pectinis, incumbens recto intestino, cujus cervix deorsum in meatum virgæ vtilis inseritur, in fœmellis verò vesica inter matricem & os pectinis collocata est. Etsi autem longo intervallo distat à renibus, tamen per ureterum interventum eis colligata est, & per sympathiam semper affectis renibus & ureteribus, & ipsa simul afficitur. Variis afficitur morbis vesica, quorum præcipui sunt:

Ejus sympathia
cum renibus.

Vesica affectus præcipui.

Inflammatiō vesicæ,
Ardor urinæ,
Exulceratiō vesicæ,
Urinæ difficultas,
Urinæ stillicidium,
Urinæ suppressio totalis,
Urinæ involuntaria fluxio,
Calculus vesicæ.

2. Inflammatiō vesicæ quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Inflam-

Φλεγμονή τῆς κύστεως est ubi ipsa vesica uri-

naria per accidens incalescit. Natura enim sua, vel per se est frigida, sicca, ut omnes alia: membranæ partes.

matio vesica quid.

Causæ *αἰτιολογικαί* inflammationis vesicæ sunt urina ignea ex renibus inflammatis in eam defluens, aut crassius putridusque humor jamque inflammatus, vesicæ meatus occludens.

Causa.

Προκαταρκτικαί sunt diuturna retentio urinæ sæculentæ, crassæ turbulentæque, & venenata pharmaca, ac calidiora diuretica, ut sunt cantharides & ol. vitriol. non probè præparatum atque rectificatum, si quis eo inconsultò utatur.

Signa inflammatae vesicæ communia sunt cum his, quæ in calculo vesicæ & difficultate urinæ annotabimus. Semper autem ardor sentitur in hypogastrio & circa inguina, quibus accedunt & febricula & vigilæ, & urina difficulter & cum summo ardore per virgam destillat aut effluit, alvus ut plurimum suppressa est.

Signa.

Prognostica: Vesicæ inflammatiō ut rarissima est affectiō, ita periculosissima. Hippocr. l. 2. Prognost. c. 14. *vesica dura & dolentes, perniciose sunt. Exitiales vero maxime, quæ cum febre continua sunt. Corripuntur hoc affectu potiss. pueri à 7. ad 15. annum.*

Prognostica.

Curatio inflammatae vesicæ consistit in victus ratione, venæ sectione, & remediorum tum interiorum tum exteriorum exhibitione.

Curatio.

In victus ratione imperanda est ægroti moderata diæta, cibis utatur refrigerantibus, ut cremore psianæ, prunis Ungaricis & piscibus fluviatilibus, ut sunt gobii & melanuri seu percæ aculeatæ, & ea omnia alimenta conveniunt, quæ paulo ante in renum inflammatione sunt commemorata. Potus erit aq. hordei aut lac sem. frigid. maj. cum aqua lactucæ confectum: uti quoque moderatè poterit cerevisia clara & refrigerante, qualis est Brunsvicensis, & huic similibus.

Diæta.

Venæ si vires & ætas tolerant secanda: venæ ut in omnibus ferè morbis venæ sectio.

Venæ sectio.

Ece

rem

nem efflagitantibus admonuimus, ita & hoc loco alvus, quæ semper in hoc malo est obstructa, clystere prius est eluenda, qui hoc modo parari potest.

Enema.

℥. Violar. Mercu. an. M. i. sem. malvæ, alth. an. M. s. Lini ℥ s. psylli ℥ ii. Concisa & confusa coquantur in q. s. aquæ ad tertias, colentur, colati juris accipe ℥b. i. cui admisce el. lenit. ℥ ii. ol. violar. ℥ ii. anethi ℥ i. salis ℥ s. fiat clyster, qui tepidus recto intestino infundatur, & si dolor acerbior justo sit, leniendi ejus causâ clysteri admisceri possunt gr. opii ℥ ii. in aq. rosar. soluti.

Quæ vena incidenda.

Post elotam alvum, statim, si corpus vel est plethoricum vel adsit febricula, & vires perferre possint, secetur vena epatica dextri humeri primum, deinde si necessitas exigat, tertio die & vena talaris in pede commodè incidi potest.

Evacuatio.

Post venæ sectionem interna remedia sequentia adhibenda sunt, & primum devoret æger ℥ x. cass. hora una ante cibum, aut ℥ i. elect. lenit. assumat in haustulo aq. endiv. 6. horis ante prandium: postea utatur quotidie manè ac vespere lacte sem. hac ratione præparato.

Emulso.

℥. iiii. Sem. frigid. ma. an. ℥ s. sem. portulacæ, papav. albi an. ℥ iiii. contundantur tenuiss. eisque admisce. conf. rosa. viola. sacca. candi an. ℥ i. aq. alka. cicho. an. ℥b. i. s. subigantur omnia probè, & agitentur in mortario, deinde percolentur, exprimantur, fiat potio cujus ℥ v. aut vi. pro vice frigidæ ebibantur.

Topica.

Quantum ad externa remedia retinet; statim post venæ sectionem applicentur hypogastrio & pectini sequentia Topica. Primum crebrius insideat æger folio aq. tepida repleto, in qua aq. sint incocta rad. ac fol. malvæ & alth. violar. fol. salicis & cap. papav. an. M. iiii. aut quantum sufficere videbitur. Insideat autem in hoc decocto æger per spaciū unius horæ, aut quousque perferre potuerit, ita ut liquor umbilicū attingat: post balneum inungantur pecten,

inguina & tota vesicæ regio sequent. oleis.

℥. Ol. chamæm. anethi an. ℥ ii. violar. Linimen. papav. an. ℥ s. Muccil. sem. lini, psylli & citon. simul confusum & cum aq. solatri macerat. & conf. ℥ iiii. misce.

Postea si per hæc remedia nondum dolor mitigetur, seq. liquor apto instrumento si-ve siphone per virgam in capacitatem vesicæ impellatur.

℥. Cap. papa. cum seminibus, baccar. haliacabi, fol. solani an. ℥ iiii. concisa coquantur cum q. s. aq. malvæ. Hujus decocti liquoris accipe ℥ iiii. cui admisce ol. nymph. viola. an. ℥ ii. ping. gallinæ resolutæ ℥ i. fiat enema, vesicæ infundendum. Quin & vesicæ regioni totique hypochond. commodissimè sequens cataphasma viridium herbarum crebro imponi debet.

℥. Fol. alkak. solani, hyosch. an. M. Catapla. iiii. cap. papav. vesis cum seminib. M. s. ma anody. ii. His omnibus confusis, succus ex-primatur eisque admisce q. s. farinæ hordei, & concoquantur ad pulvis crassitiem, fiat catapl. quod tepidum imponatur.

Majori adhuc urgente necessitate, formetur suppositorium in crassitiem arundinacei calami & longitud. minimi digiti ex opio Theba. ad ignem calefacto, quod syndone involvatur, filoque appenso recto intestino inseratur, & post semihoram rursus eximatur, postea iterum inseratur, donec dolor cessaverit.

Porro si inflammata vesicæ superveniat & urinæ omnimoda suppressio, quod non caret periculo, tum cathetere urina est elicienda, & ejusmodi remediis, quæ suppressioni urinæ sunt dicata, exceptis tamen inflammationem augmentibus. Reliqua remedium genera ex curatione inflammationis renū & epatis huc transferri & accommodari possunt.

3. *Ardor urinæ quid, quæ ejus causâ, quæ signa, & quomodo extinguendus?*

Keisios & ὄρεν est, ubi inter emingendum in cervice vesicæ & in meatu virgæ ardor & punctilis cruciatus perferentiscitur, qui mortuos vesicæ, ut inflammationem, exulceratio-

Liquor per cathetere infundendus.

Catapla. s. ma anody. non.

Non omnino tutum est hoc remedium, nam facili stuporem & apoplexiam inducere potest.

Ol. h. & saccharum ex eo confectum optimè dolorem sedat.

Ardor urinæ quid.

tio-

Causa.

tionem & calculum ut plurimum sequitur.

Causæ ætiusæ: ardoris urinæ sunt humores acres & acidi; veluti est bilis tenuis, & falsa acidaque pituita urinæ mixta ex renibus in vesicam profluens, aut sanies ex ulcere renum, aut corruptum semen ex testibus in virgam defluens.

Ætiusæ sunt eduliorum calidorum acriumque crebrior & intempestivus usus, immoderata intempestivaque Venus, potissimum ubi mulierculæ mensibus laborant: item semen muliebre corruptum venenatum acre serofumque glandi virili in actu Venereo adhærens, quale est mulieribus Gallica lue infectis. *Qua causa in curatione diligenter sunt distinguenda.*

Signa.

Signa ardoris ex relatu ægri manifesta sunt, causas vero indicantia sunt; dolor circa Renes ac lumbos, ex renibus malum oriri: calculi excreti, gonorrhea, & sanies per virgam prodiens sine lumborum dolore, in vesica testiculis vel parastatis mali causam esse ostendunt.

Prognostica.

Prognostica: Ardorem urinæ ex commercio impuratum mulierum contractum, ut plurimum Gallicus morbus subsequitur. Ardor urinæ nisi tempestivè restinguatur, brevi cervicem vesicæ & virgam exulcerat.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate varianda erit. In omnibus autem causis ardorum id conandum, ut cum alimentis tum medicamentis calidam intemperiem mitigemus.

Diaeta.

Primum itaque in victus ratione vitet æger omnia falsa, acrida, diuretica & calefacientia, utaturque alimentis refrigerantibus ut cremore ptisanæ, hordeo excorticato in jussculo carniū, prunis Ungaricis, ovis sorbilibus, herbis acetariis ut lactuca, portulaca & stolonibus Asparagi. Deinde si ardor urinæ ab acrimonia aut biliosorum aut serosorum humorum sit ortus, & dolor in pene excitatur, tum omnium primum alvus subducenda erit hujusmodi clystere.

Enema.

℞. Fol. mal. alth. Mercur. violæ. an. M. i. Concisa coquantur in q. s. aq. ad tertias, colentur, colati juris acci-

pe ℥b. i. cui admisc. diacathol. hier. simpl. ℥ i. s. ol. violar. chamæm. an. ℥ i. falis ℥ i. fiat Enema, quod tepidum applicetur.

Post subductam & exoneratam alvum, si corpus sit plethoricum aut temperatura calidum, vena Basilica sive epatica dextri humeri incidatur, ac subsequenti deinde die biliosior & serosior pars sanguinis sequentibus remediis evacuetur.

℞. Rhab. el. ℥ i. fol. senæ ℥ ii. sem. anisi ℥ i. Contusa macerentur in aq. lactucæ ℥ v. per noctem, mane ebulliant, & expressa colentur, colato jussculo admisceantur diacathol. Diaphæ. an. ℥ ii. fiat haustus, qui tepidus 6. horis ante prandium ebibatur. Aut devorandæ offerantur ℥ x. cass. recent. extract. aut ℥ iii. syr. rosar. solut. in haustulo aq. cichor. resolv. tepidæ ebibantur. Aut

℞. Cort. sambuci interioris M. i. Flor. Decollur. centaur. mi. p. i. confer. Rosar. Fuma. Nymph. an. ℥ s. Rhab. ℥ ii. Concisa contusaque in duplici vase cum ℥b. i. i. feri lactis caprini per 2. horas concoquantur, & refrigerata colentur, colati juris ebibat æger mane ac vespere ℥ v. i.

His ita peractis alteretur calida intemperies epatis ac renum sequenti potione sive lacte sem. quod & ardorem urinæ extinguit.

℞. iiii. Sem. frig. maj. an. ℥ s. sem. papav. albi, portulacæ an. ℥ vi. contundantur tenuissimè, eisque admisc. confer. rosar. nymph. an. ℥ i. sacca. candi ℥ vi. aq. lactucæ, endiviæ, cichor. an. ℥b. i. diligenter subacta & commixta in mortario, exprimantur & percolentur, fiat lactea potio. Aut

℞. Sem. melo. excorticati ℥ s. cucum. cucurb. citrul. portulacæ, papav. albi an. ℥ ii. Tragacanti ℥ i. s. Gummi arab. ℥ s. sem. maj. concidantur minutissimè, reliqua omnia pulverentur exactissimè, eisque admisceatur sacca. cand. violar. pulverati ℥ i. fiat pulvis: cujus ℥ ii. mane ac vespere in aq. hordei aut plantag. ebibantur.

E e e 2 Aut

*Trochisci
Alkakengi.*

Aut exhibeatur mane ac vesperi 3 i. Trochif. Alkak. in pulverem redactorum, qui sine opio sunt confecti. Quamquam si necessitas exigat, & cum opio confecti bis in septimana cum aq. lactucæ aut portulac. exhiberi possunt.

Topica.

Quod si vero dolor etiam post mictionem in virga perseveret, hæc Topica applicari possunt.

*Liquor per
catheterem
injiciendus.*

℥. Mucag. psylli cum aq. rosar. in qua camphora est macerata confectæ 3 ii. lactis muliebris 3 i. ol. rosar. 3 i. s. Quæ commisceantur & per siphonem in meatum virgæ impellantur. Foris autem virgæ sequens epithema duplicatis linteolis exceptum circumponi debet.

*Epithema
ta pro vir-
ga.*

℥. Mucag. ex sem. cyto. & psylli cum q. s. aq. rosar. & plantag. confectæ, in qua madesiant, ut dictum est, linteoli & imponantur. Aut ovorum albumina cum aq. rosar. conquassata simili modo imponi possunt. ¶ Ardori autem urinæ, qui ex calculo aut inflammatione renum Vesicæque originem habet, quæ remedia conveniant, suis in locis commemorabuntur, similiter & ex Venerea contagione excitato ardori, in quo morbus Gallicus est metuendus, quibus præfidiis sit succurrendum, & ejus symptomatibus auxiliandum, in curatione morbi Gallici, & symptomatum ejus, quæ paulo post inter cutis affectiones describentur, petenda erunt.

4. Exulceratio & scabies vesicæ quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

*Exulceratio
vesicæ
quid.*

Ἐλκωσις τῆς κύστιος καὶ ψάρα, vesicæ exulceratio & scabies. Exulceratio est continui solutio, scabies vero est pustularum species, utraque autem affectio cum ex iisdem causis ortum habeant & iisdem remediis curantur, earum tractationem hoc loco conjungendam esse duximus. In membraneo corpore vesicæ rarissimè accidit exulceratio

*Quæ pars
exulceretur.*

aut scabies, frequentissimè autem in muscosa ejus cervice.

Causæ ἀσθυναίαν exulcerantes aut scabiosam reddentes vesicam sunt humores acres & erodentes, ut biliosi aut falsi & pituitosi, lorio in vesica collecto permixti, aut calculi asperitas in vesica generati, aut tuberculum abscessusque in cervice exortus: ἀσθυναίαν est cantharidum assumptio, quæ vesicæ cervicem etodit reliquis partibus illæsis.

Signa scabiosæ vesicæ Hippo. 4. Aph. 77. Signa hisce verbis complexus est. Quibus cum u-

rina crassa fursurea quædam excrementa simul prodeunt, his vesicæ scabie laborat. Exulcerationem autem vesicæ his notis deprehendendam docet 4 Aphor. 8. i. si quis sanguinem aut pus aut squamulas minxerit, & adsit gravis odor urinæ, vesicæ exulcerationem significat. Præter hæc signa & sequentia comparent, vehemens dolor circa pubem & infimum ventrem, difficultas urinæ, pus in fundo urinæ residens, cum dolore imi ventris, semper ulcus, fursures autem aut squamulæ, semper scabiem vesicæ significant.

Porro cum & ex ulcere virgæ sanguis & pus profluat, utrum virga aut vesicæ cervix sit affecta, hisce signis discernuntur. Ex ulcere vesicæ pus cum urina emingitur, & cum cruciatu infimi ventris continuo; ex ulcere vero penis pus ante urinam profluit, & inter meijendum in virgæ cavitate cruciatus sentitur. Præterea vesicæ exulcerationi ut plurimum adsunt febricula, vigiliæ, continui dolores, adeo ut æger vix se erigere queat. Notandum & hoc: Ulcere existente in capacitate vesicæ in fibris venosis, ramenta & mucosa una cum urina projiciuntur, & dolor continuus per totum infimum ventrem persentiscitur. Si vero ulcus est in cervice vesicæ, dolor circa pubem non perpetuus, sed tempore tantum excretionis urinæ percipitur.

Prognostica Signa: Ulcus in capacitate vesicæ oboriens, propter membranosa ejus substantiam, raro aut difficilissimè curari potest. Facile autem quod in ejus cervice hæret ulcus ex asperitate calculi in vesica exci-

Causa.

Signa scabiei.

Signa exulcerationis.

An virga an vesica sit exulcerata ut discernendum.

excitatum potest curari, sed non nisi calculo prius sublato: calculi vero propulsio, propter ulcus, periculosissima est.

Curatio.

Curatio exulceratæ vesicæ consistit in victus ratione & remedium usurpatione. Verum ut in aliis plurimis morbis, curatio ipsius morbi paulisper intermitteri, & ad symptomatum mitigationem omnium primum animus converti debet: Ita in exulcerationis Vesicæ Curatione primum symptota, deinde morbus est tollendus. Tria vero sæva symptomata aut præcedere aut comitari consueverunt vesicæ exulcerationem, calculus, vesicæ inflammatio, & cruciatus sive dolor immensus. Calculus autem quæ ratione sit evellendus vel repellendus, paulo post dicturi sumus. Quæ autem ratione inflammatio sit mitiganda, paulo ante dictum est. Cruciatu vero ut sit mitigandus nunc ostendam.

Symptomata 3. primum curanda.

Dolorem sedantia.

Initio itaque in acerbatione doloris (sunt enim exacerbationes per periodos in ulcere vesicæ) statim dolor mitigandus est remediis Topicis, quæ foris infuso ventri sive pectini imponi debent, in quem usum plurimum conducit sequens cataplasma.

℥. Ol. rosar. myrtil. Cythos. an. ʒ s. Album. ovorum n. iij.

Probe simul conquassentur, eisque admisc. pul. tenuiss. hordei & cadmiæ an. p. æ. & q. ad incorporationem sufficiens, ut videlicet pultis crassitiem consequatur, fiat cataplasma, quod duplicatis linteolis exceptum tepidum pectini imponatur. Aut applicetur sequens epithema.

Epithema.

℥. Sem. cyton. psyllii, Alt. Malv. lini an. ʒ i. Contusa parum macerentur per 3. horas in aquis plantag. rosar. an. lb. s. cucus mucago percoleatur, & duplicatis linteolis excepta instar epithematis applicetur: Præstat simili ratione, si externis remediis dolor non cessaverit, sequentem liquorem per siphonem seu catheterem argenteum meatui virgæ immisum in capacitatem vesicæ impellere.

Liquor per catheterem inficiendus.

℥. Lactis caprilli ʒ s. Candidum ovi unius, mucaginis psyllii cum aq. Rosar. factæ ʒ iij. Commisceantur, fiat liquor.

Mitigatis cruciatibus tandem ulcus curandum est per victus rationem & medicamenta. In victus ratione nihil salubrius est ad ulcus vesicæ per sanandum quam crebrior potatio lactis caprilli, si modo absit febris.

Admiscendum autem est lacti parum mellis rosacei, & nonnihil rad. glycyrr. Profunt & pruna Ungarica dulcia, item pulmenta ex amylo & lacte caprillo confecta: præsana cum hordeacea, tum avenac. Item pisces fluviatiles squamari. Vinum aut acetum, omniaque acria & impensè calida fugienda sunt. Potus sit aqua hordei, aut si absit inflammatio, hydromeli.

Quantum ad medicamentorum rationem attinet, primum considerandum est ex quo humore lotio admixto, exulceratio sit orta, ex salisane pituita, aut retorrida bile. Et salsa quidem pituita evacuabitur sequenti haustulo.

℥. Seri lactis caprini ʒ v. in quo mace-
renter per noctem Agarici, fol. senæ phlegma-
an. ʒ i. s. Mane leniter ebulliant, & colatoque
ac colentur, colatoque jussculo admisc.
diaphæ. ʒ v. fiat haustus, qui tepidus
sex horis ante prandium ebibatur.
Bilis vero sequenti haustulo subducatur.

℥. Rhab. El. ʒ i. s. Fol. senæ ʒ i. con-
tusa parum macerentur per noctem
in aq. ciccho. ʒ v. manè leniter ebul-
liant, & colato jussculo admisceantur
El. lenit. El. rosar. mel. an. ʒ i. s. fiat
haustulus.

Expurgato vitioso humore remedia omnia cum assumenda tum foris applicanda debent esse talia, quæ vesicæ asperitatem leniant, sordesque abstergant & eluant ac simul ulcus conglutinent. Hæc omnia autem præstant sequentia pharmaca.

Conficiatur lac ex iiii. sem. maj. an. ʒ s. admixtis duabus lb. aq. è malvis destillatæ, in quib. prius fuit incocta ʒ s. rad. glycyrr. fiat potio, de qua crebrius assumat æger ʒ v. Aut

℥. Rad. simph. maj. ʒ i. Hippuris sive caudæ equinæ M. i. Ceterach. capill. Vener. Betho. an. M. s. Rosar. p. i. Rad. chinæ ʒ i. Contusa ac concisa coquantur in duplici

Ecc 3 vase

Vlcera cu-
ratio.

Diatæ.

Medica-
menta.

Hauſtus
phlegma-
gogus.

Hauſtus
cholagogus.

Lenientia
& consoli-
dantia.

Emulſio.

Decoctum.

vase cum feri lactis aut hydromel. lb. v. per 2. horas, quibus per se refrigeratis, colentur, fiat potio, cujus mane ac vespere 3 v. hauriat. Aut

Pulvis.

℥. Cineris priapi Taurini 3 ii. Vermium terrestrium siccatorum 3 i. Trochisc. de Alka. 3 i. s. Gummi cerasorum, Amyli an. 3 iiii. Pulverentur tenuissimè, cujus 3 i. mane ac vespere cum aq. stillat. Bethon. assumatur. Commodissimè quoque uti poterit æger balneo aquæ tepidæ in qua incocta sunt rad. Alth. Betho. Malv. viola. pariet. & stramina fabacea.

Insepus.

Per catheterem immittenda in vesicam.

Intra vesicam autem impelli debent singulis diebus bis per siphonem virgæ insertum liquores abstergentes & conglutinant, qualis est lac caprillum recens multum cum pauxillo melle rosa. mixtum, hydromel tepidum, ovi candidum cum pauxillo aq. rosa. conqussatum & rursus in aq. resolutum, iisque liquoribus, pro ulceris qualitate, admisceri possunt commodè pulveres pompholygis, plumbi usti, amyli, cerussæ, sarcocollæ & thuris, quæ omnia pro arbitrio sumi possunt; sed providendum ut omnia sint tenuissimè pulverata, & liquoribus probè commixta.

Enema a-nodyn.

Quin etiam tempore exacerbationis, ut dolor mitigetur, commodè Enema in rectum intestinum, cui vesicæ incumbit, infundi potest ex cremore hordei aut mucag. sem. lini & papa. cum lacte caprillo, dilutis, paucio viola. oleo admixto: infundatur autem tepidum.

Remedia exulc. ex cantharidibus.

Si vero vesica est exulcerata ex assumptis cantharidib. aut aliis venenatis potionibus, quam exulcerationem ut plurimum sanguinismissio consequitur, præstat quotidie bis assumere 3 i. pul. terræ Lemniæ, aut boli Armeni Veri, cum lacte caprillo. Aut bibere ol. amygd. dul. & lac ex amygd. confectum. Præter hæc omnia ea remedia conveniunt quæ supra in Renum exulceratione sunt commemorata.

Scabiei remedia quæ.

Scabies vesicæ cum sit exulcerationis initium, simili modo, & iisdem remediis, quibus ulcera vesicæ, curabitur.

8. *Urina difficilis excretio quid, quæ causa, quæ signa, & quibus præstidius curanda?*

Dysuria
debilitata, laboriosè diuturniorque conatu, quandoque cum dolore hypogastrii, & nonnunquam nonnisi cum comprehensione hypogastrii, urinam propellere potest.

Causa.
Causæ *αὐτογενεῖς* urinæ difficultatis, est expulsivæ facultatis in vesica debilitas, quæ propriè oritur à refrigeratione frigidaque intemperie vesicæ; sive id contingat à nuda qualitate, sive à constitutione corporis pituitosa, crassam pituitam in vesicam demittente. Reliquæ autem causæ internæ per accedens inferunt urinæ difficultatem, veluti sunt inflammatio vesicæ, exulceratio vesicæ, & calculus vesicæ.

Προγενετικαὶ causæ sunt diuturnior ob pudorem urinæ retentio, item intumescencia vesicæ ex casu, plagis aut convulseratione, venenatæ potiones, veterisque casei crebrior usus & similes.

Signa.
Signa ex ægri querela cognosci possunt. Urinæ difficultas cum dolore, signum est eam oriri aut ex inflammatione aut ab exulceratione vesicæ; frigiditas & pituita vesicæ impacta ubi difficultatem urinæ excitant, tum urina alba & crassa excernitur: puris quoque excretio in urinæ difficultate signum est exulcerationis colli vesicæ.

Prognostica.
Prognostica sunt: In ardentiss. febribus difficultas urinæ superveniens, periculosum est signum. Dolo carens urinæ difficultas, minus est periculosa. In senibus urinæ difficultas frigidam intemperiem vesicæ ostendit, & non caret periculo.

Curatio.
Curatio *Δυσουρίας* perfici debet victus ratione, & remediorum adhibitione. Verum ubi urinæ difficultas vel ex inflammatione vel exulceratione vesicæ oboritur, earum causarum curatio ex præcedentibus petenda erit. Similiter si ex calculo vesicæ generetur, ejus medicationem in sequenti tractatione dicturi sumus. Hoc autem loco curationem *De qua dysuria hic agatur.* duntaxat trademus ejus urinæ difficultatis, quæ

quæ originem trahit aut ex frigida temperie, aut frigidis lentisque humoribus vesicæ impactis: qua in curatione victus ratio temperata esse debet, cibisque utendum paucis & purum sanguinem generantibus moderateque calidis, ut sunt carnes hædorum, pullorum gallinaceorum, vitulorum, perdicum, & passerum: Item pruna Ungarica, ova forbilia, juscula ex vino & cerevisia, & juscula carnum bovillarum, quæ omnia condiri possunt rebus aromaticis diureticis, ut sunt rad. petrosel. pastin. Cariotæ, pimpin. & ex seminibus, semen Anisi, carvi, cymini & fænic. ex aromaticis autem cinamom. crocus, macis, galanga & Zinziber. In potu conveniunt Vinum Rhenanum, aromatite & hydromeli probè percoctum.

*Diatæ.
Cibus.*

Condimentæ.

Potus.

Inseffus.

Ante balneum assumenda.

Linimentum.

Enema.

Statim itaque in initio difficultatis urinæ collocetur æger in folio aq. calidæ, in qua incoctæ sunt sequentes herbæ puleg. sampsuc. organ. calamint. chamæm. parietar. malv. aristarum avenac. & straminum fabarum an. pro libitu. Ante vero ingressum balnei exhibeatur ægro 3 i. s. The. Andro. cum haustulo vini Rhenan. dissolut. aut haustul. vini tepidi in quo coctum est scordium aut rad. Ononidis. Aut præbeantur binæ ternæque rotulæ Diagalangæ aut Dia anisi. Post balneum ad ignem luculentum inungetur pecten sive vesicæ regio sequentibus oleis.

℥. Ol. rutæ, nardin. de castor. an. 3 ii. quibus admisce 3 i. aq. stillat. Juniperi.

Post hæc si & dolor & difficultas urinæ non leniantur, sed perseverent, recto intestino sequens clystere injiciatur.

℥. Flor. chamæm. Aneth. centaur. min. puleg. parietar. origa. an. M. s. Ficum n. v. Furfur. filig. M. i. sem. carvi, Bac. lauri an. 3 i. Concidentis concisis & contundendis contusis coquantur in q. s. aq. ad tertias, colati juris ℥b. i. admisc. hieræ simpl. Benedictæ laxativ. an. 3 s. mellis rosati 3 ii. Ol. rutæ, scorpionum an.

3 i. s. salis 3 i. fiat Enema, quod tepidum applicetur.

Porro si corpus patientis existat pituitosum in *Δυσουρία*, indeque in vesicam viscida pituita confluat, ejus meatum obstruens urinæque projectionem impediens, tum convenit ut primum pituita lenta concoquatur & extenuetur per pauculos dies sequenti potione.

℥. Rad. Fænic. petrosel. ononidis an. 3 s. dauci cretici 3 ii. Herb. puleg. Meliss. parietar. an. M. s. sem. Anisi, ligustici an. 3 iii. Contusa coquantur in duplici vase cum hydromel. ℥b. ii. ad duas horas, quæ postquam per se refrigerata sunt exprimantur ac colentur, colato juri admisc. syr. de Bethon. Oxytel. scil. simpl. ex v. rad. an. 3 iii. fiat potio, ex qua quotidie in aurora ebibat æger 3 v. tepefactas, & totidem 3. vesperti.

Exhausta potione purgetur pituita sequ. haustulo.

℥. Diaphæn. 3 i. Troch. ex Agar. 3 ii. Aq. Fænic. 3 v. fiat haustus, qui tepidus sex horis ante prandium ebibatur. Aut purgetur sequentibus pilulis.

℥. Mass. pill. Aggre. foetidarum, Agar. Troch. an. 3 i. Diagrid. gr. iii. cum q. s. mellis rosar. formentur pill. n. xv. quæ sex horis ante prandium deglutiantur cum pauxillo cerevisiæ tepidæ.

Post pituitæ evacuationem tutius fortiora diuretica, & urinæ propulsioni dicata remedia exhiberi possunt, qualia sunt hæc sequentia, quæ in præscripto balneo ex herbis facto exhibenda sunt.

℥. Aq. Junip. 3 i v. & ebibatur. Aut ℥. Ol. vitriol. probè correcti gutt. 9. Vini Rhenan. 3 iii. misceantur & ebibantur. Aut

℥. Testarum ovorum ex quibus pulli sunt exclusi ab interna membrana purgatarum, sem. urticæ Roman. succini albiss. an. 3 i. pulverentur tenuissi-

In pituitosa constitutione.

Digestiva potio.

Haustus purgans.

Pillula.

Diuretica quando exhibenda.

Pulvis.

nissime & commisceantur, & cum haustulo vini aut cum pauca aqua Juniperi ebibantur. Aut

Tereb. septies elotæ in aq. Junip. 3 ii. Ol. vitriol. corr. gut. v. commixta resolvantur ad ignem in haust. vini Rhenani, & in folio ebibantur.

Meatus urinatorius ut aperietur.

Ubi vero lenta pituita meatui vesicæ aut virgæ tenacius inhaerit, urinæque fluorem impediverit, consultum est ut cathetere instrumento ex ære aut argento facto per virgæ meatum in vesicam immisso, aut cerea candela calami crassitiem æquante in meatum virgæ missa, pituita removeatur, & meatus aperiantur. Postea parum decocti glycyrr. repidum per siphonem in vesicam impellatur.

Quantum ad Topica attinet, præter balneâ & inunctionem cum præscriptis oleis, sequens cataplasma pectini seu hypogastrio & regioni vesicæ commodè imponi potest.

Cataplasma urinam provocans.

℞. Rad. Alth. pastinac. sylv. Dauci sylv. Fænic. petrosel. an. 3 s. Herb. Bethon. Origan. Major. Meliloti an. M.s. sem. lini. Fænu-græci an. 3 i. Hæc si viridia haberi possunt, contundantur tantum. Si vero aridiora sunt, pulverentur & concoquantur cum q. s. aq. ad pultis formam, quibus admisc. Ol. scorp. Anethi, chamæm. an. 3 ii. fiat cataplas. cujus aliqua pars & q. s. per duplicatum linteum extendatur & calidum sing. diebus bis regioni vesicæ imponatur. Reliqua remedium genera pro causarum varietate suis ex locis huc transferenda sunt.

6. *Urinæ guttatim exstillatio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Stranguria quid.

Stranguria, urinæ stillicidium est, ubi quis parum & frequenter guttatimque cum acerbis mordicatione meatuum urinatoriorum emingit.

Causa.

Causæ *αἰσχυρῆς* *σπασμῆς* sunt humores acres, veluti sunt salsa pituita & tor-

rida bilis, urinæ admixti, facultatem expulsi-
væ vesicæ subinde irritantes, retentricem
verò debilitantes, viasque urinæ in collo ve-
sicæ constringentes, & vesicæ justo frigidior
intemperies, sabulosaque urina.

Προγνῶσκειν causæ sunt vini cerevisiæ-
que feculentæ & in fundo residens potatio,
crudorum alimentorum, leguminumque
& recens pisti adhucque tepentis panis, &
veteris calei esitatio, præsertim si vinum su-
perbibatur.

Signa *σπασμῆς* manifesta sunt. Gut-
tatim enim & cum acri cruciatu cum in col-
lo vesicæ tum in pudendi apice extillat urina.
Qualis vero sit acris humor urinæ admixtus,
ita dignoscitur: rubedo urinæ biliosi humo-
ris, albedo salis pituitæ, purulentia puris
admixti, arenosa urina calculi sunt signa.
Præterea & ex colore constitutioneque cor-
poris, humores vitiosi facile dignosci pos-
sunt.

Prognosticon: Stranguria in senibus pe-
riculosa est, difficilime enim curatur, & ca.
ut plurimum commoriuntur. *Quibus ex
stranguria volvulus succedit, intra diem 7.
moriuntur, nisi febre accedente copiosa urina
profluat: Aphor. 44. l. 4.*

Curatio pro causarum diversitate varian-
da est. Perfici autem debet curatio victus
ratione, & nonnunquam venæ sectione, &
medicamentorum convenientium usurpa-
tione.

Si itaque Stranguria ob vesicæ intempe-
riem frigidam aut ob pituitosorum crasso-
rumque humorum copiam in vesica colle-
ctam, sit excitata, id quod urinæ albedo
& crassities faciliè ostendit, tum cibi atque
portiones ad caliditatem declinare debent.
In cibo itaque utatur æger jusculis ex vino
aut cerevisia cum luteis ovorum confectis,
& carnis pullorum vitulorum atque hæ-
dorum. Condiantur vero esculenta pipere,
cinamom. Zinzib. croco, & similibus aro-
mat. maxime vero radicibus petrosel. pastinacæ
& cariotæ. Potus patientis sit vinum
Rhenan. meracius, vinum aromaticum, quod
claretum vocant, & hydromeli, & in summa
in victus ratione omnia convenient, quæ
pau-

Signa.

*Prognosti-
ca.*

*Curatio
Strangu-
ria ex cau-
sa frigida.*

Dieta.

paulo ante in curatione *Δυσουρίας* commemorata sunt. Initio itaque stranguriæ ex pituita, dolor est mitigandus hisce sequentibus remediis. Frustulum Zinzib. per flammam torreatur & minutim concidatur & cum tantillo salis commisceatur, simulque devoretur. Pubi verò & pectini subinde calefacta pulvinaria imponantur. Aut conficiatur sacculus ex sequentibus herbis.

Sacculus. ℞. Parietar. Origani, saturejæ, puleg. Bethon. Rutæ & Majo. an. M. i. cymini contusi ꝯ i. simul mixta insuantur sacculo & in cerevisia ebulliat, exceptusque fortiter exprimatur & calidus imponatur. Postea tandem tota regio vesicæ inungatur ol. rutæ & scorp. simul mixtis. Ubi vero hæc non contulerint, consultum est, ut æger in solum aq. calidæ in qua coctæ sunt herbæ sequentes, chamæmelum, pariet. Orig. Bethon. Mentast. & stramina avenacea, ex quibus avena nondum est excussa, & per horam insidere permittatur. Antequam autem in tale lavacrum descendat, tria cochlearia aq. Juniperi aut 9. gutt. Ol. vitrioli probè correcti cum haustulo vini bibenda exhibeantur, aut 3 i. s. Ther. Andro. cum haustulo vini.

Mitigato dolore subducatur alvus fe-
quenti enemate.

Enema. 4. Flo. Absin. chamæm. Aneth. cent.
mi. Fol. Malv. Alth. an. M. i. Fur-
furis triticeæ M.s. coquantur in q.s.
aq. juris colati accipe ℥b. i. cui ad-
misce diaphæ. hier. simpl. bened.
laxat. an. $\frac{3}{4}$ s. Ol. rutæ, absinth. an.
 $\frac{3}{4}$ i. s. falis $\frac{3}{4}$ i. fiat clyster, qui tepi-
dus jejuno ventri. existente in re-
ctum intestinum infundatur. Vel
loco Enematis à pituitosis humo-
ribus universum corpus purgetur
3 x. diaphæ. in haustulo aq. rutæ
resolutis. Si vero pituita lenta in
collo vesicæ impacta fuerit viam-
que urinæ obstruxerit, vel candela
cerea, vel instrumento ex argento
facto per virgam immisso extraha-
tur pituita.

Curatio At vero si ab acrimonia biliosi excrementi

aur falsedine urinæ stranguria excitata sit, id *stranguria*
quod extillatæ urinæ rubedo ostender, & *ex causa*
corpus est plethoricum, statim vena epatica *calida.*
incidatur. In victu autem conveniunt lac ca- *Vena sa-*
prillum decoctum, lac amygdalarum cum aq- *Etio.*
stillar. haliacabi confectum, juscula gallina- *Vitæus rati-*
rum & pifces laxatiles, lactuca & portulaca *tio.*
in acetariis esitata. Potus sit aqua hordei in
qua cocta sit radix glycy. & sem. mal. Pe-
cten vero fomentetur sacculo ex foliis mal-
væ, alth. viola. consutò, & in aq. cocto atque
expresso, post forum inungi commodè potest
ol. violar. & amygdal. dulc. Mitigato dolore
sequens clystere in fundatur.

27. Malv. Alth. viola. an. M. i. Coquan- *Enema.*
tur in q. s. aquæ: colati juris accipe
℥b. i. cui admisc. cass. extr. ʒ ii. ol.
viola. ʒ iii. salis ʒ i. fiat Enema.
Aut biliosæ feces subducantur bolo *Cholagogæ*
devorato ex recen. evulsæ cass. ʒ x.
aut sequenti portione.

℞. Rhab. el. ʒ i. s. contusum maceretur
per noctem in aq. stillat. hālicacab. ʒ v.
Mane colato & expresso juscūlo admif.
ʒ ii. syr. rosa. sol. fiat potus, qui tepi-
dus ebibatur.

Ubi redierit cruciatus, commodissimè uti poterit lacte 4. sem. frigid. in hunc modum confecto.

24. 4. Sem. frigid. ma. an. 3 s. Aq. Cicho. *Emulsio.*
 lb. iij. sacca. candi 3 iij. simul probe
 agitatis lacteus liquor efficitur, qui
 coletur & exprimitur, vesperi ac ma-
 ne haustus ægrotanti offeratur. Pro-
 dest quoque in stranguria ex calidis
 excrementis orta, 3 i. pul. Trochif.
 Alkakenji.

Stranguriæ ex reliquis recitatis causis ortæ Vnde reli-
Curationes, ex suis locis peti debent, & qua reme-
omnia quidem remedium genera, quæ dia peten-
paulo ante in dysuriis curatione sunt com- da.
memorata, ad stillicidium quoque urinæ
commode referri & accommodari pos-
sunt.

7. *Vrina totalis suppressio sive omnimoda cohibitio quid; quæ ejus causæ, quæ signa, & quomodo curanda?*

Iſchuria eſt quando vel veſicæ expulſiva fa-
cultas quid.

cultas ita est prostrata, vel ubi vesicæ meatus ad virgam ita est obturatus, ut prorsus nulla, & ne gutta quidem urinæ profluere queat, sed in capacitate vesicæ collecta exundet, ex qua urina non tantum vesica, sed & totum hypogastrion in tumorem elevatur, & ruptionem vesicæ minatur.

Causæ internæ.

Causæ *αἰσθητικῆς ἰσχυρίας*, sicut habet definitio, sunt aut prostratio facultatis expultricis vesicæ, quæ ut plurimum ex refrigeratione fibrarum transversalium in vesica provenit, aut colli vesicæ meatusque urinæ obstructio, quæ contingit ut plurimum à calculo, à lentō & crasso humore, aut purulenta colluvie, aut sanguine concreto, aut à tuberculo apostemateque in collo vesicæ generato; sit & à *προϋπάρχουσιν* precedenti.

Causæ externæ.

Προκαταρκτητικαὶ sunt, refrigerata quidem vesicæ diuturna mora in frigida, diuturna ob pudorem urinæ cohibitio, quæ sanitatis studiosis in conviviis diligenter est cavenda. Retenta enim urina vesicam extendit, quæ quanto magis extenditur, tanto ejus meatus redditur angustior, & excitat *ἰσχυρίαν* aut lapsus ex præcipiti loco, violentusque ictus, aut percussio lumborum aut pubis, lædens nervos vesicæ insertos, spiritumque animale intercipiens. Obstructionis vero meatus *αἰσθητικῆς* causæ sunt, cibi crassi, ut pisa, panis recenter pistus & calens esitatus, cerevisia & vinum feculentum, & in fundo relictum, item potiones aut medicamenta violentius crassa excrementa ad vesicam propellentia.

Signa.

Signa causarum suppressæ urinæ sunt: si labefactata est expulsiua vis in vesica propter refrigeratam vesicam, tum si homo corpus incurvet, ut vesica comprimi queat manibus, per compressionem nonnihil urinæ profluit, quod est signum facultatis expultricis læsæ: si vero compressa tumefcente vesica nihil urinæ exprimi queat, obstructum esse meatum vesicæ arguit. Reliquæ vero causæ *αἰσθητικῆς* & *προκαταρκτητικῆς* ex totius corporis temperatura & symptomatum signis, suis in locis ostensis, & ex relatione ægroti & administratorum dignosci possunt. Prognosticum id observetur: *ἰσχυρία* ex violento ictu

Prognostica.

aut dislocatione vertebræ in lumbis orta, curam non recipit. Urinæ suppressio ex grumo seu concreto sanguine orta non sanatur, nisi grumi prius resolvantur. *In morbis acutis si urina supprimatur, plerumque est indicium lethale.*

Curatio.

Curatio pro causarum varietate disponi debet. Non multum autem *ἰσχυρίας* curatio differt à curatione *Δυσουρίας* & *σπασμῶδους*, ideo ex eorum symptomatum curatione & victus ratio & medicatio huc accommodari potest. Si itaque urina suppressa sit ob labefactatam vesicæ facultatem expultricem, in victu conveniunt alimenta & portiones calefacientes, veluti sunt carnes pullorum vitulorum, & jacula ex cerevisia aut vino cum luteis ovorum confecta. Condiri autem alimenta possunt aromat. cinamom. croco, Zinzib. radicibus petros. & pastinacæ. Potus vero sit vinum Rhena. hydrom. & cerevisia plena beneque lupulata.

Dietæ.

Post ordinatam victus rationem feces pituitosæ ac frigidæ ex intestinis seq. clystere eluantur.

℥℥. Pariet. Orig. flo. absinth. cent. mi. an. M. i. concisa coquantur in q. s. aq. ad med. quibus in fine coctionis imponatur nodulus ex *℥i.* pulp. colocynth. factus, qui semel atque iterum cum reliquis ebulliat, deinde colentur, colari juris accipe *℥ xiiii.* quib. admisce hieræ simp. *℥ ii.* ol. rutæ, absinth. an. *℥ i. s.* salis *℥ i.* fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Enema.

Quin & universalis purgatio fieri poterit pro corporis constitutione & temperamento, ut in pituitoso cum *℥ x.* diaphæ. in bilioso *℥ v.* El. rosar. Mes. in atrabiliario cum *℥ xii.* diacathol. in haustulo aq. stillat. vel petrosel. vel pariet. resolutis, & sex horis ante prandium exhibitis.

Evacuatio.

Purgato corpore collocetur æger in solium aq. calidæ plenum, in qua incoctæ sunt herbæ parietar. Orig. serpillum, calamamentum, berth. artemis. ruta, chamæm. aneth. malv. & alth. an. M. ii. & fasciculus straminis avenacæ ex quo avenæ grana non-

Infusus.

Diuretica
varia.

nondum sunt excussa; huic balneo infideat æger per horam unam, sed paulo ante infessum exhibeantur patienti aut gutt. 9. ol. vitriol. cum haustulo vini mixtæ, aut 4. cochlearia aq. stillat. ex baccis Junip. aut g. vi. ol. è succino albo cum haustulo vini mixti, aut 3 ii. Ther. Andro. cum haustulo aquæ petrosel. resolutæ, aut 3 i. pul. succini albi. Aut

Spir. ☉
aliquot
guttula
cum aq.
parietaria
exhibita
idem præ-
stant.

℥. Lumbricorum terrestrium n. v. qui in mortario contriti cum haustulo vini & fortiter expressi exhauriendi offerantur. Aut

℥. Carnis erinacei exiccata & in pul. redacta 3 ii. & cum haustulo hydro-mel. ebibatur. *Sal succini à gr. 6. ad 10. cum aq. ononidis exhib. mirabiliter pellit remoratum urinam.*

Vrina ex-
primenda.

Ubi autem è balneo est egressus & medi-camentorum vi nondum profluat urina, ipse parum reclinato corpore hypogastrium & vesicam fortiter comprimat, & urinam extorqueat. Tandem à balneo inungatur

Topica.

singulis diebus mane ac vesperi vesicæ regio & peritonæum sequentibus oleis.

Inunctio.

℥. Ol. hypericon. Rutæ, Anethi an. 3 s. Collini 3 ii. ex baccis Junip. 3 i. Misc. & calefiant, cujus momentum & in rectum intestinum immitti potest. Post inunctionem imponatur tumenti vesicæ vel Emplast. è Meliloto quod in myropolii prostat, aut sequens cataplasmata.

Cataplasma.

℥. Pul. fænugræci, lini an. 3 i. Major. Orig. scord. parietar. an. 3 iii. Flo. chamæm. Melilo. Anethi an. 3 ii. Rad. Aith. 3 iii. Coquantur in q. s. cerevisiæ ad pulvis formam, quibus admisceantur ol. hyper. scorpion, lini an. 3 s. singulis diebus bis hoc cataplasmata post inunctionem hypogastrii applicetur. Hæc præscripta pharmaca, si parum juvamenti attulerint, ad catheteris usum confugiendum erit. Est autem *per* fistula argentea crassiori culmo avenaceo paulo spissior, oblonga & nonnihil incurva, quæ ol. scorpion. inuncta per virgæ mea-

tum usque in vesicam intrudi potest, & ea ratione urinam obstruentes materię in cervicæ vesicæ collectæ removeri possunt. Potest & per meatum *Vesica in-
virgæ in ipsam vesicam per siphonem
ficienda.* impelli parum ol. rutæ & scorp. & succi Raphani, quibus parum lactis in quo castoreum est decoctum sit admixtum tepidum. Et hæc quidem in prostrata expulsiva virtute vesicæ ad urinæ provocationem sufficient.

Ubi vero crassi & lenti humores vesicæ *Remedia
cervicem obstruunt urinæque exitum cohi-
ad obstru-
bent, balnea, unguenta, cataplasmata & tionem
omnia jam commemorata remedia foris collis vesicæ.* commodè applicari possunt; sed intra corpus medicamenta adhibere prius non licebit, quam pituita per clyster. & per elect. *Purgantia.* Diaphæ. 3 x. cum haustulo aq. petrosel. expurgata fuerit. Alias enim assumpta urinam moventia remedia unâ cum urina & pituitosos humores in vesicam ad adherent & auferent obstructionem. Post expurgatam autem pituitam, ea omnia pharmaca urinam moventia, quæ paulo ante commemorata sunt, utiliter exhibere possumus, & in tali quoque casu magnus usus est & utilitas catheteris.

Diuretica
quando ex-
hibenda.

Porro si urina suppressa fuerit, aut ob *Tubercu-
tuberculum aut ob carunculam in cervicæ lum in col-
lo vesicæ
vesicæ, aut meatu virgæ obortam, id quod lo vesicæ us
non raro morbo Gallico contingere con-
removen-
suevit, & facile dignoscitur, si immissa can-
dela cerea aut catheter per virgæ meatum*

ad vesicam penetrare nequeat, aut cum acerbo cruciatu sanies sanguisque post extractum catheterem consequatur, tum talis curatio est instituenda. Primum utatur balneo in folio ex herbis emollientibus *Infessus.* confecto, veluti sunt malva, althæa, bethon. branca ursina, melilotum, flo. chamæm. anethi, sem. fænugræci & lini. Post balneum incipiatur per siphonem in vesicam ol. chamæm. & hyper. cum mucagine ex sem. lini facta. Mitigatis paxillum doloribus solida curatio perfici potest cum rad. chinæ & Zazararillæ, cujus usurpandi rationem in curatione morbi

Liquor in-
ficiendus.

Catheter
quid, &
quomodo
eo uten-
dum.

Gallici accuratius Deo juvante descripturi sumus.

Tubercula autem & carunculae in urinae meatu, sive in cervice vesicae sive in meatu virgae haereant, sequentibus remediis extirpanda veniunt. Emplastrum ab Amato Lusitano celebratum in extirpando tuberculo aut caruncula.

Emplastrum Amati Lusitani carunculas absumens.

℞. Ol. Rosa. ʒ ii. pul. tenuiss. Litharg. ʒ i. decoquantur simul ad ignem cum ferrea spatula subinde agitando donec crassam instar cere mollioris aut Emplastri duriciem consequantur, quibus deinde adhuc tepentibus admisceatur ʒ i. sequentis pulvisculi.

℞. Æruginis sive viridis aeris, auripigment. Vit. alum. an. ʒ s. aceto rosac. conspersa per lapidem marmoreum, quali pictores utuntur, tenuissimè per 2. horas terantur, & postea exiccantur, quæ conspersio & contritio hujus pulv. octies per octiduum reiteretur. Ita enim medicina omnem amittit acrimoniam, & exulcerandi vim; Hujus pulveris ʒ i. in præscriptum Emplastrum adhuc tepens probe commisceatur.

Quod quidem Emplastrum est nobilissimum ad omnia duriosa tubercula & luxuriantes in ulceribus & vulneribus carnes extirpandas non tantum in vesica & virga, sed in quovis corporis loco, & tollit polypum in naribus, abstergit sordes in ulceribus & exsiccat, quo emplastro in carunculis & nodulis vel in cervice vesicae vel in virga haerentibus ita utendum erit. Candelæ cereæ culmo crassiori majores aliquot præparentur, quarum apici nonnihil præscripti Empl. apponantur & agglutinentur, ne decidere possit, aut plumbeæ virgulæ parentur earumque apici emplastrum agglutinetur, quarum sing. diebus duæ inferantur, ita ut attingant locum affectum, quæ brevi tempore nodulos carunculasque absumunt & extirpant.

Obstructio a pure & grumo ut curanda.

Si vero meatus urinarius à purulenta colluvie aut sanguinis grumis sit obstructus, & urina suppressa, tum præscriptis balneis

est utendum, & cathetere argenteo, & patienti bibendum exhibeatur decoctum Arthemisiae in vino, aut coagulum leporis, aut hædi ad ʒ i. cum haustu aceti resolutum. Conveniunt in his obstructionibus, pul. succini albi, aut cineris cancrorum singulatim aut simul commixti, additoq; gummate ceraforum ʒ i. Per virgam verò glans ex melle & sale confecta, instar culmi atrundinacei usque ad vesicam inferi potest, quæ unam citissimè provocat.

Ubi verò ex ulcere cervicis vesicae vel virgae suppressa erit urina, ejus curationem paulo post, in curatione exulcerationis virgae traditur sumus. Similiter si ex calculi adhaesione in urinae meatu cohibeatur mixtio, ejus quoque curationem paulo post trademus.

8. *Urina incontinentia sive involuntaria effluxio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis curanda?*

Ἀνεστὸς ἢ ἐκκροσις ἢ ἄρα, urinae incontinentia est, ubi vesica urinam retinere pro voluntatis nostræ arbitrio nequit, sed præter voluntatem effluere finit, quo malo laborantes Græci ἐνυπνίας vocant.

Causæ αἰσθητικαὶ sunt, resolutio musculi in cervice vesicae constituti, aut obliquoarum fibrarum in eo musculo imbecillitas. Musculi enim voluntariis motibus obtemperant, fibræ vero motibus naturæ serviunt. Fit verò talis resolutio musculi in cervice vesicae, ubi nervi huic musculo implantati aut refrigerantur aut læduntur, ita ut spiritum animale intercipient, quod contingit ubi obstruuntur frigidis humoribus aut imbuuntur intemperie frigida. Πρὸς τὴν αἰσθητικὴν sunt lapsus vel ictus violentus, vertebrae lumborum & ossis sacri, ex quibus nervi vesicae prodeunt, aut luxatio, aut vehemens refrigeratio ex diuturna mora in aq. frigida, item vulnus cervicis vesicae, & copiosior potatio liquorum penetrantium, mordicantium & inebriantium. Item in feminis difficilis & laboriosus partus, unde vicina partes urinariae dilacerantur.

Signa involuntariæ diurnæ, aut nocturnæ, nã mi-

Suppressionis ex aliis causis curatio unde petenda.

Urina incontinentia quid.

Causa.

Sphincter vesicae ut resolvatur.

Externa causa.

næ mictionis in lectum manifesta sunt. Causarum vero signa ex relatione ægri deprehendi possunt.

Prognostica. Prognostica sunt: Pueri ut plurimum frequentius quam adulti hoc malo laborare solent. Involuntarius urinæ fluor à causis *αεσυνυμδρως* ortus, potissimum autem à refrigeratione, citius curatur quam qui à causis *αεσυνυμδρως* sit ortus. Urinæ præter voluntatem effluxio à vertebrarum luxatione, aut vulnere cervicis vesicæ proveniens, periculosa & incurabilis est.

Curatio incontinencia ex refrigeratione spinæ vesicæ. Curatio instituenda est pro causarum diversitate. Si itaque musculus cervicis est refrigeratus aut humoribus frigidis imbutus, ejusque nervi sunt resoluti ut urinam retinere nequeat, tum victus ratio calefaciens est præscribenda. In cibo itaque conveniunt carnes pullorum perdicum, vitulorum & hædorum, quæ condiri possunt aromar. calidis, ut Zinzib. cinam. croco & foliis major. salvie & saturejæ. Assa autem quam elixa magis conveniunt. Potus esto vinum rub. aut hydrom. & cerevisia plena. Cavendum quoque ne alvus sit obstructa. Id si contingat, clysteribus calefacientibus utendum erit ex herbis sequentibus confectis; Betho. Salv. origa. Iva Artherica, Rorism. Arthem. & similibus, quarum decocti juris accipiat *℞. i.* Ol. Rutæ *℞. iiii.* Hieræ simpl. *℞. ii.* salis *℞. i.* Quibus simul commixtus fiat Enema quod tepidum recto intestino infundatur: & si corpus sit pituitosum, purgetur *℞. x.* diaphæ. in haustulo aq. Fæni. resolutis.

Topica. Foris vero Topica remedia adhibeantur cervici vesicæ, & lumborum vertebris, & primum quidem loca prædicta quotidie bis inungantur sequenti linimento.

℞. Ol. rutæ, coſtini an. *℞. ii.* de casto. *℞. i.* Lavand. *℞. s.* ceræ q. s. eluatur cum aq. Junip. fiat linimentum. Post inunctionem imponatur vertebris lumborum Emplastrum oxycroceum, quod in Myropoliis proſtat, per alutam extenſum. Præterea in resolutione cervicis vesicæ urinam retinere nequintus, omnia ea remedio-

rum genera plurimum conferunt, quæ supra in curatione *παραλυσως* commemorata sunt. Maxime autem confert, si quotidie patienti ituro cubitum *℞. i.* seq. pul. cum vino, in quo decoctæ sunt rad. Enulæ, exhibeatur.

℞. Calaminth. Myrrhæ, castor an. *℞. iiii.* Glandium *℞. v.* pulverentur subtilissimè.

Porro si non ex refrigeratione vesicæ, sed aliis ex causis urinam potissimum inter dormiendum inſciis profluat, lectusque permingatur, tum sequentes pulvisculi cum rub. vino exhibiti maxime auxiliantur.

℞. Glandium *℞. ii.* Thuris *℞. iiii.* sem. coriand. præpar. & torrefacti, Gummi Arab. lapidis Armeni an. *℞. ii.* Conterantur in tenuiss. pulverem, ex quo *℞. i.* ituro cubitum cum vino rub. exhibeatur.

Specificæ autem virtute in lectum mingentibus conferunt seq. pharmaca, si eorum *℞. i.* cum vino rub. potanda præbeatur: ut *℞. i.* pulmo. hædi toſti, & in pul. redacti: aut *℞. i.* cerebelli leporis exiccati & in pul. redacti: aut *℞. i.* testiculorum leporis excicatorum & in pul. redact. aut *℞. i.* cineris exciscarum porcinarum aut ovillarum: aut *℞. i.* terræ sigillatæ cum haustulo aq. parietæ. exhibita.

9. Calculus vesicæ quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?

Λιθιασμός τῆς κύστεως, lapidatio seu calculus vesicæ. Ut in Renibus, ita & in vesica ex colluvie humorum lentorum cum urina in vesicam delatorum, calculus generatur & coalescit.

Causæ *αεσυνυμδρως* calculorum vesicæ sunt, Materialis quidem, lentorum humorum ex Renibus aut arenularum in vesicam confluxus & colluvies. Efficiens est calor vesicæ aut potius calor intensior urinæ. Προκαταρκτικαὶ causæ sunt cibi ac potiones crassum ac lentum sanguinem in nutritione generantes, ut sunt crebrior usus casei, piscium, anguillarum & similibus esculentorum. Item crebra potatio crassioris ac feculentioris cerevisiæ & vini & calculosa parentum natura. Est enim calculus ex his affectionibus.

Pulvis egregius ad resolutionem spinæ nocturnæ permittitur remedia.

Experimenta.

Essentia croci & cum aq. plantæ gini Chymici hic exhibent.

Calculus vesicæ.

Causa.

nibus, quæ hæreditariæ nominantur, & à parentibus in liberos transplantantur.

Signa.

Signa calculi vesicæ sunt, in pueris quidem crassa & colore lactea aut virescens urina, in adultis autem tenuis & instar aquæ limpida. In iis enim calculus obstruens meatum vesicæ, crassiorem urinæ partem profluere cohibet, quandoque urina conspicitur arenosa. Sunt & signa calculi, pruritus præputii, & crebra distensio virgæ, siue appetentia Venerea.

Quomodo calculus vesicæ à calculo renum distinguatur.

Signa distinguuntur calculum vesicæ à calculo renum. Calculi vesicæ figura ut plurimum rotunda est & dura, fluviatilibus calculis similis, & lentis figuram refert, colore albicans. Sed quando ex mutua cohesione arenarum ex Renibus in vesicam defluentium compactus est calculus, tum rubicundior, aut flavior, aut asperior est, & intus nucleum habet. Renum vero calculus figura inæqualis est, asper, colore rubicundior & magis fricabilis. Si vero calculus in ureteribus est generatus, tum figura oblongiusculus est instar nuclei pinei.

Prognostica.

Prognostica signa hæc sunt notanda. Calculus vesicæ pueros magis quam adultos & senes affligit. Qui calidam habent alvum ventriculumque, in iis magis generatur calculus vesicæ. Ut enim matula excipit excrementa urinæ adhærentia, ita contingit & in vesica. Non omnes, qui sabulum emingunt, calculosi sunt. Sabulum enim non coalescit, in calculumque concrevit, nisi interveni viscidorum humorum.

Curatio.

Curatio calculi vesicæ communis ferè est cum curatione calculi Renum, nisi quod paulo validiora requirat remedia.

Dieta.

Primum itaque instituatur ea victus ratio, quæ supra in calculi Renum curatione est præscripta. Videntur autem omnes Occasiones & alimenta calculum generantia, ut sunt lac, caseus, pisa, anguillæ, panis recens pictus, vinaque & cerevisiæ crassæ ac sæculentæ, crebro autem bibat hydromel.

Insepsus.

Ubi jam calculus affligit, & in meatum urinæ aut virgæ est impactus cruciatusque excitat, statim ducatur æger in solium aq. calidæ, in qua incocta sunt fasciculus

straminis avenacei cum granis, & herbæ pariæ. malv. alth. chamæm. aneth. & similia. Atque si urina nondum est suppressa, tum nec ol. vitrioli nec alia remedia diuretica aut calculum propellentia exhibeantur, ne materiam crassam deducant in vesicam, & obstructioni addatur obstructio, dupliceturque malum, nisi prius evacuatis humoribus. Si adsit nausea, vomitione spontanea, aut assumptione ʒ i. succi Rapha. cum haustu vini, in quo per noctem cortices rad. juglandis sunt macerati, & leniter ebulliti, quod tepidum haustum mitissimè vomitum cit. At, si dolor inducias perfert, sequens clyster recto intestino infundatur.

Vomitoria.

ʒ. Flo. chamæm. Aneth. Cent. mi. Malv. Alth. Mercur. an. M. s. concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, colati juris accipe lb. i. cui admisce hier. simpl. cassiæ extr. an. ʒ i. Ol. chamæmeli, scorp. an. ʒ i. s. fiat enemata.

Enema.

Postea calculus ipse in vesicæ collo hærens repellatur in capacitatem vesicæ per usum catheteris. Remoto calculo ægrotanti exhibeantur quæ sua vi calculum atterere & confringere queant: inter quæ præstantiss. est ol. vitr. rectificat. si singulis diebus gutt. 9. cum haustulo vini exhibeantur. Hoc enim medicamentum calculum durum in calcem convertit & absomit. Aut præbeat ʒ i. Pul. succini albi cum haustulo aq. Juniperi, aut exhib. ʒ i. succi Rapha. cum aq. Juniperi ʒ i. mixtæ, aut ol. terebinth. ʒ i. vel è succino albo destillat. aut ʒ i. salis absinthii cum haustulo vini; aut haustus lixivii ex cineribus festucarum fabarum & rad. filicis factus; aut ʒ i. calculorum vesicæ ab ægro excretorum, aut in vesicis porcorum repertorum in tenuissimum pulv. contritorum, aut ʒ i. pul. lapidis Judaici cum haustu vini aut hydromel. aut ʒ i. lumbricorum terrest. n. v. cum aq. Juniperi contritorum & expressorum.

Calculus atterentia.

Experimenta singularia ad calculum vesicæ atterendum & propellendum.

Reliqua remedium genera vesicæ calculum & atterentia & propellentia ex curatione calculi Renum huc commodè adferri

Tempus exhibendi. ferti possunt. Omnia autem hæc remedium genera præstat exhibere in solio sive balneo præscripto sedente ægro, sed, ut dictum est, non nisi evacuato per vomitum aut per clyster, aut per catharticum corpore. Ex catharticiis autem lenissim. hæc sunt (validiora enim sunt vitanda) syr. rosar. solut. 3 111. cum haust. aq. petros. commixtæ: aut 3 x. cassi. recenter extractæ: aut haustus aq. petros. in qua per noctem macerata fuere fol. senæ 3 11. Rhab. 3 1. mane autem liquore expresso admixtæ sunt syr. rosar. solut. 3 11. Foris autem utiliss. est cataplasma vesicæ applicare ex farina sænugræci & lini q. s. cum sanguine hircino q. s. confectum.

Chirurgia seu exciso calculi quando suscipienda. Porro ubi calculus vesicæ majusculus fuerit, ut nec concussione crurum supino jacente ægro (qua sæpe calculus in capacitatem vesicæ recidit) nec catheterum usu

retro trudi ex collo vesicæ queat, sed in plis vesicæ firmiter hæreat, id quod peritus lithotomus facile digito in anum immisso, cui collum vesicæ incumbit, deprehendere potest, ad acerbum illud remedium, ad excisionem videlicet calculi, confugendum erit. Incidet autem peritus lithotomus aut Chirurgus cervicem vesicæ musculosam, diligenter cavens ne membrana vesicæ vel sphincter ani lædatur. Fiet autem incisio paulo supra anum, ubi musculi sphincterum rectas habent fibras. Inciso collo vesicæ si calculus grandior sit, quam ut spontè excidere aut manibus exprimi queat, tum forcipe adaptato confringatur calculus, & ita particulatim eximatur. Exempto calculo curetur vulnus, & ejusmodi præscribitur victus ratio & remedium usurpandus. quæ generationem calculi prohibere queant.

Quomodo calculus excidendus.

Vide Chirurg. Paral. 16. c. 43. & seq.

PRACTICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER SEPTIMUS,

DE VIRGÆ ET TESTIUM AFFECTIONIBUS.

SECTIO I.

DE VIRGÆ MORBIS.

I. Virga quid, & quibus afficitur Morbis?



Esicæ cervix vel collum in viris in ipsum virgæ meatum desinit, per quem & urina ex vesica projicitur, & semen ex testibus ejaculatur. Naturæ itaque ordo efflagitat ut post morbos vesicæ de affectionibus virgæ nobis sermo habeatur. *Kabî* & coles, cauda, mentula, penis, priapus, virga seu

membrum virile, synonyma sunt, quæ huic membri generationis organo attribuuntur. Est autem virga aptissimum ad semen ejaculandum in os uteri instrumentum, ex duobus nervosisque carnosisque corporibus & oblongis utrinque ex ossibus pectinis pronatis & inter se connexis, compactum, intus spongiosis cavernosisque meatibus plenum, cujus

Virga quid.

Varia nomina

jus cavernulæ, ubi flatulento spiritu replen-
tur, turgescit & erigitur, in medio in-
signem meatum habens, per quem urina, &
in adultis semen profluit. *Sunt autem præ-
cipuæ affectiones:

*Ejus pri-
marii af-
fectus.*

Virgæ tumor sive apostema,
Virgæ exulceratio,
Verrucæ ac pustulæ virgæ,
Virgæ pruritus,
Priapismus & satyriasis,
Virgæ erigendæ impotentia.

2. *Virgæ tumor quid, quæ ejus causa, quæ
signa, & quibus mediis tollen-
dus?*

*Tumor
virgæ
quid.*

Ἀπόστημα, abscessus virgæ ut plurimum
adjunctam sibi habet inflammationem, &
Græcis φλεγμονὴ ἢ κούλη, id est calidus
tumor virgæ; aut frigidityte, & ἄδημα ἢ
κούλη, id est, frigidus tumor virgæ no-
minatur, qui nonnunquam totum mem-
brum, quandoque præputium tantum, &
nonnunquam intrinsecam, quandoque ex-
ternam ejus partem, occupat.

Causæ.

Causæ αἰσθημένων inflammati tumoris
virgæ sunt, aut biliosus impurusque sanguis,
aut venenosa sanies, aut calidi flatus in ca-
vernosis partibus virgæ collecti. Frigidi ve-
ro tumoris, (qui rarissimè in hac parte so-
lum; in hydropicis enim unâ cum abdomi-
ne vel toto corpore etiam virga frigido tu-
more inflatur, contingit.) Causa αἰσθημέ-
νῃ est colluvies frigidorum pituitosorum-
que humorum cum flatulento spiritu in ipsa
virga collecta. Προκαταρκτικαὶ causæ inflam-
mati tumoris sunt, concubitus immodera-
tus & cum impuris & menstruo laboranti-
bus mulierculis, morsus venenatorum ani-
mantium, inunctiones calefacientes, ictus
aut vehemens compressio virgæ. Frigidus
tumor virgæ vix habet causas procatartici-
cas. Refrigeratur tamen hac pars incarce-
ratis sæpè & iter facientibus, indeque intum-
escit.

Signa.

Signa calidi tumoris virgæ manifesta sunt,
& ex rubedine, dolore & crebra extensione
prurituque facillè deprehenditur. Signa fri-
gidi sunt albedo & indolentia.

*Prognosti-
ca.*

Prognostica: Nisi scitè & artificiosè & ci-

to curetur tumor virgæ calidus, facillè pu-
trefcit, & in fistulam degenerat.

Curatio pro causarum diversitate insti-
tuenda est. In inflammato itaque tumore
virgæ, primum incidatur vena talaris dextri
pedis, & si corpus sit plethoricum, & vena
Epatica. Deinde victus ratio instituatur re-
frigerans & humectans. Conveniunt ita-
que pruna Ungarica, cremores ptisanæ &
avenæ, juscula & carnes pullorum cum uvis
immaturis conditæ & pisces saxatiles. Potus
sit aq. hordei & cerevisia non adeo plena, vi-
num & aromata fugiant. In frigido tumo-
re, quem rarum esse diximus, paulò cali-
diora alimenta aromatibus moderate condi-
ta, & vini moderata potio conveniunt.

Post præscriptam victus rationem humor
vitiosus in virgam incumbens sive sit bilio-
sus, sive salus, sive pituitosus convenien-
tibus remediis toties in superioribus tum cu-
rationibus tum generalibus tabellis commemo-
ratis ad evacuationem præparetur, &
deinde evacuetur, & si necessitas postulet,
alvus lenibus Clysteribus crebro subduca-
tur. Quibus ita præmissis, mox ad Topica
remedia virgæ tumorem sedantia, dolo-
rem prurituque mitigantia, deveniendum
erit.

Primum itaque inflammato tumentique
pudendo imponatur tale epithema.

℞. Lutei ovorum cum album. n. ii. ol. Epithema.
rosar. ℥ i. succi plantaginis, Solani,
lactucæ an. ℥ i. Aceti rosar. ℥ s. simul
conquassata probeque commista,
cum panno novo aut duplicatis lin-
teolis excipiantur tumentique virgæ
imponantur.

Verum ubi Apostema à præscripto Epi-
themate non detumescat, ad tumoris ma-
turationem & in pus conversionem consi-
lium est convertendum, id quod sequenti
cataplasmate perfici potest.

℞. Fol. Malvæ, solani, violar. an. M. i. Cataplasma.
flor. verbasci, rosar. an. M. s. coquan-
tur in q. s. ac deinde herbæ concoctæ
pistentur in mortario, quibus admix-
sce farinæ hordeac. lini, fœnuigræci
an. ℥ ii. ol. violar. ℥ ii. vitell. ovo-
rum

rum n. ii. commisce, fiat cataplasma, quod tepidum bis singulis diebus imponatur. Mitigat enim dolorem & ad maturitatem deducit tumorem.

Apertio Apostematis. Maturato apostemate incidatur secundum longitudinem tumoris locus, & emundato pute chirurgico artificio (de quo suo loco latius tractabitur) curetur.

Curatio tumoris frigidi. Porro tumor virgæ frigidus, qui raro & vix quam in hydrope contingere consuevit, ita curandus est. Primum applicato sequens cataplasma.

Cataplasma discussiens. ℞. Rad. Asphodeli M. ii. lilior. albor. M. i. conterantur in mortario, quibus admisce fecis vini ℥ ii. farinæ fabarum & pul. Cymi. an. ℥ i. mellis q. s. commisceantur & fiat instar pulvis cataplasma. Aut maturetur tumor sequenti cataplasmate.

Aliud maturans. ℞. Vitelli ovorum n. iiii. far. vel pul. sænugræci, lini & farinæ volatilis in molendinis collectæ an. ℥ i. aq. decoctionis meliloti, & rad. Alth. q. s. simul coquantur in pulvis formam, fiat cataplasma, cui admisce parum ol. chamæm. Aut

Aliud tumorem imminuens. ℞. Nucleorum dactylorum ℥ i. Aloës Epat. Aceti & aq. p. æ. q. s. fiat cataplasma bis singulis diebus applicandum.

Maturato apostemate incidatur & curetur chirurgico processu.

Tumoris intrinseci remedia. Ubi autem tumor intrinsecus ad meatum Virgæ tendit, tum pro qualitate causæ, omnia præscripta remedia commode adhiberi possunt, nisi quod liquidiora per siphonem impelli, duriora autem instar candelæ cereæ conformata inferi debeant.

3. *Virga ulcus sive exulceratio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Quæ partes pudendi exulcerantur. Ἐλκωσις τῆς καύλης. Virga frequenter exulceratur cum externis tum internis ejus partibus; & externa quidem ejus ulcera excitantur aut in cute, aut in glande, aut in præputio. Interna vero ulcera contingunt aut

sub cute, aut in meatu urinæ, aut in interna parte præputii, aut circa radicem pudendi, id quod ex loci dolore facileprehenditur.

Causæ αἰσθημένων exulcerationis virgæ sunt, putidi & venenosi humores, salsa & adusta biliosaque colluvies in cavernulis virgæ impacta. Procatactica vero causæ sunt, contactus ulcerosorum putrefactorumque locorum matricis infectarum mulierculatum aut menstruo laborantium in sædo coitu.

Signa exulcerationis virgæ sunt evidentia, & causæ quidem procatactica ex confessione ægri cognoscuntur, sed causæ progumenæ ex totius corporis habitu & intemperie dignoscenda erunt. Prognostica signa notantur: Ulceri virgæ aut præcursores aut comites sunt morbi Gallici. Ulcera virgæ nisi tempestivè curentur, maligna redduntur, & vel in putrefactionem, aut in fistulam, aut in cancrum degenerant, maximè ea, quæ intra glandem, aut circa radicem virgæ excitantur.

Curatio exulcerationis Virgæ consistit in victus ratione, in vitiosi humoris evacuatione, in puris abstersione, & ulceris per topica pharmaca conglutinatione. Si itaque vitiosi humores per totum corpus sparsi ad virgam defluentes tumorem aut exulcerationem excitent, victus ratio semper contraria debet esse & vitiosis humoribus & intemperiei corporis. In genere autem conveniunt pruna Ungarica, poma assata, juscula pullorum cum uvis immaturis & rad. petrosel. cocta, & pistana avenacea ac hordeacea, pulmentaue ex oryza & amylo. In potu conveniunt hydromeli, aqua hordei, cui incoctum est cinamomum, aut cerevisia tenuior.

Post victus rationem ordinatam, nec venæ sectio prætereunda erit. Secunda autem erit primo vena epatica dextri humeri, & postea vena talaris interior.

Medicatio inter usurpationem topicorum remedium talis est. Bibat patient mane ac vespere haustum tepidum ℥ v. feri lactis caprini, in cujus semicongio in duplici

G g g

vase

vase incocti sunt M. ii. fumariz viridis, aut ejus loco conf. fumariz 3 ii. herb. Veronicæ M. i. rad. chinæ, polypodii an. 3 i. post sufficientem cocturam percoletur.

Evacuanda.

Interim & putidi venenosique humores singulis septimanis semel subducantur, aut bolo ex 3 x. cass. fistul. devorato, aut 3 i. Elect. diacatholici, aut 3 v. confectionis hamech. cum haustulo aq. veronicæ, aut card. benedict. resolutis & ebibitis. Quin, si circa regionem Renum simul cum ulcere virgæ inflammatio percipiatur, aut ardor acrimoniaque urinæ inter mendum, inungatur regio Renum sequenti linimento.

Linimentum.

℥. Ol. rosarum, nymphaeæ an. 3 s. Mucaginis ex sem. cyton. contulis cum aq. solani confectæ 3 ii. ceræ q. s. fiat linimentum. Aut ex iisdem rebus conficiatur cerorum addita sufficienti cera, & Renibus imponatur.

Si ex virgæ inflammatione sit ulcus.

Ubi vero in ipsa virgæ hæreat inflammatio, quæ maximè impedit curationem, (quia destruit naturalem calorem) ea citissimè restinguenda est sequenti Epithemate.

Epithema.

℥. Album. ovorum n. ii. quibus admisceantur aq. Rosarum, solani an. 3 ii. & simul conqassentur, ac si ulcus sit extrinsecum, excipiantur duplicatis linteolis, & crebro inflammato loco imponantur.

Si vero intra cavitatem virgæ hæreat inflammatio & ulcus, hoc ipsum Epithema tepidum per siphonem intropellatur.

Omnia autem deinceps Topica remedia talia esse debent, quæ ulceris sordes abstergant, loci humiditatem exsiccet & simul consolident. Si itaque ulcus virgæ sordida sanie redundet, abluatur, abstergeturque & mundificetur primum aut vino rubeo, in quo cocta sit herba Veronicæ, aut hydromelle tepido, aut lacte caprillo, in quo rosæ rubæ sunt incoctæ. Qui liquores, si internum sit ulcus, per siphonem infundantur: si vero extrinsecum sit, tenui spongiola exceptis liquoribus abluatur, & mox post ablutionem externum quidem ulcus lana xyliana, aut molliori spongia extergatur, ulcerique sequentium pulverum aliquis in-

Ulcus abstergentia.

spargatur, aut tenuissimi pulveris Aloës Epaticæ, aut fol. querci, aut rad. Aristolochiæ rotundæ, aut pul. plumbi usti & probè eloti, aut cadmiæ elotæ, aut thuciæ præparatæ, aut, quod mirificè exsiccat, conglutinat, & inculpatam carnem regenerat,

Pulveres exsiccantes & conglutinant. Ol. Tartari ad hunc usum Chymici commendant.

℥. Thuciæ præparatæ, sarcocollæ, Thuris, Balauftiæ, Acatiæ, lapid. hæmat. an. 3 i. Aluminis 3 ii. Omnia tenuissime pulverentur & commisceantur, ulcerique inspergantur. Aut ex ejus portione cum pauxillo ol. rosacei, & cera candida, fiat linimentum, quod ulceri illinatur.

Linimentum.

Mirificè quoque sequens pulvisculus ulceri virgæ persanare consuevit.

Pulvis compositus.

℥. Scoriz ferri præparatæ, plumbi usti, cineris chartarum lusoriarum, sang. Draconis, Aluminis adusti an. 3 s. fiat pulvis tenuissimus, qui ulceri inspergatur: Aut cum ol. Rosaceo exceptus illinatur, & post illitionem remedium, aut pulveris inspersio nem, imponatur extrinsecò ulceri Emplastrum de cadmia, quod in myropoliis Emplastrum Griseum nominatur.

Pulvis.

Empl. griseum.

Porto in internis pudendi ulceribus paulo difficilior est curatio. Itaque intra corpus quotidie bis exhibenda sunt remedia abstergendi & conglutinandi facultate prædita, veluti sunt sequentes pulvisculi.

Ad ulcera pudendi interna.

℥. Aristolochiæ rotundæ, Bacc. lauri an. 3 ii. sem. urticæ, Fol. fabiæ an. 3 i. Glandium 3 i. s. Gummi Arabici, Tragacanti an. 3 ii. pulverentur subtilissimè, cujus 3 i. exhaustur mane ac vesperi cum hydromelle, aut 3 i. Trochiscorum Alkaken-gi cum aq. hippuris.

Pulvis assumendus.

Interim & sordes ulceris interni cum supra scriptis liquoribus per siphonem impulsis quotidie bis eluantur, quibus si patum efficiatur, tum ceream candelam ex cera sigillatoria viridi confectam, & unguento Egyptiaco vocato oblinitam per meatum virgæ in ulcus immitti prodest, cum candelæ & præscriptus pulvisculus admisceri potest.

Topica.

Ant

Aut paretur cerea candela ex præscriptis pulvisculis quæ quotidie bis inferatur in ulcerosam virgam, & non eximatur nisi mendi necessitas incumbat. Aut

Liquor infundendus.

℞. Pul. viridis æris 3 s. aq. plantag. ℥ s. compisceantur & simul maceantur per noctem, deinde coletur liquor viridis ab æruginē, in eoque liquore resolvatur 3 i. aloës purissimæ, sarcocollæ 3 s. qui calidus per siphonem in ulcus infundatur.

Et his quidē remediis eousque est utendum, donec dolor ulceris non amplius perentiscatur, nec sordes purulentæ cum urina profuant.

Si ulcus sit putridum, quibus utendum. Porro si ulcus putrescere deprehendatur, utilissimum erit sequenti liquore eluere.

℞. Auripigmenti 3 ii. quod tenuissimè pulveratum cum 3 ii. aq. rosar. resolvatur, qui liquor per siphonem immittatur. Aut

℞. Aq. plantag. 3 i. ol. vitrioli 3 s. misceantur & tepida per siphonem in ulcus impellantur. Quæ autem ulcera virgæ hac ratione & his remediis curari nequeunt, eis curandi ratio morbo Gallico dicata, quæ paulo post in curandis affectionibus cutis commemorabitur, adhibenda erit. Sunt enim hi morbi, utpote jam pertractatus, & sequentes, præambulationes & perpetui nuncii morbi Gallici.

Validiora remedia unde pendenda.

4. Pustula & verruca in virga exorta quid, quæ earum causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Pustula quid.

Ἐφ' ἧλιδος Ἰκρύλης, Pustulæ virgæ. Pustulæ generali significatione dicuntur Chirurgis tumusculi, vel extuberantiæ minores in cute excitatæ, quales sunt scabiei tumusculi, aut adustione aq. ferventis excitati, quorum materia ut plurimum tenuior & flavior est quam apostematum seu tumorum. Pustulæ autem virgæ semper oboriri solent in externa cute pudendi, aut in pellicula glandis. Duplices autem sunt pustulæ virgæ,

Pustula virga in quo loco erumpant.

Molliores alteræ & albicantes, Duriores autem & inæquales rubescentesque aut livescentes alteræ. Quanto autem magis pustulæ virgæ ab albo colore ad lividitatem aut nigredinem recesserunt, tanto sunt duriores. Duriores & scabræ pustulæ livescentesque Barbaris verrucæ, Arabibus Botores nominantur & ut plurimum præputio adhærent.

Earum differentia.

Causæ pustularum virgæ ut plurimum procatarticae sunt tantum, veluti sunt contactus & conjunctio virgæ cum exulcerata parte uteri, aut illitio & defœdatio virgæ cum virulenta colluvie putidaque sanie in utero contenta, & illitio menstrui sanguinis. Id autem non contingit, nisi concumbentibus cum impuris mulierculis & publicis scortis. Verrucæ vero sive duriusculæ pustulæ virgæ ex iisdem causis αἰτιαται & κινῶνται excitantur, potissimum accedente αἰτιᾷ μένι causa, hoc est, ubi sanguis in corpore adusta melancholia est defœdatus.

Causa.

Signa pustularum virgæ manifesta sunt, Signa visu enim ac tactu deprehendi possunt. Prognosticon est: Pustulæ & verrucæ virgæ præcursores sunt morbi Gallici, & nisi tempestivè curentur, in maligna ulcera degenerant.

Prognostica.

Curatio pustularum virgæ tota ferè est chirurgica. Ut tamen in aliis morbis, ita & in hisce affectionibus ratio habenda est victus, venæ sectionis, & remediorum usurpationis.

Curatio.

Victus ratio ordinanda est talis, quæ in temperiei corporis est contraria, ut calidis frigida, frigidis calida, ut supra sæpè annotavimus.

Dieta.

Venæ sectio in sanguineis naturis, & corporibus plethoricis semper præcedere debet. Secunda autem est vena Epatica sinistri lateris. Commode quoque adhibentur virgæ hirudines sanguinem impurum elicientes, & scarificationes, & sanguis impurus digitis per vulnuscula exprimendus est. Remedia digerentia & evacuantia pro humoris redundantis in corpore constitutione adhibenda sunt, quorum copiam ex superioribus & ex tabellis medicamentorum habere possumus.

Venæ sectio.

Hirudines.

Topica.

Topica remedia, quibus pustulæ & verrucæ virgæ extirpari curarique possunt, magis experta hæc habentur. Etsi autem valde sævum sit curationis genus, tamen breviori tempore pustulas & verrucas persanat, cauterium actuale ut vocant, hoc est, ustulatio pustulæ & verrucæ cum ferro candente: statim verò post ustionem toti virgæ sequens remedium inflammationem arcens est imponendum.

Epithema refrigerans.

℥. Albuminum ovorum n. ii. conquassentur eisque admisceantur ol. rosacei ℥ i. succi plantag. Solani an. ℥ s. commixta & parum calefacta duplicatis linteolis excepta bis per diem imponantur.

Inciso.

At qui ustionem tolerare nequeunt, iis pustulæ aut verrucæ profundiori vulnuscule incidantur, vulnerique imponatur aut unguentum Ægyptiacum, quod in myropoliis prostat, aut pulvisculi Trochiscorum è Minio, quorum parandorum ratio ex Vigone Chirurgo ita habetur.

Trochisci è minio Vigoni.

℥. Medullæ panis bene fermentati ℥ s. Mercurii sublimati ℥ i. Minii ℥ s. Hæc tria simul in mortario diutissime conterantur & cum q. s. mucaginis Tragacanti cum aq. rosac. facti, formantur exigui orbiculi, atque exsiccentur. Hoc medicamentum non modo pustulas & verrucas in virga, verum etiam corruptas carnes & excrescentias omnes in quibuscunque vulneribus partium absument & erodit.

Post exesas pustulas atque verrucas, ulceri earum sequens cataplasma imponatur.

Cataplasma abstergens.

℥. Terebinthinæ ℥ i. Mellis rosar. ℥ iii. succi Apii, Plantaginis an. ℥ ii. simul ebulliant & defecentur, eisque admisceantur farinæ hordei ℥ v. sarcocollæ ℥ ii. croci ℥ i. fiat cataplasma, quod in die bis tepidum ulceri pustularum imponatur, cujus beneficio ulcus emundatur & abstergitur; & ubi satis emundatum est ulcus, tum eidem cataplasmati utiliter admisceantur ea quæ carnem generare & ulcus con-

Sarcotica.

glutinare queant, qualis est sequens pulvis.

℥. Thuris ℥ ii. Aloës Epaticæ ℥ iii. Myrrhæ ℥ i. pulverentur tenuissime ac commisceantur. Ut autem citissime ulcus ad cicatricem perducat, inspergatur ei sequens pulvisculus.

℥. Lithargyrii utriusque an. ℥ ii. Tutthiæ preparatæ ℥ i. Boli Armenii, Terræ sigillatæ an. ℥ s. Myrobalanorum citrinarum, aluminisusti an. ℥ ii.

Omnia tenuissime pulverentur, & commixta ulceri inspergantur.

Porro solent nonnunquam ulcera pustularum ac verrucæ virgæ continuo sanguinis madore ac fluxione affici, & inflammatione corrumpi, & simul pruritus excitare, quæ symptomata sequentibus remediis curari possunt.

Sanguinis fluxionem non modo in virgæ pustulis, sed & aliarum partium affectionibus mitissime constringit sequens hic pulvisculus, si ulceri inspersus fuerit.

℥. Aloës Epaticæ, thuris, sarcocollæ an. ℥ i. Terræ sigillatæ, Boli Armenii, Lithargyrii utriusque an. ℥ i. Myrrhæ ℥ s. pilor leporin. minutissime conc. ℥ s. farinæ volatilis vocatæ, quæ parietibus molarum adhærescit, farinæ fabarum, lentium, hordei an. ℥ s. commisceantur & inspergantur, vel albuminibus ovorum conquassatis in linimenti formam redigantur, & linteolis excepta affecto loco imponantur.

Tumorem vero & inflammationem virgæ ac potissimum glandis sequens linimentum sedabit.

℥. Ol. rosarum ℥ i. Succu plantaginis ℥ vi. Lithargyrii utriusque an. ℥ ii. Tutthiæ ℥ i. s. Cerussæ lotæ ℥ i. Plumbiusti ℥ s. ex quibus omnibus probè pulveratis & commixtis fiat linimentum, quod linteolis exceptum, loco affecto imponatur. Idem præstat sequens liquor.

℥. Aq.

Epithema. 2. Aq. plantag. rosarum an. 3 rr. sieph. albi sine opio facti, (quod est populaire remedium Ataribus ita nominatum) 3 rr. commisceantur, fiat liquor sive collirium, & imponatur.

Pruritus sedantia. Pruritus vero qui ex acerbis salisq; humoribus in pudendo excitatur, mitigabit hoc sequens cataplasma.

Cataplasma. 2. Violariæ, acetosæ, meliloti, fumariz, flo. rosarum, sambuci an. M. s. Concisis omnibus coquantur in q. s. aquæ, & abjecto liquore herbæ contendantur in mortario, quibus admisceantur aceti rosei an. 3 rr. farinæ sabaceæ q. s. fiat cataplasma, quod tepidum imponatur. In leviori autem pruritu satis erit inungere unguento Populeonis vocato, cui nonnihil quoque aluminis usti sit admixtum, aut inungere medulla ex vitulinis ossibus exenta.

Linimentum.

5. *Præternaturalis & continua Virga erectio seu extensio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis persananda?*

*Priapi-
smus quid.* Πριαπισμός & Σαρδαπία sunt affectiones virgæ, in quibus virga præter naturam & præter voluntatē cum dolore continua erectione molestat, sine omni Venereo desiderio & seminis excretionē. Virga enim à Deo opifice ad seminis ejaculationem est condita, semen autem minimè ejaculari potest, nisi ipsa extendatur & turgeat, & ideo ejus artificiosa structura cavernosa est, & recipiendis spiritibus aptissima, constans ex validis nervis, eisque, exceptis opticis, solis cavis, & musculis amplis, arteriis ac venis intertextis. Cum itaque virgæ cavernæ & nervorum ineatus spiritu replentur ac turgent, & calore nativo incalescunt, stimulat animal ad libidinem, & erigitur virga, & excitatur ad semen ejaculandum cum summa voluptate, quæ affectio naturalis est. In priapismo autem nec desiderium adest Venēris, nec semen ejaculatur, sed riget virga cum dolore. Satyriasis ex iisdem causis oritur, & in hoc tantum differt à Priapismo, quæ in satyriasi sit non tantum continua erectio

cum dolore, verum etiam continue palpitet, *sumum & sursum deorsumque subsiliat virga.* Ut autem *satyriasis.* rara, ita fœdæ sunt hæ affectiones virgæ. U- *Rara affe-
ctio.* num mihi per vitam adolescentem maritum inter longam profectionem hoc malo laborasse, videre & curare licuit tantum.

Causæ *αἰσθητικαὶ* sive internæ priapismi atque satyriasis sunt vapores & ferventes spiritus ex arteriis dilatatis justo copiosius in cavernas virgæ, & cavitates nervorum profluents, ibidemque collecti. Item seminis mala & venenosa qualitate imbuti destillatio ad meatum virgæ post longam retentionem. Acres & purulenti humores ex internis apostematibus in meatum virgæ profluents. Hisce causis internis perpetuo conjunctus est status, sed in satyriasi major, quam in priapismo copia status adest.

Προσπεπτηκαὶ sunt calefactio nimia lumborum & inguinum, quæ calefactio ut plurimum ex inconsueta unctione aut equitatione oboritur, in qua semper dilatantur arteriarum orificia in virga sparfarum, item acrida & calida pharmaca meatui urinæ intromissa.

Signa ex ægri querela haberi possunt, & per se manifesta sunt. Nam adest continua extensio cum dolore, ac sine titillatione ad libidinem, & in satyriasi continuè jactitatur subsilitque virga. Prognosticon hujus mali hoc est: Priapismus & satyriasis similis est spasmo seu nervorum convulsioni, & nisi maturè curetur, vitæ perniciem, ut spasmus, inferre consuevit, & mortuis non subsidet virga, sed rigida permanet; aut si flaccescat, venter ex flatu intumescit.

Curatio hujus mali consistit in victus ratione, venæ sectione, & remediorum usurpatione; quæ omnia pro causarum diversitate, & corporum intemperie varianda erunt.

Victus ratio moderata esse debet: Et præstatet patientem per triduum inedia macerari. Cum autem naturis siccis & calidis magna ex parte hoc malum accadat, ordinanda est victus ratio calidæ & siccæ intemperiei contraria. Conveniunt itaque prisana, cremor prisanæ, pulmenta ex amylo & farina avenacea, lac amygdalinum, lactuca, Ggg 3. portu-

Causa interna.

Externa.

Signa.

Prognosticon.

Curatio.

Dietæ.

*Differen-
tia inter
priapi-*

portulaca &c. quibus nonnihil admisceri possunt flatus dissipantia, veluti sunt semen carvi & cymini. Potus sit aqua hordei. Vitare autem convenit omnia calefacientia & flatus generantia.

Vena sectio. Venæ sectio corporibus plethoricis & biliosis plurimum utilitatis adfert, ac primum quidem in sanguineis redundantia sanguinis per venæ Epaticæ incisionem, deinde & ejus quæ sub poplite habetur, diminui debet, sed præstaret arteriam tarsi pedis, quæ ex pulsu facile deprehenditur, incidere.

Arterioto-
mia in
tarsis. Verum ut in aliis morbis præcepimus, ita in hac affectione ante venæ sectionem biliosi flatusque & inflammati humores subducantur, aut infusioni Rhabarbari, cujus parandi rationem jam sæpius commemoravimus, aut cass. pulp. ʒ x. aut ʒ iiii. syr. rosat. solutivi, aut leni clystere alvus eluatur.

Purgantia. *Enema.* ʒ. Malv. violar. Mercurialis an. M. i. flor. Anethi M. s. decoquantur in q. s. aq. ad tertias, colati juris accipe lb. i. cui admisce cass. extractæ ʒ i. syr. rosat. solutivi ʒ ii. ol. violarum ʒ iii. salis ʒ ii. fiat enema, quod tepidum recto intestino injiciatur.

Evacuato corpore & flatuoso sanguine, spirituque ferventi per venæ vel arteriæ sectionem subtracto, quotidie patienti potanda præbeatur ʒ i. sequentis pulvisculi cum haustulo aquæ Rutæ.

Pulvis refrig-
rans. ʒ. Rad. Nymphææ, sem. viticis an. ʒ ii. fol. verbenæ ʒ ii. Rutæ ʒ s. coral. albi præparati ʒ i. Trochisco. è camphora ʒ i. misceantur, fiat pulvis.

Sal h i-
dem præ-
stat. Interim topica remedia sedulo usurpanda erunt. Si itaque calida intemperies corpus infestet, pedes & crura ægrotantis subinde in aquam frigidam sunt immergenda, virga vero percalefacta sequenti Epithem. est fovenda.

Topica. *Epithema.* ʒ. Succī plantaginis, Hyoschiami, semper vivæ, solani, papaveris an. p. æ. aceti rosacei parum, fiat epithema, quod tepidum duplicatis linteolis exceptum, virgæ circumponatur.

Iidem succi, aut lac ex sem. papaveris cum aq. rosacea factum, tepidumque per syphonem in meatum virgæ commode impelli potest. Aut ex *catapla-*
prescriptorum succorum herbis re-
suma. centibus admixto ol. rosaceo & Nymph. an. q. s. & farinæ fabacæ, ut pultis formam consequatur, fiat cataplasma, & virgæ imponatur. Ea *Lumbis*
ipsa pharmaca lumbis percalefactis imponen-
da. utiliter imponi possunt. Aut inungantur lumbi ac plantæ pedum quotidie bis sequenti linimento.

ʒ. Ol. rosarum, violarum, nymphææ, Linimentum an. ʒ ii. chamæmelini, unguenti *rum.*
populeonis an. ʒ i. Mucaginis ex sem. psylli cum aceto rosaceo factæ ʒ ii. ceræ albæ q. s. fiat linimentum.

At ubi hoc malum ab ulcusculo in meatu virgæ oborto & ex eo defluente sanie sit excitatum, ulcus ipsum mundetur, & pus *Si ex ulce-*
re virgæ, acrisque colluvies cum tepida aqua rosacea *quid a-*
gendum. per syphonem immissa eluatur, & eis remediis perlanetur ulcus, quæ paulo ante commemorata sunt.

Si vero Priapismus & satyriasis à copia flatulentorum spirituum sunt excitatæ, post *Flatulen-*
torum spirituum usum præscriptorum remedium, ea sunt *discussio-*
nia. adhibenda, quæ flatum discutiant, inter quæ præstantissima sunt ʒ s. ol. carvi, aut ol. Cymini cum haustulo aq. Rutæ quotidie exhibitus.

In satyriasi virgæ palpitanti, potissimum *Satyriasis*
si absit vehemens caliditas, imponi com- *remedia.*
mode potest vinum tepidum instar Epithematis, in quo concocta sint cyminum & fol. rutæ. Similiter & ruta viridis contusa, & cum pauxillo aceto & cymino additis, fiat cataplasma.

Si vero inflammatio virgæ prohibeat tum mucaginem psylli cum aceto rosaceo factam, & linteolis exceptam, commodius imponere possumus.

6. Impotentia erigenda virga quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis sublevanda?

Ἀδυναμία ἐνεργίζουσαν τὴν κούλην, Virgæ i- *Impoten-*
gnavia seu erigendæ impotentia est, ubi in *tia quid.*
ætate

etate connubio apta, virga ita enervatur, ut nullo conatu erigi, extendive queat. Quod in decrepitis naturale est, sed in mediæ ætatis hominibus, ac potissimum in conjugio degentibus tristis & ingratiſſima est affectio.

Causa.

Causæ *προνυμειναι* ignaviæ virgæ sunt, nervorum virgæ resolutio ex refrigeratione orta, penuria flatulentorum spirituum ex interceptis arteriis virgæ in nervos influere prohibitorum, cordis debilitas & palpitatio, seminis penuria & frigiditas, obstructions nervorum & arteriarum, vasorumque spermaticorum per frigidos humores, Renum insignis refrigeratio. *Προκατακτιναι* sunt longa mora & conversatio in frigida aqua, locisque frigidis, victus ratio, & remedium impensè refrigerantium, tum foris tum intra corpus usurpatio, nervorum & arteriarum virgæ convulseratio, fascina seu incantamenta diabolica, à sceleratissimis & extremo supplicio puniendis inducta virgæ ignavia.

Signa causarum diversarum.

Signa ex relatione patientis haberi possunt. Causarum vero signa ita consideranda veniunt. Virgæ paralyſin præceſſit aut insignis ægritudo, aut extrema refrigeratio. Refrigeratio ex totius corporis, ac potissimum inferiorum partium frigida intemperie, deprehendi potest. Flatulentorum vero spirituum & caloris nativi inopia, ac simul seminis penuria, ex vitium naturalium imbecillitate, & corporis extenuatione dignoscitur. Simili ratione & renum vasorumque spermaticorum obstructio ac debilitas ex propriis signis deprehenditur. Ubi vero per diabolicam incantationem virgæ ignavia est introducta, id ut plurimum integra sanitate bene fruuentibus in nuptiarum festivitatibus, & primo conjugali concubitu præter spem sponſus deprehendit, quod quidem malum quibuldam per totam vitam, aliis autem per plures menses durare solet.

Curatio.

Curatio extinctæ aut impeditæ facultatis erigendæ virgæ pro causarum diversitate variabitur. Consistit autem potissimum in victus ratione, & remedium excalefacientium, flatuosumque spiritum generan-

tium & semen augmentum usurpatione.

In victus ratione conveniunt omnia, quæ Diata. probè nutriunt, & copiosum flatuosumque generant sanguinem, spiritusque vitales recreant, veluti sunt carnes gallinarum, caponum, perdicum, & potissimum eorum cerebra, columbarum & porcorum non castratorum recenter mactatorum, similiter & vitulina & avium montanarum. Idem præstant, & peculiari facultate ad Venerem excitant testiculi gallorum, porcorum & vulpium opipare cocti; Item ova recentia & dura. Ex leguminibus flatulentum spiritum generant fabæ, ciceres, pisa, & ex seminibus Erucæ, fœniculi & anisi, pastinacæque. Ex radicibus utiliter cſtantur rapæ minores, quas napes vocant, *Sternbergische Ruben* / rad. pastinacæ, carotæ, eryngii, cepæ & porrum. Ex fructibus vero profunt nuces pineæ, avellanæ, amygdalæ, ficus, dactyli & uvæ passæ. *Fructus item seu capita cinara herba, quam artichoca ex Gallico vulgus nominat, de quo Poëta:*

Hunc tibi jus perpingue coquat: præstantior inde est,

Ibit & in numeros sic Venus apta suos.

Ex aromatibus conducunt cinamomum, zinziber, crocus, piper & cardamomum: Ex piscibus specifica virtute semen augmenti cancri, carabi & conchæ marinæ, præsertim ostrea, ex quibus omnibus varia edilia parari, cum iisdemque condiri possunt. Potus illi sit vinum generosum aliquod, aut malvaticum aut aromatizatum, quod claretum vocant, & hydromeli. Verum ex iis quæ impensus exsiccant, eorum usus moderatior esse debet. Conducit præterea frequens exercitium, & agitatio inferiorum partium, & frictio moderata lumborum & inguinum. Pedes quoque calidis tegumentis muniendi sunt, & à refrigeratione arcendi. Conducit insuper nonnunquam lavare in balneo aq. dulcis, in qua cocta sint malva cum radicibus, flores chamæmeli, & semina lini atque fœnugræci contusa.

Ad medicationem quod attinet, causa primum est consideranda. Et si principes partes, veluti cor, cerebrum, renes, epas vel uni-

Cibi Venerem excitantes.

Congolatum quoque piperatum crocum, Balneum dictum, hic utile.

Potus.

Principes partes roboranda.

universum corpus aliqua intemperie potissimum frigida laborent, aut sanguis in venis frigido humore sit dilutus, earum partium nativo calori restituendo roburque inferendo diligenter est studendum; & ea medicamenta adhibenda, quæ in curatione earum partium sunt proposita. Ac potissimum si sanguis colluvie frigida est infectus primum calefacientibus remediis concoquendus est humor frigidus, deinde per haustulum ex 3 i. diaphaniconis aut 3 s. confect. hamech. aut 3 x. Diacatholici cum q. s. aq. solutis, est expurgandus.

Proderit & Clysterem alvo infundere ita paratum.

Evacuatio frigida colluvie.

Enema.

℥. Herb. Malv. Mercur. flor. Anethi, chamæmeli an. M. s. Rad. Altheæ 3 s. sem. Fæniculi 3 ii. erucæ 3 i. Concisa & confusa coquantur in jusculo galli q. s. ad tertias, colati juris accipe ℥b. i. cui admisce cassiæ extractæ 3 i. vitellorum ovorum n. ii. ol. amygdalarum dulcium recentis 3 i. fiat clyster.

Pharmaca Venerem stimulantia.

Porro inter medicamenta ignavam virgam ad erectionem excitant, Venerem stimulant, semen augent idque fecundum efficiunt hæc sequentia: Ituro cubitum patienti exhibeatur devoranda 3 i. electuarii Diasatyrion in officinis vocati, insuperque haustum vini generosi Rhenani aut vini Cretici bibat. Aut exhibeatur quant. nucis juglandis sequentis electuarii eodem modo usurpati cum haustu vini generosi.

Electuarium elegantissimum & essentia satyrionis à 3 i. ad 3 i. cum vino generoso, ituro cubitum exhibitantissimum est confortativum.

℥. Sem. erucæ, napi, pastinacæ, piperis albi & longi, zinzib. alb. an. 3 i. sem. fraxini, urticæ, lini an. 3 s. stinci Ægyptiaci veri abjectis capitibus & pedibus n. iii. testiculorum vulpis, gallorum siccatorum an. 3 ii. ramenti priapi Taurini 3 i. s. spec. Diamoschi, diambæ an. 3 i. v.

Omnibus tenuissimè pulveratis ac commixtis excipiantur sequenti syrupo.

℥. Succu caparum viridium cum pauxillo vini generosi conspersarum. Succu rad. satyrii similiter vino conspersarum an. 3 i. v. Cum quibus succis

resolvatur saccari ℥b. s. fiat syrupus ad justam consistentiam coctus, cui præscriptus pulvisculus admisceatur, fiat electuarium.

Aut devoretur mane ac vesperi ex seq. morsellis unus, & vesperi insuper hauriatur haustus vini generosi.

℥. Sem. erucæ, urticæ, anisi, fæniculi, *Morselli confortantes egregii.* pastinacæ an. 3 i. Pul. priapi Taurini & cervini in Septembri capti & arefacti an. 3 ii. Nucleorum pineæ, amygdalarum dulcium, pistacearum minutiss. concisarum an. 3 i. s. Nucis moscatæ, cubebæ, cardamomi, Zinziberis an. 3 s. Piperis longi 3 i. s. stinci Ægypt. n. iii. spec. diamoschi 3 iv. Saccari albi in aq. Cinam. soluti, & ad duritiem suffic. cocti 3 x. Commisceantur, & inter commiscendum adjiciantur ol. cinamom. guttæ v. ol. fæniculi guttæ v. ii. fiant morselli elegantes pondo 3 i. Aut exhibeatur vesperi ituro cubitum cum haustu vini generosi sequens pulvisculus.

℥. Testiculorum galli aridorum, vulpis, priapi Cervini & taurini an. 3 i. Stinci Ægyptiaci n. i. sem. erucæ, linian. 3 i. s. Rad. Eringii, Ari an. 3 s. Piperis albi & longi an. 3 i. Tenuissimè pulverata commisceantur, quibus admisceatur Ol. fæniculi 3 i. fiat pulvis, cujus *usus* est 3 i. aut 3 i. s.

Interim plurimum quoque ad virgæ erectionem faciunt & topica remedia Renes & membra genitalia calefacientia. Itaque inungatur virga, testes & peritonæum cum aq. *Spiritus stillat. ex ovis formicarum producta; aut formice leonis, quæ raro haberi potest: aut pinguedine quisculæ avis: Quiscula avis coturnix est, cujus adipem cum paucis elleboro ad vim Veneris excitandam pudendo inungit Keussnerus Medicus, teste Gesnero.* Aut ol. nucis Indicæ, aut sequenti linimento.

℥. Ovorum formicarum 3 s. conterantur, eisque admisceantur Ol. de castoreo, *Linimentum egregium.*

Odoriferum suum
specificum
Crollius ad
hunc usum
videm
commen-
dat.

Aliud effi-
cacissi-
mum.

De incan-
tamentis
& diabolici
artibus
quibus no-
velli mari-
ti ligantur.
Hæc ut ve-
nena no-
scenda, non
ut in abu-
samur, sed
ut ab illis
caveamus,
& per ea
laesos juve-
mus; Deus
enim ju-
stissimus
vindex est
sali mali-
cie.

reo, ol. de piperibus an. 3 s. succi ce-
parum, succi rad. satyrii sive or-
chidis an. 3 i. ebulliant simul ad suc-
corum absorptionem, colentur &
colato oleo admisceantur coaguli le-
poris 3 ii. Ol. nucis moscata liqui-
di 3 i. Cibeti gr. v. Moschi in vino re-
soluti gr. iii. Cera candida parum,
fiat linimentum, calorem enim nati-
vum genitalium excitat, & miram vo-
luptatem libidinis infert. Plura gene-
ra remediorum paulo post in curatione
sterilitatis commemoraturi sumus.
Ad idem efficacissimum est sequens
linimentum.

¶ Ol. ex sem. cruce stillatitii 3 i. cui
admisceantur 3 s. ovorum formica-
rum contusorum, vini cretici 3 i. ma-
cerentur simul per mensem in loco te-
pido, deinde in duplici vase aut vitro
in aquam ferventem collocato, fer-
veant ad consumptionem vini & co-
lentur, colato oleo admisceantur pin-
guedinis circa Renes vulpium exem-
pta & liquefacta 3 ii. cera albæ pa-
rum, fiat linimentum, cui rursus ad-
misc. moschi gr. iii. cibeti gr. iii.

Impotentia vero erectionis virgæ & eja-
culationis seminis, quæ inter novos con-
juges ex Diabolica Phægundus & per orga-
na Satanæ homines sceleratissimos introdu-
citur, & nihil est aliud quam ligatio poten-
tiæ naturalis nervorum virgæ, ut plurimum
per filios incredulitatis rebus ridiculis, & ta-
lium virium nihil habentibus perfici solet, ut
nucæ juglandis, fabarum gramine, testicu-
lis galli cum sanguine exentis, acu qua ca-
davera mortuorum in lintheamina sunt con-
futa: Certoque modo certis verbis pronun-
ciatis in novorum conjugum cubiculis ea
collocant ac disponunt. Quidam & chara-
cteribus ad suam hanc malitiam perficien-
dam utuntur. Hujusmodi autem maleficium
cum prorsus sit trans naturam, & præstigium
cacodæmonum, æque impii & superstitiosi
homines quidam, æque ridicula remedia ad
tollendum maleficium excogitarunt, ut ni-
mirum Sathan impietatem & superstitionem

in eis consumaret. Inter tales Medicos prin-
cipem locum obtinet Bombastus Paracel-
sus, ut videre est in archidoxis ejus ma-
gicis.

Quam impia autem & superstitiosa hæc
sint Bombasti, aliorumque magiæ dedito-
rum figmenta, quilibet sacris literis aliter e-
doctus, facile æstimare potest.

Ridicula etiam sunt ea quibus in hujus-
modi maleficii aut ligationis naturæ solu-
tione atque curatione rustici nostrates u-
tuntur, naturalia quidem, & sine aliqua
superstitione ab iis usurpata, sed talia ta-
men quæ per se nullarum sunt virium, nec
eas in se continent *deus apes*, ut maleficium
solvere possint, nisi omnem salutis fidu-
ciam & persuasionem in ea collocent, quod
non caret impietate; talia autem sunt hæc
sequentia.

Si sponsus vel novus maritus statim ubi
sensit dolum, mingat per anulum, quem
in copulatione à sponsa accepit, abluetur
maleficium.

Item si quis fascinatus herbam quamcun-
que per scissuram aut foramen saxi aut ali-
cujus lapidis enatam exiccatam & in pulve-
rem redactam pondere unius drachmæ cum
vino bibat, cessabit impostura & male-
ficium.

Item cor cornicis gestatum à fascino ma-
leficioque liberare creditur.

Sed omnis superstitiosis nugis, qua ego
curandi ratione feliciter usus fuerim & natu-
ralem potentiam restituerim breviter com-
memorabo.

Primo cohortatus sum patientem, ne ob-
technas diaboli curis se maceraret, sed una
cum conjugæ per dies aliquot à Venere ab-
stineret, & Deum Opt. Max. autorem con-
jugii ardentibus precibus fatigaret, ut ipse
per Filium suum Dn. nostrum Jesum Chri-
stum destrueret opera diaboli propter suam
ordinationem.

Secundo jussi ut diligenter materiam fa-
scinii in lecto, sub lecto, in stragulis, cer-
vicalibus, & tota lecti suppellectile inquire-
rent. Quin & ut terram sub postibus, limiti-
bus januæ, cubiculi effoderent, & si quid ma-
leriei

Vulgi nu-
ga ad liga-
tionem sol-
vendam.

Vera & na-
turali li-
gaturum
curatione.

Preces.

Expurga-
tio cubicu-
li.

H h

teriei reperirent, igne comburerent, & cubiculum aut saltem lectum, stramina & lectisternia mutarent ac renovarent.

Evacuatio corporis.

Tertio jussi patientis corpus pro ratione redundantis humoris convenientibus remediis, potissimum autem VII. 3. benedictæ laxativæ in vino resolutæ, ab infectis humoribus purgati, & purgato corpore, ut quoque spiritus naturales simul purgentur, suasi patienti ut intraret balneum sudorificum, assumeretque diaphoreticum sequens remedium.

Sudorifica.

℥. Theriacæ Andromachi 3 i. Pulscordii, zedoariæ, Aristolochiæ rotundæ, corall. rub. præparat. an. 3 i.

Commisceantur cum haustulo aceti, & ante ingressum balnei ebibatur tepidus.

Confortantia.

Ita purgatis humoribus & spiritibus, jussi ut singulis diebus ituri cubitum ambo conjuges devorarent juglandis quantitatem electuarii diasatyrii vocati, & superbiberent haustum vini generosi, ac tandem post horam in timore Domini operam darent liberis. Quo curandi genere ex benignitate Dei non tantum pristinas vires naturæ, sed & fecunditatem brevi restituimus.

SECTIO II.

DE TESTIUM AFFECTIBUS.

1. Testes & vasa spermatica quid, & quibus morbis infestantur?

Testes quid.

Organi, testes, & ἰδρυγὶ substantia constant glandulosa, alba & cavernosa, figura ex rotundo nonnihil oblonga. In viris infra virgam inter inguina propenduli sunt siti, seminificatrice facultate præditi. Nullum enim animal perfectum sine testibus gigni potest.

Vasa spermatica quæ. Vnde oriuntur.

Vasa spermatica sunt duo canales, quorum singuli ex una grandi vena, & ex una insigni arteria simul copulatis ac conjugatis constructi sunt, quorum dextri vena exoritur ex trunco venæ cavæ, Arteria vero ex trunco Aortæ, quæ subjacet venæ cavæ. Sinistri vero vasis vena oritur ex vena emul-

gente, & arteria ex arteria emulgente eidem venæ subjecta. Hæc dico vasa sive ductus per peritonæum usque ad pubis ossa descendentes, per peritonæumque transeuntes in involucrium testium implantantur, testibus ipsis seminis materiam, sanguinem videlicet purissimum & spiritum vitalem subministrantibus. Testium autem & horum vasorum morbi præcipui sunt:

Seminis corruptio, *Morbi testium.*
Seminis involuntarium profluvium,
Testiculorum tumor,
Testiculorum contusio & vulneratio,
Sterilitas.

2. Seminis redundantis & diutius retenti corruptio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & ut curanda?

Διαφθορὰ τῆς γονῆς, Genitura seu seminis corruptio. Γονή, genitura vel ἀρτήρ, semen, est sanguis ex arte percoctus, & cum multo spiritu vitali perfusus per seminaria vasa ad testes delatus, ibidemque specifica virtute testium, eorundemque alba substantia in semen, hoc est in materiam sanguine crassiorē, magis lentam albamque conversus.

Quemadmodum enim lac in mammis ex sanguine, ita semen in vasis spermaticis & testibus conficitur. Utrumque autem & lac & semen excrementum est utile ultimæ concoctionis. Cum autem omne excrementum in partibus coacervatum diutiusque retentum, nisi tempestivè excernatur, naturam vel copia ac pondere aut vitiosa qualitate gravet, lædat, & destruat: vitiosam autem qualitatem acquirit aut per putrefactionem, aut per mixturam venenosorum humorum: itaque & lac & semen, illud quidem in mammis, hoc vero in testibus ac vasis exauctum, & diutius retentum, maxime in adulta ætate, gravissima & perniciosissima infert symptomata, & teste Galeno, longè sæviora quam retentio menstrui sanguinis. Suo enim venenoso vapore ferit & inficit cerebrum, cor & epar, & agit homines in furorem, capitis continuos dolores & gravitatem infert, anxietatem cordisque palpitationem, & difficultatem respirationis

parit,

parit, tumorem & inflationem hypochondriorum & ventris inferioris excitat, appetentiam concoctionemque prostermit, & tandem in talem hominem conjicit: Postremo autem ex corrupto semine intumescit hypogastrium, & sudor frigidus erumpit, & interit animal.

Quibus poriff. hac mala eveniant.
Corripiuntur autem hoc malo viduæ continentest castæque viventes, virginesque nubilem ætatem excedentes, & adolescentes virique continentiores, qui semine abundantes. Hisce autem periculosissimis symptomatibus cum colluvies monachorum & monacharum & tota caterva sacrificulorum, quæ castitatem spontaneam DEO voverunt, nunquam aut rarissimè corripiantur, qualis sit eorum castitas, quilibet conjicere potest.

Causa. Causæ *απορρυθμίας* redundantæ & putrefactionis seminis sunt, seminis copia in vasis & testibus diutius retenta, impurus & vitiosus sanguis ex toto corpore ad vasa seminaria defluens, semenque inficiens, contemptus & neglectus conjugii in nubili ætate: voluntas pugnans cum natura & divina ordinatione, quæ conatur seminis cursum prohibere in iis in quibus non est donum continentia. Causæ *απονευσετικαί* sunt victus ratio lauta & opipara, vita otiosa, & medicamentorum semen augmentum crebrior usus.

Signa. Signa sunt, continua ferè ad libidinem titillatio, virgæque crebra extensio, inguinum intumescencia, ac tandem ubi corruptum est semen, prædictorum symptomatum consecutio.

Curatio. Curatio. Nemo Medicorum, quod ego quidem sciam; curationem hujus mali præscripsit, & nec ego quidem attigissem, nisi sæva illa symptomata, ex corruptione seminis orta, sæpius conspexissem. Etsi autem Galenus lib. 6. cap. 5. de locis affectis ex seminis corruptione symptomata provenientia enumerat, curandi tamen rationem veram & legitimam non indicat. *Natura enim ipsa se gravatam sentiens seminis copia ea se liberat in somno gonorrhagia spontanea, quam pollutionem nocturnam vocant. Inde etiam*

rardè admodum hac symptomata à seminis retentione excitantur, nisi vi expultrice lapsa. Tum Natura subvenire Medicus Naturalibus remediis debet.

Vera autem curatio consistit in præservatione, ne in vasis semen exuberet, & si corruptum sit, in tempestiva & legitima seminis corrupti evacuatione. Regulare enim est, repletionis evacuationem, & evacuationis repletionem, esse remedium. Præservatio itaque sita est in victus ratione, venæ crebra sectione, & remediorum semen generari prohibentium ac diminuentium usurpatione. Porro ad seminis generandi prohibitionem imprimis temperantia, inedia, & tenuis victus ratio, & continuus labor plurimum conducit. Tota autem victus ratio debet esse refrigerans, & quæ parum sanguinis generet. In cibo itaque conveniunt cremor pisanæ, usus lactucæ, portulacæ, bliti & atriplicis. In potu aqua hordei & tenuis cerevisia conveniunt. Sedulo autem vitanda sunt omnia calefacientia, lauta & opipara convivia, & inprimis vinum. Sine Cerere enim & Baccho friget Venus.

Venæ sectio epaticæ crebra in plethoricis corporibus & otio deditis plurimum detrahit materiam seminis. Porro remediorum alia semen specifica facultate extinguunt ac diminunt, veluti sunt semen viticis, mentha & ruta, per se pulverata aut simul mixta, & pondere ʒ i. cum aceto indies exhibita. Alia vero refrigerando seminis copiosi fervorem & titillationem extinguunt: talia sunt pulvis rad. ac sem. nymphaeæ, semen lactucæ, portulacæ & papaveris per se aut simul mixtis pondere ʒ i. indies cum aq. Plantaginis assumpta. Idem præstat & ʒ i. trochiscorum è camphora pulveratorum assumpta, & sequentis Electuarii semijuglandis q. devorata.

℞. Conser. rosar. flo. nymph. an. ʒ i. Rad. viticis an. ʒ i. Corallii albi præparati ʒ i. syr. è nymph. q. s. Fiat Electuarium.

Quin & topica remedia externè lumbis & testiculis inguinibusque utiliter applicantur, quæ vasa seminaria & ipsum semen refrigerent, veluti est sequens Ephithema.

H h h 2 ℞. Aq.

Epithema. 2℥. Aq. nymph. plantaginis an. ʒ iii. Aceti rosacei ʒ vi. aq. rosarum ʒ ii. Albuminum ovorum cum liquoribus concussorum n. ii. Camphoræ pulveratæ ʒ s.

Commisceantur, fiat Epithema, quod duplicatis linteolis exceptum, partibus commemoratis applicetur.

Putridi seminis evacuatio. Ubi autem jam seminis copia in vasis spermaticis putrefacta est, ejusque vapores vitiosi cerebrum, cor, & epar ferire & turbare cœperint, & commemorata symptomata excitent, antequam labefactetur natura, corruptum semen omnino evacuandum est. Cum vero Deus severissimè prohibuerit seminis abusum & vagas libidines, & semper pœnæ horribiles subsequantur, ut exempla Sodomitarum ostendunt, unicum huius mali salutare remedium est, conjugium. At cum quibusdam ob causas graves tam cito conjugium inchoare non liceat, antequam natura prorsus labefactetur, his remediis est utendum.

Spir. ☉ Exhibeantur ægrotanti quotidie ix. gutt. ol. vitrioli, quod semen corruptum & glutinosum extenuet: deinde ducatur patiens in balneum aquæ dulcis, in qua coctæ sunt rad. & herb. Alth. Mal. chamæmel. & Melilotum; in eoque balneo diutiusculè commoretur æger; ac post balneum cogatur ad equitandum aut saltationem violentiorem, qua commotione partium, semen corruptum excutitur. Id quod Hippocrates non tantum, sed & sætum hac ratione ejectum esse, scribit.

3. *Seminis involuntarium profluvium quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandum?*

Gonorrhœa quid. Γονόρροια, seminis profluvium. Vocabulum derivatum est à γόνι vel γόνι genitura, γόνι id est fluere. Est autem γονόρροια seminis involuntaria & crebra effluxio, quandoque cum virgæ extensione, Venerea imaginatione, & cum quadam voluptate ac titillatione: nonnunquam verò sine sensibili perceptione virgæque extensione, nulloque insomnio Venereo antecedente.

Causæ αἰσθητικῆς τῆς γονόρροιας sunt aut imbecillitas potentiae retentricis in vasis spermaticis; quæ imbecillitas oboritur aut ex humida, & calida intemperie vasorum spermaticorum; aut propter refrigerationem nimiam Renum ac vasorum; aut ob seminis humidioris & calidioris statulentam copiam; aut ob ejusdem tenuitatem & acrimoniam vasa continentia aut gravantem aut violentam. Προκιττικῆς sunt longa continentia post consuetum usum Veneris, item immoderatus Veneris usus vasa dilatans, & retentricem facultatem prosternens, usus denique alimentorum calidorum & humidorum aut statulentorum.

Signa causarum: Si αἰσθητικῆς profluat cum Venerea imaginatione, & cum voluptate quadam erectioneque virgæ, ostendit copiam seminis & caliditatem acrimoniamque, & tum semen ut plurimum crassius est, & ad luteum colorem declinat. Ubi vero imbecillitas vasorum ex refrigeratione, aut ex nimia humiditate seminis profluat semen, tum sine sensu, sine extensione virgæ & sine voluptate profluit, & semen est aquosum.

Γονόρροια utrique sexui contingit; ο- Prognostic-
mnum maximè autem adolescentibus, virginibusque adultis, & viduis continentibus. Si seminis profluvium diutius perseveret, fœdum & pallidum colorem infert, universumque corpus in tabem conjicit. Gracilescunt enim partes, præsertim circa lumbos, & oculorum cavitas subsequitur.

Curandi modus τῆς γονόρροιας secundum diversitatem causarum cum per victus rationem erit. Debent autem esse & alimenta & medicamenta, quæ excicandi, & semen condensandi ac constringendi facultate sunt prædita.

Quantum ad victus rationem spectat, Diata. partium superiorum exercitium & frictiones humeri non quidem mane sed vesperi plurimum conferunt, studiosè autem vitetur decubitus supinus. Et præstat semper in dextro, quam sinistro latere cubare. Absint quoque cogitationes, lectiones & collocationes Venereæ. In alimento præstat Cibi convenienter.

temperantia, & cibus uti tardè concoquibilibus, & paucum sanguinem generantibus, veluti sunt carnes bubulæ fumo duratæ, carnes leporinæ, ac cervinæ: magis autem assa, quam elixa, conveniunt. Pane bis cocto utatur. Potus ejus sit tenuis cerevisia, aut lac ex semine canabis cum aqua, in qua candens ferrum sæpius est extinctum, confectum. Vinum meracius, & omnia, quæ calefaciunt & humectant, flatus & copiam seminis generant, diligenter sunt vitanda, de quibus paulo ante dictum est.

*Vbi causa
necesse cali-
da qua con-
veniant.
Cholagoga
exhibenda.*

Porro quantum ad medicationem attinet, corporis temperies & natura omnium primum est consideranda. Et si corpus ægrotantis sit calidum & biliosum, semineque abundet, & quod profluit sit tenue, flatulentum & ad libidinem titillans, biliosus humor primum purgetur per Rhabbarbari infusi liquorem cum syr. rosaceo solutivo mixtum, aut pulpæ cassiæ aliisque remediis cholagogis, quorum copiam & parandi modum, quantitatemque exhibendi, creberrimè in superioribus indicavimus. Deinde exhibeantur remedia refrigerantia, & semen condensantia, veluti sunt pulveres rerum subsequen-
tium, aut inter se commixtarum, pondere unius aut sesquidrachmæ, mane ac vespri cum haustu lactei liquoris ex seminibus canabis confecto, radicis nimirum aut sem. nymphaeæ, sem. viticis, sem. rutæ, rad. tormen-
tillæ, coral. rubei præparati, aut ex his concinnetur talis pulvisculus.

Pulvis.

℞. Rad. nymph. ʒ ii. sem. ex rosis luteorum, quæ Anterababaris vocatur ʒ i. Boli Armenii, corallii albi præparati an. ʒ s. sem. viticis. fol. rutæ an. ʒ i. fiat pulvis. Huic pulveri si admisceantur ʒ ii. conser. rosaceæ veteris, fiet nobile Electuarium ad compescendum fluorem seminis, cujus semijuglandis q. mane ac vespri devorari potest. Aut exhibeatur patienti mane ac vespri haustulus tepidus iv. ʒ. sequentis portionis.

Decoctum.

℞. Polygoni sive sanguinaræ, Acetosæ, Plantaginis an. P. i. Portulacæ,

capreolorum vitis, umbilici Veneris, sarmentorum rubi viridium, & sursculorum viridium prunorum sylvestrium an. M. s. Fructuum mirtyllorum, sem. coriand. præparat. papa. albi an. ʒ iii. Conser. nymph. boraginis, violarum an. ʒ s. sem. rutæ, viticis an. ʒ ii. Mentæ, calaminthæ an. ʒ i. Contusis contundendis & concidendis concisis, in cantharumque positis adfundantur aq. pluvialis, in qua ferrum candens ter est extinctum lb. iiii. Succorum granatorum, Cytoniorum, rosarum an. ʒ iii. oblito cantharo & in ahenum aq. plenum collocato, per duas horas coquantur, deinde per se refrigerata colentur, colatum jus dulcescat per admixtionem syr. Cytoniorum ʒ vi. fiat potio. Aut si cui potio adveseretur, utatur sequentibus morsellis.

*Possent &
extractum
ex hisce
parari in
eundem usum
conducens.*

℞. Sem. rutæ, agni casti, Plantaginis an. ʒ s. sem. lactucæ, portulacæ, papaveris albi an. ʒ i. sem. Coriandri præparati, canabis torrefacti an. ʒ i. Cornu cervini usti & præpar. Coral. albi præpar. succini alb. præpar. an. ʒ ii. Spec. Diacalaminthæ ʒ i. saccari alb. cum aq. rosar. dissoluti ʒ vi. Fiant morsuli secundum artis legem pondere ʒ i. de quibus unam devoret patiens mane ac vespri.

Morsuli.

Interea nec applicatio remediorum topicorum prætereunda erit: Lumbi itaque & inguina ac testes inungantur quotidie bis sequenti linimento.

Topica.

℞. Ol. rosarum, Cytoniorum, Myrtillorum, nymphaeæ an. ʒ ii. Mucag. ex sem. Cyton. contusis & in succo polygonii maceratis ʒ ii. Ceræ parum, fiat linimentum, cui admisceri possunt commodè pulveres boli Armenii, sanguinis draconis an. ʒ ii. Aceti rosacei pauxillum.

Linimentum.

Quin & ol. nymph. & cytoniorum simul mixtorum post evacuatam alvum commo-

H h h 3 de re-

dè recto intestino per siphonem infundi possunt. Incumbit enim rectum intestinum vasis semen deferentibus.

Lamina plumbea.

Extinguit quoque fervorem seminis & condensat lamina tenuis ex plumbo formata & lumbis applicata alligataque: aut folia viridia nymphae lumbis inguinibusque imposita. Aut prædictis partibus applicetur sequens cataplasma.

Cataplasma.

℞. Dactylorum contusorum ℥ iv. farinæ fabarum ℥ i. Pul. Acatæ, hypocistidos an. ℥ s. Boli Armenii ℥ s. Ol. cytoniorum ℥ ii. vini rubei q. s.

Coquantur simul ad pulvis formam, fiat cataplasma, quod bis singulis diebus imponatur tepidum.

Balneum.

Præter hæc in calidis naturis & ferventiori semine plurimum confert sequens lotio, crebraque balneatio in frigida aq. aut in thermis ex alumine & sulphure aut ferre constantibus.

In frigida causa quid agendum.

Verum ubi corporis temperies frigida & vasorum spermaticorum retentrix facultas ex frigiditate labefacta est, vel semen fit justo frigidius & instar feri aquosius redditum invitis profluat, cumque semen subinde extillet sine sensu & omni ad libidinem titillatione, præscripta remedia omnia cum interna tum topica, (exceptis seminibus rutæ & viticis) adeo nihil conferunt ut etiam noxam inferant, & malum exacerbent.

Curatio prioris contraria hic instituentia.

Quare tum postpositis omnibus præscriptis remediis, curatio contraria est instituenda alimentis & medicamentis moderatè calefacientibus & exiccantibus.

Primum igitur si corpus patientis frigidis humoribus tedundet, ii concoquantur & evacuentur per convenientia remedia in superioribus toties repetita & præscripta. Prodest autem maxime sequenti clystere à frigidis humoribus inferioris ventris viscera eluere.

Enema.

℞. Rutæ, Menthæ, calaminthæ an. M. i. viticis ℥ i. Mercur. Malvæ, flor. chamæmeli an. M. s. Concisa coquantur in q. s. aq. ad medias, cola si juxta accipiatur lb. i. eique admi-

sceantur hieræ simpl. ℥ i. Benedictæ laxativæ ℥ s. ol. rutæ ℥ ii. salis communis ℥ i. fiat clyster, qui tepidus recto intestino, ventriculo adhuc jejuno existente, infundatur.

Subductis frigidis humoribus victus ratio præscribatur moderatè calefaciens, & exiccans, tenuisque semen condensans, ex quibus sunt caro bubula assa, caro asnerina & cervina, vitella ovorum duriora, panis bis coctus & cum sem. carvi conditus, ossula ex tosto pane & vino cretico parata: porus sit moderatus vini cretici, aut alterius generosi.

Victus ratio calida & sicca.

Omni mane corporis partes superiores, ut brachia & pectus donec incalescant exercentur aut confricentur calidis linteolis. Ventriculi cruditas & omnia alimenta pituitam aut flatum gignentia sedulo vitentur. Et si cruditatem aut flatum collectos esse suspicio sit, prodest singulis septimanis ante prandium ℥ s. aut ℥ ii. pillularum hieræ simpl. deglutire. Deinceps utatur singulis diebus seq. pulvisculi ℥ i. cum haustu vini ante cænam ebibita, qui & semen condensat, & profluvium ejus cohibet, & ventriculum corroborat.

℞. Cineris intestinorum gallinæ prius probe mundatorum, & in vino elocutorum ac deinde combustorum ℥ s. sem. agni casti, rutæ an. ℥ ii. Mentæ, cornu cervi usti ac præparati an. ℥ s. Pulverata tenuissimè commisceantur, quo commodè utatur paulo ante prandium, & simul post cænam ubi non amplius bibere velit patiens. Aut ejus loco assumat cum vino mensuram cochlearis sequentis tragematis.

℞. Cineris intestinorum Gallinarum, pellicularum lutearum ex ventriculis gallinarum detactarum an. ℥ s. sem. anisi ℥ i. Galangæ ℥ i. corallii præp. sem. agni casti an. ℥ iv. saccari candidi pulverati ℥ i. s. Omnibus tenuissimè pulveratis commisceantur, fiat Tragea. Topica quoque remedia desiccantia & constringentia foris appli-

Tragea.

Topica.

applicari debent: Alvo itaque prius expurgata per commemoratum Enema, sequenti liquoris § 1. aut 11. in intestinum rectum per syphonem infundantur.

Liquor per
clysterem
infunden-
dus & ex-
trinsecus
applican-
dus.

4. Iridis Illyrica § 11. Myrtillorum § 1. s. Mastiches, caryophyllorum an. § 3. s. Nucum cypressi, sem. rosarum, agni casti, rutæ an. § 1. v. Contusa crassiusculè coquantur in f. 1. vini rubei ad tertias, deinde colentur, & colatum jus in rectum intestinum impellatur, cujus reliqua parte tepida panno aut linteolis duplicatis excepta inguen & testes fovendi sunt: Liquore autem injecto cubet æger pronus super ventrem.

Aut inungantur lumbi & inguina sequenti linimento tepido singulis diebus bis.

Linimen-
tum.

Admisceri
possunt ol.
masticchi-
ni stillat.
gust. ali-
quot ad
majorem
efficaciam.
Ad exulce-
rationem
ductus uri-
narii.

4. Ol. myrtillorum, è mastiche, Irini an. § 11. ol. stillat. ex caryophyllis, nucibus moscatis an. § 3. s. Ceræ parum, fiat linimentum, cui admisceantur tenuissim. pul. agni casti, seminis rutæ an. § 1. fiat unguentum.

Ubi vero ex acrimonia profluentis seminis internus virgæ meatus, ut sæpe contingit, exulceratus fuerit, tum seq. pulvis cum lacte muliebri temperatus ac commixtus singulis diebus quater per syphonem intra virgam usque ad locum affectum impellatur.

Pulvis o-
ptimus.

4. Tutia præparata § 11. sarcocollæ lotæ, Aloës Hepaticæ, saccari candi an. § 1. s. Pulverentur tenuissimè ac commisceantur: & præterea consuatur curatio exulceratæ virgæ paulo ante tradita.

4. Testiculorum tumor quid, quæ ejus differentia causa, quæ signa, & quo pacto curandus?

Tumor te-
stium quo-
plex.

Ἀπὸς ἡμῶν τῶν ὀρχέων, tumor testium. Intumescunt in viris crebro testiculi non secus ac in mulieribus mammae. Differentiæ tumorum quæ testiculis accidunt, (præter illum qui ex hydropè nascitur, de quo ante disseuimus, & Ramicum species de quibus paulo post, in Inguinum morbis, tractaturi sumus)

quinque sunt, φλεγμονώδης tumor inflammatus sanguineus, διημερώδης tumor frigidus & pituitosus, σκληρώδης tumor durus & melancholicus, ὑδαρώδης tumor aquosus, πνευμονώδης tumor flatulentus. Hi tumores aut in scroto, id est capsula sive externa cute testiculorum, aut inter alia duo eorum involucria, aut in ipsa testiculorum substantia, (qui omnium est periculosissimus) excitantur.

Vbi con-
tingat.

Causæ inflammari tumoris αἰτιαμένην Cause tumores sunt sanguineæ massæ accensæ & inflammatae ad scrotum aut testes copiosa defluxio ibidemque collectio. Προσχεκτικαὶ sunt lapsus ex alto, aut testium violenta contusio compressioque.

Signa tumoris inflammati seu sanguinei Signa sunt παθητικὰ, totius corporis vehementer dolor: si ex puro sanguine excitatus sit tumor, est extensus; si vero sanguis biliosior sit, dolor est acris, & totius corporis habitus est biliosior, urens testium caliditas, & rubedo excellens in summa cute testium.

Prognostica: Diutius neglecta curatio inflammati & sanguinei tumoris testium, pessima infert symptomata, ut intolerabilem dolorem testium, mortificationem & lapideam duritiem: Celsus lib. 6. cap. 18. inquit; inflammatio testiculorum febres adfert, nisi celeriter conquieverit, & nervi, ex quo testiculi dependent, simul intumescunt.

Prognosti-
ca.

Curatio inflammati tumoris testium in victus ratione, venæ sectione, & remediorum convenientium applicatione consistit. Primum itaque si alvus est adstricta, statim subducatur leni clystere ex f. 1. aq. hordei, cui admixta sint § 11. cass. & § 111. ol. viol. & § 1. salis confecto, & recto intestino infuso Deinde si ætas & vires ferant, retractionis sanguinis adfluentis causa secetur vena epatica dextri lateris, aut affigantur cucurbit. hypochond. cum scarificatione. Humeri autem calidis linteolis subinde conficiuntur, nimirum versus brachia deorsum reuulsione causa, aut sæpè strictius ligentur fasciis.

Curatio tu-
moris ex
inflammatione.

Enema.

Vena se-
ctio.

Dieta.

Tandem præscribatur ægrotò victus ratio refrigerans & humectans, veluti sunt cremor ptisanæ, lac Amygd. pruna Ungarica, & reliqua alimenta aceto condiantur.

Potus ejus sit aut cerevisia clara & tenuis, qualis est Brunsvicensis & Eimbecensis, quæ melior, aut aq. hordei in qua cinamom. pauxillum est incoctum. Postea purificetur massa sanguinea in plethoricis quidem corporibus cum ʒ i. s. pulp. cass. recent. extractæ devorata, aut cum haustulo decocti Tamarind. paulo ante prandium ebibita. Si vero corpus fuerit biliosum, purgetur haustulo infusionis Rhab. ʒ ii. in aq. cichor. q. s. per noctem maceratarum, in qua dissolutæ sunt ʒ ii. syr. rosarum solut.

Dolorem sedantia.

Purgato corpore statim vel etiam ante purgationem animus ad doloris mitigationem est convertendus. Dolor enim vires prostermit, curationem impedit, & fluxum sanguinis allicit. Initio itaque imponantur inflammatis & tumentibus testibus remedia caliditatem repellentia, id est frigida & astringentia, veluti est sequens Epithema.

Epithema.

ʒ. Aq. stillat. rosar. plantag. aceti rosarum an. t̄b. β. Album. ovor. N. iiii.

Conquassentur simul & panno laneo aut linteo duplicato excepta, tumentibus partibus imponantur. Idem præstat doloremque auferit vinum rub. austerum eodem modo applicatum. Aut

Cataplasmata anodyna.

1.

ʒ. Ol. rosar. ʒ iiii. lutei ovorum n. iiii. Micæ panis similacei, in ferventi aq. macerata & rursus expressæ.

Contundantur simul in mortario, fiat catapl. & tument. testibus bis singulis diebus imponatur. Aut

2.

ʒ. Herb. ac. rad. hyoschi. coquito sub calidis cineribus, deinde contunde in mortario ac admisce adipis recentis suillæ, fiat cataplasma. Aut

3.

ʒ. Fol. Plantag. solani, semper vivi an. M. i. conterantur una cum aceto, aut vino in quo cocti sunt cortices granatorum & sem. sumach. an. ʒ s. & addita farinæ hordei q. s. fiat cataplasma, quod tepidum singulis diebus bis applicetur. Præterea in genere tu-

4.

mori testiculorum & mammarum in-

flammato convenientissimum cataplasma fit ex q. s. farin. fabar. cum aq. sufficienti in pulvis formam cocta, eademque admixta q. s. ol. rosar.

Dolorem mitigat & inflammationem compefcit mirifice sequens linimentum inflammatis testibus illitum.

ʒ. Ung. popul. Ol. rosacei an. ʒ s. Mucilag. ex ʒ i. sem. psylli & tantundem sem. hyosch. contus. & cum pauca rosar. aq. macerat. confectæ ʒ ii. ceræ albæ parum, simul resoluta ac commixta illiniantur. Omnia hujusmodi repellentia ac refrigerantia sæpius reiteranda & renovanda erunt, usque ad tumoris decrementum.

Post doloris & inflammationis sedationem vel mitigationem, magis digerentia & lenientia applicare conveniet, veluti est sequens cataplasma Avicennæ.

ʒ. Pul. fol. Malvæ, Absinth. Rosar. an. ʒ s. Croci ʒ i. farinæ hord. ʒ i. coquantur ad pult. formam cum vini rub. q. s. cui admisce ol. chamæm. q. s. fiat cataplasma, quod tepidum per duplicatum linteolum extensum singulis diebus bis tumori imponatur. Deinde in statu tumoris, id est post sex aut septem dies, si dolor extensivus urgeat, rursus sequens cataplasma imponatur.

ʒ. Medullæ panis t̄b. s. & cum liquore mucoso mucilaginoso aq. in qua decoctæ sunt rad. Alrh. Malv. an. ʒ s. Flo. Chamæm. Melilo. an. M. i. q. s. maceretur panis, & rursus expressus admisce Ol. rosar. q. s. fiat Cataplasma. Sed subsequens magis etiam per halitum tumorem digerit.

ʒ. Pulv. parietar. Malv. an. ʒ i. furfur. tritic. farinæ volat. in parietibus molendinarum collectæ an. ʒ s. pulv. fænugræci, anethi an. ʒ iiii. Croci ʒ i. coquantur in vino ad pultis formam, eisque admisce ol. chamæm. q. s. fiat cataplasma.

Efficaciss. quoque est Empl. ex medulla panis efficaciss.

Linimentum egrogium ad dolorem & inflammationem.

Cataplasma digerens.

Ad dolorem extensivum.

Aliud efficaciss.

panis filiginei q. s. in ferventi aq. per horam macerata, tandemque probè expressa, eique q. s. mellis rosa. admixta, & in Emplastri formam redacta, quæ semel in die applicare satis erit. Tumorem enim discutit & dolorem mitigat.

Discussio. Porro in declinatione morbi post 9. aut 10. dies ubi nonnihil tumor diminuitur, tum sufficere solis discutientibus uti, veluti sunt far. hord. cum melle temperata, & instar cataplas. applicata, aut vinum calefactum & lana succida exceptum testibus applicatum.

Suppuratio. Ubi verò tumor digerendo discuti nequeat, sed ad suppurationem ac saniem tendere videatur, ad ea remedia transeundum erit, quæ materiam tumoris maturant & pus generant: Id autem probè præstat cataplasma ex triticea farina in aq. decoct. rad. Alth. decoctæ, & q. s. ol. Chamæmeli admixta, bisque in die admota. Tale Empl. confici quoque commodè potest ex far. hordei aut medulla panis. Sed præstantius cataplasma tale confici potest.

Cataplasma maturans aperiens. ℞. Rad. Alth. rad. lil. alb. Herb. senecionis, fol. malv. omnium viridium an. M. i. Contundantur exactissime & cum q. s. aq. ad pulvis formam coquantur, eisque admisc. ℞ i. far. tritic. pul. se. lini ℞ i. Axungia suillæ recen. ℞ iiii. fiat catapl. quod singulis diebus bis applicetur.

Tumor aperiendus. Ubi materia tumoris maturavit jam, & in pus est conversa, si scrotum sive cutis testiculorum exterior ultro non perumpatur, scalpello est aperiendum, & pus omne evacuandum, abstergendum & ulcus ipsum convenientibus chirurgicis Emplastris, de quibus suo loco dicturi sumus, consolidetur & ad cicatricem deducatur.

Tumor ædematosus testium quid. Ὀιδηματώδης testiculorum est tumor frigidus & laxus. Ὀιδημα enim omnem tumorem laxum & doloris expertem significat.

Causa. Causa frigidi & laxi tumoris testiculorum protægumena est adfluxio pituitæ frigidorumque humorum in scrotum, aut ipsos testiculos. Procatartica sunt casus ictusque

violentus & dolorificus, frigidos humores alliciens, & alimentorum frigidorum & pituitosorum frequens usurpatio.

Signa pituitosi tumoris sunt: Tumor est *Signa.* laxus & mollis dolore carens, & qui prementi digito cedit, & cava digitorum vestigia relinquit, colorque tumoris ad albedinem vergit. Prognosticon tumoris testiculorum pituitosi: Tumor pituitosus, si non auferatur per resolutionem seu exhalationem, in abscessum & saniem convertitur. Ubi tumor testiculorum citra remedium applicationem repente evanescit, metendum est, ne ad supernas partes deferatur & brevi periculosos excitet morbos.

Curatio in victus ratione & remedium *Curatio.* applicatione consistit. Victus rationem oportet esse moderatè calefacientem & pituitosos humores extenuantem. Conveniunt itaque in cibo panis bis coctus, cui admixta sunt sem. coriandri & carvi; ex carnibus profunt ovilla, bovilla, & avicularum campestrium, assa quam elixa magis sunt comedenda: Vitandi sunt pisces, lacticia, & fructus fugaces. Præstat autem condire edulia pipere, croco, Zinz. cina. & satureja. Potus sit vinum tenue, aut cerevisia probè defecata atque plenior.

Ad medicationem quod attinet, primum subducatur alvus seq. clystere.

℞. Flo. chamæm. centaur. absinth. an. *Enema.*

M. i. se. carvi, anisi an. ℞ i. coquantur in q. s. aquæ ad tertias, colati juris accipe lb. i. cui admisc. hieræ simpl. ℞ i. Diaphæn. ℞ i. s. Ol. absinth. ℞ iiii. salis ℞ i. fiat Enema, quod tepidum recto intestino infundatur.

Ubi vero post clysterem alvus obstructa fuerit, ægrotanti comedendi offerantur ficus n. vr. medulla se. cartami concisa infarcti ac repleti & ad ignem calefacti. Deinde si corpus universum pituitoso humore redundet, pituita extenuetur & ad educationem præparetur per v. dies assumptis ℞ v. calefactis mane ac vespere seq. potionis.

℞. Rad. fænic. petros. pimpin. an. ℞ iiii. *Decoctum*
Angelic. ℞ ii. Fænic. fænic. pituitam
caryi extenuans.

carvi an. $\frac{3}{4}$ s. Bac. Junip. $\frac{3}{4}$ s. Herb. hyssopi satur. Card. bened. rorismar. an. M. s.

Concidenda concidantur & contundenda contundantur, & cum hydrom. lb. 4. in duplici vase five cantharo oblinito concoquantur per 2. horas, refrigerata colentur & colato juri admisceantur oxymel. simpl. $\frac{3}{4}$ vi. fiat potio. Aut paretur extenueturque crassa pituita potionibus supra in pituitosis capitis affectionibus, & in tabellis medicamentorum pituitam præparantium præscriptis: tandem per intervalla bis terve evacuetur pituita seq. haustulo.

*Hauſtus
phlegma-
gogus.*

$\frac{1}{2}$. Fol. fenæ, Agarici Troch. an. $\frac{3}{4}$ i. s. macerentur in aq. fenic. $\frac{3}{4}$ v. per noctem, manè autem leniter ebulliant, exprimantur ac colentur, colato jussculo admisc. Diaphæ. $\frac{3}{4}$ i. fiat haustus, qui tepidus in aurora ebibatur. Aut

Pillule.

$\frac{1}{2}$. Maſ. pill. aurear. aggregat. agarici troch. an. $\frac{3}{4}$ i. Troch. alhandal. gr. v. ex quibus probe contusis cum q. s. mellis rosarum formentur pill. n. xv. & inungantur Ol. carvi; hæc in diluculo deglutiantur 6. horis ante prandium. Plura pituitam subducentia remedia ex superioribus curationibus & tabellis remediorum peti possunt.

Topica.

Interea tumentibus testibus applicentur sequentia topica. Primum manè ac vesperi abluantur tumentes testes spongia nova in lixivio & aceto æ. p. simul mixtis imbuta, in quibus resoluta sit nitri & salis an. $\frac{3}{4}$ i. Deinde tumens locus confricetur leniter calidis linteaminibus, & inungatur seq. oleo.

*Linimen-
tum.*

$\frac{1}{2}$. Ol. rosac. $\frac{3}{4}$ i. Aceti rosac. $\frac{3}{4}$ s. in quibus resolvatur salis $\frac{3}{4}$ s. fiat linimentum: aut applicetur sequens cataplasma.

Cataplasma ad tumorem ædematosum resoluendum.

$\frac{1}{2}$. Aloës, Myrrhæ, Lycii, Acatæ, Glaucii, Cyperi, Boli Armeni an. $\frac{3}{4}$ i. Croci $\frac{3}{4}$ s. omnibus pulveratis commisceantur cum succo brassicæ & aceto, & ad ignem redigantur in pultis

formam, fiat catapl. quod tepidum bis in die imponatur. Aut

$\frac{1}{2}$. Alum. rotundi, sulph. myrrhæ, salis an. æ. p. ex quibus pulveratis simulque commixtis fiat linimentum, aut cataplasma, adfusa q. s. olei & acetis rosac. Aut

$\frac{1}{2}$. Stercoris vaccini lb. s. exiccat. & *Aliud.* pulv. Olibani, styracis liquidæ, musci quertini, calami arom. spicæ celticæ, absinth. an. $\frac{3}{4}$ s. pulverata omnia coquantur cum decocto brassicæ ad pultis formam, cui admisce nonnihil acetis rosarum, fiat cataplasma.

Per hæc remedia si pituitosus tumor non resolvatur, sed ad suppurationem declinare videatur, quod ex mollitie partis tumentis deprehendi potest, tum, ut cito ad maturitatem deveniat, applicetur Empl. Diachylon compos. aut sequens cataplasma.

$\frac{1}{2}$. Fol. Malvæ, Acanthi id est Brancæ cataplasma-
urinae an. M. i. Rad. Alth. lil. alb. *ma matu-
rans.* Ceparum, sem. lini pul. an. $\frac{3}{4}$ i. co-
quantur simul cum q. s. aq. & in
mortario contusa subigantur in pul-
tis formam, additaque fermenti &
axungie porcine an. q. s. fiat cata-
plasma.

Maturato tumore, scalpello five cuspidē *Tumor*
ferreo tenui aperiatur tumor, & pus quotid. *quando a-
periendus.* exprim. & absterg. & in ulcus unguentum A-
postolorum vocatum cum ramento lintei
immittatur, & seq. Empl. donec conglutinetur
ulcus, imponatur.

$\frac{1}{2}$. Galbani, Ammoniaci, Resinæ, picis, *Empla-
sevi bovini, ol. veteris an. p. æ. ex
strum con-
solidans.* his Galbanum & Ammoniacum ma-
cerentur per noctem in aceto & per
linteum transigantur. Resina autem,
pix & sebum una cum oleo ad len-
tum ignem resolvantur ac simul
commisceantur, fiat Emplastrum.

Σκρῆψις. Durus tumor testium est quan-
do scrotum vel alia corporis partes non
tantum intumescunt, sed & in duritiem *tumor te-
stium re-
stium*
lapideam ferè convertuntur, & premen-
ti digito non cedunt, qui nonnunquam
hebe-

hebetem doloris sensum retinent, nonnunquam vero prorsus sine sensuprehenduntur, & tum ut plurimum incurabiles sunt.

Causa. Causæ αἰσθητικαὶ sunt confusus ad testes melancholici sanguinis. Item sanguis ex vehementi compressione testium in scroto collectus & induratus, item intestini portio aut perturbatum peritonæum aut laxatum in scrotum delapsa & indurata; idque in ramice, de quo paulo post tractaturi sumus, contingit. Προκατασκευαί sunt violenta testium compressio, medicamentorum vehementius refrigerantium aut exiccantium in calidis tumoribus testium imprudens applicatio, qua humores concresecunt in tumorem, aut subtiliores eorum partes exiccantur & duriores redduntur.

Signa. Signa duri tumoris testium sunt, ipse tumor durus & renitens, doloris sensu aut exiguo aut prorsus nullo præditus, cuius color est lividus seu fuscus ex rubro & nigro constans, item totius corporis habitus melancholicus. Prognostica signa sunt: Nisi tempestivè & ritè duri tumores tractentur, incurabiles evadunt, & ut plurimum in cancerum aut ferocia ulcera terminantur. Scirthus exquisitus, id est qui omni prorsus sensu caret, curari nequit; præstat itaque ab ejus curatione abstinere.

Curatio. Curatio duri tumoris testium in principio, & nondum omni sensu privato consistit in venæ sectione, victus ratione, humoris melancholici subtractione, & Topicorum applicatione.

Vena secatio. Vena secanda est ubi vires & aliæ circumstantiæ permittunt & corpus est plethoricum melancholicoque sanguine redundans, sinistri humeri, vel ea quæ inter annularem & minimum digitum est sita in sinistra manu, quam splenicam vocant.

Dieta. Victus ratio moderatè calefaciens & humectans præscribitur; conferunt itaque ova sorbilia; juscula carniū, carnes pullo- rum & vitulorum. In potu utatur vino tenui aut cerevisia clara & probè lupulata. Vitet omnia leguminum genera: fugiat iram atque mœrorem.

Deinde concoquatur extenueturque melancholicus humor, & tandem evacuetur convenientibus remediis, tum aliis in locis tum in mammarum duri tumoris curatione à nobis descriptis.

Topicis similiter iisdem, quæ in curatione scirrhosi tumoris mammarum sunt annotata, commode uti possumus: studiosè autem cavendum est, ne tumoribus duris topica remedia vehementer trahentia aut nimium digerentia atque vehementius excalefacientia applicentur; sed sint omnia mediocria. Ubi enim ab excellentibus qualitatibus melancholici humoris tenuiores partes prorsus dissipantur aut exiccantur, reliquæ ejus deinceps in lapideam duriciem convertuntur. Initio itaque quotidie inungantur tumescentes testes fece ol. lil. alborum, aut ol. Irino aut Hypericon. Post tres autem dies tumor fomentetur vapore aceti vinacei in particulas lapidis molaris candentes infusi; deinceps applicetur cataplasma emolliens hac ratione confectum.

℥. Fol. Malv. hortulan. quam arbore- scentem vocant, fol. Malvæ vulgaris, Alth. an. M. i. Flo. Anethi M. s. Rad. Alth. contus. ʒ i. Concoquantur in aq. ad mollitiem, & ex liquore exempta, contundantur in mortario ad pultis formam, eisque admisceantur ping. anserinæ & galli; aut earum loco suillæ salis expertæ q. s. fiat cataplasma, quod bis in die tepidum imponatur.

℥. Ammoniaci, galbani in acet. resoluti & per linteum transacti, styracis liquidæ an. ʒ i. Medullæ bovillæ, ce- parum an. ʒ s. Ceræ q. s. fiat cerotum. Aut concoquito rad. Alth. contusam in q. s. aq. & cum butyro contundatur & instar cataplasmatum tumori imponatur.

TUMOR aquosus Testium Græcis ἀ- ποσπμα ὁδυνηδες est ubi serosa aut aquo- sa humiditas in scroto colligitur, qualis tumor contingere solet in hydropicis ac- potissimum in ea specie quæ Ascites di- citur.

Remedia unde petenda.

In topicis observanda.

Inunctio.

Vapor ace- ti.

Cataplasma emolliens.

Cerotum malacissimum.

Tumor aquosus testium quid.

Causa. Causæ *αἰσχυρισμοῦ*, ut & hydropis sunt, frigida intemperies epatis & sanguificationis frustratio. *Προκαταρκτική* est alimenti refrigerantis immoderatus usus, & multa heluatio.

Signa. Signa sunt: Tumor aquosus testium paulo laxior est quam pituitosus, ac si tumor agiteretur fluctuans sonus exauditur, & incensa candela tumori opposita tumor transparet. Prognosticum: Tumor aquosus testium ut plurimum hydropem præcedit, & præterea in capite infantum, & scroto duntaxat contingit.

Curatio. Curatio aquosi tumoris testium in scroto, ex curatione Ascitis peti debet. Satis autem hoc loco erit pauca quædam remedia *Topica.* Topica in scroto collectam aquam exiccantia & resolventia præscribere. Scrotum itaque aqua refertum primum calido & acrilixivio ex cineribus faginis facto novaque spongia excepto per singulos dies sæpius abluatur ac fomentetur. Deinde seq. linimento inungatur.

Linimentum. ℞. Ol. rosar. ℥ ii. Aceti rosar. ℥ s. In quibus simul commixtis resolvantur salis nitri ℥ i. Alum. crudi ℥ i. i. eis-que admisc. ol. sulph. ℥ s. ol. vitr. ℥ i. fiat linimentum. Tandem post sufficientem inunctionem imponatur tumentis scroto seq. Emplastrum Avicennæ.

Emplastrum. ℞. Pul. sc. stapidis agricæ, sinapi, urticæ an. ℥ ii. sulph. citrini, spumæ maris an. ℥ s. Aristol. rot. ℥ v. Bdel-
lii, Gummi Ammon. in aceto resoluti an. ℥ i. ol. antiqui ℥ ii. Ceræ q. s. fiat Emplast.

Cautela. Diligenter tamen hic considerandum, ne hisce topicis tumorem ex scroto in abdomen sursum propellamus, & difficultatem respirationis aliaque symptomata molesta augeamus, quod sæpè contigisse memini in asciticis. Ideo simul interna hydragoga exhibenda.

Præscriptis Topicis si tumor non dissipetur, nihilque impedimenti obstiterit, ad paracenthesin est confugiendum. Incidenda autem erit acuto scalpello ima pars scro-

ti, ut commodè aquosus humor omnis effluere queat.

TUMOR flatulentus testium, Græcis *αἰσχυρισμὸς πνευμονώδης* est ubi in scroti capacitate flatulentus spiritus est collectus. *Tumor testium flatulentus quid.*

Causæ fiat tum. *αἰσχυρισμὸς* sunt nativi caloris imbecillitas, hærens agensque in pituitoso humore (status enim in corpore excitantur neque ab extenso calore, neque à vehementer debilitato, sed ab eo qui languide agit pituitosum humorem, cum tamen conficere nequit) & meatuum cutis obstructio. *Προκαταρκτική* sunt crebræ & immoderate helluationes & alimentorum crudorum refrigerantium & pituitosum sanguinem generantium crebrior esitatio. *Generatio flatuum.*

Signa flatulenti tum. test. sunt, dolor extensivus in scroto, & splendor transparentiaque tumoris luci objecti, scrotum præterea instar vesicæ inflatæ tumescit. *Signa.*

Curatio ad causas *αἰσχυρισμὸς* potissimum est dirigenda. Cum itaque in flatulento tumore tria concurrant, pituitosi humoris copia, caloris nativi debilitas, & pororum scroti obstructio. *Curatio.*

Primum pituitosa materia, per triduum oxymelite aut syr. de v. rad. cum decocto rad. sem. & herb. incidentium extenuantium & calefac. aut medicamentis supra in tabellis pituitosum humorem concoquentibus ostensis, coquatur, ac deinde aut diaphæn. ʒx. aut Bened. laxat ʒvii. cum haust. aq. menthæ solutis aut ʒ i. pill. Aggreg. expurgetur. *Digerentia pituitam.*

Deinde nativus calor corroboretur, porique obstructi referentur & cutis rarificetur victus convenienti ratione & medicamentis flatulentum spiritum dissipantibus. Victus itaque ratio præscribatur calefaciens, extenuans & flatus dissipans. Conducunt itaque panis hord. cui sem. cymini, carvi & fœnic. admixta sint. Ex carnibus utiles sunt, colum. gall. bovilla & vitulina, quæ magis assa quam elixa profunt. Potus ægri esto vinum alb. ac tenue, aut cerevisia clara. In poculo semper imponendus est nodulus ex sem. cymini & Zinzib. confectus. *Calorem nativum roborantia.*

Viten-

Apertio scroti.

Flatus ge-
nerantia
vitanda.

Remedia
flatus dis-
cutientia.

Tragea
carminia-
tiva.

Topica.

Cauterio
scrotum a-
perien-
dum.

Testium
contusio
quid.

Vitentur omnia crassa, viscida, cruda & fla-
tulentia alimenta, veluti sunt dulcia omnia,
item legumina, fructus fugaces, rapæ &
castaneæ. Reliqua curatio ex curatione tym-
panitis peri debet. Omnium maxime autem
prodest singulis diebus gustare jejuno ventr.
aquam Juniperi ꝑ i. aut vini cretici haustu-
lum, & devorare Rotul. ii. Diacymini, aut
Diagal. aut aromat. rosat. aut manus Christi
vocatas rotulas cum ol. Cymini atque carvi
confectas: Aut devoret æger laminam asla-
ti panis in vino macerati, cui inspersa est ꝑ s.
sequentis Trageæ.

Ꝓ. Pul. sem. Anisi, carvi, fœnic. dauci,
cymini, bacc. lauri an. ꝑ i. Glycy. gal-
langæ, Zinzib. an. ꝑ i. s. Caryoph.
cubeb. piperis longi, sem. rutæ an.
ꝑ s. sac. albiss. ꝑ v. Confect. anisi ꝑ ii.
miscantur, fiat Tragea. Hæc enim
omnia præscripta non tantum scroti
flatulentum tumorem, sed totius cor-
poris discutiunt, & calorem nativum
restituunt, totumque corpus corrobora-
rant.

Topica remedia foris imponenda sunt
quæ meatus aperiant, & flatus evocent. Pri-
mum itaque tumentes testes foveantur acri-
lixivio calido, nova spongia excepto, dein-
de inungantur ol. calente Anethino, aut
chamæm. aut hypericon. per se aut simul
mixtis, eisque additis gutt. x. ol. vitriol.
Hæc omnia olea lana succida excipienda
sunt, & calida testibus applicanda. Prodest
& Oesipum humidum per linteolum exten-
sum testibus imponere.

Porro si discuti flatus ea ratione nequeunt,
confugiendum est ad causticum remedium,
scrotumque diligenter ligandum, & candenti
auro inurendum; ac deinde plaga bolo Ar-
meno cum aq. rosacea mixto inungi debet;
ac post triduum vulnus instar aliorum vul-
nerum ad cicatricem deducendum.

5. Testium contusio quid, quæ ejus causa,
quæ signa, & quæ ratione
curanda?

Συρτήσις τῶν ὀρχέων est ubi ipsorum sub-
stantia confringitur, aut conteritur.

Causa comp. testium ~~αὐτογενὴς~~ nulla causa.
est. Ex solis igitur causis procatare tictis con-
tingere consuevit, quales sunt lapsus aut casus
è sublimi, in quo testes in durum corpus
impinguntur: violenta compressio ab equi-
tatione vehementiori: ictus à re contun-
dente in pugna: & grandium animalium
morsus.

Signa sunt manifesta. Fit enim eorum Signa.
contusio cum intolerabili dolore & animi
deliquio, & perit ovalis eorum figura.

Prognostica: Quibus ambo testiculi sunt Prognosti-
contusi, iis in totum perit gignendi facultas, ca.
& si solus dexter est contusus, nunquam
malesculos; si sinister, nunquam fœmellas ge-
nerant.

Curandi ratio contusorum testium tota Curatio.
est chirurgica: opus tamen habet Medica
præcautione, ne contusioni accedant sæva
symptomata, animi nimirum deliquium,
tumor & inflammatio, quorum curatio in
superioribus est tradita. Satis itaque erit
hoc loco pauca quædam Topica remedia
annotasse. Primum itaque acerbus dolor tes-
tium mitigetur sequenti Epithemate cale-
facto, & duplicatis linteolis aut lana succida
excepto & testibus obvoluto.

Ꝓ. Ol. viol. nymph. Rosar. an. ꝑ i. Mu- Epithema
cag. ex rad. Alth. & flo. chamæm. si- dolorem
mul macerat. in vino confect. ꝑ ii. mitigant.
Misce, fiat Epithema. Aut, si tumor
adfit, fiat catapl. ex ꝑ iii. farinæ fab. Catapla-
& q. s. lactis vaccini simul commi- sma.
xtis, & in formam pultis concoctis,
testibusque circumpositis.

Sedato dolore sublatoque tumore, testes
contusi quantum fieri potest, digitis rursus
in unam massam colligantur, & in propriam
formam redigantur, ac tandem sequenti ca-
taplasmate singulis diebus bis imposito ca-
lente consolidentur.

Ꝓ. Pul. sem. lini, fœnugræci, rad. Alth. Catapla-
far. fab. an. ꝑ i. Herb. veronicæ, sa- sma conso-
niculæ, Comarum Hypericon. an. ꝑ s. lidans.
Myrrhæ, Thuris an. ꝑ i. Coquantur,
& in q. s. vint rub. ad. pultis formam,
cui admisc. nonnihil ol. Hypericon.
fiat cataplasma.

6. Testium pruritus & exulceratio quid,
quæ ejus causa, quæ signa, & quo-
modo curanda?

Pruritus
testium.

Κνησμός ἢ ἔλκυσσις τῶν ὀρχέων est quando
scrotum sive exterior tunica testium pruri-
tu, & continuo scalpendi ardore molesta-
tur, scalpitationemque postulat, unde ut
plurimum cutis exulceratio subsequitur.

Causa.

Causæ *αἰσθητικαὶ* sunt aut pituita sal-
sa, aut acris erodensque biliosus sanguis,
aut adusta melancholia ad scrotum defluens.
Προσπαθητικαὶ sunt salsus humor aut acris
& foeda colluvies scroto in foedo concubitu
illita, in ejusque poros infarcta.

Signa.

Signa cum pruritus tum exulcerationis
sensu percipiuntur, causarum vero signa ex
habitu & colore totius corporis, adeoque
ex ægri relationeprehenduntur.

Curatio.

Curatio consistit in victus ratione, ve-
næ sectione, & humoris vitiosi, sive is sit
pituita salsa, sive bilis acrior, sive adusta
melancholia, præparatione & evacuatio-
ne, & topicorum remediorum pruri-
tum sedantium & exulcerationem sanan-
tium applicatione.

Dieta.

Victus ratio debet esse causæ efficienti
contraria, ac diligenter vitanda sunt omnia
alimenta impense calefacientia, salsa & a-
cria. Cremor itaque ptisanæ, avenæ, pi-
scei friabiles, ut lucii, percæ, maximè
sunt convenientia alimenta. Potus condu-
cit cerevisia clara & probe lupulata, qualis
est Brunsvicensis.

Vena se-
ctio.

Venæ sectio molliatur, atque si corpus
est plethoricum aut bile refertum, secetur
vena epatica dextri lateris; si melancholico
humore corpus reëdundet, sinistri lateris:
Tandem vitiosus humor, qualiscunque e-
tiā is sit, convenientibus remediis, quo-
rum formulas supra tradidimus, præparetur,
& artificiosè evacuetur.

Topica.

Deinde Topica remedia pruritum scroti
sedantia & exulcerationem superficiei
persanantia hujusmodi applicari pos-
sunt.

Ablutio.

Primum abluatur scrotum prurigino-
sum aut vino in quo coctæ sunt rosæ rub.
fol. veron. & plantag. Aut si ulceratio scro-

ti adsit, lacte tepido: post ablutionem ab-
stergatur leni spongia, aut lana xylina, &
inungatur aut Unguento populino, aut è
cerussa.

Ubi vero pruritus hisce remediis non se-
detur, imponatur tale Epithema.

℞. Mucag. ex sem. cyton. & sem. psy- *Epithema.*
llii cum aq. rosar. factæ ℥ ii. Aq.
plantag. ℥ vi. Aceti rosar. ℥ i. tenuiss.
pul. sulph. citrini litharg. an. ℥ i.
campho. resol. ℥ s. Fiat Epithem.
quod tepidum linteolis exceptum
crebrius imponatur.

Plurimum confert pruritui non tantum
scroti sed & reliquarum partium, sequens
Unguentum.

℞. Pul. sulph. vivi ℥ s. camph. ℥ i. Bac. *Unguen-*
lauri ℥ ii. salviæ, fol. major. an. p. *tum singu-*
ii. Butyri ℥ ii. succi Apii, suc. rad. *lare ad*
lapa. acuti an. ℥ ii. simul concoquan- *pruritus*
tur ad suc. evaporationem, colentur *sedandum.*
& infrigidentur, vel in aq. frigidam
infundantur, & refrigerata conserven-
tur, fiat unguentum. Tollit quoque
pruritum conficatio cum succo A-
pii & lapatii acuti.

7. Sterilitas quid?

Quamquam sterilitatis naturales causæ
tam ratione virorum quam muliercularum
contingere queant; tamen ut plurimum &
crebrius ex vitiosa matricis constitutione,
quam culpa virorum evenire, quotidiana
docet experientia; quare sterilitatis causas, *Vbi de steri-*
signa & curandi modum inter matricis af- *litate a-*
fectiones paulo post declarabimus. *gatur pla-*
nus.

8. Testiculi famellarum quibus morbis
afficiuntur?

Ut fiat imprægnatio, liberorumque pro- *Testium*
pagatio, necessarium est ut utrumque se- *necessitas*
men & viri & famellarum in matricis ca- *in fami-*
pacitate eodem tempore confluar & ju- *nis.*
sta proportionem ac temperamento com-
misceatur.

Cum autem semen perfectum sine be-
neficio testiculorum confici nequeat, con-
sequens est & faminas ipsas testes & semi-
naria vasa possidere.

Tē-

*Differen-
tia inter
virorum &
mulierum
testes.*

Testes tamen muliebres & magnitudine & figura & situ à virorum testiculis plurimum differunt. In fœmellis enim siti sunt utrinque ad latera Matricis circa Iliā, ubi nimirum matrix cornibus ita dictis alligata est Iliis: Magnitudine minores sunt & paulo compressiores virilibus: Figura quoque paulo oblongiores.

*Vasa sper-
matica.*

Vasa autem semen deferentia utrinque per cornua matricis in os uteri protensa sunt,

ex quorum orificiis muliebre semen in capacitatem uteri ejaculatur & influit.

Porro afficiuntur Testiculi & vasa semi-
*Morbi testiculo-
rum in fœ-
minis.*
naria muliebria, ut & virorum variis morbis: maximè vero obstructione, & seminis corruptione, quam sæva sequuntur symptomata, veluti sunt Matricis suffocatio, animi deliquium, furor uterinus.

Eorum itaque affectiones inter morbos matricis paulo post explicabuntur.

PRACTICÆ

FRANCISCI JOELIS

LIBER OCTAVUS,

DE MULIERUM MORBIS.

SECTIO I.

DE UTERI AFFECTIBUS.

1. Uterus quid, & quibus afficitur morbis?

*Uterus
quid.*



HTPA sive *ὕπερος*, uterus, est nostræ germinationis & propagationis hortulus.

*Uteri cum
genitali-
bus virili-
bus compa-
ratio.*

Matrix per similes est seroto & pudendo virili inversis. Capacitas enim seroti, si *ἡδύμοι* excipiantur, respondet capacitati matricis, & cavitas virgæ cavitati cervicis uteri. Partes enim generationis, quæ in viris extra corpus propendulæ sunt, eas Naturæ opifex non sine sapienti consilio in fœmellis intra corpus delitescere voluit.

Situs.

Situs autem est uterus intra os sacrum & ossa Ilii, tanquam in minutissima cistula, quæ sua postica parte recto intestino incumbit, anteriori vesicæ corpori contigua est.

Figura.

Figura Matricis, ubi repleta fuerit, rotunda est, & similis vesicæ inflatæ. Ejus autem interna capacitas referta est exiguis & lentis figuram referentibus foraminulis, quæ Græcis *κοτυληδόνες* id est acetabula, no-

*Cotyledo-
nes.*

minantur, & non sunt aliud nisi oscula venarum & arteriarum in uterum desinentium, per quæ menstruus sanguis in adultis purgari consuevit. Fundus uteri ad umbilicum, cervix verò ad vulvam protenditur.

Variè agitur & commoveitur matrix in corpore tum ad dolores cum ad odores, tum ad visus objecta, cum etiam ad animi affectiones: Hinc est quod Plato in Timæo uterum animal esse contendat.

Nulla autem ferè humani corporis pars tam multiplicibus ac sævis morbis & symptomatibus tentatur, quam ipsa Matrix seu uterus.

Sunt autem præcipui morbi & symptomata Matricis:

Uteri intemperies & imbecillitas,
Uteri impunitas,
Uteri suffocatio,
Uteri procidentia,

*Morbi ac
sympto-
mata ute-
ri præci-
pua.*

Uteri

Uteri inflammatio,
 Uteri inflatio seu intumescencia,
 Uterinus hydrops,
 Uteri exulceratio,
 Uteri cancer,
 Uteri durus tumor,
 Vulvæ constrictio,
 Vulvæ scissuræ,
 Vulvæ pruritus,
 Mensium immoderatum profluvium,
 Mensium suppressio,
 Albæ colluviei ex utero profluxio,
 Sterilitas uteri seu conceptionis difficultas,
 Conceptio vitiosa sive Mola,
 Gravidarum tractatio tempore gestationis,
 Pariendi difficultas,
 Fœtus præternaturalis in utero situs ante partum,
 Abortus,
 Fœtus emortui & secundinæ tunicæ in utero retentio,
 Sanguinis post partum nimia profusio,
 Sanguinis concreti post partum in utero detentio,
 Recens in lucem editi infantis tractatio.
 Symptomata vero gravidarum & ante & post partum sunt:
 Febres,
 Ventris inflatio,
 Dolor uteri,
 Dilaceratio matricis,
 Nausea & vomitus,
 Syncope,
 Capitis dolor,
 Appetitionis abolitio,
 Pedum intumescencia.

2. *Uteri intemperies quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus remediis emendanda?*

Cur in uterinis morbis versatus esse debeat Medicus.

In curandis morbis uterinis oportet Medicum sagacem esse, & morborum differentias & causas sedulo & summa cura explorare. Uteri enim nomine fœmineum genus miserimum est, & imbecille magis

quam masculinum, & infinitis ferè morbis obnoxium. Siquidem uterus tanquam sentina & receptaculum est omnium vitiosorum ac venenatorum humorum totius corporis, & tamen commercium & sympathiam habet cum nobilioribus & principalioribus partibus, cerebro, nervis, corde, Diaphr. ventriculo, intestinis & vesica: quæ partes, utero affecto, facillimè læduntur. Et hinc est, quod mulierculæ ex levi occasione sæpe Epilepsia, animi deliquio, suffocatione, cordis palpitatione, appetentiæ prostratione, nausea ac vomitione, respirationisque difficultate, colicis doloribus & dorsi cruciatibus tententur, & excrucientur: Adde quod uterini morbi curatu difficiliores sunt quam reliquarum partium, non tamen per se, sed pudoris ratione. Malunt enim plurimæ mulierculæ potius emori, quam uteri sui affectiones revelare.

Δυσκρασία Matricis est, ubi vel caliditas vel frigiditas vel humiditas vel siccitas, vel earum qualitarum *συχναι* justam commoderationem transgressæ sunt. Porro omnis intemperies cujuscunque partis semper ejus actiones tam naturales communefque quam actiones cuilibet parti proprias, lædit & imbecilles reddit, morbosque efficit. Sunt autem communes & naturales omnium partium actiones, attractio, retentio, & alteratio & expulsio: Propriæ vero sunt, ventriculi quidem conversio alimenti in Chylum, epatis sanguificatio, oculorum visio, manuum apprehensio. Ita & matricis propriæ actiones sunt, seminis conceptio, fœtus formatio, & sanguinis menstrui in adultis singulis mensibus effusio, quæ actiones omnes ex intemperie debilitantur & morbos inducunt.

Omnis vero intemperies hæret in aliquo subjecto, aut in partium substantia, & tum *intemperies* nudæ intemperies nominantur; aut in coluvie humorum in ipsis partibus contentorum, & tunc intemperies cum materia nuncupatur.

Causa *αεγυρετή* nudarum intemperierum est à nativitate congenita, & à parentibus

Uteri sympathia cum partibus principalibus. Fœmina variis affectionibus obnoxia.

Cur uterini morbi curatu difficiles.

Intemperies uteri quid.

Actiones partium communes. Propriæ.

Uteri functiones propriæ.

Causæ.

bus contracta *diuergit*. Intemperiei vero cum materia est colluviei aut vitiosi sanguinis, aut alterutrius, bilis aut pituitæ, collectio in Matrice.

Causæ *αἰτιατικαὶ* nudæ intemperiei sunt, medicamentorum impensius calefacientium exicc. refrigerant. aut humectant. hypogastrio, lumbis & pudendo muliebri applicatio. Intemperiei vero cum materia sunt, alimentorum & aliarum rerum naturam conservantium, quas res non naturales vocant, intemperatos humores generantium, crebra & immoderata usurpatio.

Signa intemperiei calidæ. Signa nudæ intemperiei calidæ sunt, hypogastrii, lumborum, & pectinis ad tactum caliditas, & à calidis remediis applicatis offendentur, frigidis vero juvantur. Siccæ nudæ intemperiei sunt continua uteri interioris siccitas, mensium paucitas, squalor totius corporis.

Sicca. Frigidæ intemperiei signa sunt continua pedum & hypogastr. frigiditas & mensium suppressio. Humiditatis nudæ in utero nota est continuus mador & fœtor uteri.

Frigida. Humida. Intemperies uterina ex vitiosis humoribus intra Matricem detentis dignoscitur primum ex totius corporis constitutione & colore. Qui enim humor in toto corpore redundat, is in Matricem quoque confluit & colligitur, & quali quilibet humorum in corpore color est tinctus, talis est & faciei & totius corporis cutis color. Sanguinis itaque vitiosi in utero redundantis intemperiem, quæ calida est & humida putrefactaque, indicat faciei rubedo & crebriores mensium effluxiones, & si menses fluentes pannum linteum attingant, rubeo colore inficiunt.

Signa cachymia uterina. Si vero intemperiei subsit biliosus humor, tum uterus calidus & siccus est, & iis mulieribus totius corporis constitutio gracilis est, colorque faciei ad flavedinem vergit, ac subinde in ore amarorem sentiunt. Menses vero paucæ, acres & erodentes cum pudendi muliebris pruritu sunt, & si in linteum incident, subflavo tingunt colore. Ubi vero pituitosæ colluviei insidet intemperies, ea erit frigida & humida, & facies est subhumida coloreque ad albedinem declinat, à Venere abhorrent,

Ex pituitosa colluvio. mensisque ut plurimum subsistunt, aut crebrius albo fluore uterus infestatur, ac dolores lumborum, tumoresque pedum percipiunt: menses linteis incidentes ea tingunt cinericeo colore. At vero si Melancholico humore imbuta sit Matrix, tum ejus intemperies aut calida erit & erodens, nimirum si Melancholicus humor ex bilis adustione sit genitus, & tum ut plurimum exulcerat eroditque matricem, & hujusmodi mulieres sales sunt & libidinosæ. Si vero ex naturali Melancholia, color faciei ad fuscenedinem vergit, aut plumbeum præ se fert colorem, menses vero in linteum prolapsi maculas nigras relinquunt.

Prognostica nudæ intemperiei uteri sunt: Intemperies quæ in substantia uteri hæret, curatu est difficilior, quam quæ in humoribus in Matrice contentis delitescit. Inter omnes autem intemperies sicca omnium difficilimæ est curationis.

Curatio intemperiei uterinæ consistit in victus ratione, venæ sectione, ubi nimirum natura intemperiei eam concedit, & remedium tum internorum tum externorum applicatione. Tam vero victus ratio, quam medicatio semper intemperiei debet esse contraria, ut calidæ frigida, frigidæ calida, humidæ sicca, & siccæ humida.

Venæ sectio non est molienda, nisi ubi intemperies vel in putrido sanguine, vel in bile flava continetur. Semper autem vena secanda est primum epatica, deinde & sub malleolis primum dextri pedis, deinde & sinistri pedis, interposito unius diei spatio.

Quantum ad medicationem attinet, si intemperies uteri in vitioso aliquo humore hæreat, sive is sit biliosus, pituitosus, sive melancholicus, sive sanguis putridus ac se- rosus, is humor primum concoquatur & ad eductionem præparetur, ac deinde ritè expurgetur remediis singulis humorum vitii dicatis, quorum sylvam in superioribus de curatione Intemperierum reliquarum partium, & in tabellis medicamentorum supra proposuimus. Subductis humoribus tandem quælibet intemperies

Ex melancholica facie.

Curatio.

Vena sectio.

Præparatio & evacuatio humoris peccantis.

peries in contrariam temperiem, contrariis remediis deducenda erit, & talia quoque multa remediorum genera in superioribus proposuimus, in curatione videlicet intemperierum Epatis, Lienis & ventriculi, quæ huc accommodari possunt.

*Calidam
intempe-
riem alte-
rantia.*

In genere autem uteri intemperiei calidæ adversantur & in contrarium statum reducunt portulaca, plantago, semper vivum, oxalis, Rosæ, Violæ, & malva. Ex compositis vero philon. Rom. syr. ex portul. ex oxalide, ol. Ros. Nymph. & Myrtillorum.

*Frigida re-
media.*

Frigidam vero intemperiem uteri, quæ omnium frequentissime matrix afficitur, emendat ex simplicibus Flor. chamæm. Anethi, Berhon. fol. & bac. lauri, parthenic. Major. Origanum, Scord. Rad. Asari, dau- ci cretici, Distamni Gentianæ, Rubeæ, ma. Aristol. utriusque, sem. pastinacæ, Nucces Moschat. Maces, cinam. cardam. castor. Myrrh. sagapen. galbanum, Asa foetida, Benzoi, Moscus, Aq. Juniperi, ol. cymia. Angel. vitriol. Ex compositis sunt, Theriaca, Musa Ænea, troch. è Myrrha.

*Siccam
intempe-
riem cor-
rigentia.*

Siccitati vero matricis profunt, mucago ex sem. lini, sænugræci, rad. alth. cum aq. Meliss. & Malvæ, rad. satyrii & eryngii conditæ, & Diasatyrium, atque omnia quæ tabidis conveniunt.

*Humidam
intemper.
emendan-
tia.*

Humidam intemperiem uteri emendant & exiccant rad. Nymph. Balauft. decoctum furculorum Rub. cornu cervinum ustum & præparatum. Coral. utrumque præparat. Terra lemnia, Nigella & radix Bistortæ. Ex compositis, Troch. è spodio, è terra sigillata, & è succino. Ex his omnibus enumeratis remediis, non tantum ad uteri intemperiem quamlibet, verum & ad alias quasvis Matricis affectiones concinnari possunt pul. portiones, electuaria, Rotulæ, suffitus, forus, Balnea, clysteres, Unguenta, empl. cataplasin. & pessi; quorum formulas, dosin, utendi rationem in curatione sterilitatis paulo post indicabimus.

3. *Impuritas matricis quid, quæ ejus causæ, quæ signa, & quomodo abstergenda ac emundanda?*

Ἀκαθαρσία τῆς μήτρας cum Matrix in sæpellis sit tanquam sentina in navibus, totius corporis impuritates in se recipiens, & ubi naturaliter se habet, singulis mensibus excernens; hoc loco nos non eam uteri impuritatem, quæ à confluxu in utero menstrui sanguinis, aut albæ colluviei contingit, sed eam duntaxat intelligimus, quando uteri interna tunica viscida humiditate est oblita & lubrica, orificiaque & cotyledones seu acetabula uteri, quæ non sunt aliud quam oscula venarum & Arteriarum in uteri capacitatem desinentia, hujusmodi humore ita sunt infarctæ, ut uterus nec menstruum sanguinem ritè ac debito modo profundere, nec semen conceptum diu intra se continere possit.

Causæ *αἰσχυρίων* hujusmodi impuritatis & lubricitatis uterinæ sunt, imbecilla concoctio chymi seu sanguinæ massæ in venis, in qua redundat pituitosus humor, & universi corporis pituitosa constitutio. *Προκαταεγκύκη* est alimentorum pituitosorum intempestivior usurpatio.

Signum infirmæ concoctionis & pituitosæ corporis constitutionis est, pallidior & ad albedinem vergens corporis color. Lubricitatis autem uterinæ signa ex confessione patientis mulierculæ explorari debent, utrum videlicet lento humore semper madeat uterus, item utrum menses parcius quam par est profluant, & utrum in uterum projectum semen paulo post rursus procidat.

Prognosticon est; nisi talis impuritas & lubricitas Matricis tempestivè auferatur, sterilitatem certam inferit.

Curatio hujus uterini madoris & lubricitatis consistit in victus ratione, lenti & pituitosi humoris præparatione & evacuatione, capacitatisque uterinæ absterfione & exiccatione.

Primum itaque præscribatur diæta moderatè calefaciens & abstergens: Qualia alimenta in superioribus pluries sunt proposita.

Con-

Uterus sentina omnia impuritatu corporis.

De qua uteri impuritate hic agatur.

Causæ.

Signa.

Prognostica.

Curatio.

Diæta.

Conveniunt enim aromatis condita fercula, & vini aut hydrom. in potu usurpatio.

Deinde pituitosus totius corporis humor ad Matricem defluens sequenti decocto ad educationem præparetur.

Decoctum digestivum.

℞. Rad. Apii, fæni, pimpi. an. ʒ s. dauci cretici, Asari an. ʒ ii. sem. fænic. pastii. an. ʒ iii. Herb. Melissæ, Bethon. Origan. Rorismar. an. M. s. Schænanthi, cinamom. cardam. an. ʒ i. Concidenda concidantur & contundenda contundantur, ac in duplici vase sive Cantharo cum lb. 4. vini Rhena. ad 2. horas coquantur, deinde refrigerata colentur & colato juri admisc. syr. de Anthemi. è Card. Bened. an. ʒ iii. fiat potio, de qua bibat mulier mane ac vesperi ʒ iii. calefactas.

Absumpta hac potione, evacuetur lenta ac pituitosa materia seqq. haust.

Haustus phlegmogogus.

℞. Fol. senæ ʒ ii. Agar. Troch. sem. cattami an. ʒ ss. spicæ Indic. ʒ s. Contusa macerentur per noctem in ʒ iii. aq. puleg. mane leniter ebulliant & fort. expressa colentur, colato jusc. admisc. elect. Diaphæ. Indima. an. ʒ ii. fiat haustus, qui tepidus ebibatur in aurora sex horis ante cibi potusque assumptionem. Aut exhibeantur eodem tempore ac modo seq. pill.

Pillula.

℞. Mas. pill. agg. de sagapeno, Troch. de Agar. an. ʒ i. diagrid. gr. v. simul contusa cum syr. de Arthemis. formentur pillulæ n. xv. & inungantur Ol. fænic. Hæ præparationes & purgationes pituitosi humoris bis aut ter reiterari debent per 3. menses, paulo ante excretionem mensum.

Corpore probè purgato singulis septimanis bis assumat ægra haust. diaphoreticum hac ratione paratum.

Diaphoreticus haustus.

℞. Theriacæ Andr. ʒ i. pul. Trochisc. è Myrrha, pul. rad. chinæ an. ʒ ii. Ol. fæn. gutt. v. aq. puleg. ʒ iii. Fiat haustus, qui tepidus ebibatur, & corpore benè tecto ægra se ad su-

dorem componat, sudetque per unam aut sesquihoram.

Interim & Matrix corroboretur quoti- *Corroba-*
die & exsiccetur ii. rot. diamargar. calid. *rancia.*
mane ac vesperi devoratis.

In impuritate Matricis præstaret mulier- *Therma*
culam ad Thermas sulphureas & aluminosas *Carolina*
post corpus purgatum confugere, quales sunt *hie utiles.*
thermæ Carolinæ, prope vallem Joachimi-
cam. Sed quia ob itineris longinquitatem
non quibuscumque eas accedere datur, ther-
marum loco balneum seu lavacrum ex seq.
herbis confici potest, in eoque alternis die-
bus mulier collocetur.

℞. Arthem. Betho. serpill. chelidon. cum *Inseffus seu*
rad. melissæ, puleg. Origa. lavand. *therma ar-*
Hyperico. an. M. ii. sem. carvi, cy- *tificiosa.*
mini, anisi an. ʒ ii. Radicib. valer.
ʒ iii. sulph. citr. lb. i. s. Alu. ʒ iii. i.
salis ʒ ii.

Concisa ac contusa in sacculumque con-
futa coquantur in q. s. aq. id est tanta ut pa-
tiens in ea usque ad umbilicum mergi queat;
in eoque lavacro commoretur ægra ad ses-
quihoram, & sacculus hypogastrio circum-
ponatur. Si vero nec hæc commoditas hu-
jusmodi balneum conficiendi adsit, ex iis-
dem herbis parari possunt fomenta & vapo- *Fomenta-*
res Matruci quotidie supponendæ. *tio.*

Tandem commodissimè uteri capacitas
elui poterit, & à lento madore abstergi se-
quenti Enemate uterino matruci per siphonem injecto.

℞. Rad. valer. Gentianæ an. ʒ s. Aristo.
rot. ʒ ii. scoriz ferri ʒ ii. Origa. Ma-
trica. puleg. an. M. s. Myrrhæ ʒ ii.
sulph. ʒ iii. Coquantur in lb. ii. ii.
hydr. simpl. cujus ʒ iii. tepidæ pro
vice matruci infundantur. Deinde ex-
siccationis uteri causa hianti matruci
tale suffumigium subijciatur.

℞. Myrrhæ, Thuris, Benzoi, caryoph.
an. ʒ i. Nucis Mosch. ʒ ii. Fol. lau-
ri, major. spicæ celticæ an. p. i.

Conterantur crassiusculè, & carbonibus
semiextinctis in olla inspergantur, & fumus
inde elevatus per infundibuli apicem in os
matricis recipiatur. Vel inferatur per no-

K k 2 ctem

Et utero Glans uterina, quam Græci pessum vocant, qui hoc modo conficiatur.

Tessm.

℞. Pul. Acat. Balauft. calicum glandium an. 3 i. Mastic. Thur. an. 3 s. strobilorum cupressi, Myrrh. an. ʒ i. corn. cer. usti, Alum. an. ʒ s. Ex quibus tenuissimè pulveratis ac commixtis cum pauca Tereb. & cera, fiat pessus, & formetur in digiti longitudinem, & paulo crassiore pollice, syndoneque obducatur, & per noctem Matrici inferatur, manequè rursus extrahatur. Plura in sterilitatis curatione huic affectioni conducencia commemorabimus.

4. *Vteri suffocatio seu strangulatio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & ut curanda?*

Vteri suffocatio quid.

Ἡ ὑστερικὴ ἐστὶν ὅτε ὅτε Matricis capacitas, flatulentis tetrisque vaporibus in ea excitationis inflatur & distenditur, & sursum elevatur, & primum vētrem ac intestina, mox ventriculum, ac deinde ipsum diaphragma, quod principalissimum est respirationis organum, coarctat, & multo flatu comprimit, & respirationem vocemque intercipit; ita ut misera mulier instar mortuæ jaceat. Non dissimilis est hic morbus & syncopi & epilepsiæ, nisi quod non convellitur corpus quemadmodum in epilepsia. Interdum tamen propter uteri inquietum motum leviter convelli quasi videntur hysterica femina. Sed tum manifestè motus incipit ab inferiori ventre & sursum ad jugulum sese extendit, ut caput in posticam partem inclinetur, & thorax per intervalla elevetur.

Causa.

Causæ αἰτιατικαὶ sunt, menstrui sang. aut sem. ex vasis spermat. in capacitat. uteri inapli, aliorumque putridorum humorum in ea coacervatorum putrefactio, ex quibus halitus tetri ac flatus uterum distendentes excitantur: aut sanguinis copiosi in plethoricis corporibus in venas infarctio & refrigeratio. Πνευματικαὶ sunt animi exteniores perturbationes, veluti sunt ex candescencia, mœror ac Zelotypia; Et in quibusdam

malam uteri constitutionem habentibus, suaviore odore. Matrix enim natura cum ad suaves odores tum ad tetros afficitur, & sursum deorsumque commovetur.

Accidit suffocatio Matricis potissimum in viduis juvenculis quæ antea consuetudini virorum assuefactæ fuerunt, jam vero se continere coguntur: Et virginibus adultioribus generationi aptis.

Accidit hoc malum creberrimè & puerperis paulo post partum, aut ob nimiam sanguinis effusionem, aut ob ejusdem in utero retentionem ac putrescentiam, de qua suffocatione paulo infra in sympt. gravidarum tractabimus.

Admiracione autem dignum est quod intercepta respiratione in hoc morbo mulierculæ vivere queant; cum impossibile sit non spirantem posse vivere, aut respirantem non vivere: sed vivunt ratione caloris nativi in corde & arteriis nondum extincti; & per poros arteriarum transpirabiles, etiam si totum corpus sit refrigeratum.

Signa paroxysmi uterinæ suffocationis manifesta sunt. Intercipitur enim aut omnino aut magna ex parte & respiratio & vox, & refrigeratur corpus, mortuæque similis jacet muliercula. Paroxysmum autem antecedunt torpor mentis, faciei pallor, crurum pigritia, & quandoque desipientia cum risu aut lachrymis sine manifesta causa, quam tandem mox articulata vocis & respirationis interceptio subsequitur.

Causæ verò suffocationis uterinæ hisce notis deprehenduntur. Si ex retentione supprellisque mēsis originem ducat suffocatio, id ex narratione patientis cognosci potest. At ubi menses probè fluunt, certum est malum ex feminis aut alterius vitiosi humoris in utero putrefactione ortum trahere. In puerperis iidem ex relatione causæ constare poterit.

Ubi mulier mortuæ similis sine sensibili respiratione ac motu decumbit, & ab omnibus extincta judicatur, tum, utrum adhuc vita superfit, explorari debet per admotionem ori ac naribus tersi ac puri speculi, quod admotum si udo vapore inficitur, vita

Vterus eodre movetur.

Quenam femina huic male obnoxia.

Hysterica quomodo absque respiratione vivant.

Signa paroxysmi.

Signa causarum.

Exploratio an femina sit hysterica vel mortua.

vita adhuc in corpore delitescit: Alii plumas aut lanam puram ori naribusque admovent, ex cuius commotione vitam restare prædicunt, aut vitrum aqua repletum pectori imponunt, & ex aq. tremore vitalem adhuc spiritum supereffe deprehendunt.

Prognosi-
ca.

Prognostica: Quæ ex retentione seminis oboritur uteri suffocatio longè est periculosior curatuque difficilior, quam quæ mensium aut aliorum vitiosorum humorum putrefactione generatur. Strangulationes uterinae maxima ex parte Autumno & hyeme infestant mulierculas.

Curatio.

Curatio uterinae suffocationis bipartita est, cuius prima pars in paroxysmo, altera in causis suffocationis tollendis occupata est.

Statim itaque ubi futurae suffocationis signa comparuerint, ac imprimis insultus & intumescencia hypogastrii, mulierculæ ebibendus præbeatur sequens haustus tepidus.

Remedia
in paroxysmo adhibenda.

Ol. castorei stillatium, item ol. succini admodum hic utile, si gr. 11. vel 111. exhibeantur.

Venter re-
stringen-
dus.

℥. Sterco. rec. caballi avena nutriti M. 11. coquantur in vino Rhenano, exprimantur ac colentur & ebibenda præbeantur. Aut

℥. Casto. 3 11. fol. Mentæ crispæ p. 11. gran. Junip. parum contusorum n. xxx. Bac. lauri contus. n. 111. croci 3 s. coquantur in vini tb. 1. ad med. colentur, fiat haustus: aut resolvatur 3 1. diacasto. in haust. aq. pulg. & tepidus exhib. Aut deglutientæ præbeantur pill. v. ex 3 1. Asæ foetid. formatae.

Ubi vero uterus jam turget & ascendere incipit, statim uterus manibus supprimatur, & violentius deorsum repellatur, ne ventricul. in diaphragma cogere & sursum compellere queat. Venter autem circa umbilicum fascia linea latiore aut cingulo ex corio Terri in ipso coitu cum cervâ necati confectio, quod singulari efficacia esse in hoc casu experientia testatur, vinciatur ac subligetur, & hypogastrio sequens sacculus calefactus imponatur.

Sacculus
hypoga-
strio im-
ponendus.

℥. Anthem. Origa. Betho. Calam. pulgii, Rutæ an. M. 11. sem. cymini, carvi an. 3 1. Bac. lauri 3 11.

Herbæ concidantur & reliqua contundantur, mixtaque sacculo insuantur, qui vino conspersus, & per lateres ignitos calefactus ino ventri imponatur, deinde mox acerrimo aceto & sale simul mixtis tarsum & plantam pedis atque circa malleolos, item manus palmam & carpum fortiter fricato, & mulieris nomen cum valida inclamatione exprimatur. Deinde & dolorifica ligamenta circum coxas, pedibus & humeris injiciantur, atque mox naribus teterrimi odoris res quæque admoveantur, hujusmodi sunt casto. asa foetida, sagapenum, oppopanax & bitumen, quæ ut gravius oleant, non nihil calefacienda aut incendenda sunt, aut fumus lapidis Gagatis, aut ol. petrolei, aut nucis moschata, qui admodum hic efficax. Hæc si in promptu non sint, admoveantur naribus fumi ex incensis coriis veterum calceamentorum, aut ex cornubus caprinis accensis, aut fumus plumarum perdicum pilorumque accensorum, aut si nihil aliud ad manus sit, matula ex corrupta urina fecdè olens, aut nonnihil humani stercoreis, aut si quid his abominabilioris odoris sit, naribus admoveatur. Ex tali enim odore fædo excitantur spiritus animales, & uterus cum tetros aversetur odores, refugit ac subsidet: aut fiat hujusmodi foetidum suffumigium, naribus admovendum.

Frictio pe-
dum &
manuum.

Ligatura
dolorifica.

Odoramen-
ta foetida.

Modus ta-
men hic
servandus,
ne nimio
fædore vel
spiritus vi-
tales ex-
tinguantur
vel apople-
xia indu-
catur.

℥. Casto. Galba. in aceto resoluti an. 3 11. sulph. citrini 3 s. Asæ foetid. 3 1. ex quibus contusis, fiat massa cum ol. petreoleo, & formetur aut pomum olfactorium, aut Troch. qui carbonibus accensis imponantur, & fumus ad nares ægrotæ demittatur.

Suffumi-
gium com-
positum.

E contra vero removeantur ex cubiculo omnes res suaviter spirantes, & nonnisi contectæ & munitæ, (ne earum odor ad nares ægrotæ deferatur) vulvæ matricis vel cervici uteri per fæminas admoveantur vel indantur, ut suavitate odoris matrix deorsum redeat. Mirum enim est quam uterus oblectetur, & quam avidè se convertat ad suaves, & aversetur fugiatque tetros odores. Ex his autem odoratissima, quæ Matrici

Suaviter
olentia us
usurpanda.

Odorata
pudendis
admove-
nda.

subjici possint hæc, Moscus, Zibetum, Ol. caryoph. Ol. Benzoi, styrax calam. Ol. spicæ, Ol. ex gran. Junip. ol. ex nuce muscat. ol. Angelicæ, Sambucus, Major. o-cymum sive Basilic. quæ lana xylina excepta sindone obvolvi matricique commodè inferi possunt. Aut ex iisdem Unguenta concinnari, & ori matricis inungi possunt, ut

Pessus odoratus ad uterum retrahendum.

℞. Galliæ Moschatae 3 ii. cinam. el. caryophyll. Macis an. 3 i. Moschi gr. v. styrax calam. 3 ii. terpen. q. s. formetur Glans uterina seu pessus, & inungatur gutt. iii. ol. Angelic. & syndone obvoluta matrici inferatur. Aut

Linimentum.

℞. Ol. lilior. alb. 3 iii. Ol. Angelicæ 3 s. ceræ albæ parum, fiat linim. cui admisc. pul. Galliæ Mosch. 3 s. Moschi in aq. ros. fol. gr. v. fiat linimentum.

Ubi hac ratione iisque remediis ex paroxysmo suffocationis excitata est mulier, & vires nonnihil rursus collegit, ad alteram

Præservatio & causa sublatio.

curationis partem, id est causæ sublationem, & ab ampliori insultu præservationem animus est convertendus. Ac primum si alvus est obstructa, & intestina fecibus repleta, clystere convenienti, cujus formula ex colici doloris curatione peti potest, subduci debent. Deinde sedulo considerandum, quis potissimum humorum præsertim vitiorum in corpore redundet. Ex eo enim ut plurimum inficitur sanguis ad uterum

Evacuatio.

fluens. Is statim concoquatur & evacuetur convenientibus remediis toties jam in superioribus commemoratis. Aut si corpus plethoricum existit, aut suffocatio ex menstrui sanguinis suppressione originem trahat, vena secanda est, in plethoricis primum epatica, deinde & sub malleolis sparfa: In suppressis mensibus sola ea quæ sub malleolis habetur, in ceteris autem suffocationum causis semper vitanda est venæ sectio.

Menses provocandi.

Si itaque suffocatio originem ducat à mensium suppressione, convenienti tempore menses provocentur ea ratione & iis remediis quæ paulo post in curatione retentorum mensium proposituri sumus.

At si ex seminis in utero corruptela, in conjugatis malum hoc oriatur, nullum est præsentius remedium quam concubitus & debiti conjugalitatis solutio. Verum si patiens sit virgo, corruptum semen remediis & rationibus in curatione præcipuas præscriptis discutiendum erit.

Vide lib. 5. sect. 3. q. 2.

5. *Vteri procidentia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Πρωτοτοκίας τῆς μήτρας. Varie movetur uterus, nunc enim sursum se erigit, ut in suffocatione; nunc ad latera contorquetur; nunc deorsum, & prorsus extra corpus prolabitur. Quando itaque vel ejus fundus invertitur, & deorsum in cervicem uteri prolabitur, vel quando sola ejus cervix per rimam vulvæ extra corpus procedit, prolapsio seu procidentia uteri nominatur. Quemadmodum enim nonnunquam muscoli Ani sphincteres dicti, & Intestina, & omentum è suo loco deorsum delabuntur, ut in Ramice contingere consuevit; ita & Matrix sæpe deorsum ruit, & è corpore propendet.

Vteri procidentia quid.

Causa ἀσυνεργίας procidentiae uteri sunt, ligamentorum membranarumque quibus uterus cum peritonæo, cum intestinis & cum ossibus sacro & Ilii colligatus est, relaxatio & ruptio; Relaxationis eorum rursus causæ interiores sunt, mucosa matricis humiditas, mensium præternaturalis aut albæ colluviei aut sang. post partum defluxio; item extensior refrigeratio.

Causa interna relaxationis ligamentorum.

Προκαταρκτησις autem causæ relaxatarum membranarum sunt, diuturna mora in aquis frigidis, & ambulatio nudis pedibus per frigida loca, remedia impensius refrigerantia lumbis applicata, aëris frigidi in alvum uterumque, dum aut excrementa alvi ejiciuntur, aut mensium fluore detinetur uterus, irruptio, & vehemens conatus in excernendo.

Externa.

Ruptionis vero ligamentorum uterino-rum causæ ἀσυνεργίας sunt difficilis partus & abortus & ruptio peritonæi. Προκαταρκτησις vero sunt ponderis gravioris sublatio, casus è sublimi, violenta percussio, ossis sacri vel lumborum secundinæ post abortum,

Causa ruptionis.

ortum, aut fetus mortui ex utero violenta evulso.

Signa. Signa prolapsi uteri manifesta sunt, & ex relatione patientis intelligi possunt. Utrum autem membranæ ac ligamenta relaxata tantum aut rupta sint, ostendit materia cum utero prolapsio profluens. In relaxatione enim ligamentorum uterus est alba & mucosa materia defecatus: si vero rupta sint vincula, sanguis & deinde pus profluat, & urina sanguinolenta apparet. Utrum vero cervix aut fundus uteri e corpore sit elapsus, his notis dignosci potest: cervicis prolapsa caro rubens glandi virili cum foramine similis extra corpus ante pudendum propendit: si vero fundus matricis est inversus ac prolapsus, tum caro propendula seroto virili est similis ovi asserini magnitudine.

Qua pars prolapsa sit ut dignoscendum. Præterea in omni prolapsione Matricis dolor lumborum & pectinis sentitur, & fit recti intestini, & vesicæ compressio & difficultas egerendi.

Symptomata. Prognosticum: Uterus in senili ætate prolapsus, maximè si diutius restauratio negligatur, incurabilis est. Difficillimè intra corpus retinetur uterus elapsus quando ex partus difficultate, aut peritonæi ruptione, aut ex abortu orta est uteri procidentia.

Prognostica. Curatio pro lapsu uteri in repositione matura, & in proprium locum restitutione, & in eodem retentione consistit. Cum itaque adhuc recens est affectio, uterus prolapsus sagacis obstetricis industria rursus in sedem suam reponatur. Antequam autem id molietur obstetrix, necessarium erit ut & urina ex vesica, & excrementa ex recto intestino, inter quas partes matrix sita est, per lenem clysterem evacuetur ac proliciatur. Deinde decumbat ægra supina coxis elevatis popliteisque reflexis, & ab invicem dilatatis, & ita tandem obstetrix dependentem uterum primum foveat, abluat & abstergat, ac demum in suum locum reponat. Fomentum autem & lavacrum tale conficiatur.

Curatio. *Repositio uteri ut peragi rite debeat.* ʒ. Fol. betæ, malv. alth. arthem. an. M. s. sem. sænugræci, lini an. ʒ s. Bac. lauri ʒ ii. concisa & con-

tusa coquantur, in q. s. aq. ad tertias, colentur, & in eo aliquamdiu foveatur uterus prolapsus. Aut si recens excidit Matrix, sufficit fovisse in lacte tepido. Post sufficientem irrigationem, antequam in locum suum reponatur, abluatur & abstergetur vino rubeo austero, in quo decocta sint flor. ros. balauft. bacc. rosar. rub. in quibus semen continetur, gallæ, myrtill. & glandes an. ʒ ii. vinum autem sit ʒ xvi. & decoquantur ad tertias, ac tandem absterfus uterus imponatur in proprium locum, vulvæque pessulus aut ferula, pro foraminis uterini capacitatem ex molli & carpta lana vel subere formetur, & sequens pulvisculus lanæ inspergatur.

Fomentum. ʒ. Balaust. pulv. nuc. cupress. rosar. acat. ʒ s. fiat pulvis. Deinde ea ferula syndone aut linteolo molli involvatur & consuatur, cui filum sit appensum, & in præscripto vino madefiat, & sinui uterino inferatur. Ne autem hic pessulus ab incumbente utero retrocedat aut elabatur, præstat subligaculo arte parato uteri foramen & perinæum contegere ac colligere. Mulierculæ nostrates uterum prolapsum ita restituant. Primum allium in aq. tepida, aut in lacte minutissimè conterunt, & expressum colant, in eoque partem propendulam foveant & abluunt, & seq. pulvisculo conspergunt, & ita in suam sedem reponunt.

ʒ. Pinearum combustarum, corn. cerviusti, thur. Mastic. acat. an. ʒ. ʒ. Fiat tenuiss. pulvis, & utero reposito, imo ventri urticam cum radicibus probe contusam instar cataplasmati imponunt.

Porro utero ita in suam sedem reposito, statim umbilico & ilibus cucurbitulæ magnæ cum multa flamma sine tamen scarificatione imponantur, & sæpe repetatur impositio. Earum enim attractione uterus sursum

tusa coquantur, in q. s. aq. ad tertias, colentur, & in eo aliquamdiu foveatur uterus prolapsus. Aut si recens excidit Matrix, sufficit fovisse in lacte tepido. Post sufficientem irrigationem, antequam in locum suum reponatur, abluatur & abstergetur vino rubeo austero, in quo decocta sint flor. ros. balauft. bacc. rosar. rub. in quibus semen continetur, gallæ, myrtill. & glandes an. ʒ ii. vinum autem sit ʒ xvi. & decoquantur ad tertias, ac tandem absterfus uterus imponatur in proprium locum, vulvæque pessulus aut ferula, pro foraminis uterini capacitatem ex molli & carpta lana vel subere formetur, & sequens pulvisculus lanæ inspergatur.

ʒ. Balaust. pulv. nuc. cupress. rosar. acat. ʒ s. fiat pulvis. Deinde ea ferula syndone aut linteolo molli involvatur & consuatur, cui filum sit appensum, & in præscripto vino madefiat, & sinui uterino inferatur. Ne autem hic pessulus ab incumbente utero retrocedat aut elabatur, præstat subligaculo arte parato uteri foramen & perinæum contegere ac colligere. Mulierculæ nostrates uterum prolapsum ita restituant. Primum allium in aq. tepida, aut in lacte minutissimè conterunt, & expressum colant, in eoque partem propendulam foveant & abluunt, & seq. pulvisculo conspergunt, & ita in suam sedem reponunt.

ʒ. Pinearum combustarum, corn. cerviusti, thur. Mastic. acat. an. ʒ. ʒ. Fiat tenuiss. pulvis, & utero reposito, imo ventri urticam cum radicibus probe contusam instar cataplasmati imponunt.

Porro utero ita in suam sedem reposito, statim umbilico & ilibus cucurbitulæ magnæ cum multa flamma sine tamen scarificatione imponantur, & sæpe repetatur impositio. Earum enim attractione uterus sursum

Decoctum astringens pro ablutione uteri.

Pessus.

Pulvis ad pessum.

Processus muliercularum in repositione uteri.

Ventosa umbilico imponenda.

sursum trahitur & retinetur. Hypogastrio vero sive imo ventri imponatur emplastrum contra rupturam, aut emplastrum comitissæ in officin. vocatum, aut tale conficiatur.

Emplastrum adstringens.

℥. Mastich. Thur. sang. draco. Ladani an. ʒ iiii. Galliz mosc. ʒ i. Tenuissimè pulverata commisc. ad ignem cum resolutis Resinæ & ceræ an. ʒ i. & Terebinthinæ q. s. fiat emplastrum & extendatur per alutam, pubique imponatur. Aut

Ceratum.

℥. Opopa. Galbani, serap. Colophoniz, Resinæ, pini an. ʒ ii. Mastich. Thur. an. ʒ i. styra. liquid. ʒ i. ceræ q. s. Pulver. pul. resolvenda resolvantur, fiat cerotum quod per alutam extendatur: ita tandem per triduum quiescat ægra decumbens per dorsum: ac interim naribus quæque suaviter olentia, veluti est Moscus, Benzoi, styrax calamita, cariophyl. & ol. Angel. admoveatur. Pudendo vero foetidissima quæque subjiciantur, veluti est Ala foetida, castoreum & similia, studioseque caveat patiens à nimia corporis commotione, tussi & sternutatione. Post triduum tandem extracto pessulo uterino, in sequens balneum per horam usque ad umbilicum collocetur.

Naribus odorata admoveanda Inferius foetida.

Insepus.

℥. Rad. bistortæ, Bacc. Myrtil. sumach an. ʒ ii. Musci arbor. quercini, quem Arabes usneam vocant, Fol. rosar. mēspil. fol. prun. sylvestr. lysimach. an. M. iiii. cort. querci contusar. glandium an. lb. s. Balauft. & spongiarum quæ per frutices rosaceas nascuntur an. M. i. Alum. ʒ ii. Radic. symphyti lb. i.

Sacculi.

Contundenda contundantur & concidentia concidentur, coquantur in q. s. aq. fiat lavacrum. Ex iisdem rebus sacculi quoque confici possunt, & cum vino acerbo rubeo concoqui rursusque expressi lumbis & i-

mo ventri imponi.

Caterum ubi uterus ex ruptione ligamentorum prolapsus est, ad astringentia remedia non ante est properandum, nisi prius grumi sanguinis & sanies ex uteri sinibus est expurgata & absterfa sequenti decocto.

Procidencia uteri ex ruptione remedia.

℥. Ros. rub. plantag. Veron. corrigiolæ an. M. i. Concisa coquantur ad tertias in lb. iiii. vini rubei, & colato juri admisc. mell. ros. ʒ ii. cujus ʒ iiii. per syphonem utero impellantur, eousque donec in urina nulla appareant vestigia vel sanguinis vel saniei. Deinde reposito utero fiat progressio cum præscriptis remediis.

Decoctum abstergens.

Accidit autem nonnunquam, ut ob neglectam diutius curationem, pars elapsa uteri computreat, quod ubi contingit, putrefacta particula omnis sine metu periculi turò abscondi potest, & rursus chirurgica industria curari.

Si uteri pars prolapsa putrefacta quid agendum.

Tempore curationis, si alvus adstringatur, ut plerunque fit, ʒ x. cass. recent. evuls. devoratis, vel leni clystere ex Arthem. Berhon. & centau. in jure pulli coctis, & cum sufficienti cassia commixtæ, scivala alvi producantur. Victus interim ratio valde parca & tenuissima præscribatur.

6. Uteri inflammatio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Φλεγμονή τῆς μήτρας est ubi vel tota Matritrix, vel ejus aliqua pars urente qualitate obfessa est. Inflammatur enim uterus nonnunquam non secus ac ventriculus, Renes, par, lien & reliqua viscera.

Uteri inflammatio quid.

Causæ φλεγμονῆς uteri inflammati sunt, copiosi sanguinis ex plethor. corpore in venas uteri defluxio, & diutius ibidem, per menses non expurgati detentio, aut sanguis in uterum affluens justo biliosior, qui erysipelata excitat; item tumor præternaturalis aut exulceratio in aliqua uteri parte exorta. Προγεννητικαὶ sunt violentus casus, ictus, percussio in inum ventrem, creber coitus, abortus, præternaturalis partus, acrium

Causa.

acrium & calidorum remediorum in uterum infusio.

Signa.

Signa causarum præcip. ex relatione ægrotantis innotescere possunt. Semper autem ardens dolor in ventre imo circa pubem: Et si in collo Matricis tantum hæreat inflammatio, igneus calor obstetricis digito dignoscitur; si vero posterior uteri pars inflammata est, tum dolor & caliditas circa lumbos persentiscitur & alvus difficulter egerit; si anteriori in parte inflammatio consistat, dolor & ardor circa pubem sentitur & urinæ stillicidium adest; si laterales partes ejus sunt inflammatae, inguina calent ac dolent & crura gravantur.

Dignosio loci affecti.

Ubi vero fundus uteri inflammatione laboret, paulo infra umbilicum dolor & ardor sentitur. In qualibet autem inflammatione uterina subsequitur febris, & si vehementius uteri fundus est inflammatus, tum difficultas respirationis, & nonnunquam suffocatio uteri accedunt, & dolor usque ad jugulum extenditur propter uteri connectionem cum diaphrag. per interventum peritonæi. Prognosticon: Inflammatio uteri si in sola cervice hæreat, minus est periculosa. Ea vero quæ totum uterum occupat, ut plurimum periculosa est. Uteri inflammatio aut erysipelas in gravidis lethalis est.

Prognostica.

Curatio.

Curatio consistit in victus ratione, venæ sectione & remed. cum intra tum extra corpus uteri adhibitione. Victus ratio debet esse refrigerans & humectans; quemadmodum in Renum & aliorum viscerum inflammationibus sup. annotavimus. Maxime autem conveniunt in cibo ptisanæ cremor, & pruna acida & pisces saxatiles. In potu vero aq. hordei cum cinam. & passulis parata utilissima est, deinde cerevisia clara, qualis est Brunsvicensis.

Evacuatio per clysterem.

Venæ sectio.

Alvus in hoc malo cum plurimum sit adstricta, proderit eam crebrius per lene enema exonerare, cujus formula ex superioribus peti potest. Venæ sectio in plethor. corpor. potissimum locum habet, deinde & in quibus menses sunt suppressi. Fugienda autem erit venæ sectio in iis quæ post abortum aut plurimam sanguinis effusionem

in inflammationem uteri inciderunt. Secetur autem vena epatica dextri humeri primum, deinde & quæ sub malleolis sita est.

Post venæ sectionem biliosi humores seq. haustulo subtrahantur.

℞. Fol. senæ ʒ i. Rhab. ʒ i. s. Mace. *Haustrus cholagogus.*
rentur pernoctem in aq. cicho. ʒ iiii. & mane expressa & calefacta fortiter exprimantur & percolentur, colato jusculo admisc. syr. ros. sol. aut syr. ex multis infusionibus violar. ʒ ii. elect. ros. Mes. solut. ʒ i. commisceantur, fiat haustus, qui in aurora tepidus exhauriatur. Aut purgetur bolo devorato ex ʒ x. cal. recent. evul. factio.

Post expurgationem vitiosorum humorum refrigerandæ inflammationis gratia bis singulis diebus ebibat ægra seq. liquoris lactei haustum unum.

℞. Quatuor sem. frig. mayo. an. ʒ iiii. *Emulsi.*
sacca. cand. ʒ ii. contundantur in mortario exactissime, eisque admisc. aq. cichor. & plantag. an. lb. ii. deinde expressa colentur fortiter, fiat lacteus liquor.

Tandem quod ad topica remedia attinet, equidem in magna inflammatione fundi uterini sola radice hyoscyami. cum pauxillo aceto rosac. contusa, & instar cataplasmatibus umbilico impositæ felici successu sum usus, quæ & aliis partibus uteri inflammatis ac dolentibus ac toti imo ventri commodè imponi potest: Idem præstat succus semper vivi aut ipsa herba cum aceto ros. contusa & loco dolenti instar catapl. imposita. Aut inungatur locus affectus sequenti linimento.

Topica.

℞. Ol. rosa. Nymph. cyton. an. ʒ s. Mu- *Linimen-*
cag. ex sem. pŷylli & aceto rosac. factæ *tum.*
ʒ iiii. ceræ albæ q. s. fiat linimentum, quod & in sinum uteri mollissimæ lanæ illitum imponi potest. Aut applicetur affecto loco sequens epithema.

℞. Suc. semper vivi ʒ ii. suc. hyoscy. ʒ i. *Epithema.*
Aq. rosar. plantag. solatri an. ʒ ii. Aceti rosa. ʒ i. Misceantur & duplicatis

lenteolis excepta imponantur. Aut sequens cataplasma tuto imponi potest.

Cataplasma.

℥. Umbilici Veneris, polygoni, plantag. semper vivi, capitum papav. omnium viridium an. M. i. contundantur eisque addantur far. hordei M. ii. ol. viola. q. s. fiat cataplasma. Quin & pampini seu fol. vitis, folia Nymph. in aceto rosa. madefacta, utilissimè dolenti loco imponi possunt. In ipsum vero uterum inferi possunt ex lana aut lino formati pelli, & succis prædictarum herbarum aut Mucag. psylli, aut ol. rosa. viola. imbuti.

Pelli.

Porro ubi cruciatus intolerabilis & dolor immensus somnum turbat, & omnem requiem adimit, resolvatur ̄ i. opii Thebaici cum paux. aq. rosa. eisque admisc. mucag. ex sem. cyton. factæ ̄ s. & pellis inungantur, uteroque inferantur.

Narcotica.

Cautela
admodum
utilis; nam
à refrigerantibus
nimium
continua-
tis, sæpe in-
flammas
pars in
scirrhosam
duriciem
convertitur.
Incessus o-
mollens.

Verum ubi dolor remisit, non amplius vehementer refrigerantia, ac multo minus stupeficientia, quale est opium, sed mollificantia & discurrentia tantum sunt adhibenda.

Proderit itaque patientem in sequenti lavacro tepido usque ad umbilicum collocare.

℥. Fol. malv. alth. cum rad. arthem. pulg. chamæm. an. M. iiii. sem. lini, fanugraci an. ̄ vi. Aristarum avenacearum ex quibus semina nondum sunt excussa fasciculum unum, quæ simul coquantur in q. s. aquæ, fiat balneum. Deinde applicetur lumbis & pectini sequens cataplasma.

Cataplasma.

℥. Rad. alth. mal. fol. viola. flo. viol. chamæm. Meliloti, Anethi an. M. ii. Contusa coquantur in q. s. aq. usque ad pultis formam, cui admisce far. hordei, sem. lini, ol. rosa. q. s. fiat catapl. Aut maceretur micæ panis siliginei q. s. in lacte, & concoquantur in formam pultis, admisc. nonnihil ol. chamæ. fiat cataplasma.

7. Vteri ex flatibus intumescencia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Πνευµατισµὸς ὑπερβαλὼν, inflatio ubi matricis cavitas aut interstitium inter teri quid, membranam uteri, & eam quam habet sibi connexam ex peritonæo, flatulento spiritu inflata intumescit, & totum ventrem secum distendit.

Causæ ἀγεννησθέντες sunt, humores pituitosi aut in ipsa Matrice generati, aut ex toto corpore in uterum defluentes, & caloris nativi in utero debilitas, qui humores concoquere non valet, sed eos in flatu resolvere tantum. Προγεννησθέντες sunt largior frigidi liquoris potatio in balneo, aut pedum ac totius corporis refrigeratio. In partu autem & paulo post partum hoc malo corripiuntur mulierculæ ex recitatis procatare. causis, ut frigida potione, refrigeratione pedum ac ventris: contingit quoque hic tumor ex frigida potione tempore fluentium mensium, & ambulatione nudis pedibus per frigida pavimenta.

Causa.

Signa uterinæ intumescentiæ sunt manifesta, ut quæ visu tactuque deprehendi possunt. Hæc si in capacitate uteri excitetur, sine dolore perseverat, & frequenter per uteri cervicem strepitus non secus ac ex podice erumpit, in inflexione corporis rugitus ac sonitus exauditur. Ubi vero flatulenti spiritus in interstitio uteri & membranæ quam à peritonæo habet collecti sunt, dolores punctivos & instabiles afferunt, quæ & difficilior curari potest. Prognosticon: Uterina inflatio, quæ ex mala tractatione aut refrigeratione in puerperio mulierculis contingit, sine dolore permanet, & rarissimè detumescit, & tamen præterquam quod corpori deformitatem adfert, nec nutritionis nec generationis actiones lædit, & difficulter curatur. Ex hac affectione mulieres sæpe abortiunt, & tunc abortum præcedunt flatus crepantes per vulvam.

Signa.

Prognosticon.

Curatio magna ex parte ex curatione Curatio. ejus speciei Hydropsis, quæ Tympanites nominatur, peti debet. Consistit autem potissimum in victus ratione, cucurbitularum ad-

admotiōe, & medicamentorum tum intra tum extra corpus adhibitiōe.

Diaeta.

In victus ratione offerenda sunt ea, quæ flatus discutunt & dissipant. Condiantur itaque fercula sem. cymini, carvi, Zinzib. & croco. Vitentur autem legumina, & omnia flatus generantia, Potus sit vinum absinth. aut cerevisia absinthiaca. Omnium autem convenientiss. ferculum erit jusculum ex cerevisia cum pauxillo butyro cum sem. cymi. præpar. conditum.

Ventosa.

Cucurbitulæ circa initium inflationis prope umbilicum & Ilia sine scarificatione crebro applicari possunt.

Medicatio hujusmodi est instituenda. Primum acriori clystere pituitosa materia ex intestinis eluatur, quod ita parari potest.

Enema.

℥. Fol. rutæ, ebuli, anethi, chamæm. flo. centaur. min. an. M. s. sem. cymini, carvi, Apii an. ʒ i. r. pulpæ colocynth. ʒ s. eoquantur concisa & confusa in q. s. aq. ad medias, juris colati accipe lb. i. cui admisce hieræ simpl. ʒ i. Benedictæ laxat. ʒ s. ol. lauri ʒ s. ol. rutæ ʒ i. salis ʒ i. fiat enema, quod tepidum infundatur.

Altero tandem ac tertio die concoquatur humor pituitosus totius corporis sequenti potione.

Decoctum digestivum.

℥. Rad. Apii, fænic. pimpin. dauci creti. an. ʒ s. Herb. mentæ, rutæ, puleg. meliss. an. ʒ s. Bacc. laur. Junip. an. ʒ ii. sem. cymini, carvi, Anisi an. ʒ ii. Concisis concidendis & contund. confus. coquantur in duplici vase cum lb. iiii. vini Rhenani per 2. horas, deinde colentur, & colato juri admisc. syr. de Arthemisia ʒ vi. fiat potio clara, ex qua mane ac vespere bibat ægra calefact. haustum.

Phlegmago.

Potione exhausta, subducatur pituitosa materia, à qua flatum excitari diximus, aut sequenti haustulo.

Haustus.

℥. Diaphæn. ʒ i. x. aq. Rutæ ʒ iiii. commisceantur, fiat haustus, qui tepidus sex horis ante prandium ebibatur. Aut seq. pillulis.

℥. Mas. pill. Agg. Aga. Troch. an. ʒ s. *Pillule.* diagr. gr. iiii. ex quibus simul contusis cum q. s. mellis rosacei fiant pill. n. xv. quæ inungantur ol. cymini, & devorandæ præbeantur in aurora, 6. horis ante prandium. Evacuato corpore præstiterit, ut octavo quoque die patiens deglutiat seq. pill.

℥. Mas. pill. de bdell. de sagap. Agar. *Alia pillule.* Trochisc. an. ʒ i. pul. castor. ʒ s. la. Cum syr. de Arth. formentur pill. n. 9. In reliquis intermediis diebus offeratur omni mane aut ʒ s. ol. cymini cum haustu vini mixtus, aut ʒ i. Theriacæ Androm. cum aq. rutæ commixta.

Vespere vero cubitum itura devoret 2. aut 3. rot. confect. diacym. aut devoret sequent. elect. semijugl. quantitatem.

℥. Cort. Arant. condit. cort. citri mali *Electuarium carminativum.* condit. an. ʒ i. s. Confer. Anthos. melliss. an. ʒ iiii. Concidentur minutissimè & contund. in mortario additis rot. Diacym. ʒ ii. & cum q. s. syr. condituræ cort. citri, fiat electuarium.

Ad Topica quod attinet, inungatur per *Topica.* æten pudend. & ilia quotidie mane ac vespere seq. linimento.

℥. Ol. Nardi, Rutæ, Anethi an. ʒ s. Iri- *Linimentum.* ni ʒ ii. ex gr. Junip. ʒ i. ceræ q. s. fiat linimentum, eluatur cum aq. Junip. ac deinde admisc. ol. vitr. ʒ s. fiat liniment. Post inunctionem inflato utero sive ventri ab umbilico usque ad pudendum imponatur emplastr. de bacc. lauri per linteum duplicatum aut alutam extensum, aut seq. cataplasma.

℥. Sterc. capri lb. ii. contund. & concoq. cum vini albi q. s. ad pultis formam. *Cataplasma.* cui admisc. pul. cymini præpar. Bacc. lauri an. ʒ i. r. sem. Apii ʒ i. mell. q. s. fiat cataplas. bis per diem imponendum.

Non incommode quoque tumenti utero sacculus calidus ex torrefacto Milio & sale *Sacculus.* æ. p. simul mixtis imponi potest. Aut fasci- culus

culus florum lineorum in aq. & cinere coctus, ac rursus expressus, *gekochet leinen Garn.*

Observatio necessaria de puerperio.

Observato tamen, in utero inflato in puerperio contracto, nec purgationes, nec clyster. nec alia interna remedia adhibenda esse, donec ægra ex puerperio profus convaluit; sed sufficit in puerperio, si sanguinis colluvies ex utero eluatur & cum mensibus profluat; quod fit, si tumens uterus fasciis subligetur.

8. *Vteri aquosa intumescencia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Hydrops uteri quid.

Υδρωψ υστερικῆς, Aqua intercus matricis est, ubi ex refrigerato epate, (hydrops enim non potest generari, nisi præcedat epatis refrigeratio & sanguificationis frustratio) crudus aut aquosus chymus, aut in ipsam uteri capacitatem per cotylodones, vel inter substantiam uteri & ejus externam tunicam, quam à peritonæo habet, aut sub interna ejus tunica colligitur, & secum uterus imum ventrem non aliter ac in ascite in tumorem extendit. Ætius aquam uterinam scribit in utero colligi in quasdam vesicas in capacitare uteri genitas. De hydropse uteri nec veteres nec recentiores practitantes Medici quicquam memoria dignum scripserunt, præter unum Hippocratem, qui in libris de natura mulierum, causarum & signorum ejus ita meminit. Aqua intercus in utero oboritur, menses pauciores & deteriores fiunt, id est aquosiores, deinde repente deficiunt & venter intumescit, & mammae siccae fiunt, ita ut sætum utero gerere suspicentur. Et paulo post; successu dolor inum ventriculum, lumbos & ilia occupat.

Hypocratis locus de hoc morbo.

Causæ.

Causæ *πρὸς τὴν ὑστερικὴν* sunt frigida intemperies tum epatis tum uteri, & flatulenti spiritus in utero coacervati, & mensium post uberiorem fluxionem, repentina diuturnaque suppressio. *Προκαταρτικαὶ* sunt cibi & potus refrigerantes, & omnia quæ epar & uterum impensius infrigidare possunt, quæ in hydropis curatione supra commemorata sunt.

Signa ostendentia qua in parte uteri aqua sit collecta, hæc sunt: si inter externam uteri membranam, quam à peritonæo habere diximus, est coacervata aqua, tum per poros facillè ea in peritonæum permeat, & instar Ascitis, totus venter intumescit.

Tali hydropse uterino correpta erat anno Christi 1560. honesta Matrona Martini Hannemanni conjunx, cum jam per 7. menses gravida extitisset, quæ tandem, cum remedia nulla ferret, per *παρὰ γέννησιν*, id est sectionem cutis Abdominis curata fuit, & aq. subtracta & brevi convaluit, sanumque enixa est puellum.

Exemplum hydropis uteri curati.

Si vero sub interiori tunica uteri aqua sit coacervata, nullus tumor notabilis, nisi forte circa pectinem ventris consequitur, sed in commotione corporis, fluentis aq. sonitus ac murmur auditu percipitur. Hujusmodi hydropse ante sexennium laboravit nobilis juvencula, conjunx viri nobilis Christiani Winterfeldt. Hæc species hydropis uteri conceptionem impedire consuevit.

Signa 2. species.

Ubi vero in uteri capacitatem confluit aqua, cum mensibus fluentibus & aqua effluit, & non eget alia curatione nisi mensium provocatione, & epatis ac uteri corroboracione. Sed si diutius in utero detineatur, putrescit & dolores excitat, mensesque supprimuntur. Prognostica in signorum enumeratione commemorata sunt.

Signa 3. species.

Curatio perficitur hydragogis seu aquam elicientibus remediis, eparque & uterum calefacientibus & corroborantibus, quæ omnia in curatione Ascitis, quæ species est hydropis, abundè enumerata sunt, & hoc loco repeti possunt.

Curatio.

Singillatim autem aquosus humor primum acri clystere in præcedenti curatione præscripto eluatur: deinde totum corpus ibidem descriptis catharticis purgetur, ac si adsit dolor, fomentis & cataplasmatibus ex fol. ebuli, pulegio, meliss. & chamæm. floribus confectis, aut inunctionibus dolor mitigetur. Sedato dolore, imo ventri imponatur cataplasma, aquam per poros alliciens, quod ita parari potest.

Evacuatio.

℞. Stercoris vaccæ virentibus herbis *Cataplasma nutritiva.*

nutritæ, saponis nigrae & fermenti p. æ. misceantur cum pauxillo aceti, fiat cataplasma & tepidum imponatur circa pectinem & inguina.

Vesicato-
ria.

Non incommodè quoque Vesicæ excitari possunt, quibus perforatis, profluet aqua impositio pastillo molli, ex pul. 3 i. canthar. & fermenti 3 s. simul cum pauxillo aceti mixtis.

Intra vero corpus indies mane ac vesperi sequens pulvis cum haustulo vini calef. 3 i. exhibeatur.

Pulvis hy-
dragogus.

℥. Grano. fruticum ebuli aut sambu. exiccatorum 3 ii. Medul. sem. car- tami, sem. Mercur. mar. sem. pæon. an. 3 i. cinamo. 3 ii. Fiat pul. tenuissimus. Porro commodissimè utero infundi possunt per syphonem 3 iii. seq. liquotis.

Enema u-
terinum.

℥. Fol. Meserij, Rad. Iridis nostratis an. M. i. decoquantur in q. s. aq. ad medias, colentur, & 3 iii. utero infundantur.

Pessus.

Aut inserantur utero pessii ex rad. Gentia. aut iridis nostratis facti, aut ex seq. pulv.

℥. Rad. Thitymalli, colocynt. an. 3 i. Gran. cnidii n. x. Ellebo. albi 3 s. cum q. s. mellis, formetur pessus, & in syndonem involutus oleoque irino oblitus utero inseratur.

Prodest quoque uterino hydropse laborantem famellam frequentius cum viro concumbere, & menses congruo tempore provocare medicamentis paulo post describendis. In gravidis (quæ non ferunt medicamenta) curatio per Paracent. cutis vel abdom. incisionem circa umbilicum est auspicianda. Observandum tamen ne aq. affatim & copiosè, sed sensim ac per vices educatur.

Menses
provocan-
di.

Paracente-
sis quando
locum ha-
beat.

9. Exulceratio uteri quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Vteri exul-
ceratio
quid.

Ἐλκωσις τῆς μήτρας est ubi aliqua pars uteri lacerata aut rupta, & continuitas ejus soluta est.

Causæ *απορρημνύει* uterinæ exulceratio-
nis sunt, inflammatio, acres & erodentes humores in ea collecti, partus difficultas, fætus aut secundinæ violenta ex utero evulsio, aut apostematis alicujus in utero disruptio. *Προγνώσκειν* sunt acrium medicamentorum in uterum insertio, contractus & concubitus violentus & cum morbo Gallico laborantibus, vel morbus Gallicus hæreditarius.

Signa exulcerati uteri sunt, dolor acris & punctivus in affecta parte uteri, sanies & pus per intervalla ex utero aut per se aut cum urina profluens, dolor syncipitis, & urinæ acredo; atque ubi una adest & inflammatio uteri, tum pauca sanies cum cruciatu profluit. Si verò sordidum est ulcus, copiosior sanies, & minori cum dolore exit.

Prognostica: Ex utero exulcerato pus *Prognosti-*
fœtidum & nigrum profluens, ulcus ma-
lignum ac depascens significat. Si vero pus album, paucum & æquale crassumque ac non fœtidum profluat, minus est periculosum, & facilius curari potest. Uteri tamen exulceratio omnis semper suspecta esse debet, & ejus curatio acceleranda. Cum enim uterus totius corporis excrementorum sit receptaculum, facilè incurdescit & exacerbatur.

Curatio consistit in victus ratione, ve-
næ sectione, & remediorum vitiosos hu-
mores in corpore redundantes præparan-
tium & subducentium, Topicorumque
pharmacorum adhibitione. Victus ratio
debet esse tenuis & parca, quæ ex Renum
exulceratorum curatione peti potest, aut
pro humoris vitiosi in corpore specie præ-
scribi debet.

Vena, si inflammatio adest, aut acres *Vena sa-*
biliosique humores corpus infestant, ape-
rienda est sub malleolis pedum. Deinde me-
dicatio instituenda est pro ratione humo-
ris sive is sit sanies salæ pituitæ, sive bi-
liosus, sive retortidus & cinereus melanco-
lici excrementi. Ac primum convenientibus
remediis humor vitiosus concoquendus &
præparandus, ac deinceps subducendus est:

quorum remedium sylvam in tabellis medicamentorum, & in aliorum viscerum curationibus supra annotavimus. Vel in genere fiat hujusmodi vitiosi humoris præparatio.

*Digesti-
um.*

℥. Rad. fenic. glycy. apii, polypod. an. ʒ iii. cort. internarum de baculis sambuci M. l. Rhab. ʒ ii. centaur. min. sem. malvæ M. s. Melif. pulg. veron. an. p. ii. Conf. fumar. ʒ ii. concisa & contusa coquantur in canth. cum q. s. aquæ ad duas horas, deinde colata exprimantur & juri admisceantur syr. è fumo terræ, de Anthemisia an. ʒ iii. fiat potio, de qua mane ac vespere ebibat ægra ʒ iii. calefactas. Potione exhausta purgetur corpus sequenti haustulo.

*Haustus
purgans.*

℥. Elect. hamech ʒ s. diacathol. ʒ iii. commisc. cum ʒ 4. aq. melissæ, fiat haustus. Corpore repurgato, si adsit inflammatio, lac ex sem. 4. frig. cum aq. plantagin. confectum mane ac vespere bibendum præbeatur.

Si vero absit inflammatio, seq. pulvisculus cum haustulo aq. Arthemis. mane ac vespere exhiberi potest.

Pulvis.

℥. Pulv. Aristol. rot. ʒ ii. Myrrhæ ʒ i. rad. asclep. ʒ iii. misceantur, ex eoque ʒ ii. exhibeantur.

Topica.

Purgato corpore applicentur utero sequentia Topica medicamenta. Porro medicamenta omnia, quæ applicantur utero, debent esse valide constringentia & exiccantia, cum propter loci scilicet uteri continuum humiditatem, tum propter nervosam ejus substantiam, quæ exiccantia efflagiat. Si itaque exulceratio levior sit, hujusmodi elorio utero infundi potest.

*Enema u-
terinum.*

℥. Herb. veronic. plantagin. corrig. rosar. rub. Balauftiar. sem. lentium, faniculæ an. M. s. decoquantur in aq. q. s. fiat liquor, ex quo eluatur locus affectus.

Ubi vero ulcus in conspectum est subjectum, & manibus contrectari potest, ul-

ceri seq. pulvisculus post abluionem inspergendus erit.

℥. Pulv. Thuris, Mastich. Boli Ar. Pulvis comen. sang. dracon. an. ʒ s. misceant. solidantur.

At vero si in profundo delitescat ulcus, Remedia præscripta remedia per syphonem injicienda ulcus præerunt. Si vero ulcus putidum & sordidum existat, primo cremore pitæ & melle rosar. mixtis tepidisque infusis abstergetur, ac

deinde fiat decoctio præscriptarum herb. in hydromel. q. s. quibus addantur rad. Aristol. rot. Iridis illyr. herb. persicar. & myrrhæ an. ad placitum, & decoquantur ad medias, quo liquore abluatur uterus singulis diebus bis per syphonem infuso: ac tandem sequens linim. pessulo ex syndone facto illitum usque ad locum affectum injiciatur, aut calefactum per syphonem impellatur.

℥. Mell. rosar. terpent. butyr. recent. Linimentum saliti an. ʒ s. misce, fiat linimentum, cui admisceatur seq. pulvisculus tenuissimè contritus.

℥. Rad. Aristol. rot. Iridis Illyr. an. ʒ s. croci ʒ s. Mast. Thur. an. ʒ i.

In malignis autem & serpentibus uteri ulceribus præstat astringentia magis injicere. Eluatur itaque uterus sequenti.

℥. Bac. Myrrh. cort. granat. sem. lentium an. ʒ s. Rad. Aristol. rot. Torment. Iridis Illyricæ, strobilorum cupress. an. ʒ iii. Herb. veron. persicar. maculatæ an. M. s. Alum. ʒ i.

concisa & contusa coquantur in hydrom. ʒ iii. ad medias, fiat Enema, quod tepidum utero injiciatur: atque si ex hujusmodi elotione dolor aliquis excitetur, cremore pitæ cum ol. rosar. mixto rursus eluatur, aut lacte rec. mulcto, cui nonnihil mellis rosati sit admixtum; ac postea supra scripto lin. admisc. pulv.

Acatæ, Hypocist. & lycii nonnihil an. ʒ i. qui pulveres vel præscripto vel melli ros. admisc. & cum pessulo aut per syphonem ad locum affectum impellatur.

Chymici hic Balsamum h. singulari cum efficacia adhibent.

Vlceris pu-
tridi re-
media.

Ubi autem in utero pars affecta putresce-
re & corrumpi inceperit, præstabit præscri-
ptæ decoctioni nonnihil æruginis addere,
vel in eadem 3 ii. Ung. Egypt. resolvere,
& in locum affectum imponere. Quin &
foris qua in parte uteri dolores percipiuntur,
ut aut paulo infra umbilicum aut ilibus aut
pectini aut coxis, empl. topica foris appli-
cari commodè possunt, quale est subse-
quens.

Empla-
strum
extrinse-
cus abdo-
mini ap-
plican-
dum.

¶ Ol. rosar. 3 ii. Adipis anser. 3 i. ce-
ræ albæ parum, liquefiant, fiat li-
nim. quod cum refrigerari incipit, e-
luatur 7. cum lacte mulieb. aut si id
desit, caprillo: ac deinde rursum le-
viter resolvatur, eique admisc. ceræ
alb. liquefactæ 3 ii. ac tandem seq.
pulvis tenuiss. contriti admisce.

Empla-
strum sti-
pticum
Crollii e-
tiam in e-
undem u-
sum com-
modissimè
applicatur.

¶ Tutæ præpar. Litharg. an. 3 i. ce-
rusæ 3 ss. sarcoc. 3 ii. camphor. 3 s.
fiat juxta artem Empl. quod per alu-
tam extensum loco dolenti impona-
tur, inuncto prius loco cum ol. ro-
sar. 3 i. & è Mastich. 3 s. simul com-
mixtis.

Hiscæ remediis si uteri substantia exiccare
nequit, tum suffragiis sequentium pastil-
lorum esse utendum, quorum fumus in ute-
rum exceptus mirificè omnem colluviem
exiccat.

Pastilli pro
fumo ad
exsiccan-
dum uteri
ulcus.

¶ Sandalor. succini an. 3 i. Ladani,
hypocist. an. 3 ii. Thur. Mastic. Myr-
rhæ an. 3 s. Auripigment. rub. 3 ii.
fiat pulv. tenuiss. & cum q.s. Terpent.
formentur pastilli; quorum unus aut
alter carbonib. ignitis in olla injician-
tur, & fumus per apicem infundibi-
uli in uterum recipiatur. Si autem
uteri exulceratio à Morbo Gallico est
orta, ejus curationem infra inter cutis
affectiones commemorabimus.

10. Vteri cancer quid, qua ejus causa, qua
signa, & qua curandira-
tio?

Cancer u-
teri quid.

Καρκινωμα ἢ μίρκας, est tumor live-
scens & aspectu teter, nucis juglandis ma-
gnitudinem nonnunquam excedens, in
ipso utero vel circa uterum generatus, in

quo, quia venæ circumcirca tument ac ru-
bent vel livescunt, instar pedum in cancris
fluvialibus, nomen habet. Eorum quidam
circa exulcerationem, alii autem cum ulce-
re conspiciuntur. Ulcerosus cancer ut plu-
rimum in sinu uteri exoritur, aut in collo
ejus; qui vero sine ulcere est, in labiis pu-
dendi muliebris circa inguina excitatur.

Causa ~~congenita~~ est humor Melan-
cholicus adustus & in erodentem cinerem
conversus, qui & scirrhi est causa, qui
processu temporis convertitur ut plurimum
in cancrum. Προγεννητικὴ sunt venenata
aut adurentia remedia utero applicata, præ-
sertim in curatione scirrhi uterini.

Signa cancri cum ulcerosi tum delitescen-
tis, si in externa uteri parte existat, mani-
festa sunt; visu enim tactuque deprehen-
ditur. Tumor siquidem lividus est, rubeus
aut livescentes radices ex se in adjacentes
partes projiciens, inestque dolor punctivus,
punctioni acuum similis. Exulceratus vero
cancer aspectu quidem abominabilis est, &
qu岸quam mollis appareat, tamen tangen-
tibus sabra potissimum ejus durissima sunt
& continuè lancinantibus doloribus sævit,
ac semper madet virulenta sanie, instar sudo-
ris tenuis, cujus color aut subniger, aut fla-
vus, odor vero foetidus est. Cancrī autem
in abdito loco confinisbusque uteri exorti si-
gna, non nisi conjectura, & ex sævis dolo-
ribus lancinantibus non procul intra umbili-
cum ac pudendum coxasque deprehendun-
tur.

Prognostica: Hippoc. 6. Aphor. Cancros
occultos, id est qui in abdito loco hærent,
vel qui nondum sunt exulcerati, melius est
non curare. Curati enim cito pereunt, non
curati vero longius perdurant.

CURATIO. Nullus cancer penitus ex-
tirpari aut curari potest. Ne autem latius
serpat, aut magis intumescat, prohiberi po-
test, & dolores ejus mitigare non est im-
possibile. Causæ vero cur curari nequeant,
prima est, quia in principio cum nondum
in justum tumorem excrevit, exigua mo-
lestiam adfert, ideoque negligitur. Secun-
do, quia sola eradicatione, id est, omnium
vena-

Ejus diffi-
cultas.

Causa.

Signa can-
cri non ul-
cerati.

Exulcerati
signa.

Interni &
delitescen-
tis.

Prognosti-
ca.

Curatio.

Cancer cur-
incurabi-
lis.

vena-

venarum tumori adjacentium & melancholico humore infarctarum excisione & evulsione ac deinde candenti ferro vulneris inundatione curari potest, quos cruciatus nemo patitur. Tertio, quia levia medicamenta admota hoc malum contemnunt, validioribus vero magis exacerbatur. Ut vero non in ampliorem tumorem increseat, aut latius exulceratio serpat, inhiberi potest his mediis, victus ratione, venæ sectione, hæmorrhoidum apertione, mensium, si suppressi sunt, provocatione, & adusti melancholici humoris concoctione, crebraque evacuatione, & quod primum, doloris per applicationem Topicorum mitigatorum seu blandientium continua impositione.

*Remedia
cancrum
mitigan-
tia.*

Diaeta.

Victus ratio qualis conveniat, supra in cancri mammillarum curatione prodidimus. Id monuisse sat sit, vitanda esse omnia acrida, falsa & melancholicum succum generantia.

*Venæ sec-
tio.*

Venæ sectio, & quidem singulis quadrantibus anni, primum in splenetica seu interna cubiti sinistri vena, deinde sub poplite aut sub malleolis existente molienda erit. Hæmorrhoides venæ quibus remediis aperiri debeant, in superioribus dictum est. Menses suppressi quomodo sint provocandi, paulo post in curatione suppressorum mensium docebimus. Quibus vero remediis melancholicus humor adustus sit concoquendus & evacuandus, supra in morborum melancholicorum, & in cancri mammillarum curationibus ostensum est, quæ huc commode referri possunt. Verum ne quid desiderent Tyrones, sequens potio probe extenuat adustum humorem per octiduum mane ac vespere bibita.

*Digesti-
vum atra-
biliaris
humoris.*

℞. Rad. polypodii ʒ i. Ellebor. nigri, Asari an. ʒ iiii. Myrabal. Indorum ʒ ii. Ceterach. Epith. scord. an. M. s. conf. fumar. Rorismar. an. ʒ i. Contusa coquantur in canth. oblinito cum seri lactis caprini ʒ. iv. per 2. horas, deinde refrigerata colentur &colato juri admisceantur syr. de fumo terræ, de epith. an. ʒ ii. fiat potio,

ex qua mane ac vespere ʒ iv. calefact. exhaustiantur. Absumpta potione fiat evacuatio cum extractionis ellebori *Evacuatio.* gran. vii. aut ʒ β. in formam pill. *tio.* confectis, aut pill. de lap. Lasuli ʒ i. cui admisc. grana iiii. Elleb. extract. fiant pill. xv.

In Topicis remediis caveantur acrida & ca- *Topica.* lesacientia. Sequentia autem prohibent tumoris incrementum & ulceris dilatationem, *Dolorem* & blandissimè mitigant dolores in tumore *mitigan-* atque ulcere. Primum ulcus in abdito lo- *tia.* co existens eluatur crebro lacte muliebri tepido, & si vehementer dolor ex cruciet, in lacte muliebri, aut caprillo ebulliant, Ro- *Enema u-* sar. violæ, Nymph. fol. solatri an. M. s. cali- *ternum.* cium hyoschy. n. iiii. cap. papaveris n. ii. coquantur ad tertias, & per syphonem utero infundantur. Aut

℞. Suc. plantag. sola. semper vivi an. *Linimen-* ʒ i. plumb. ult. Antimon. an. ʒ s. u- *tum ano-* rrorumque exactiss. pulveratorum & *dynam.* septies cum aq. rosar. elotorum, qui deinde in plumbeo mortar. & cum pistil. plumb. cum prædictis succis tam diu conterantur, donec nigrescant & incalescere incipiant, ac tandem si ulcus est occultum per syphonem impellantur: Si vero in loco manifesto hæreat, linteis excepta aut tumori aut ulceri imponantur. Mitigant quoque dolorem mirificè in cancro, fol. tene- *Fol. solani.* ra solani in lacte muliebri madefacta, & tumori ulcerique imposita. Idem efficiunt infensiones in tepidam aq. *Infusus.* usque ad umbil. in qua incocta sunt capita papav. rad. Alth. fol. Mal. flor. rosar. & violar. an. ad placitum.

Tumores inungi commode possunt ol. *Olea.* violar. nymph. & rosac. an. ʒ s. simul mixtis, aut unguent. populino. Aut imponatur Empl. de pomphol. & de cerussa. Aut ℞. Ci- *Empla-* ner. cancro. fluv. cum aq. solani quater elot. *stra.* ʒ i. Antimon. 7. eum aq. rosar. elot. ʒ s. quæ cum q. s. succi solani agitentur in plumb. *Linimen-* mortario, donec in linimenti crassitiem re- *tum sin-* deant, & linteolis excepta cancro imponan- *gulare.* tur. Reliqua remediorum genera ex cu- *Vide l. 3.* s. 3. 2. 8. *rat.*

rat. canceri mamillarum huc transferenda sunt.

II. *Durus uteri tumor particularis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo emolliendus sanandusve?*

Scirrhus tumor in utero. *Σκίρρῳς ὁ τῆς μήτρας καὶ μέγας:* Tractabitur hoc loco non de uteri totius indurescentia, sed tantum ubi apostema durum in aliqua parte uteri excitatur. Totius enim uteri substantiæ durities ut plurimum insanabilis est. Oritur autem plerumque scirrhus vel in uteri fundo, aut in latere, aut in cervice sive osculo. Est itaque scirrhus uteri tumor durus ac renitens: Verum non ut in reliquis partibus dolore prorsus caret, sed doler, moderatè tamen in cervice, sed vehementius in fundo; idque propter annexarum partium compressionem ac tractus.

Causa. Causæ *αἰτίαι* sunt uteri inflammatio & sanguinis melancholici aut pituitosi nondumque prorsus exusti in aliqua parte uteri collectio. Dux enim affectiones ex melancholico & crasso humore oriuntur: Ex frigido quidem & nondum perusto scirrhus, ex adusto vero cancer. *Προκαταρκτικαὶ* sunt violenta percussio aut compressio uteri, & præpostera medicatio inflammationis, aut alterius apostematis uteri. Ubi enim uterus vel alia quælibet pars corporis inflammatione vel apostemate laborat, & indoctus Medicus pharmaca adhibet impensius vel refrigerantia & constringentia, vel nimium calefac. & exiccantia, quæ materiam in tumore collectam totam discutere aut resolvere nequeunt, sed tantum ejus subtiliores tenuioresque partes absument, exiccant & cogant, tum materia tumoris indurescit & in scirrhum convertitur, malumque pejus redditur; id quod in curationibus inflammationum & apostemat. studiosè notandum.

Signa. Signa scirrhi seu duri tumoris uterini visu tactuque deprehendi possunt, & dolor his accedit, & tumor qui in fundo uteri hæret magis doler & ab eo totus venter intumescit, & in omnes partes pigritiem & pedum

tumorem infert. Prognostica: Scirrhi interim curatio neglecta aut perperam curata in *ακαταμάχητος* aut hydropem ægram con-jicit. Scirrhus ubi exulceratur aut inflammatur, in cancerum degenerat. Scirrhi uterini in collo existentes facilius, in fundo vero difficillimè curari possunt.

Curatio perficitur victus ratione, Venæ Curatio. sectione, humoris vitiosi præparatione, subtractione, & convenientium Topicorum applicatione.

Victus ratio instituitur temperata, & si *Dieta.* adsit inflammatio, nonnihil refrigerans. Pruna itaque, cremor ptisanæ, ova sorbilia, caro vitulina, pullorum, piscesque saxatiles conveniunt. Potus esto tenue vinum, aut Cerevisia lupulosa & clara. Reliqua ex scirrhi Epatis & lienis curatione huc transferenda sunt. *Vide l. 5. f. 1. q. 7. & f. 2. q. 4.*

Venæ sectio, si in principio adsit simul & inflammatio, primum molienda est lienaria sinistri humeri, postea & quæ sub poplite existit. Cucurbitularum ad tumorem applicatio, quam suadet Ætius, mihi non probatur. Tenuem enim materiam evocant & reliqua pars incrassatur. *Vena sectio.*

Medicatio: Humor melancholicus aut crassa pituita si redundet in sanguine, primum extenuetur & concoquatur, ac deinde evacuetur supra in epatis lienisque scirrhi curatione commemoratis remediis, aut qui in præcedenti tractatione canceri uterini sunt præscripta. Aut

2. Rad. fenic. petros. asari an. ʒ s. polypod. ʒ i. Aristol. rot. ʒ iii. Fumar. Scordii, Cardui Bened. an. M. s. Flor. centaur. min. æ. p. ii. Epithy. ceterach. an. p. i. Agar. Troch. & in linteolo ligati ʒ ii. Concisa & contusa coquantur in lb. 4. feri lactis caprin. in duplici vase per 2. hor. dein colentur, & collato juri admisc. syr. è fumar. ʒ vi. fiat potus, cujus ʒ iv. calefact. ægra ebibat mane ac vespèri. *Digestio.*

Exhausta hac potione purgetur vitiosus humor ʒ vi. aut vii. confect. hamech in aq. puleg. haustulo solutis calefactisque, *Purgantia.*
M m m & 6.

& 6. horis ante prandium ebibitis. Aut deglutiatis sequentes pill.

Pill. tartarea Quere. etiam hic utiles.

℥. Mas. pill. è fumo terræ, Aggreg. an. 3 i. Agar. Troch. 3 s. extract. Ell. nig. gr. iiii. cum aq. puleg. formentur pillulæ n. xv.

Topica. Fomentatio.

Corpore evacuato, scirrhus cum seq. remediis Topicis emolliatur ac discutiatur. Primum fomentetur tumor sequenti lavacro, in quo usque ad umbilicum infideat ægra, aut ejus liquor calidus subinde spongia exceptus Tumori imponatur: aut ex iisdem herbis conficiatur catapl. & quotidie tumori imponatur.

Cataplasma.

℥. Rad. alth. malvæ, lilior. alb. Achanti mollis, id est Brancæ urs. an. 3 ii. Fol. Arthem. Nepetæ, flor. chamæm. Melilot. Anethi an. M. ii. Sem. lini, sænugræci an. 3 ii. Grumi avenæ M. ii. Contusa & concisa coquantur in q. s. aq. & fiat vel infessio vel balneum quod Græcis *ἐνδύθη* vocatur. Aut fiat fomentum ex ejus liquore, aut expressæ herbæ atque confusæ ol. chamæm. addito & ping. suilla q. s. fiat cataplasma. Post forum balneumque semper inungatur tumor seq. liniment.

Linimentum emolliens egregium.

℥. Buty. sine sale, axung. porci. an. 3 s. Pingued. gallin. anser. anatis, leporis an. 3 ii. ol. amygd. dulc. lilior. albor. an. 3 i. Mucag. ex sem. sænugræci & lini cum vino confectæ 3 s. Terebint. 3 v. ceræ q. s. fiat linimentum.

Post inunctionem duro tumori imponatur Emplast. diachyl. vel si absit calor, Emplast. de Meliloth. aut sequens Emplastum.

Emplastum.

℥. Galba. Ammoniæ, oppopo. an. 3 s. contusa macerentur cum 3 iiii. vini in tepido loco, donec resolvantur, deinde per linteum exprimantur & ad pultis formam coquantur, admisceantur mucag. ex sem. althe. & sænugræci cum vino albo factæ, ac omnia probè commisceantur. Tandem

℥. Ol. lil. albor. anethi an. 3 iiii. ping. anser. leporis an. 3 s. Terpent. ceræ albæ simul ad ignem resolutæ q. s. Quæ cum infrigidari incipiunt cum præscriptis gummat. diligenter commisceantur, fiat Empl. Aut imponatur duro tumori uterino sequens cataplasma.

℥. Medul. panis filig. in decocto dactylorum ac ficum per noctem macerata 3 iiii. quæ in mortario contratur, eisque admisc. Rad. Alth. sem. sænugræci, lini, fl. chamæm. Melilot. omnium bene pulv. an. 3 i. quibus admisce vini albi q. s. & decoq. ad pultis formam, cui tandem admisc. Ol. Aneth. q. s. fiat cataplasma.

Pessus quoque ex præscriptis emollientibus Empl. si loci affecti constitutio ferat, utero inferi potest. Hisce remediis si uteri scirrhus emolliari aut resolvi nequeat, sed magis atque magis intumescat ac doleat, certum est in cancrum terminari, mortemque citam adferre.

Præter scirrhum, & alia Apostematum genera & calida & frigida infestare solent uterum. Verum cum curationem Apostematum supra in ventric. & aliorum viscerum tumore affectorum cura tradiderim, ea huc transferri possunt.

Hoc loco conveniet omnibus abscessibus unum atque alterum Utero conveniens adjecisse. Quando in uteri Apost. sive tumore pus generatur, tum ægra sentit ac potiss. circa vespertam dolores punctorios, & percipiat tumorem percipit incrementum: præterea supprimitur aut alvus aut vesica aut utraque: Quæ symptomata per leviores clysteres primum sunt removenda; deinde quo citius pus ad maturitatem pervenire queat, sequens catapl. Apost. imponatur.

℥. Pul. sem. lini, sænugræci, far. hor. dei, rad. alth. an. 3 i. Ficum coctorum in mortario bene contritorum 3 iiii. Quæ omnia simul commisceantur, & cum q. s. aq. ad pultis formam coquantur, quib. deinde admisc. Temp. 3 ii. fiat cataplasma. Aut

℥. Ster-

℥. Stercor. columb. q. s. Mellis & ol. Aneth. an. p. æ. & q. s. ex quib. conficiatur cataplasma lumbis & ventri tumenti imponendum.

Ex præscriptis quoque rebus fomentationes & infusiones sive balnea confici possunt.

Anodyn. Porro si dolor vehementius urgeat, cap. papav. in aq. concoquito & contusa instar cataplasmatidis dolenti loco imponito.

Rupto apostemate quid agendum. Cum vero apostema rumpitur, & pus ad vesicam profluit, quod plerumque contingit, aut sero lactis capr. aut lacte ex sem. 4. frigidis major. præsertim si addit inflammatio, cum q. s. aq. Alkakeng. facto, in potu utendum est, & sinus uteri decocto lentium subinde elucendus, oleoque rosaceo inungendus.

12. *Angustia sive occlusio uteri quid, ejus causa, qua signa, & quomodo aperienda?*

Angustia matricis. Φίμωσις τῆς μήτρας, connascentia uteri est, ubi os uteri ita est coarctatum, ut pudendum virile inferi nequeat, & mulier plane sit ad conjugium inepta.

Causa. Causæ αἰσθητικαὶ sunt aut callus & durities ex inflammatione aut tumoris mala curatione in utero relictus, aut à nativitate insita angustia, aut caruncula membranaeque ante ostium uteri pronata. Causæ αἰσθητικαὶ sunt violenta contusio aut vulneratio.

Signa. Prognostica. Signa sunt ipsis maritis nota, & ex fæmellarum querelis dignoscuntur. Prognost. Si semen per angustissimum orificium uteri illabatur, gravida quidem fit mulier, sed quia fætus exire non potest, mortem adfert præsentissimam parturienti.

Curatio. Curatio consistit in mollificatione & dilatatione angustiae foraminis, & in sectione carnis aut membranae in utero genitæ.

Si ex callo oriatur. Si itaque angustia uteri contingat ex callo aut induratione, tum infusions seu balnea ex seq. herb. confici poterunt.

Infusus emolliens. ℥. Herb. malv. althææ, Mercur. puleg. an. M. iii. Rad. Alth. Malv. an. ʒ iv.

Flo. chamæmeli, Meliloti, Anethi an. M. iii. sem. lini, fænugræci an. lb. s. Contundendis contulis & concidendis concisis in q. s. aq. coquantur donec aq. mucaginosa reddatur, ex quibus fiat infusio sive balneum, in quo sedeat ægra usque ad umbilicum per unam aut sesquihoram. Hæc decoctio quater aut quinque recalefieri cum eisdem herbis potest, & commodè usurpari.

Ex iisdem herbis commodè & fomentationes & vapores fieri possunt, quarum variatio. por per canalem operculo ollæ insertum in uterum excipi potest; aut idem liquor tepidus per siphonem instar Enematis utero infundi poterit. Post fomentationem inungatur adhuc uterus seq. linimento.

℥. Ol. lil. albor. Aneth. an. ʒ ii. A-
dipis anser. Ursin. an. ʒ i. terp. ʒ s. Mucag. ex sem. lini, fænugræci cum vino confect. ʒ iii. ceræ q. s. fiat linimentum. Aut

℥. Mucag. ex sem. fænugræci cum vino factæ, styra. liqui. an. ʒ i. Gum. Ammon. Myrrhæ an. ʒ s. quæ gummata in vino dissolvantur & per linteam transprimantur, reliquisque admisceantur, quibus adde ol. Trini ʒ vi. ceræ q. s. fiat linimentum.

Post inunctionem formetur pessus *Pessus.* pro mensura foraminis uteri ex empl. diachylo vocato, cui filum appendatur, & sindone involvatur, ol. lilior. alb. inungatur & calloso utero inferatur.

Ubi vero nulla in utero durities aut scirrhus adest, sed naturalis est à prima nativitate simul connata foraminis uterini angustia, dilatetur hoc modo. Primum in præscripta infusione sedeat ægra, deinde formetur ex arida spongia vel subere pessus, cui filum alligetur, & arcuè in angustiam uteri intrudatur, & quotidie talis spongia renoveretur, & major majorque efficiatur ex ea pessus. Aut paretur pessus ex rad. crassiore Gentianæ, qui cum filo appenso quotidie utero inferatur. Sed omnium efficaciss. est remedium in dilatatione uteri mari-
M m m 2 ti

Naturalis angustia ut corrigenda.

Pessus uterorum dilatans.

ti opera, si crebro & tamen cum ratione concumbat cum conjugē.

Oclusio u-
teri a pel-
licula vel
caruncula.

Porro si uteri foramen omnino est occlusum, aut propter pelliculam aut carunculam ori uterino pronatam, (hunc affectum Arabes *Abraticam* seu *clausuram* vocitant, & hoc malo affectu *ἀβράτις*, id est imperforata dicuntur) tum chirurgica industria est utendum, & novacula aut specillo, aut alio convenienti instrumento ad naturalem dimensionem est incidenda, aut prorsus caruncula præcidenda; id enim sine metu periculi à perito artifice perfici potest. Incisa pellicula, aut præcisa caruncula, sanguis ex vulnere manans totus profluere permittatur, spongiæque in vino tepido inadefacta abstergetur atque eluatur. Deinde vulneri linimenta, unguen. aut ol. rosar. cum vino mixto & calefacto imbuta imponantur, eisque vulnus repleatur, & si natura patitur loci, empl. vulnerarium imponatur, decenterque obligetur, donec vulnus consolidetur, semper diligenter prospiciendo ne foramen sectum rursum connascatur. Id quod præcaveri facile potest, si fistula aut canalis ex stanno paratus, foramini inferatur, aut radix, ut diximus, Gentianæ.

Vide Par-
um l. 23.
chirurg. c.
42. & 43.
Item Ro-
deric. à Ca-
stro de
morbis mul-
ierum l. 2.
c. 18. ubi
de opera-
tione hac
chirurgica
pluribus a-
giunt.

Vbi rena-
scitur, quid
agendum.

Ubi vero caro aut membrana incisa recrescere conspicitur, imponatur Ung. Apostol. vocatum, aut inspergatur pulvis ex ʒ r. Alumin. usti, ærug. & thuris an. ʒ s. concinnatus. Interdum autem caro hac, quam *Nymphaam* Rod. à Castro vocat, non solum renascitur, sed in tantam excrescit molem, ut non tantum orificium matricis occludat, sed etiam progredi faminas nullo modo patiatur, sicuti in famina quadam *Holsatica*, Anno 1607. observavi: qua massa licet bis per Chirurgum sectione auferretur, tamen renascebatur, & quidem adeo excrescebat, ut miserè contabescens reliquo corpore famina, tandem in vivis esse desineret.

13. Scissura seu rima uteri & Condylomata id est carnei tumusculi uteri quid sunt, quæ eorum causa, quæ signa, & quæ ratione curanda?

Scissura u-

ῥαγάδες τῆς μήτρας, sunt oblongæ rimæ

laceratæ in membranulis orificii uteri. Con- *teri quid.*
dylomata verò sunt tubercula instar verru-
carum in orificio uteri genita. Raro autem
rimæ sine condylomatis, vel condylomata
sine scissuris existunt. Fiunt autem rimæ non
tantum in uteri osculo, sed in aliis plerisque
partibus, quæ tenui membrana sunt vesti-
tæ, veluti sunt labra, papillæ mammarum,
anus & glans pudendi virilis: ita & in labiis
vulvæ oriuntur, de quibus hoc loco nobis
sermo erit. Quæ enim scissuræ in manuum
ac pedum plantis oboriuntur, hæ validiores
habent causas, quarum curationem inter
affectiones cutis descripturi sumus.

Causæ *αἰτίαι* tum rimarum tum *Causa.*
condylom. sunt acres salisque & ignei hu-
mores ad vulvam confluentes, siccitas
membranæ uterum vestientes, aut violentus
partus ob magnum caput fetus. *Περίσ-*
παιξις sunt, concubitus cum morbo
Gallico conflantibus viris, & pharma-
ca acria vehementerque exiccantia in ute-
ro diutius retenta.

Signa & scissurarum & condylom. sunt *Signa.*
manifesta. Dolor enim acris, si locus affe-
ctus palpetur, aut in ipsa Venerea actione
percipitur, & dilatatis ab obstetricibus labris
uteri rimæ aut verrucæ per ambitum vulvæ
visu deprehenduntur.

Curatio in victus ratione, venæ sectio- *Curatio.*
ne, & acrium humorum subductione, &
Topicorum remediorum adhibitione con-
sistit.

In victus ratione vitentur omnia a- *Dieta.*
cria & salsa, cremor ptisanæ & pruna sunt
aptissima fercula.

Venæ sectio, si corpus est plethoricum, *Venæ se-*
fiat primum ex Epatica dextri humeri, dein- *ctio.*
de & sub poplite.

Salsa pituita acresque humores & adusti
subducantur seq. haustulo singulis mensi-
bus epoto.

ʒ℥. Conf. hamech ʒ s. diacartho. ʒ III. *Evacua-*
elect. rosar. ʒ i. cum haustulo aq. *tio.*
puleg. resoluta & calefacta ebibatur
6. horis ante prandium.

Aut purgentur humores. aliis convenien-
tibus singulis vitiosis humoribus dicatis re-
mediis,

mediis, quæ supra in tabellis nostris sunt præscripta.

Tubercula exscindenda. Porro ubi simul & condylomata & pædides sunt conjunctæ, primum condylomata sunt auferenda, ac deinde rimæ curandæ. Possunt autem tubercula, si majuscula sint, & conspectui evidentia; novacula abscindi, ex quibus deinde sanguis omnis virulentus exprimendus est, vinoque tepido vulnus eluendum & chirurgico artificio consolidandum.

Pustula minores ut auferenda. Aut possunt quælibet condylomata, sicuti & verrucæ, filo interligari & intercipi, ut eorum alimentum intercipiatur, quo destituta brevi spacio decidunt & exarescunt. Minora autem tubercula & pustulis similia seq. Topicis auferri possunt, ut: Inungantur ung. Ægypt. aut Apost. vel illiniantur pauca gutt. ol. vitriol. & si natura loci patitur, imponatur eis emplastrum Diachylon; vel inspergatur seq. pulvis.

Pulvis. ℞. Fol. sabin. ʒ i. rad. hermodactyl. ustorum ʒ s. alum. usti ʒ i. Auripig. rub. ʒ ii. Mercur. præcip. ʒ iiii. misc. fiat tenuiss. pulvis. Aut illiniatur sequens liquor. ℞. Aq. plantag. rosar. an. ʒ i. in quibus resolvantur Mercur. sublim. cerussæ an. ʒ s.

Scissuræ remedia. Inseffus. Sublatis condylomatibus, scissuræ seq. Topicis curari possunt. Crebro infideat ægra usque ad umbilicum balneo dulcis aquæ in qua decocta sint malv. cum rad. alth. cum rad. sem. lini, sænugræci an. q. s. Tandem post balneum fiat fomentatio cum vapore vini rubei per candens excremento ferri in ollam positum vino insperso, & vapore excitato, quæ fomentatio debet fieri per i. horam. Deinde formetur pessus ex linteo, qui sequenti unguento imbuatur, ut utero rimoso scissove inferatur.

Linimentum. ℞. Antimon. plumbi usti, pompholig. an. ʒ ii. quæ tenuiss. pulverata cum aq. rosar. quater eluantur eisquæ admisce Acariæ, sanguin. draconis an. ʒ i. Thur. Mastic. Myrrhæ an. ʒ s. Alumin. Opii an. ʒ i. conterantur omnia cum vino rubeo, & in

linimenti formam reducantur. Aut

℞. Litharg. plumbi usti, cerussæ an. Aliud. ʒ s. stibii, pomphol. an. ʒ iiii. cadmiæ ʒ ii. hæc omnia cum aq. veronica tenuiss. pulverisata conterantur, ac rursus exiccata denuo in pul. redigantur, & cum q. s. ol. rosar. commisc. fiat liniment. quod pessus exoptum inferatur. Aut

℞. Ol. Myrtil. rosar. an. ʒ i. suc. plantag. consol. maj. an. ʒ ii. commisc. ac decoq. ad succi evaporationem, cui tandem addatur ceræ albæ q. s. fiat linimentum, cui admisc. plumbi usti, Antimonii probè pulverat. & cum aq. rosar. elotorum ʒ s. fiat unguentum. Reliqua curandi ratio cum condylomatibus tum Rhagadarum ex curatione affectionum anihuc accommodari potest.

14. Pruritus uteri quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo sistendus?

Pruritus uteri qualis affectus. Κνησμός τῆς μήτρας est affectio non dissimilis satyriasi in pudendis viri, nisi quod in satyriasi nullum adest Veneris desiderium: in prurigne vero uteri ex pruritū & confractione pudendi excitatur insatiabilis libido, quæ tamen ex concubitu & consuetudine virorum minimè levatur, sed magis magisque excitatur, eam ob causam, quia semen excerni nequit, propter vasorum infarctionem atque tumescentiam; & in Venerea consuetudine nihil agitur aliud, quam quod major copia humoris titillantis attrahatur.

Causæ. Causæ ἀκαταρκτικαὶ sunt acres, falsi aut adusti humores, & ferventes spiritus ad uterum defluentes, & pustulæ ex iisdem causis in utero exortæ. Causæ ἀκαταρκτικαὶ sunt pessi & acria erodentia pharmaca diutius in utero retenta, & continua confectio titillatioque pudendi cum Venerea imaginatione.

Signa ex querela patientis cognoscit maritus, & ægra semper admoras habet. Signa. Mmm 3. nus.

nus pudendo, & salacissima est, coeundi-
que desiderio contabescit, & tamen nun-
quam saturatur Venere. Signa vero humo-
ris pruritus excitantis cognosci possunt ex
habitu coloreque corporis & menstrui san-
guinis colore linteo excepti & exiccati: Al-
bus enim & calcis color salam & nitrosam
pituitam, flavus retorridam bilem, niger a-
dustam melancholiam pruritus causam esse
ostendit.

Curatio. Curatio perficitur victus ratione, venæ
sectione, vitiosorum humorum remotione,
localiumque pharmacorum applicatione.

Dietæ. Victus ratio debet esse tenuis & parca, re-
frigerans atque humectans; tales sunt cre-
mor prusanæ, pruna, lactuc. portulaca, pi-
scis saxatiles & similia: Potus sit aq. hor-
dei, cum uvis passis & paucis cinamoim.
cocta, quam præstat calidam bibere: aut
bibat lac ex amygd. & 4. sem. frig. cum aq.
plantag. confectum. Vinum autem & o-
mnia salsa, acia & calefacientia vitentur
sedulo.

*Venæ sec-
tio.* Vena, si corpus est plethoricum, secetur
primum hepatica dextri humeri, deinde &
ea, quæ sub poplite habetur. Post venæ sec-
tionem & cucurbitulæ cum scarificatione
circa inguina & lumbos commodè applicari
possunt.

*Evacuan-
tia.* Vitiosus humor pruritus excitans, qua-
liscunque is sit, suæ naturæ convenientibus
remediis, quæ supra toties in tabellis medi-
camentorum, & in curationibus morborum
ex certis vitiosis humoribus ortorum com-
memorata sunt, primum præparari extenua-
rique, deinde & expurgari potest. Ne quid
autem desideretur, pituitam salam conco-

*Digessi-
vum salsa
pituita.* quit & temperat serum lactis caprini, in
quo concocta sunt centaur. min. hyssop. pu-
leg. & Mel. rad. Asari, & similes, si ejus
3. iiii. mane ac vespere per 4. aut plures
dies ebibantur. Eandem pituitam postea
probe expurgat haustulus ex 3. rx. diaphæn.
& 3. iiii. aq. centaur. minor. confectus, &
mane calidus ebibitus.

*Phlegma-
gogum.* probe expurgat haustulus ex 3. rx. diaphæn.
& 3. iiii. aq. centaur. minor. confectus, &
mane calidus ebibitus.

Bilem flavam retorridam contemperat Bilem præ-
& ad eductionem præparat potio ex decocto radic. glycyrr. cichor. tamarind. & ca-
coctum. pill. Ven. hisque similibus artificiosè con-
fecta, si ejus sumantur 3. iiii. eisque admisc.
3. i. syr. rosar. aut violar. & mane ac vespere
per tres quatuorve dies tepidè ebibatur.
Leniter autem expurgat hanc ipsam bilem
el. rosar. sol. Mes. 3. s. cum haustul. aq. ci-
chor. mixtum & calefactum, exhaustum-
que.

Melancholicus humor adustus conco-
quitur, & habilis ad eductionem efficitur
decocto polypod. cererach. veratri nigri præ-
parat. & fumar. cujus decocti 3. iiii. ad-
misc. syr. de epithym. 3. i. & per quinque
dies mane ac vespere ebibatur.

Postea 2℥. Diacath. confect. Hamech, Melanago-
Elect. senæ an. 3. ii. Aq. fumar. 3. iiii. mi-
sce, fiat potio.

Vitioso humore pruritus excitante ex-
purgato, salutare est singulis diebus ex-
hibere 3. i. rad. nymph. cum aq. rosar. 3. ii. Rad. nym-
phæ aut suc. fol. salicis 3. i. cum syr. violar. mi-
xtum.

Deinde procedatur ad Topica: ac pri-
mum, caput quotidie perfundatur aqua
rosac. cum paucis aceto rosa. mixta. Pro-
dest autem uterum quotidie eluere aq. quæ
effluit ex incisus palmitibus vitis. Lumbi
vero & loca circa pudenda inungantur in-
dies ung. popul. cui parum acet. rosar. &
nonnihil camphoræ sit admixtum. Avicen-
na vehementer laudat vinum in quo deco-
cta sunt fol. mentæ, fol. ros. & cort. ma-
lorum granatorum ac lentes excorticatæ, si eo
pruriginosus uterus fomentetur lave-
turque. Aut prurienti loco imponatur stic-
folani, portul. lactu. & fol. salicis an. 3. iiii.
quibus admixta sunt granat. quinque cam-
phoræ.

Reliqua remedium genera in curatio-
ne priapismi supra tradita, & in curatio-
ne inflammationis uteri, commemorata
sunt.

SECTIO II.
DE AFFECTIBUS QUÆ CIRCA
UTERI PURGATIONEM CON-
TINGUNT.

I. *Menses muliebres quid, & qua circa
menses consideranda?*

Miseria
famini
sexus.

Miserum fragileque genus fæminæum, ut corpora habet virorum longe frigidiora, ita & imbecilliora, & vitiosis humoribus excrementisque magis referta, qui vitiosi humores nisi singulis mensibus à naturâ, à Deo opifice corporibus indita, evacuantur, necesse foret fæmellas perpetuis morbis confictari. Horum vitioforum humorum receptaculum est uterus, in quem tanquam in sentinam totius corporis impuritas confluit, & per lunæ periodos statatque tempora excernitur, ex cujus humoris constitutione ac colore redundans in corpore humor certius, quam ex urinae inspectione dignoscitur. Sanguine enim menstruo lineolus tinctus & exiccaus si sit floridus, bonam intemperiem & corporis salubritatem sanguineæque massæ puritatem; si albidior pituitæ; si flavidior aut citrinus, bilem flavam; si niger aut lividus, melanchol. hum. in corpore muliebri, redundare significat.

Menses
quid.

Hujus sanguinis ex utero profluvium Græci *ἐμμήνιον*, Latini menses, menstrua, & menstruum sanguinem, nostrates autem mulierculæ honestiorem ac vetecundiori Vocabulo per metaphor. flores ac iofas muliebres *die fremliche Blumen / Rosen oder fremliche Zeit* nominant. Menses autem duplici ratione profluere solent, secundum naturam, & præter naturam. Secundum naturam se habens mensum profluvium est causa valetudinis & fecunditatis. Impossibile est enim sine naturali sanguinis menstrui excretionem mulierculas aut bene valere, aut conceptioni idoneas esse. Præternaturale menstrui sanguinis profluvium est, ubi vel ejus copia seu quantitas excedit; aut qualitas ejus vitiosa est; aut ubi intempe-

Eorum
differen-
tia.

Menstrua
purgatio-
nis vitia.

stive, & non ad periodos Lunæ profluit; aut ubi prorsus suppressitur ex causis mor-
bificis, quæ multorum symptomat. gravif-
simorum est causa.

Circa menstrui sanguinis effusionem o-
cto sunt consideranda.

I. Menses in salubribus & bene tempe-
ratis corporibus virginum fluere incipiunt in
hisce borealibus regionibus ut plurimum
circa annum ætatis 16. & fluere desinunt
anno ætatis 50. Verum hæc regula sæpe fal-
lit. Nam pro ratione temperamenti victus
& vitæ genere, aliis citius, aliis tardius flue-
re incipiunt & desinunt.

II. Virginibus quibus menses primum
erumpunt, paulo ante ubera intumescunt, &
& papillæ pruriunt, capiteque dolent, &
tunc primum aptæ sunt conjugio, & nun-
quam sine sanitatis dispendio ante mensum
cursum concipiunt. Nam veluti arbores non
ferunt fructum, nisi primum producant
flores, ita nec virginibus ante mensum pro-
fluvium concipere possunt, & omnium con-
venientissimum est conceptionis tempus
post purgatos menses.

III. In salubribus corporibus, (viragi-
nibus exceptis, & illis qua calidioris natura
sunt, vel duris exercentur laboribus) singulis
mensibus profluunt menses, nisi tempore
gestationis in utero & lactationis. Tum e-
nim sanguis menstruus in alimentum satus
cedit.

IV. Profluvium sanguinis menstrui per-
durat ut 'plurimum' ad sex septemve dies.
Interim Deus & Natura prohibet comple-
xum muliebrem. Sicuti videre est *Levitici*
c. 18. v. 19. *Ad mulierem qua patitur men-
strua non accedes, nec revelabis faditatem
ejus. Ibid. c. 20. v. 18. Qui coierit, ait lex,
cum muliere in fluxu menstruo, & revela-
verit turpitudinem ejus, ipsaque aperuerit
fontem sanguinis sui, interficientur ambo de
medio populi sui.* Verum hæc regula variatur
pro temperamenti ratione, aliis vix per 3.
dies durat, aliis ad 8. usque diem extendi-
tur profluvium.

V. Regulare est virginibus & juvenculis
in prima quadratura, mediæ ætatis mu-
liercu-

Circa
menstrua
purgatio-
nem consi-
deranda.
1. Tempus
quo inci-
piunt &
desinunt
menses.

2. Signa
primam e-
ruptionem
& ruptio-
nem
Virgines
quando
nubiles.

3. Quan-
do natura
singulis
liter fluant
& cessant.

4. Tem-
pus dura-
tionis pur-
gationis
menstrua.

5. Quo
mensis
liercu-

tempore
cuique
fluant.

6. Mensu-
ra seu
quantitas.

7. Quis
sanguinis
menstrui
usus.

8. An ve-
nenata
qualitate
sit imbu-
tus.

Plinii lo-
cus ut in-
telligen-
dus.

Præter-
naturalis
sanguinis
menstrui
evacuatio
qua.

lierculis circa oppositionem vel plenilunium; provectioris ætatis, in ultima quadratura ut plurimum menses profluere.

VI. Mensura quoque menstrui sanguinis profluentis non est in omnibus æqualis. Sed pro temperamenti ratione in aliis plus, in aliis minus excernitur: Sed tamen ut plurimum capacitatem testæ ovi anserini complet.

VII. Usus menstrui sanguinis in utero adhuc existentis est, ut sit una cum semine parentum, materia partium fœtus. Nam tempore gestationis in utero, ejus benignior pars cedit in alimentum fœtus, impurius autem ejus pars digeritur in totum corpus, & vel absorbitur à calore nativo, vel per urinam excernitur.

VIII. Plinius lib. 7. cap. 15. Nihil magis monstrificum sanguine menstruo esse scribit, ejus enim attractu dicit vina acescere, fruges sterilefcere, hortorum gramina & plantas exuri, ferrique aciem hebetari asserit, & mulierculas fluore mensem laborantes solo intuitu terlis speculis cruentas maculas inducere dicit. Quæ Plinii sententia simpliciter vera non est. Si enim tam horrendum esset venenum, eo sine perniciæ fœtus in utero ali non posset. Eatenus itaque vera est sententia, ubi menses in utero detenti putrescunt, & vitiosis venenatisque humoribus commisceantur. In sanis autem corporibus fœmellarum nihil tale deprehenditur. Quoniam verò plerumque corpora earum impura sunt, sæpe fit, ut superveniat earum salsamenta, vina, & condita corrumpantur & putrescant, uti experientia testatur.

2. Præternaturalis & immoderata Menstrui sanguinis profusio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quo modo suppressenda?

Ἀπεργὴ & ἀποπόσις, sive ὑπεργήδουσις ἢ μήρης, præternaturalis Matricis evacuatio est, ubi præter consuetam mensuram aut copiosius aut præter consuetum tempus diutius crebriusque & intempestivus sanguis menstruus ex utero profluit cum variis symptomatibus.

Causæ immoderati mensium floris *ἁπλῆ* Causa. *ὑπερβαί* sunt corporis plenitudo, nimia incallescencia uteri, aperiens cotyledones, & orificia venarum in uteri capacitatem desinentium. Item sanguinis tenuitas & acrimonia venas erodens, qualis est sanguis aut bile aut seroso humore aut salsa pituita mixtus, ruptio venarum in utero existentium, quæ contingit ex casu, percussione vel aliis causis externis. Causæ procatartice immoderati floris sunt cibi & potiones & balnea impenitus calefacientia, sanguinemque extenuantia pharmaca venas erodentia utero inserta diutiusque in eo retenta. *Ἀνὴρ ἰτεμ* *consternatio* & *ἡμῖα ἱρακύνδῃα*. Ruptionis venarum in utero causæ externæ sunt, vehemens frigus, aut violentus corporis motus.

Signa immoderati floris mensium ex *Signa*. querelis muliercularum, & fœdo corporis colore, pedumque intumescencia & virium appetitionisque prostratione deprehendi potest. Causarum vero signa sunt: *Diversa- rum cau- sarum in- dicia.* Si venatum orificia in utero hient, tum sanguis non affatim profluit, sed tantum continuè extillat, & ætus ingens in utero præsentiscitur. Si erosæ sunt venæ, ostendit biliosa constitutio corporis, & flavus faciei color tenuitasque excreti sanguinis, & dolor acris in excretionem sanguinis. Si salsa pituita sit causa erosionis, sanguis profluens pallidior est, & dolorem non adeo acrem infert. Si ruptæ sunt venæ uteri, sanguis confertim & copiosè erumpit.

Prognostica: Nisi tempestivè immoderato flori menstrui sanguinis succurratur, *Prognosti- ca.* uti reliqua sanguinis undequaque nimia profusio, ita & immoderati menses in hydropem tandem concipiunt, & crebra animi deliquia inferunt.

Curatio immoderati profluvii sanguinis menstrui dirigenda est pro causarum diversitate, & quidem perficitur venæ sectione, victus ratione, & medicamentorum convenientium usurpatione. *Curatio.*

Venæ sectio in calidis causis & corporibus plethoricis multoque sanguine refertis *Venæ se- ctioni quando locus.* locum habet: In aliis corporibus non item.

Vena itaque epatica vocata in dextro humero aversionis five revulsionis causa incidenda erit, & pro una vice non multum sanguinis detrahendum, sed alternis diebus sectio reiteranda. Post venæ sectionem, aut ubi locum non habet venæ sectio, ejus vice plurimum prodest sub utrisque mammis cucurbitulas apponere, & utrumque humerum dolorifica ligatione constringere.

*Revulso
per cucur-
bitulas &
ligaturas.*

Diat.

Victus ratio convenit refrigerans & exsiccans. Exhibendus itaque est panis bis coctus, ova dura in aceto macerata, oryza cum lacte chalybeato cocta, pyra cocta & assa, carnes avium sylvestr. cervina, leporina, eaque omnia assa magis quam elixa conveniunt. Item pulmenta ex amylo, & sac amygd. Omnia autem alimenta coqui debent cum aq. chalybeata. Potus esto cerevisia clara, in qua macerata sunt lamina panis tosti cum nuce moscata confricata, aut aq. hordei in qua candens ferrum est extinctum, aut in qua rad. Tormentill. & Balauft. & paucum cinamom. est decoctum. Prodest quoque, & vice medicamento erit, si mulierculæ menstruo præternaturali affectæ, quotidie jejuno ventric. assumant panem siligineum recens pistum, & in minutas partes concisum atque in butyro probè frictum (*gekrintelt oder geröstet Warm hier*) si primum ejus mediam partem sine liquore edant, & alteri parti cerevisiam adfundant & calefactum esint.

*Hec omnia post
evacuatio-
nem hu-
moru mor-
bifici con-
veniunt.*

Remedia.

Quod ad medicationem atinet, in tota curatione est cavendum ne alvus sit obstipata, quod si contingat, leni clystere, aut suppositoriis subducenda erunt excrementa: Deinde sedulo considerandum est, qui vitiosi humores in corpore redundant, id quod tum ex urina tum ex totius corporis habitu ac colore, omnium vero maxime ex colore menstrui profusi linteo excepti & siccati deprehendere licet. Si enim pallidior & albus color appareat, pituita; si flavior bilem flavam; si niger aut lividus melancholic. hum. redundare in massa sanguinea ostendit.

*Purgan-
tia.*

Primum itaque vitiosus humor præpa-

retur & ad evacuationem habilis reddatur, deinde leniter & per vices convenientibus remediis supra commemoratis, ut pituita, liquore in quo maceratus est agaricus, addita diaphan. q. s. Bilis flava cum liquore in quo maceratum est Rhab. addita q. s. syr. ros. solut. Melancholic. humor cum diacatholica sufficiens q. subducatur.

Purgatione peracta, propinanda sunt hujusmodi remedia, quæ sanguinem infrigidare ac condensare, & venas constringere fluxionemque cohibere queant, ut sunt hæc sequent. ad cohibitionem floris mensium multiplex experientia comprobata.

*Adstrin-
gentia &
fluxum
supprimen-
tia.*

℥. Suc. plantaginis polygoni defecatum, Bursæ pastor. an. ℥b. ss. in quibus ebulliant Acatæ concisæ & Balauft. an. ʒ ii. colentur, & fiat portio, cujus ʒ iiii. mane ac vesperi ebibendæ præbeantur. Magis astringit fluoremque mensium cohibet, si huic haustulo admisc. ʒ i. pul. Trochisc. è carabe, aut ʒ i. Troch. è terra sigill. aut è spodio, aut ʒ i. corall. rub. præparatorum. Plurimum quoque à veteribus in sistendis mensibus celebratur ʒ ii. elect. Micletæ, aut Athanasii, si cum haustul. vini rub. in quo candens ferrum est extinctum, exhibeatur, aut ʒ i. Electuar. philonii Perfici.

Decoctum.

*Veterum
remedia.*

Potentissimè quoque sanguinis menstrui fluorem sistit sequens portio, si ejus ʒ iiii. mane ac vesperi exhibeantur.

℥. Croci Martis, id est ferri concremati & in croci coloris pulvisculum conversi, aut scorix ferri concremati, & sapiusculè in aceto extincti, lapid. hæmat. an. ʒ ii. fiat pulv. tenuiss. & commisc. cum syr. è cyton. & papav. an. ʒ i. eisque admisce suc. polygoni defecati ʒ iiii. fiat haustulus, qui, ut diximus, mane ac vesperi reiteretur. Aut

*Potio vali-
diss. fluo-
rem sistens.*

*Chymici
hujus loco
essentia
croci ʒ &
tinctura
corallorum
utuntur.*

℥. Sang. Dracon. Boli Armen. succini Pulvis. citr. corall. rub. præp. an. ʒ ii. corn. cervi usti & præparati, spicæ indicæ

*huic simi-
lu & ma-*

Non an. ʒ i.

*foris effica-
cia est
pulvis dy-
sentericus
Crollii.
Potio alia.*

an. ʒ i. fiat pulv. tenuiss. & pro vice una ʒ i. cum ʒ iiii. suc. polyg. calida exhibeatur, indiesque bis reiteretur. Aut

℥. Rad. symphyti ʒ i. Balauft. Acatiz concisæ an. ʒ s. coquantur in vini rub. astringentis lb. ii. ad med. colentur, & ejus ʒ iiii. mane ac vesperti tepidæ exhibeantur. Aut

Massa.

℥. Coaguli hæd. aut leporis cui admisc. coral. rub. præp. Gummi Arabici torrefacti & probe pulverisati, sang. Dracon. an. ʒ i. Thuris ʒ s. fiat massula, cujus ʒ i. resolvatur in ʒ iiii. suc. rad. symph. deputati, fiat haustus, qui mane ac vesperti reiteretur, donec substituant menses. Aut

Pulvis.

℥. Semen pœcon. testarum ovorum ustulatarum, sulph. citr. an. ʒ ii. fiat pulv. ten. cujus ʒ i. cum vino chalybeato aut suc. polyg. ʒ iiii. tepidæ exhibeatur. Aut

*Electua-
rium con-
stipans.*

℥. Rad. virid. symph. maj. plantag. an. M. i. quæ minutim incisa coq. in aquæ chalybeatæ q. s. ad molliciem, deinde adfusa aq. rad. probè contundantur, & per cribrum transigantur instar pultis, cujus accipe ʒ vi. quibus admisce sacch. albi in q. s. succi corrigiolæ soluti ʒ iiii. concoque simul ad lentum ignem, donec elect. formam consequatur, cui admisc. pul. sang. Dracon. Tragacanti, Acatiz an. ʒ i. s. succini flavi, cornu cervi usti ac præpar. coral. rub. præpar. lap. hæmat. an. ʒ i. commisc. fiat elect. cujus ʒ s. mane ac vesperti devoretur, aut cum vino rub. chalybeato ebibatur. Aut ℥. Conf. ros. antiq. plurimumque annorum ʒ ii. pul. rad. symph. corall. rub. præpar. an. ʒ ii. Troch. è succino ʒ i. commisc. & cum q. s. syrup. è papav. fiat elect. de quo assumat ægra mane ac vesperti semijugl. q. Aut ℥. Spongiæ probè elotæ, deindeque in cinerem exustæ, ac rursus in aq. rosarum elotæ ʒ iiii. cor. cervi usti ac præp. cortic. granat. an. ʒ i. coral. rub. præp. ʒ s.

*Electua-
rium a-
liud.*

*Pulveres
adstringen-
tes variis.*

misc. fiat pul. de quo mane ac vesperti ʒ i. exhib. cum suc. polyg. aut vino rubeo chalyb. Aut ℥. Thur. mastich. nucum cupr. rad. bistortæ an. ʒ ii. fiat pulv. ten. cujus ʒ o-vo forbili admisc. ac edatur. Aut ℥. Pellicul. rubeorum immediate nucleos nucis avellanæ tegentium ʒ s. exiccata redigantur in tenuiss. pul. cujus ʒ i. cum vino chalyb. exhibeatur.

Porto inter Topica remedia foris applicanda, conveniunt balnea sive infusiones, Epithemata, unguenta, catapl. Emplastr. pessi. Balneum hac ratione præparari potest.

Topica.

℥. Polygoni, lysimachiz sive salicariæ Infusio. utriusque an. M. iiii. veron. stachad. purpur. fol. querci, fol. prunellæ sylv. fol. pyri sylv. an. M. iiii. Rad. symph. Bistortæ sive Tormentill. cortic. radic. prunellorum an. M. i. glandium & fabarum an. M. iiii. Concidenda concidantur & contundenda contundantur ac coquantur in q. s. aq. cujus tanta debet esse copia, ut ægra usque ad umbilicum infundere queat. Postea in ea aqua exting. ferri excrem. candens & fiat balneum, cui infideat ægra per unam aut sesquihoram, & sæpius reiteretur. Eadem aqua calefiat cum candentibus excrementis ferri.

Plurimum quoque conferunt ad sistendum menstruum profluvium thermæ aluminosæ & sulphureæ, quales habentur prope vallem Joachimicam. *Therma hic conducit.*

Aut loco balnei non incommode ad restringendum menstruum profluvium uti possumus fomentatione cum iisdem rebus in balneo commemoratis, si in minori aqua. *Fomentatio.* in olla majuscula cum vino rub. concoq. & ferventis ejus vini vapor ex olla cum infundibulo obiecta in uterum recipiatur, muliercula undique bene obiecta. Quin solo vapore vini rubei in candens excrementum ferri vino cum spongia insperso vapore per horam in uterum excepto qualem

*Experi-
mentum
simplex.*

dam

dam miseras mulierculas profluvio mensium laborantes feliciter curavimus.

Suffumigium.

Eadem ratione & suffumigationes uteri fluorem sistere possunt, quales sunt ℥. Colophon. ʒ i. Eboris usti sive spodii, cor. cervi usti, sem. papav. nigri an. ʒ s. quæ crassiusculè contrita commisceantur, & spacio unius horæ carbonibus ignitis, in olla quæ pudendo muliercularum subiecta, subinde inspergantur, & fumus per infundibulum in uterum recipiatur: Mixticæ quoque retrahendo sistit fluorem mensium, si acetum vini calefactum duplicatis linteolis exceptum, mammis subinde imponatur, aut eisdem sequens cataplasma imponatur. ℥. Chelidon. major. cum rad. ad placitum, quod cum pauxillo aceto vini contundatur, & instar cataplasmatismis mammis imponatur.

Revulsorium epithema pro mamillis.

Præstiterit quoque imum ventrem circa pudenda & lumbos quotidie bis inungere unguento comitisæ, aut sequi. unguento. ℥. Ol. myrtill. à mastice an. ʒ i. suc. corrig. suc. rad. consolidæ maj. suc. plantag. an. ʒ i. s. Gallarum & sumach crassiuscule contritar. an. ʒ s. commisc. ac coquantur ad suc. absorptionem, colentur, & colato oleo addatur ceræ ʒ s. & reducatur in formam linimenti, cui admisc. tenuiss. pulv. Mast. Acar. Hypocist. an. ʒ i. Troch. è terra sigill. è spodio an. ʒ iv. commisc. fiat unguentum. Deinde imponatur imo ventri & lumbis sequens Epithema calefactum.

Epithema.

℥. Succ. Corrigiolæ, suc. pentaph. suc. symph. suc. plantag. an. ʒ v. Aceti vini ʒ ii. quib. admisc. boli Arme. sang. dracon. Balauft. tenuissimè pul. an. ʒ s. fiat Epithema, & duplicatis linteolis exceptum locis prædictis imponatur, subindeque reiteretur. Aut conficiatur sequens cataplasma. ℥. Cor. cervi usti, cineris chartarum luforiarum, scotiz ferri prius inflammata, & in aceto vini sæpius extinctæ, Gallarum an. ʒ s. fuliginis ex ahenis detractæ ʒ iii. Acetiz, Hypocist. an. ʒ ii. strobil. cypressi combusti ʒ i. s. redi-

Vnguentum pro venire & lumbis.

Cataplasma.

gantur omnia in tenuissimum pulverem, ac deinde cum alb. ovorum cum pauxillo aceti rosar. concussorum q. s. in catapl. sive pulvis formam redigantur, & tep. duplicato linteol. except. lumbis & imo ventri imponantur. Idem præstat & seq. Emplast.

℥. Pul. Masti. ʒ s. Laudani, Thuris, Emplast. Gallarum, Nucle. cupressi, Rad. strum. Bistortæ an. ʒ ii. Myrrhæ, Galbani an. ʒ i. Ter. sigill. ʒ iii. ceræ parum. Quæ omnia in cal. mortar. diu contund. addito pauxillo ol. è Mastic. & in Emplast. formam redigantur, atque per alutam extendantur, imoque ventri & lumb. applicantur continueque gestentur.

Vel fiat catapl. ex pulv. gypsi adusti & Cataplasma leporinis ustis simul mistis, & cum alb. sma.

ovorum pauxilloque aceto vini fiat cataplasma lumbis & imo ventri imponendum. Maximi quoque momenti est cataplasma, ex far. fab. & hord. & pul. rad. symph. p. æ. cum albumin. ovorum & pauxillo aceto confectum, modoque supra dicto usurpato. Inter alia remedia quæ intra corpus sumuntur, excellentissimus est seq. pulvis. ℥. Musci seu usneæ Arabibus Pulvis exdictæ per calvas mortuorum pronatæ, & cellentissimæ nucl. ex Tamarindis exemptorum an. ʒ ii. torrefacta, tenuiss. pulverentur, & iucundi saporis causa admisc. pulv. caryoph. ʒ ii. cuius ʒ i. ante cænam & prandium cum haustulo vini rub. in quo extinctus est chalybs candens, exhibeatur. Caseus quoque vetus & exiccatus in rub. vino ad pultis formam coctus & esitatus fluorem mensium constringit: deinde pudendo indatur pessus sequens.

℥. Elect. Micletæ & Athanasiz an. Pessus. ʒ vi. quibus in mortario admisc. pulv. Acetiz Hypocist. bol. Arme. sang. Draco. Gallarum an. ʒ v. cor. cervi usti, Balauft. an. ʒ ii. Commisc. probè & formetur pessus, qui sindone involvatur, alligato serico filo, ut quovis tempore eximi queat, & indatur per noctem. Proderit

Empla-
strum.

deinde imo ventri sequens Empla-
strum & lumbis applicare. \mathcal{U} . Pulv.
Mastic. $\frac{3}{4}$ s. Ladani, Thuris, Gall.
Nuc. cupressi, Bistortæ an. $\frac{3}{4}$ i i.
Myrrhæ, Terræ sigillat. an. $\frac{3}{4}$ i i.
Galbani $\frac{3}{4}$ s. Ceræ q. s. ad formam
emplastri, quæ omnia in calido
mortario diu conterantur, addito
pauillo ol. Mastic. fiat Emplastrum,
quod per alutam extendatur & ap-
plicetur.

Cucurbitu-
la revel-
lentes.

Sistit quoque menses, si per 14. dies sin-
gulis diebus per unam horam cucurbita si-
ne scarificatione dextro hypoch. applice-
tur. Quin & sequens epithema convenien-
tiss. est, quo mane ac vespere plantæ pedum
fortiter confricentur. \mathcal{U} . Suc. plantag.
semper vivæ, solani, polygon. an. $\frac{3}{4}$ ii. qui-
bus admisceantur, coral. Thur. Mastic.
sem. ex calicibus rosar. hyoscy. cort. Man-
dragoræ an. $\frac{3}{4}$ s. Aceti rosar. $\frac{3}{4}$ i. probe
commisc. & fiat epithema, quod & dupli-
catis linteolis excipi potest, & plantis pe-
dum alligari.

Hæmor-
rhoides u-
teri à flu-
xu men-
struo im-
moderato
discernen-
da.

Porro cavendum ne in dijudicatione
fluoris menstrui aberret Medicus. Non ra-
rò enim ex utero profluit sanguis ex hæ-
morrhoidibus, ita ut & mulierculæ & Me-
dici imperitiores menstruum sanguinem es-
se putent. Nam ex ramo Ilii venæ cavæ qui-
dam furculi venarum uteri labris sive valvis
inserti sunt, qui instar venarum hæmor-
rhoidum in ano existentium aperiuntur, &
per eos crassus sanguis profluit, cujus pro-
fusio non temere est restringenda. Eius au-
tem curatio est facilis, & ex curatione hæ-
morrhoidum peti debet.

3. Alba colluviei ex utero profluvium
quid, quæ ejus causa, quæ signa,
& quæ ratione cu-
randum?

Albus flu-
xus mulie-
rum quid.

Ῥῆς γυναικείας, muliebre profluvium,
nosteratibus mulierculis, *der weisse Fluß* /
id est alba profluxio, est ubi colluvies al-
terius substantiæ quam est menstruus san-
guis, ex utero profluit, quæ colluvies
pro redundantis in corpore humoris nunc

alba & pituitosa, nunc flava & biliosa, nunc
livida aut cinericea ac melancholica appa-
ret. Substantia ejus est aut crassa mucosa-
que & albumini ovorum similis, aut tenuis
& sero lactis non dissimilis. Hæc proflu-
vies quibusdam mulierculis quotidie, non-
nullis post mensium evacuationem, aliis
inter duas mensium effluxiones contingit.
Defluit autem in uterum aut ex toto corpo-
re, aut ex vitiosa constitutione Epatis.

Causæ *αἰτιολογία* albi profl. muliebris Cause.
est retentricis facultatis in venis imbecilli-
tas, & copia imperfecti aut pituitosi san-
guinis, aut emulgentium venarum attracti-
væ potentiæ imbecillitas. Procatareticæ sunt
alimentorum frigidorum & humid. crebræ
esitationes, & spinæ dorsi lumborumque
aut aëre ambiente, aut lotionē aq. frigidæ
refrigeratio.

Signa ex relatione muliercularum intelli-
gi possunt. Matrix enim continuo madore
lubrica est. Humoris vero profluentis signa
ex habitu totius corporis & colore vel et-
iam certius ex colore colluviei linteolo ex-
ceptæ & rursus exiccata deprehenditur. Si
enim linteolum albeat, serosum ac pituito-
sum humorem, si flavo colore tinctum est,
bilem; si nigro aut livido, melanch. hu-
morem ostendit. Et colluvies quidem al-
ba aut serosa, ex frigida constitutione cor-
poris; flava vero ex biliosa & calida pro-
fluere consuevit, & pituitosus humor sine
sensu doloris; biliosus vero & serosus cum
acrimonia quadam profunditur. Præter hæc
signa, in albo fluore facies dedecoratur,
spina dorsi dolet, appetentia prosternitur,
oculi intumescunt, pedesque tumore affi-
ciuntur.

Prognost. Proventioris ætatis muliercu-
læ magis quam juvenulæ albo profluvio
infestantur. Donec colluvies alba in utero
hæret, uterus est lubricus, semper hians,
& ad imprægnationem ineptus. Profluvium
album, nisi diutius perseveret, antequam
totum corpus à vitiosis humoribus est ex-
purgatum, & Epatis imbecillitati consul-
tum, non temerè est restringendum. Ob-
structio enim, capitis dolores & nervo-
rum

rum lationem infert, & hydropi occasionem præbet.

Curatio.

Curatio venæ sectione, humorum vitiosorum evacuatione & exsiccantium restringentiumque medicamentorum tum intra corpus assumptorum, tum extra applicatorum usurpatione perficitur. Si itaque plethoricum sit ægræ corpus & facies rubicunda existat, effluensque colluvies nonnihil sanguine sit tincta aut bilioso colore imbuta, venæ sectio adhibeatur. Secetur autem vena epatica dextri lateris. Ante venæ sectionem si alvus sit adstricta, leni enemate aut glande feces subducantur. In corporibus autem frigidioribus, & albo existente profluvio, venæ sectio frustra adhibetur.

Dieta.

Victus ratio pro corporis temperamento frigido sit calida, & calido frigida: In universum tamen debet esse humores incrasans, exsiccans, & venarum orificia constringens, qualem in præcedenti curatione constitimus. Potus, quatenus fieri potest, sit paucus & parcissimus, in quo constringentia & exiccantia sunt cocta aut macerata.

Eriçiones.

Post victus rationem quotidie universum corpus linteolis calidis & asperioribus ante prandium confricetur, intacta & relicta regione uteri, id est infimo ventre.

Deinde considerato humore redundante in corpore, id quod ex habitu corporis & ex colore colluviei profusæ deprehendi diximus, redundans & vitiosus humor præparetur, & ad evacuationem extenuetur convenientibus remediis, deinde evacuetur.

Evacuatio serosum humorem.

Et serosus quidem humor & biliosus nulla indigent præparatione, sed evacuatione tantum: commodè autem evacuari potest serosus quidem humor, cum pill. ex hiera picra & Agar. Troch. an. 3 s. additis gr. iiii. Diagrid. conformatis, aut 3 iii. rosa. sol. cum haustu. aq. ebulli mixtis. Pituita vero crassa post præparationem purgetur pill. ex sagapeno & scetidis vocatis an. 3 s. admixtis gr. iiii. Troch. Alhand. Aut 3 x. Diaphæ. in haustu aq. centaure. solutis. Biliosus vero humor educatur cum infusio-

ne Rhab. 3 ii. in haustu. aq. cich. cui admixtæ sint Elect. ros. Mes. 3 iiii. Melancho-
licus humor si redundet, educi potest pill. de
fumaria 3 i. cui admixta sint gr. iiii. extracti
Ellebori nigri.

Corpore purgato, per aliquot dies mane haustulus est exhibendus, qui venas emulgentes ac renes aperiat, & per urinam colluviem deferat & expellat, ut est vinum in quo rad. seminaque Apii & rad. Asari & gr. Juniperi sint incocta.

Mulier alba fluxione laborans, à balneo & vehementiori motu prorsus absteineat.

Demum albam colluviem uteri exsiccant probè, & constringunt 3 i. Troch. è succ. cum vino chalyb. quotidie mane exhibito, aut 3 i. pulv. corn. cervi usti. Aut 2℥. Gum. Arab. Tragac. Amyli an. 3 i. Mastic. 3 i. corn. cervi usti 3 s. commisc. fiat pulv. cuius 3 i. cum vino rub. chalyb. mane exhibeatur. Aut 2℥. Eiusdem pulv. 3 s. sacchari cum succo cydon. soluti 3 iiii. conficiantur rotulæ pondo 3 ii. cuius mane ac vespere una devoretur. Aut 2℥. Scoriz ferri probè in aceto præp. 3 iiii. Troch. è suc. 3 ii. Diacyt. ex suc. simplicis facti 3 ii. pulveratis aridis commisc. fiat elect. cuius semijuglandis q. mane ac vespere devoretur. Efficacissimum quoque remedium est mane ac vespere ebibere 3 iiii. vini rub. in quo pluries sit extinctus candens chalybs, quod efficacius redditur si eidem admisc. 3 s. pulveris Tragacanti.

Porro in temperie calida corporis uteri alba colluvie laborantis, præstantiss. adfert remedium, si mulier quotidie albumen i. ovi cum pauxillo aq. rosarum concussum & tepefactum, cui nonnihil pulv. Mastic. ac thuris sit admixtum ebibat. Aut 3 s. mucag. sem. cyton. cum aq. rosac. factæ, cui 3 i. seq. pulv. sit admixta devoret. 2℥. Sem. portulacæ, hypocyst. antheræ & herb. hippuris an. 3 i. Omnia simul tenuiss. pulverisentur. Potest etiam cum succo polygoni assumi. Idem præstat & coagulum hæd. aut leporis, si ejus 3 i. cum vino assumatur. Præterea ad exiccandam albam colluviem omnia ea remedia quæ in profluvio sangui-

nis menstrui sunt commemorata, commodè exhiberi possunt.

Topica.

In Topicis vero remediis plurimum conferunt, præsertim si colluvies acris fuerit & erodens, ut quotidie uteri sinus aq. tepida chalybeata eluatur & abstergetur. Aut si hæc colluvies sit pituitosa & frigida sine acrimonia, præstat cum vino rub. tepido, in quo scoriz ferri candentis ter quaterque sint extinctæ, uterum eluere. Post elotionem

Fomentatio.

fomentetur uterus vapore aceti vini, in quo cortices pineæ sunt incoctæ. Excitetur autem vapor per candens ferri excrementum in olla possum, & vapore per infundibulum ollæ impositum in uterum recepto. Quin & aqua destillata ex Antheris & herba polygoni simul mixtis destillatisque, haustulus omni mane assumptus, colluviem albam mirifice sistit.

Experimentum.

4. *Mensium præternaturalis suppressio sive retentio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Mensium suppressio quid.

Ἐπὶ τῇ ἐμμένῳ, cessatio mensium statim temporibus (ut paulo ante diximus) profluere consuetorum, est quando post annum ætatis 16. sive in ætate florenti usque ad annum 40. seu circiter, solita singulis mensibus sanguinis ex utero fluxio cessat & intercipitur. Dupliciter autem subsistunt menses: secundum naturam, ut ante pubertatem, in gravidis ac lactantibus, & in senili ætate post 50. annum. Aut in iis, quæ obesa habent corpora. Item in viraginibus, & quæ fortibus exercitiis utuntur, teste Aërio. Et in iis omnibus frustra & non sine periculo mensium provocatio tentatur. Præter naturam autem, quando ex causis morbificis intra tempus fluxionis consuetum impeditur, solitoque parcius fluit, aut prorsus intercipitur sanguinis menstrui fluxus. Quibus secundum naturam supprimuntur menses, illæ nullam ex ea suppressione sentiunt molestiam, si cuti & quæ ob morbum antecedentem graciles reddita nihil sanguinis superflui habent. Ideoque in illis mensium provocatio non acceleranda. Quibus vero præter naturam ex aliis

Ejus differentia. Naturalis.

Præternaturalis.

causis morbificis subsistunt, hæc variis symptomatibus afficiuntur.

Causæ αἰσθητικαὶ aliæ consistunt in utero aut totius corporis, aliæ in sanguinis in venis uteri contenti prava constitutione ac qualitate. Supprimuntur autem menses aut propter venarum in uterum desinentium angustiam: aut ex cotyledonum, id est orificiorum venarum cum lentis humoribus infarctione: aut uteri totiusque corporis intemperie calida, frigida & sicca. Item ex obesitate corporis, & ex imbecillitate facultatis expultricis in utero, atque ex cicatrice aut callo uteri cervici obducto.

Causa.

Causæ αἰσθητικαὶ suppressi. mensium sunt assidui labores, ac validi animi microres, repentina expavescentia, sanguinis ex quacunque parte copiosior profusio, aut menstrui sanguinis ad alias partes conversio, per quas evacuat, ut per nares, per hæmorrhoides aut os, alimentorum & pharmacorum constringentium mensesque prohibentium usurpatio, pedum refrigeratio in aq. frigida, quæ puellis lotricibus familiaris est. Porro in universum ex frigida causa crebrius, ex calida rarius obstruuntur menses.

Causa antecedentes & externa.

Signa suppressionis mensium, cum ex confessione mulierularum, tum ex scædo faciei colore, pallido, albo, lividoque cognosci possunt. Præterea in mensibus suppressis, mulierculas cibi fastidium, gravitas totius corporis, dolores syncipitis, lumborum & crurum, tormina imi ventris, & tumores pedum infestant, & quandoque accedit & febris ardens, urina ex rubeo nigrescat, præsertim si ex caliditate orta sit suppressio: nonnunquam vero eadem cruda & alba cernitur, ubi ex refrigeratione originem ducit suppressio. Insuper ex caliditate obortam mensium retentionem, gravitas corporis ostendit, quam & febris, & alii morbi præcesserunt. Ex refrigeratione, tumor pedum, & laxitas corporis, colorque faciei pallidior indicat.

Signa.

Prognostica notatu digna sunt: In quibus mensium suppressionem nulla comitantur symptomata, facilius tolerant, sed diffici-

Diversarum causarum indicia.

Prognostica.

difficilius curantur. Multæ ex mensium suppressione in insaniam melancholicam prolabantur ob vapores ex utero ad cerebrum delatos, spiritusque animales turbantes.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate instituenda erit, & potissimum dirigenda ad calidam aut frigidam intemperiem totius corporis aut uteri tantum, & sanguinis tenuitatem & crassitiam & coryledonum refecutionem. Perficitur autem curatio victus ratione, venæ sectione, & medicamentorum menses moventium, crassitiam sanguinis incidentium, & obstructas venas aperientium convenienti applicatione.

Cautela diligenter observanda.

Quoniam autem & ex calida intemperie seu causa calida, per accidens, ut in febribus & acutis morbis menses sistantur: non tamen in ea causa ad mensium productionem frigida victus ratione aut remediis utendum erit. Frigida enim sanguinem incrassant & venas constringunt, sed calefacientibus mediocriter & sanguis extenuantibus, ita tamen, ut plurimum calidi morbi auferantur & calidi humores subducantur.

Diata in causacalida.

In calida itaque corporis constitutione, qualis est, ubi bilis flava in corpore redundat, primum ea bilis & victus ratione temperanda & convenientibus remediis evacuanda erit. Victus ratio in calida intemperie sit humectans & moderatè refrigerans, ejusmodi sunt cremor psittacæ, pulmenta ex lacte & amylo, carnes gallinarum & caponum, agnorum, hædorum & vitulorum, pisces quoque saxatiles & squammatæ, & ova sorbilia recentia addi possunt. Potus sit aq. hordei in qua sem. anisi, rad. glycyrrh. & cinam. sunt incocta. Vinum quoque, præsertim ubi ventriculus imbecillus est, tenue & album, cum prædicta aq. dilutum exhiberi potest. Conferunt & somnus longior & balnea, in sessioneque crebræ aq. dulcis, in qua malva & violaria sunt incocta. Confert quoque plurimum à balneo, si inguina inungantur linim. ex ol. ros. amygd. dulc. & mucag. sem. lini an. 3 ii. & ceræ paxillo confecto. Deinde biliosus humor subducatur 3 v. elect. ros.

Prodromus curationis in causa calida.

In sessione.

Linimentum.

Cholagogum.

Mel. aut 3 x. cass. recent. evulsæ cum haust. aq. melissæ solutis. Aut ʒ ii. Rhab. 3 ii. contusa macerentur per noctem in aq. cichor. 3 iv. mane ad fervorem usque calefiant, exprimantur ac colentur, & colato liquori misceantur 3 iii. aut iv. elect. lenit. fiat haustus: aut eidem liquori admisce 3 ii. syr. è cich. aut syr. ros. sol. quæ calefacta ebibantur 6. horis ante prandium. His ita peractis tandem ad menses cientia, quæ omnia calefaciunt, accedendum erit.

Ita si menses supprimantur ex melancholico humore in corpore redundante, ante mensium provocationem humor melancholicus concoquatur primum, ac deinde educatur. In hujusmodi corporibus victus ratio calefaciens & extenuans instituat, qualis supra in melancholicis morbis annotata est; deinde præparetur melancholicus succus seq. portione: ʒ. Polyp. Borag. Bugloss. Glycy. an. 3 s. Elleb. nigri præpar. id est prima decoctione abjecta, & rursum exiccata, cortic. Cappar. an. 3 ii. Herb. ceterach. lupuli, Camædrios an. M. s. Thymi, Epithymi an. 3 ii. Schoenanti 3 i. conferv. Melissæ, fumar. borag. an. 3 i. passul. min. 3 i. s. cinam. el. 3 ii. contundantur contundenda & concidantur concidenda, & cum tb. iii. feri lactis caprini & 3 iv. aceti vini concoquantur in canth. ut supra sæpe docuimus. Coquantur autem per 2. horas, ac tandem per se refrigerata colentur, colato juri admisc. syr. de calamintha, de Epithymo an. 3 ii. fiat potio, cujus 3 iv. repetita ebibantur mane ac vespere. Exhausta hac portione subducatur humor melanch. aut cum 3 i. pill. Indar. cui adjectum est gr. i. extracti elleb. nigri. Aut subducatur seq. haustulo. ʒ. Confect. hamech 3 vi. dissolve in aq. lupuli 3 iv. fiat haustus, qui calefactus in aurora ebibatur.

Cum verò, quod sæpe accidit, menses supprimuntur ex frigida causa, & pituitosi humoris cum sanguine admixtione, simili ratione pituitosus humor ante mensium provocationem extenuandus & exonerandus erit, tum victus ratione, tum med. calefacientibus & extenuantibus. Oportet itaque

In causa melancholica qua potiss. conveniant.

Digestivum.

In causa frigida qua pramittenda.

Dietā.

que totam victus rationem calefacientem, incidentem & extenuantem esse. Conveniunt itaque aromatibus condita alimentā; lac vero, pisces, & omnia refrigerantia vitanda sunt. In potu utile est vinum generosum Rhenanum, Creticum & aromatite, quod claretum vocant: nec ab hydromellis veteris potione arcenda est ægra. Pituitam concoquunt, extenuant & ad evacuationem præparant, adeoque expurgant sequentia remedia. ℞. Rad. Apii, Dauci Creti, Asari, Valerianæ, Ruberæ tinctorum an. ʒ ii. Fenic. petros. an. ʒ s. sem. fenic. pastinacæ, Anisi, Amios an. ʒ ii. fol. Rorism. pulegii, Melissæ, scordi, Dictamni Cretici, calaminthæ, Arthemissæ, origani an. M. s. Gran. Junip. ʒ i. zinzib. cardam. an. ʒ i. Croci ʒ i. conservæ melissæ ʒ ii. contund. contund. & cum lb. iv. hydrom. in duplici vase concoquantur per 2. horas, refrigerata colentur, colato juri admisc. syr. è calamint. de Arthem. an. ʒ iv. cujus potionis ʒ iv. calefactæ, ebibendæ offerantur, & ubi media pars ejus potionis fuerit exhausta, semel purgetur pituitosus humor, deinde rursum ea utatur portione, donec tota fuerit absorpta. Tandem rursus evacuetur pituita sequentibus remediis.

℞. Mas. pill. aggr. fœtid. Agar. Troch. an. ʒ i. Diagrid. gr. iv. formentur pill. n. xv. cum aq. Junip. & inungantur ol. fœniculi, & mane deglutiantur sex horis ante prandium. Aut

℞. Diaphæn. elect. Indi maj. an. ʒ s. hieræ picræ Galeni ʒ ii. pul. Agar. Troch. ʒ i. dissol. in haust. aq. calaminthæ aut centaur. min. fiat haustus, qui tepidus in aurore ebibatur.

Præscripta concoquentia & evacuationia remedia vitiosorum humorum non tantum in mensium suppressionibus, sed & in aliis morbis & humoribus vitiosis ortis locum habent.

*Remedia
mensis
provocan-
tia.*

Corpore evacuato, recta ad remedia menses producentia transeundum erit, adhibendaque ea tum intra corpus tum ex-

tra, quæ & calefacere & extenuare, & obstruatas venas aperire & colluviem sanguinis evacuare queant. Verum non quovis tempore menses provocantia pharmaca administranda sunt, sed ea tantum Lunæ periodo, qua menses in sanitate fluere solebant. Fluunt autem aliis circa novilunium, aliis circa plenilunium, aliis in prima, aliis in postrema quadratura Lunæ, id quod ex patiente sedulo investigandum erit. Congruo tandem tempore cognito, tandem hac methodo retentum menstruum sanguinem provocare licebit.

Primum quarto aut quinto die ante statutum tempus solitæ fluxionis collocetur ægra in solium aquæ dulcis calidæ paulo ultra umbilicum per unam aut sesquihoram. In ea autem infusione sive aqua sint concoctæ seq. herbæ, quæ & sanguinem extenuare & venas uteri emollire dilatareque, & oscula earum aperire queant.

℞. Malv. cum rad. Alth. cum rad. Valer. cum rad. Flor. chamæmeli, Anethi Bethon. Arthemissæ calamentæ, serpilli, pulegii, melissæ, an. pro arbitrio, sem. lini, fœnugræci an. ʒ i. herbæ & rad. concidantur, semina vero contundantur, eisq. admisc. bac. Junip. lauri an. M. ii. omnia concoquantur in q. s. aquæ, fiat infusio, quæ ter quaterque recalefieri potest.

Semper autem antequam in lavacrum descendat mulier, vel ubi egreditur, aliquid remedii menses moventis est offerendum, quæ remedia paulo post commemorabimus. Egressa ex lavacro mulier & calidis linteolis absterfa, ventrem, lumbos, inguina & fœmora sequenti linimento inungi curet.

℞. Ol. chamæm. Anethi, amygd. dulc. lilior. alb. an. ʒ ii. ceræ parum, fiat linimentum, quod eluatur ter cum aq. Juniperi.

Postquam autem ægra usa est ter quaterque lavacro præscripto, tandem secetur vena poplitis aut malleoli dextri pedis quam saphenam vocant. Antequam autem venæ sectio peragatur, prius oportebit pedes ab

*Quo tem-
pore ad-
hibenda.**Infusio uti-
li.**Herba pro
balneo.**Ante &
post bal-
neum quid
agendum.**Linimen-
tum.**Saphena
sectio.**Friccio.*

Erethio.**Vena
quando a-
perienda.****Eucurbitu-
la.****Hirudines.****Balneum
reiteran-
dum.****Remedia
interna.****Potiuuncu-
la.****Pulvis.****Pillula.****Pessi.**

ab inguinibus usque ad talos vel malleol. aspero ac calido linteolo probè conficcare. Opportunissimum tempus secandæ venæ est primus dies ante tempus consueta fluxionis; si prima vice sectio venæ non succedat, id est, si nihil sanguinis aut parum profluat, & secundo & tertio reiteranda erit, cum ex dextro, tum ex sinistro pede. Si autem tenuioris naturæ virgines venæ sectionem non ferant, cucurbitulæ per mulierculas subinde inguinibus sunt sine scarificatione applicandæ, & cum scarificatione etiam utroque pede sub malleolis, aut hirudines in calamis arundinaceis collocatæ eminentibus capitibus venis talaribus sunt admo- vendæ.

Post venæ sectionem rursus per quatuor dies in præscriptum lavacrum deducenda est ægra, & semper vel ante descensum, vel ubi egressa est ex lavacro, & in mollem lectum collocata, remedia menses ducentia sunt offerenda, semper incipiendo à lenioribus, veluti sunt 111. cochlearia aq. Juniperi, in qua per triduum maceratæ sunt rad. Asar. Valer. Dauci Cretici, castorei an. ʒ 11. simul confusa: Aut exhib. 4. cochl. vini Rhenani generosi, quibus admixtæ sunt 7. gutt. ol. vitrioli, aut 9. gutt. ol. fæ- nic. Aut 3 1. seq. pulveris cum haustu vini generosi Rhenani.

ʒ. Troch. è myrrha, 3 11. pulv. Dau- ci Creti. Asari, Sabinæ an. 3 1. Cas- storei ʒ 11. tenuissimè pulverisa- ta commisceantur. Aut ʒ. Troch. è myrrha ʒ 11. Asæ fetid. ʒ 1. ex confusis formentur pill. n. xv. & inungantur ol. Vitr. ituræque cubi- tum deglutientiæ exhibeantur. Eo- dem tempore & pessi seq. utero commodiss. injici possunt.

ʒ. Pul. Gentianæ, sem. Nigellæ an. 3 s. colocinth. 3 1. scammon. ʒ 1. Asar. 3 1. cum felle taurino probè conterantur, deinde, ut coherere queant, addatur q. s. hier. picræ, & formentur pessi, paulo crassiores pollice, & involvantur sindone, eis- que fila appendantur, ut quovis tem-

pore pro arbitrio extrahi queant, & unus utero inferatur mane in lecto, in eoque relinquatur ad 3. aut 4. ho- ras, deinde rursus eximatur. Fel quoque taurinum cum succi Mercu- rialis æ. p. mixtum, in quo colo- cynt. pulpa est incocta lana xylina exceptum & syndone involutum cum filo appenso, utilissimè utero in- feri potest, statim enim menses mo- vet. Si à pessis incallescere uterus percipiatur, extrahi debent, & ute- rus vino calido, in quo puleg. est in- coctum, elui. Porro si primo mense curatio non succedat, nec menses elici queant, seq. mense, ubi tempus profluvii consueti instat, eadem re- media reiterari debent. Intermediis autem temporibus, seq. remediis commodè mulier uti poterit, quæ suppressa habet menstrua. Quotidie mane 3. aut 4. cochle. aq. Junip. ebi- bat, aut bibat haustu calefact. seq. po- tionis mulierculis Pomeranicis usi- ratissimæ, quam illæ **den Drancst** *Decoctum muliercu- larum ex 9. spec. ad menses provocan- dos.* **bon den 9. Urântern** vocant, ubi aut Uterus est refrigeratus, aut ubi menses in totum sunt suppressi, aut ubi non satis ac sufficienter fluunt.

ʒ. Zinz. alb. cinamo. Croci, car- dam. granor. paradisi, piper. lon- gi, castorei, Myrrhæ, & sem. fæ- nic. an. 3 1. Confusa coq. in dupl. vase per 2. hor. cum vini Rhe- nani lb. 1. Aut

ʒ. Asari, Dauci Cretici, pimpin. an. 3 11. puleg. Melis. an. M. s. sem. fænic. pastin. Dauci sylv. an. 3 1. croci 3 s. schænanthi ʒ 11. cice- rum rubeor. 3 s. confusa concisa- que cum vini Rhenani lb. 111. additis mellis 3 11. in cantharo per duas horas coquantur, ejus- que 3 111. mane ac vesperi ebi- bantur.

Pedes quoque vesperi seq. lavacro ablui possunt. ʒ. Calaminthæ, pulegii, salviæ, Ar- *Lavacrum pro pedibus*
Ooo themi-

themisæ, Rorismar. an. M. II. Rad. Ebuli, Elenii an. 3 i. Gran. Juniperi M. III. Con- cisa & contusa in lixivio q. s. aut in vino al- bo decoquantur, & per unam aut dimidiam horam pedes in eo laventur.

Commodè & vesperi ituræ cubitum 3 i. diacastor. aut 3 i. Troch. è myrrh. cum haustu vini Rhenani exhiberi possunt. Plu- rimum quoque confert, si vesperi itura cu- bitum muliercula linteis calidis & asperis confricat crura ab inguinibus usque ad talos.

SECTIO III. DE AFFECTIBUS QUÆ CIRCA GENERATIONIS ACTUM CONTINGUNT.

I. Sterilitas seu generandorum liberorum im- potentia quid, qua causa, signa sterilitatis, tum causarum ejus, & quomo- do liberorum generatio procreanda?

Sterilitas
quid.

Ejus dispo-
sitione.
Superna-
turalis.

Naturalis.

A Torio & ætenua, infæcunditas est, ubi homines generativa potentia de- stituuntur. Ideo enim Deus utrumque se- xum, masculum & femellam condidit, eis- que sua benedictione vim generativam in- didit, ut ex mutuo complexu genus hu- manum ad ultimum diem propagaretur & conservaretur: ut ex eo Filius Dei Ecclesiam suam, in qua sola Deus verè cognoscitur & invocatur, plantaret. Duplex est autem sterilitas: Una supranaturalis, & à solo o- mnipotentis curari potest. Talis fuit sterili- tas Abrahæ, Annæ matris Samuelis Pro- phetæ, & parentum Johannis Baptistæ, Za- chariæ & Elizabethæ, quæ ex sterilibus per omnipotentiam Dei solam, redditæ sunt ul- tra naturam fecundæ. Altera est quæ vitio naturæ accidit, & habet causas physicas, quæ à perito Medico tolli possunt, ut fe- cundæ reddantur feminae. Accidit autem sterilitas physica, tam ratione viri, quam ratione mulieris.

Causæ prægumenæ sterilitatis cum in masculis, tum in femellis sunt, aut totius corporis, aut membrorum generationi set- vientium ac potissimum uteri, aut seminis u- triusque sexus notabilis intemperies, aut ju- sto calidior, frigidior, siccior aut humidior. Semina certè utriusque sexus, sunt materia fetus, quæ nisi sint temperata & ad invicem analoga, tam in substantia quam in qualita- te, & nisi proba fiat eorum commixtio in u- tero, fetus ex eis conformari nequit. Quem- admodum autem in vehementer humida, aut nimium arida terra, ex semine injecto ger- men produci nequit, ita nec in humido squa- lidoque utero fieri potest fetus conceptio, idque Hipp. 5. Aph. 62. & in aliis plerisque Aphor. luculenter testatur: ita nimia corpo- ris obesitas, nimiaque gracilitas, & puden- di virilis brevisitas impedit conceptionem. Si- militer in femellis mensium immoderatum profluvium, & longa mensium retentio ob- sunt conceptioni, quibus enim menses non fluunt, ea non gignunt, inquit Plinius lib. 7. cap. 15.

Procatacticæ causæ sunt, victus ratio & remediorum usurpatio, temperiem totius corporis aut seminis aut partium generatio- ni servientium destruens, pharmaca factum in utero corruptentia, aut conceptionem impediencia utero inserta, aut intra corpus sumpta, quæ scire nec utile est, nec ea e- dere boni viri erit. Fascinia per Diabolo- rum mancipia inducunt, (de quibus supra lib. 7. f. 1. Q. 6. de impotentia) involuntarius concubitus, deformitas & aversio à Vene- re, intempestivus coitus, ut tempore fluo- ris mensium, & justo crebrior complexus, uteri refrigeratio ob longam moram in aqua frigida vel aëre frigidior.

Signa utrum viri an feminae culpa sterili- tas contingat, tali experimento deprehen- di possunt. Granorum hordei manipulus, seorsim & in viri & in feminae urina per no- ctem maceretur, ac deinde in terram sera- tur, & cujus hordeum germinat, hunc fe- cundum esse ostendit; cujus non germi- nat, sterilem. In viris talis fieri consuevit sterilitatis ac fecunditatis exploratio. Semen viri

Causæ ge-
nerales in-
terna &
proxima.

Semina
minus a-
nalogæ.

Viri ni-
mia humi-
ditas.

Causa an-
tecedentes
externa.

Signa sub-
jectum ste-
rilitatis in-
dicantia.

viri in aqua coniectum si supernatat, sterilem; si fundum petat, fecundum esse arguit. Mulier autem utrum sit fecunda vel sterilis, ita experiri docet Hippoc. 5. Aphor. 59. Mulieri undique tegumentis probe munitæ, suffitus aromatum ejus utero subjiçatur, & si dolor ac sapor aromatum, usque ad os & nares per corpus feratur, sensuque gustus & olfactus percipiatur, eam fecundam esse arguit, sin minus sterilem. Idem documentum præstat si non obiecta mulier allium contusum, & in sindone involutum utero inserat, si ejus sapor ad linguam, & odor ad nares ascendat, fecunda est.

Signa causarum diversarum. Frigiditas.

Humiditas.

Caliditas.

Siccitas.

Causarum signa sunt, si sterilitas ex frigida intemperie vel totius corporis vel uteri tantum, quod ut plurimum contingit, accidat, dignoscitur ex longa suppressione, & non sufficienti mensum fluxione, & sensu stupiditatis circa pectinem, lumbos & circa crura. Si autem nimia humiditas causa sit infæcunditatis, tum menses plus justo fluere consueverunt, & uterus continua humiditate mader stillatque. At ubi uteri præternaturalis calor est causa sterilitatis, tum calor & in toto corpore & in utero potissimum persentiscitur, & menses sunt pauciores & nigriores. Ariditas vero si causa est sterilitatis, totum corpus gracile & squalidum, uterus vero siccus est, & plerunque scissuris laborat, & menses pauci cum cruciatu profluunt. Ut plurimum autem hisce præternaturalibus qualitatibus copulantur vitiosorum humorum redundantia. Quis autem humorum in corpore redundet, sterilitatemque efficiat, tum ex habitu & colore corporis, tum ex aliis indiciis in superioribus à nobis toties commemoratis facile deprehendi potest. Reliqua signa ex relatione conjugum dignosci possunt.

Prognostica.

Prognostica: Ætas 30. annorum in viris, & 18. in mulierculis aptissima est ad liberorum procreationem. Tempus conceptionis maximè idoneum est, secundus aut tertius dies post mensum purgationem. Semina utriusque quanto sunt temperatiora & eodem momento simul ex vasis cum

voluptate in uteri capacitatem infusa, tanto sunt aptiora ad fatum concipiendum & conformandum. Amor inter conjuges quanto est arctior & ardentior, cæteris paribus, (*si nempe in utero vel in ipso semine nullum est vitium*) tanto sunt fecundiores & aptiores ad liberorum procreationem. Ætas nimium juvenilis & senilis secundum naturam inepta est ad liberorum generationem.

Curatio pro causarum diversitate varianda erit, & potissimum consistit in causarum Proëgumenarum sublacione, & generativæ potentie corroboracione, quæ perficitur proba victus ratione, & remediorum cum intra tum extra corpus applicatione. Omnium itaque primum consideranda venit corporis infæcundi constitutio secundum intemperiem, & secundum humoris exuberantiam, & tum omni cura adniten- dum, ut redundans humor è corpore subtrahatur, & intemperies ad æqualitatem reducatur victus ratione, & remediis cuilibet vitioso humori & intemperiei contrariis.

Quia vero omnium frequentissimè sterilitas ex frigidi & pituitosi humoris redundantia, & frigida intemperie partium generationi servientium oboritur, primum de curatione sterilitatis ex frigida causa ortæ acturi sumus. Initio itaque si universum corpus aut partes generationi ministrantes pituitosa colluvie gravantur, aut intemperie frigida laborant, tum humor pituitosus concoquatur & extenuetur, tandemque artificiose subducatur remediis convenientibus paulo ante in curatione suppressorum mensum ex frigida causa commemoratis, & præscribatur victus ratio calefaciens & extenuans, veluti sunt carnes pullorum, caponum, vitulorum, hædorum & similibus, multis aromatis conditæ cum iisdemque alimentis crebro concoquantur rad. fænic. petrosel. pastinacæ & cariotæ. In potu commodiss. uti possunt vino generoso & aromatite, cerevisiaque pleniore & bene defecata. Post purgationem autem corporis singulis diebus mane

Curatio scopus generalis.

In frigida causa remedia.

Dieta.

Malvatum vinum.

& vesperi haustulum vini cretici, & portiunculam panis in eo macerati edere ac bibere possunt. Præstat quoque si mane ac vesperi ebiantur 2. cochlearia aq. Juniperi. A sumpto cibo præstat confectiones, sem. fœniculi, sem. carvi & cinamom. saccharo obductorum, simulque commixtorum, 2. aut 3. pugillos devorare, aut 3 s. zinzib. conditi edere. Tempore purgationis mensium prodest per 4. aut 5. dies seq. pulv. cum haustu vini mane ac vesperi mulierculis exhibere.

*Pulsis
tempore
mensium
assumen-
dus.
Sudorife-
rum.*

℥. Castorii Myrrhæ, sem. Mercurial. an. ʒ i. Cinamomi, croci, an. ʒ s. Fiat pulv. tenuiss. pro una vice. Post mensium purgationem, eliciendi sudoris gratia, resolvantur in vino generoso, vel in aqua pulegii, Theriacæ Andromachi & Mithridatii an. ʒ ii. & in tepida ebiantur, sudetque mulier ad 1. vel sesquihoram, eodemque die sequenti utatur lavacro seu infusione, quæ alternis diebus repeti ac renovari potest quater aut quinquies, & ex sequentibus herbis concinnetur.

Infusus.

℥. Arthemisiæ, Bethonicæ, Chelidoniz cum rad. Malvæ, Melissæ, Majoranæ, Nepetæ, Origani, pulegii, Rorismarini, Mentastri, Chamæmeli, Meliloti, Hypericonis, Hissopi an. M. ii. sem. anisi, Fœnic. Carvi, Cymini an. ʒ ii. sem. lini, fœnugræci an. ʒ i. s. Rad. Althææ, Valer. consolidæ major. an. lb. s. sulph. ʒ vi. salis ʒ iii. Alum. ʒ i. s. concidenda & contundenda contundantur, atque in quantum sufficit ad infusionem usque ad umbilicum aq. coquantur, & calidæ infideat mulier. Idem præstarent, & forsitan majori cum utilitate Theriacæ Sulphuræ & aluminosæ, quales sunt Carolinæ non procul à valle Joachimica sitæ, si cuilibet eas accedere daretur. Diebus autem intermediis inter lavacra, utantur mulierculæ mane jejuno existente ven-

*Therma
Carolinæ.*

triculo fomentis ex vapore herbarum præscriptarum in minori quantitate decoctarum, aut herbar. seq. qui vapor ex olla obrecta, perforato operculo cui siphon est impositus in uterum recipiatur.

℥. Rorismar. Majoranæ, pulegii, serpilli, Arthemis. Bethonicæ, Melissæ an. M. i. coquantur in vini q. s. & fiat fomentatio, ut dictum est. Vesperi vero ejusdem diei recipiat mulier in uterum rerum seq. suffitum, sive fumum per canalem in uterum directum.

℥. Cinam. caryoph. an. ʒ ii. sem. anisi, Thuris, Myrrh. mast. an. ʒ i. Benzoi, styrac. calam. Galliz Moschatæ an. ʒ i. s. Fol. Rorismar. Majoranæ an. ʒ s. crassiusculè concidantur, & ignitis carbonibus in olla repositis inspergantur, & fumus in uterum recipiatur. Præstat quoque ad recalesfactionem uteri refrigerati seq. pessus utero insertus. ℥. Castor. Myrrhæ, Mastich. Aristol. rot. an. ʒ i. s. Galbani ʒ iii. Theriac. q. s. quæ in mortario cal. contusa conformentur in pessum, qui sindone involutus, cui filum sit appensum, ol. lilior. albor. inungatur & utero inferatur.

Post hæc omnia, si uterus amplior justo sit & nimium dilatatus, ut conceptum semen retinere nequeat, seq. pessus indito artior reddi potest.

℥. Acaturæ, Balaust. calicum gland. Nucis Cypress. scoriz ferri, Mastich. cortic. Oliba. an. ʒ s. Alum. ʒ ii.

Misc. & cum suc. prun. sylv. non indurato q. s. conficiatur vel pessus vel nodulus, & hianti utero inferatur.

Porro si non modo simplex adsit uteri refrigeratio, sed conjuncta ei sit quoque humiditas supervacanea, aut alba colluvie ita madeat, ut semen illapsum retinere nequeat, præter remedia, quæ supra in curat. albæ colluviei, & paulo ante recensita sunt,

Vapor utero excipiendus.

Fumus pro utero exsiccando.

Pessus pro utero calefaciendo.

Pessus constringens uterum laxum.

In nimia humiditate uteri quæ adhibenda.

sunt, uterum seq. decocto frequenter eluere, ac post absterionem, subscripto suffitu frequenter desiccare utilissimum erit.

Decoctum ad uterum eluendum. ʒ. Gallarum, Nucis moschat. an. ʒ ii. caryoph. ʒ i. Bal. Nucum cupressi an. ʒ s. Alum. ʒ. ii.

Contusa coquantur in vini rub. ʒb. ii, ad tertias sub operculo, & transcolentur, quo tepido molli spongia aut linteolis excepto, eluatur cervix uteri: aut linteii ex eo madefacti utero imponantur, in eoque aliquandiu retineantur. Proderit quoque plurimum, si uteri refrigeratione laboranti mulierculæ devorandæ præbeantur mane ac vesperti 2. rotulæ Diamb. Diamosch. aut pliris fæcoticis: aut una morsella seq. Electuarii.

Rotulæ.

Morsuli.

ʒ. Cinamom. El. ʒ ii. Caryoph. Cardamo. an. ʒ s. Galang. Zinzib. an. ʒ i. Macis, Conf. Rorismar. Borag. Diafayr. an. ʒ s. spec. Diamb. Diamoschi an. ʒ i. sacca. alb. in aq. Junip. resoluti & rursus ad justam duriciem cocti ʒb. s. fiant morsuli pondo duarum triumve drachmarum. Non erit abs re, si mulier singulis septimanis cum vini haustu ʒ i. Theriacæ ebiberit, purgato tamen prius corpore, & desudaverit. Hæc sufficiant de frigida & humida intemperie uteri, quæ ut plurimum & frequentiss. est causa sterilitatis, emendanda dixisse.

Theriaca.

In calida

& sicca uteri constitutione quæ remedia convellant.

Ubi autem calida & sicca uteri intemperies (quod tamen rariuscule contingit) aut biliosorum humorum copia & biliosa corporis constitutio conceptionem impediat, post bilis subductionem & alterationem, cujus remedia superius toties sunt proposita, veluti sunt Rhabarb. infusum, pulpa cassiæ, syr. rosat. sol. Elect. rosat. mesuæ.

Diata.

Victus ratio instituat moderate refrigerans & humectans, qualis est cremor pitisanæ, pruna acida sicca, lac amygdal. & lac sem. frigid. major. cum aq. cichor. confectum, acetaria ex lactuca, & portulaca, & pisces saxat. ac squamosi, somnus

sit diuturnus, à vino, Venere & valida corporis exercitatione vigillisque abstineat. In potu hauriat aq. hordei, cum cinamom. & Glycyrr. & passulis parvis. Aut stillat. aq. cichoreæ cum pauxillo syr. acetosistatis citri dulcoratam, aut lac ex sem. & aq. cichoreæ & saccaro confectum: aut aq. hordei per conservam rosarum ferventem percolatam. Utatur quoque crebrius & singulis septimanis bis sequent. infusione sive lavacro.

ʒ. Herb. Malvæ, Althææ cum radicibus, Lavæ Violarum, fol. salicum, Betulæ an. crum. M. v. sem. fænugræci ʒb. s. flor. Nymphææ, Rosarum an. M. ii. coquantur in q. s. aquæ, fiat lavacrum, cui infideat ægra, totumque corpus madefaciat.

Deinde si totum corpus exuctum aridiusque fuerit, aut uterus tantum, post balneum inungatur tota spina dorsii, lumbi, & imus venter atque hypochondria seq. linimento.

ʒ. Ol. Rosar. violar. Nymph. an. ʒ iii. Linimentum. Mucaginis ex sem. cytoniorum cum a. tum. qua rosacea paratæ ʒ ii. Ceræ albæ parum, fiat linimentum. Hoc linimentum & viris & mulierculis calidioris sicciorisque temperaturæ probe facit.

At si uterus tantum aridior existat, quod dignoscitur, quod concubitus vix & non nisi cum dolore ferat, & viri quoque pudendum offendatur, tum utero illiniatur mucago ex sem. cyton. cum aqua rosacea facta. Aut imponatur linteolis succus umbilici Veneris cum aq. rosar. ad placitum commixtus, & nodulo ex lana xyliina confecto & sindone involuto exceptus. Cavendum tamen ne diutius quam par est refrigerantia pharmaca in utero retineantur. Reliquorum humorum redundantia aut in toto corpore, aut in partibus generationi ancillaribus tantum, si causa sit sterilitatis, earum curandi rationem ex superioribus, ac potissimum ex curatione intemperierum uteri & suppressionis mensium, albique fluoris uterini petant studiosi.

Epithema.

*Specifica
contra steri-
lilitatem.*

Nunc reliquum est ut remedia quædam experientia comprobata subjiciamus, quæ & suis primis qualitatibus & specificis proprietatibus naturalem sterilitatem remouent & conceptionem efficiunt.

Porro diximus sterilitatem maxima ex parte oriri ex intemperie frigida & humida, rarissime autem ex calida & sicca. In frigida itaque intemperie hæc seq. plurimum faciunt ad concipiendum factum.

*Electua-
rium in
causa fri-
gida.*

℥. Rad. Iringii condit. zinz. Cond. cort. Arant. cond. conf. Rorismarin. an. ʒ i. Pul. sem. urticæ Romanæ, sem. Mercurialis an. ʒ i. pulv. priapi Taurini ʒ i. pulv. Matticis leporis ʒ i. s. spec. Diamosc. Diambra, an. ʒ ii.

Concidantur minutiss. & cum q. s. syr. condituræ zinzib. aut cort. arantiarum fiat Elect. cujus semijuglandis quantitas mane ac vespri à conjugibus sterilibus devoretur, & superbibatur haustus cretici vini, aut alterius generosi. Aut

Morsuli.

℥. Testiculorum dextrorum apri sylv. Testiculor. vulpis, Testic. gallorum an. ʒ s. Quibus omnibus exiccatis, & in pulv. redactis, admisce scobis eboris ʒ ii. sem. Melonum concisorum ʒ i. s. coag. leporis ʒ i. Nucl. nucis Indicæ ʒ iii. sp. Diambra, Diamosch. an. ʒ ii. saccari albiss. cum vino cretico soluti ʒ xii. decoquatur saccar. ad justam consistentiam, cui admisc. præscriptum pul. & artificiosè conficiantur morsuli pondo ʒ s. cujus una à sterilibus devoretur mane ac vespri, & bibatur insuper vini cretici haustus. Aut

Pulvis 1.

℥. Sem. feseleos, sem. urticæ Rom. pastinacæ an. ʒ i. sem. Mercurialis maris. ʒ ii. priapif. taurini, testicul. galli, Matric. leporin. an. ʒ i. s. coag. lepor. ʒ s. Cinamom. ʒ ii. tenuiss. pul. misceantur, & ejus ʒ i. assumant steriles ituri cubitum cum haust. vini generosi. Aut

Pulvis 2.

℥. Cinamom. el. Cardamomi, Cubebar. an. ʒ ii. sem. lini, urticæ Rom. an.

ʒ i. Zinzib. albi, piperis longi, Eruca an. ʒ i. Rad. Glycyrrhiz. Eryngii an. ʒ ii. stinci Egypt. ʒ s. Mosch. ʒ s. pulverentur tenuiss. cujus ʒ i. ebibatur mane ac vespri cum vino generoso. Aut

℥. Castor. piperis nig. an. ʒ i. Matr. Pulvis ʒ. lepor. ʒ ii. fiat pulv. quem ebibat mulier cum haustu vini cui succus pulegii est admixtus, itura cubitum. Mas vero devorabit iturus cubitum semijuglandis q. confect. Diasatyrin.

*Essentia
satyrionis
Crollii quo-
que mira-
bis præstat.*

Præterea nec Topica sunt prætereunda. Itura itaque cubitum mulier sterilis, fomentet uterum seq. rerum vapore. ℥. Puleg. Orig. Melissæ, an. M. i. Moschi, gr. v. decoquantur in olla, cum q. s. vini, & vapor ferventis liquoris per canalem in uterum demittatur. Postea per horas 3. utero imponatur Pessus ex Electuario quam Mesue & Arabes sazeneam, Antidotaria vero usualia Musam Eneam, sed falsò, vocant. Mirum enim in modum teste Mesue & Manardo prodest ad sterilitatem arcendam & in potu assumpta & supposita. Post fomentationem quotidie itura cubitum, maxime si meruit mulier matricis suffocationem, seq. suffitu foveat uterum.

*Topica.
Fomenta-
tio uteri.*

℥. Nuc. cupressi, Mastic. oliba. ladani, Myrrhæ an. ʒ i. Galbani ʒ ii. Pulverata crassiuscule misc. & carbonibus ignitis inspergatur, quorum fumus per canalem in uterum demittatur. Aut si immunis est mulier à suffocatione Matricis,

℥. Nucis Moschatæ, Macis, Benzoi, styracis calamithæ an. ʒ ii. Ladani, Galliæ moschatæ an. ʒ i. Flor. lavand. fol. Rorismarin. spic. celticæ an. ʒ s. fiat pulv. crass. pro suffitu.

Quia vero absque Venerea voluptate conceptionem fieri impossibile est, suavem excitant in membris generationi servientibus utriusque sexus voluptatem hæc sequentia Topica. Ante congressum glans vitilis

*Venerem
stimulan-
tia.*

virilis inungatur Zibera odorata, aut felle leporino aut aprino, aut inungatur succo ex ovis formicarum expresse, cui pauxillum ziberæ est admixtum. Aut masticentur in ore cubebæ, & una cum saliva glandi inungantur. Utero vero præstat illinire nonnihil ol. castor. aut caryophyllor. aut nucis mosch. expresse. Porro notandum, præscripta remedia omnia ad liberorum procreationem servientia usurpanda esse tribus aut quatuor diebus à mensium purgatione exacta. Opportunissima autem hora est liberis operam dandi matutina.

Prodest autem plurimum ad citam conceptionem, si uterque per octiduum à Venere abstineant, priusquam procreandis liberis operam dent, & interim vascantur o-piperis alimentis bonum sanguinem semenque sæcundum producentibus, & vinum bibant creticum & generosum.

2. *Imprægnatio seu fatus conceptio ac formatio in utero quomodo fit, qua ejus causa, quo tempore movetur & in lucem editur, qua signa conceptionis, & quomodo procurandum ut mæculi concipiantur?*

Ex quo dicitur, Fatus conceptio ac formatio in utero hoc modo perficitur. In commixtione maris & femellæ semina amborum ut plurimum eodem ferè momento ex vasis spermaticis in uterum cum voluptate confluant, quæ si sunt sæcunda, mutua quadam amicitia ita commiscantur, ut unica fiat massa & natura, quæ massa est materia nostræ propagationis ac principium. Inest autem in hac massa & materia feminis, cælestis calor & spiritus æthereus, proportionem respondens elemento stellarum, uti Aristoteles lib. 2. de generat. animal. eum describit. Calor enim ignis nullum animal generat, sed solus calor & animalium. Qui causæ sunt conformatrices & elaboratrices omnium partium humanæ naturæ, adeoque motus ac vitæ. Hic spiritus & calor in seminibus contentus, ab uteri innato calore, à quo semen arctissime undique concluditur, ad agendum excitatur: qui pri-

mis tribus diebus seminis materiam in tres partes segregat ac disponit. Purio rem nitum & tenuiorem partem, sicut in ovoluteum, in centrum cogit, crassiores autem, ut albumen in ovo, ad circumferentiam pellit, & aquosior partem ad superficiem, ex qua, tanquam in ovo sub testa, tenuissima pellicula à calore uteri condensatur. Tales autem tunicæ circa fætum tres paulatim generantur. Ex partibus autem crassioribus deinceps sub pelliculis paulatim & successivè omnes corporis nostri partes generantur ac formantur, quæ tandem processu temporis à sanguine menstruo, id est, à sanguine illius, qui per venas & arterias ad uterum deferitur, & extra tempus imprægnationis singulis mensibus expurgatur, puriori portione, vegetantur & vivificantur. Defluit enim ex utero per venas ex cotyledonibus ortas & per membranas fætus usque ad cor protensas, quo vivificantur omnes partes. Intran autem & venæ & arteriæ in corpus fætus per umbilicum. Vita autem datur infantibus circa diem 45. circa quod tempus & anima rationalis à Deo infundi creditur, & non amplius fætus sed infans nominatur. *Advenit enim à calo nova creata anima, inquit Scaliger exer. 290. d. 2. post fatus articulationem, qua anima tunc massa illa homo fit.*

Situs est in utero fætus, masculus quidem in dextra, femella in sinistra uteri regione, & instar oblongæ sphaeræ involutus calcibus ad nates contractis, volis autem manuum genibus impositis, & capite ita genibus incumbente, ut oculis pollicem manus attingere videatur, confidet, ac dorso quidem ad maternum ventrem sive umbilicum, ventre vero ad dorsum maternum versò, collocatus est.

Movetur in utero infans primum pro ratione roboris, quandoque tertio, nonnunquam quarto mense. Maxima tamen ex parte matres infantis in utero motum persentiscunt præcisè circa medium gestationis tempus.

In lucem vero prodeunt regulariter nono vel decimo ut plurimum à conceptione

*Fatus deli-
neatio pri-
ma.*

*vivifica-
tio.*

*Situs fa-
tus in ute-
ro.*

*Motus sen-
sibilis.*

*Tempus
partus na-
turalis.*

*Hic ne-
mo abuti
ad illegiti-
mam & il-
licitam Ve-
nerem de-
bet.*

*Tempus
Veneri a-
ptissimum.*

*Conceptio
ut fiat.*

*Spiritus
æthereus
in semine
primarius
opifex.*

*Calor uteri
causa ad-
juvans.*

ne mense. Verum ut non omnis fatus eodem tempore suam recipit perfectam conformationem: ita nec eodem tempore

vel movetur vel in lucem editur, quam diyersitatem & motus & partus sequens ostendit tabella.

Tabella diversita- tem for- mationis, motus & partus fa- tus indi- cant.	Masculi forma- ti die à conce- ptione	$\left\{ \begin{array}{l} 30 \\ 35 \\ 40 \\ 45 \end{array} \right\}$	Moven- tur die	$\left\{ \begin{array}{l} 60 \\ 70 \\ 80 \\ 90 \end{array} \right\}$	In lucem pro- deunt men- se	$\left\{ \begin{array}{l} 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{array} \right\}$	vivunt, Intereunt, vivunt, vivunt:
	Fæmellæ for- matæ die à conceptione	$\left\{ \begin{array}{l} 35 \\ 40 \\ 45 \\ 50 \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} 70 \\ 80 \\ 90 \\ 100 \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{array} \right\}$	
					Nascuntur mense	$\left\{ \begin{array}{l} 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{vivunt,} \\ \text{Intereunt,} \\ \text{vivunt,} \\ \text{vivunt.} \end{array} \right\}$

*Optime-
stis partu
cur lesba-
li.*

Octavo mense à conceptione infans editus interit, cum propter imbecillitatem ex valida commotione in præcedenti septimo mense contractam, & quod octavo mense sol oppositum signum occupat, ejus in quo erat tempore conceptionis.

*Cause di-
versæ sexus.*

Sexus discriminis causa principalis est libera Dei voluntas: minus principalis causa est feminis concepti temperies & consistentia, & regio uteri, in quam semen conceptum est illapsum. Ex femine enim calidæ & siccæ temperiei & crassioris consistentiæ in dextrum uterum illapso ut plurimum masculi: ex frigidiore autem & humidioris semine in uteri sinistri partem illapso fæmellæ conformantur ac generantur. *Ætatis quoque & caliratione sexus discrimen oritur. Nam juxta Aristotelem l. 4. de generatione animalium c. 2. Admodum tenera & senescens ætas magis quam consistens & florida fæmellas generat. Et calo aquilonari magis quam austri. no mares gignuntur.*

*Signa con-
ceptionis.*

Signa concepti fatus & sexus gestati in utero præcipua hæc sunt: si semen utero illapsum per 7. dies ex utero non refluat, signum est conceptionis. Siccitas uteri post concubitum, conceptionis est argumentum. In mulieribus benè se habentibus, mensium ultra consuetum tempus suppressio, est signum imprægnationis. Iis quæ conceperunt circa nonum diem à conceptione, subsequuntur albæ colluviei ex utero profluxio, ac tandem capitis dolores, vertigines, nausæ, vomitiones, ciborum aversiones & absurdorum alimentorum naturæque minus convenient-

*Hæc signa
non sor-
sim sed
conjun-
ctim pla-
raque in-
prægnatio-*

tiium appetitiones. Iis mulieribus quæ concep-
cerunt, oculi in profundum delabuntur, *tant.*
albugoque in oculis dilatatur cum venulis sanguine turgentibus. Gravidis ut plurimum solitus color faciei immutatur & venustas perit, & in facie rubæ maculæ & papulæ excitantur. Utero gerentibus venæ sub lingua constitutæ virides & turgidæ apparent. Quæ conceperunt mulieres, paulo post eis mammae intumescunt, & solito duriores redduntur cum livefcentibus venulis, & papulæ magis rubent cum corona fusca subnigra. Ventris sensum accrescens insolita intumescencia est certiss. concepti fatus signum. Quibusdam gravidis & tibiæ intumescunt.

Urina prægnantium in primo secundoque mense, pallido cernitur colore, deinde in aureum colorem & subrubeum vergit cum hypostasi alba, & lanæ minutiss. carptæ aut tenui farinæ simili, & si commoveatur urina, resolvitur hypostasis, & per totam substantiam urinæ instar atomorum in jubare solis volitantium fluitare conspicitur. Urina gravidæ in matula probè obturata per triduum in tepido loco conservata, ac de-
mum per linteolum colata, si in linteolo exigua animalcula instar pediculorum conspiciantur, eam concepisse ostendunt, ac si vermiculi rubentes appareant, masculum, si albicantes fæmellam utero gerere significant. Exploraturus utrum mulier concepit, ituræ cubitum præbeto tepidum haustum hydromel. aut aq. cum melle coctæ, quæ si paulo post tormina Ventris sentiat, concepit; si vero non, libera est.

*Urina gra-
vidarum
qualis.*

*Observa-
tio singu-
laris.*

Signa

Signa se- Signa concepti sexus: Si mamma dextri
kum factus in gravidis turgat & intumescat magis
indicantia. quam sinistra, masculum gerere arguit;
 si sinistra famellam. Lac imprægnatæ mulieris emulsum & in aquam effusum si fundum petat, masculum gerere; si in aq. resolvetur, famellam arguit. Masculum utero gerentes floridioris ac rubicundioris in facie sunt coloris, famellam pallidioris.

Interdum moventur in dextro latere, famellæ die
tamen famellæ ci- 90. in sinistro. Gravida masculum gerens
tius moventur, ubi ubi inambulat, aut è sella surgit, aut januæ
bi calidioris nature post se transgreditur, semper dextrum pedem prius promovet ac præponit & se dextra manu fulcit. Lac aquosum è mammis si sponte profluat, imbecillitatem fætus in utero arguit. Salubritatem fætus in utero ostendit, mammae turgidæ & duriusculæ, & lactis ex eis emulsi inculcata consistentia & albedo. Quibus enim, ut inquit Hippo. gravidis mammae flaccescunt aut graciles redduntur, hæ abortiunt.

Masculorum generatio ut procuranda. Et si generationis & formationis nostræ causa efficiens principalis sola Dei benignitas sit: tamen cum sexus diversitatis causæ physicae reddi queant, quod nimirum ex sem. calido & moderatè crasso in dextram partem uteri delapso ut plurimum masculi generentur, non est à ratione alienum posse procurari, ut cum victus ratione & remediis semen vitiosum corrigatur, & ad masculi generationem aptum reddatur. Ut itaque fecundæ mulieres masculos concipiant, primum utantur victus ratione calefaciente & exiccante; sanguinemque purum ac crassum, qui materia est feminis, generante: qualem supra in curatione sterilitatis ex frigida & humida causa præscripsimus. Ituri itaque cubitum conjuges vel uterque vel alteruter, cujus semen frigidius & fluidius est, assument vel Diasatyrii 3 s. vel Mithrid. 3 i. cum vino generoso, ac deinceps mane ac vespere edant 2. vel 3. rotul. Diamb. vel Diamosch. vel Diamargariton. cal. & bibant haust. vini Cretici aut alterius generosi, & tempore matutino dent operam liberis

procreandis. *Mercurialem mærem, item crataegonum herbam Diosc. in hunc usum valde commendat. Alii dextrum porci testiculum pulverisatum exhibent.* Ut autem Tori conjugum semen in dextram partem uteri confluat, galu dispo- cum ut plurimum à conjugali consuetudine peracta mulierculæ se à viris avertant, multum conducit ad masculi generationem, si lectus conjugalis ita sit dispositus, ut se mulier statim à concubitu in dextrum latus vertere, in eoque cubare ac indormire queat.

3. Ne fætus in utero offendatur qua ratione tractanda sunt Gravida, & quibus potissimum morbis & symptomatis infestantur?

Veluti tenerrimi arborum fructus suis Quando nondum pediculis satis firmati, ex quavis fætus facili levi occasione decidunt & corrumuntur; le lædatur. ita fætus conceptus, præsertim in primis tribus mensibus ex levissimis quibusque causis lædi, corrumpi & ad abortum propelli potest. Quare singularis prudentiæ, Gravida pietatis & humanitatis est, & reverentiæ, non offendenda. ita tractare uterum habentes, ne ulla occasione offendantur ac lædantur. Omnem enim læsionem sentit fætus, omnemque & animi & corporis affectionem mater nam, & cum matre compatitur. Qui itaque uterum gerentes offendunt & abortui aut corruptioni fætus occasionem præbent, in judicio Dei ab homicidii crimine non absolvuntur.

Consistit autem & matris & fætus salu- Salubritas matris & fætus in quibus consistat. bitas in causarum naturam nostram conservantium seu alterantium, quas recentiores Medici res non naturales minus propriè appellant, convenienti usurpatione. Sunt autem numero sex: Animi affectiones, Aër, cibus & potus, Somnus & vigilia, Motus seu exercitium corporis & quies, Excretio superfluitatum & retentio convenientium: in quibus hac ratione gubernandæ sunt gravida.

Quantum ad animi perturbationem attinet, Animipap p p p net,

shemata & perturbationes quanam evitanda gravidis. Gravidæ exhilaranda omni modo.

Res monstroſæ & terribiles removenda.

Mira viſi imaginatio- nis.

Fætor noxius.

Aër qualis eſſe debeat.

Alimenta convenientia.

In Tica quid agendum.

nèr, vix alia re magis afficitur fœtus, quam materni animi affectione. Lætante enim matre lætatur & exultat ipſe fœtus, contriſtante & fœtus triſtis contrahitur ac marceſcit. Quare curandum eſt ut quantum fieri queat, ſemper læta & hilaris & quieto animo permaneat grvida, & jucundis ſenſuum objectis, ut aſpectu rerum pulchrarum, auditione ſuavium colloquiorum & harmoniæ muſices, oratione rerum fragrantium, guſtu rerum dulcium, molli & ſuavi contretatione ac complexu ad læticiam excitetur. Contraria autem omnia objecta ſenſuum, quæ triſtitiā, mœrorem, iram, timorem, ſollicitudinem inducere gravidæ poſſunt, procul ſunt removenda. Inprimis autem ſtudioſè cavendum, ne res aſpectu horribiles, monſtroſæ & inuſitatæ, ex quarum viſu expaveſcere terreſierique queat, gravidæ offerantur aut demonſtrentur, præſertim incendia & monſtroſa animalia. Talibus enim conſpectis repente perterrefactæ gravidæ quæcumque ſui partem manibus attigerint, rerum viſarum indelebilem imaginem fœtui inurunt. Simili ratione & hitoriarum horribilium deſcriptiones & narrationes procul ſunt arcendæ à gravidis. Ita & odores graves & fœtidi ſunt vitandi; nam quædam ex ſolo odore lucernarum extinctarum abortiviſſe hitoriz teſtantur.

Aër in quo verſatur grvida & quem per inſpirationem perpetuo haurire cogitur, debet eſſe purus, nulla excellenti qualitate aut virulenta contagione aut fœtore infectus. Præſtat itaque odoratis ac jucundis ſuffitibus ſubinde aërem in cubiculo corrigere. In frigidiore vero aëris conſtitutione corpus & maximè Venter gravidarum calidis tegumentis muniendus erit.

Alimentis utantur gravidæ ſuæ naturæ convenientibus, concoctu facilibus, & probum ſanguinem generantibus. Inter alia alimenta maximè eis proſunt ova forbilia, & carnes pullorum ac vitulorum & ſimilia. Hoc tamen cavendum, ubi gravidæ nonnunquam alimendorum abſurdorum & naturæ minus convenientium vehementi

appetentia tenentur, etiamſi ea ſint minus ſalubria, ne talia iis proſus denegentur. Quæ enim ipſæ vehementer appetunt, facile etiam conſiciunt; Sed ſi earum appetitioni reſiſtatur, in graviora incidunt ſymptomata, & rerum deſideratarum ſigna ſæpè fœtui imprimuntur, vel admodum male habent grvida, & in animi deliquium incidunt, niſi adipiſcantur, quæ appetunt.

In potu autem maximè convenit vinum lene & ſuave, aut cereviſia clara, quandoque & vinum aromatiz quod claretum vocant, aut vinum creticum utiliter guſtare poſſunt. Aſſumpto cibo claudant oriſcium Ventriculi aut fruſt. cyton. ſacc. condit. aut pugill. ſem. fœnicul. & coriand. ſacc. obducti eſtatione.

Somno & vigilia moderatè utantur, & earum voluntati ſatisfacienti, nec ipſæ gravidæ à ſomno meridiano, ſi appetant, arcendæ ſunt.

Motiones & exercitia corporis in gravidis debent eſſe levia ac moderata, veluti ſunt leves & breves deambulationes per loca amœna. Vitanda autem ſunt omnia laborioſa exercitia, veſtiones vehementes in curru, ſalationes, rerumque ponderoſarum lationes, & corporis inclinationes, extensiones in altum ac compreſſiones. Omnium autem maximè ſibi cavere debent gravidæ, ne per imprudentiam cadant aut è ſublîmi delabantur.

Quantum ad excretionem & retentionem ſpectat, ſtudioſe procurandum eſt, ne naturales excretiones alvi potiſſimum ac veſicæ ſupprimantur: id ſi contingat, cibis potiſ, quales ſunt juſcula pingua, pruna ungar. & ſimilia, & balneis alvum emollientibus excrementa alvi & veſicæ ſubducenda erunt, magis quam medicamentis. A pharmacis autem omnibus, exceptis fœtum corroborantibus ac potiſſimum in primis tribus menſibus abſtineant. Poſtea vero ſi neceſſitas urſerit, levioribus remediis veluti ſunt caſſ. pulpa, Manna & ſyrup. roſat. ſolut. tutò uti poterunt.

Quin & quotidie uterus & fœtus in utero, ſi frigida ſit temperies ſæmellæ, hiſce remediis corroborantia. lida.

Potus.

Somnus & vigilia.

Motus corporis.

Alvus quibus ſolvenda.

Lenitiva.

Confortan-
cia frigida.

diis corroborari potest, duab. rot. Diamarga. calidi; aut 11. pug. sem. fœnic. saccharo obducti devoratis; aut haust. vini generosi vel aromat. in quo nonnihil panis est maceratum. At vero si gravida præternaturali calore infestetur, quod ut plurimum accidere consuevit, utatur sing. diebus, Diamarg. frig. rot. 11. aut rad. cichor. aut frustulo cyton. sacchar. condito. Aut bibat haust. lactis, ex sem. frig. majorib. & aqua hordeacea, aut aq. cichor. confecti, cujus parandi rationem supra aliquoties proposuimus.

Morbi autem & symptomata quibus potissimum infestantur gravidæ, præcipua hæc sunt:

Fatua imprægnatio sive Mola,
Pica,
Tumor tibiæ ac pedum,
Febricula,
Abortus.

4. *Fatua imprægnatio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Inter fatuas imprægnationes, & à natura abhorrentes sunt Mola, Monstra, & A-

Mola quid. nimalia diversigenis. *Mola*, Mola seu fatuus conceptus, est informis, inanima & conglobata caro, dura & pellicula obducta, intus rubea ac sanguinea, fœtis vero ex albo rubescens, figura ex rotundo oblonga, magnitudine nunc ovo nunc cucumeri aut ovino Ventriculo persimilis, in utero

Ejus differentia.

concepta, fatum sese mentiens. Nostrates mulierculæ triplicem statuunt Molæ differentiam. Et primam quidem minorem & ovi magnitudinem referentem vocant *Ein Sonnenkind* / id est solarem fatum, aliæ *eine faule Geburt* / quæ ut plurimum circa tertium gestationis Mensem ab expultrice facultate expellitur. Secundam vocant *Ein Mohnkind* / id est Lunæ fatum, quæ major est & ovis Ventriculo similis, quæ & ipsa post quartum aut quintum mensem propellitur. Tertia nomen germanicum non habet (*nonnulli tamen ein Gewerch* vocant) quæ sæpe per integrum gestatur annum, & crebro quoque per totum vitæ cursum. *Vri apud Ambros. Pareum*

lib. 23. chirurgia cap. 34. fœmina quadam per 17. annos molam scirrhosam 9. librarum usque ad vitæ exitum gestavit, quæ postea per sectionem exempta est.

Causa *conceptionis* Materialis quidem *Causa*. est semen utriusque parentis effatum, & vel qualitate vel quantitate vitiosum, in concubitu in uterum illapsum, & ab uteri aviditate conceptum ac retentum, à caloreque uteri induratum, in quam materiam sanguis menstruus per cotyledones influit, eoque nutritur & augetur, sed nullus influit spiritus vitalis ex cotyledonibus seu orificiis arteriarum, imo in eo extinguuntur à menstruo sanguine, & calor natus & facultas formatrix, ita ut maneat massa tantum carnea, informis & mortua, (in comparatione nempe ad fætum. Nam alias instar fungi augetur & crescit, interdum ad tantam magnitudinem, ut Venter molem hanc capere non possit, & miseræ mulierculæ tandem suffocentur ejus pondere. Non enim ut perfectam, nec ut omnino alienam habet Naturam, teste Aristotele lib. 4. de generatione animal. c. 7.)

Ex eadem materia concepta pro sua se- *Monstra* & quacitate & qualitate, generantur & mon- *animal-*stra & animalcula, veluti sunt Ranæ, fer- *cula*.pentes, & alia: adfluente ad illam non tantum sanguine menstruo, sed & spiritu vitali, ex arteriis maternis. *De hisce videatur Pareus l. 24. chirurgia, & Marcell. Donatis in histor. Med. mirabili l. 4. cap. 25.*

Signa in conceptione molæ omnia ea *Signa*. apparent quæ in veri fœtus conceptione evenire solent. Nam menses intercipiuntur, appetentia vitatur, subsequuntur nausæ & vomitiones, mammae intumescunt, ac post medium gestationis tempus, vel circa 4. mensem fit tremula commotio, non quidem Molæ, sed uteri, gravantem molam excutere conantis: Processu vero temporis, si non dictis temporibus expellitur à natura, intumescit & Venter.

Distinguitur autem à vera conceptione, *A naturali* quia in mola ex mammis tumentibus nul- *fatu ne* lum lac exprimi potest, quemadmodum *discernen-* fit in vera conceptione; deinde decum- *da mola*.

bente muliere in alterutrum latus mola non ut infans suavi motu movetur, sed ut lapis gravis ex uno latere in aliud moleste ruit. Et in mola post octavum gestationis mensem Venter ita intumescit, ut hydropis suspicionem inferat. Duricie tamen ab hydropē dignoscitur; & quod in hydrope & Venter & pedes simul intumescunt: in mola vero Venter quidem intumescit, sed pedes & manus gracilescent. Præterea molæ id proprium est, quod per manus compressionem pondus ex uno latere in aliud protrudi potest, quod in fætu gestato minimè contingit. Deinde in gestatione molæ vehemens commotio in Ventre ante tertium mensem perentificatur, in fætu ante quartum mensem nunquam. Prognostica: Nullum animal, excepta muliere, molam concipit aut gerit, teste Aristotele. Non potest generari nisi ex concubitu viri aut mulieris.

Ab hydrope ut differratur.

Prognostica.

Naturalis mola excretio.

Curatio molæ est salutaris; si à natura mola ut pondus inutile & noxium ejiciatur. Id quod, si virtus uteri expulsiua robusta sit, post decimam tertiam aut certè post 19. septimanam contingit. Projicitur autem similiter ut fætus, cum dolore & difficultatibus, quin & ea subsequuntur symptomata propulsiōem molæ, quæ verum partum sequi consueverunt, & sanguis impurus similiter ut in partu profluit.

Curatio artificialis.

At ubi ob expultricis facultatis imbecillitatem mola expelli dictis temporibus nequeat, aut remediis aut chirurgica operatione (quod tamen non caret periculo, ideoque nec temerè tentanda) producenda venit. Et nunquam chirurgica operatio tentanda, nisi certo constet molam esse, & post exactum xi. mensem à conceptione, ultra quod tempus fætus in utero nunquam delitescere potest.

Ut molam enixam tractanda.

Quæ igitur mulieres naturæ beneficio enixæ sunt molam, hæ tractentur & per omnia simili ratione victus utantur, qua uti solent mulierculæ quæ naturalem fætum pepererunt, ut nimirum calida edant juscula & concoctu faciles cibos, & vitent omnia frigida, refrigerantia & concoctu difficilia.

In quibus autem mulierculis mola ultra xi. mensem retenta fuerit, hæ si corpus habent plethoricon, primum venæ talares utriusque pedis aperiuntur, quo modo menses provocare solent; deinde frigida pituitosaque colluvies, quæ in utero plerumque circa molam hæret, remediis convenientibus concoquatur & expurgetur, quorum copiam in superioribus, in sterilitatis nimirum curatione, & mensium suppressorum provocatione præscriptissimus. Purgato corpore collocetur ægra in lavacrum sive infessionem ex fol. & rad. Alth. Malv. Brancæ Ursinæ, parietar. chamæmeli, Meliloti, & seminibus lini & fœnugræci an. q. s. concisis ac contusis præparatam. Ex iisdem quoque herbis & semin. sacculus confici potest, qui decoctus & expressus, Ventri tumenti imponendus est, quò emollescat & Venter tumens & ipsa materia molæ. His ita peractis exhibeantur ea remedia omnia, quæ paulo post in fætus mortui aut secundinæ in utero retentæ expellendi curatione tradituri sumus, cujus hoc loco unum & alterum exemplum adjecisse satis erit.

Quando remediai hoc affectu ruto adhibenda.

Infessio.

Sacculus.

℞. Cinamo. cl. Aristol. long. an. ʒi. Fol. sabinz ʒ ii. Rad. Asari, Croci, Laccæ an. ʒs. sem. Rutæ ʒ ii.

Molam expellens pulvis.

Tenuissimè pulverata commisceantur, cujus ʒ i. mane ac vesperi cum haustu vini Rhenani exhibeat. Aut loco pulveris devoranda præbeatur seq. pill. mane ac vesperi ʒ s.

℞. Nigellæ, Aristol. long. rad. Dictamni, sem. Thlaspi, baccarum sabinz, fol. sabinz an. ʒ i. sem. Rutæ, Rubææ tinctorum, Gummat. Serapini, Amouiaci, Myrrhæ, Castor. an. ʒ s. His omnibus pulveratis cum succo radiculæ culinariæ Merretig / conformentur pill. in calido mortario. Tandem utero inseratur per noctem subseq. pessus.

Pillula.

℞. Naphthæ seu Asphalti (pix concreta in mari mortuo) castor. Ellebori albi, Gentianæ, Galbani, Opopanacis, Serapini, Scammonæ, sabinz an. ʒ s. Ex his omnibus pulveratis for-

Pessus.

formetur pessus cum succo Rorif. aut Mercurialis herbæ.

Extractio per chirurgiam. • His & similibus si mola prolici nequeat, ad chirurgicam operationem accedendum, & convenientibus instrumentis mola minuenda frustulatimque extrahenda erit. Quanquam Plin. lib. 7. cap. 15. asseveret omnem ferri ictum & aciem respuere. Dicit autem Plinius hoc propterea, quod non facile comprehendi potest mola instrumentis, sed cedit retrorsum: si tamen rectè comprehendatur, instrumentis evelli potest.

5. *Pica gravidarum quid, qua ejus causa, qua signa, & quæ medicatio?*

Pica quid. *Κίρτη*, Pica gravidarum est rerum absurdarum, & à quibus alioqui natura abhorret, veluti sunt carnes piscesque crudi, anguillæ, pix liquida, creta, carbones & similia, ad vescendum desiderium. De causis, signis & curandi ratione Picæ supra in l. 4. f. 2. g. curatione morborum Ventr. abundè nobis tractatum est. Hoc loco satis fuerit monuisse, ut & antea factum est, ut si aliquando gravidæ hujusmodi vitiosa appetentia tententur, id quod ut plurimum tertio quartoque mense contingit, eas non proflus esse arcendas ab esu rerum desideratarum, quia hæc ut plurimum vel abortum, vel alia incommoda, si eis denegentur, inferre solent. Quia vero pharmacis purgantibus causam mali auferre minimè licet (præter enim Mannam & cassiam exhibere gravidis tutum non est) ideo laborandum est, ut officium Ventr. corroboremus & abstergamus tantum: Nam post mensem ut plurimum spontè cessabit hæc affectio. Prodest itaque foris Ventr. inungere ol. Mastich.

Desiderata gravidis non deneganda. & Nardino mixtis, quibus pulvis radic. polipodii & suc. granatorum est coctus, & post inunctionem imponenda est Ventriculi orificio lamina panis tostii, & aut vino Malvatico, aut succo granator. conspersa: aut imponantur Ventriculo pampini seu fol. vitis cum aceto confusi, aut imponatur Emplastrum de crusta panis, quod in lib. dispensandi officinarum præscribitur. Intra

corpus vero assidue assumat grvida suc. uvarum omphac. aut offulam panis in vino granatorum aut vino Rhenano aut Malvatico madefactam, & subinde esitet pulpam Tamarindor. aut cortices Arantiorum condit. aut rad. calami Aromat. conditas, aut pruna sylvestria condita, aut mala cum persica tum cytonia condita. Inter edulia autem utilissimè uti poterit condimentis acetarii loco, olivis maturis & fructibus caparum conditorum & synapi cum aceto contriti, cujus tamen usum, statim ubi cessat vitiosa appetitio intermittere debet. In pica gravidarum id commemoratione dignum est, quod si à rebus desideratis prorsus arceantur, ejus rei imago & vestigium capiti infantis imprimitur, teste Hippocrate in libello de superfætatione.

6. *Pedum intumescencia in Gravidis quomodo discutienda?*

Ἰοιδήματα τῶν ποδῶν ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι. Intumescunt pedes gravidarum ut plurimum in tribus primis gestationis mensibus, cujus causæ *οὐκ ἐν γαστρὶ* sunt pituitosi humores ex Epate, Ventr. & utero, sua gravitate in pedes decumbentes.

Verum ut cætera Oedemata sine noxa phar macis curari non potest. Eam ob causam sufficet, Ventr. & Epar, si robusta est grvida, primum 3 r. s. mannæ à pituita liberare, postea eadem viscera convenientibus alimentis & medicamentis corroborare. Tumentib. autem pedibus post frictionem calidis linteolis, proderit inungere seq. linimentum. *℞.* Ol. Aneth. chamæ. Hyperico. an. 3 s. ol. vitr. 3 r. commisc. fiat liniment. Deinde Aëtius jubet Brassicæ fol. imponere, sed magis probatur catapl. caulicum nigricant. in æ. p. vini & aceti decoctis, quibus confusis admisc. far. fabar. q. s. fiat cataplasma. Aut

℞. Ol. rosar. q. s. in quo resolvatur ac conteratur Terra sigillata, addatur aceti rosarum parum, fiat unguentum quod tumori illinatur.

7. *Febris gravidarum quomodo Mitiganda?*

Πυρετός ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι. Tentantur mul-

P p p 3 hier-

*Febres
gravida-
rum me-
thodice
non curan-
tur.*

Diat.

*Decoctum
hordei.*

Acida.

*Supposito-
ria.*

Lenitiva.

lierculæ utero gerentes & febribus ex putrido humore genitis, quæ plenæ sunt humoris superflui. Sæpe & feb. occasio sunt aut abortus aut intereptionis fatus, teste Hippoc. Et minimè licet Medico Gravid. febres methodo & convenientib. remediis ut alias febres auferre. Febrium vero causas, signa, differentias & curandi rationes infra in lib. xi. Deo juvante fusius tradituri sumus. Hoc vero loco, quomodo febrientes gravidæ sint tractandæ, succinctè tantum perstringemus. In gravidis itaque febricitantibus primum instituatur victus ratio conveniens, refrigerans & humectans. In cibo convenientiss. sunt cremor ptisanæ hordeaceæ aut avenæ, pruna, lac amygd. & sem. frig. macaro pullorum & avicularum cum uvis omphac. cocta, lactuca cum aceto. In potu vero utilis est aq. hord. hac ratione parata. \mathcal{L} . Hord. el. M. i. sem. Anisi \mathcal{Z} s. passularum min. id est Corinth. \mathcal{Z} ii. cinamo. el. \mathcal{Z} s. Excepto hordeo reliqua contundantur & cum semicongio aq. fluentis in cantaro probè obliato per 2. horas coquantur. Atque si gravida delectetur potione acida, addi possunt Tamarind. \mathcal{Z} i. s. & simul concoqui. Sitis vero in ipso paroxysmo sedari potest aut succo Arantiorum, aut mal. punicorum aut Tamarind. in ore retentis. Ariditas autem linguæ atque faucium humectetur crebra elotione oris, cum aq. hord. cui parum aceti rosarum sit admixtum. Et post elotionem, linguæ & faucibus illiniatur mucago ex sem. cyton. contusis & in aq. rosar. maceratis expressa. Prospiciendum quoque diligenter ut constipatus Venter referetur Glande seu suppositor. ex sapone candido formato & ol. chamæmel. inuncto anoque inserto. Aut inseratur podici vitellum ovi cum sale mixtum, & in rarum linteol. instar noduli colligatum. Et si febris in 5. aut 6. gestationis mensem incidat, tuto potest \mathcal{Z} i. s. Mannæ in haust. prun. decoctorum resolutæ ac colatæ exhiberi, aut syr. ros. sol. sine scammo. \mathcal{Z} ii. aut \mathcal{Z} x. pulp. Cassiæ. Dolori capitis in feb. Epithema seq. dupl. linteolis exceptum temporibus imponatur.

\mathcal{L} . Aq. rosar. lb. s. papav. \mathcal{Z} iii. Ace- ti rosar. \mathcal{Z} ii. Albumin. ovorum n. i. simul conqussentur ac commisc. fiat Epithema. Æstus febrilis in toto corpore extensus mitigetur seq. liniment. quo inungatur spina dorsî usque ad lumborum vertebrae & dextrum hypochondr. \mathcal{L} . Ol. rosar. nymph. an. \mathcal{Z} iii. cyton. \mathcal{Z} i. Mucag. ex sem. psylli cum suc. semper vivæ parat. \mathcal{Z} i. s. ceræ cand. q. s. f. linim. cui admisce aceti rosar. parum. Quin & Epatis regioni ac cordis & tarso pedum & carpis manuum commodiss. seq. Epithema duplicat. linteol. exceptum imponi potest. \mathcal{L} . Aq. rosar. lb. i. aceti rosar. \mathcal{Z} iii. suc. semp. vivæ, suc. trifol. acidi an. \mathcal{Z} ii. muc. ex sem. cyton. cum aq. ros. factæ \mathcal{Z} i. spe. Diatriasand. Diamarg. frig. an. \mathcal{Z} ii. album. ovi n. i. fiat Epithem. Præscriptis omnibus tuto uti poterunt gravidæ, ab aliis autem validioribus pharmacis prorsus abstinere. Nam febris ut plurimum à partu statim extinguitur. Verum si post partum in puerperio contingat feb. & vires constent, præter prædicta aliis quoque remediis causam febris tollentibus uti possumus, quæ libro undecimo describentur.

8. *Abortus quid, quæ ejus causa, quæ precedentia signa, & quæ ratione præcavendus?*

"Αμβλωσις five ἔκτρωσις, ejectio fatus, Abortus Abortus, q. d. intempestive ortus, est ubi fatus ante legitimum tempus, id est, ante sextimum gestationis mensem in lucem editur. Et si quidem primo aut secundo mense, antequam fatus perfectam nactus sit conformationem, abortus contingit, ad molæ speciem primam à mulierculis referretur. At vero si post exactam conformationem fatus excidat, Abortus propriè dicitur. Similiter si septimo vel octavo mense fatus mortuus prolabatur, inter Abortivos numerabitur. Si vero supervivat post partum,

*Epithema
pro capite.*

*Linimen-
tum.*

*Epithema
pro carpi.*

*Valida
purgantia
noxia.*

*Abortus
propriè
quid.*

tum, inter partus tempestivos vel legitimos referendus est.

Causa proxima & interna. Causæ Abortus *αἰτιαι* sunt, retentricis facultatis uteri imbecillitas, ex aliqua excellenti intemperie orta, relaxatio vasorum, id est venarum & arteriarum ex cotyledon. uteri progenitarum, & in corion, id est, secundinam implantatarum, quibus fœtus utero est alligatus, amplitudo, nimiaque humiditas, & lubricitas interioris orificii uteri.

Causa antecedentes & externa. Προγενετικαὶ sunt vehementiores perturbationes animi, ut repentina expavescentia, excandescencia, metus, tristitia, odores fœdi ac graves, labor vehemens & violenta corporis commotio, saltatio, ictus, casus & percussio, flatus Ventrem distendentes, tussis violentæ, & sternutationes crebræ, sanguinis ex venis præsertim talaribus aut ex quavis corporis parte immoderata profusio, mensium uberius in gravidis eruptio, pharmaca violenter purgantia & menses moventia, (ideo hac non temerè exhibenda, nec absque discrimine cuiusvis vendenda) morbi acuti, veluti sunt Tenesmus, Apoplexia, febres acutæ, alvi fluor immoderatus, fœtus in utero imbecillitas, & reum appetitarum denegatio.

Signa prognostica. Signa futuri abortus sunt, si gravidis ubera, quæ prius plena & tumida erant, repente, aut etiam sensum subsidant ac flaccescant, abortum prælagiunt aut fœtus extinctionem. Ubi repente in utero intempestivi dolores excitantur & prægnans contremiscit, facieque rubet, abortum minuitur. Repentina in gravidis copiosior mensium eruptio, abortum instare significat. Cum gravidis menses fiunt, invalidi aut non vitales partus eduntur, aut saniosi, uti ex Nigidio asserit Plinius l. 7. c. 15. & experientia verum esse testatur. Interdum tamen gravidis semel atque iterum fiunt menses, absque detrimento fœtus, in naturis nempe robustis & plethoricis.

Curatio seu præcautio. Curatio maxima ex parte in prævisione seu præcautione, ne abortus contingat, & causarum internarum emendatione externarumque evitatione, & retentricis facultatis

uteri corroboratione consistit. Quomodo autem vitandæ sint procatasticæ causæ, in tractatione gravidarum paulo ante docuimus. Causæ vero Proëgumenæ abortus crebriores & periculosiores, hac ratione præcavendæ & emendandæ veniunt.

Si uteri orificium nimium sit amplum & lubricum, viscidaque humiditate oblitum, remediis topicis paulo ante in curatione sterilitatis ex nimia humiditate oræ dictis, exiccandum & constringendum erit.

Si flatus copiosos in utero collectos abortum inducere metuatur, ipsa gravida quotidie uratur iusculis in quibus pul. cymini præparati est incoctus & admixtus: aut crebro assumat ol. cymini gut. v. cum haust. vini: aut devoret mane ac vespere ii. rot. Diacymini aut Diagalangæ, donec dispensetur flatus. Foris autem utero imponatur fasculus, cui infusa sint bacca lauri, cyminum, piper, ruta & mentha an. ad placitum, qui subinde vino conspersus, & per regulam ignitam calefactus, utero imponatur: aut inungatur Venter ol. liliorum alb. cui nonnihil ol. cymini aut carvi sit admixtum.

Si ob alvi obstructionem aut tenesimum metuendus sit Abortus, Venter glandibus ex sapone albo formatis & ol. chamæm. inunctis anoque insertis subducatur. Aut si superavit gravida tertium mensem à gestatione, sine metu injici poterit clyster ex pingui jure carnis bubulæ & pulpa cassiæ oleoque communi confectum: aut per os assumat ʒ i. s. mannæ in iusculo prunorum resolutæ ac percolatæ. In Tenesimo autem proderit lac bubalum recens emulctum potitare: aut iusculum piscium coctorum, in quo radic. glycyrr. sint incoctæ.

Ab alvi vero fluore si metuatur abortus, In diarr. pulverem frumenti ocymoidis vel ocymarrhææ, stri, quæ nostrates Boockweiten vocant, in butyro frixum, cui hypocystr. pulv. est admixtus, instar pulmenti; crebro esiter, subinde vinum bibat rubeum, in quo pruna sylvestria sunt incocta.

In febrilibus æstibus, si abortus metuatur, & corpus sit plethoricum, post quartum gestationis mensem, venam medianam vocatam.

vocatam dextri humeri tūd incidere licet, & corpus à putridis humoribus vel manna vel pulpa cassiæ purgetur, & his topicis utendum, quæ paulo ante in febribus gravidarum commemorata sunt. Inprimis vero utile est lumbricos terrestres cum aceto rosaceo contusos instar catapl. imponere arteriis in carpa, aut Epithema ex succo rutæ, aceto rosaceo & albugine ovorum confectum, linteolisque exceptum applicare, aut cataplasma ex hordeacea farina & succo semper vivi Ventri imponatur.

In morbis
periculosiss
aliis.

Si vero aliorum graviorum morborum occasione abortus timeatur, veluti tussi, lienteria, Epilepsia, mensium fluore, sanguinis profluvio, tum ad eorum morborum curandi modum in superioribus traditum confugiendum erit, & iis remediis utendum, quæ fatui nullam noxam inferant.

Retentri-
cem uteri
corrobo-
rantia.

Mulierculæ quæ crebro abortire consueverunt, hæc studebunt sedulo, ut & internis remediis retentivam vim uteri corroborantibus subinde utantur: tales autem sunt rotulæ Diamarg. vocatæ, rad. zedoariæ, cancri fluviatiles cum jusculo pullorum contusi. *Balsamus quoque puerorum, dicta aqua scilicet pretiosa, insignem vim habet & fatum & matrem confortandi, sicque abortum præcarvendi, si ejus cochleare i. assumatur, & linteum eo madefactum umbilico imponatur.*

Experi-
menta su-
gularia.

Pro præsentis experimento autem utuntur nostrates mulierculæ ossiculis leporum in articulatione cruris & tibiarum repertis, quæ nostris *der Hasensprung* vocantur, si ea pulverata cum vino crebro bibantur, aut etiam collo appensa gestentur. Similiter & ungulæ ursinæ in collo gestatæ & lapis Aëthites, *Adelerstein* in collo gestatus, & cinis Erinacei cum pauxilla pinguedine scrophæ, quæ nondum peperit, in linimenti formam reductus & utero illitus. Reperiuntur & vermiculi sub rad. graminum majorum evulsis colore subrubicundi, qui sine donec illigati, & in collo gestati specifica virtute prohibent Abortum. Quin & fatum legitimo tempore nascentem eniti prohibent, donec removeantur. Ventri autem commodissimè attrahentia & constringentia

Empl. imponi possunt, qualia sunt hæc sequentia.

℥. Pulv. Tragacanti, Gummi Arabici torrefacti, Bdellii mollis & subalbidum ven- an. ʒ s. Acar. Thur. Hypocyst. sanda- rri & luma- racæ an. ʒ i. Boli Armeni com. sang. bis appli- candum. Dracon. succini citrini an. ʒ ii. Ceræ ʒ s. Glutinis usitati, in aq. plantag. resoluti q. s.

Omnibus in calido mortario probè contusis, fiat Emplastrum, & per alutam extendatur, & instar ceroti Ventri lumbisque imponatur. Aut

℥. Pulv. Thuris masculi, sang. Dracon. Boli Armen. an. ʒ iii. Balauft. nucum Cypressi an. ʒ ii. Picis navalis ʒ i. s. Ceræ q. s. *Cerorum.*

Fiat l. a. Cerorum, & per alutam extendatur. Quin & lumbi abortum metuentium sequent. linimento utilis. quotidie inungi possunt.

℥. Ol. rosac. myrtill. è mastich. an. ʒ s. Linimen- ol. caryoph. destillati ʒ i. Coag. le- tum. poris ʒ ii. Ceræ q. s.

Fiat linimentum, cui admisc. pulv. tenuiss. eboris, cornu cervi usti, spodi, Boli Armen. an. ʒ s.

Porro gravidæ abortum passæ per omnia ut puerperæ sunt tractandæ, viresque earum convenienti victus ratione corroborandæ. *Sapius enim magis debiliantur abortientes, quam tempestivè parientes & gravioribus affliguntur symptomatibus.* De puerperarum autem tractatione paulo post disseremus.

SECTIO IV.

DE PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM AFFECTIBUS.

1. Partus quid, quæ partuum differentia, quæ instantis partus signa, quomodo dolor parturientium intermissus rursus excitandus, & quibus affectibus parturientes & puerpera potiss. affliguntur?

T Oxiac. regis, partus, est ipsa tota pa- Partus triendi actio & fetus enixio. Utero e- quid.

nim gerentes 7. mense raro, sed tamen vitalem, 8. mense rariss. & semper vel mortuum, vel paulo post moriturum, Nono mense sive 40. à conceptione septimana superata, frequentiss. communiter & secundum naturæ cursum, fatum in lucem edunt. Tum enim fatus grandior & robustior factus violentius se commovendo &

Causa partus temporis.

Admirandum Dei opus.

Partus differentia.
Naturalis.

calcitrando membranas duas Amnion Agninam; & Farciminales perrumpit ac lacerat, & tertiam quæ secundina nominatur, & exterior est, à cotyledonibus, quib. venis & arteriis alligata est, solvit & laxat, ac inde admirabili ac planè divina manu ductione ac ope per angustiss. viam inter duos ossa pubis tanquam per rimam angustam inter duos scopulos sitam, in hanc ærumnarum vallem cum lachrymis & ejulatu progreditur, supinus cælum versus aspiciens; in qua actione nisi auxiliator Deus adesset, & infantis & matris vita tanquam in tenuiss. filo pendens, in extremo esset discrimine constituta. Differentiæ partus sunt duplices. Naturales & Præternaturales. Naturalis partus fit, quando fatus legitimo tempore ruptis suis involucribus hoc modo in lucem progreditur, ut primum caput exeat supinus, deinde cervicem & humerum, tandem thoracem, ventrem ac pedes, manibus lateribus applicatis, & usque ad genua protensis.

Præternaturalis.

Præternaturales partus habentur, quicunque à naturali jam descripto, quoquo modo recedunt, id est, quando vel non legitimo tempore fatus elabitur, vel ubi primum pedes aut manus ex utero exierit, aut quando uno pede aut una manu aut dorso aut cervice, aut pectore ad os uteri devolvitur ac prodit: tum enim semper pariendi difficultatem adfert. Ubi maximè industria obstetricis desideratur, quæ sciat molliss. manibus oleo liliaceo inunctis fatus in utero præternaturalem situm iterum in naturalem aptissimè deducere, dirigere ac conformare, & ita tandem enitente matre fatum molliter excipere.

Signa partus instantis.

SIGNA instantis partus omnibus gravidis communissima, sunt vehemens do-

lor & anxietas, non tamen in omnibus æqualis, qui dolor parturientium nominatur, & omnibus parturientibus accidere consuevit, exceptis plerisque meretriculis, quæ Sathanæ ope ac suasu, ne suam impudicitiam prodant, fatum prodeuntem horribili patricidio extinguere conantur. Dolor autem hic sentitur in lumbis, pectinis ossibus, imo Ventre, in inguinibus ac cruribus, denique superior Venter contrahitur, in imo vero gravitas & tumor persentiscitur, adeoque tota moles in pudendum decumbit; cervix uteri dilatur & inflammatur, & quibusdam primum alba coluvies ex utero prolabitur, & assidua menjendi cupiditas gravidam infestat, postremo ubi jam ruptæ sunt membranae fatum involvences, statim profluit aqua satis copiosa, eaque serosa vel sanguine diluta, quæ nihil est aliud quam lotium fatus in membrana farciminali tempore gestationis collectum, cujus effusionem statim subsequitur infans in naturali partu, qui si diutius remoretur, partus difficultatem summam efficit.

Dolor & anxietas.

Aqua serosa humorum ante partum profusus.

Dolor parturientium ubi cessaverit, fatum imbecillum & uteri expulsi vim facultatem prostratam arguit. Post paucas enim horas hic dolor recurrit. Verum ubi totum cessent hi dolores, nec post multas horas redeant, & parturientibus oscitationes, pandiculationes & horrores superveniant, certissima sunt indicia fatum in utero extinctum esse.

Doloris cessatio, malum. Indicia fati extincti in utero.

Ut vero parturientium dolor ob fatus aut expulsi vim virtutis imbecillitatem intermissus excitetur, utilissimum est parturienti 3 r. pseudo chamedrios, quæ herba cum cæruleis flosculis in vepretis nascitur, quam nostrates *Tophtraut* vocant, vel etiam verichamedrios cum haustulo vini propinare; statim enim, ubi non est extinctus fatus, dolores parturientium rursus excitantur.

Dolores partus quibus renovandi.

Affligunt autem potiss. parturientes & puerperas hæc symptomata.

Partus difficultas.

Secundinæ in utero retentio.

Q 9 9

Fatus

Tertium.

pone Venetiano confecta, & ol. chamæm. imbuta. Tertio exploret obstetrix mitissima contrectatione manuum ol. liliaceo calente inunctarum, utrum uteri osculum sit apertum; quod si patet, colloce gravidam in subfelliū conveniens aut pulvinare, & subinde illiniat lumbos & pudenda parturientis pinguedine gallinarum aut ol. liliaceo.

Quartum.

Quarto si obstetrix deprehenderit fætum non naturali situ ad exitum properare, manibus molliſſ. dirigat, retrudat & attrahat eoſque, donec ſitum naturalem nanciscatur.

Quintum.

Quinto si membranae fætum involvences craſſiores extiterint, & ex calcitracione fætus rumpi nequeant, apprehenſas vel unguibus læceret, vel forcipe incidat. Sexto si vero ob earum membranarum tenuitatem citius quam par eſt rumpantur, & aqua in eis contenta effluat, antequam fætus ad exitum commoveatur, tum utero inſundenda erit mucago ex rad. Alth. & Fœnugræci confecta: aut ol. liliac. alb. tepidum: & ita mitiſſime infantem prodeuntem excipiat.

Parturientem quid facere debeat.

Gravidam autem parturientem 1. Forti animo eſſe oportet. 2. Et omnem ſpem in benignitatem Dei paternam collocare, perſuaſumque habere, Deum in hiſce anguſtiis opitularurum, & ſuam creaturam conſervaturum. 3. Tandem obediat ſedulo obſtetrici, adminiſtrantibusque mulierculis. 4. Atque ſtrenuè enitatur, monente obſtetrice, ad expellendum fætum ſpiritum detinendo & ad inguina depellendo. *Intempeſtivè enim ſi id fiat, irritus labor eſt, & vires ſolummodo atterit, ſed aperiente ſe utero, non cunctandum, ſed Natura ſubvenien- dum omni conatu. Qua in re ſæpe peccatur ab obſtetricibus nimis citò urgentibus ad e- nitendi conatum. Commodiſſimè autem & ſtemutatio per elleborum aut piper naribus inditum inter parturiendum excitari poteſt. Exigente nempe neceſſitate, & Natura quieſcente ultra tempus, ut fætus eò citiùs propellatur.*

Remedia partum facilitantia.

Remedia porro cum Topica & foris applicanda tum intra corpus aſſumenda, quæ difficultatem partus facilem reddunt, hæc

ſunt præcipua. Specifica proprietate partum facilem reddunt, lapis Aëtites, Smaragdus & Jaspis & corallia rubra, & herba viridis coriandri, & rad. polygonii contrita, & arthemifia contuſa, cruribus alligata. Intra corpus vero plurimum facit ad alleviandum partum, ſi pauxillum nidi hîrundinacei in aq. coquatur & conteratur ac percolatum ebibatur. Commendatur & aq. ſtillat. verbenæ, ſi ejus ʒ iiii, aut iiii. exhibeantur. Ineffabili experientia compertum eſt, facilem fieri partum ſi ʒ i. ſeq. pulviſculi cum aq. menthæ aut chamæm. ebibatur. ʒ. Boracis ʒ s. croci, ſucc. albi an. ʒ s. fiat pul. tenuiſſ. aut ʒ ii. ol. lauri cum juſculo cicerum epota. Idem præſtant & pill. ex Aſa fatida conformata ʒ s. Utiliter quoque exhibetur pul. Buſæ paſtoris ʒ i. cum vino, aut ʒ. Troch. è myrtha ʒ s. croci gr. v. cinamom. ʒ s, fiat pulvis & ebibatur cum hauſt. aq. Arthem. aut pulegii. aut ʒ. Gummi Bdellii, Myrrhæ, bacc. Sabinæ, caſtor. Agar. an. ʒ s. Diagrid. gr. vi. cinamom. ʒ s, fiat pulvis & ebibatur cum hauſt. aq. Arthemif. aut pulegii, aut ʒ. Gummi Bdellii, Myrrhæ, ſem. Sabinæ, caſtor. Agar. an. ʒ s. Diagrid. gr. vi. ſtyrac. liq. ʒ s. formentur pill. cum pulpa caſſ. ciceris magnitudine, quarum ʒ i. exhibeatur. Præſtat quoque ii. cochlearia aq. cinamomi exhibere. *Vel ol. Cinam. g. ii. vel iii. cum aq. lavendula, vel ol. ſuccini g. vii. vel ix. cum aq. ſabina vel verbenæ, quod potentiſſ. propellit fætum. Obſervandum tamen hac cauè admodum exhibenda, præſertim ubi fætus naturaliter adhuc conſtitutus eſt, ne ei validioribus hiſce pharmacs noceamus. Vbi autem ſuſpicio eſt fætus mortuus vel aliàs malè diſpoſitus, tuto exhiberi poſſunt. Sabinæ enim teſte Galeno partum virum enecat, mortuum expellit. Et ſæpe abſque omni cauſa præter rationem hiſce remediis admodum torquentur ab imprudentioribus mulierculis parturientes, cum ſatiùs eſſet, baſamo puerorum ſupra dicto, vel hauſtulo vini matrem & fætum roborare, & ſic firma cum*

Intra corpus exhibenda.

Vide Conſil. 363. Cratonis, ubi plura talia recenset.

Pulvis utiſſimus.

Pulveres alii ſatis fortes.

Luteum etiam li- ſiorum al- borum ex- hibitum cum aq. verbenæ, valde prædeſt.

Cautè fætum ex- pellentia exhibenda.

fiducia auxilium divinum expectare. In casu autem necessitatis, hæc & similia, summa tamen cum prudentia, nec coarctatim, propinari possunt.

3. Secundina sive membranarum fatum involventium in utero post partum detentio quid, ex quibus causis contingit, & qua ratione expelli extrahique debet?

Secundina quid. Τὸ ἑπομένον ἐν τῷ ὕδατι. Secundina in utero remansio. Die Nachgeburth.

Secundina, est tertia & extrema fatus tunica, venis & arteriis à Cotyledonibus pronatis conspersa eisque connexa, quæ & umbilico infantis per vasa umbilici adhærescit, & quæ in naturali partu semper cum fætu excutitur: in præternaturali autem partu non nunquam post fætum enixum intra matricem remanet. Causæ autem detentionis hujus pelliculæ in utero αἰτίας sunt matricis imbecillitas in partu, & virium expulivarum resolutio in matrice, valida connexio hujus membranæ cum Cotyledon. uteri, convolutio ejusdem ex calcitracione infantis, & in aliquam partem uteri detrusio, item repentina oclusio orificii uterini, & nimia exsiccatio uteri à partu, & tumor cervicis uteri ex difficultate partus.

Signa. Signa retentionis Secundinæ obstetrici manifesta sunt. Debet enim diligentissime ea observare, an secundina etiam integra cum fætu prodeat. nam vel minima ejus particula relicta, vita periculum inducere potest.

Prognosticon. Prognosticon notabile est. Relicta in utero Secundina, nisi maturè expellatur, brevi tempore putrescit, & suo tetro halitu Diaphragma, cor, Ventric. & cerebrum inficit, & perniciofa symptomata, veluti sunt strangulatio uterina, respirationis difficultas & animi deliquium, miseris mulierculis infert.

Curatio. Curatio consistit in causarum ablatione & emendatione, & relicta secundinæ vel discussione, vel artificiosa extractione. Si itaque puerpera post enixum fætum secundinam discutere nequeat ob virium imbe-

cillitatem & virtutis expulsiuæ debilitatem, primum convenientibus alimentis, veluti sunt juscula ex vino optimo & luteis ovorum, aut ex confusis pullis perdicibusque confectis, & pane vino cretico imbuto ac comesto restauretur & corroboretur, ac tandem puerpera spiritum cohibendo expellendæ membranæ adnitatur.

At vero si desiccata fuerit cervix uteri, aut propter tumorem angustior reddita, tum præstabit emollientibus lubricantibusque pharmacis, qualia sunt ping. Gallinarum, Anat. & Anserum & ol. liliac. & amygd. & mucaginib. rad. Alth. & Fænu-graci tumorem uterum inungere & locellis uteri infundere, uterique cervicem humectare ac dilatare, aut fomento ex herba radicibusque Malvæ & Alth. in aq. decoctis intra cervicem uteri infundere, aut easdem herbas in sacculum consutas & decoctas tumenti loco imponere aut earum vaporem per canalem intra uterum recipere, aut vaporem seq. herbarum eadem ratione intra uterum recipere.

℞. Artemis. Marrubii, Abrotani, Puleg. Scord. ana M. r. Concisa in q. s. aq. coquantur & subjiciantur. Quin probè quoque eliciunt secundinam in utero retentam odorati suffitus ex Gallia moschata, Ambra, & Moscho-ignitis carbonibus inspersis, & fumo intra uterum recepto, verum in hujusmodi odoratis suffumigiis, cavendum est sedulo ne fumi hæres feriant. Tum enim uteris ad suaves odores sursum elevatur & labores facit. Ideo præstiterit tum naribus fatida quæque applicare, veluti sunt Asa fatida, castoreum, fumi incensarum-plumarum aut veterum calceorum igni injectorum.

Intra corpus vero assumenda sunt ad secundinæ expulsionem 9. gr. Juniperi contrita. aut ʒ ii. Galbani contriti cum vini haust. & vinum in quo puleg. est coctum.

Dum hæc aguntur, puerpera subinde enitatur spiritum comprimendo, & secundinam deorsum pellendo. Proderit eodem tempore & momentum pul. Ellebo. albi aut piperis aut majoranæ singula aut simul mixta narib. indere ac sternutationem excitare.

Ubi

Emollientia & lubricantia.

Fomentatio.

Suffitus pro utero.

Cautela.

Secundina contrita nam ex-pellens.

Sternutationes.

Ubi vero ea ratione commodè expellitur secundina, tum ol. rosac. tepidum per siphonem ad doloris mitigationem infundatur.

Verum si tenacius hæreat secundina, iisdemque remediis propelli nequeat, tum ejus particula, quæ ex umbilico infantis prognati est abscissa, obstetricis digitis apprehendatur, filoque serico alligetur & molissimè subtrahatur, hinc inde agitando, ut sine dolore & uteri offensione extrahi queat, quæ si tractionem sponte non sequatur, violenter minimè trahenda est, sed sericum filum crurib. est alligandum per aliquot horas, & iterum attractio molienda.

Protractio per obstetricem.
Seq. autem pulv. ʒ i. cum vino generoso bibita præclare expellit secundinam.

Pulvis secundinam expellens singularis.
℞. Castor. Myrihæ, styriæ liq. ana ꝑ i. Cinam. & aristol. rot. an. ʒ s. Agar. Troch. ʒ s. Diagr. gr. v. croci, sileris montani, sabinæ an. gr. iiii. Opii Thebaici, Asæ fetidæ anagr. vi. fiat. pul. tenuiss.

Reliqua remed. genera secundinæ expulsionis opitulantiæ ex seq. curatione fætus mortui in utero, huc accommodari possunt.

4. *Fætus in utero extincti Causa quæ, quæ signa & quomodo expellendus?*

Fætus mortuus quid.
Εκνοῦντος fætus mortuus vitæque privatus. Sæpe extinguitur in utero fætus, maximè tempore pariendi in partusque difficultate, qui nisi ex utero ocys expellatur aut eximatur, præsentissimum exitium & prægnanti infert.

Causa.
Causæ extinctionis in utero fætus multiplices sunt tum internæ, tum externæ, inter quas αἰτιασάρας præcipuæ sunt difficultas partus, ubi longa enixionis mora, ut quando parturiens per tres vel quatuor dies laborat, intervenit. Difficultatis autem pariendi causas paulo ante commemoravimus. Περικνησάρας sunt metus & consternatio repentina, obstetricis imprudens chirurgia circa extractionem fætus, & violentorum reme-

diorum ante & inter parturiendum exhibitio. *Casus item ex alio, contusio ventris gravida, defectus alimenti fætus ex nimio profusio sanguinis, calor præternaturalis in febrilis, vel morbi maligni & aliæ fætui noxiæ.* Sæpe etiam dum nimis & inordinatè fætus movetur, suffocatio succedit, involvente se fætum in ductum umbilicalem, ut vitalem spiritum ex arteriis uteri haurire nequeat, atque tum ductus umbilicalis exarescit, uti experientia testatur.

Signa.
Signa fætum in utero extinctum esse ostendentia sunt, si prægnans ambas manus in calentem aquam imponat, in eaque aliquandiu teneat, fætumque non sentiat, mortuum esse docet. Doloris parturientium in totum intermissio, est signum intermortui fætus, præsertim si superveniat horror & pandiculatio. Tum enim non amplius se commovere potest fætus: Item moles in utero frigidior & gravior persentiscitur, quam dum viveret fætus, & reclinante matre ex uno in alterum latus, fætus instar lapidis convolvitur. Ubi fætus in utero extinctus est, tum oculi gravidarum excavantur, & facies & totum corpus fædo colore expallefcit, & ipsa continua stranguria & tenesmo & insomniis infestatur. Si fætus mortuus ante tertium diem non eximatur expellaturque, subsequitur corruptio, & gravida tetrum respirat odorem.

Prognostica.
Prognostica in fætu mortuo in utero remanente. Si fætu mortuo parturiens crebro in animi deliquium incidat, & acclamantibus nihil respondeat, nec oculos attollat, aut si crebro spasmo corripiatur, omneque alimentum aversetur, interibit & ipsa unà cum fætu; si vero viribus constet, & alimentum admitat, & jussis astantium obtemperet, bona spes est eam evasuram, quare danda est opera, ut quam celerimè ab emortuo pondere ac cadavere ipsa liberetur.

Curatio.
Curatio sive expulsio emortui fætus duplici ratione perficitur, nimirum violenter expellentibus elicientibusque remediis, & chirurgicis extractionibus. Quantum ad remedia attinet, quibus fætus extinctus

elici expellique debeat, hac ratione institui debet curatio. Initio si vires ferant collo-
canda est mulier in solium seu lavacrum in
quo seq. herbæ sint incōctæ.

Lava-
crum.

℥. Flor. chamæm. Abrotani, parietar.
puleg. Arthemisæ, Bethon. Malv. cum
rad. Sabinæ an. M. ii. Rad. Bryoniæ
Aristol. long. filicis an. ʒ ii. sem. fæ-
nugræci, lini, an. M. iii. Concisa &
contusa coquantur in tanta q. aquæ ut
mulier usque ad umbilicum insidere
queat. Aut si balneum perferre ne-
queat, consuantur eadem herbæ in
sacculum, & in cerevisia concoquan-
tur & imo Ventrī ac lumbis circum-
ponantur. Tandem inungatur puden-
dum mulieris & totus Venter ol. lil.
& subjiaciatur suffitus seu fumus re-
rum fætidarum, qualis est fumus un-
gulæ equi, aut Vegeris calcei carbo-
nibus ignitis impositi: aut excitetur
fumus sequent. Trochiscis, & per ca-
nalem in uterum recipiatur.

Sacculus.

Trochisci
pro fumo.

℥. Vernationem serpentis unam, Myr-
rhæ, Castor. an. ʒ i. Rubæ tin-
ctorum, stercoreis columbini an. ʒ ii.
Contusis omnibus cum felle bubalo
q. s. redigantur in Trochiscos,
& carbonibus ignitis imponan-
tur.

Pulvis fa-
tum mor-
tuum pro-
pellens.

Intra corpus verò, si vires non sunt o-
mnino prostratæ; commodè exhiberi po-
test ʒ i. seq. pul. cum haustu vini, in quo
sabina est decocta, ℥. Asæ fætida ʒ s. sa-
binæ, Rutæ, Myrrhæ an. ʒ ii. redigan-
tur in tenuiss. pulverem. ʒ ii. quoque
Galbani aut Asæ fætida cum lacte alterius
mulieris resolutæ ac bibita expellunt fæ-
tum mortuum. Similiter & ʒ i. seq. pulv.
cum haustu vini in quo puleg. & sabina sunt
cocta ebibita potenter fætum mortuum ex-
pellit, ℥. Sabinæ, Diptami Cretici, Rad.
filicis, Boracis an. ʒ i. Asphalti ʒ i. mi-
sceantur fiat tenuiss. pulvis.

In aridi-
tate uteri
quæ conve-
niant.

Si vero ob ariditatem uteri fætus mortuus
difficultè expelli queat, tum mulier bibat
vini haustum in quo sabina, origa. puleg.
an. p. i. & sem. fænugræci & rad. malvæ an.

ʒ ii. & ficuum n. iii. sunt incōctæ. In u-
terum vero infundatur ol. lil. alb. Validissi-
mè autem attrahit fætum mortuum seq.
pessus cervici uteri insertus.

Pessus.

℥. Gummi Ammon. Opopa. Asphalti
an. ʒ i. elleb. nigri. staphidisag. Ari-
stol. long. pulpæ colocinth. an. ʒ s.
scamo. ʒ i.

Ex quibus simul mixtis cum q. s. fellis
bubuli conformetur massa & lanæ xylinæ
involvatur, sindoneque obrecta & in tepi-
do succo rutæ aut felle bubalo imbuta ute-
ro inferatur. Porro ubi his remed. fætus
mortuus expelli elicique nequit, tum ad
miserabilem illam carnificinam, ut mater
salva conservari queat, confugiendum e-
rit, & cadaver fætus, forcipibus, cultris &
aliis ferreis instrumentis frustulatum inci-
dendum, & uncis convenientibus sensim
extrahendum, sine tamen læsione uteri, à
perita obstetrice vel chirurgo. *Quæ de re
videatur Pareus l. 23. chirurg. c. 26.*

Extractio
fætus mor-
tuum chi-
rurgica.

Observandum quoque hoc loco erit, si Mater ex-
mater, vivente in utero fætui, antequam in
lucem edatur, emoriatur, tum statim os
gravidæ mortuæ aperiatur, ut fætus liberius
aërem haurire queat, ac deinde alterutrum
latus imi Ventrīs recto vulnere novacula
aperiendum, & deinde ipsa matrix inci-
denda venit, & infans vivus molliter exi-
mendus. Qui autem ita nasci consueve-
runt infantes, à veteribus Cæsares nomi-
nabantur. *Vide Roussetum de Partu Cæ-
sareo.*

5. Sanguinis ex utero immoderata post
partum defluxio quomodo
curanda?

Χορὸν υπερχύσεως sive ἀμφοτέρωθεν ὁ Sanguis
ὑπερὸς μετὰ δυσκοίαν nimia sanguinis deflu-
xio post partum. Crebro accidit puerperis, qua de
ut ex uteri Cotyledonibus dilatatis ex avul-
sione fibrarum venosarum, quibus connexæ erant cum secundina, sanguis justo im-
moderatus profluat, adeo ut nisi tempesti-
vè cohibeatur, vires prosternat, & in ani-
mi deliquium conjiciat, cujus symptomatis
curatio hac ratione instituenda est.

qua de
causa post
partum
immodicè
profluat.

Ini-

Curatio.

Initio dolorifica ligatio brachiis est adhibenda, & cucurbitulæ grandiores, sine tamen scarificatione, subinde infra mammæ sunt affigendæ, ut nimirum sanguis ad superiora convertatur. Imo autem Ventri imponatur sacculus ex seq. herbis concinnatus.

Sacculus
fluxum
sanguinis
cohibens.

℥. Corrig. Plantag. Amaran. purpurei, Rosa. rub. an. M. ii. Balauft. Cortic. granat. Gallarum an. ʒ i. Acatix ʒ s. Contund. contusis, & concidend. concisis in sacculum Ventri adaptatum insuantur intersuanturque & in vino rubeo austero decoquantur, & expressa subindeque in eodem jusculo recalefacta Ventri imponantur. Ante verò sacculi applicationem exhibeatur ʒ i. seq. pulvisc. cum vino rub.

Pulvis
re-
strictivus.

℥. Cornu cervi usti & præpa. pulv. corticis citri ana ʒ s. Troch. è Cærabæ, pul. Acatix an. ʒ ii. Commise. fiat tenuiss. pulvis.

Reliqua remediorum genera ad compescendum fluorem uteri facientia huc transferri possunt ex curatione superfluum mensium in superioribus tradita.

6. Sanguinis in utero post partum retentionis Causa & signa quæ, & quomodo provocandus?

Qualis
sanguis
post par-
tum eva-
cuetur.

Ἐποχὴ τῆς λοχείας ἢ καθάρσεως τῆς μήτρας μετὰ τὴν δύσκειαν. Cessatio purgationis uterinæ à partu. Magna copia sanguinolentæ colluviei colligitur in capacitate uteri à partu, tum ex Cötyledonibus, tum ex ruptis secundinæ venis eo confluentibus, quæ secundum naturam statim à partu ex utero profluere consuevit, veluti menstruus sanguis. At si talis colluvies diutius moretur in capacitate uteri, in grumos coalescit, deinde putrescit, & varia ac perniciosissima symptomata, veluti Ventris tumorem, strangulationem uterinam, animi deliquium, febres & ulcerationes infert.

Causa.

Causæ ἀσθενείας sunt expulsivæ facultatis uteri prostratio, & lentor crassitiesque colluviei. Περὶ τῆς αἰτίας causa est ut plurimum pedum refrigeratio inter pariendum.

Signa obstetrici & ministris mulierculis signa sunt manifesta.

Curatio consistit in ejus colluviei suppressione ac provocatione; sed singulari judicio ac prudentia opus est, ne per medicamenta vehementia, nimium concitetur defluxio, Vel calor præternaturalis exciterur. Semper itaque medicatio à levioribus inchoanda est. Primum itaque sufficit in potu puerperæ nodulum seq. imponere, & ubi voluerit eum exprimere.

℥. Sefeli cretici sive sileris montani ʒ i. cymini præparati ʒ s. Croci ʒ i. Cæstor. ʒ s. misceantur & colligantur in sindone, fiat nodulus.

Pulvis
Lochia
pro-
vocans.

Rad. Zedoaria etiam in pulvere exhibitæ valde prodest.

Ea ratione si non procedat fluxus colluviei, commodè exhiberi potest ʒ i. Troch. è myrrha, cum haustu vini tepidi.

Et si nec hac ratione discutiat colluvies, & jam grumos concrevisse sit certum, tum ejus resolvendi causa applicetur sacculus ex seq. herb. confectus.

Si grumi concreverint, quid agendum. Sacculus.

℥. Malvæ. Alth. Flor. chamæm. puleg. calam. Bethon. Arthemis. an. M. ii. Flor. lupuli M. i. Concisa in sacculo confuantur & intersuta cum q. s. aq. & aceti æ. p. mixtis decoquantur, & expressa subindeque recalefacta imo Ventri imponantur, & tum utile est sternutationem excitare momento piperis aut ellebori albi naribus inserto. Commodè & gurt. v. Olei vitrioli ante sacculi applicationem exhiberi possunt; & si ferant vires, corpusque sit plethoricum, vena talaris commodè incidi potest. Quin & industria obstetricis, chirurgica apertione sanguis in grumos concretus quoque eximi poterit. Huc referri possunt quæ supra in curatione suppressorum mensium proposuimus. pag. 470.

Sternutamenta.

Vena scrotalis.

Exemptio sanguinis grumosi.

7. Inflatio seu intumescencia Ventræ à partu quas habet causas, & quomodo curanda?

Διδόκωσις τῆς γαστρός μετὰ τὴν δύσκειαν, Inflatio Ventræ à partu intumescencia. Intumescit ventris non raro Venter à partu, non secus ac in hydrope,

hydropes, & hinc ut plurimum hic tumor hydrops uterinus censetur.

Causa. Causa ejus ἀσυνεργία Retentio sanguinis in utero post partum. ἀσυνεργία sunt frig. potiones in puerperio, quæ ut plurimum flatu distendentes in utero excitant, & pedum genitaliumque refrigeratio in partu.

Differentia. Signa sunt manifesta. Intumescit enim Venter nonnunquam duro, quandoque laxo tumore.

Curatio. Curatur internis & externis remediis. Initio si vires ferant totum corpus purgetur 3 r. pill. de hiera cum Agarico, cui adjecta sint gr. v. Diagrid. Deinde & in victus ratione & in medicatione adhibeantur, quæ flatu discutiunt, & serosos humores absument. Subinde itaque alimenta cymino, cinamomo, macere & croco condiantur. In medicatione autem, si ab sit febris, commodè exhiberi possunt, 3 ii. Ther. Andr. in haust. vini resolutæ. Et præstat sing. quoque diebus tum ante cenam tum ante prandium ii. rot. diacymini aut Diagonalæ devorare, aut gutt. vii. ol. cymini quotidie cum trib. cochlearibus vini ebibere. Aut utatur puerpera in jusculo cerevisiario mixto, ℥. Cymini præparati, zedoar. an. 3 i. croci 3 s. puleg. origani, scordii an. 3 s. misce. fiat pulvis, cujus 3 i. pro vice exhibeatur.

Condimentum. Subinde itaque alimenta cymino, cinamomo, macere & croco condiantur. In medicatione autem, si ab sit febris, commodè exhiberi possunt, 3 ii. Ther. Andr. in haust. vini resolutæ. Et præstat sing. quoque diebus tum ante cenam tum ante prandium ii. rot. diacymini aut Diagonalæ devorare, aut gutt. vii. ol. cymini quotidie cum trib. cochlearibus vini ebibere. Aut utatur puerpera in jusculo cerevisiario mixto, ℥. Cymini præparati, zedoar. an. 3 i. croci 3 s. puleg. origani, scordii an. 3 s. misce. fiat pulvis, cujus 3 i. pro vice exhibeatur.

Pulvis utilis. Subinde itaque alimenta cymino, cinamomo, macere & croco condiantur. In medicatione autem, si ab sit febris, commodè exhiberi possunt, 3 ii. Ther. Andr. in haust. vini resolutæ. Et præstat sing. quoque diebus tum ante cenam tum ante prandium ii. rot. diacymini aut Diagonalæ devorare, aut gutt. vii. ol. cymini quotidie cum trib. cochlearibus vini ebibere. Aut utatur puerpera in jusculo cerevisiario mixto, ℥. Cymini præparati, zedoar. an. 3 i. croci 3 s. puleg. origani, scordii an. 3 s. misce. fiat pulvis, cujus 3 i. pro vice exhibeatur.

Topica. Foris vero utile erit Ventrem inflatum quotidie bis cum ol. Anethi cui parum ol. cymini sit admixtum inungere, & seq. sacculum in vino coctum & expressum tumenti Ventri imponere. ℥. Fol. Ebuli, flor. lupuli, rutæ, pulegii, artemis. calamint hæ, centaur. mino. Scordii an. M. ii. Bacc. lauri, cymini præpar. an. 3 ii. concidend. concisis & contund. contusis, fiat sacculus, qui in cerevisia aut vino coqui potest. Ex iisdem herbis ac speciebus lavacra, infusionesque commodè concinnari possunt. Plura remed. genera ex hydropis curatione huc transferri possunt.

Febris puerperarum. 8. Febris Puerperarum causa qua & quomodo curanda?

Πυρετός ἢ λόχος μετὰ τὴν δυσκολίαν febris puerperarum. Crebro à partu febribus cor-

ripiuntur puerperæ, cujus causæ ἀσυνεργία sunt, non ritè ac sufficienter colluviæ in utero collectæ post partum purgationes, & cruoris in utero concreti putrefactio. Περὶ τῆς ἀσυνεργίας sunt vitiosa victus ratio, ut frigida aq. aut lactis potitatio, aut piscium concoctusque difficilium post enixum factum esitatio.

Signa facile à quovis deprehendi possunt. *Signa.* Adest enim calor praternaturalis, pulsus creber & vehemens, urina rubea, dolor capitis, sitis continua, & virium prostratio, aliaque febris symptomata.

Curatio consistit in causerum ablatione. *Curatio.* Sed circumspicè remedia febriū mitigantia sunt adhibenda. Primum itaque si vires ferant, aut 3. x. pulpæ cast. aut 3. i. s. Manne in pinguioris gallinæ jusculo resolutis corpus purgetur, & si id plethor. sit, vena quoque talaris incidi commodè potest. In victus ratione puerpera cremore ptisanæ, aut aqua hordei, actu tamen calida, in qua cinam. & Thamarindi sint incocti, utatur. Spina dorsī & epatis regio inungatur seq. linimento.

℥. Ol. rosar. Nymph. cyton. an. 3 ii. Linimentum pro epate & dorso. Ceræ albæ parum, fiat linimentum, cui admisce mucag. sem. psylli cum aceto rosar. factam. Cordi vero & carpi manuum seq. Epith. applicetur.

℥. Aq. rosar. plantag. acetosæ an. 3 ii. Epithema. Meliss. Borrag. an. 3 i. Aceri rosar. 3 i. s. spec. Diamarg. frigid. Diatrion. santal. an. 3 i. Commisc. fiat Epithema, quod linteolis exceptum applicetur.

Plura de curatione febrium libro undecimo Deo juvante dicturi sumus.

9. Recens Puerpera Quomodo tractanda?

Λόχος ἢ five ἀπὲρ τελέσει, Puerpera. Statim ubi peperit gravida in lectum mollem deducenda est, in eoque solito altius thoracè & capite q. sedens collocanda, & eo usque quies est imperanda, donec sanguinea colluviæ ex utero probè est purgata; fluorque ejus spontè cesser.

Diata.

Victus autem ratio debet constare ex alimentis actu semper calidis & probe corroborantibus, similiter & potus calidus semper est adhibendus, nec à vino ei interdicti debet. *Si nempe febris absit.* Fugiat omnia frigida cum actu tum potentia alimenta, & omnia concoctu difficilia, ut sunt lac, pisces,

olera, carnes suillæ & aliæ fumo saleque conditæ.

Post 14. dies in balneum deduci commodè poterit. Interim provideatur ne alvus ei sit obstructa, & si id ei contingat esu prunorum Ungaricorum & glandibus rursus emolliatur.

Balneum.

PRACTICÆ FRANCISCI JOELIS LIBER NONUS. DE INFANTUM ET PUERORUM MORBIS.

SECTIO I.

DE RECENTER NATI INFANTIS CURA AC EDUCATIONE.

i. Recens natus quomodo tractandus.

Umbilicus
à ligamen-
tis solven-
dus.



ῥέφθ' sive ἀρπυγῆς Infans & recens natus. Statim ubi in lucem prodit infans, ab ejus centro, quod est umbilicus, ligamenta quibus involucria fætus umbilico sunt alligata, & non sunt aliud, quam vasa umbilicalia, abscindenda sunt. Debet autem hoc ligamentum priusquam abscindatur vinculo ex serico aut lineo factio intercipi constringi ac ligari per trium digitorum latitudinem à corpore infantis, & ita exterior à ligatura pars abscindi, quod ligamentum paulo post, & ut plurimum quarto die decidit sponte: Et si ex resectione umbilicus sanguine madeat tenuiss. pul. vel Boli Armeni vel cretæ vel argillæ inspergi debet, & imponi oleum olivar. rec. aut butyrum salis expers linteolis exceptum donec consolidetur.

Sanguinem
sistentia
& consoli-
dantia.

Observatio
singularis
ex liga-
mentis
umbilicalibus.

Circa resectionem umbilici infantis id notatu dignum ab obstetricibus observatum est, si in ligamenti umbilicalis ea parte quæ corpori est proxima rugæ aut nodi compa- ruerint, quotquot ex fuerint, matri tot libe-

ros adhuc procreandos pollicentur, quibus si careant, & planum prius ligamentum, matrem sterilem & sine liberis per mansuram indicat, & si rugæ rubeæ extiterint, masculos, si albæ fæmellas generandas restare arguunt.

Obligato umbilico tenerum corpus infantuli aqua moderatè calida diligenter abluatur, & obstetrix inter lavandum digito minimo, quantum fieri potest, vias excrementorum ac in primis nares & anum levissimè dilatet, & ad excernendum excrementa incitet: deinde ad lentum ignem infantem calefaciat mollissimis que linteis abstergat, & omnes corporis partes & coarticulationes in rectum situm figuret, ac reponat, fasciisque involvat ac colliget, colligatumque in cunas reponat; Et hujusmodi quidem balneatio infantis, & configuratio artuum per unum & alterum mensem singulis diebus ad minimū bis reiteranda erit, & semper ab excretis sordibus emundandus. Neglecta enim regulari partium configuratione ac disposi-

Lava-
rium.Emunda-
rio & col-
ligatio in-
fantia.

R r

tione.

tione infantis, distortæ & deformes corporis partes nascuntur, & si diutius in excrementis humidioribus jaceant, ut plurimum exulcerantur.

*Instru-
menta sen-
sum ex-
tergenda.*

Quin & oculi & aures subinde tenuissimis linteolis aq. tepida aut lacte madefactis extergendæ & emundandæ veniunt, & vesicæ regio leniter demulcenda & ita ad urinæ expulsionem excitanda est, & inguina subinde ad ignem exiccanda veniunt, quod nisi fiat, putrescunt faciliè & exulcerantur.

*Repositio
in cunis.*

In cunis autem oblecto capite ponendus est infans, capite paulo sublimiori. Et lotio singulis diebus reiteranda est, semel ad minimum in die, & quidem semper à somno. Sed inter lavandum cavendum est, ne aq. in aures infantis influat.

*Somnus
quibus
concilie-
tur.*

Post lotionem infanti somnus conciliatur, quod his tribus remediis fieri docet Galenus, moderata cunatum agitatione, suavi modulatione, & papillarum ori insertione.

*Quoties
lactandus
infans.*

Semper autem à somno peracto, & simul à balneo nutriendus est infans lacte materno. Sed cavendum ne in initio ad tertium usque diem infans lac fugat maternum; sed alienum, donec colostrum id est lac concretum in mammis maternis vel emulsione vel exsuctione per organa vel instrumenta extractum sit.

*Nutritio
infantis
conve-
niens.*

Porro quod ad recens nati nutritionem attinet, primis præsertim quatuor mensibus convenientissimum alimentum est lac, postea vero & pappæ seu pulmentum liquidius ex micis panis simillacei minutim contriti, aut ex farina amyli & lacte vaccino confectum, adjecto non nihil sacchari, ori infantis inseri potest.

Pappæ.

*Lac ma-
ternum o-
ptimum.*

Inter omne lac autem ad alendum infantem est saluberrimum naturæque infantis accommodatissimum lac maternum, utpote ad quod infans in utero ipso jam dudum est assuefactus. Cum eo enim lacte ex uberibus matris simul & *στέγες* & mores maternos imbibit infans, nisi forte mater ad versa debilius valetudine sit adfecta, aut lacte prorsus destituta, aut papillas suctioni ineptas habeat, tum enim ex necessitate nutritrix est adhibenda.

Deligenda autem est nutritrix habitus in- *Nutrix*
culpati, ætate mediocri, succi plena, flo- *qualis eli-*
ridi coloris, mundicie studiosa, moribus *genda.*
honestæ, & ab omni voracitate & ebrietate aliena, quæ ad minimum bis peperit, & liberos suos educavit.

Principes autem mulieres & nobiliores *Scultitia*
opulentioresque matronæ, si integra fru- *& molli-*
antur valetudine, & ob falsam quorundam *ties fami-*
medicorum adulatoriam persuasionem, ut *narum*
si suos liberos lactent, formæ venustatem *suos infan-*
amittant, non tantum stultæ, sed & im- *tes lactare*
piæ agunt, quod suos liberos proprio & na- *negligen-*
tivo, ab opificeque ordinato alimento ipsæ *tium.*
nutrire negligant, quæ id mercedis inde re-
ferunt, quod primum illa dulcissima vo-
luptate, quam honestæ matres ex lactatio-
ne percipiunt, frustrentur; deinde quod

φειλοσπονία liberorum erga matres sensum im-
minuitur & extinguitur, ad alienamque nu-
tricem convertitur.

Lac autem quo infantes nutriuntur debet *Lac qualo*
esse inculpatum, & nulla vitiosa qualitate *esse debeat.*
imbutum. Tale autem est si substantia in-
ter tenue & crassum mediocri sit, & si un-
gui aut speculo terso ejus guttula instilletur,
non defluat, sed rotunda persistat, sitque
colore candidissimum, sapore dulcissimum
& odore jucundum.

Contra vero vitiosum est lac omne sero- *Vitiosum*
sum, aquosum crassum & caseosum. Co- *lac.*
lore autem si ad flavedinem vergat, bilis
flavæ miscellam continet, sapore autem a-
marum itidem arguit; subnigrum vero cæ-
ruleum & acidum, melancholici humoris
mixturam in se habet. Vitiosum quoque
est acre salsum, alienique saporis particeps. *Lactū vi-*
Ex vitiosa lactis qualitate faciliè constitutio *tiosum in-*
& ægritudo matris cognosci potest, & lac *commoda.*
omne vitiosum offendit & noxam infert in-
fantibus. Primum enim Ventriculum per-
turbat, tormina Ventris generat, alvum
concitatur, & alia symptomata infert, &
ex lacte tenui serosoque acquirunt infan-
tes omne genus scabiei, ex caseoso, al-
vi obstructions, appetentiæ prostratio-
nem & vomitiones, ex flavo & acri lac-
te, alvi fluxum & pustulas calidas, ex
aquo-

Vide l. 3. f. 3. q. 3. aquoso, flatus & tormina. Quibus autem remediis & lactis in uberibus penuria restituenda sit, & ejus vitiosa qualitas emendanda, supra inter mammarum morbidarum curationes indicavimus.

Quamdiu infans lactandus. Infantem per sesquiannum aut ad summum per biennium lactasse satis erit: & non sunt adhibendi uberibus infantes, ubi mater de-
nuo concepit, sed ab lactandi, ad solidioraque alimenta assuefaciendi.

2. *Quibus potissimum morbis infantes infestantur, & quomodo eos agrotare agnoscendum?*

Morbi ac symptomata, quibus infantes potissimum infestantur, hæc fere sunt:

Infantium symptomata & morbi præcipui.
Epilepsia.
Capitis ardor.
Capitis intumescencia.
Capitis ulcera.
Vigiliæ continuæ.
Somnia terrificæ.
Membrorum resolutio.
Strabismus.
Pterophthalmia.
Aurium purulenta fluxio.
Crebra stertutatio.
Dentitio dolorifica.
Aphthæ.
Ranulæ sub lingua.
Tonsillarum intumescencia.
Uvulæ elongatio.
Tussis, Asthma.
Stomachi intumescencia.
Vomitæ, singultus.
Ventris tormina.
Ventris inflatio.
Alvi constipatio.
Lumbrici.
Umbilici indecens magnitudo, Emi-
nentia vel excrescentia.

Calculus.

Urinæ difficultas.

Urinæ incontinentia.

Ramex.

Ani prolapsus.

Tenesmus.

Cutis excoꝛiatio.

Crusta, scabies.

Variolæ & morbilli.

Febris.

Corporis intumescencia.

Tabes sive macilentia.

Infantum vero cum salubrem tum adver- *Indicia a-*
sam valetudinem ostendunt coralli rubei *grota-*
collo pueri appensi, qui donec florido ru- *rum in-*
bore nitent, sanum esse infantem ostendunt, *fantium.*
si vero decolorentur pallidioresque reddan-
tur, affectum esse aliquo morbo infantem
arguunt.

Recitatorum morborum ac symptoma- *Quomodo*
tum causas & signa cum partim in superiori- *de inf. mor-*
bus commemoraverimus, partim in seq. tra- *bis agat.*
dituri simus, hic non apponemus, & satis
hoc loco esse judicavimus, exceptis paucis-
simorum explicationibus, si singulorum cu-
rationi unum & alterum remedii juvantis ge-
nus adjecerimus.

SECTIO II. DE INFANTIUM AFFECTIBUS CAPITIS.

1. *Epilepsia infantium unde & quomodo curanda?*

Επιληψία seu *πυλιν νόσος* comitialis *Epilepsia*
& puerorum morbus, accidit infanti- *in infanti-*
bus ut plurimum, vel ob cerebri humidam *bis unde.*
& frigidam intemperiem, vel ob vapores
ex inferioribus ascendentes & cerebrum vel-
licantes. Lumbrici enim in intestinis sese mo-
ventes vel sensiles eorum partes arrodentes,
Item lac vitiosum & acre, sæpè epilepsiam
excitant. Dentitio quoque difficilis, & mor-
bi febriles, uti & variola ac morbilli ubi
primum invadunt, haud raro hujus mali
causa sunt.

Arcent Epilepsiam infantium, smarag-
dus gemma, aut lapis in hirundinum Ven-
triculis circa oppositionem Lunæ & solis
dissectis repertus, aut ungula Alcis dextræ
pedis posterioris, aut viscus quercinus, &
radix pæoniæ collo appensa, aut in yola ma-

nus infantis complicato pugno retenta. Quin & ungula Alcis auriculæ sinistræ inserta, & cum ea titillatæ, paroxysmum Epilepticum aufert.

Intra corpus ori subinde aut Syr. de Cichor. aut è card. benedicto illinitus magnum adfert præsidium. Aut

Pulvis e-
gregius.

℥. Sem. pæon. n. ix. rad. pæon. visci quercini an. ʒ i. Cranii hominis suspensi, ungulæ Alcis an. ʒ ii. Cardamomi ʒ s. Moschi gr. vi.

Succinum
album
cum aq. fl.
tilia & ce-
raferum
nigrosum
iidem
valde ju-
vat, præ-
sertim in
calidis af-
fectibus.

Redigantur omnia in tenuissimum pulverem, & infanti Epilepsia laboranti in lunæ magnis mutationibus ejus pul. ʒ i. aut ʒ s. pro ætatis ratione cum aq. lavendulæ aut liliorum convallium exhibe, aut commisc. pul. cum syrup. è cichor. & subinde ori inferatur. Sal perlarum, & corallium etiam utiliter à Chymicis Neotericis exhibetur. Foris autem plurimum conducit cervicem & synciput aq. lavend. conficcare, vel oleo succini albi, quod efficacius paroxysmum tollit. In paroxysmo eximatur digito ex ore infantis pituita seu spuma, & si commode fieri potest, penna ol. imbuta ori inferatur, & infans ad vomitionem irritetur.

Vomit.

Vomitum enim sæpè jurvat, si malum est ex ventriculo.

2. Capitis infantium ardor unde oritur, & quibus remediis sedatur?

Ardor ca-
pitis quid.

Ardor capitis infantium aut puerorum Græcis Ζεφελαις, est membranarum cerebrum involventium præternaturalis calor, qui, si modum excedat, in ʒφελνδν transit & infantem tollit.

Signa.

Deprehenditur tactu ex syncipitis fervore, & rubedine aut flavedine faciei, ex vigilia & continua ejulatione.

Remedia.

Curatur refrigerantibus ut ℥. Ol. ros. unguent. popul. an. ʒ s. Alb. unius ovi, lactis ex sem. papav. albi cum aq. rosar. expressi ʒ ii. Subigantur ac probè commisceantur, fiat Epithema, quod duplicatis linteolis exceptum syncipiti circa coronalem suturam, temporibus & arteriis carpi applicetur: Aut eodem modo fiat pulmentum ex luteo ovi & instar catapl. locis prædictis imponatur, aut ℥. medullam cu-

Epithema.

curbitæ virescentis, & instar catapl. applicato. aut cucumerem recentem in crassas lamas concidito, & præscriptis locis imposito. Ex confusis foliis solatri cum aq. rosar. Conspergis fiat catapl. & imponatur. Mizaldus valde commendat catapl. ex fol. urticæ confusis adjecta q. f. popul. confectum temporibus syncipiti & carpo impositum. Observandum autem præscripta omnia actu quodam modo frigida admoventi esse, & subinde, antequam incallescant, renovanda. *Vi tamen diligenter cavendum, ne actuali frigidityte contrarium inducamus affectum, & infanti exitium creemus.*

Topica re-
frigeran-
tia.

Saccha-
rum ʒ
cum aq. fl.
tilia &
sambuci
applica-
tum repi-
dè, idem
prestat ef-
ficacius.

3. Capitis infantium intumescencia cum aquosa tum flatuosa unde, & quæ ejus sunt Remedia?

Intumescit nonnunquam cutis capitis infantium ex collectis inter cranium & cutem aut aquosis humiditatibus quod mæpitiū dūlum Græcis ὑδροκέφαλον dicitur, aut flatu- lentis spiritibus ibidem coacervatis, & ἐμφύσμη nominatur, quod crebro & adultis accidere consuevit, & vulgus magno errore credit futuras calvæ in hoc malo ab invicem dehiscere.

Intume-
scencia ca-
pitis du-
plex.

Aquosa.

Flatuosa.

Quæ ex aquosa quidem collectione sub cute oritur intumescencia, ea mollis est & cedemati similis: Ex flatibus autem durior magis, renitens & majori cum dolore.

Signa.

Curatur ὑδροκέφαλον per seq. remedia. Primum subinde sternutatio est excitanda, inserta radice Gentianæ naribus. Aut

Curatio
hydroce-
phali.

℥. Castor. rutæ, Major. an. ʒ i. Macis, Croci, an. ʒ s. saccati albi. ʒ s. Omnibus tenuiss. pulverisatis cum felle gruis conformentur Trochisci, instar lentis & excicentur, quorum unus singulis diebus una cum aq. rosar. dissolvatur, & naribus instilletur. Deinde universum caput inungatur quotidie bis sequent. linimento.

Trochisci
sternutato-
rii.
Linimen-
tum.

℥. Ol. Chamæm. ʒ i. ol. sulph. ʒ s. Commisc. post inunctionem imponatur lana calida, aut imponatur capiti infantis seq. Epithema.

Epithema.

℥. Sem.

℞. Sem. nasturcii tenuiss. pul. ʒ s. Aq. major. ʒ vi. Commisc. & calida lin-
teolis excepta imponantur. Aut capiti
applicetur seq. Emplastrum.

Empla-
strum.

℞. Origani, calaminthæ, sabinae, stæ-
chados, serpilli, Major, nucis cu-
pressi an. ʒ i. Cinam. nucis mosch.
Macis, cortic. citri an. ʒ i. Ol. lil.
è costo. an. ʒ vi. Cera q. s. Com-
misc. fiat Emplastrum.

Odora-
menta ex-
siccantia.

Utile erit & odoramenta exiccantia sub-
inde naribus admovere, quale ita parari po-
test.

℞. Castor. major. rutæ, nigellæ, an. ʒ s.
contusa colligentur in sindone, &
crebro naribus admoveantur.

Apertio
pericranii.

Hæc si non contulerint (est enim difficilis
curationis) præstat chirurgica industria a-
quam subtrahere, facta incisione, aut in
syncipite aut in fronte, aut hoc causticum
remed. syncipiti apponatur.

Vesicato-
rium.

℞. Rad. flammulæ ʒ i. canth. ʒ ii.
pulverata cum fermento & acri ace-
to conformentur in massulam & sin-
cipiti per plures horas imponantur.
Excitant enim vesiculas, quib. aper-
tis aqua profluit. Notandum autem
aquam subducendam esse sensum &
quasi exstillando.

Inflatio
capitis ut
curetur.

Porro si intumescencia capitis infantum
orta sit ex collectione statulentorum spiri-
tuum, quam Avicenna inflationem capitis
vocat, curatur remed. statum discutientibus
capiti infantis applicatis. Prodest itaque in-
fantulis lac præbere in quo cymini. præpar.
est maceratum & castoreum, capiti vero im-
ponatur mitra confecta ex sequentibus.

Cucupha.

℞. Cymini. præpat. ʒ i. Flor. anethi,
major. orig. an. M. i. Rorism. M. i. s.
Concisa insuantur mitræ.

Quin & quotidie inungatur caput seq.
oleis.

Linimen-
tum.

℞. Ol. Anethi, amygd. an. ʒ s. olei cy-
mini ʒ i. Commisc. fiat linimentum.

Experi-
mentum
singulare.

Adultis simul & puerulis si oriatur intumescencia ex flatibus præsentissimum re-
med. est caput conficcare alio cum urina in-
fantis commixto.

4. *Ulcera scabies qua Capitis Infantum
unde, & qua eorum sunt
Remedia?*

Duobus potissimum generibus crustosæ scabiei sive ulcerum afficiuntur capitula & facies infantum, sicca videlicet, quæ ex re-
torrida bile & melancholia adusta originem
ducit, & cum squamis decedit, & humida
quæ ex pituita & impuritate sanguinis obo-
ritur, & conficcata semper saniem exsu-
dat. Materia autem scabiei ex calore faci-
lè dignoscitur. Unum genus Græci *ἄχρης* Achores.
& Arabes saphatum nominant, quod ad sic-
cam scabiem refertur; Alterum Græcis *ῥέ-
ειος* id est favum vocatur, quod nimirum si-
cut in favo mel, ita in foraminibus cutis hu-
mor glutinosus melli similis continetur.
Nostrates mulierculæ hæc duo scabiei ge-
nera *den Erbgünd oder den bren-
nenden Gründ* vocant, & non tantum
in capite sed & in facie & aliis partibus acci-
dere solet.

Curatio consistit in emendatione lactis nutriticis cum bona victus ratione, & in To-
picorum remed. infantis capiti vel partibus
affectis applicatione.

Curatio.

In ulcere itaque humidioris & purulento primum pili capitis sunt subinde novacula
auferendi & sæpius caput lavandum lixivio
calido in quo incocta sunt fol. Myrtil. Rad.
lapatii, sem. lupini & lentium, ac post lo-
tionem sanies diligenter exprimenda & ab-
stergenda erit.

Lixi-
vium.

Si autem ardor cutis adsit, vel inflamma-
tio, cataplasma imponatur ex fol. salicis
aut lentibus palustribus aut fol. attriticis
contusis, & cum aq. rosar. conspersis, quæ
& dolorem mitigant, & saniem eliciunt.
Sublato hujusmodi catapl. inungatur sa-
niosa scabies leguminibus pisorum in ore
jejuno probè masticatorum, aut confice-
tur frustulo succidæ cum pisus cocto. Aut illi-
natur seq. unguento.

Catapla-
sma.

Nicotiana
famina fo-
lia impossi-
ta valde
quoque
profunt.

Vnguen-
tum.

℞. Cerussæ, litharg. an. ʒ v. Grano-
rum Mezerei ʒ ii. Lixivii ex ci-
nere vitis aut urticæ percolati, ol.
rosar. an. ʒ s. Lutei unius ovi in
duriciem assati & minutissimè

R. i. ʒ

con-

contriti. Omnibus probè commixtis fiat unguentum, & singulis diebus post ablutionem & expressionem scabiei, inungatur eo locus affectus.

*Experi-
mentum
singulare.*

Porro certissima experientia comprobatur est ad omnia genera scabiei in capitibus infantum plurimum opitulati camphoram, si super ferrum candens aduratur & in pul. redigatur, & scabiei inspergatur, aut cum pinguedine veteri suilla commisceatur & capiti inungatur, aut abluatur crusta capitis tepida aqua, in qua incocta sunt mentastr. majoran. Thymus & satureja, ac deinde pilis abradis inungatur seq. linimento, ℞. Litharg. Cerussæ an. 3 i. Flor. sulphur. hydrarg. in saliva jejuni hominis extincti an. 3 i. omnibus tenuiss. pulveratis cum q. s. ol. rosaceo commisc. diutissimeque in mortario agitentur, & in unguenti formam reducuntur, quo scabies inungatur.

*Lotio capi-
tis.*

*Unguen-
tum.*

*In sicca
scabie qua
adhiben-
da.*

Si vero arida fuerit scabies, & cum squamis decidat, pili abradantur & caput lavetur aq. calida in qua decocta sint fumus terræ, beta, chamæm. thymus, & Epithym. & rad. elleb. nigri, & tandem ex præscriptis unguentis, uno, quod ulceri accommodatum maximè videbitur, subinde inungatur.

*Vernicis
usus in sca-
bie.*

Si vero crusta vel in capite vel in facie infans tenaciter hæreat, præsentiss. remedium erit vernicem pictorum linteolis instar Emplastri illitum scabiei imponere subindeque renovare. Lapis item medicamentosus Crollii in aqua nicotiana dissolutus, & impositus vel inunctus valdè juvat.

5. Vigilia continua puerorum unde & qua earum sunt remedia?

Somnus infantulis secundum naturam est. Vigiliæ autem ubi modum excedunt, valde sunt noxiæ, & parentibus molestæ. Pueri enim vigilantes indefinenter vagiunt. Longæ vigiliæ itaque ut plurimum à mala acri & calida qualitate lactis nutricis, aut nimia ejus copia ingestionevè, aut dolorificis symptomatibus infantum, oboriri solent.

*Causa vi-
giliarum
continua-
rum.*

Curatio consistit in causarum sublatio- *Curatio.*

ne, & ipsis infantibus remediorum somniferorum exhibitione & applicatione. Prava itaque lactis nutricis qualitas primum emendanda est. Deinde doloris causa removenda, & linteola lectisterniaque infantis quam mundissima substernenda. Atque si adsit, ut plerunque adest, in vigiliis continuis siccitas cerebri, quod faciliè ex signisprehenditur, tum linteolum mundissimum frigida aq. madefactum & expressum supra caput infantis, interposito lingeo semicirculo, expandatur. Naribus autem infantuli ol. viol. cum pauxillo succo lactucæ commixtum illiniatur. Tempora vero inungantur unguento populino, cui gutt. aliquot aceti rosarum sint admixtæ. Quod si vero quis illud unguentum magis soporificum esse cupiat, 3 i. unguenti popul. admisceat tria gr. opii cum aceti rosarum exiguo ad lentum ignem resoluta. Aut applicetur temporibus & syn-

*Siccitas
cerebri re-
media.*

*Unguen-
tum som-
niferum.*

Epithema.

*Catapla-
tis.*

Manus pedesque infantis aq. calida, in qua capita papav. cum sem. sunt cocta, autè fo-
mnum abluere utilissimum est. Intra os vero non erit inutile syr. è papav. aut viola. ori-
infantis subinde illinitre. Aut gr. i. vel ii. *Laudani opiatii in lacte dissolvere & pro ra-
tione atatis pueri exhibere.*

*Suffimi-
gium quo-
que ex
thure, ma-
stice & ab-
sinthio u-
tiliter in
hoc casu
adhibetur.*

6. Pavores seu somnia terrifica infantium unde & quibus Remediis curantur?

Sæpè expavescunt & cum tremore excitantur infantes è somno, quod malum ut plurimum in infantibus comitari solet Epilepsia, & tunc in somno contingit infantibus ut plurimum, quando calidis affectionibus, veluti sunt febriculæ, morbilli &c. derinentur. Maximè autem ex corruptione lactis & alimenti in Ventriculo, unde halitus fetidus & teret vapor ad cerebrum exha-

*Causa ex-
pavescen-
tium in som-
no.*

exhalat: Hinc plerunque infantibus ex ore fætidus halitus persentiscitur. *Lumbrici quoque hoc malum sæpè excitare solent.*

Curatio. Curatio in emendatione lactis, & ne nimia copia alimenti Ventriculus gravetur, consistit. Quare cavendum ne parvuli terribico somno laborantes pleno Ventriculo cubitum deferantur aut indormiant, sed eo usque gestentur, donec & concoctio prius sit peracta, & os Ventric. occlusum. At si adsit calida aliqua affectio, à lactatione aut sumpto alimento, præstiterit ori infantis nonnihil mellis purificati illinire.

Inunctio ventriculi. Quin & orificium Ventric. ol. cyton. & masticis an. 3. i. cum ol. nuc. mosc. expr. 3. s. simul mixtis inungere non erit inutile. Ante vero somnum iotulam t. Diamosci cum lacte solutam infanti ingerere utiliss. est, & si absit præternaturalis calor, per septimanam simul 3. i. Theriacæ Andr. Sed si pavoris causa sit vel febricula vel alia calida corpusculi affectio, ejus curatio ex propriis locis petenda erit. *Lumbricis quoque sua, quæ infra proponuntur, remedia opponenda.*

7. Resolutio nervorum aut impeditus motus infantium unde & quæ ejus sunt remedia?

Paralysis infantium unde exci- tiatur. Παρεσθλωση, nervorum resolutio, nostris **die Thambheit oder der Schlag.** Sæpenumero resolvuntur nervi in articulis puerorum, in quibus vis motiva impeditur. Notum autem est nervorum omnium originem aut cerebrum, aut ejus rivulum spinalem medullam esse, quorum initia si crassis humoribus obstruantur, intercipiuntur spiritus animales, & sic impeditur motus membrorum. Porro resolutio fit vel in toto corpore, vel in quibusdam membris tantum.

Differen- tia. Curatio. Curatio consistit primum in lactis nutricis emendatione. Emendatur autem lac Victus ratione calefaciente & extenuante. Abstineat itaque nutrix ab omnibus refrigerantibus & pituitam generantibus alimentis, veluti sunt pisces, lacticia, carnes fumo duratæ aut sale maceratæ.

Lavacrum pro infan- te. Infans autem singulis diebus lavetur bis aq. calida, in qua incocta sunt frondes Juni-

peri, fol. rorismar. sum aquat. nascunt. aquaticum, bethon. serpill. rad. Valer. pimpinel. &c. Aut in qua cocta sunt sem. & flor. ex fano prateni excussi **Hewsamem.**

Post lotionem & absterfionem infantis, *Frictiones & inun- ctiones.* confricentur membra resoluta. Et si manus sunt resolutæ, cervix, si vero pedes, lumbi & spina dors. Et inungantur ol. de castoreo, & ol. lumbricorum terrestr. cui nonnihil aq. Juniperi sit admixtum.

Celebre est & seq. Elect. 3. i. aut 3. s. *Electua- rium anti- paralyti- cum.* singulis dieb. cum lacte muliebri exhibere.

4. Calami aromat. cinam. mastich. rad.

Dauci cretici, zedoariæ, caryoph. an.

3. i. ligni Aloës, sandali citrini an.

3. s. molchi 3. s.

Pulverentur exactiss. & cum q. s. Syr. è stæch. fiat Electuarium.

Præstat insuper in paralysis infantium par- *Lixivium pro mem-bris.* tes resolutas lixivio calido, in quo bacca lauri, & sem. pæoniæ sunt incocta abluere, & deinde ol. laurino, cui parum ol. vitr. sit admixtum, inungere.

8. Convulsio infantium unde & quæ ejus sunt remedia?

Σπασμο Convulsio est ubi nervi in ar- *Convulso* ticularis manuum & pedum convelluntur, & à quid. naturali sua positione muscoli distrahuntur, nostri **denkrampff** vocant. Oritur ut plu- *Vnde ori- tur.* rimum à copiosa lactis nutricis vitiosi & cras- sioris ingestione. Infestantur ut plurimum hoc malo circa dentitionem infantes, ubi nempe ea difficilis est, nec facile per gingivas dentes erumpunt.

Curatio in lactis nutricis emendatione, *Curatio.* & in exuberantis qualitaris frigida, calida, sicca, in corpusculo infantis alteratione consistit. Initio itaque alvus infantis subducatur *Emollien- tia alvum.* 3. i. i. aut 3. s. calidæ evulsæ, quæ cum lacte soluta ori infantis illiniatur.

Deinde si adsit præternaturalis calor aut *Lavacrum in causa calida.* Febricula, lavetur pars affecta decocto ver- basci, violariæ, rad. malvæ & althææ, ac tandem inungatur cervix & articuli convulsi ol. violar. & amygd. dulc. simul commixtis. Aut si articulos in pedibus convelli contingat, lumbi ac pedes iisdem oleis inun- gantur.

Ubi.

*In causa frigida la-
vacrum.* Ubi vero corpusculum infantis frigida
interperies occupavit, lavetur infans aqua
cal. in qua decocta sunt fol. salviæ, beton.

Inunctio. rutæ, chamæm. meliloti, flor. lavand.
&c. Inungatur autem ol. Irino aut lil. al-
bor. aut chairino, cui pauxillum aq. Juni-
peri sit admixtum. Et præstat plurimum cer-
vici vel lumbis, & simul articulis convul-
sis cataplasma ex major. & rad. liliot. al-
bor. simul contusis & cum melle commix-
tis factum imponere.

*Prognosti-
con.* Notandum hoc loco, artus puerorum,
si tremuerint, certo subsequi aut spasmodum
aut Epilepsiam.

9. *Crebra vel continua sternutationes in-
fantium unde & quibus Remediis
sedantur?*

*Sternuta-
tiones cre-
bra unde.* Ex acrib. humoribus vaporibusque ad
nares ex cerebro influentibus Continuo
sternutant infantes, à qua sternutatione,
quæ vehemens est commotio cerebri, val-
de concutitur cerebrum, cui malo hisce
remediis succurrendum est.

*In causa
calida.* Primum consideretur utrum caput cali-
dius aut frigidius existat, quod tactu depre-
hendi potest. Ac si præter naturam incale-
scar caput, naribus illiniatur momentum o-
lei vel nenuph. aut Violar. cum lacte mulie-
bri temperatum. Capiti vero imponatur ca-
taplasma ex foliis portulacæ & medulla cu-
cubitæ aut cucumeris viridis cum ol. ro-
fac. & q. s. farinæ hord. subactis confe-
ctum. Aut inungatur caput oleo ex florib.
*Catapla-
sma.* salicis confecto: Aut imponatur fronti aq.
ros. cui pulvis rosar. sandal. rub. & sang.
Draco. vocati succi sit admixtum, quæ
duplicatis linteolis excepta fronti appli-
centur.

*In causa
frigida.* Si vero caput frigidius esse deprehenda-
tur, succus ocyini naribus illiniatur & o-
dores malorum Aurantiorum, & majoranæ
naribus admoveantur, & subinde calidiora
juscula ex cervisia facta, infanti offeran-
tur. Caput vero lavetur aqua calida, in
qua serpillum & fol. rorismarini sunt inco-
cta. Absterfo deinde capite, frons & nares
inungantur ol. chamæm. aut anethino.
*Epithema
pro fronte.* Fronti vero applicetur Epithema ex aq. Ma-

joranæ factum, cui thus, mastix & myrrha
sunt admixta.

10. *Strabismus infantium unde, & qui-
bus remediis emendandus?*

Strabismus & oculorum detorsio & obli- *Strabis-
mus unde.* quitas. Detorquentur autem oculi in stra-
bismo vel ad superiora vel inferiora vel ad
latera quæ detorsio sit, aut ob musculorum
oculos moventium à loco proprio revul-
sionem, aut ob crystalloidis humoris in-
versionem. Hac molesta deformitate labo-
rante, Græcis *σκαλός*, latinis strabones di-
cuntur.

Strabismus in recens natis emendari, sed *Prognosti-
con.* difficulter potest, in pueris aliquo modo con-
corgi, in adultis vero nunquam emenda-
ri potest.

In infantia itaque talis est curatio ten- *Curatio.*
tanda. Primum muscoli in ambitu oculo-
rum, qui oculos circumagunt, mundissi-
mis linteolis calefactis singulis diebus con-
ficiuntur; deinde ol. chamæm. inungantur,
præcavendo ne in oculos oleum influat.
Et si caput infantis excrementitia humidi-
tate redundet, id quod ex salivæ copia, & *Cerebrum
exsiccan-
tia.* narium pituitosa destillatione deprehendi
potest, tum naribus subinde odora menta
exiccantia, veluti sunt majorana, nigella,
lavand. caryoph. & fumus ex accenso suc-
cino admovenda, & excrementa exiccan-
da veniunt.

Deinde infantes perpetuo in cunis ita *Repositio
infantis
necessaria.*
collocandi erant, ut recta in lumen aut in
accensam lucernam intueantur, quæ con-
tractioni oculorum sive strabismo contra-
ria sit, & panni rubei coloris oculis oppo-
nantur, ut radios visivos recta in eum di-
rigere, & intuitum in adversam partem
flectere assuecant.

11. *Pruritus inflammatio ac tumor oculo-
rum in infantibus unde excitatur &
quibus remediis curatur?*

Ψωροφθαλμία scabies seu prurigo oculo-
rum. In oculorum palpebris infantibus
pronascentur exiguæ instar arenarum vel
mili, pruriginosæ scabiculæ, quandoque
cum inflammatione, nonnunquam cum tu-
more

Haec oculorum affectiones unde.

more & non raro cum exulceratione, quæ originem ducunt ex adfluxu ad oculos falsi aut acris humoris, quod malum ex continuo pruritu, rubore palpebrarum & tumore dignoscitur.

Curatio.

Curatio consistit in lactis nutricis emendatione, deinde in ocularium remedium applicatione. Plurimum hoc in malo conducit sæpe lac muliebri in oculos infantis instillare, aut butyrum ex lacte muliebri confectum oculis scabiosis illinire. Prodest præterea scabiosas palpebras infantium sæpiusculè ablueri purissima spongia ex decocto parietariæ & chamæm. aut easdem herbas concoctas instar catapl. oculis imponere.

In rubore & tumore oculorum remedia.

Si adsit rubor & tumor scabiei, multum conducit Aloë puriss. in lacte muliebri resolvere & parum aq. rosar. admiscere, oculisque illinire.

In oculi inflammatione.

In inflammatis oculis infantium conducit illinire vel instar catapl. oculis imponere succum solani cum aq. ros. mixtum, aut imponere album ovi cum iisdem liquoribus diu agitatum ac concussum linteolisque exceptum.

Ad palpebras tumefcentes.

Tumefcentibus palpebris infantium utiliter imponitur seq. Epithema.

Epithema.

℞. Rad. Chelidoniz, rosar. rub. an. ʒ ii. Myrtæ, croci an. ʒ i. Quibus tenuiss. pulveratis admisce lactis muliebris cum aq. rosar. mixti q. s. quæ linteolis excepta oculis tumentibus imponantur.

12. *Aurium Purulentia in infantibus unde, & quibus remediis curanda?*

Affectus aurium variis in pueris.

Ἰσχυρῶς ὄντι purulentæ aures. Crebro ex infantium auribus profluit aut serosus sanguis, aut pituitosum excrementum, aut purulenta sanies, & quandoque una & vermiculi prociidunt, significantque cerebri malam constitutionem & humidam intemperiem, aut ruptum in cerebro apostema ac putrefactionem.

Aurium fluxio non

Porro etsi omnis evacuatio cerebri quæ per aures & oculos fit præternaturalis & mo-

lesta sit, fluxio tamen aurium temerè non temerè supprimenda, sed sensim & probè prius purgato cerebro.

Curatio fluentium aurium hac ratione instituenda est. Si crassæ sordes meatibus aurium sunt impactæ, primum auriscalpio leniter eximantur, & lana mollissima acus nodulo obvoluta extergantur. Deinde emundatis auribus mel purissimum, quod virgineum vocant, cum vino rubeo ad ignem solutum & licio aut lana xylina exceptum auri fluenti tepidum inseratur, aut instillantur tres quatuorve gutt. hydro-mellis simpl. tepidi, aut instilletur aurib. sequens liquor.

℞. Mel. purissimi, vini rubei, an. ʒ s.

Alum. croci, nitri an. ʒ i. quæ contrita simul leniter ebulliant, & guttulæ tres fluenti auri instillantur, Aut lana xylina excepta tepidaque auri imponantur.

In vehementi autem fluxione, temporibus & auribus imponatur milium tostum, & in sacculo confutum subindeque calefactum. Exsiccat enim omnem effluxionem.

In purulenta saniosaque aurium fluxione utilissimum existit ol. ex sem. canabis expressum, aut ejusdem herbæ succum tepidum, aut ol. amygd. amar. cum pauxillo vini mixtum instillare.

Verum si fluori accedat inflammatio capitis, & dolores intolerabiles excitet, mitigetur dolor & leniatur inflammatio, granis duobus opii Thebaici vel laudani opiat, cum lacte muliebri resolutis & in aurem instillatis.

Si purulentæ fluxioni adsint status, quod ex tensivo dolore circa aures, & aurium tintu dignosci potest, tum maximè proderit sacculum ex flor. chamæm. meliloti, & origani concinnatum, vinoque conspersum & per calidum laterem calefactum, auribus applicare, aut laminam recens pisti panis tolerabiliter calentis, auri admove, aut gutt. i. aut alteram ol. castorei instillare.

13. *Dentitioni difficili infantum & ex ea ortis symptomatibus quæ remedia conveniunt?*

Tempus dentitionis ordinarium.

Ordinarius aut eductior pædes dentitio. Infantibus ut plurimum emergunt ex maxillis, gingivas perforantes dentes circa septimum à nativitate mensem, & aliis difficiliter, facilius aliis erumpunt.

Symptomata difficili dentitionis.

Difficilem dentitionem præcedere consuevit alvi turbatio ac fluxus, aut ejusdem nimia restrictio, gingivarum pruritus, tumor & inflammatio, aut exulceratio, quibus nonnunquam accedit & febricula, quæ symptomata seq. remediis curanda veniunt.

Alvum solventia.

Si alvus excitetur, fluxio alvi non est cohibenda, donec sponte cesset. Si vero adstricta sit alvus, ori infantis 3 iiii. aut 3 s. cassiæ inferenda est, aut 3 s. mannæ in lacte resoluta.

Fomentatio.

Et præstat in dentitione, ut infans quotidie lavetur, & maxillæ fomententur aq. calida, in qua cocta sunt malva, althæa, flor. chamæ. & anethi.

Pruritus gingivarum sedantia.

Prurientes gingivæ commodè digitis crebro conficari, aut ori infantis dens lupi argento inclusus, aut corculum ex argento factum mandendum mastigandumque assidue ingeri potest, aut ut Ægineta docet, frustulum salitæ carnis mastigandum præbere.

Dentitionem promoventia.

Pareus

gingivas

sectione a-

periendas

suadet, si

hæc non

profecerint, quod

absque pe-

riculo fieri

potest.

Linimen-

tum ad in-

flammas

gingivas.

Ad exul-

ceratas

Tumentes gingivas, & jam ruptionem minitantes utilissimum est inungi aut cerebro leporino cocto & elixato, aut pinguedine leporina, aut gallinacea aut butyro recenti. Quin & maxillis oleum chamæmeli calidum lana molli exceptum foris utiliter imponimus.

Si inflammata sunt valde gingivæ, & vehementiores excitant dolores, inungi debent ex ol. rosac. & cera candida facto linimento, quod cum succo solani aut portulacæ aliquoties sit elotum.

At vero si gingivæ sunt exulceratæ, præstat eis illinire exiguum butyri salis experti, cui nonnihil mellis & pul. thuris sit admixtum, aut sequens linimentum, ℞. Butyri salis experti, mellis rosac. an. 3 i.

Terebinth. cum aq. plantag. ter elotæ 3 s. gingivas commisc. fiat liniment. & gingivis inungatur. *remedia.*

Si dentitioni adsit febricula, ejus mitigandi rationem paulo post docebimus.

14. *Ulcuscula oris ac lingua infantum unde, & quæ eorum sunt remedia?*

Aphæ Arabib. Alkonæ, nobis autem die *Differen-*
Schwammen vel **der Boß** / sunt c- *tia aph-*
xigua ulcuscula, linguam, palatum, fau- *tharum.*
ces, gingivas & totius Oris ambitum ob-
sidentia, quæ quandoque albæ, & minus
sunt periculosa, nonnunquam rubæ, &
magis noxiæ, non raro etiam subnigræ, quæ
omnium sunt perniciosissimæ, spectantur.
Atta enim ulcuscula si difficulter mature- *Quando*
scant & abstergi nequeant, ut plurimum *lethales.*
lethalia sunt.

Generantur æphæ ex lactis aut serosa *Vnde gene-*
substantia, aut vitiosa acri urenteque qua- *rentur.*
litate; aut ex urentibus vaporibus ex prava
concoctione Ventriculi infantum delatis.

Curatio Aphtharum consistit in lactis nu- *Curatio.*
tritis emendatione & ulcusculorum oris
absterfione, & cum convenientibus remed.
consolidatione. Statim itaque à parenti-
bus à lacte vitioso nutritis subducendus est *Lac emen-*
infans, donec humor vitiosus lacti admi- *dandum.*
xtus è corpore evacuetur.

Porro lactis biliosam constitutionem fla- *Lactis vi-*
vus color tum lactis tum ulcusculorum o- *riosis nota.*
stendit. Rubedo autem aphtharum retorri-
di sanguinis est argumentum pituitosam
vero nutritis constitutionem, lactis tenui-
tas & serositas ulcusculorumque albus co-
lor commonstrat. Aphthæ subnigræ & lac
ad cæruleum vergens, melancholici humo-
ris redundantiam ostendit.

Quibus autem remediis cujusmodi viti-
osi humores sint evacuandi, in superiori-
bus abundè proposita sunt. Et si corpus nu-
tritis sit plethoricum & rubescant aphthæ, *Venesectio*
aut flavo colore sint tinctæ, sanguis quoque *in nutriti-*
per venæ sectionem detrahendus est. *bus.*

Aphthæ autem seu ulcuscula in ore puel-
lorum seq. remediis abstergi & consolida-
ri possunt.

Sing. diebus ter quaterque confricentur *Abstergem-*
aphthæ tia.

Limen-
tum.

aphthæ fol. viridibus salviæ in aq. prius ablutis, ac deinde vino rubeo imbutis, aut hydromel. concoctis, aut si rubescant, aut flaviores appareant aphthæ, abluantur decocto rosar. violar. & lentium in vino rub. quibus ablutis seq. liniment. illiniuntur.

℥. Mell. rosar. ʒ ii. cui admisc. pul. violar. & ciner. hippuris herbæ an. ʒ i. Cornu cervi ust. ʒ s. fiat linimentum.

Refrige-
rantia.

In inflammatis ulcusculis, post elotionem & abstersionem aphtharum, commodè illiniri potest succo lactucæ, solani, aut portulacæ, aut succo mororum aut diamoron. Prodest & ulcusculis inspergere pul. glycyrr. aut cum melle rosar. mixtum illinire.

Ad aph-
thas hu-
midiores
linimen-
tum.

Aphthis humidioribus existentibus prodest seq. linimentum.

℥. Myrrhæ, Gallarum, Thuris, Rad. chelidon. maj. an. ʒ i. Croci ʒ s.

Cautè hoc
usurpan-
dum.

Omnibus tenuiss. pulveratis cum melle rosar. pondo ʒ s. excepta commisc. fiat linimentum. Præstantiss. est & experientia comprobata ad aphthas remedium si ʒ ii. mellis rosacei ʒ s. aut ʒ i. ol. vitrioli admisceatur, eoque illiniatur. Plura remedia aphthas sanantia, ex curatione affectionum linguæ ex superioribus petenda veniunt.

L. 2. sect.
7.

15. *Ranula sublinguis infantium unde nascuntur, & qua earum est curatio?*

Ranula
quid.

Βαρεγχὸς ἢ τὸ πρὸ τῆς γλῶσσης ranula sub infantium lingua est tumori parvus fabæ magnitudinis cum inflammatione, speciem referens ranulæ animalis, sub lingua infantium nonnunquam excitatus. Nascitur talis tumor ut plurimum ex pituitoso sanguine ad ligamentâ linguæ defluente, & infert non leves cruciatus, quandoque febriculas, balbutiōnem & vocis titubationem, & nisi celeriter curetur, interitum quoque adfert.

Vnde ori-
tur.Ejus in-
commoda.

Curatio.

Curatur primum venarum livescientium sub lingua, & tumor adjacentium cum scalpello apertione, & tumusculi quoque incisione sanguinisque pituitosi expressione, & crebra tumoris confractione cum

fale Armoniaco, & inunctione mellis rosarum cui nonnihil ol. vitrioli sit admixtum. Plura pete ex superioribus in curatione morborum linguæ traditis.

16. *Labiōrum rimæ & asphredo in infantibus quomodo sanatur?*

Ραγάδες rimæ, & scissuræ labiorum. Rimæ labiorum mulas & aspredines perfrangant succus plantag. in quo resolutum est Tragacantum, quibus sanantur. carpto lino exceptus & labiis impositus. Item pinguedo gallinæ scitiss. labiis illita. Item albumen ovi, & pulv. masticis simul mixta labiisque illita. Aut

Rima la-
biorum
quibus sa-
nantur.Vnguen-
tum po-
matum e-
tiam hic
utile.

℥. Flor. lactis & ping. quæ cochlearibus inter agitandum carnes coctas, præsertim bubulas, adhæret an. ʒ i. commisceantur, fiat liniment. & aspredinibus labiorum illiniatur.

S E C T I O III.

DE MORBIS FAUCIUM ET PECTORIS INFANTIUM ET PUERORUM.

1. *Tonsillæ & fauces infantium quibus afficiuntur malis & qua sunt eorum remedia?*

Sæpe numero intumescunt incalescunt- Angina que tonsillæ & laryngis muscoli in infantibus, quod malum Græcis αναγκή. Latinis Angina, nostris Geschwulst der **Schh haken oder des Halses** nominatur. Perniciosum est Angina malum, præsertim ubi tumor extra non est conspicuus, sed intra fauces vergit. Intercipit enim respirationem, & spatio 24. horarum, sæpè etiam citius, misere strangulat puerulos. Qui vero foras protruditur, minus est periculosus. Angina correpti nonnisi erecta cervice, & cum strepitu magnoque conatu respirare possunt.

Quando
nim respiratio-
nem, & spatio 24. horarum,
sæpè etiam citius, misere strangulat puerulos.

Curatio Anginæ occultæ frustra tentatur. Sitamen solatii causa aliquid tentare cogatur Medicus, provideat ne alvus infantuli sit obstructa, ac si fuerit, glande sive supposito ex exiguo ex melle, fale, & trochisc.

Curatio
Anginæ
internæ.
Alvus sub-
ducenda.

Collo applicanda.

Sacculus pro capite.

Tumoris externi remedia.

Cataplasma.

Quando tumor aperiendus

Lib. 2. sect. 8.

Uvula unde relaxatur.

Remedia unde petenda. Experimentum singulare.

chisc. alhandali facto vel enemate referetur subducaturque. Collo vero infantis ol. hypericonis aut chamæm. calidum, molli lana exceptum circumponatur. At si caput sit humidius, & saliva in fauces defluat, sacculus ex milio & sale factus, sæpiusque calefactus capiti imponatur. Intra vero fauces Diamoron & mel. rosarum illiniatur, ac reliqua curatio optimo adjutore Medicorum Filio Dei commendetur.

In eminentibus verò extra collum tumoribus anginae, intra quidem fauces, ut dictum est, Diamoron aut mel. rosaceum cui cinis hirundinum est admixtus, illiniatur crebro, collum vero ac tumor externus foveatur ol. chamæm. aut anethi molli lana excepto. Aut conficiatur cataplasma ex nido hirundinis in aq. & pauxillo aceto cocto ad liquoris evaporationem, additoque q. s. olei chamæm. & farinæ hord. fiat catapl. & calidum tumori imponatur. Aut ut celerius maturescat tumor, conficiatur catapl. ex luteo ovorum Terebint. p. æ. quibus admisce pul. rad. alth. & sem. lini ac fœnugræci q. s. Ubi maturuit tumor, scalpello vel novacula incidatur mundificeturque & chirurgica industria remediis convenientibus consolidetur, quemadmodum supra in Anginae curatione docuimus.

2. Uvula elongatio in infantibus unde, & quæ ejus sunt remedia?

Γαγγλίων Uvula. Infantibus non secus quam adultis sæpe laxantur ligamenta collumellæ seu uvulæ ab humiditate cerebri ad eam defluente; aut ubi nutrices, inter sugendum papillas ex ore infantium repente & violenter extrahunt: Dependens autem uvula in fauces suctionem & deglutitionem lactis infanti impedit.

Sed quia de hujus mali curatione in superioribus diximus, sufficit hoc loco unicuique experientia comprobatum remedium adjicere. Accipiantur lactis muliebris & aq. stillat. rosarum & majoranæ an. ʒ i. Commisc. in eoque liquore calefacto charta munda sive papyrus duplicata palmæ la-

titudinem obtinens madescat, & instar Epithematis vertici capitis infantis aliquoties imponatur.

3. Tussis & gravedo infantium unde oritur & quibus remediis curatur?

Catarrho h. e. destillatione excrementorum humorum cerebri ad infernas partes; infantes ac pueruli non secus quam adulti infestantur. Et ubi defluxio ad nares procumbit, Græcis *ροβήξα*, id est gravedo, nostris **der Schnuppen** nominatur; Sed si in asperam arteriam illabatur, tussim excitat.

Verum tussis infantium non tantum ex destillatione humoris in asperam arteriam, sed ex capitis quoque infantium aut refrigeratione aut calefactione immoderata, aut ex lactis importuna deglutitione, ætherisque ambientis frigiditate oriri potest.

At si tussis vehemens sit & diu perseveret in infantibus, eos in tabem aut in ramicem, id est igninum perruptionem, ac postremo in mortem conjicit.

In curatione utriusque symptomatis & gravedinis & tussis primum consideranda veniunt intemperies infantis, id est utrum infantuli corpusculum justo sit calidius aut frigidius, & ita statim nutricis lac in contrariam qualitatem & victus ratione, & medicamentis alterantibus catarrhoque & tussi adversantibus convertendum erit.

Et quidem in curatione gravedinis, infantulo ea sunt exhibenda & applicanda remedia, quæ paulo ante in sternutationis infantium curatione sunt commemorata.

In tussis vero infantium curatione, si corpusculum calidius existat, lavetur infans cum aq. calida in qua decocta sunt malva althæa violaria. Deinde absterfo & siccatu corpusculo, pectus & hypochond. infantis inungantur ol. viola. aut rosar. Intta corpus autem exhibeantur sorbitiones ex ptisana hord. vel avenacea in qua rad. glyc. sit incocta, & ori subinde syr. è glycyrr. aut violac. illiniatur, aut seq. Electua. molle lambendum præbeat.

ʒ. Pul.

Gravedo quid.

Tussis in causa.

Prognosis.

Lac nutricis emendandum.

Gravedinis remedia.

Tussis ex causa calida.

Eclegma.

℞. Pul. glycy. pæon. sem. lini an. ʒi. spec. Diatrag. frig. ʒs. syr. è glycy. ʒi. Commisceantur, fiat Electuarium lambile.

In tussi sicca qua convolvant. Porto ubi tussis sicca est & aspera, & calescit corpus, ori eorum seq. Electuar. subinde illiniatur, **℞.** Mucag. ex sem. cyton. & lini simul contusis, & cum aqua hyssopi confectæ ʒi. loch. è passulis ʒs.

Elegma. Conser. rosar. ʒii. pulv. sem. papav. albi ʒs. rot. Diatrag. frigid. ʒs. contundantur simul diutissime, & si non satis liquidum sit admisc. q. s. syr. viol. fiat electuarium molle.

Emulso 4. sem. frig. Plurimum conducit quoque infantulis tussi laborantibus & æstuantibus præbere lac ex 4. sem. frig. & sem. papa. an. ʒii. cum aq. malvæ aut scabiosæ ʒi. Confectum. Aut **℞.** Pulv. sem. cyton. lini an. ʒs. rad. glycy. pæon. an. ʒi. sacchari penidii ʒiii. fiat pulvis. cujus pauxillum crebrò cum lacte instilletur puerulis.

Pulvis. At vero si corpusculum frigidius, & tussis causa frigida existat, simili ratione, lavetur infans frequenter in calida aqua in qua concocta sunt fl. chamæm. meliloti, anethi & bethonica, ac post lotionem iterum accuratè linteolis calidis abstergatur, & calefiat, & pectus & hypochondria inungantur ol. chamæm. vel anethi, vel pinguedine anserina, vel ol. amygd. dul. per se singulatim aut inter se commixtis ac calefactis. Proderit etiam plurimum rad. lingvæ subinde contrectare digito, & infantem ad Vomitionem pituitæ excitare, pituitamque ex ore digitis excipere. Infantis vero ori crebro commodissime illinitur syr. de Jujubis aut syr. de hyssope aut lochsanum & expertum, aut seq. Elect. **℞.**

Lava-crum. Pulv. sem. lini, urticæ an. ʒs. Zedoar. ʒi. Croci ʒs. Rot. Diapen. ʒs. syr. de hyss. q. s. Conterantur diutiss. fiat Electuarium molle, cui admisce gutt. iiii. ol. anisi. Aut saccharum candi resolvatur in aqua juniperi aut hyssopi, & tussientibus infantulis calidum præbeatur. Conducit quoque lac canabinum aut amygd. cum saccharo candi dulcoratum tepidumque crebro exhibitum.

Vomitum utilis. Proderit etiam plurimum rad. lingvæ subinde contrectare digito, & infantem ad Vomitionem pituitæ excitare, pituitamque ex ore digitis excipere. Infantis vero ori crebro commodissime illinitur syr. de Jujubis aut syr. de hyssope aut lochsanum & expertum, aut seq. Elect. **℞.**

Elegma. Pulv. sem. lini, urticæ an. ʒs. Zedoar. ʒi. Croci ʒs. Rot. Diapen. ʒs. syr. de hyss. q. s. Conterantur diutiss. fiat Electuarium molle, cui admisce gutt. iiii. ol. anisi. Aut saccharum candi resolvatur in aqua juniperi aut hyssopi, & tussientibus infantulis calidum præbeatur. Conducit quoque lac canabinum aut amygd. cum saccharo candi dulcoratum tepidumque crebro exhibitum.

Lac canabinum. Conducit quoque lac canabinum aut amygd. cum saccharo candi dulcoratum tepidumque crebro exhibitum.

Sed præsentiss. adfert remedium in tussi *Syrupus* infantum sequi. Syrupus crebrò osculis eop^{eculiaris}. rum insertus **℞.** Aq. Juniperi ʒiv. pulv. sacchari candi ʒi. Commisceantur, & accendatur aq. Juniperi, ac eousque inter ardendum agitetur, donec syrupi formam acquirat, & sponte sua extinguatur. His addi potest.

℞. Rad. fenic. & glycy. an. ʒiii. *Hydromel.* Contusa coquantur in ʒs. hydrom. qui liquor calefactus mane ac vespere puerulis exhibeatur bibendus.

Tussientibus infantibus providendum est *Alvum* le- ne alvus sit adstricta, quod si contingat, *nientia non negli-* suppositorio sive glande ex albo sapone *genda.* confecto, & ol. chamæm. illito anoque inserto, egestio est excitanda. Aut resolvantur ʒiii. Mannæ in hydrom. & bibenda infanti præbeantur, Aut ori eorum illiniatur pulp. cass. ʒs.

4. Difficultas respirationis unde & qua ejus sunt remedia?

Asopus & duarvela, Anhelitus seu respi- *Asthma* rationis difficultas est, ubi infantuli diffi- *Infant.* culter & cum sonitu spiritum attrahunt ac *quid.* respirant. Quod malum ex iisdem fere causis quibus tussis oritur, nimirum ex infarctione & repletione asperæ arteriæ aut fistularum pulmonis, cum crassa pituita ex capite defluente, vel crassis vaporibus gravato Diaphragmate.

In curando difficili anhelitu aut sonorosa respiratione, lac nutriceis, si crassum est & pituitosum, per victus rationem primum est emendandum. Deinde pectus & hypoch. infantis molliter primum calidis linteolis confricanda sunt, ac deinde inungenda cal. oleo vel chamæm. vel amygd. cum butyr. recent. cui gutt. ʒ. quatuorve aq. Juniperi sunt admixtæ. Quin & aurium *Inunctio.* & lingvæ radicem, adeoque totum collum ol. amygd. aut lilia. inungere & imbueretutilissimum erit. Ori autem frequenter inferantur remedia aperientia, meatus respirationis dilatantia, & simul emollientia, veluti sunt hæc subsequenda, **℞.** Pul. sem. lini, zedoar. *Elegma.* an. ʒi. Croci gr. v. cum ʒi. syr. de hyss. *fff 3* fiat

Vomitus.

fiat electuarium, cui admisceantur gutt. iii. ol. angelicæ aut ol. anisi, aut aq. juniperi ʒ i. & ejus fabæ q. ori inferatur. Utilissimum quoque erit sing. diebus rad. linguæ molliter comprimere, & ad vomitum infantem excitare, cistamque pituitam ex ore infantis digitis excipere.

*In compressione
diaphragmatis
quid agendum.*

Si vapores crassi gravant Diaphragma
impediuntque anhelum, prodest gutt. ii.
ol. cymini, aut ol. angel. cum iii. cochlear-
ibus hydromel. infanti exhibere, & hy-
poch. subinde cum ol. chamæm. inungere.
Quin & nuttici sæpè affumendus erit pul.
cym. præpar. & providendum, ut infantu-
li alvus semper sit laxa.

SECTIO IV.

DE MORBIS INFIMI VEN-
TRIS INFANTUM ET
PUERORUM.

1. *Stomachi infantum debilitas dolor & intumescencia unde excitatur, & quibus remediis curatur?*

Cardialgia
quid.

V Eteres orificium Ventriculi cor nomi-
nabant, & ejus affectionem cardial-
giam, quæ consuetudo manfit apud nostrat-
es, ut & hodie orificium Ventriculi **bag**
Hertzgrüblin / & ejus dolorem & intum-
escentiam **bag** **Hertzspan** vocifent.
Afficitur autem infansibus orificium Ventr.
aut ex vitiofi lactis copia, aut crassis flatibus
ibidem collectis.

Ejus san-
sa.

Curatio.

Inunctio.

*Sacculus
stomacha-
lis.*

Aqua Aprina.

Curatur *μεθελυξία*, cavitatis sub sterno ,
qua regio est orificii Ventric. inunctione
cum oleo è mentha, è mastice & nardino
cum singillarum aut simul mixtis, & impositione
sacculi ex fol. menthæ rosar. & absinthii &
pauillo mastice addito confuti in vinoque
rub. cocti, & expressi calentes qui sæ-
piusculè recalescendunt est. Intra corpus
verò mulierculæ nostrates exhibent aq. stil-
lar. Aparines, sed præsterit & efficacior
redditur illa aqua, si eisdem commisc. gutt.
ii. ol. stillat. aut caryoph. aut è mentha, aut
è mastice. Ego vero seq. pulvisculum cum

lacte exhibere soleo. ℞. Pul. cornu cervi, *Pulvis*
coral. rub. præpar. an. ℥ i. Mastic. caryoph. *singularis*
an. ℥ s. misceantur fiat pulv. tenuiss. cu- *in cardial-*
jus ℥ s. cum lacte aut aq. menthæ exhi- *gia puero-*
beatur. *rum.*

Ubi intumuit orificium Ventric. seq. Em-
plastr. commodè imponi poterit.

24. Olibani, mastic. Pul. Menthæ an. *Empla-*
3 i. medullæ panis tosti, & cum aceto ro- *strum ad*
sar. contusi 3 s. Contundantur in mortario *tumorem*
& conformetur Emplastrum. *ventriculi*

Si verò adit febricula vel caliditas præter-
 naturalis, plurimum proderit infantis ori il-
 linire Diacytonium simplex ex succo cum
 saccharo factum vel syr. Granator.

Flatus autem si adsint, quod ex crebra e-
ructatione percipi potest, proderit gutt. 11. *Flatus dis-*
ol. cymini cum pauxillo aq. menthæ exhibe-
re. Si crassi humores ibidem sunt collecti, *cutientia.*
gutt. 11. olei Vitrioli. cum vino commodè
propinamus.

2. Singultus infantum unde & quæ ejus
sunt remedia.

*A*nytus singultus. Sicuti sternutatio cerebri, & tussis pulmonis, ita singultus est motus violentus Ventrículi, quo natura noxia expellere conatur. Vellicatur enim interior tunica Ventrículi aut ab acerbis aut à frigidis aut à calidis humoribus aut à vitioso lacte nutriticis, aut à vaporibus flatulentis in Ventrículo contentis, quæ per singultum propellere conatur natura.

Singultus in ardentibus febribus aut in *Prognosti-*
diuturna alvi fluxione non modò in in-*con.*
fantibus sed & in adultis mortem præsen-
tem significat.

Curatio. Si singultus ex vitioso lacte nutriticis oritur, statim nutriticis lac est emendandum, & lactis assumpti revomitio excitanda. Excitatur autem vomitus in infantibus, si eorum lingua mollior comprimitur, & fauces immissa summitate pennæ titillentur.

Ubi autem singultus ex flatibus sit ortus, *Si ex flatibus*
sternutatio est excitanda, & nares titillandæ. *bus.*
Sternutatio enim solvit singultum.

At si regio Ventricul. frigidior deprehen- Si ex fri-
datur, inungatur oleis calefactis, è mentha, giditate
nar- ventriculi.

nardino, aut ol. absinthii, & subinde pauxillum vini generosi, quale est Creticum, ori infantis instilletur. Post inunctionem autem orificio Ventricul. imponatur facculus ex mentha pulegio & serpillio confectus in vinoque coctus & expressus.

Sicausa calida, singultum exciter. E contra si ad tactum orificium calidius deprehendatur, post vomitionem syr. granatorum aut acetos. citri ori infantis illiniatur, & regio Ventric. ol. rosac. & mastich. cui pauxill. aceri rosar. sit admixtum, inungatur, vel conficiatur Epithema expul. Mastich. cum album. ovi, & pauxill. aceto rosarum confecto, & orificio Ventric. imponatur.

Pulvis utilis in omni singultu infans. In omni autem singultu infantium, utilissimum erit 3 s. pulvisculi ex cornu cervi usti & coral. rub. præparatis exhibere cum lacte, aut syr. è mentha.

3. *Nausea & vomitio infantium unde excitatur & quibus remediis curatur?*

Nausea & vomitus differentia. *Nausea & vomitus.* Utraque affectio ex iisdem causis infantibus accidunt iisdemque remediis curari possunt. Et nausea quidem semper antecedit vomitum. Quamquam non semper nauseam sequatur vomitus, sed inanis & irritus conatus vomendi existat. Per vomitum expellit natura vitiosas & noxias è Ventricul. materias, quales sunt lac corruptum, aut copiosè ingestum, aut pituitosa colluvies aut biliosa in Ventric. collecta.

Signa ex materia per vomitum rejecta. Evomita materia si sit subnigra aut viridis, deinde & crocea, mala significat. Pituitosa autem & alba minus est periculosa. Biliosa evomitio caloris præternaturalis, pituitosa vero frigiditatis est argumentum. Vomitus moderatus infantium non est protinus compescendus, nisi diutius perseveret. *Vomitum non statim sedandum.* Natura namque per vomitum expellit ea quæ sibi molesta sunt & noxia. Vnde in proverbio dicitur à mulierculis, Puerulos sapienti vomentes victuros saniores.

Curatio. Curatio nausæ & vomitionis infantium consistit in lactis nutriticis emendatione, & moderata exhibitione, remediumque cum externorum tum internorum applicatione.

Si itaque vomitio infantium ex pituita, aut lacte, vel frigida causa sit ex citata, ori in-

fantis illiniatur syr. è mentha cui pauxillum thuris, mastich. & caryoph. sit admixtum, Aut.

Pulvis. ʒ. Coral. rub. præpar. mastich. an. 3 s. Commisc. cujus ʒ s. cum lacte aut vino exhibeatur, & naribus infantuli subinde lamina panis tosti, & cum aceto irrigati admoveatur.

Foris vero orificium Ventric. adeoque totus Venter inungatur seq. ol. ʒ. Ol. è mentha è mastich. nardini an. 3 ii. Quibus admisc. ol. stillat. ex caryoph. gutt. v. post inunctionem imponatur Empl. de crusta panis, aut lamina panis tosta, & vino generoso conspersa. Aut fiat sacculus ex fol. quercinis, menth. absinth. caryoph. & Mastich. simul mixtis, qui in vino rub. ebull. & express. Ventri imponatur. *Linimentum.*

Ubi vero vomitio biliosa existat & adjuncta sit caliditas præternaturalis, præstabit infanti syr. ex omphac. aut Diacyton. simplex ex succo & saccharo paratum, aut syr. granator. ori infantis crebro illinire, quibus admisceri potest pulv. Trochiscorum de Berberis. *Emplastrum.*

Foris vero Ventric. inungatur ol. rosar. aut è cytoniis ac deinde seq. cataplasma imponatur. ʒ. Pulv. rosar. contular. Granat. Mastich. an. 3 ii. farinæ fab. 3 iii. subigantur cum suc. rubi aut aq. ros. fiat cataplasma. Aut seq. Emplastrum quod non tantum vomitum biliosum, sed & alvi fluorem sistit. *Topica.*

ʒ. Pulv. mastich. aloës, acatiæ, gallar. olibani an. 3 ii. panis tosti, & in aceto rosac. macerati rursusque expressi ʒ s. Subigantur cum q. s. ol. ros. & admisc. fabar. q. s. fiat. Emplast. quod Ventricul. infantis imponatur. *Emplastrum ad vomitum & alvi fluxum.*

In omni autem vomitione sistenda, nullum est præsentius remedium, quam si 3 s. caryoph. & gr. mastich. ʒ ii. simul concisa in ʒ vi. vini rubei ebulliant, & ejus liquoris usitati cochlearis mensura infanti ebibenda præbeatur, ac si calor præternaturalis absit, si ii. gutt. ol. stillat. ex caryoph. cum pauxillo vini bibendæ præbeantur. *Potiusculum ad omnem vomitum sistendum.*

Non temerè autem nec citò compescendus est vomitus infantium, & non nisi prius evacuata per vomitum materia, præsertim pituita, *Vomitum infant. non citò.*

compescen-
dus.
Aq. juni-
peri per
descensum,
vomiturum
concitatur.

pituita. Et si nausea tantum adsit, & sterilis conatus evomendi, tum præbeatur infan-
tulo mensura i. cochlear. aq. Juniperi per
descensum cum pelvi destillata, quæ egre-
giè per vomitum quicquid est vitiosi Ventri-
cul. acervatim evacuabit, & ita tandem fe-
lix curatio succedit vomitioni.

3. Ventris tormina & intumescencia in In-
fantibus unde, & quibus remediis
curatur?

Tormina
Ventris
unde exci-
tentur.

Σπράφοι sive ἀλγὸν τῆς κοιλίας, Tormina
sive dolor Ventris. Sæpenumero infantes
dolore ac cruciatus Ventris torquentur, ubi
nimirum flatulenti spiritus, aut acres hu-
mores, frigidaque colluvies in intestinis eo-
rum sunt coacervati & occlusi, id quod ex
continuo, & miserabili vagitu & contra-
ctione Ventris, inquietudineque depre-
hendi potest. Oriuntur autem tormin. ex
vitioso flatulentoque lacte nutriticis, aut
corrupto alimento aut alvi obstructione,
aut ex lumbricis. Ex iisdem causis nonnun-
quam inflatur & intumescit totus imus
Venter.

Inflatio
Ventris
unde.

Curatio.

Nutrici
exhiben-
da.
Lava-
crum.

Inunctio.
Ventris.

Alvum le-
nientia.

Inflatio.
Ventris ut

Curatio Torminum in lactis nutriticis e-
mendatione & remedium usurpatione
consistit. Nutrici proderit in jussulo cere-
visiario aut vinaceo crebro exhibere pulv.
cymini præpar. aut sem. anisi, fœniculi. In-
fantes vero utile erit in aq. calida in qua in-
cocta sunt flor. chamæm. anethi & absinthii
lavare, & post lotionem Ventrem calidis o-
leis anethi chamæm. & laurino, aut singil-
latim aut simul commixtis inungere: Aut
præscripta olea lana molli excipere, & um-
bilico imoque Ventri instar catapl. impo-
nere.

At ubi alvus est adstricta, præstabit in-
fantis ori subinde syr. ex flor. persicorum il-
linire, aut 3 iiii. vel iv. cassiæ recenter evul-
sæ, aut mannæ puræ 3 iiii. cum jussulo pru-
norum dissolutæ & percolatæ exhibere.

Si autem torminum Ventris vermes seu
lumbrici causæ existant, quibus remediis
interimendi & expellendi sint paulo post
commemorabitur.

Inflatur infantibus & intumescit non raro
imus Venter, & ut plurimum hæc inflatio

ex flatulentis spiritibus, aut vitioso lacte ge-
neratur, nonnunquam verò ex pituitosa col-
lue in intestinis collecta, quod malum ita
curabitur. Fol. ebulli aut cort. intern. ra-
morum sambuci in vini & aq. p. æ. coquan-
tur & expressa instar catapl. Ventri tumenti
imponantur calida, sæpiusque renoventur
& recalescant. Quin & tormina & intume-
scentiam Ventris ex flatibus ortam faciliè di-
scutiant sola ebulli folia virescentia si Ventri
imponantur. Præstiterit tamen Ventrem in-
ungere crebrius aut chamæmeli aut lil. oleo
in quo nonnihil croci, myrrhæ & aloës pul-
veratorum sit admixtum.

Catapla-
sma.
Folia Ebu-
li.

Linimen-
tum.

Interna
inflationis
remedia.

Intra corpusculum verò cum in tormini-
bus tum intumescencia Ventris præstantiss.
est præsidium, præsertim si absit febricula,
si exhibeatur aut cum lacte nutriticis aut cum
vino duorum pisorum quantitas Theriacæ
Androm. aut gutt. iiii. vel ol. cymini, vel ol.
carvi, vel ol. anisi.

4. Alvi fluor infantium unde, & quæ e-
jus sunt remedia?

Διαρροία, alvi perturbatio est crebra per
anum & immoderata liquidæ colluviei ef-
fluxio. Et alias crebro, maximè autem circa
dentitionem hoc malo infestantur pueri,
qui fluor si in dysenteriam id est cruentam
excretionem degenerat, ut plurimum perni-
ciciem adfert.

Diarrhœa
infan-
tium.

Quando
periculosus.

Oritur autem alvi fluxio, aut ex vitio
lactis, aut ex alimenti corruptione, aut
ex colluvie collecta in intestinis.

Vnde oria-
tur.

Excreta per alvum si crocea appareant, Signa
bilem & calidam infantis intemperiem, si
alba & mucosa, pituitam, aut cibi corru-
ptionem & frigidam intemperiem com-
monstrant. Observandum autem in alvi
fluore, quod si per acutas ægitudines & pro-
strationem virium accidat, semper lethale
est signum. Nigra excrementa in alvi fluore
pernitiosa sunt, deinde cruenta, testis cro-
cea, alba vero minus sunt pernitiosa.

Signa
causarum
diversa-
rum.

Prognosti-
ca.

Curatio consistit in lactis nutriticis emen-
datione. Cibare itaque nutricem oportet
lacte amygd. in quo panis tostus est concisus,
aut lacte caprino, in quo silices igniti
sunt extincti. Infanti autem administranda
sunt

Curatio.

Quando alvi fluxus sedandus. sunt medicamenta adstringentia cum foris tum intra corpus. Observandum tamen est, non statim in initio fluxoris, alvum infantis constringendam esse, nisi animadvertatur succedere fluxori virium debilitatem, & tum imo Ventri calidum Epithema linteolis exceptum subinde imponatur, decoctum nimirum sem. rosar. prunor. sylv. herb: polygoni gnaphalii; nuc. cupressi, balaust. cymini singulorum ad placitum. Ex iisdem rebus sacculus quoque concinnari potest, qui in vino coctus & fortiter expressus infantis Ventri imponatur. Aut \mathcal{L} . limi ex alveis fabrorum ferrat. in quo extinguntur candentia ferra, q. v. & admisce q. s. farinæ fabar. cum pauxillo aceto, & instar cataplasmatismatis Ventri imponatur. Aut

Aliud. \mathcal{L} . succi corrigiolar succi consolidæ maj. an. \mathfrak{z} ii. album. ovorum n. i. Conquassatis admisce: q. s. farinæ fabar. aut far. hordei, fiat catapl. cui, ut præstantius constringat, admisceri possunt & pulv. Acatiz, ptydii & sang. Draconis.

Interna. *Trochisci de baccis sambuci.* Intra corpus vero plurimum confert, si cum lacte in quo ferrum extinctum est exhibeatur. \mathfrak{z} i. pulv. Troch. de sambucis qui ita conficiatur.

\mathcal{L} . Far. fab. q. s. & cum q. s. succ. bacc. sambuci in Troch. formentur, qui exiccati in usum referuntur. Plurimum constringit alvum infantium si \mathfrak{z} i. aut s. pro ætatis ratione coaguli hædi cum aq. plantag. aut cum lacte amygd. exhibeatur. Verum eo die quo infans coagulum sumpsit, à lactatione abstinendum est. Efficaciss. quoque est remedium subsequens pulv. \mathfrak{z} i. cum lacte exhibitus.

\mathcal{L} . Sem. lapatii acuti, sem. uvarum torrefact. an. \mathfrak{z} ii. Gland. sem. papav. albi an. \mathfrak{z} s. Olibani \mathfrak{z} s. conterantur fiat pulvis tenuiss. Aut

\mathcal{L} . Sang. Dracon. myrtill. balaust. an. \mathfrak{z} ii. fiat tenuissimus pulvis, cujus \mathfrak{z} i. propinetur cum lacte. *Land. opiat gr. ii. vel iii. exhibita valde quoque hic profunt.*

Egregiè etiam sistit alvi fluxorem suppositor. ex pulv. Acatiz \mathfrak{z} i. Opii gr. iii. & pauxil. cera confectum, alvoque infantis insertum.

Utiliter quoque infanti pulmentum ex far. fab. & ovi luteo ad duriciem assati & cum lacte chalybaro commixti datur. Præstat & frustulum Ichthiocolle in lacte coquere, & crebrius infanti sugendum præbere. Aut

\mathcal{L} . Epatis bubali q. s. assati & in pulv. redacti, cujus \mathfrak{z} i. aut \mathfrak{z} s. exhibeatur cum lacte in quo incocti sunt flor. verbasci, aut flor. stachad. citrinæ.

5. *Alvus infantium adstricta indurataque quibus remediis curatur?*

Στεγνότης ἢ ἡγιδίαι, Alvi obstructio est quando infans excrementa egerere nequit. Contingit hoc malum ut plurimum aut ex epatis renumque calore immoderato, attracticisque potentæ vehementia, aut ex obstructione meatus bilis ad intestina.

Curatur in infantib. alvi obstructio re- mediis alvum lenientibus, quæ cum nutrice tum infanti sunt exhibenda. Nutrix itaque vescatur lacte cum saccharo ebullito, aut prunis coctis eorumque jusculo, in quo nonnihil sol. senæ est incoctum. Infanti autem tuto præberi possunt. \mathfrak{z} iii. aut iii. vel pulp. cass. vel Mannæ in jusculo prunorum resolutæ. Item infanti præberi utiliter possunt \mathfrak{z} i. mellis, aut \mathfrak{z} i. Terebinth. quod non tantum Ventrem solvit, sed & epatis obstructions tollit. Ano vero inferatur suppositorium ex melle cum pauxillo sale & pul. colocynth. factum aut ex sapone albo; aut ex radice malv. vel alth. formatum & ol. chamæm. illitum.

Venter & umbilicus inungatur ol. calido chamæm. in quo parum colocynth. est coctum. Aut imponatur umbilico fel. bubal. molli lana exceptum. Valet plurimum & nucis juglandis testa butyro infarcta, cui inspersus sit pul. vel colocynth. vel scamon. si applicetur umbilico. Clystere quoque, si commodè inferi queat, hujusmodi alvo infundendum est.

Enema.

℥. Ol. olivar. ʒvi. sacch. communis ʒ i. s. luteum ovi unius salis ʒ i. & lactis q. s. commisceantur & infundantur ano.

6. *Lumbricorum seu vermium in Infantibus quæ sunt causa, signa, & quæ eorum curatio?*

Lumbrici unde generantur.

Ελμίνθες lumbrici. Ex putrefacta tepidaque colluvie veluti in fimo, ita & in intestinis generantur vermes & lumbrici. Lumbricis autem scaturire pueros ex hisce notis deprehenditur: Oculi pallidi aut crocei conspiciuntur, tussi arida molestantur, in somno crebro contremiscunt, & dentibus strident, facie pallent, & tamen sæpe genæ rubore perfunduntur, statimque iterum pallescunt, de dolore Ventris conqueruntur, ac si in Ventriculum repant lumbrici, nausea & vomitione subinde laborant, & nares creberrimè confricant ac scalpunt, & halitum fætidum expirant.

Curatio.

Curatio lumbricorum consistit in eorum enecatione & expulsionione; utrumque egregiè præstat fel bubalum, cui non nihil pul. cymini, colocynth. & aloës est admixtum, quod stupa seu lana in modum sphæculæ formata exceptum umbilico infantis adfigetur.

Spir. ☉

Extinguunt & expellunt quoque lumbr. gutt. v. aut vi. ol. vitrioli pro ætatis ratione per aliquot dies jejuno existente Ventriculo cum pauxillo vini exhibitæ. Auxiliantur quoque aq. stillat. polygoni & graminis.

Lumbrici pulverisati.

Sed mirifica vis est in lumbricis enecandis & propellendis, si lumbrici alterius pueri eloti & exsiccati in pulverem redacti cum pauxilloque saccharo mixti, ad ʒ i. aut ʒ s. cum lacte aut hydromel, exhibeantur. Adultioribus pueris mane ac vespere per aliquot dies pulv. sem. fantonici ʒ s. aut ʒ ii. cum hydrom. exhibere, plurimum confert. Enecat enim & expellit lumbricos, ut vulgata testatur experientia.

Supposito-ria lumbricos deorsum revellentia.

In subducendis lumbricis antequam remedia intra os exhibeantur, lac aut mel. cum molli lana exceptum & an. insertum irritat lumbricos, ut ad inferiora repant.

At vero si Ascarides id est exigui vermiculi, iis similes qui in putrefacto caseo conspiciuntur, hæreant in recto intestino sive ano, tum mollis lana imbuetur ol. amygd. amar. cui aloës non nihil sit admixtum, & ano inferatur. Folia persicorum virescientia parumque contusa & instar catapl. umbilico & Ventri imposita enecant & propellunt lumbricos. Plura de exturbatione lumbricorum ex superioribus peti possunt. Lib. 4. sect. 3. q. 8.

Ascaridum remedia.

Folia Persicorum.

7. *Umbilici infantum eminentia & intumescencia, quæ sunt causæ & remedia?*

Ἐξομφαλον πᾶσι ☉ umbilici intumescencia extraque cutem justo altius prominencia, contingit infantibus vel propter exulcerationem vel propter flatum humoresque ibidem collectos, aut ex continuo ploratu, vociferatione & vehementi tussi. Contingit quoque si ex rupto peritonæo ad umbilicum devolvatur pars intestini, quam affectionem Ramicem vocant, de qua alio in loco tractabitur.

Umbilici prominencia unde.

Hernia umbilicalis.

Curatio in infantib. umbilici prominencia talis est. Præstat intra corpus infantulo exhibere ʒ i. pul. rad. scrophulariæ cum lacte. Extra vero corpus prominenti umbilico hæc seq. commodè imponi possunt, & fasciis convenientibus illigari.

Curatio. Rad. scrophulariæ.

Si umbilicus infantis exulceratus & inflammatus intumuit ol. rosar. in quo cerussa lota est contrita lana molli exceptum imponatur, aut albu. ovi cui pulv. thuris est admixtus, & nonnihil Acatiæ & psydii eodem modo imponatur. Aut imponatur Emplast. è cadmia, quod officinis Griseum nominatur.

Topica in inflammatione umbilici.

Si ex flatulentis spiritibus nimioque ploratu umbilicus promineat, quod fit, quando aut tussunt, aut continuè plorant infantes, præstat hoc cataplasma imponere.

Si ex flatibus vel ploratu. Cataplasma.

℥. Sem. cymini, lupinorum & paccar. lauri an. p. æ. pulverata cum rubro vino ad pultis formam decoquantur fiat cataplasma.

Si ex humorum adfluxu intumescat umbilicus, imponatur catapl. ex pul. spicæ fluxu hu- Si ex ad- fluxu hu- morum.

derasa & cum succo parietariæ in unguenti formam redacta.

Therma.

Deinde præstiterit puerulos ad thermas sulphuris & aluminis participes deducere, in iisque crebro balneare, vel ex iisdem materiis confusis addita pice balneum, conficere.

Pulvis singularis.

Intra corpus vero plurimum juvat puerulo ituro cubitum seq. pulvisculi ῥ i. aut 3 s. cum aq. fol. querci exhibere.

℥ . Testicul. leporis tostorum 3 i. gutturis galli cremati, vesicæ porcinae crematæ an. 3 s. gland. ῥ ii. sem. rutæ, fol. nepetæ an. ῥ i. fiat pulvis subtilissimus.

Vesica usta pulvis.

Vesica quoque porcina aut ovilla per se usta, & cum jusculo crebro exhibita magnum confert præsidium.

In paralyssi musc. vesica.

At si muscoli in cervice vesicæ paralyssi laborant, ita ut nec interdiu nec noctu retinere queant urinam, sed inscius defluat, præstat exhibere ῥ i. aut 3 s. castorei & myrrhæ p. æ. simul mixtorum cum hydromelite.

Pulvis.

II. *Hernia in puerulis unde excitatur & quibus remediis curatur?*

Hernia unde.

Κήλη Ramex Arabib. Hernia est ubi peritonæum aut perrumpitur aut relaxatur, ita ut intestina vel in inguina descendant, aut in scrotum delabantur. Et ubi intestina ad inguina decumbunt $\beta\epsilon\epsilon\alpha\nu\omicron\kappa\eta\lambda\eta$ id est inguinum ramex & ruptura, sed ubi in scrotum delabuntur $\epsilon\nu\tau\epsilon\rho\omicron\kappa\eta\lambda\eta$ id est intestinorum ramex nominatur.

Causa.

Causa ruptionis aut laxationis peritonei in infantibus est violentus ploratus, aut vehemens tussis, aut tenesmus, aut præceps lapsus.

Signa.

Dignoscitur ex tumore extuberantiaque vel inguinum vel testiculorum & scroti.

Curatio.

Curatio Ramicis in puerulis ejusmodi est instituenda l. si alvus sit adstricta emolliatur,

Alvum e mollientia.

& pituitosa excrementa subducantur aut pulp. cassiæ 3 vi. aut mannæ totidem drachmis in jusculo prunorum coct. dissolutis.

Repositio intestini.

Deinde artificiosè ac molliter infante in dorsum reclinato intestinum sive in scrotum sit devolutum, sive in inguina delapsum suble-

vetur, & in proprium locum retrudatur, statimque ex seq. cataplasmatibus unum, quod videlicet cuique maximè convenientiss. videbitur, imponatur, & subligaculo artificiosè formato, & circa rupturam instar pulvinaris bombace infarcto alligetur ac constringatur.

Præterea autem pueruli ramice laborantes per totum curationis tempus à vehementi corporis agitatione ac motu, tussi & spiritus cohibitione ac vehementi conatu in egerendo studiosè abstineantur.

Inter cætera rupturarum ac ramicum puerilium remedia celebriora sunt hæc sequentia.

℥ . Arnoglossi cum rad. M. ii. lentium M. iii. simul coquantur ad molli-

ciem & contundantur in mortario contrusisque addatur far. lupinorum q. s. rad. aronis, capill. veneris, faniculæ albæ an. M. i. contusa coquantur in butyro salis experti, & majore mense expresso & ping. gall. an. q. s. Quibus admisce. far. lupinorum, fiat cataplasma, quod tepidum sing. diebus ruptæ regioni imponatur, aut si ruptura recens sit.

℥ . Album ovorum n. iii. quibus concussis commisce. pul. tenuiss. thuris, gallarum, acatiæ, psidiæ, succini, myrrhæ an. 3 ii. Aluminis 3 i. quibus probè commixtis & bombace sive lana xylina, aut molli lana exceptis, rupto loco imponantur.

His præcatis, validius rupturam conglutinat hoc sequens emplastrum.

℥ . Myrrhæ, nucis cupressi, aloës, acatiæ an. 3 ii. quæ omnia tenuissimè pulverata excipiantur cum q. s. glutinis piscium, quod Græci $\iota\chi\theta\nu\alpha\nu\omicron\kappa\eta\lambda\eta$ nominant & reducantur simul subacta in empl. formam, & per alutam extensa rupto inguini imponantur.

Nec autem interim ea quæ intra corpus exhibentur prætereunda sunt, quæ vim habeant ruptas membranas conglutinandi. Præbeantur itaque bibenda puerulo singulis dieb. mane ac vespere iii. cochlearia seq. potionis.

℥ . Ar-

Subligaculo usus.

Motus inhibendus.

Cataplasma ad rupturam.

Epithema.

Emplastrum.

Decoctum ad hernias utilis.

℥. Arnoglossæ, faniculæ an. M. s. rad. charyoph. symphyti maj. sarmenti Indici an. ʒ s. Agrimon. p. r. coquantur in ℥ i. aq. in dupl. vase, & addito saccharo candi q. s. fiat haust. qui tepidus propinetur. Plura de Ramicis curatione paulo post tradituri sumus, unde convenientia puerulis remed. huc transferri possunt.

12. Ani procidentia infantum unde & quæ ejus sunt remedia?

Ani procidentia causa. Σφινκτηρ musculus anum claudens. Non nunquam relaxatur, & foras prolabitur in puerulis hic musculus, aut ob alvi lubricitatem humiditatemque aut ob musculorum ani refrigerationem, aut ob vehementem egerendi conatum, ut fit in tenesmo.

Curatio. Curatur hoc malum in puerulis & infantibus hisce seq. remediis.

Epithema. ℥. Cuminum contusum in cerevisia decoctum, & anum elapsum eo liquore tepido colluito, ac postea mollior sphincterem prolapsum in anum retrudito ac recondito, infantemque aut puerum in balneum usque ad umbilicum collocato, in quo incocti sunt cort. mali granat. gland. myrtil. gallæ & aluminis singulorum ad placitum. Postea pessulum ex lina xyliina fact. seq. inperfo, ano inserito.

Inseffio. ℥. Pul. myrrhæ, aloës, gallarum, mast. sumach. balaust. an. ʒ i. fiat pul. tenuiss.

Pessulum. At si musculi ani prolapsi ob diuturnitatem neglectumque intumuerint, tum necesse erit eos prius tepidis fomentis aut balneis emollire ac tractabiles reddere. Fomentum vero seu balneum confici potest ex malva, althea cum rad. chamæm. rad. lilior. alb. & sem. lini simul contusis & coctis, & anus deinde inungi ol. lilior. albor. & ita rursus in proprium locum imponi, remediisque supra dictis claudi.

13. Tenesmi seu tentionis infantum quæ sunt causæ & remedia?

quæ puerulos ad continuam egerendi cupiditatem & conatum impellit, & tamen aut nihil aut exiguum mucum & cruentam fa- niem excernunt.

Causa hujus mali est crassa frigida & ta- men ex putredine falsa tiullanque pituita recto intestino impaeta.

In tenesmo acerbi excitantur & colicis si- miles dolores.

Curatio tenesmi calidis & incidentibus fla- tumque dissipantibus remediis perfici debet.

Intra corpus itaque conferunt. ℥. pul. cy- mini nasturt. an. ʒ ii. anisi ʒ s. misceantur, fiat pul. cujus ʒ s. cum haust. cerevisiæ calefactæ in quo nonnihil butyri recent. aut quod præstantius est ol. lauri sit resolutum. Utile quoque est infantibus ac puerulis subinde bibendam præbere aq. stillat. verbasci, ac si ætas patiarur utiliss. est clysterem recto intestino puerorum infundere hac ratione paratum.

℥. Fol. verbasci, chamæm. anethi, centaui. mi. an. M. s. sem. cymini, bacc. lauri ana ʒ ii. concisa & contusa coquantur in q. s. ad tertias, cujus juris colati accipe ℥ s. in quo ebulliat rursus ʒ i. pulpæ colocynth. in linteolo ligatæ. Deinde huic liquori admisce hieræ simpl. ʒ s. & ol. lauri ʒ vi. salis ʒ i. fiat enema. Prodest & inseffio balneumque ex fol. & rad. verbasci confectum. Aut ℥. verbasci M. iiii. fursur. triticeï M. ii. sem. cymini ʒ i. bacc. lauri ʒ i. contusa insuantur sacco lineo, & in aq. ebulliat, cui expresso & calenti infideat æger. Plurimum quo- næ præsidii adfert suffitus terebinthi- nae prunis injectæ, fumoque ejus per infundibulum in anum recepto. Aut ℥. cymi. anisi, anethi an. ʒ i. colopho. ʒ s. sarcocollæ ʒ i. misce contusa, & prunis inspergantur, fiat suffitus.

Tenesmus quid.

Tenesmus est tentio recti intestini violenta,

Ttt 3 SE-

SECTIO V.

DE EXTERNIS ET UNIVERSALIBUS TOTIUS CORPORIS PUERORUM AFFECTIBUS.

1. Excoriationi seu ulcerationi circa inguina, axillas & collum infantium quare media conveniunt?

Excoriationes unde.

Π *Αερίσημα*. Attritiones seu excoriationes cutis. Nisi in infantibus illa loca, ubi caro plicas efficit, veluti sunt loca circa inguina axillas & collum subinde à nutricibus studiosè laventur ad ignemque siccantur ab urina sudoribus sordibusque ibidem collectis, cuticula facilè abraditur & exulceratur, quod malum nostri *Schmer-tzen der Kinder* nominant.

Curatio.

Curatio est ut locus attritus & exulceratus sedulo aq. tepida ablatur in qua incocta sunt exiccata flor. violar. aut hord. ex cortic. aut rad. altheæ. Post lotionem molliss. linteolis abstergatur & ad luculentam flammam exiccetur, moxque ulceri inpergatur vel caries ex piceis asseribus exesis aut hord. tenuiss. farina, aut pul. iridis Illyrici, aut pul. rosarum.

Dolorem sedantia.

Ubi vero ejusmodi excoriatio acerbiores excitat in infantibus dolores, primum mitigandi sunt dol. mucag. ex sem. citon. cum aq. plantag. facta, & cum linteolo excepta, ulceribusque imposita: aut mucag. tragant. in aq. rosar. macerati, aut albug. ovorum cum aq. rosar. subacta. Aut *℞*. albu. ovi. n. r. ol. violar. *℥* i. litharg. *℥* i. s. & diutiss. conterantur in mortario plumbeo ad crassitatem linimenti, quæ rasura linteoli excepta ulceribus imponatur.

Sanguinem purificantia.

Verum si ulcera illa ex impuritate sanguinis non tantum in prædictis locis, sed & aliis partibus contingant, sang. prius vel caust. *℥* s. aut manna *℥* vi. in lacte resol. purificandus erit. Deinde excoriatio lavetur decocto violar. alth. & achanti mollis, quam brancam ursinam vocant & tussilagi. & catapl. ex medulla panis similacei, in lacte macerati, aut pulmentum ex grumis a-

Cataplasma.

venæ imponatur, & ulceri inpergatur cinis chartæ sive papyri aut impon. seq. empl. per linteolum extensum. *℞*. Ol. rosar. *℥* ii. ce. Empl. ræ *℥* s. litharg. *℥* s. boli armen. *℥* vi. rad. consol. maj. *℥* ii. mucag. sem. cito. *℥* i. fiat emplast.

Emplastrum. Ol. de palma utilis ter hic quoque inungitur.

2. Variola & morbilli in Pueris unde oriuntur & quibus remediis curantur?

Omnes seu plerique homines experiuntur variolarum & morbillorum per cutim eruptionem, nisi morte præveniantur, Græci & variolas & morbillos unico vocabulo exanthemata, id est cutis eruptiones sive efflorescentias nominant. Plinius autem papulas vocat, nostrates vero variolas, quæ tum musculis scabiei similes sunt *die Kinder Pocken oder Blattern* / morbillos autem, qui rubescentibus punctulis & instar lentis extuberantibus & per totum corpus sparsis, sunt similes, *die Masseln* vocitant. In puerulis facilius, in adultis difficilius & sæpe cum vitæ discrimine curantur.

Causæ harum eruptionum cutis *αερίσημα* Causæ sunt reliquæ menstrui sanguinis, quo in utero nutriebatur fœtus cum aliis impuritatibus humorum mixtus, quas natura per poros expellere conatur. *Περίσπαστος* Causa est contagiosa & singulariter ternæ. *dispositus* aër movens naturam ad expellendas sordes. Instar enim pestilentis contagionis grassatur variolarum morbillorumque eruptio, & eodem tempore plurimi hoc malo corripuntur & maxima ex parte contagium ab uno ad alterum pertransit. *Multi enim iis corripuntur, ad quos ab aliis per contagium hoc malum non est delatum. Ut potius ex singulari calî ac aëris constitutione in corporibus dispositis semina exanthematum delitescencia suscitari sit præsumendum. Quod ipsum & a forti imaginatione aliquando in meticulosi fieri videmus.*

Sunt nonnunquam variolæ atque morbilli prorsus pestiferi, & quam plurimos puerulos extinguunt; quales fuere anno Christi 1574. in insula Rugia, & Vicina urbe Stralsundensi, in quibus tanta erat putrefactio, ut detractis crustis pustularum in sub.

Exanthemata sæpe sunt pestifera.

subcutaneo ulcere vivi vermiculi reperi-
rentur.

**Signa em-
pionem
præceden-
tia.** Signa exanthematum antecedentia sunt
dolor capitis, rubedo faciei, lachrymæ spon-
taneæ, febricula, anhelitus difficultas, tre-
mor partium, quam subsequuntur eruptio-
nes pustularum vel rubescentium puncto-
rum.

**Signa hu-
morum
morbifico-
rum.** Impuritas humorum ex colore exanthe-
matum dignoscitur. Sanguinis enim impu-
ritatem rubedo exanthematum, flavæ bilis
eorum flavedo, pituitæ albedo, nigredo ve-
ro melancholici humoris vitium ostendit.
Quin & morbilli vitiosorum humorum te-
nuitatem, variolæ autem crassitiem ar-
guunt.

**Prognosti-
con.** Exanthematum nigredo aut lividitas, u-
rina viridis & cruenta, & respirationis diffi-
cultas, pernitiola & lethalia sunt signa.

Curatio. Curatio in exanthematibus. Prima cura
debet esse, ut statim post comparentia signa
per cutem quam celerrimè & copiosè erum-
pant. Secunda sollicitudo debet esse certa-
rum partium præservatio, ne à morbillis va-
riolisque lædantur. Omni itaque cura &
studio cavendum est, ne vel aëris ambientis
frigidityte, vel medicamentis refrigeranti-
bus erumpentes variolæ morbillique intro
repellantur, sed statim ubi pueruli de capi-
tis dolore, siti aut febricula conqueruntur,
in loco tepido lectoque molli mundis lin-
teolis instructo, rubeoque panno oblecto
collocentur.

**Aëris fri-
giditas e-
vitanda.**

**Dietæ
conve-
nientis.** In vietus ratione utatur moderato cibo
ac potu & facillè concoquibili, quales sunt
ova sorbilia recentia, juscula ex ovis & cere-
visia, juscula pullorum, lac amygd. cremor
pitisanæ, poma assata, pruna & panis lami-
na in hydrom. macerata. A lacte autem pi-
scibus fructibusque recentibus abstineat.
Pro potu utatur, si absit febris, hydromelle
donec erumpant exanthemata, aut cerevisia
clara. Ubi vero febris est adjuncta, utatur
aq. hord. cum cinamom. & ficub. cocta.

**Purgantia
noxia.** Pharmaca purgantia turè eis exhiberi non
possunt, nisi obstructa sit alvus, quæ 3vi.
mannæ in jusculo prunorum resolutis & per-
colatis emolliri potest. Sed si ætas & vires

non obstant, & corpusculum sit plethori-
cum impurum rubicundumque & venæsc-
tio & cucurbitularum affixio cum scarifi-
catione, vel saltem hirudinum applicatio
maxima cum utilitate in furis pedum tenta-
ri potest.

At vero ubi exanthemata sua sponte pri-
mo vel altero die non erumpunt, conandum
est ut vel natura vel arte propellantur, ne
intra corpus remaneant, ut vel asperam ar-
teriam vel pulmonum canales obsideant, sta-
tim enim respirationem intercipiunt, & in
mortis periculum præcipitant. Remedia au-
tem præcipua variolas morbillosque ad e-
ruptionem promoventia hæc sunt. *℞. Fi-* *Decoctum*
cum ping. n. xv. passular. min. 3 i. tragan- *ficum.*
ti 3 ii. sem. faniculi, aquilegiæ an. 3 i. croci
integri 3 i. decoquantur in lb. iii. aq. hord.
in cantha. ad ii. horas cujus 3 i v. mane ac
vesperi exhibeantur. Ac tenerioribus pueru- *Lentium*
lis propinare decoctum glycyrr. & ficuum in *decoctum*
sero caprini lactis satis erit. Plurimi practi- *inutile.*
cantium medicorum utuntur lentium deco-
cto, quam rectè nescio. Certum enim est
lentes crassum & melanchol. succum gene-
rare.

Ego vero ad latentium exanthematum Pulvis
expulsionem seq. pulvisculo semper felici
successu usus fui. *℞. Sem. nastur. aquilegiæ* *singularis*
an. 3 i. scobis unicornu 3 i. aut loco ejus *expulsione*
scobis cornu cervi in septemb. capti 3 s. co- *authoris.*
rall. rub. præparat. margarit. præpar. an.
3 i. si quis addere velit scobem auri precio-
sius redderetur medicamentum, omnibus
tenuiss. contritis commisceantur & ejus 3 i.
infantulis aut 3 s. adultis vero integra 3
cum hydromel. exhibeatur.

Variolæ ubi erumpunt, si acerbos infe-
rant dolores, catapl. seq. imponatur, quod
& dolores mitigat, & ad maturitatem dedu-
cit. *℞. Carnes pomorum assat. farinæ hor-* *Ad dolores*
dei aut lentium an. p. æ. quæ concoquantur *variola-*
cum q. s. aq. ad pulvis formam fiat cata- *rum.*
plasma. *Carapla-*
ma.

At si pustulæ sponte sua non rumpantur, *Quandq*
acu aurea aut argentea pungantur ac perfo-
diantur, & sanies exprimat abstergetur-
que. Aperta ulcuscula commodè ablui pos-
sunt *Quibus*
ablucenda.

sunt aut aqua mellis, aut aq. rosar. in quibus parum nitri sit dissolutum. Dolorem autem ulcerum mitigat aut illitio unguenti de cerusa camphorati, aut pomati.

Partes que munienda. Post eruptionem exanthematum statim maxima cura habenda est oculorum, narium gutturis, pulmonis & faciei. Oculos itaque statim in initio & deinde quotidie auro puro aut ungarico leniter conficere prodest. Id enim arcet ne in oculis erumpant exanthemata. Utile quoque est oculis

Collyrium. sæpe illinire seq. collyr. ℞. Aq. plantag. rosar. euphras. an. ʒ s. in quibus dissolvantur camphoræ, gr. ii. & croci gr. i. fiat collyr.

Epithema. Aut imponatur oculis seq. epithema. ℞. Aq. ros. succi verbenæ an. ʒ i. album. i. ovi, concutiantur & linteolo excepta oculis imponantur. Si vero contingat, ut oculi ob palpebrarum tumorem ex pustulis aperiri nequeant, fomententur laventurque oculi seq. decocto.

℞. Sem. fenugr. sem. lini an. ʒ s, sem. malvæ M. i. coquantur in q. s. aq. ad medias.

Nares que præferunt. Nares si à pustulis exanthematum occupentur, subinde acetum rosac. odorandum naribus admoveatur.

Faucium remedia. Gutturi vero pustulis obfesso, hisce remediis & illinitionibus succurrendum erit, nimirum crebro illiniatur confect. diamof. aut rob. è ribes aut mel. rosar. cui parum ol. vitr. sit admixtum, quæ omnia per se illiniri possunt, aut cum aq. prunel. q. s. in gargarismi formam redacta.

Pulmones ut muniendi. Pulmones si fuerint infecti, respirationem difficilem efficiunt, & ut dictum est, perniciem minantur. Huic itaque symptomati sequentibus remediis opem ferre necessarium erit. At primum si adsit caliditas corporis.

Eclegma refrigerans. ℞. Far. fabar. ʒ ii. sem. papav. albi ʒ i. tragacanthi, amyli an. ʒ s. tenuiss. pulverata excipiantur q. s. syr. de hyssopo, bene commixtis omnibus fiat electuarium lambitivum quod crebro inferatur & deglutiat. Aut si nullus adsit præternaturalis calor.

Eclegma calidum. ℞. Zedoar. glycyrr. an. ʒ i. croci ʒ s. gum. ammon. cum aq. junip. soluti

& percolati ʒ ii. misc. cum syr. de hyssop. & crebro deglutienda ori inferantur. Aut illiniatur deglut. syr. ex sach. candi cum aq. junip. accensa paratus, & ad syrapi formam deductus, cui commodè admisceri potest. ol. anisi ʒ s.

Facies a Faciei quoque in exanthematum pustulis non levis est habenda ratio, & studiosè providendum, ut per totum ægritudinis tempus custodiantur pueruli, ne pustulas per faciem exortas scalpendo decerpant, aut faciem manibus confricent contrectentve, donec pustulæ sua sponte decendant. Nisi enim id præcaveatur, stigmata & vestigia pustularum decerpitarum per totam vitam in facie relinquantur. Ubi vero per incuriam pustulæ decerpæ fuerint, tum præstat earum vestigia per noctem leporino sanguine inungere, & mane cum aq. tepida rosarum aut far. fab. cum aq. calefacta mixta rursus abluere, aut illinitio cicatricibus sequens linimentum.

Linimen. ℞. Far. fab. lupinorum an. ʒ ii. cum q. s. urinæ pueri fiat linimentum, quod mane cum aq. rosar. cal. abstergetur.

Variola- Præter hæc symptomata contingit nonnunquam, quod exanthemata adeo sint virulenta, acria & erodentia, ut locum occupatum exulcerent, & non facilè sanentur. Imo & sæpe ad ossa penetrant, avrosos & labefactatis ipsis derticulationibus ut nonnulli inde motu membrorum quorundam privati sint, & particulas ossium ex cubiti & humeri articulis exemptas esse, connatis postea inter se aliis audiendi alii olfaciendi sensum amiserint: aliis eroso palato facultas loquendi sit depravata, & alia enormia multoties subsequantur symptomata ex corruptione interiorum viscerum, quæ sæpe etiam agros planè interimunt.

Bilem a- Quo in casu bilis adusta ante omnia domanda est potione ex syr. rosar. violar. & cichor. cum aq. lactu & indiv. mixtis. Deinde ferox humor subducatur ʒ ii. syr. rosati sol. aut ʒ iii. elect. rosar. sol. cum aq. cichor. mixtus, vel rhabarb. infuso.

Quin

Quin & epatis caliditas mitiganda est hypochondrio dextro inuncto cum ol. rosar. nymph. & violar. *Epithema quoque ex Sacch. h. in aq. cichorii dissoluto, extrinsecus applicari potest.*

Ulceribus adhibenda. Ulceri autem seq. epithema utiliter imponitur. \mathcal{V} . Sulphuris citrini \mathfrak{z} s. camphoræ \mathfrak{D} ii. conterantur diutissime cum aq. rosar. q. s. vel cum aq. plantagin. \mathfrak{z} iii. fiat epithema: aut abluatur seq. decocto. \mathcal{V} . Rosar. sic. folior. aut extremitatum surcul. querci, plantag. an. M. s. myrtil. \mathfrak{z} s. thuris, mastich. an. \mathfrak{z} ii. coquantur contusa in q. s. aquæ, fiat lavatorius liquor. Post ablucionem & abstersionem ulcerum inspergatur seq. pulvis. \mathcal{V} . Thur. mastich. rosar. sarcocollæ, boli armeni an. \mathfrak{D} i. pulverentur tenuissime. Plura ex chirurgicis & curatione luis Venereæ huc transferri possunt.

3. *Crustosa scabiei puerorum qua sunt causa & remedia?*

Lactumen quid. Kneia, lactumen, nostratibus *der hrennende Grind* est scabies crustosa aspera & dura, potissimum in capitibus & facie aliisque partibus exorients. Lactumen dicitur forte, quia à lactis impuritate, acedine & salsa pituitæ admixtione oritur.

Curatio. Curatio ejus ut plurimum naturæ committitur, cum non adeo notabiles inferat infantibus dolores. Processu enim temporis exiccata crusta spontè decedit.

Laborandum autem est in hujusmodi scabiei eruptione, ut lac nutriticis emendetur nutriticis quoque quotidie bibendum propinetur mane ac vesperi serum lactis caprini, cui suc. fumaris sit admixtus, sintque in eis decocta senæ fol. centaury & agaric. troch. in lincolo colligata an. ad placitum Medici. Tum enim maturius decedit crusta & non renascitur. Interdicatur quoque nutritici ut ab aromatibus, calefacientibus eduliis, salitque & caseo abstineat.

Inunctio faciei puerorum. Ubi vero infantulorum faciem talis scabies dehonestet, & usque ad oculos se extendat, eosque lædere posse metuatur, vernix pictorum, vel pix ex betula arbore, communiter *Begen dīsa*, vel liquor ex be-

tula sudans in igne inter arandum illiniri scabiei, aut per lintecolum extensa instar catapl. imponi possunt.

Ab omni autem remediorum genere quæ constringunt ac reperiunt, qualia sunt refrigerantia, abstinendum erit. Commodè quoque in balneis locus affectus abluipotest aq. calida, in qua cocta sint fol. alth. & malv. fl. chamæm. melilo. etrosa. & sem. fænugr. Utiliter quoque inungi potest scabies ol. chamæmelino.

4. *Febris puerorum unde excitatur, & qua ejus sunt remedia?*

Febris definitionem & differentias paulo post tradituri sumus; Febris infestantur pueruli sæpè, & tunc maximè, cum eis dentes provenire incipiunt. Tum enim ex intumescencia gingivarum & acri dolore, quæ sæpè & in adultis febrem excitant, inflammantur infantes.

Signa hujusmodi febricularum puerilium sunt, totius corporis externi ad tactum fervor, & insolitus calor suisque continua.

Curatio febricular. in infantibus consistit in alteratione caloris, per victus rationem refrigerantem & humectantem, nutriticis, & remediorum convenientium ipsis puerulis administratione.

Nutrix itaque vescatur cibis refrigerantibus, quales sunt cremor ptisanæ, hordei decorticati, jusculorum cum uvis immaturis coct. aut cum succo granatorum aut aceto rosaceo conditum. Item lacte ex amygd. & sem. papav. albi cum aq. hordei parato: Vel lacte ex 4. sem. frig. maj. confecto & pauco sacch. condito, commodè quoque nutritrix vesci potest in acetariis lactuca & portulaca, & jusculis ex cerasis tum recentibus tum arefactis paratis. Potus sit aq. hordei aut aq. stillat. cichor. & endiviæ cum suffic. q. sacch. candi dulcorata, cui & succi granatorum & arantiorum nonnihil admisceri potest.

In puerulis vero febricitantibus ita procedendum erit. Primum pro ætatis ratione subducatur alvus \mathfrak{z} iii. aut \mathfrak{z} iiii. pulpæ cassiæ aut \mathfrak{z} s. vel \mathfrak{z} v. mannæ in jusculo prunorum solutis & ad sugendum exhibitis. Deinde si-

Vuu de si-

Refrigerantia.

de siticulosis puerulis crebro bibenda offerantur aq. stillat. violar. purpur. fragorum & succ. arantior, cum sacch. candi dulcorata, sæpeque infantium ori illiniatur syr. acetos. citri vel syr. violar. vel bibenda offeratur aq. card. bened. cum præscriptis syr. mixta.

Linimentum.

Foris autem præstat infantibus totam spinam dorsi & utraque hypochondria & sterni inferiorem furculam, ubi est orificium Ventric. seq. linimento quotidie bis inungere \mathcal{L} . Ol. rosar. violar. nymph. an. \mathfrak{z} \mathfrak{r} i. mucag. psyllii aut sem. cyton. cum aq. rosar. factæ \mathfrak{z} \mathfrak{r} s. ceræ cand. parum. fiat linim. quod eluatur ter quaterque cum aq. aut suc. rosar. & postremo admisc. gutt. vi. aceti rosar. fiat linimentum.

Epithema.

Quin & orificio Ventric. commodè imponi potest catapl. ex far. hord. excorticati cum suc. absynth. & plantag. aut sempervivi subactis, & in formam pulvis redactis. Hypochondriis autem utiliter imponi potest epithema ex aq. rosar. \mathfrak{z} \mathfrak{r} i. suc. semper vivæ \mathfrak{z} \mathfrak{r} s. & speciebus diatriasand. simul mixtis confectum, & moderatè tepidum.

Linimentum ad somnum conciliandum.

Si à continuis vigiliis infestentur infantuli in febrib. eorum tempora inungi non incommodè possunt unguento populino, cui lac. muliebre sit admixtum: aut imponatur temporibus lac ex sem. papav. albi & album. \mathfrak{r} . ovi, & q. s. aq. rosar. simul conquassatis confectum & linteolis exceptum.

5. Inflatio sive intumescencia cutis totius corporis infantium unde oritur, & quibus remediis curatur?

Cutis intumescencia.

Ἐμφύσησις inflatio seu intumescencia cutis in puerulis. De Ventris puerorum intumescencia supra nobis dictum est; hoc vero loco de cutis sufflatione per universum corpus, qua infantes nonnunquam afficiuntur, breviter dicturi sumus.

Causa.

Causæ intumescencie cutis αἰσχυρὸν sunt aut crassi & flatulenti spiritus, aut tenues & aquosi humores ex ebullitione vitiosorum humorum ad cutem propulsi, quos tamen natura per poros discutere non

potuit. Προσπνευστικὰ Causæ sunt venenata alimenta, & densitas obstructioque pororum cutis, quæ obstructio contingit à crasso sudore sordibusque quibus pori infarcti sunt, vel ab aëris ambientis frigiditate.

Signa manifesta sunt.

Curatio hoc modo instituenda est. Si vitiosorum humorum copiâ infarctum est corpusculum, subducatur pro ætatis ratione aut \mathfrak{z} s. cassiæ, aut \mathfrak{z} vi. mannæ in prunorum jussculo resolutæ. Deinde exhibeatur \mathfrak{D} \mathfrak{r} . aut \mathfrak{z} s. theriacæ Androm. in pauxillo vini resolutæ, aut crebro exhibeantur \mathfrak{r} i. Cochlearia vini in quo coctæ sunt rad. Ebuli & gr. Junip. cum pauxillo Sacchar. mixta.

Foris autem valde prodest, & statim inflammationem aufert, si fol. Ebuli & sambuci, & in hyeme rad. ebuli & cort. sambuci & gr. Junip. contusa in vino albo decoquantur, & eo vino infans colluatur, vel prædictæ herbæ contundantur, eisque pueruli corpus involvatur. Aut in prædicto vino pannus cæruleus novus imbuatur, eoque tumidum corpusculum involvatur. Eadem ratione ac utilitate uti possumus vino albo, in quo loco præscriptoram fol. incoctæ sunt flor. chamæm. origani, scordii & rutæ & sem. cymini. Conferunt quoque plurimum in dissipandis subcutaneis Vaporibus inunctiones ex ol. rutæ, anethi & chamæm. cui parum ol. vitrioli aut ejus loco aceti vini sit admixtum. Præterea in potu convenientiss. est puerulis propinare lac ex sem. canabis paratum. Quæ reliqua sunt pharmaca huc commodè referri possunt ex curatione inflati ventris puerorum.

6. Macilentia sive extenuatio corporum puerilium unde & quæ ejus sunt remedia?

Ἰσχυρία macilentia. Extenuantur & macilenti sunt pueri nonnunquam ex antecedentibus morbis, nonnunquam ex tæbe & infantes. αἰσχυρία. Quidam natura sunt macilenti, quos non curamus.

Qui autem extenuantur post antecedentes morbos, eos curare possumus exquisitis alimentis & nutritia.

Curatio.

Sudoriferum.

Lavacrum valde utile.

Fomentatio alia.

Inunctio.

Lac canabinum.

Vide pag. 71.

Vnde extenuantur infantes.

naturam corroborantibus pleneque nutritibus alimentis. Veluti est lac & pulmentum ex amygdalis mundatis & nucleis pineæ, & carnibus perdicum caponumque contusis, & cum vino malvatico, si absit præternaturalis calor, præparatis, & ovis forbilibus.

Foris autem convenit puerulos extenuatos quotidie in lavacrum tepidum collocare aq. dulcis, in quo incocta sunt capita & pedes arietini mundati: Sunt autem in aq. eousque coquenda donec ossa ab omni carne cuteque sunt resoluta. Post lotionem autem abstergerendi sunt pueruli mollibus lintheis calidis, eorumque articuli ac maximè spina dorsi inungenda est seq. linimento. *℞.* butyri recentis salis experti, ol. rosar. violar. amygd. dul. an. ʒ ii. Axungia por-

cinæ recentis ʒ iir. ceræ cand. q. s. resolvantur ad lentum ignem, fiat unguentum, cui refriger. admisc. flor. lactis mulieb. ʒ ii. unguentum: Aut *℞.* Axungia porcina, gallinæ an. ʒ s. ceræ alb. q. s. ex quibus colliquatis fiat linimentum, cui admisc. tenuiss. pul. amyli ʒ i.

Si vero ex phthisi tabescunt extenuantur-
que pueruli, crebro eis præbeatur lac capri-
num in quo conserva rosar. est incocta &
lac amygd. aut ex 4. sem. frig. maj. cum q. s.
aq. Tusil. & sacch. confectum.

Extenuantur pueruli nonnunquam ex fascinatione, cujus curatio ab ipso Deo est petenda. Is enim solus potest destruere opera Diaboli.

*Phthisi
remedia.*

*Lava-
cium.*

*Linimen-
tum pro
spina.*

PRACTICÆ FRANCISCI JOELIS LIBER DECIMUS. DE EXTERNARUM PARTIUM MOR- BIS ET AFFECTIBUS.

SECTIO I. DE INGUINUM MORBIS SEU HERNIIS.

1. Inguina quid, & quibus afficiuntur morbis?

*Inguina
quid.*



Ἰσχίον Inguentum. Inguina sunt partes infimi ventris utrinque inter pudendum & femorum internas partes, vel sunt terminus infimi ventris, & initium femorum.

Afficiuntur vero inguina hisce sequentibus morbis:

1. Ramicum speciebus.
2. Glandularum in Inguinibus tumore.
3. Bubonibus ex impura venere.
4. Bubonibus pestilentialibus tempore pestis.

*Inguinum
affectus.*

2. Ramex quid, quot ejus differentia, qua causa, qua signa & quomodo curandus?

Κήλη Ramex, Hernia & Ruptura peri-
tonæi, nostratibus *der Hiel oder der* *Hernia*
Bruch / est ubi peritonæum, omentum
& intestina in se complectens, aut laxatur
dilataturque aut ubi eadem membrana cir-
ca inguina paulo supra pudendum perrum-
pitur. Tum enim laxatum peritonæum in *Ejus disse-*
inguen. subsidet & tumorem efficit, aut in *rentia.*
scrotum delabitur, idque in tumorem ex-
tendit:

Vuu 2

tendit: aut ubi ex ruptura peritonæi, omentum intestina regens, aut Ilion intestinum, (id enim duntaxat inter alia intestina ex peritonæo prolabi potest) in inguina aut scrotum procidit.

Verum præter has partes crebro in scroto colligitur aut aquosus humer, aut flatulentus spiritus, aut in illo ipso innascitur ex affluxu sanguinis carnosâ materia.

Hernia species 6. Differentiæ itaque Ramicum sumuntur à materia, & denominationem habent ab eadem in inguina aut scrotum prolapsa.

Inguinalis. Si itaque intumescat Inguen, Græcis βωνοκήλη, id est, Ramex vel Hernia inguinis.

Intestinalis. Si autem scrotum intumescat ab illapso intestino, εντεροκήλη, id est intestini ramex.

Omenti. Ubi omentum prolapsum fuerit, επιπλοκήλη, id est omenti ramex nominatur.

Aquosa. At ubi aquosa materia collecta fuerit in scroto, υδροκήλη.

Flatulenta. Si flatuosus spiritus, πνευματοκήλη, id est flatulenta hernia.

Carnosa. Si carnosâ materia scroto innascatur, σαρκοκήλη, id est carnosâ hernia nominatur.

Signa species hernia distinguntur. Hæ ramices species inter se his notis distinguuntur. Ubi intestinum aut omenti pars aut peritonæum relaxatum est in inguina aut in scrotum prolapsum est, id est in εντεροκήλη & επιπλοκήλη, tumor non est stabilis & perpetuus, nisi per negligentiam extra peritonæum indureseat. Resupino enim corpore vel sponte in suum locum retrocedunt partes prolapsæ, vel manuum compressione cum murmure repelli possunt.

Tumor stabilis. Sed si aquosa materia, flatulentus spiritus, aut carnosâ incrementa in scroto est collecta, id est υδροκήλη, πνευματοκήλη & σαρκοκήλη, tunc tumor est stabilis & permanens, nec intra corpus repelli potest.

Præterea aquosa hernia instar ædematis mollis est, & pressioni digitorum cedit, & penduli testes graviores sunt. In flatuosa autem hernia leves sunt testes & opposito lumine in obscuro loco tumor transparens & perspicuus est. Carnosa vero hernia subinde augescit, & instar scirrhi dura evadit, & in gangrænam terminatur, id est mor-

tuam partem, carentem sensu ac motu.

Causæ αἰτιολογούμεναι Ramicum & ruptio-
nis peritonæi sunt aut aquosus humor, aut flatulentus spiritus in peritonæo collectus, ejusque tunicam distendens ac dilans. Πρακτικῶς sunt violenta abdominis compressio, lapsus gravis è loco sublimi, violenta saltatio, ponderosæ molis sublevatio, vehemens tussis, spiritus cohibitio & Diaphragmatis compressio, qualis fit in conatu egerendi in tenebrino, aut in flatibus tubicini: in puerulis autem, ut paulo ante diximus, fletus continua ejulatio.

Signa Ramicum manifesta sunt. Ex tumore enim vel inguinum vel scroti, visu tantumque facile deprehenduntur, & eorum differentiæ ex notis jam traditis internoscuntur. Sed tamen, εντεροκήλης & rupturæ propria sunt signa, sive in inguinibus sive in scroto ea accadat, quod nimirum repente contingit, ex clamore, cohibitione spiritus, & infarctione cibi magis increfcit & augeatur, & ut dictum est, resupino corpore non magno labore intra peritonæum reduci potest, quod in aliis speciebus minimè contingit.

Prognosticationis signa. In εντεροκήλη & rupturæ peritonæi ruptione in principio vulnus est ca. parvum & tumor exilis, sed processu temporis ruptura magis magisque dilatatur & tumor subinde augescit. In relaxatione vero peritonæi si ipsum intro repellatur, nullum vestigium tumoris apparet, sed tamen ex levi occasione rursum subsider vel in inguina vel in scrotum.

Periculosa est εντεροκήλη, ubi nec sponte nec manuum impulsione intestinum intra corpus reduci potest, ubi si tussis aut singultus superveniat, perniciem adfert.

Σαρκοκήλη ut plurimum incurabilis est, nisi forsan cum vitæ discrimine castrationem quis subire velit.

Hernia ac potiss. εντεροκήλη & ruptio peritonæi in puerulis facilè sanari potest: in senioribus autem nunquam, aut quam difficilimè.

Curatio herniæ consistit in victus ratione, alvi emolitione evacuationeque in partibus generalibus.

tis elapsæ impulsione ac repositione, Emplastrorum cataplasmatòrumque convenientium applicatione & colligatione; In potionum rupturam sanantium exhibitione, quibus antecedit & prudentia chirurgica.

Dista.

Victus ratio in omnibus Herniæ specibus debet esse tenuis, moderata & parca. In farcto enim cibus ventriculo & intestinis, nec reponi potest pars prolapsa, nec intra corpus retineri. Cibi autem sint ova forbilia, jusscula pullorum, ex cerevisia, cremor hordei, avenæ, pruna Ungarica & similia. Vitet autem omnia edulia flatulenta & multi excrementi, veluti sunt olera, pisca, caseus, & fumo faleque duratæ carnes.

*Evitanda
alimenta.*

Si alvus sit obstructa & excrementis flatibusque redundant intestina, subducatur seq. Clystere. ℞. Malvæ, parietariæ, fol. & rad. Alth. flo. chamæm. an. M. i. concisa coquantur in q. s. aq. ad tertias, colentur, colati juris accipe ℥ xiiii. in quibus dissolve pulp. cassiæ ℥ i. ol. chamæm. ℥ i. salis ℥ i. fiat clyster.

*Enema.**Lenitiva.*

Potest quoque in initio aliquo leni purgante remedio vitiosa colluvies humorum redundans evacuari. Sine autem omni metu, & ampliore deliberatione utiliter exhiberi possunt ℥ ii. mannæ, aut ℥ i. s. pulv. cassiæ in prunorum decocto resolutæ.

Infessio.

At ubi feces induratæ & compactæ in intestinis dolorem ac flatum excitaverint, in lavacrum dulcis aquæ collocetur æger, in qua incocta sunt malva, althæa, flor. chamæm. sem. fœnugr. lini an. ad arbitrium. Post lotionem venter inungatur ol. chamæm. & aneth. aut imponatur cataplasma ex fol. malvæ, althææ, sem. fœnugr. ac lini pulveratis concoctis & q. s. olei admixtis.

*Cataplasma.**Quando
curatio-
nem ru-
ptura ad-
mittat.*

Post evacuationem intestinorum, si peritonæum ruptum esse deprehendatur, diligenter considerandum est, quæ species Ramicis existat. Σαρκοκήλη enim curationem non recipit: & ἐπιπλοκήλη valde difficilem, reliquæ vero curari possunt. In ruptura itaque & ἐντεροκήλη æger supinus collocetur, lumbisque ejus culcitra subjiciantur, ita

ut venter reliquis partibus eminentior sit: Deinde intestina prolapsa, seu quicquid ex peritonæo propendit, sensim ac leniter in corpus reducatur manibus, atque impellatur, reductaque intro retineatur, ruptæque regioni seq. Emplastrum rupturam congruans imponatur.

℥. Mastich. sarcocollæ, sang. Dracon. Emplacort. thuris, blat. bifantiniæ, aloës, strum. boli armen. gypsi, gallatum, psidiæ contrarium. an. ℥ ii. Aristol. utriusque hypocist. pturam. acat. an. ℥ i. symph. ℥ iiii. picis ex vetustis navibus derasæ, colophonia ℥ i. Quibus resolutis admisceantur præscripti pulveres & mucago ex Ichthiocolle & usitato glutine ex cortis facto cum acerrimo aceto vini dissolutis an. ℥ i. subigantur, & in Emplastri formam reducuntur, & mox subligaculo arctificiosè fabrefacto, quod pro arbutio constringi ac laxari queat, colligentur, Emplastrumque ad cutim constringatur.

Præcipiendum quoque est ut æger sæpius jaceat, & ab omni commotione inferiorum partium absteineat, Emplastrumque non nisi septimo quolibet die removeat, novumque reponat. Imposito Emplast. obligataque Hernia exhauriat æger mane ac vespere per 30. ad minimum dies seq. potionis ℥ iv. aut v. quæ & conglutinat, & mirum in modum constringit peritonæum rupturam tum relaxationem. ℞. Rad. Conf. maj. bistortæ, pentaphyll. an. ℥ s. sarsæ parillæ ℥ i. hyppur. polygo. perfoliatæ, faniculæ, pyrulæ, Agrimon. an. M. s. flor. rosar. prunellæ, consolidæ saraceniæ, geranii min. cum rubentibus surculis, fol. visci vel querci vel pyri arboris an. M. s. Contund. contundantur & concid. ℥ s. iiii. concoquantur in dupl. Vase ad 2. hor. cui grati saporis ergo admisce mel. lis purificati q. s. fiat potio.

Potio contra her-
niam.

Paracelsus
soliis beto-
nica & sa-
nicula al-
ba decocti.
ex vino
exhibet.

Plurimum quoque confert in ἐντεροκήλη suc. Jaceat herbæ, si ejus ℥ iiii. cum ℥ i. suc. rad. symph. simul mixtæ assumantur. In her-

V u u 3 n i i s

Herba
cancris seu
herniis
succus.

niis puerorum mirificè confert succus her-
bæ, quæ à quibusdam herba cancri nomi-
natur, quæ in marginibus segetum sabulo-
satum nascitur, ramulis ad terram sparsis,
foliis valde exiguis & rotundis ex viridi fla-
vescentibus gustu astringente, quæ contun-
denda est in mortario & conspergenda vino,
& ita ejus succus exprimendus & 3 s. vespere
ac mane herniosis propinanda.

3. *Umbilici ramex seu protuberantia quid,
qua ejus causa, qua signa, & quo-
modo curanda?*

Umbilici
hernia.

Ἐξόμφαλον πᾶσι. Umbilici hernia. In-
ter Ramicum spec. numeratur umbilici pro-
minentia, præsertim ubi ex rupto peritonæo
circa umbilicum intestina prolabantur, um-
bilicumque protrudunt: Vel ubi circa umbi-
licum multum aquosi humoris vel flatuum
copia colligitur.

Causa.

Causa ἀσπληνική est peritonæi circa um-
bolicum ruptura, aut ὑπερχῆς id est canalis à
vesica in umbilicum protensi, per quem in
utero urina foetus excernebatur, amplitudo
& mala colligatio. Fernelius scribit se vidisse
quendam annorum triginta, cui per mul-
tos menses urina non per virgam, sed per
umbilicum profluxit, quod videlicet ὑπερχῆς
foramen nondum esset exoletum. Προγκ-
ταρπικαὶ ruptionis causæ sunt violentus cas-
sus, aut ictus circa umbilicum: Τυφίς item
vehementior, aut tubarum inflatio, aliisque
conatus nimis abdomen discedens.

Signa.

Signa manifesta sunt ex nimia protube-
rantia umbilici: & si pars intestini sit prola-
psa in umbilicum, tum cum tumore dolor
adeft, ac si tumor comprimatur manibus
intestina cum rugitu retrocedunt. Si vero i-
bidem vel aquosus humor vel flatulenti spi-
ritus sunt collecti, ex levitate & gravitate,
transparentia & obscuritate internosci pos-
sunt.

Prognosti-
ca.

Prognostica. Diuturnus umbilici prola-
psus quando sine dolore ad magnitudinem
capitis infantis procrevit, frustra repelli ten-
tatur, & sine curatione per totam vitam ge-
statur.

Curatio.

Curatio. Dum adhuc recens est umbi-
lici prominentia, & ex ruptione peritonæi o-

riginem ducit, curanda est ut ἐν προκλήῃ,
nimirum repellendo intestinum intra peri-
tonæum Emplastis in ἐν προκλήῃ curatione
descriptis impositis, & falsciis convenienti-
bus obligatis, & cum potionibus congruti-
nantibus. Potest quoque recens umbilici
hernia non incommode curari per artificio-
sam sectionem industrii chirurgi.

Si autem aqua aut flarus in umbilico sunt
collecti, ea curandi ratio est administranda,
quam paulo ante in curatione ὑδρὸς κήλης &
πνευμῶτος κήλης adnotavimus. Aut impona-
tur tumori Emplastrum hoc ratione confe-
ctum. ℞. Gummi Ammon. 3 ii. resolvantur
in vino austero in pultis formam, quibus
admisc. pul. tenuiss. cymini præpar. q. s. ut
Emplastri formam acquirat.

Empla-
strum.

4. *Adenarum sive glandularum in Ingui-
nibus intumescencia quid, qua causa,
signa & quomodo curanda?*

Ἀδένες glandulæ nostris διὰ ἡγέδρος Adenes
sunt spongiosa rara & alba corpuscula, sub- glandule
jecta venarum & arteriarum divaricationi- ubi majores.
bus vel divisionibus. Omnium maximæ
glandulæ (exceptis mamillaribus) habentur
circa collum, sub axillis & inguinibus. Quæ
loca veteribus emunctoria nominata sunt, Vfus glandularum.
eo quod glandulosa hæc corpora sint quasi
receptacula superfuitatum superiorum par-
tium, & sua natura à principalioribus parti-
bus trahant ac recipiant venenosos humo-
res, ex quibus intumescunt glandulæ quan-
doque sine dolore, & nonnunquam cum
dolore. Intumescunt autem plurimum cre-
scentibus pueris & adolescentibus. Ac tunc
dolor qui inde excitatur, vocatur nostratibus
der Wachssthum.

Causa ἀσπληνική est incrementum mu-
sculorum & vasorum in inguinibus, com-
primentium glandulas. Προγκταρπικαὶ sunt
insueta equitatio, & tubercula inflammata
in pedis pollice aut tibia excitata, qua per
consensum hæc partes quoque afficiunt.

Causa.

Signum est manifestum, digitis enim con-
trectari tumor potest.

Signum.

Curatio: si absit inflammatio, est faci-
lis, & quieto sponte resolvitur, aut evan-
escit, si conficitur saliva jejuni hominis; aut
tepi-

Curatio.

tepida inunctione oleorum vel chamæmeli
ve lanethi, vel scorpionum vel hyperici. Sed
si accedat inflammatio, terminatur sapius in
apostema, cujus curationem jam tradam.

5. *Purulentus sive veneris tumor cum
inflatione circa Inguina quid, quæ e-
jus causa, quæ signa & quomo-
do curandus?*

*Tumor In-
guinum
veneris
quid.* Ἀποστήμα τὸ βυβῶνα tumor Inguinum
purulentus & inflammatus, qui & veneris
dici potest, chirurgi nostrates *Das Hap-
holz* / vocant, est tumor subortus circa
Inguina, qui solis libidinis adolescentibus
cum impuris scortis commercium habenti-
bus præmiiloco accidere solet.

Causæ *ἡ νόσος* sunt fædi & sordidi
humores ad inguina inter violentam com-
motionem defluentes à glandulis excepti.
Προκαταρκτικὰ est sudor & impura colluvies
è meretricum pudendis in venereo ceitami-
ne amassis suis communicata, eorumque in-
guinibus illita.

Signa. Signa sunt manifesta. Tumor enim &
inflammatio circa inguina tactu ac visu de-
prehenditur: Accedit nonnunquam & fe-
bris, ac præ dolore æger vix procedere
potest.

Curatio. Curatio perficitur, ut aliorum apostema-
tum suppuratorum, per medicamenta pri-
mum maturantia, deinde per tumoris inci-
sionem, purisque expressionem, elutionem
& mundificationem, & postremo per con-
solidationem. Quibus autem remediis com-
modè hæc perfici debeant, Deo auxiliante
in curandis morbis chirurgiæ subjectis com-
memorabimus. Hoc loco satis erit adjecisse,
βυβῶνες tales, id est apostemata probè ad
maturitatem deducere Emplastrum de meli-
loto, & Emplastrum Diachylon: Apertum
autem ulcusculum ab omni sorde mundifi-
care unguentum Apostolorum vulnere illi-
tum, & conglutinare vulnusque consoli-
dare Empl. Diatesaron quod Brunonis
vocant.

*Maturan-
tia.* 6. *Tumor pestifer inguinum quid, quæ ejus
causa, quæ signa, & qualis ejus
curatio?*

Bubonis βυβὼν λοιμώδης tumor pestilentiosus cir-

ca Inguina *ein Pestilenzgen* *Schwell.* *pestilentia-
lia origo.*
In contagione pestis si Natura est paulo ro-
bustior, virus pestiferum à principalioribus
partibus ad emunctoria, id est ad Adenas
colli, axillarum & inguinum propellere co-
natur: & si contagio cerebrum invasit ad
collum, si cor ad axillas, si Epar aut venas
aut ventricul. ad inguina venenosam mate-
riam propellit, ibidemque aut tumorem
aut carbunculum excitat. Verum cum de
pestilenti contagione & ejus symptomatum
curatione nobis in febrium tractatione sit
plenius agendum, hoc loco satis erit, si
brevissimè Bubonis pestiferi curationem
perstrinxerimus.

Curatur autem bubo pestilentialis, pri-
mum à nobiliore parte ignobiliorem, & à
principalibus ad maximè distantem, ante-
quam radices agar, tumorem pestiferum,
& in eo existens virus detrahare ac revellere,
ibidemque maturare, & paulo post rupto-
rium remedium imponere, aut sectionem
bubonis moliri, virulentum pus expurgare,
ac tandem consolidare.

Porro bubonem pestilentem ante pera-
ctas horas 24. à collo & axillis in volam ma-
nus, & ab inguine ad plantam pedis subtra-
here possumus seq. catapl. R. rad. serophu-
larie majoris, quam nostrates *Braun
Wurzel* nominant M. i. i. quæ probè con-
terantur cum aceti vini q. s. cui & fermenti
nonnihil addi potest, & parum decoquan-
tur, in formamque cataplasmi deducantur,
& vel volæ manus vel plantæ pedis appli-
centur.

Verum si id quod erupit virus; non sit
bubo aut tumor, sed anthrax seu carbuncu-
lus, imponatur q. s. galbani ad ignem emol-
liti, & per linteum instar Empl. extensi, ac
si hoc Empl. carbunculo adhærescat, nec a-
velli se patiatur, magnam sanitatis spem pro-
mittit. Si vero prorsus non adhæreat, lethale
est indicium.

Ad maturationem autem bubonis pesti-
feri plurimum facit seq. cataplasma.

℞. Rad. alth. lilior. alb. utriusque recent.
caricarum id est sicuum ping. passu-
larum remotis seminib. an. ʒ i. s.
Fer-

*Bubonem
maturans
catapla-
sma.*

Fermenti acerrimi ꝯ i. Axungia porcinæ & butyri non saliti an. q. s. coquantur ad catapl. formam, & buboni aliquoties imponatur.

Deinde paulo post vel incidatur bubo, (quod nonnulli feliciter non expectata maturatione quam primum facere solent, ut sanguis virulentus profluat) & virulenta sanies comprimendo protrudatur, aut seq. ruptorium catapl. imponatur.

Catapla.
sma rupto-
rium.

ꝲ. Ficum n. iv. qui probè contundantur eisque adjiciantur pul. synapi, piperis an. ꝯ i. salis ꝯ ii. fermenti acerrimi ꝯ s. croci ꝯ i. vitelli i. ovi, sacchari ꝯ s. contusa subigantur, fiat catapl. Postquam bubo est apertus, chirurgica Emplastra adhibeantur.

SECTIO II. DE ARTICULORUM AF- FECTIBUS.

i. *Articuli humani corporis quid, & quibus afficiuntur morbis?*

Articula-
tio quid &
quotuplex.

¶ *Aggōv*, articulus sive *ἀρθρωσις*, articulationis est ossium commissura sive junctura. Alii autem articuli sive ossium commissiones immobiles sunt, veluti suturae crani & dentes in maxillis, de quibus hic non loquimur: alii sunt mobiles, veluti sunt coarticulationes ossium, pedum, manuum, coxarum, scapularum & vertebrarum dorsi, in quorum ossium coarticulationibus saepe gravissimi excitantur dolores, qui *ἀρθρίδες*, id est articulares morbi nominantur, cujus species sunt:

Species ar-
thritidis.

Podagra,
Chiragra,
Scapularum dolor,
Coxarum dolor,
Spinæ dorsi dolor,
Gibbositas seu Gibbus.

2. *Articularis morbus quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?*

Arthritis

¶ *Ἀρθρίτις*, articularis morbus generaliter ad

omnes dolores, in quacunque corporis co-
articulatione ad motum destinata existant, nomen ge-
nerale.

referri potest. *Ἀρθρῶν* enim & *ἀρθρωσις*, articulum & coarticulationem ossium omnium significat: & ita & podagra & chiragra & ischiadicus dolor, *ἀρθρίτις* est: Quæ symptomata omnia à loco affecto nomen habent, & sola loci diversitate inter se differunt. In specie autem Arthritis dicitur morbus, ubi omnes aut quam plurimos articulos corporis dolor occupat, nostratibus *die Gicht* specie dicitur.

Ejus disse-
rentia.

Arthritis
quid in
specie.

In articulis mobilibus connectuntur ossa unde dolor
interventu membranarum, tendonum & li-
gamentorum, quæ particulae ex ipsis ossi-
bus vel ossium extremitatibus originem du-
cunt, & omnes membrana vestiuntur à pe-
riostio orta, quæ exquisitissimo sensu prædi-
ta est, unde si ad eam influat vel calidus vel

in articulis
excitetur.

acris humor, qualis est bilis flava, excre-
menticia caliditate & acredine articulos læ-
dit: pituita, sive sit tenuis & serosa, sive
crassa & gypsea, quam Neoterici tartarum
vocant, offendit articulos frigiditate & du-
ritie. Sanguis vero impurus, si in articulos
confluat, extendendo membranas ligamen-
torum, molestus est articulis. Humor vero
melancholicus, à quo raro oritur *ἀρθρίτις*
uti in scorbuticis, noxius est frigiditate.

Materia
peccans
quotu-
plex.

Pareus lib. 17. chirurg. cap. 2. ex ichoroso-
rum humorum ad articulos decumbentium
maligna & venenata qualitate tam vehe-
mentem dolorem excitari putat. Cum vul-
garibus remediis non cedat, sed exacerbetur
potius, & theriaca tam intrinsecus quam
extrinsecus saepe curetur. Net ad eam cordis pas-
sionibus animique deliquio subjecti essent ar-
thritici, nisi malignitas quadam interdum
subesset. Porro colligitur in articulis vitio-
sus humor aut per adfluxionem ab aliis par-
tibus, aut congestionem malè concoquen-
tis partis.

Modus col-
lectionis.

In omni articulari morbo tria debent
considerari. Primo pars affecta sive quæ re-
cipit vitiosos humores. Secundo pars à qua
oritur fluxio. Tertio via sive canalis per
quem fit fluxio ad articulos. In parte affecta
seu recipiente semper adest imbecillitas. A-
lias

Tria po-
tiss in ar-
thritide
conside-
randa.

Pars ad quam, seu recipiens. Pars à qua, seu mittens. Via per quam sit fluxio.

lias enim absumeret & discuteret adfluentem humorem. Pars autem à qua oritur fluxio tanquam ex fonte, est aut cerebrum aut Epar. Viæ vero per quas materia ad articulos fluit, ex capite quidem sunt tuniçæ nervorum, ex quibus tandem, ubi defluerunt ad articulos imbecilles pituitosa excrementa, in articulos exudant, quæ per nares & palatum fluere debebant. Quanquam non negamus eos vitiosos humores ex capite (ut Fernelio placuit) posse per subcutaneas membranas ad articulos defluere. Ex Epate autem per venas & eisdem subjectas arterias cum sanguine impuro deferuntur humores vitiosi.

Causa generalis arthritidis.

Causæ igitur *αἰτιολογία* omnium articulationum morborum sunt articulationum imbecillitas, & humorum vitiosorum, sive sint frigidi sive calidi, sive defluant ex cerebro, vel Epate, defluxio ad articulos imbecilles. *Προκαταρκτησες* sunt ingluviæ, crapula, otium, multa vini meracioris potatio, iracundia nimia, & immoderata Venus. Unde venustè Poëtæ podagram & articulares morbos, Bacci Venerique filiam esse fluxerunt. Plurimis quoque articulares morbi ex parentibus eodem morbo detentis hæreditaria successione contingunt. Sæpe etiam ex aqua alkalisata vel tartarea, aut vino quod multum tartari in se continet, arthritidis oritur. Et tum est endemius morbus, uti in Moravia & Austria.

Signa parvis mixtione.

Signa. Fluxionem vitiosorum humorum à capite ad articulos, antecedit capitis gravitas, dolor cervicis, & horrores crebri. Ab Epate fluxionem ad articulos antecedit febricula, tumores vagabundi, & dolores nunc in illa nunc in alia parte, rubedo cutis & tentio venarum.

Signa humoris influentis & dolorem excitantis.

Signa vitiosi humoris articulem morbum efficientis hæc sunt, desumpta ex natura humoris & specie doloris. Ex dolore enim acri & erodente, bilis; ex dolore tenfivo, copia sanguinis deprehenditur. Calidus humor ex partis affectu calore, frigiditas ex frigidity percipitur. Præterea si à sanguine dolor excitatur, color cutis affectu partis rubet, si à bile, pallefcit, à pituita,

albicat: adde quod à biliosa colluvie orta arthritidis, calidis remediis irritatur, frigidis mitigatur. A pituita aut melancholico humore orta frigidis exacerbatur, mitigatur autem calidis. *A pituita gypsea seu tartaro orta, in tophos concrefcit, & tumores in articulis excitat.*

Prælagium. Inveteratus articularis morbus rarissimè curatur remediis, qui in principio curari potest. *Ac tum verum est illud Poëtæ, Tollere nodosam nescit Medicina podagram.*

Quantum ad præcautionem attinet, necessarium est articulari morbo obnoxium summo studio perpetuo vitare crapulam, ebrietatem, Venerem, iram, cibi satietatem, otium, & alimenta omnia crassos humores gignentia, & tartarum suppeditantia. In hoc morbo enim omnium maximè convenit illud Hippocratis: studium Sanitatis est, cibi infatietas & laborum impigritas.

Prodest præterea articulari morbo laboranti, præsertim si sit natura pituitosa, singulis mensibus crudos humores è ventriculo per vomitum evacuare, & iis quidem qui facile vomunt, præstat id mane jejuno ventre perficere: qui vero difficulter, iis magis convenit à prandio post longam commestationem. Studeat quibque ne alvus sit adstricta: id si accadat, suppositorio aut leni clystere subducenda erit. Prodest præterea singulis mensibus seq. pillulis pondo ʒi. uti.

ʒi. Rhab. Agar. Troch. an. ʒi. cinam. spicæ nardi vel Indicæ, spicæ celticæ, Asari, mastice. Myrrh. an. ʒi. Aloës puriss. ʒs. omnibus diligenter pulveratis cum q. s. Terebinth. lotæ formentur pill. ex singulis drachmis ʒi. quæ vesperi 4. horis à cæna cum cerevisia deglutiantur.

Absumunt quoque & extenuant crassam materiam Arthritidis, gutt. 7. spiritus vitrioli alternis diebus cum iiii. cochlearibus aq. Bethon. ebibitæ. In plethoricis sanguinis crebra missione, præsertim in vere & autumnino, in articulari morbo nihil est salutaris, quæ non præservat tantum, sed sæpe in universum morbum extinguit.

Porro ubi jam sævit dolor in articulis, cura-

Prognosis.

Cura præservativa.

Evitanda arthritidis.

Vomitum utilis.

Alvus sit laxa.

Pillula præservantes.

Spir. ʒi. Vena se-ctio.

Curatio ar-

*thritidus
jam pra-
sens.*

*Purgan-
tia.*

*Affluxum
restringen-
tia.*

*Articulos
roboran-
tia.*

*Topica a-
nodyna.*

*Vbi san-
guinis ad-
fluxus in
causa.*

*Vitius ra-
tio.*

Enema.

*Vena se-
ctio.*

*Hausus
sanguinem
purificans.*

*Topica
quando ap-
plicanda.
Caute.*

tio hac methodo est peragenda. Primum di-
ligenter consideretur cerebri, & epatis,
quas partes fontes fluxionis esse diximus,
constitutio: deinde articulus seu locus affe-
ctus: tertio qualis existat humor ad articu-
los defluens doloresque excitans, sanguis-
ne copiosus, pituita aut alterutra bilis. Et
humor quidem vitiosus, qui occupat articu-
los, omnium primum est evacuandus, idque crebris purgationibus. Quo evacua-
to, & fluxio in cerebro aut in epate est re-
stringenda & cohibenda. Interim & articuli
laborantes imbecillesque corroborandi e-
runt. Et postremo topicis remediis dolor
mitigandus ac removendus.

Cognita itaque materia morbi, id est
specie vitiosi humoris, statim aegro conveni-
ens victus ratio fluentis humoris naturæ
contraria præscribenda erit. Et quidem pri-
mum ubi sanguis impurus ac copiosus arti-
culos gravet, & tendonum ligamentorum-
que tunicas extendit, victus ratio tempe-
rata ad siccitatem tamen & moderatam fri-
giditatem vergens præscribatur. Vitet au-
tem aeger omnia quæ copiosum sanguinem
generare possunt, veluti sunt carnes pullo-
rum, ova, vinum & similia.

Deinde alvus leni clystere evacuetur, cu-
jus paradigma in superioribus pluries tradi-
dimus.

Mox autem evacuato corpore sanguis
redundans per venæ sectionem subtrahatur.
Est autem secunda vena Epatica affecti late-
ris, si pedis articuli doleant: Si autem ma-
nus articulos dolor occupavit, secetur ve-
na in poplite vel sub talo, vel inter pollicem
& sequentem digitum affecti lateris.

Peracta venæ sectione reliquus sanguis
sequenti poriuncula purificetur.

℞. Pulpæ cassiæ, Mannæ an. ʒ i. pulv.
Rhab. ʒ s. Agar. Troch. ʒ i. Resol-
vantur in ʒv. lactis caprini, & propinen-
tur manè sex horis ante prandium.

Perpurgato corpore loco dolenti Topi-
ca & dolorem mitigantia remedia tuto arti-
culis imponi possunt. Ante autem corporis
purgationem periculosa est topicorum ap-
plicatio. Repellunt enim vitiosos humores

ad interiora viscera, & magnum malum
procreant. In sanguinea autem constitutio-
ne hæc seq. commodè imponi possunt. A-
cetum rosac. cum albumine ovorum con-
cutiatur & linteolis duplic. excepta affectæ
parti imponantur. Quin & ol. rosac. cum
pauillo aceto mixto, aut unguento popu-
leo & è cerussa simul mixtis dolens locus
commodè inungi potest. Aut

℞. Far. fabar. & hordei an. pro arbi-
trio, coque cum aceto vini ad pultis
formam, iisdemque admisce ol. ro-
sarum q.s. fiat cataplasma, quod tepi-
dum articulo laboranti imponatur.
Aut

℞. Medullæ similac. panis, in lacte ca-
prillo macerata & rursus expressæ
M. iii. quibus admisce vitell. ovo-
rum n. ii. ol. ros. ʒ ii. aceti ros. ʒ i.
eroci ʒ i. far. fabar. q. s. subigantur,
fiat cataplasma. Aut

℞. Fol. brallicæ q. s. coquito in aqua
ad mollitiem, & exenta in mortario
contere, eisque admisce lutea ovo-
rum & aceti rosac. parum, fiat cata-
plasma.

Notandum autem tumentibus articulis
non esse temere imponenda remedia repel-
lentia & astringentia, sed mitigantia tan-
tum. Circa tumorem autem tuto imponi
possunt, præsertim si adsit inflammatio, hæc
sequentia.

℞. Suc. prunell. sylvest. calicum rosar.
cum seminibus & glandium recent.
an. M. ii. Contundantur, succusque
exprimatur, & linteolis exceptus in-
flammato loco imponatur.

Si defluxio fiat per aliquod emuncto-
rium, quod facile sensu percipi potest, ad
cohibitionem floris seq. linimentum im-
ponatur.

℞. Boli Armeni ʒ ii. pul. bistortæ, gal-
larum, nuc. cupressi an. ʒ s. com-
misc. cum pauillo aceti rosac. instar
pultis, & imponantur emunctoriis.

Si defluxio sit copiosi sanguinis inflam-
mati, ℞. Mucag. sem. pŷylli cum suc. aut
aq. plantag. & aceto rosac. factæ q. s. cui ad-
misc.

Epithema.

Inunctio.

*Catapla-
sma.*

Aliud.

Aliud.

*Adstrin-
gentia non
temere ad-
hibenda.*

*Epithema
repellens.*

*Linimen-
tum assu-
um cohi-
bens.*

*Catapla-
sma in
misc.*

sanguinis copiosi affluxu. misc. alb. ovorum, quibus medul. panis si-
liginei admisceatur, fiat catapl. Ne autem
cito exarescat, addi potest nonnihil ol. rosac.
& inflammato tumori articulorum impona-
tur, crebroque removeatur.

Si causa biliosa. Porro si defluxio ad articulos biliosa fer-
vidaque existat, valde acres excitat dolo-
res, sed sine tumore articulorum, adest ta-
men ut plurimum & inflammatio, quæ ex
totius corporis, & loci affecti colore fla-
vescenti dinoscitur. Et si refrigerantia topi-
ca imponantur, levatur dolor, à calidis au-
tem magis exacerbatur, tum etiam alimenta
& remed. præscribenda sunt refrigerantia.

*Quæ vi-
tus ratio
conveniat.* Conveniunt itaque in victu cremor ptisanæ,
pruna acida, caro pullorum cum uvis im-
maturis, vel saltem cum aceto elixata, &
piscis squamosi, maxime perca aculeatæ,
quæ melanuri nominantur, & cerasa tum
recentia tum torrefacta & cocta. Ex oleri-
bus in acetariis plurimum conferunt lactuca
& portulaca. Vitanda autem sunt omnia a-
cria, salsa, & aromata, & vini potio. Po-
tus autem erit aq. hordei cum cinamomo
cocta, & lac ex 4. sem. frigidis cum aq. cich.
confectum. Si alvus sit obstructa leni clyst.
aut saltem suppositorio aliquo subducatur.

Enema. Postea si vires & doloris acerbitas ferant,
vena incidatur Eptica & ex opposita parte:
parcus tamen sanguis effluere permittatur.

Phlebotomia. A venæ sectione ferventem bilem crebra
purgatione subtrahere oportet, per aliquod
pharmacum cholagogum, quale est subse-
quens.

*Cholago-
gum.* ℞. Rhab. ʒ ii. contusum maceretur per
noctem in ʒ v. aquæ cichoreæ, ma-
ne ad fervorem calefiat, fortiterque
exprimatur, & colato liquori admi-
sceatur aut syr. rosac. solutivi ʒ ii. aut
elect. rosati Mef. ʒ iiii. & fiat haustus
sex horis ante prand. assumentus.

*Bilis quan-
do & quo-
modo eva-
cuanda.* Et crebro, aut dictum est, bilis est sub-
ducenda, sed cavendum tempore accessionis
& summæ exacerbationis: tum enim si pur-
gans pharmacum assumatur, augetur dolor.

*Topica a-
nodyna.* Expurgato corpore Topica remedia fer-
vorem doloremque mitigantia loco affecto
applicentur, qualia sunt hæc sequentia.

℥. Lentium palust. ad libitum, contun- *Catapla-*
dantur cum pauxillo acet. rosar. & *sina.*
instar catapl. loco affecto imponan-
tur. Aut

℥. Herb. recent. semper vivæ major. la- *Aliud.*
ctucæ, solat. polygoni, plantag. an.
M. r. contulis admisceantur far. hord.
M. ii. & ol. ros. q. s. quæ ab humi-
ditate expressa contundi in mortario,
cui admisceatur q. s. ol. ros. & mucil-
lag. sem. psylli cum aq. rosar. factæ,
fiat cataplasma.

At vero si acerbitas doloris intolerabilis *Narcotica*
sit, Narcotica torporemque inducentia re- *caute usur-*
media affecto loco circumspectè adhiberi *panda.*
possunt, veluti est seq. cataplasma.

℥. Opii Theb. ʒ ii. resolvatur in pau- *Catapla-*
xillo aceti rosar. ad lentum ignem, *sina.*
cui admisceantur mucag. sem. psylli
ʒ i. unguenti popul. ʒ i. quæ mixta
per se inungi possunt dolenti loco, vel
addita q. s. far. hord. in catapl. for-
mam redigi. Aut

℥. Fol. virescentia cicutæ & rad. hyosc.
& capita virescentia papav. an. ad li-
bitum, quibus simul contusis admi-
sceantur ol. rosar. & far. fab. q. s. fiat
cataplasma.

Prudenter autem hæc refrigerantia vehe-
menter & stupefacientia usurpanda sunt: læ-
duntur enim ex eis nervi. Post eorum itaque
usum sedato dolore lavetur fomenteturque
locus affectus calefacientibus liquoribus,
veluti sunt vinum, in quo rotismar. fol. vel
salviæ vel saturejæ sunt incocta, & crebro
inungatur locus ol. è castor. vel ol. costino.

At vero si defluens materia ad articulos *Si materia*
pituitosum sit excrementum, quæ pituita est *pituitosa,*
aut tenuis & serosa, aut est crassa & lenta, *quid agen-*
aut est terrestris & gypsea, quam defluxio- *dum.*
nem cognoscimus hisce signis, quod nimi-
rum dolor non subito nec affatim invadit,
nec valde acris est, & articuli intumescunt:
tumor autem laxus est & diuturnus, & cum
articuli moventur, major dolor excitatur,
qui articularis morbus senibus est magis
quam juvenibus familiaris: in cujus cura-
tione ita procedendum erit.

Enema.

Primum subducatur alvus acri. clystere ex decocto origani, bethon. & centaur. min. in quo \mathfrak{D} i. colocynth. pulpæ in linteolo ligatæ effebuerit, in cuius lb. i. resolvantur hieræ simpl. \mathfrak{z} ii. & ol. chamæm. \mathfrak{z} iiii. salisque \mathfrak{z} i. quæ tepida infundantur.

Diata.

Postea victus ratio moderatè calefaciens & exiccans, & fames abstinentiaque & vigilia in morbi initio præcipiantur patienti. In cibo autem conveniunt oryza cum jusculo carnis bovinæ, & aviculæ aliæque carnes assatæ magis quam elixæ. In potu hydromel, & cerevisia plena ac clara conveniunt, in quibus cinamom. cardam. sem. anisi & carvi foliaque rosmarin. commodè possunt macerari. A venæ sectione nisi in corporibus plethoricis & adolescentia, prorsus abstinendum erit, quicquid tandem sentiant Græci.

*Venæ sectioni quando locum.**Vomitio mensura.*

Excrementa autem pituitosa ad articulos defluentia subinde seq. pharmacis diminui & expurgari debent, ac primum quidem ea è ventriculo per menstruas vomitiones exturbentur, exhausto prius haustulo vini, in quo per noctem maceratæ ac deinde incoctæ fuerunt, cort. rad. jugland. arboris: aut ebibito haust. aq. ex gr. juniperi per descensum destillatæ. Tandem & ex cerebro & venis eadem excrementicia pituita, idque tempore remissionis, per vices subtrahatur: usitato tamen more prius per triduum aut quattriduum extenuetur & concoquatur crassa pituita seq. potionè.

Decoctum extenuans pituitam.

\mathfrak{L} . Rad. fænic. petrosel. pimpinellæ ligustici, Dauci cretici an. \mathfrak{z} iiii. sem. Anisi, fænicul. carvi an. \mathfrak{z} s. Fol. Bethon. rosmarin. hyssopi, origani an. M. s. scord. card. benedicti, centaur. min. an. p. i.

Contusa & concisa cum lb. iiii. aq. in dupl. vase concoquantur per 2. horas. refrigerata colentur & colato juri admisc. syr. è stachade \mathfrak{z} vi. fiat portio, cujus mane ac vespèri cibantur \mathfrak{z} iiii. calefactæ. Absumpta hac potionè, seq. haustulus sex horis ante prandium propinetur.

Haustus phlegmogus.

\mathfrak{L} . Fol. senæ \mathfrak{z} ii. Agar. Troch. contusi & in linteolum colligati \mathfrak{z} i. s. mace-

rentur per noctem in \mathfrak{z} v. aq. bethon. mane leniter ebulliant, & fortiter expressa colentur, colato jusculo admisceantur Diaphæn. \mathfrak{z} s. fiat haustus. Aut exhibeantur deglutientiæ seq. pill.

\mathfrak{L} . Mas. pill. è sagapeno, fæt. Agar. troch. an. \mathfrak{D} i. Troch. alhand. \mathfrak{D} s. cum syr. è stach. formentur 27. pill. Earum autem usurpatio crebrius repetatur. Paracelsi sequaces in omnibus articularibus morbis utuntur vitto rubicundo ex Antimonio liquefacto præparato. Sed hoc medicamentum cum summas inferat anxietates & animi deliquia, non temere usurpandum judicamus. Interim tamen in extenuanda & absumenda pituita, discutiendisque humoribus articularum miro successu usi crebrius sumus, gutt. 9. ol. vitriol. mane ac vespèri cum jusculo pingui exhibitis. Prodest & per intervalla uti \mathfrak{z} i. s. theriacæ Androm. cum haustulo vini generosi.

*Pillula.**Vitrum antimonii.**Spir. Vitrioli.*

Perpurgato corpore sequent. Topica laboranti loco post frictionem calidorum linteolorum adhibeantur. Primum inungatur locus vino Rhenano calido, in quo incoctæ sint fol. rosmarin. & strobili sive nûces pinæ, cui & ol. vitri. nonnihil commodè admisceri potest. Tandem imponatur cataplasma ex æqualibus part. stercoreis bubali aut capra- rum & far. hord. in hydrom. coctis, & in catapl. formam redactis. Aut

*Topica.**Fomentatio.**Cataplasma.*

\mathfrak{L} . Far. fænug. lini, cicerum, lolii an. \mathfrak{z} ii. pul. rad. alth. \mathfrak{z} i. cum hydromel. q. s. admisce. Commodè quoque fomentari potest tumor & locus affectus articularum vino in quo decoctæ sunt majorana abrotan. puleg. serpil. Quæ in aceti aquæve p. æ. incoqui possunt. Iisdem autem herbis concoctis & in mortario contusis admisceri possunt far. fænug. & medul. panis, & ping. porc. & in cataplasmin. formari. Aut imponatur seq. Emplast.

*Aliud.**Fomentatio.*

\mathfrak{L} . Castor. Thuris an. \mathfrak{z} i. s. medul. crurum cervi, adip. asnerini an. \mathfrak{z} s. Ol. aneth. nardi an. \mathfrak{z} i. Bdellii, galbani in aceto rosar. soluti, & per linteolum trans-

Emplastrum.

transacti, far. fœnug. sem. lini an. 3 ii. ceræ q. s. fiat Emplastrum, & dolenti loco prius seq. ung. illinito & inuncto imponatur.

Unguentum.

4. Ol. vulpini, ol. lumbricorum, lil. albor. rutæ an. 3 ii. ping. ursi, vulp. an. 3 s. mucag. ex sem. lini, fœnug. & rad. alth. factæ 3 i. croci 3 i. ceræ q. s. fiat unguentum. Aut

Ceratum.

4. Resinæ pini, terebinth. an. 3 s. ol. vulpini 3 i. s. Mucag. & rad. alth. & sem. fœnug. cum q. s. succi ebuli factæ 3 ii. Sagapeni, Opopanacis, Ammoniaci in aceto dissolutorum percolat. an. 3. s. Croci 3 i. ceræ q. s. fiat. s. a. cerotum, & inuncto prius dolenti loco imponatur. Aut

Cataplasma.

4. Stercoris vaccini lb. i. far. fœnug. fab. an. 3 ii. oxymel. simpl. q. s. subigantur, & fiat catapl. quod dolenti loco imponatur.

Si dolor ex humore melancholico.

At vero si dolor articularis ex melancholico humore exciteretur, quod tamen rarius accidere consuevit, idque potiss. in scorbuticis, propter crassitatem & stabilitatem humoris (nisi forsitan humor melanch. per vehementem calorem quasi in cinerem sit conversus, sanguineæque massæ admixtus) tum victus ratio moderatè calefaciens præscribatur, & pro constitutione corporis, si necessitas exigit, vena secetur splenetica, & quidem statim in initio doloris.

Vena sectio.

Post venæ sectionem concoquatur digeraturque melanch. humor cum sero lactis caprini in quo concocta sunt conf. fumar. mellisæ an. 3 ii. Rad. polypod. 3 i. s. ceterach. M. ii. serum autem debet esse lb. iv. & concoqui debent in dupl. vase. Post concoctionem extenuationemque humoris, purgetur corpus 3 x. Diacathol. in 3 v. aqua stillat. fumar. resolutis & 6. horis ante prandium exhibitis: Aut exhibeantur 27. pill. ex 3 i. Mas. pill. è fumo terræ, quæ Diagrid. gr. v. additis fortiora reddantur.

Hæustus melanagogus.

Pillula.

Topica.

Quibus peractis, Topica dolorem mitigantia & discurrentia loco affecto applicentur, veluti sunt hæc sequentia.

Cataplasma.

4. Fol. rorism. conizæ majoris an. M. ii.

concisâ coq. in vino, & contundantur in mortario, quibus admisceatur medul. panis & addita q. s. ping. anserinæ & æsypi, fiat cataplasma.

Porro ingens se offert difficultas in curatione Arthritidis cum propter impatientiam ægrotantis, tum propter doloris acerbitatem. Dolor enim perpetuo, ut cæcus ventus nubes, ad se allicit ac rapit vitiosos humores ex reliquis partibus, & auget dolores. Suadendum est itaque tyronibus Medicinæ, ubi præscripta remedia Topica semel atque iterum usurpata atque applicata parum aut nihil adjuvamenti attulerint, ne ea amplius admoveant, sed statim ad novum aliud remedium simile tamen aut nonnunquam ad contrarium confugiant & transgrediantur. Sæpè enim unus & idem articulari morbo laborans, eodem remedio & sanitati restitutus est, & sæpè lædi visus.

Si autem hæc omnia præscripta non contulerint, ablegetur patients ad Thermae Naturæ morbi convenientes, inter quas celeberrimæ habentur in Germania hæc quæ Carolina prope Vallem Joachimicam habentur, quæ ex alumine, sulphure & cupro constant.

Porro ut studiosos artis Medicæ nihil celem, in omnibus articularis morbi specibus nullum salutaris, nobilioris præsentiusque remedium experientia longa comprobare potui, quam potionem sudorificam ex nobiliss. rad. chinæ & sarmentis Indici paratam, cujus parandi utendique rationem paulo post in curatione morbi Gallici, & in peculiari libello experimentorum meorum Deo præsentare tradituri sumus.

3. *Pedum manuumque articularis dolor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?*

Podagra, articularis morbus in pedibus: Podagra chirographa, articularis dolor in manibus est. Partes pedum ac manuum magnam habent inter se & in coarticulatione & in configuratione motuque analogiam & cognationem, etiam si situ & usu inter se differant. Pedes enim infimæ parti, manus autem superiori corporis parti coarticulati sunt, & hi quidem serviunt ambulationi, hæc autem

Podagra chirographa quid.

Podagra chirographa quid.

xxx 3 appre-

apprehensioni. Morbi autem earum partium ad arthritida, id est dolores articulo- rum referri debent.

Causa.

Causæ podagræ eadem sunt quæ & arthritidos, nimirum *αἰσχυρισμὸς*, vitiosorum humorum aut ex capite aut ex aliis partibus per venas ad articulos pedum ac manuum defluxus. *Περονία* autem sunt continua crapula ac cruditates, & immoderata Venus: sed inevitabilis causa est hæreditaria propagatio à podagricis parentibus; Et aqua loci habitationis, multum tartari in se continens, qua nemo carere potest.

Signa.

Signa cum podagræ tum chiragræ manifesta sunt. In podagra enim articuli pedum, in chiragra manuum acerbo dolore aliquan- diu infestantur, qui deinde cessat. Hic dolor sensim oboritur. In podagra nonnun- quam initium sumit in articulis magni digiti pedum, aut in calcaneo, & deinde in ge- nuum coarticulationem procedit. In chira- gra vero incipit dolor nonnunquam in tu- berculis digitorum, unde tandem & ad reli- quas coarticulationes progreditur.

*Dolor ubi
initium
sumat.*

Causarum signa, adeoque universæ po- dagræ & chiragræ curatio pro causarum di- versitate ex arthritidos curatione peti & huc transferri debet. Hoc autem loco satis erit pauca quædam remedia & podagræ & chi- ragræ adversantia adjecisse.

Curatio.

In curatione itaque podagræ & chiragræ post institutam convenientem victus ratio- nem, & si necessitas exigit venæ sectionem, humorisque vitiosi ad pedum manuumque articulos confluentis debitam præparatio- nem & evacuationem, consideretur sedulo, quæ intemperiem, caliditasne an frigiditas podagræ ac chiragræ sit adjuncta.

*Ubi causa
subest ca-
lida.*

In calida affectione, quæ semper aut ex sanguinis aut flavæ bilis fervore ebullitione- que oboritur, refrigerantia cum in potione, tum in topicis admovenda erunt: sequens itaque potio commodissimè exhiberi potest.

*Potio re-
frigerans.*

℞. Rad. cichor. ℥ i. herb. scariolæ, la- ctuæ an. M. i. 4. sem. frig. maj. an. ℥ s. Hordei M. i. conservæ Borag. rosar. an. ℥ i. s. Concisis conciden- dis & contusis contundendis cum

℥b. i. v. aquæ fluviatilis in dupl. vase concoquantur ad 2. horas, refrigera- ta colentur, & colato juri admiscean- tur syr. acetos. citri, violar. an. ℥ ii. fiat potio, cujus ℥ v. calefactæ mane ac vesperti ad fervoris mitigationem exhibeantur. Locus autem affectus seq. linimento inungatur.

℥. Unguenti popul. ℥ i. ol. rosar. ℥ s. *Linimen-
tenuiss. pulv. boli Armeni ℥ ii. com-
mifceantur, fiat linimentum. Post in-
unctionem imponatur sequens ca-
taplasma.*

℥. Prunor. agrest. ℥ iii. medul. panis Catapla-
siliginei ℥b. i. coquantur in aceto, & sma.
expressa contundantur, per cribrum-
que transigantur, quibus admisce vi-
tellos ovorum n. i. r. & ol. rosar. ℥ iii.
subigantur fiat cataplasma. Aut

℥. Lithargyri ℥ iv. boli Armen. ℥ ii. *Unguen-
tenuiss. pulverata commifceantur
cum succo cyton. & pauxillo aceto
rosar. & ol. rosar. fiat unguentum,
quod linetis duplicatis illiniatur,
& dolenti loco applicetur. Aut impo-
natur seq. Epithema.*

℥. Aq. stillat. solani, rosar. plantag. an. *Epithema.*
℥ iii. Mucag. sem. psylli cum aceto
ros. factæ ℥ i. album. ovorum n. i. r.
Probè agitando commisc. & panno lineo
excepta ferventi dolori imponantur, cre-
broque immutentur.

Mirum in modum ferventem dolorem podagricorum & chiragricorum mitigant folia sempervivæ Hispanicæ (quæ Aloës esse *Sempervi-
judicatur & in maritimis locis in æstuariis
suspenditur, ubi non modo non arefcit, sed
in plures annos crescit ac virefcit ex tepore
hypocaustorum) cum rad. contusa & fer-
ventibus tumoribus imposita. Aut*

℥. Suc. sempervivæ maj. quæ in testis *Epithema.*
rusticorum virefcit, & suc. Lysima-
chiæ, quam & salicariam vocant an.
℥ iv. commixta excipiantur panno &
imponantur loco affecto. Aut ℥. *Catapla-
sma.*

Medull. panis silig. & bene fermentati ℥b. i. maceretur in lacte ovillo per 3. horas: deinde expressa con-
tund-

tundantur, eisque admisc. album. o. vor. n. iv. quæ probè subacta redigantur in formam catapl. & loco dolenti imponantur.

Reliqua in dolorem podagricorum cum caliditate conjunctum ex Arthritidis curatione, aut ex fervore sanguinis, aut bilis æstuatione peti, hucque transferri possunt.

Vbi causa est frigida. Ubi autem podagricorum chiragricorumque dolori adjuncta est frigida intemperies, quæ ut plurimum exoritur ex adfluxu pituitæ aut melancholici excrementi, ita procedendum est. Post vitiosi humoris sufficientem concoctionem cum per vomitionem tum per subducentia remedia & venæ sectionem evacuationemque & victus præscriptionem, in potu utatur æger hydromelle in quo sol. rosim. salviæ & chamæpitys sunt macerata. Confert quoque si æger singulis septimanis assumat ʒ ii. Thearicæ Androm. & singulis diebus devoret q. semijuglandis, conservæ Rosismarini aut seq. Electuarii.

Electuarium. ʒ. Zinzib. cond. cort. arant. condit. an. ʒ ii. quæ crassiusculè concidantur eisque admisc. conf. Rosism. Bethonica an. ʒ i. spec. Diamoschi, Diambræ an. ʒ i. & cum pauxill. aq. junip. commisc. fiat Electuarium. Aut assumat patiens mane ac vesperi cum aliquo jusculo sub ping. ol. vitriol. gutt. 9.

Loco vero affecto hæc seq. Topica inungi imponique utiliter possunt.

Spir. Vitrioli. Topica. ʒ. Ol. laurini, Icini, vulpini & lumbricor. an. ʒ s. medullæ crutis cerv. ʒ vi. Terpent. ʒ ii. Galbani in aceto dissoluti & per linteolum transacti ʒ i. s. Ceræ q. s. fiat unguentum, cui admisc. ol. vitriol. ʒ s. quo bis in die inungatur locus affectus: Aut inungatur ol. vitriol. cum vino generoso mixto. Post inunctionem imponatur loco affecto unum ex seq. cataplasmaris.

Cataplasma. ʒ. Rad. malvæ, alth. an. ʒ ii. fol. chamæm. meliloti an. ʒ i. far. fab. fæ-

nugt. lini an. ʒ x. Quibus pulveratis admisc. q. s. juris in quo caput pedesve vituli sunt incocti, & coquantur ad formam crassioris pulmenti, eisque admisceantur ping. suillæ veteris, aut ol. chamæm. q. s. fiat cataplasma. Aut

ʒ. Stercoris vaccini lb. s. pul. cymini in aceto macerati ʒ ii. mellis crudi q. s. quibus simul commixtis & calefactis fiat cataplasma. Reliqua ex Arthritidis curatione huc transferantur.

Porro accidit freq. ut in podagræ & chiragræ doloribus, ex induratione in calcemque conversione materiæ peccantis (quod contigit, vel nimia caliditate loci affecti, vel nimia exsiccantium remediorum impositione) tubercula tumoresque in articulis excrecant. Unde vulgus podagræ & chiragræ, Nodosæ Epitheton indidit. Et hæc quidem tubercula, præsertim si inveterata existant, difficilimè resolvi emolliri que possunt. In principio autem quando primum excitantur, discuti & emolliri possunt seq. remediis.

Fomententur nodosi articuli bis singulis diebus acerrimo aceto & sale marino simul calefactis spongiaque exceptis, & tophis si ve tuberculis manuum ac pedum impositis. Deinde imponatur eisdem tophis seq. cerotum.

ʒ. Ol. lumbr. lilior. albor. anethi an. ʒ i. vini Rhenani ʒ vi. ranar. com. n. ʒ iiii. quæ simul concoq. donec caro ab ossiculis abscedat, deinde fortiter exprimantur, quibus admisc. Tereb. ʒ i. & ceræ q. s. fiat cerotum. Aut fiat Emplastrum ex veteri caseo acerrimo cum pinguedine ex carne suilla excocta. Aut imponatur tophis Emplastr. Diachylon. prius autem inungatur ol. lumbr. cui nonnihil ol. sulphuris sit admixtum.

Postrema cura podagricorum debet esse præcautio, ne videlicet redeat dolor, aut saltem ut mitius rariusque recurrat: id autem consequi possunt patientes exquisita temperantia in cibo, potu & Venere, & continuo,

Aliud.

Tophi Podagrici unione.

Quando curabiles.

Epithema pro tophia.

Cerotum ex ranis.

Cataplasma.

Præservatio a podagra optima.

Tempo-
rantia.

tinuo, moderato tamen corporis exercitio. Si enim in ullo genere morbi saluberrimum præceptum Hippocratis locum habet, maxime valet in Arthriticis podagricis que doloribus. Inquit autem Hippocrates, Studium sanitatis est, infatietas cibi & potus, & laboris impigrities. Cui accedat & crebra vitiosorum humorum per convenientia remedia, & venæ sectionem evacuatio. Sed nullum præsentius inveniri potest remedium cum ad curationem tum ad præcautionem podagræ ac chiragræ, quam usurpatio rad. chinæ & sarmenti Indici, quam in seq. descripturi sumus.

Evacuatio
superfluo-
rum.

Decoctum
china.

4. *Coxendix seu coxa & scapularum dolor quid, quæ eius causa, quæ signa, & quomodo curandus?*

Ischiadi-
cus dolor.

Ἰσχίς, coxendix, vel dolor circa coxas. *Ἰσχίον* enim Latinis coxam significat. Est autem *ἰσχίον* larum os in clunibus, nostri *die Hufst oder Lendenknochen* nominant, in cuius medio rotunda cavitas est, cui caput superius ossis cruris coarticulatum involvitur, in qua coarticulatione creberrimè gravis excitatur dolor, qui coxendix & dolor circa coxas nominatur. Cum osse coxæ analogiam habet os scapulæ, quod Græcis *ἀμφοτέρων*, nostris *das Schulterblatt* nominatur, cujus cavitati rotundæ caput humeri coarticulatur, in qua coarticulatione si dolor excitetur, Græcis *ἀλγος* sive *ἀνία ἀμφοτέρων* vocatur. Utriusque autem partis morbi Arthritidos sunt species, & ex iisdem causis originem trahunt, iisdemque remediis curari possunt. Quare has duas affectiones conjungere placuit.

Dolor sca-
pulae.

Causa.

Causæ *ἀσθενεῖς* sunt nativa imbecillitas articularum, & vitiosi humores crassi aut serosi, ut plurimum autem pituitosi, vel ex cerebro ad articulos defluentes, vel ex Epate per venas ibidem collecti, cum calida aut frigida intemperie conjuncti. *Περονεϊα* sunt casus vel gravis percussio in ea loca, & intempestiva ingluviens.

Signa.

Signa doloris ex relatione ægri, causarum vero signa ex habitu corporis & tactu dinosci possunt.

Prognosti-
con.

Prognosticum. Dolor cum caliditate con-

junctus acerbior est: cum frigiditate vero diuturnior.

Curatio urriusque affectionis consistit in caufarum remotione & doloris mitigatione.

Curatio.

In his itaque malis, si corpus patientis plethoricum est, detrahatur sanguis vitiosus. In dolore quidem scapularum per venæ cephalicæ, in Ischiade autem per venæ talaris aut venæ sub poplite sectionem. In aliis autem constitutionibus, veluti pituitosa, frustra fit molitio per venæ sectionem, sed præstat in scapulari dolore cucurbitulas cum scarificatione scapulis, in coxæ autem doloribus lumbis applicare. Tandem vitiosi humores ad eos articulos defluentes convenientibus remediis concoquantur, & evacuentur, quorum copiam in arthritide & ejus speciebus superioribus tradidimus. In specie autem in scapularum doloribus exhibeantur seq. pillulæ.

℞. Mas. pillul. cochiarum, fatidarum, *Pillula in trochisc. de Agar. an. ʒ i. Trochisc. scapulae alhand. gr. iv. cum q. s. mellis rosar. dolor. formentur pill. n. 27. hisce pill. singul. mensibus utendum erit.*

In coxendice vero seq. Enemate opportunissime & quidem crebrius uti possumus.

℞. Salviæ, rorismarini, centaur. min. ru- *Enema ad tæ, camæpitys, mercurialis an. M. i. Ischidia- sem. anisi, fœnicul. an. ʒ ii. pulpæ colo- rum. cynth. in linteolum ligat. ʒ i. decoquantur in q. s. aq. ad tertias, colentur, in cuius liquoris ʒb. i. dissolvatur hieræ simpl. diaphæn. an. ʒ vi. ol. rutæ ʒ tr. lauri ʒ s. sal. ʒ i. fiat clyster.*

Pro evacuatione pituitosorum humorum, præsertim ex ventriculo & cerebro, plurimum conferunt & menstruæ vomitiones, assumpto prius haustulo vomitorio, qui parari potest ex decocto rad. asari & flor. *Topica. Genistæ, aut semine ejus: aut haustulo aq. juniperi per descensum destillatæ.*

His ritè peractis ad topica auxilia dolorem mitigantia confugiendum erit, considerata prius utrum calida aut frigida intemperies dolori sit adjuncta. Illud tamen diligenter notandum, ut neque in calidis neque in frigidis doloribus vel inde refrigeran-

tia

*Observanda in topi-
corum usu.* tia, repellentiaque & poros obstruentia im-
ponantur loco affecto, sed moderate cali-
da in frigidis, & moderate frigida in cali-
dis doloribus, idque in motui initio: Nam
ob vehementiam doloris, si diutius duret,
& levioribus non mitigetur, nonnunquam
cogimur & ad stupefacientia & ad caustica
usque progredi.

*Si ad sit
inflamma-
tio.* Si itaque inflammatio dolori sit adjuncta,
fomentetur locus decocto malvæ fl. cha-
mæm. meliloti, fol. violar. rad. alth. & sem.
lini, ex quibus & balnea in doliis concin-
nari possunt. Post balnea autem fomenta-
*Fomenta-
tio.* tionesque, inungatur locus affectus oleo
vulpino, rosar. & oleo aneth. sing. per se aut
simul commixtis. Aut ʒi. Ol. rosar. ʒi. i.
ping. anser. ʒs. aceti rosar. parum, miscean-
tur, fiat unguentum, quo vel inungatur lo-
cus vel linteolis exceptum instar cataplasmi.

Inunctio. imponatur. Concinnari quoque potest cata-
plasma ex rad. althææ coctis & confusis, ad-
dita q. s. ol. rosar. & unguenti popul. & far.
sem. lini, fiat cataplasma. Reliqua quæ ad
hæc vitia faciunt remedia, ex arthritidos
& podagræ curationibus huc transfe-
rantur.

*Si ex fri-
gida sit
causa.* Porro si frigida intemperies dolori sit con-
iuncta, Topica remedia affecto loco sunt
imponenda, quæ calefaciendi vim habent,
& à moderate calefacientibus auspiciandum
erit, paulatimque ad valentiora proceden-
dum. Leves dolores præsertim musculorum
sola frictio cum calidis linteolis tollere po-
test. In gravioribus autem doloribus bal-
nea & fomentationes sunt adhibendæ. In
quem usum plurimum conferunt vinum, in
quo decocta sunt rad. Elenii, Ebulus cum
rad. gr. juniperi, sabina, chamæpeuce,
salvia, ruta, puleg. melilot. & sem. ex a-
cervo feni pratensis excussa. Post balnea
aut fomentationem inungatur locus dolens
ol. vulpino, aut rutac. aut è castorio, aut ex
Euph. aut ex gr. juniperi, quæ omnia singul-
latim per se, aut simul commixta commo-
dè inungi possunt. Aut concinnetur seq. li-
nimentum.

Frictio. *Fomenta-
tio.* *Inunctio.* Ol. cera &
ovorum
quoque hic
utile.

*Linimen-
tum.* ʒi. Unguenti marciati ʒi. r. ol. vulp. ʒs.
ol. è gr. juniperi ʒi. ol. vitr. ʒi. i.

cæræ q. s. fiat unguentum. Aut

ʒi. Saponis Veneti in scobem abradi ʒi. i. Vnguen-
aq. junip. ʒi. ii. quæ in ollula simul
mixta ad lentum ignem dissolvantur, <sup>um singu-
lare ex sa-
pone.</sup>
& ebulliant, semper agitando, quæ
ubi refrixerint, pultis formam acqui-
runt, quibus inungatur locus affec-
tus. Post inunctionem imponatur
loco dolenti sequens cataplasma.

ʒi. Salviæ, rorisinar. chamæpeucæ, ru- <sup>Catapla-
sma.</sup>
tæ an. M. ii. gt. juniper. M. i. co-
quantur in q. s. vini, & in morta-
rio tandem conterantur, eisque ad-
misc. far. sænugr. lupinor. an. q. s.
fiat cataplasma, quod ut ne facilè
arescat, admisceri potest ol. è cas-
stor. pro libitu. Aut imponatur seq.
Emplast. ʒi. Ol. costi, è piperibus <sup>Empla-
strum.</sup>
an. ʒi. i. gt. juniper. ʒi. ii. Galba-
ni, Ammoniaci, bdellii in aq. jun-
nip. solutorum an. ʒi. iii. cæræ q. s.
fiat Emplastrum, cui antequam re-
frigeratum indurescat, admisc. pul.
Bryoniæ ʒs. Pyrethri, Aristolochiæ
ros. castor. an. ʒi. i. Euph. ʒi. ii. fiat
Emplastrum, quod extendatur per a-
lutam. Aut

ʒi. Muc. ex sem. sænugr. & rad. symph. <sup>Catapla-
sma.</sup>
major. cum vino maceratis confect.
ʒi. i. cui admisc. vitellos ovorum
n. iii. pul. picis, thur. sulphur. an.
ʒi. ii. far. lupinorum q. s. fiat cata-
plasma.

In dolore coxendicum laudatiss. quoque
est cataplasma ex radicibus quæ Iberides ef-
se putantur, quasve nostrates <sup>Rad. ra-
phani ma-
joris.</sup> Merretigk
vocat, si adhuc recentes confusæ cum q. s.
ping. porcine in catapl. redigantur & loco
affecto imponantur. Verum ultra 4. horas
non est perferendum. Dolorem enim ex-
citant, & superficiem cutis nonnihil exul-
cerant.

His validiora sunt remedia quæ vesiculas
excitant, & vitiosos humores ad superficiem
cutis eliciunt, quæ remedii genera sinapismi
vocantur, veluti & sequens cataplasma.

ʒi. Sem. sinapi per noctem in aceto ma- <sup>Sinapi-
ceratorum & in pulverem redact. ʒi. i. smus.</sup>

Y y

Ficu.

Vescato-
rium.

Ficu. arid. ꝯ iiii. sterco. columb. in vino dissoluti & ad pult. formam cocti ꝯ iiii. mellis anacardini ꝯ i. commisceantur, fiat sinapismus, & instar catapl. imponatur. Aut ꝯ Pulv. cautharid. ꝯ i. sem. staphidiasagriæ ꝯ i. s. fermenti acerr. ꝯ a. mucag. sem. psyllii cum aceto factæ q. s. commisceantur, fiat cataplasma, quod humores è profundo ad superficiem cutis elicit, & vesicam sine dolore excitat, quæ pungenda est, & ex primatur, vestigiumque vesicæ vel ol. rosar. vel mucagine ex sem. cyton. cum aq. rosar. factæ obliniatur.

Therma
Carolina.
Decoctum
china.

Hæc si non contulerint, doloresque coxarum & scapularum non sedaverint, ad thermas ex sulphure constantes & aluminosas, quales sunt Carolinæ prope Vallem Joachimicam, aut ad usum rad. chinæ vel sarmenti Indici ablegandus est patiens.

5. Dorsi dolor quid, quæ ejus causa, & quæ ratione curandus?

Dorsi dolor
unde oria-
tur.

"Αλγος τῶν ὀστέων, dolor dorsi. Dorsum totam posticam partem, ex 24. vertebriis coarticulatam, pectorique oppositam vocamus, per vertebrae dorsi spinalis medulla tanquam rivulus ex cerebro profluit, ex spinali medulla 30. paria nervorum utrinque per vertebrae foramina exoriuntur, & in totius corporis partes distribuuntur. Ubi itaque hi nervi vel gravantur vel obstruuntur vitiosis humoribus, circa dorsum dolor excitatur, qui ad arthritidos species merito referri debet.

Causa.

Causæ ἀρτηριτικαὶ dolorū dorsi sunt humores vitiosi aut calidi aut frigidi ex cerebro ad articulos vertebrae defluentes nervosque moestantes, aut status inter musculos & vertebrae collecti. Πνευματικαὶ sunt aëris ambientis extrema frigiditas aut in aq. frigida diuturnior mora, aut inunctio vehementer calefacientium remedium, item casus & percussio in dorsum, aut labor ponderumque graviorum repentina sublevatio, nimiaque corporis inclinatio. Libidinositatem immoderata Venere hocce dolores sæpius excitant.

Signa sunt manifesta. Distinguendus tamē diligenter hic dolor dorsi arthriticus, à doloribus ex calculo, & orificii ventriculi. Calculi renum indicia urina præbet. Dolor orificii ventriculi ad extremitatem costarum in dorso percipitur, & simul ad anteriora penetrat.

Curatio.

Curatio ex arthritidos speciebus antecedentibus huc referri debet. Primum itaque considerandum erit, sicuti in aliis arthritidos speciebus, utrum dolori col. intemperies aut frigida sit conjuncta: & vitiosi quidem humores primum convenientibus catharticis remediis tum ex capite tum ex reliquis partibus expurgandi sunt, ac tandem ad topica remedia deveniendum.

Et si calida intemperies una cum dolore sentiatur, spina dorsi & locus affectus inungatur ol. rosar. cum mucilag. sem. psyllii cum aceto rosar. facta. Post inunctionem loco affecto imponatur catapl. ex far. hord. & q. s. ol. rosar. & album. ovor. confectum.

Remedia
in causa
calida.
Ol. camphoræ
etiam hic
prodest.
In causa
frigida.

Ubi vero dolorem dorsi frig. intemperies excitabit, adhibeantur calidæ inunctiones, veluti sunt aq. juniperi, cui nonnihil ol. ex gr. junip. & ol. vitrioli sit admixtum. Aut unguento ex sapone Veneto, & spiritus juniperi antea descripto inungatur dorsum. Post inunctionem imponatur & catapl. ex foliis majoranæ, salviz, rorismarini simul in vino coctis in mortarioque contusis, addita q. s. far. lupinorum & ol. costini, fiat cataplasma.

Si vero dolor dorsi ex flatulentis spiritibus inter musculos collectis sit excitatus, satis erit linteolis calefactis crebro confricere dorsum.

In flatu-
lenta ma-
teria.

Dolorem dorsi ex equitatione laboribusque contractum, quies, balnea & inunctiones cum ol. chamæ. & aneth. tollere possunt. Lavetur quoque dorsum cum vino calido, quod valde reficit.

Dolor à
motu ut
curandus.

6. Maxillarum dolor quid, quæ ejus causa, quæ signa, & ut curandus?

"Αλγος ἢ ἂν ἴσται τῶν ὀστέων, mandibularum dolor. Maxilla superior in omnibus animantibus immobilis est, excepto crocodilo & psittaco; inferior autem cum ossis capitis

Dolor ma-
xillarum
arthriti-
cus.

capitis coarticulatur, ex quarum alveolis dentes pronascuntur. Dentes enim & maxillæ similibus doloribus & ex iisdem causis afficiuntur, qui ad arthritidos species referendi sunt.

Causa. Causa *αεμνυρδον* doloris maxillarum, est adfluxio humoris calidi, vel frigidi. Maxillæ siquidem vestiuntur membrana tenui sive periosteo ex peritonæo orto, per quam plurimi furculi venarum, nervorum & arteriarum sunt dispersi, qui & in radic. dentium implantantur. Per eos autem defluit humor tenuis & calidus qui vehementes dolores cum in maxillis, tum in dentibus excitat: Aut crassus & pituitosus humor eò delabitur, & in maxillis tumorem excitat. *Περονταρκτηναι* sunt ambientis aëris excellens frigiditas aut caliditas & ictus violentus. *Crapula item & ingluviæ defluxiones excitans.*

Signa causarum. Signa sunt manifesta. Humoris autem defluentis qualitas ex habitu faciei, doloris vehementia, & tumore maxillarum dignoscitur.

Curatio. Curatio pro adfluentis humoris qualitate variari debet. Post vitiosi itaque humoris expurgationem & subtractionem, ut si calidus sit in maxillis humor collectus, per pill. cochias; si vero crassus & pituitosus, per pill. aureas & aggregativas, tum ad dolorem mitigantia Topica remedia confugiendum erit.

Topica in causa calida. In calida defluxione utiliter Emplastello ex pulv. canthar. cum pauxillo fermenti & mucag. sem. psylli in aceto macerati, & pone aures per 4. horas applicato uti possumus, ex quo Empl. ubi vesica est excitata, *ἕως* puncta vesicula exprimitur, & locus inungatur aut ol. rosæ aut unguento popul.

Vesicatorium. Maxillæ vero dolenti applicetur catapl. ex fol. solani & semper vivæ in æ. p. aq. & aceti concoctis, addita q. s. farinæ hordei & parum ol. violarum, ac simul contrita in cataplasm. formam redigantur.

Epibema. Aut *℥.* Album. ovor. n. ii. aq. & aceri rosar. an. *℥* ii. commisceantur, & ad lentum ignem concoquantur, semper agitando donec in pulvis formam redeant: cui tan-

dem tepido admisc. pulv. thuris *℥* iii. quæ tepida dupl. linteolis excipiantur, & instar catapl. applicentur per noctem.

Interiores autem maxillarum partes in *Collutio o-* ore utilissi. erit crebro eluere decoct. rad. *rin.* hyoschyami in rotulas concisarum, quæ in æ. p. aceti & aq. concoquantur.

Ubi vero adfluens ex cerebro humor *In causa* frig. & crassus existat, & tumorem ali- *frigida.* quem in maxillis excitet, tum præstiterit crebro inungere & os colluere cum aq. juniperi, aut cum decocto rorism. & rad. pyrethri in vino. Aut

℥. Flo. chamæm. melilori, aneth. ser- *Sacculus.* pill. rorisma; an. M. i. sem. malvæ M. i. s. concidantur, & in sacculum quadratum aut maxillæ adaptatum consuantur, & in vino ebulliant, qui sacculus expressus dolenti tumentique maxillæ crebro applicetur. Reliqua remedium genera ex aliis speciebus Arthritidos, & dentium doloris curatione petenda erunt.

7. Dolor articulorum in lue Venerea quid?

Præter has Arthritidos species enumeratas *Vbi dolor* acerbissi. dolor in articulis manuum ac *in lue Ve-* pedum & scapularum ex lue Venerea sive morbo Gallico sæpe excitatur, quorum causas curandique rationem paulo post in curatione morbi Gallici, ubi de cutis affectionibus nobis sermo erit, tradituri sumus.

SECTIO III.

DE AFFECTIBUS CUTANEIS.

1. Cutis quid, & quibus potissimum morbis afficitur?

Δ *ἔστω*, Cutis est universi corporis tegumentum. Gal. lib. i. cap. ult. de temperamento, cutem nominat nervum sanguine præditum. Habet enim cutis substantiam, & naturam mediam inter nervum & Y y 2 car-

Pori Cutis. carnem. Est vero universa cutis infinitis & exiguis foraminibus pervia, quæ pori vocantur, per quos fit continua transpiratio & evaporatio noxiorum halituum.

Affectiones cutis duplices. Afficitur cutis & propinquæ subcutaneæ partes duplici genere morborum, uno qui chirurgiæ sunt subjecti, ut sunt vulnèra, ulcera & tumores majores præternaturales, de quibus in morborum chirurgiæ subjectorum curatione tractabimus: hoc vero loco eorum vitiorum cutis trademus curationem, quæ per superficiem cutis efflorescunt, ut sunt:

Morbilli & variolæ,
Scabies sicca, & purulenta sive for-
dida,
Prurigo,
Ignis sacer, ~~et~~
Serpigo vel impetigo,
Pustulæ efflorescentes in facie adul-
torum,
Lepra,
Morbus Gallicus sive scabies Venerea,
Verrucæ,
Clavi,
Vermes capillares subcutanei,
Vermiculi miliares sub cuticula ge-
nerati,
Lentigo,
Maculæ cutis omnis generis,
Cutis adustio.

2. Morbilli & variola quid, quæ eorum
causa, quæ signa, & quomodo
curandi?

Exanthemata quid. Ἐξανθήματα, efflorescentiæ & pustulosæ eruptiones cutis. Plinius papulas, nostrates vero variolas, **die Kinder Pocken** / morbillos autem **die Masseln** vocant: pueris familiarissima est affectio, qua quidam eorum non tantum semel, sed & bis & ter laborare consueverunt. In adultis rarius accidit, sed magis est exitiosa, & difficilius curationis. Morbilli & variolæ differunt inter se materia & colore per cutem erumpente. Morbilli enim ex tenui & ut plurimum inflammato sanguine: Variolæ ex crasso & pituitoso sanguine, utroque tamen impuro & venenato originem trahunt.

Eorum differentia.
Morbilli.
Variola.

Causa utriusque ~~αἰτιολογία~~ est quidem causa. impurus sanguis & reliquæ menstrui sanguinis, quo in utero nutriebatur infans. Προγενετική est pestilens & contagiosa aëris constitutio: Ut plurimum enim, ut in peste, ita in exanthematibus eodem tempore plurimi per contagionem & conversationem aërisque infectionem afficiuntur, & plerumque exanthematum comes pestis est.

Signa. Signa sunt evidèntia. Utrumque tamen malum inter se discernitur colore & quantitate. Morbilli enim rubent maxima ex parte, & per cutem universam dispersi, minutiores esse conspiciuntur, vestigiis morsuum pulicum ferè similes, nonnihil tamen cute eminentiores. Variolæ autem varii sunt coloris, pro redundantis in corpore humoris colore, ut pituitæ albidiores, bilis magis flavescèntes, atra bilis subnigræ aut livescèntes cernuntur, majoresque magnitudine fabæ aut nucis avellanae è cute prominent.

Utriusque affectionis perniciosiores sunt nigræ & livescèntes, tutiores albæ: lethales quoque habentur quæ difficulter erumpunt, aut quæ semel progressæ rursus evanescent, & ad internas partes se recipiunt, & quæ fauces pulmonesque occupant.

Curatio. Curationem & Morbillorum & variolarum simulque omnium symptomatum ex eis nascentium supra inter morbos pueriles eis abundè tradidimus. Verum ubi adulteriores hisce malis tentantur, si corpus sit plethoricum, donec vires constant, plurimum conducet impurum sanguinem per venæ Epaticæ sectionem dextri lateris: aut plurimum cicurbitularum cum scarificatione, aut hirudinum suris applicationem subtrahere.

Post sanguinis impuri detractionem, reliqui quoque humores vitiosi in corpore prævalentes, cujuscunque speciei fuerint, id quod ex corporis constitutione ac calore prudens Medicus facillè dignoscere poterit, per convenientia pharmaca exturbandi erunt. In genere autem conferunt plurimum aut 3 x. cassiæ rec. extractæ, aut 3 ii. syr. rosati solut. aut 3 x. Diacathol. aut Elect. le-
nit.

Signa.

**Morbillo-
rum.**

**Variola-
rum.**

**Prognosti-
ca.**

Curatio.

**Vide Q. 2.
s. 5. lib. 9.**

**Vena se-
ctio.**

**Cicurbitu-
la.**

**Purgan-
tia.**

nit. cum q. s. aq. card. benedicti dissoluta, & sex horis ante prandium ebibita.

*Expellen-
tia.*

Purgatis vitiosis humoribus, si exanthemata sponte tardius erumpant, eorum expulsiōe danda est opera. Expelluntur autem, si patiens crebro est in acetariis nasturtium aquaticum, & radic. culinarias, quas nostrates *Merretigk* nominant. Haustus quoque crebrior hydromel. promovet & expellit Exanthemata, nisi forte adsit ardens febris. Tum enim hydromel est vitandum, & pro potu eis est offerendum decoctum ficum & passularum & rad. faniculi.

*Hydromel
quando ex-
hibendum.*

*Decoctum
china.*

Inter cetera prastantiss. est exanthematum propulsivum, decoctum rad. chinæ aut sarment. Indici, aut rad. perasis, quorum 3 r. cum lb. iiii. aquæ in duplici vase concoquenda est per duas horas, cui saporis causâ adjici possunt 3 r. passul. minor. Decoctum lentum, quibus vulgus Medicorum in expellendo hoc vitio utitur, nos omnino improbamus.

*Reliqua
remedia
unde po-
tenda.*

Qua ratione autem jam apparentia Exanthemata in superficie cutis sint tractanda, pungenda, abstergenda, quibusque remediis dolor sit mitigandus, quibus item vestigiæ & stigmata variolarum morbillorumque tollenda & cutis explananda, ex morbillorum variolarumque puerilium curatione superius tradita peti debent.

4. *Scabies quid, qua scabiei differentia, qua causa, qua demique signa, & qua ratione curanda?*

*Scabies
quid.*

Σώγη, Scabies. Per utrumque vocabulum varia cutis vitia, cum Græci, tum eorum Interpretes comprehendunt. Nos vero scabiem cutis exasperationem, vel torius corporis vel aliquarum partium tantum cum pustulis, ulcusculis & pruritu, doloreque post conficationem, vocamus. Nostrates *den Grind / Schabbheit / Schorb* oder *Sürigkeit* nominant. Excludimus autem ex genere scabiei, Impetigines, lepram & morbum Gallicum, similesque malignas exulcerationes cutis.

*Differen-
tia.*

Sunt autem prima divisione duæ species

scabiei, sicca & pruriginosa, & subhumida vel purulenta. Sicca scabies ut plurimum ex bile flava adusta & ex melancholico excremento in cinerem visco sanguinique admixto generatur. Humida vero scabies ex seroso humore & pituita salsa originem ducit.

Generatur quoque ex retorrido sanguine scabies, quæ circa crustas rubicundior apparet. Atque quæ ex melancholico humore generatur, plerumque crustam habet subustam. Ex seroso vero humore pustulæ excitantur, quæ si pungantur, aqua profluit. Scabies autem ex salsa pituita majores habet pustulas & suppuratur, ac ubi ad maturitatem pervenit, si pungatur, pus exprimitur albicans.

*Signa di-
versarum
causarum.*

Causa itaque *αἰσχυρότης* scabiei est, sanguinis impuritas cum vitiosa pituita, & salso aut seroso humore, aut cum bile adusta, aut cum melancholico excremento. *Πεπονισμένη* est prava victus ratio, crebraque esitatio esculentorum salsam pituitam aut serosam humiditatem generantium, qualia sunt alimenta, carnes piscesque sale conditi, fumoque exiccati, & cæpæ porrumque crudum.

Causa.

Signa ex enumeratis speciebus agnosci possunt.

Curatio scabiei varianda est pro causarum diversitate seu humoris ex quo scabies excitata est specie ac natura. Consistit autem scabiei curatio in materiæ subductione & expurgatione, quæ & per venæ sectionem & pharmaca convenientia perfici potest, & Topicorum remediorum scabiem tollentium applicatione.

Curatio.

Victus ratio institui debet in scabie contraria naturæ & qualitati humoris vitiosi, & imprimis utendum est alimentis boni succi & facile concoquibilibus. Vitanda autem studiose omnia genera esculentorum pituitam salsam, serosum biliosumque humorem, & adustam melancholiam generantia, ut sunt omnia edulia acrida, salsa, putrefactioni obnoxia, sale condita fumoque macerata carnes ac pisces, & vinum forte largius bibitum.

*Victus ra-
tio.*

Vena se-
ctio.

Venæ sectio in scabie, si ætas ferat, minime negligenda erit. Si itaque ex sanguine retorrido aut bilioso humore scabies originem ducat, id quod ex rubedine loci affecti, aut flavescence humore in scabie midenti dignosci potest, vena erit secanda Epatica dextri lateris: sed si scabies ex melancholico humore adusto sit excitata, id quod ex subnigris livescitibusque scabiei crustis deprehendi potest, ex vena lienaria sinistri lateris, quæ idem est cum Epatica, sanguis detrahi debet.

Purgan-
tia.

Post venæ sectionem tota massa sanguinea à vitioso prædominante humore, qui materiam scabiei subministrat, convenientibus pharmacis purificanda & separanda erit. Ante purgationem verò, si crassa & salsa pituita aut melancholicus humor in corpore prædominetur, tunc sanè vitiosa talis materia concoquenda & extenuanda erit. Biliosus autem humor & serosus etiam sine concoctione & extenuatione evacuati facile potest, nimirum vel ʒ iiii. syr. ros. solut. vel ʒ x. cas. extr. vel sero lactis caprini in quo sol. senæ aut interni cortices sambuci sunt macerati & cocti, vel infus. Rhabarb. vel Electuar. lenitum aut Diacathol. est admixtum. Porro cum in scabie

Cathartica
reiteranda. sanguis vitiosis humoribus sit infectus, qui non tantum in venis majoribus, sed in exilibus extremis & cutaneis continetur, ideo una purgatio non sufficiet, sed per intervalla iterum atque iterum purgatio repetenda erit.

In pituitosa aut melancholica scabie, sequens potio præclare utrumque præstat, concoquit enim simul & expurgat.

Potio utilis
in scabie
pituitosa
& melan-
cholica.

ʒl. Rad. glycyrr. Elenii, polypod. cichor. chelidon. maj. an. ʒ s. lapatii ac. ʒ i. Ellebori nigri in aceto per noctem macerati, & rursus exiccati ʒ ii. ceterach M. i. Fl. centaur. cardui benedicti, scabiosæ an. M. s. Rhab. ʒ iiii. Agar. Troch. in pul. redacti in linteoloque colligati ʒ ii. Fol. senæ Alex. ʒ s. Thymi, Epithymi an. ʒ i. s. conservæ fumar. boragin. buglossæ an. ʒ i. contund. con-

tundantur, & concigenda concidantur atque cum lb. v. feri lactis caprini in cantharo per 2. horas concoquantur, & refrigerata colentur: hujus liquoris ʒ iv. aut v. mane ac vespere tepide exhauriantur. Concoquant enim quoslibet vitiosos humores, & expellunt, attrahuntq; ex quibuscumque extremis venis. At vero qui crebras alvi subductiones ferre non possunt, vel qui per se alvum habent laxam, rr. præscriptæ potionis ʒ iv. vel diluculo tantum vel alternis diebus usurpare possunt. Aut etiam ex hac portione omitti possunt inter præparandum laxantia, ut sunt sena, Rhabarb. Agaricus. Ubi autem excrementa sanguinis sufficienter sunt concocta & extenuata, tunc per intervalla 4. dierum, haustulo ejus positionis in purganda pituita admisceri possunt ʒ i. aut ʒ x. Diaphæn. & in melancholico excremento deturbando, in eodem haustulo resolvi possunt Dialenæ & confectiois hamech. an. ʒ s. & diluculo 6. horis ante prandium exhiberi.

In leviori scabie vitiosus humor commodius seq. syrupis concoqui potest.

ʒl. Syr. è fumar. de lupulis, cichorio, è succo cardui benedicti, mellis rosac. an. ʒ s. aq. fumar. cardui benedicti an. ʒ ii. misc. pro uno haustulo, qui quotidie repetatur, & mane ac vespere per quatrinduum exhauriatur. Deinde exturbetur vitiosus humor aut præscriptis remed. catharticeis, aut seq. pillulis.

ʒl. Mass. pill. de fumo terræ, aurear. fetidar. an. ʒ i. quibus si biliosum est corpus, addantur gr. 4. Diagrid. si pituitosum, tantundem Troch. alhand. & cum q. s. mellis rosac. fiant pill. 27. quæ diluculo devorentur. Aut seq. haustu fiat purgatio.

ʒl. Confect. hamech. ʒ s. Diacathol. ʒ ii. Elect. rosati solut. Mef. ʒ i. cum haustu aq. fumar. fiat haustus.

Cor.

Topica
quando
adhibenda.

Corpore ritè purgato; Topica remedia, ut sunt balnea, fomentationes, ablutionesque & inunctiones adhibeantur. In inunctionibus autem studiose cavendum est, ne prius fiat inunctio, quam ubi corpus à vitiosis humoribus probè fuerit perpurgatum: Alioqui enim, si per pingues inunctiones obstruantur pori cutis, nequit fieri transpiratio, & vitiosi humores ad interiora repelluntur in viscera, ibidemque magis putrescunt, & aut febrem incendunt, aut alia graviora symptomata excitant, & nonnunquam in naturis imbecillioribus vitæ perniciem adferunt.

In scabie
humida.

Itaque ante inunctionem, si scabies subhumida purulentaque existat, assumat æger sudorificum haustum hac ratione confectum.

Hauftus
sudorificus.

℥. Theriac. Androm. ʒ i. pulv. bacc. lauri, aristol. rotundæ, Elenii an. ʒ i. vini in quo decoctæ sunt rad. Elenii & petasitis haustulum, quæ simul commixta tepida ebibantur, & eo assumpto, balneum vaporarium patiens ingrediatur, in eoque per horæ spacium sudet diligentèr, sudore sufficienter propulso, scabiosum corpus aut partes scabiosæ abstergantur, & seq. decocto abluantur.

Balneum.

Fomenta-
tio & ablu-
tio.

℥. Rad. Elenii, lapatii acuti an. ʒ ii. Aristol. rot. bacc. lauri an. ʒ i. sulph. citrini ʒ ii. camph. ʒ i. crassiusculè confusa coquantur in q. s. cerevisiæ ad tertias, quo colato liquore sponsia excepto laventur fomententurque scabiosæ partes: & talis quidem ablutio ac balneum commodè quoque ternis diebus repeti potest.

In scabie
secca &
pruriginosa.

Verum si scabies sit secca & pruriginosa, præstat patientem in balneum aq. marinæ collocare, in quo decoctæ sint rad. Elenii, lapatii acuti, herbæ malvæ cum rad. parietariæ, violæ, flor. chamæm. & meliloti, fursuris filiginis in sacculo colligati an. pro arbitrio Medici q. s. In eo decocto confideat æger per horæ spacium: egressus è balneo confricat ac fomentet loca scabiosa seq. sacculo.

Inseffio.

℥. Far. crassioris fabarum, fænug. pul. Elenii, bacc. lauri an. ʒ i. sulph. vivi ʒ ii. camph. ʒ i. confusa commisc. & sacc. insuantur, & cum q. s. cerevisiæ ebulliant, quo scabiosæ partes abluantur ac fomententur, & per se siccare sinantur. Demum ubi à balneo ac fomentatione siccatum est corpus, in loco calido inungatur scabiosus locus seq. unguentis.

℥. Terebinth. in aq. rosac. quinques-
lotæ ʒ s. butyri recentis salis exper-
ti ʒ iii. ol. rosac. ʒ vi. vitelli unius
ovi, salis communis ʒ ii. sulphuris
tenuiss. pp. ʒ s. Camphoræ ʒ s. Om-
nibus simul commixtis diutius subi-
gantur in plumbeo mortariolo, fiat
linimentum. Aut ℥. Suc. lapatii a-
cuti, Elenii, plantag. an. ʒ s. suc-
ci limonum ʒ s. Terebinth. styracis
liquidæ an. ʒ iii. ol. rosac. ʒ v. pulv.
tenuissimi litharg. ʒ i. Tutæ pp. ce-
rusæ in aq. rosac. lotæ an. ʒ ii. rad.
Elleb. nigri ʒ i. subigantur in mor-
tario, fiat linimentum. Aut ℥. Butyr.
recen. ʒ ii. liquefiat ter quaterque
semper in frig. aquam profundendo,
cui deinde admisceantur suc. lapat.
acuti ʒ ii. suc. limon. ʒ ii. in qui-
bus simul commixtis ebulliant fol.
major. & salviæ viridium ac conci-
forum usque ad succor. evaporatione-
nem, tandem fortiter exprimantur
ac colentur, colatæ pinguedini ad-
misc. tenuiss. pul. sulph. ʒ s. camph.
ʒ s. & diutiss. agitentur in mortario,
quibus postremo jucundioris odoris
gratia admisceantur gutt. x. ol. de
spica aut ol. juniperi.

In crustosa scabie, quæ in cute altius radi-
ces egit, illiniatur scabiei seq. aq. stillaricia.
℥. Suc. lapatii acuti lb. ii. plantag. lb. i.
aq. rosæ ʒ vi. succi limon. ʒ iii. pul. lithar-
gyri ʒ iv. cerusæ ʒ ii. Mercur. sublim. ʒ ii.
sulph. ʒ i. salis communis ʒ s. commisc. in
vitrea cucurbita, simulque macerentur per
3. dies quotidie agitando, cui tandem
imponatur capitellum rostratum vitreum,
& in

Sacculus.

Vnguen-
tum.

Linimen-
tum.

Aliud.

Lap. medi-
camentosus
Crollii in
aq. conve-
nienti so-
lutus &
inunctus e-
tiam valde
hic utilis.

In scabie
crustosa.
Destilla-
tum singu-
lare.

Vnguentum cum Mercurio. & in ferventi cinere aut arena destillantur suaviter, quæ aqua quotidie bis scabiei inungatur. Extirpat enim etiam maligniores scabiei crustas. Aut ℥. Rad. Elenii, & lapatii ac. an. p. æ. quæ in minutiss. partes concisa macerentur in aceto per noctem ac deinde concoquantur ad molliciem, & per cribrum setaceum ejus pulmentum transprimatur, cujus accipe ℥ ii. eisque admisc. axungia porcina. ℥ i. s. argenti vivi cum hominis jejuni saliva extincti ℥ i. commisceantur ac diu subigantur in mortario, fiat unguentum.

Therma. Hæc si non contulerint & contumacior maligniorque sit scabies, æger ad thermas sulphureas & aluminosas, quales sunt Carolinae prope Vallem Joachimicam ablegatur. Aut confugiendum erit ad usum famenti Indici, cujus parandi utendique rationem in morbi Gallici curatione tradituri sumus.

Decoctum sarsaparilla.

4. Ignis sacer quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curandus?

Erysipelas quid.

Ερυσίπelas, nostris *das Heillige ding* est fervens & biliosus sanguis ad aliquam partem corporis, ut manus, caput, omnium frequentissimè tamen ad tibias confluens, & cum pruritu, túbédine & dolore percutim erumpens. Galenus & omnes ejus interpretes Erysipelata inter tumores præternaturales numerant, sed quia in parte affecta nullus sensibilis tumor apparet, nec ut reliqui tumores suppuratur, nos inter affectiones cutis referre volumus.

Causa.

Causa *αιτημένη*, ut jam dictum est, fervens & tenuis sanguis bilioso humore mixtus, & caliditas Epatis. Προκατερεπνύει sunt acrium calidorum alimentorum, & vini meracioris crebra usurpatio, & hæreditaria propensio à parentibus Erysipelate laborantibus contracta, & diuturna conficatio compressioque cutis in aliqua parte.

Signa.

Signa sunt manifesta. Semper enim affectæ partis cutis rubet, & ad tactum fervet. Quanto autem major copia bilis sanguini est mixta, tanto majores dolores excitat, & color cutis ad flavedinem vergit. Porro Ery-

sipelatos materia ubi primum fluere incipit & agitur, semper febrilem accessionem semel tantum infert, tertianæ similem.

Erysipelas quæ ab interioribus ad exteriora erumpit bonum, contra verò in exterioribus apparens & cito evanescens, ad interioraque repulsum, teste Hippoc. 6. Aph. 25. perniciosum existit.

Curatio. In levioris ignis sacri eruptio-
ne Boreales nostri universam curationem naturæ committunt, prorsusque nulla adplicant Topica remedia, sed mundis tantum & moderatè calidis linteolis involvunt & contegunt locum affectum. Ita enim paulatim per insensibilem evaporationem solvitur materia.

Verum si quis in initio ignis sacri statim in accessione febrili patienti offerat sudorificum haustulum ex ℥ ii. Theriacæ Androm. cum q. s. aq. fl. sambuci mixtæ, aut ℥ iiii. aq. petasitis & coopertum ægrum in lecto probe sudare curet, ut plurimum altero die ab Erysipelate liberatur.

At si dolor in loco affecto exacerbetur ex inflammatione, proderit plurimum aq. fl. sambuci linteolis exceptam loco affecto imponere.

Omnia autem erunt magis efficacia, si al-
vus, præsertim ubi est obstructa, eluatur cum Enemate ex malva Mercuriali & violaria simul decoctis, in earumque liquoris lb. i. palpæ cassiæ ℥ ii. & ol. violar. ℥ iiii. & salis ℥ i. resolutis.

Ne autem Erysipelas redeat, aut saltem mitius molester, *αεφύλαξις*, id est præcautio hujusmodi instituat.

Victus ratio observetur refrigerans & humectans. In eduliis itaque conveniunt cremor prisanæ, pruna acida, thamarindi, & in acetariis lactuca acetosa & portulaca, lac amygd. oryza, caro pullorum cum uvis immaturis cocta: potus esto aq. hordei cum cinamomo cocta. Viter autem patiens vinum, omnia denique pingua & acria. Deinde verno & autumnali tempore, si nihil impedimenti obstat, sanguinem ex vena Epatica dextri lateris commodè educere possumus. Quin & biliosus humor cum vere tum

in

Cholagoga. in autumno post sanguinis emissionem seq. haust. subduci potest. ℥. Decoct. thamarind. & prunor. ꝯ v. in quibus resolvantur ꝯ iii. syr. rosati solutivi, fiat haustus. Aut ℥. Rhab. ꝯ i i. sem. anisi ꝯ i i. contusa misceantur, & per noctem in aq. cichor. ꝯ v. macerentur. Deinde mane ad fervorem calefacta, fortiter exprimantur & colato jusculo admisc. Elect. lenit. ꝯ vi. aut pulpæ cassiæ ꝯ i. fiat haustus.

Symptomata magna Erysipelas comitantia. Porro si redeat Erysipelas & magnum existat, nec sponte à natura discutiat, tum ut plurimum hæc gravia symptomata inferit, inflammationem, dolorem acrem, & cutaneæ rubedinis in livorem conversionem, quibus accidentiis sequentibus præsidii succurrendum erit.

Inflammationis remedia. Si inflammatio vehemens conjuncta sit sacro igni, leniter refrigerantibus mitigari debet. Verum non amplius applicanda sunt refrigerantia quam ad rubedinis alterationem. Si enim diutius & vehementer refrigerantia imponantur, cutis schirrhosa & livida redditur. Hæc itaque commodè imponi possunt, succus solani aut hyoscyami aut semper vivæ maj. aut mucag. sem. psyllii cum aqua plantag. confecta, quæ omnia linteolis dupl. excepta Epithematis instar applicentur. Aut imponantur lentes palustres catapl. modo, quin & rosac. ol. & ungu. popul. cui parum aceti rosac. sit admixtum utiliter inungi potest. Omnia autem hæc actu frigida applicanda, & crebro immutanda erunt, antequam incallescant, aut arida fiant. Aut

Epithemata. ℥. Suc. plantag. ꝯ i. ol. rosa. ꝯ i i. pul. litharg. ꝯ i. cerusæ ꝯ i i. lactis muliebriis ꝯ s. conterantur simul in plumbeo mortariolo donec linimenti formam acquirat, & inungatur. Remisso fervore ut ne subcutaneus humor incrassescat livoremque affectæ parti inferat, resolvendi humoris gratia seq. cataplasma imponatur.

Linimentum. ℥. Suc. plantag. ꝯ i. ol. rosa. ꝯ i i. pul. litharg. ꝯ i. cerusæ ꝯ i i. lactis muliebriis ꝯ s. conterantur simul in plumbeo mortariolo donec linimenti formam acquirat, & inungatur. Remisso fervore ut ne subcutaneus humor incrassescat livoremque affectæ parti inferat, resolvendi humoris gratia seq. cataplasma imponatur.

Cataplasma. ℥. Medullæ panis in lacte macerata cui far. hord. q. s. admisc. & loco affecto imponatur seq. cataplasma simul & refrigerat & subcuta-

neos humores digerit ac resolvit.

℥. Fol. recent. althææ pro arbitrio, Aliud requæ concoquantur in q. s. aq. dein. frigerant de conterantur, eisque admisceantur ol. ros. q. s. quibus & far. hord. & pul. lithargyri & cerusæ ad placitum admisceri potest. Magis autem penetrat & resolvit, si aceti rosac. parum commisceantur.

At vero si vehemens & acerbus dolor occupet locum affectum, statim mitigatur si fol. & rad. hyoscy. in stupa convoluta & sub cineribus cal. assata denique contusa & cum unguento popul. q. s. in catapl. formam redacta imponatur.

Accidit quoque ut quandoque ex acrimonia biliosi sanguinis, affectæ partis cutis exulceretur, cui probè auxiliatur si unguentum è cerusa, aut linimentum ex ol. rosac. in plumbeo mortariolo tantisper agitato donec incrassescat, inungatur.

Caterum ubi color rubeus in livorem convertitur, tum locus affectus ac lividus crebro & multum fomentetur. Præstat autem si aqua sit marina aut loco ejus muria, à quibus si genuinus color non redeat, cutis scalpello scarificari debet, & sanguis exprimendus, scarificatoque loco Emplast. Diatessaron sive Brunonis imponatur & aq. calida subinde perfundatur.

5. Impetigo & serpigo quid, quæ earum causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Ἐγρη, λεχν, serpigo & impetigo, non strates impetiginem die gemeinen Flechten / serpiginein die Franzosischen Flechten nominant. Rectè quidem meo judicio Joannes de Vigo chirurgus has duas cutis affectiones conjunxit: non enim differunt nisi extensione & remissione sive magnitudine. Nam Græcorum descriptio Herpetis & Lichenis, vitio huic quod Flechten nominatur, minimè congruit, sed potius sicæ scabiei. Hæc autem affectio primum ex levi scabrie oritur, & tum impetigo nominatur, deinde vero latius altiusque serpit & cutem erodit & in timas scindit. Oritur hoc vitium cutis in omnibus carnosiss

Z z z parti-

partibus, potissimum autem in facie, collo, & omnium creberrimè, in vola manuum & in digitis.

Causa.

Causæ impetiginis & serpiginis *αἰνυμέναι*, sanguis aut tenui & seroso humore aut adusta bile, aut præternaturali melancholico humore & aluminosa materia mixtus. *Περίσχευσις* sunt loci affecti contrectatio ab alio, (est enim contagiosus morbus,) & ablutio in eadem aqua in qua lotæ sunt partes impetiginosæ serpiginosæque, & abster-sio manuum ac faciei cum linteolo in quo abster-sæ sunt partes serpiginosæ, & chirothe-cæ manibus inducæ ab impetiginosis antea usurpatae.

Signa.

Signa impetiginis & serpiginis evidentialia sunt. Primum enim cutis sicca scabie & scabrie afficitur, ac tandem processu temporis paulatim serpit & in latum se extendit, & nisi tempestivè succurratur, cutim pro-fcindit rimasque efficit, usque ad subjectam carnem.

Curatio.

Curatio utriusque affectionis consistit in victus ratione, venæ sectione, & vitioforum humorum concoctione & expurgatione, ac postremo Topicorum applicatione.

Dietæ.

In victu alimenta conveniunt purum sanguinem procreantia, & concoctu facilia, qualia in superioribus sæpius enumeravimus. Vitanda è contra sunt omnia salsa, facile putrescentia, & pituitam salsam retorridamque bilem generantia, veluti sunt pisces carnesq; sale conditæ, fumoque duratæ.

Venæ sectio.

Venæ sectio locum habet in corpore plethorico, vel loco venæ sectionis cucurbitulæ cum scarificatione paulo supra locum affectum, unde fit humoris vitiosi adfluxio, commodè applicari possunt. Deinde vitiosi humores sanguineæ massæ mixti seq. potione utiliter concoqui, extenuari & digeri possunt.

Digestiva potio.

℞. Rad. chinæ ʒ i. Glycy. cichor. an. ʒ s. polypod. ʒ vi. Ellebori nigri, prius in aceto ebulliti & rursus siccant. ʒ iiii. capil. Veneris, veron. cardui benedicti an. M. s. centaur. min. cortic. inter. sambuci an. p. ii. sem. anisi ʒ ii. conserv. fumar. bora-

ginis an. ʒ ii. concidenda concidantur, & contund. contundantur, & simul in cantharo stanno macerentur per noctem cum feri lactis caprini lb. iiii. & altero die concoquantur cantharo oblinito pasta, & in ahenum aq. plenum collocato per 2. horas cantharo refrigerato colentur, colatoque juri admisc. syr. de fumar. oxymel. simpl. an. ʒ ii. fiat potio, cujus mane ac vesperi sing. diebus exhibeantur ʒ v. calefactæ. Exhausta hac potione expurgentur vitiosi humores seq. haust. cathartico.

℥. Diacathol. ʒ vi. Diaphæn. ʒ iiii. *Haustrus purgans.*

confect. hamech. ʒ ii. dissolvantur cum ʒ v. aq. cardui benedicti, fiat haust. qui sex horis ante prandium ebibatur. Aut purgentur seq. pill.

℥. Mas. pill. è fumo terræ, Aggre- *Pillula.*

gativ. Hieræ cum Agarico an. ʒ i. Troch. Alhandal. ʒ s. cum q. s. confect. Hamech. formentur pill. n. xxvii. quæ circa medium noctis deglutendæ præbeantur. Præscripta potio concoquens & simul purgantia pharmaca jam dicta, ubi necessitas exigit & contrumax est malum, singulis mensibus vel alternis repeti possunt.

Perpurgato corpore localia præsidia par- *Topica.*

tibus impetiginosis vel lichenosis hujusmodi adhibeantur. Cum adhuc levis est impetigo, & antequam conversâ in serpiginem aut exulcerationem, cutis sola saliva jejuna confricata sanari potest: aut illinitione salivæ jejunæ cui favillæ ex focis sunt admixtæ, & in formam linimenti redactæ, aut confractione muræ ex butyro.

Ubi autem his remediis non cedit serpi- *Vbi vehementius ludit.*

go, præstat loco affecto tale Epithema lin-teolis exceptum singulis noctibus imponere. ℥. Succ. lapatii acuti, chelidon. an. lb. *Epithema.*

s. aceri scyllitici ʒ iiii. aluminis, æruginis an. ʒ i. Mercur. sublim. ʒ ii. salis Ammon. ʒ i. fustur. filigine ʒ s. Quæ omnia ebulliant ad tertias, deinde colentur, & fiat Epithema.

In

*Serpiginis
rimosa re-
media.
Vnguen-
tum.*

In serpigne rimosa & scissa cute præstan-
tiss. est sublequens unguentum.

℞. Saponis nigri ʒ i. s. styrac. liq. ʒ vi.
ol. lauri ʒ iiii. pul. vitrioli ʒ i. argenti
vivi cum saliva jejuni hominis diu agi-
tata mortificati & in pul. redacti ʒ ii.
subigantur in mortario quam diutissi-
mè, fiat unguentum, quo indies bis
ungatur ac confricetur locus affectus.

*Experi-
mentum
authoris
singulare.*

Ego autem ad omnem impetiginem ser-
piginemque tale præsentiss. præsidium exco-
gitavi, omnesque ex Dei beneficio persan-
navi, potissimum ubi serpiginis scissuræ vel
in manibus vel pedibus extiterint. Excre-
menti ferri 3. aut 4. majora frustra cande-
facio, & unum ex eis in grandem & capa-
cem ollam impono, pariemque seu locum
affectum supra candens excrementum ex-
tendo, & undique ollam culcitra aut pulvi-
nari contego, & cooperio ut nullus vapor
exire queat, deinde vinum rub. cum parti-
cula spongiæ excipio & subinde ac sensim in
candens ferrum exprimendo destillo, ita ut
fervor in olla excitetur, eoque vapore ele-
vato locum affectum fomento ac imbuo :
Quod excrementi frustum ubi extinguitur
& nullum ex se profert vaporem, aliud in
ollam impono, & similiter ut antea ago, id-
que sing. diebus bis per sesquioram facio :
& ita per octiduum omnis serpigo & rimæ
confanescunt. Talis enim vapor excremen-
ti ferri humores vitiosos per sudorem elicit,
exiccatur, & poros constringit.

*Ad cicat-
rices ri-
marum re-
medium.*

Ne autem serpiginis vestigia appareant,
inungo ac lavo locum rubentem aqua plant.
cujus ʒ vi. admixtæ sunt ʒ ii. ol. vitrioli.
Nonnulli ol. myrrha in hunc usum adhibent.

6. Pustula exiles in cute faciei qua vari e-
tiā dicuntur quid, qua earum
causa, qua signa, & quo-
modo curanda?

*Vari faciei
quid.*

Ἰσχοί, Latinis vari, nostratibus **die Wint-
nen**/ sunt parva & dura, magnitudinis se-
minis canabini vix excedentia, in cute fa-
ciei & nasi tubercula, quæ aut cito resol-
vuntur, aut ingenito exiguo pure mature-
scunt, quo expresso exiccantur & evanescunt,
nullum inferentia dolorem, sed tantummo-

do faciem dedecorantia. Hoc vitium maxi-
ma ex parte adolescentibus & prolifico se-
mine abundantibus ad Veneremque jam a-
ptis, continentibus tamen, familiare est.
Cessat enim post usum Veneris & rarissimè
post concubitum erumpit. *Quibusdam ta-
men naturale est, illisque post usum Veneris
magis erumpunt vari.*

Causa *αἰσθημένη* varorum, est sanguis *Causa.*
moderatè calidus & flatuosus, qui est aptus
converti in semen aut lac. *Προσγίγνεται*
sunt creber & copiosus potus vini meracio-
ris, vel cerevisiæ flatulenta & præpinguis, &
tepor aëris ambientis: nam æstate magis
quam hyeme vari erumpunt. *Hepar quoque
ut plurimum calidum habent, qui hoc malo
tentantur.*

Signa sunt satis conspicua. Ex tuberculis *Signa.*
enim faciei unguibus compressis, si vari sunt
maturi, exiguum pus crassum & album se-
mini simile; ex immaturis autem cruentus
mucor exprimitur.

Curatio facillima est. Post concubitum e-
nim & usum Veneris ut plurimum spontè e-
vanescunt: sed cum non omnibus adole-
scentibus concessum sit matrimonii vinculo
sibi consulere, hac ratione ac methodo facile
extirpari possunt. Si corpus sit plethoricum
& facies rubicunda, Vena primum hepatica, *Vena se-
ctio.*

deinde frontis commodè incidi potest, vel
cucurbitulæ applicari cervici cum scarifica-
tione, idque aversionis causa. Ubi vero san-
guis flatulenta & seminali materia est com-
mixtus, purificatur per bolum ex ʒ i. s. cas-
siæ extractæ, paulo ante prand. devoratum,
vel exhibeatur haustulus aptus ad subducen-
dum humorem in corpore redundantem,
id quod facile ex colore tum pustularum tum
totius faciei dignosci potest. Remedia autem
quibus singuli humores subduci debeant, ex
tabellis nostris superius præscriptis peti
possunt. *Vide Meth.
generalem
l. 5. sect. 3.*

Purificato sanguine, hæc sequentia To-
pica remedia applicentur, varos & quælibet
tubercula in facie exiccantia & extirpantia
faciemq; explanantia ac decorantia. Vespè-
ri iturus cubitum faciem habens varosam,
inungat eam aut ol. vitrioli, aut ol. tartari,

Zzz 2 aut

Quidam
Mercurio
sublimato
utuntur
feliciter
cum succo
limorum
Et aq. fl.
fabarum.

Cautela.

aut sulphuris, non quidem illo foetido, sed quod chymica arte fit paratum. Mane vero abluit faciem aq. calida in qua macerata sunt farina fabarum, & bulbi seu rad. liliorum alborum confusi, quæ eoulque repetantur, donec tubercula resolvantur, & facies sit explanata. *Hic tamen diligenter observandum, ne Topicorum varos repellentium usu intempestivo majus malum & omnimodam perniciem patienti creemus. Nam si hepar precalidum sua excrementa in faciem emittat, ibidemque varos copiose excitet, illi potius internis remediis succurrendum, calore ejus praternaturalis restringendus, & materia excrementicia varorum educenda, quam ad interna repellenda. Novi enim aliquot exempla eorum qui dum varos fortioribus topicis extinguere conati sunt, in morbos incurabiles inciderunt, & una cum variis vitam extinxerunt.*

7. Lepra quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Lepra
quid.

Ἐλεφαντίασις, lepra, nostratibus, *der Auffsatz* / (& eo laborantes Elephantici & leprosi, nostratibus, *die Auffsätzischen und die Sunderfischen* dicuntur,) est cutis vitium aspectu abominabile, contactu & exhalatione contagiosum, scabiei crustulæ simile, colore bufonum cuti, vel licheni herbæ, quæ arboribus Ilicum aut quercubus adnascitur, & pulmonaria nominatur, non absimile est. Porro lepram nostri temporis differre plurimum à divina illa plaga Ebraeorum, quæ etiam lepra vocabatur, Levit. 13. & quæ pro ratione & magnitudine peccati gravior atque gravior à Deo infligebatur, nullisque remediis, sed tantum nutu Dei curabatur, cujus Judices Sacerdotes Levitici erant, & quorum decem Filius Dei solo omnipotenti suo verbo perfanavit, Luc. 17. non est dubium. Hæc autem nostra ea est longè malignior, quæ ubi radices egit, prorsus fit incurabilis. Porro etsi de vocabulis non debet Medicus magnopere sollicitus esse, modo rem ipsam teneat, sciendum tamen hoc loco est, Græcos authores lepram nostram, quam nunc descripsimus, non

Lepra Græcorum.

sub nomine lepræ, sed Elephantiasis complexos esse. Erat enim apud Græcos levis affectio cutis, & species *ψώρας* lepra. Eorum autem Elephantiasin, & Arabes & omnes homines usque ad hæc tempora lepram vocitant.

Causa.

Causæ lepræ *αεχρυσμίνης* sunt melancholicus humor crassus & viscidus acrisque sanguini putrefacto in venis mixtus. In Elephantiasin siquidem tota massa sanguinea, quemadmodum & in Gallico morbo, corrupta & depravata est, & hinc est, quod sæpè morbus Gallicus in lepram degeneret. *Προγενεσις* sunt semen parentum leprosum in liberos derivatum: fieri enim nequit, quin ex parentibus leprosis leprosi generentur liberi. Conversatio & compotatio cum leprosis: virulenta enim leproforum saliva, ubi poculo adhæserit, lepram combibenti communicat. Concubitus cum leprosis, vel cubatio in stragulis in quibus decubuerunt leprosi. Item respiratio & exhalatio virulenta, proxima corpora, si tenera fuerint, inficere potest. His addi poterit & diuturnior consuetorum mensium & hæmorrhoidum retentio. Item alimenta melancholicum sanguinem generantia, ut sunt continuæ esitatio leguminum, lentium, & fabarum.

Etsi autem species lepræ plures sunt, tamen pro malignitatis extensione & remissionem, & qualitate melancholici sanguinis, in duas differentias dividi potest. In diram, contumacem & incurabilem; & in mitem, recentem exortam & quodammodo curabilem.

Signa.

Signa ex quibus lepra deprehenditur, varia & multa sunt, quæ tamen non omnia in sæva lepra concurrere est necesse: quorum præcipua hæc observari possunt. Lepra ut plurimum in facie & fronte incipit, in quibus tubercula sæda pronascuntur, quæ deinde totum corpus occupant, præterea nares resimæ & tuberosæ patulæque redduntur, labra prætumida, aures retortæ, frons extuberans, facies ex rubro livescens efficitur, & sædis tuberculis repletur, sub lingua venæ intumescunt & varicosæ nigræque redduntur. Musculi exteriores inter indicem & pollicem absumentur, pili cum ex capite tum ex

super.

superciliis decidunt, deinde totius corporis cutis subnigra & maculosa redditur, tandem scabrie inæqualiter & crustosa scabie conspurcatur, adeoque corio Elephantorum (unde Elephantiasis dicitur) similis efficitur, & horribiliter defædatur. Postremò primi digiti pedum ac manuum intumescunt, & tandem crura instar sacci cum dira scabrie instantur, ac præterea subinde leprosi insatiabili libidinis stimulo agitantur, cruor è venis detractus, grandinosus niger & fetidus conspicitur, qui propter insignem corruptionem non coalescit, & si ei sal injicitur non resolvitur ut in sano sanguine, ac si acetum infundatur, non commiscetur cruori.

*Singula-
ria lepra
indicia,
ex sangui-
ne.*

*Prognosti-
con.*

Prognosticon. Lepa inveterata & in habitum conversa, incurabilis est. Præstat itaque Medicum manus non admove. Oleum enim & operam perdet, cum vix incipienti, & recenti lepræ integra curatio reperiri possit, quicquid tandem Paracelsistæ gloriæntur, se posse omnem lepram curare suo oleo Antimonii, & ementito suo auro potabili. Humanitatis tamen & Christianæ commiserationis est, si consilium in incipienti & leviore lepra à Medico expetatur, ut id fideliter miseris hominibus imperiat, & sua experimenta liberaliter communicet, ut bonus Galenus sua remedia scriptis posteritati reliquit, qui in lib. qui de Informatione Empyrici inscribitur cap. 12. Elephantiasin viperarum virulentarum usurpatione curari posse docuit, & ejus curationis quinque exempla & historias memorabiles recitat, trium Elephantiasin laborantium, qui vino epoto in quo erant viperæ extinctæ persanati fuerunt, & unius qui ex institutione Galeni edoctus, viperam instar anguillæ coctam intrepidè esuravit, & à lepra liberatus est. Quinti verò, qui erat Thrax, qui somnio ab Æsculapio commonefactus, medicinam ex viperis confecit, assumpsit & foris inunxit, & sanitati est restitutus.

*Leprosi
quomodo
subvenien-
dum.*

*Historia
leproforum
casu cura-
torum.*

Curatio.

Curatio in lepra incipienti nondumque radicibus actis hujusmodi methodo tentari potest. Cum lepra ut diximus ex venenosa impuritate sanguinis originem ducat, non

semel sed subinde per venæ Epaticæ sectionem nunc dextri nunc sinistri lateris impurus sanguis subtrahendus est. Deinde & per venarum talarium sectionem, sed per intervalla, vel loco talarium venarum, sub malleolis aut venis hæmorrhoidibus in anohirudines applicari possunt. Deinde crassi ac viscosi humores medicamentis potissimum feces melancholicas aut pituitam salsam vehentibus, aut singulis vel saltem alternis mensibus expurgentur, ad quorum præparationem talis potio mane ac vesperi per octiduum ante purgationem exhiberi potest.

*Vena sc-
tio.*

*Purgan-
tia.*

℞. Rad. polypodii, Elenii, cichor. Cap-
par. an. ʒ s. Ellebori nigri per no-
ctem in aceto macerati ac rursum
siccati ʒ iij. gr. juniperi ʒ s. sem. a-
nisi, feseleos an. ʒ ii. herb. ceterach.
veronicæ, cardui benedicti, centaaur.
min. rotifima. an. M. s. conf. fumar.
borag. an. ʒ i. pass. min. ʒ i. s. ci-
nam. ʒ ii. concisa & contusa co-
quantur in duplici vase cum tb. 4.
seri lactis caprini per duas horas,
refrigerata colentur, de quo mane
ac vesperi ebibat æger ʒ v. tepidas.
Exhausta potione purgentur vitiosi
humores extracto Ellebori nigri, ʒ a.
pondere semiobuli aut gr. xij. pro
ratione virium. Validissimè enim pur-
gat omnes vitiosos humores præ-
sertim melancholicos. Aut exhi-
beantur gr. i i i. vitri antimonii con-
triti & commixti cum ʒ ii. conf.
rosarum. Aut ℞. Mass. pill. è fu-
mo terræ fetid. è lapide lasuli an.
ʒ i. Trochiscor. Alhandal. ex qui-
bus simul contusis, formentur pill.
n. 19. & cum syr. è fumo terræ me-
dia pars in uno, altera altero die in
aurora deglutatur, & à cibo per 6.
horas abstineat æger.

*Decoctum
digesti-
vum.*

*Melanago-
gæ.*

Purgato ea ratione corpore, ex doctrina
Galenii nihil est præstantius, quam bibere
Vinum crebro, in quo viperæ sunt extinctæ,
vel esitet carnes viperarum coctas instar an-
guillarum, abjectis tamen cauda & capite.

*Vipera-
rum usus
ad lepram.*

Zzz 3.

Cum.

Cum vero in his borealibus regionibus viperæ raro habeantur, consultum erit loco viperarum uti singulis septimanis semel aut bis Trochiscis è viperis, aut 3 r. Theriacæ Andr. mixtis ac temperatis cum aq. petasitis aut scordii, & post haustum ad sudorem se componere subindeq; sudorem abstergere.

Balneum.

Porro crustæ Elephantiasis in Balneo, in quo coctæ sunt malva, althæa, lapatium acutum, Ebulus an. cum rad. fl. chamæmeli & meliloti ac sem. fænug. emolliantur & auferantur & subiecto ulceri, ut dolor mitigetur & pruritus sedetur, linimentum ex lactis flore vel pinguedine in superficie lactis concreta illinatur cum aq. plantaginis. Præterea in incipiente lepra ægrum ad thermas sulphureas & aluminosas, quales sunt Carolinæ in finibus Bohemiæ prope Vallem Joachimicam, ablegare aut deducere non erit inconsultum.

Therma Carolina.

Decoctum china.

Nullum tamen præsidium præsentius & salutaris lepræ incipienti excogitati inveniri potest, quam usurpatione decocti alterutius nobilissimæ rad. chinæ videlicet & sarménti Indici, cujus coquendi utendique rationem in seq. morbi Gallici curatione breviter proposituri sumus. Nam uberiorem earum descriptionem, efficaciam & utendi modum, in peculiari libello Deo juvante tradituri sumus.

Vitiligo & Morphea ut curanda.

Porro Græcis authoribus inter cutis vitia commemorantur & aliæ duæ species, quarum una ipsi Græci ἀλφον, alteram λευκη. Arabes vero hanc Morpheam, illam Aborram vocant: quas Celsus Latine vitiliginem vertit, quæ cutis affectiones hoc seculo non amplius aut rarissime conspiciuntur, quas nos ad speciem Elephantiasis aut lepræ deferimus. Et si cui earum curatio occurrat, iisdem remediis profligandas, quibus Elephantiasis curatur, suademus.

8. *Morbis seu scabies Gallica quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quibus præsidis profliganda?*

Lues Venerea quid.

Λοιμὸς ἀφροδισιῶν. Lues & contagio Venerea sive morbus & scabies Gallica seu Neapolitana, est contagiosa & sevæ scabiei species, omnibus seculis usque ad annum

Christi Salvatoris 1494. ignotissima, quo anno Deus iratus in pœnam sceleratæ libidinis mundo hoc malum inflixit. Gallica autem scabies inde nomen habet, quia eodem tempore Gallis in Neapolitano bello militantibus ob spurcam turpemque eorum libidinem, militaris præmii loco à Venere contributa est, à quibus deinde in universum terrarum orbem propagata fuit. *In India tamen tam Occidentali quam Orientali Endemium Incolarum morbum à multis seculis fuisse, referunt scriptores Indici, uti apud nos scorbutus: inde putatur in Europam per contragium primum delatus.*

Incipit autem hæc horribilis & sæva belua humanam naturam vastare & sese manifestare post sædam Venerem cum pustulis tuberculisque duriusculis in pudendis utriusque sexus, & circa inguina erumpentibus: deinde in alias partes, collum, faciem, frontem, capitis cutem, manus ac tibias divagatur, postea & sanguineam massam universam inficit, spiritus turbat & viscera principalia labefactat. Cerebri enim intemperiem corrumpit, jecur & lienem inflammatur, renes & meatus urinæ exulcerat, tandem & in fauces repit, easque erodit & palati arque cribiforme os in radice narium absumit & erodit, & processu temporis ex homine cadaver vivum efficit, & in diversis partibus corporis virulenta & ægre sanabilia excitat ulcera, nisi tempestivè obviam eatur. In plerisque tamen corporibus non omnia hæc simul mala subsequuntur, nec pustulæ excitantur, sed caput & cervix aggravatur, & acerbissimi dolores præsertim noctu, in articulis, manibus ac pedibus excitantur.

Causæ ἀσχηκερικῆς ut plurimum antecedunt ἀσχηκερικῆς. Sunt vero causæ ἀσχηκερικῆς, Venerea consuetudo cum sædis & infectis mulierculis, & è contra. Sudores enim & exhalationes insectorum suo contactu facile alios inficiunt. Item stragulæ & lavacra communia cum infectis, & crebræ commensationes ac comporationes cum scabie Gallica laborantibus. Est enim hic morbus planè contagiosus, quam

Quando primum exorta. Vnde nomen habet.

In quibus partibus apparet.

Qua incommoda importet.

Indicia quadam hujus mali occulti.

quam sæpè & hæreditario jure propagetur in natos, à parentibus eo morbo laborantibus; sæpè & ab infantibus cum lacte affligitur. *Προγνυσθῆναι* sunt corrupti humores, & infecta sanguinea massa, & intemperies totius corporis.

Signa.

Signa luem Veneream ostendentia, petenda sunt ex jam comitantibus symptomatibus, quorum quædam in descriptione mali enumeravimus, ut sunt pustulæ duriusculæ in & circa pudenda & in finibus, quorum color nunc ad rubedinem, nunc ad lividitatem, nunc ad cinericeum vergit, quamquam crebrò & sine pustulis quosdam hæc scabies occupat. Item purulenta exulceratio interni meatus urinatorii, ardor urinæ, & insueta hæmorrhoidum eruptio, quibus accedunt & tubercula verrucis similia per caput, frontem, faciem, collum, brachia & tibias erumpentia, capillorumque defluvium. Processu autem temporis alia quoque subsequuntur symptomata, ut artuum articulorumque in manibus & pedibus acerbis

*Dolores.
Tumores
in carne.*

In ossibus.

Caries ossium.

dolores: arthritis & coxendix, quæ noctu magis quam die affligunt. Deinde & tumores in carnosissimis partibus, seminucis juglandis quæ extuberant, qui tandem suppurantur, & omnia genera virulentorum ulcerum progenerant, pro ratione vitiosi humoris in corpore patientis prædominantis. Quin ex ea venenata colluvie in plerisque partibus scirrhusi & glandulosi tumores, scrophulæ & strumæ progesserantur. Adde quod neglecta mali curatione in siccioribus partibus ubi ossa exigua carne sunt vestita, eadem venenosa colluvies ossibus adhæret & induratur, adeo ut os adnatum videatur: id quod ut plurimum in tibia & in cubitu carpoque contingere consuevit, quod malum imperiti tonsiores *ein Oberheim* / q. d. os adnatum, nominant: quo in loco acerbis doloribus nocturnis potissimum excitantur: & si validioribus remediis locus agitur, in ulcus virulentum degenerat, & os subiectum corrumpit, & sphacelatum reddit. Præterea sæpè & cerebrum inficit, & quibusdam totam calviam absunt, aliis os tantum palati, & creberrimè cribiforme os narium.

Hæc signa etsi non in omnibus omnia concurrant: tamen pleraque in scabie Gallica semper observantur.

Prognosticum: Morbus Gallicus recens, qui nondum radices egit, pauciora mitioraque secum trahit symptomata, ac facilius curari potest: inveteratus vero plura sæviora curatque difficiliora producit mala.

Sæpè concepta lues Venerea per plures menses in corpore delitescit antequam se per signa prædicta manifestet, statim tamen continua gravitas artuum & crebri capitis dolores subsequuntur.

Curatio. Cum hæc fæda lues primum inter homines grassari cœpisset, variae sunt curandi ejus rationes à Medicis excogitatae, sed omnia frustra tentata fuere, donec tandem ad inunctionem hydrargyri perventum esset, cujus quidem usu multi, palliata tamen ac superficiali cura, sanitati non admodum integræ restituti sunt. Ejus itaque usus mansit apud imperitiores cum tonsiores tum Medicos usque ad nostram ætatem.

Inunctioni tandem accessit & Emplastrum ex hydrargyro applicatio, præsertim in ulceribus morbi Gallici.

Inventus quoque est & suffitus cum Cinnabare, quæ reliquis sævior est curandi ratio.

Tandem successit his curatio per potionem sudorificam ex ligno Indico seu Guajaco, & ex ligno Juniperino, cui curandi rationi extremè tenuis victus adjungebatur, & multi abstinencia potius, quam virtute remedii curabantur.

Et hæc quidem omnia incerta sanatione, aliis præsidio erant, aliis vero nullum adferrebant levamen. Quin & inunctiones & emplastra ex argento vivo, & suffumigationes ex Cinnabare, quod ex argenti vivi materia constat, initio etsi superficialia cutis mala tollebant, tamen post ipso morbo Gallico longè sæviora inferebant symptomata, ideoque ab eruditioribus Medicis non tantum neglecta, sed etiam detestanda sunt.

Postremo autem, & quidem nostro ævo ex Indicis regionibus duæ nobilissimæ radices Chinæ & Sarmeni Indici, quas Hispani Zarpazilla.

Prognosticum.

Curatio.

Inunctio cum hydrargyro.

Emplastrum ex hydrargyro.

Suffitus cum Cinnabare.

Decoctum ligni Guajaci & Juniperini.

Remedia non adeo tuta.

Decoctum Chinæ & Zarpazilla.

zaparillam vocant, allata sunt, ex quibus saluberrimæ potiones sudorificæ in locum priorum sunt restitutæ, quibus non tantum morbus Gallicus & symptomata, sed & alii perniciosi morbi felicissimè curari possunt.

Unguentum ex hydrargyro.

Cum autem, ut dictum est, manserit usus unguenti & Emplastri suffitusque ex hydrargyro apud consores, & suam habeant efficaciam in palliativa cura, & corporibus robustis, antequam ad rad. decoctum deveniam, breviter conficiendi & utendi rationem unguenti & emplastri rationem commemorabo. Unguentum ex hydrargyro sic conficio. ℞. Axungia porcina rec. lb. s. butyri recentis sine sale ℥ iv. unguentorum Althææ, marciati an. ℥ i. ol. chamæmel. ol. lumb. ol. laurini, terebinth. an. ℥ s. Theriacæ Androm. ℥ i. styrac. liquidæ ℥ i. succi limon. aut ejus loco, suc. radic. lapatii acuti ℥ i. aq. Juniperi vel Vini destillati ℥ s. subigantur in mortario diutissimè, quibus admisce pulv. mastic. litharg. an. ℥ i. hermodact. Aristoloch. rot. turbit. tartari rub. Zinzib. albi an. ℥ ii. myrrhæ, aloës an. ℥ i. i. quibus & ceræ resolutæ q. s. ob crassitiem acquirendam admisceri potest. Deinde commisceantur quoque hydrargyri sive argenti vivi in saliva hominis jejuni extincti, & in pulvis formam redacti ℥ ii. diutiss. agitando fiat unguentum.

Emplastrum ex hydrargyro.

Emplastrum autem ex hydrargyro in hunc modum concinnatur. ℞. Emplastrum diachili magni, emplastri de ranis, cujus descriptio extat apud Johannem de Vigo, an. ℥ i. ii. Empl. triaph. ℥ ii. ol. de laterib. ol. de spica, aq. Junip. styrac. liquidæ, theriacæ Andr. an. ℥ i. s. Gummi Ammoniac. Galbani in aceto macerati & percolati an. ℥ ii. omnia simul ad lentum ignem resolvantur, & ubi refrigerari incipiunt admisc. pulv. mastic. thuris, myrrhæ, aloës, ladani an. ℥ ii. aristol. rot. hermod. bac. lauri, cyperi an. ℥ i. s. Cinabarii ℥ i. mercur. sublimat. ℥ ii. argent. vivi in saliva jejuna extincti ℥ iv. diligenter subacta redigantur in Emplast. formam.

Suffitus ex cinabari.

Suffitus ex cinabario sic conficitur. ℞. Cinabarii ℥ ii. pulv. Benzoi, styr. calamitæ,

gran. Junip. Caryophyll. ligni aloës an. ℥ tr. calam. arom. angelicæ, myrrhæ, succini albi, olibani an. ℥ i. omnibus simul pulveratis cum q. s. theriacæ redigantur in trochiscos.

His præscriptis remediis consores hunc in modum utuntur. Primum præscribunt ægrotanti convenientem tenuemque victus rationem ex alimentis boni succi, deinde vitiosos humores, qui in corpore redundant, concoquant, & convenientibus remediis naturæ singulorum humorum evacuant purgantque. Tandem ægrotantem includunt in conclave calidum seu hypocaustum, ibidemque præscripto unguento totum corpus, excepto capite, pectore & axillis dextroque hypochondrio, quotidie sex horis ante prandium inungunt, tegumentis que calidis involvunt, & per 2. horas sudare permittunt, idque in quibusdam 9. in quibusdam 14 diebus perficiunt. Morbi vehementiam victam esse arbitrantur, ubi magna salivæ copia per aliquot dies ex ore ægrotantis profluit, tunc cessant ab inunctione, & utuntur vires corroborantibus remediis. Plerumque autem succedit fluori salivario oris exulceratio & gingivarum putredo, dentiumque vacillatio & alia pleraque symptomata, quibus peculiariora adhibent remedia, quæ paulo post proponemus.

Emplastro autem utuntur ubi in aliqua corporis parte à morbo Gallico crustosa ulcera sunt excitata. Iis enim post concoctos & expurgatos vitiosos humores Empl. præscriptum lineo extensum imponendo, patientem sudare permittunt, & si totum corpus ulcerosis crustis est obsessum, Empl. spinæ dorsi imponunt, eoque brachia, manus & crura vestiunt, & huic curationi ut plurimum 10. dies tribuunt, in quibus ægrotantem in hypocausto calido recinent & indies sudare cogunt.

Suffitus autem ex cinabari in virulentis ulceribus ex lue Venerea ortis adhibent. Trochiscos enim ignitis carbonibus in aliquo vasculo imponunt, & ulcerosam partem ita in vas collocant, ut fumum ex trochiscis è cinabare ulcus recipiat. Est autem hoc genus remedii acerbissimum nec nisi in extremè periculo.

Modus utuntur.

Inunctione.

Quousque continue.

Emplastrum quo modo usatur.

Suffitus quando adhibendus.

riculosis ulceribus & sphacelato osse eotendunt.

Symptomata ex argento vivo. Verum aut in ipsa curatione, aut paulò post ex argento vivo in poros coacto, & non rursus artificiose per sudatoria remedia propulso, subsequencia symptomata accidere solent.

Oris fauciumque exulceratio;
Gingivarum putrescentia,
Dentium vacillatio,
Capillorum defluvium,
Capitis dolore,
Maculæ faciei,
Epatis inflammatio,
Ardor urinæ,
Arthritis,
Volæ manuum & soleæ pedum scissuræ,
Et unguium decisio.

Horum pravorum accidentium prorsus nullum subsequitur curationem nostram cum decocto chinæ aut sarmenti Indici. Verum enumerata symptomata ex hydrargyro, hisce remediis tolli possunt.

SYMPTOMATUM REMEDIA.

Ad oris fauciumque exulcerationem.

Gargarismus. ℞. Plantag. hippuris an. M. i. rosarum balaustiorum cortic. rad. prunor. sylvest. extremitatum frondium salicis an. M. s. hord. M. i. nucum cupressi, lentium, sumach. an. ʒ s. excepto hordeo reliqua contundantur & coquantur in aceti & aq. an. ℥b. i. s. ad tertias, colentur colatoque juri admisce mellis rosati, diamorian. ʒ ii. alum. ʒ i. fiat gargarismus, quo crebro eluatur os & fauces. Aut ℞. Aq. Plantag. rosar. flor. periclymeni, prunellæ an. ʒ iiii. quibus admisce Rob. è ribes, è berberis an. ʒ i. s. misceantur, fiat gargarismus. Validior est in malignis ulceribus seq. gargarif. ℞. Fecis vini, aceti vinacei an. ʒ i. pulv. æruginis ʒ s. aluminis ʒ i. mastic. ʒ i. s. mercur. sublim. ʒ s. aq. plantag. rosar. an. ʒ s. ebulliant & colentur, colatusque liquor illinia-

tur ulceri. Ego quidem præstantius esse comperi hoc linimentum. ℞. Mellis rosacei ʒ i. ol. vitrioli ʒ ii. commisceantur, fiat linimentum.

Putrescentes gingivas prius cum sale & acetato confricato, sædumque sanguinem vel sugendo vel comprimendo elcito, & præscripto gargarifmate, vel liquore in faucium exulceratione descripto colluito, & linimento ex melle rosac. & ol. vitrioli inungito.

Dentes mobiles colluantur cum seq. decocto. ℞. Cortic. granatorum, psidæ, gallarum, acatiæ an. ʒ ii. mastic. ʒ i. Alum. ʒ s. aq. & aceti an. ℥b. i. coquantur ad medias, colentur, colatoque liquore dentes crebro colluantur, & post ablutionem seq. linimentum inungatur. ℞. Mellis rosac. ʒ i. pul. gallarum ustarum, cornu cervi usti, corall. an. ʒ s. mastic. alumin. an. ʒ i. commisceantur, fiat linimentum.

Si capilli defluant, laventur pilosa loca vino rubeo in quo coctæ sunt radic. agri-moniæ, cort. tamarisc. an. ʒ i. rosar. M. i. myrtil. Bacc. hederæ an. ʒ s. abrotani, spicæ Indicæ an. M. s. Vinum autem sit ℥b. ii. & coq. ad tertias. Post ablutionem confri-centur loca glabra à pilis seq. linimento.

℞. Cort. nuc. avellan. ustarum, cineris abrotani an. ʒ i. cineris apum ʒ s. ladani, olivani, mastic. acatiæ an. ʒ i. ol. myrt. ʒ i. ceræ parum, fiat linimentum.

Dolor capitis ut plurimum & antecedit & subsequitur morbum Gallicum: Mitigatur autem & tollitur convenientibus enemati-bus, pillulis capitalibus, gargarism. masti-catoriis, & venæ cephalicæ incisione, quæ omnia ex curatione cephalalgæ petenda sunt. Utilissimum autem est ad dolorem ca-pitis, caput ipsum post lenem confricatio-nem calidorum linteolorum inungere se-quenti liquore. ℞. Aquæ lavendulæ ʒ iiii. rosar. ʒ i. aceti rosac. ʒ i. spec. diambæ ʒ i. moschi gr. iiii. ol. vitrioli ʒ i. ol. ex gran. Ju-nip. gutt. v. commisceantur. Sequens quoque sacculus utilissimè capiti applicabitur. ℞. Maj. beth. menthæ, serpilli, saturejæ, ros. rub. an. M. ii. spicæ Celticæ p. i. flor. chamæm. aneth. an. M. s. carvi contusi ʒ ii. concidân-

A a a tur,

Ad gingivas putrescentes.
Lapis item medicamentosus hic utilis.

Ad dentes firmandos.

Collutio.

Linimen-tum.

Ad deflu-vium ca-pillorum.

Fomenta-tio.

Linimen-tum singu-lare.

Ad dolo-rem capi-tis.

Liquor.

Sacculus.

tur, fiat facculus, & ebulliat in vini q. s. & expressus capiti imponatur.

Ad maculas faciei.

Macula livescens aut rubicunda relinquuntur in facie post morbum Gallicum. Ha tollantur deleanturque sequenti liquore crebro illito. ℞. Aq. plantag. rosar. flor. fabar. an. ℥ i. r. succi Limon. ℥ i. r. tartari, Olibani, tragacanti an. ℥ i. boracis, mercur. sublim. an. ℥ s. confusa bulliant simul in olla vitreata ad tertias & colentur, quo conficentur maculae. Aut ℥. Album. i. ovi, quod concutitur virgulis ut spumescat, cui admisce Mercur. sublim. ℥ s. Camphoræ, Boracis tenuissimè pulveratarum an. ℥ ii. fiat linimentum, eique admisce ol. tartari ℥ i. s.

Linimentum.

Ad hepatis calorem.

In Epatis inflammatione, secetur vena Epatica, præscribatur pro potione lac ex 4. sem. maj. cum aq. cichor. factum: Inungatur dextrum hypochond. seq. linimento. ℥. Ol. rosar. nymph. violar. an. ℥ s. mucag. sem. psylli cum aceto rosar. factæ ℥ s. ceræ albi parum, fiat unguentum.

Ad urinæ ardorem.

Indicia loci affecti.

Urinæ ardor excitatur aut ex inflammatione & exulceratione renum, aut vesicæ, aut meatuum urinæ per virgam. Si renes sunt exulcerati, dolent lumbi, & urina purulenta aut pilis referta profluit; si vero vesica aut ejus cervix est affecta, urina cum anxietate difficulter excernitur, & sæculenta & mucosa conspicitur, & dolores in hypogastrio sentiantur. In virgæ vero exulceratione, pus aut sanguis cum urina projicitur.

Urinæ ardor ex sola inflammatione renum, tolli potest præscriptis in inflammatione Epatis remediis. Sed inunctio debet fieri circa lumbos. Quod si urina ab exulceratione ardeat, primum utendum est, præter inunctionem præscriptam, remediis abstergentibus & dolorem mitigantibus, talia autem sunt hydromeli & lac caprinum. Postea utendum erit refrigerantibus & acrimoniam urinæ temperantibus, qualia sunt lac ex 4. sem. & sem. papav. cum aq. solani præparatum. Omnium autem præsentiss. remed. in omni ardore urinæ est pulvis Trochisc. de Alkekengi, si ℥ i. illius cum aq. hordei exhibeatur.

Abstergentia & lenientia. Refrigerantia.

Pulv. trochisc. Alkekengi. Ad dolores

Artuum articulorumque dolores ex mor-

bo Gallico chirurgi inunctione cum hydrargyro aut Empl. ex cinabari superius descripto, tollere conantur. Alii inunctione cum ol. ex gr. juniperi. Nos vero his præferimus, experientia edocti, decoctum sequens, Epithematis instar loco dolenti impositum. ℥. Rad. chinæ ℥ i. s. veronicæ M. i. olibani ℥ i. gran. junip. contusorum ℥ ii. camphoræ ℥ i. s. vini alb. ℔b. 4. hæc omnia in duplici vase per 2. horas coquantur, fiat Epithema.

articulorum.

Epithema probatum.

Ragades sive scissuras ac manuum pedum per sanat ol. vitrioli ℥ i. & ol. tartari ℥ s. cum ℥ vi. aq. plantag. mixta & scissuris oblinita. Aut ℥. Vitrioli, tartari, æruginis, bacc. lauri an. ℥ i. boracis, mercur. sublim. an. ℥ i. camphoræ gr. v. axungie porcine, succi limon. & ol. lauri an. ℥ ii. subigantur diutius. fiat unguentum, quo ragades inungantur. Alii sufficu cum Trochisc. è cinabari scissuras curant. Nos his præferimus vaporem vini supra candens excrementum ferri conspersi, cujus utendi rationem in Impetiginis curatione descripsimus.

Ad fissuras manuum ac pedum. Liguor. Linimentum.

Vapor è scoria ferri.

In morbo quoque Gallico unguium ligamentis putrefactis ungues delabuntur, quod ubi contingit, ut ungues retineri nequeant, maturandum est ut citius decidant. Imponatur itaque unguibus putrescentibus cataplasma ex farina tritici & butyro recenti factum. Maturat enim, & ungues ab eo sponte decident. Locus autem nudus abstergetur vino tepido, inungaturque ol. è vitellis ovorum, & formentur digitalia ex nova & pura cera, vel ex cera viridi sigillatoria, digitisque imponatur, sub iis novi succrescent ungues.

Ad unguium desu-vium. Cataplasma maturans.

Inunctio.

Post Venerem etiam cum impuris mulierculis, bubones sive tumores in inguinibus excitantur, qui bubones Venerei nominantur: in quorum curatione omnium primum imponatur Emplast. resolvens confectum ex gummi Ammoniaco in spiritu vini resoluto, & si tumores non resolvantur, imponatur Empl. maturativum, videlicet Diachylon, aut seq. cataplasma.

Ad bubones Venereos.

Emplast. strum resoluens.

℥. Ficum ping. contusatum, rad. li-lior. albor. sub cinerib. ferventibus cocto.

Cataplasma maturans.

Consili
dans.

coctorum & contusorum an. ʒ i. r. a-
xung. porci, terebinth. an. ʒ i. farinæ
tritici ʒ vi. croci ʒ i. ol. lilior. alb. q.
s. fiat cataplas. Maturatis tumoribus
ferro aperiantur, & pus è vulnere ex-
primatur, ulcusque hydromel. eluatur
& unguenti apost. pauxill. ramento
linco imponatur, & empl. Triaphar.
supra ponatur, donec vulnus persan-
netur, & ad cicatricem deducatur.

DECOC- Restat nunc ut breviter & nobilissimæ po-
TI RAD. tionis ex rad. Chinæ & sarmento Indico pa-
CHINÆ randæ & usurpandæ modum & rationem
ET SAR- nostram hæcenus nemini cognitam, (alii e-
SÆPA- nim longe aliter describunt) tradam: cujus
RILLÆ virtute opeque non solum morbos Gallicos
DE- & omnia ejus symptomata tutò, faciliè, ju-
SCRI- cundè & perfectissimè cum universæ massæ
PTIO. sanguinæ purificatione curari, sed & alii
Præstantia
hujus Re-
medii.

Vide Li-
brum ex-
perimento-
rum.

Proceſſus
hujus cure.
Vena se-
ctio.
Evacuatio
per pur-
gantia.

Initio ægroto ipsi vena secetur, primum
quidem Epatica dextri humeri, ac triduo
post vena talaris externa sinistri pedis. Postea
vitiosus humor in corpore redundans, quem
peritus Medicus ex colore & habitu corporis
facile deprehendere potest, studiosè sub-
ducatur, & evacuetur, ut pituitosa quidem
excrementa ʒ x. Diaphan. biliosa ʒ vi. E-
lect. rosati Mesuæ; melanchol. ʒ x. Diaca-
thol. aut ʒ vii. Diafenæ. Mixti vero humores
ʒ vii. confect. hamech. in haust. aq. card.
benedicti resolutis, & 6. hor. ante prandium
exhaustis.

Hypocaust. Purgato corpore deducatur æger in con-
clave sive hypocaustum mediocriter cali-
dum, in quo per universum curationis tem-
pus se contineat, omnemque afflatum ex-
terni aëris præcaveat, & conclave singulis
diebus suffitibus odoriferis imbuat.

Tandem præscribatur ei tenuis & boni *Diatæ.*
succo & parcissima victus ratio, Venerem
fugiat, & alvum laxam semper vel natura
vel alimentis vel glandib. vel enematis. ha-
bere studeat. Uno ferculo cum aliquo juscu-
lo tam in prandio quam in cœna contentus
esse debet. Quanto enim quis parcius vivit,
tanto sanitatem consequitur celerius. Ali- *Cibus con-*
menta ejus familiaria sint, pruna cum ma- *veniens.*
joratum minora, poma pyraque assata &
saccaro conspersa, ova recentia forbilia,
quæ una vice numerum binarium non exce-
dant, lac amygdalinum saccharatum, cre-
mor sive jusculum ex pulmento aut grumo
avenaceo aut hordeaceo, juscula carniū
bovillæ & gallinacæ, caro pullorum, ca-
ponum, avicularum, perdicum, ovilla, hæ-
dina & vitulina. Ex piscibus perca aculea-
tæ, & lucii, sed parcissimè concedi debent.
Fercula exiguo sale & pulv. cinamomi, &
zinzib. condiri, in eisque rad. petroselinæ &
uvæ passæ minores concoqui commodè
possunt. In potu, excepta secundaria coctura
chinæ aut sarmenti Indici per totam cura-
tionem nihil prorsus gustabit.

Potus qua-
lis esse de-
beat.

His omnibus probe procuratis, potio
nobilissima hac ratione conficiatur. Acci- *Decoctum*
piantur chinæ radices aut Sarmenti Indi- *china &*
ci ʒ i. & china quidem cum crassa sit, in *sarsaparil-*
tenues laminas, sarmentum vero quod te- *la ut præ-*
nue, & lupi salictarii sarmentis simile est, *parandum.*
in particulas minores concidantur, & in can-
tharum 8. lb. reponatur, eisque denique 8.
lb. aquæ puræ adfundantur, juncturaque
canthari massa farinacea charta oblita obli-
niatur, & ex eo quidem potio prima sudori-
fica concoquatur. Eodem ipso tempore e-
jusdem concisæ radicis accipiat alia ʒ i. &
in alium cantharum ejusdem capacitatis im-
ponatur, & tantundem quoque aq. affunda-
tur, juncturaque ejus similiter obliniatur,
& ex hoc secundaria, sive sitim sedans con-
ficiatur potio: in utroque cantharo mace-
rentur per 24. hor. in tepido loco remedia,
quibus peractis, utrumq; cantharum in ahe-
num amplum aqua ferventi plenum colloca-
& per duas horas simul coquantur aq. sem-
per bulliente: Tandem exceptis & refrige-
ratis

Decoctum
minus pro
potu.

raris cantharis percolentur; & radices ex cantharis exceptæ in loco tepido & mundo rursus exsiccentur. Ex iis enim in minutiora fragmenta concisis dupl. pondere, id est 3 i. cum 8. lb. aq. ut prius maceratis & coctis semper deinceps usque ad finem curationis concoquenda est secunda sive sitim sedans potio. Quin ex iisdem & sudorifica potio dupl. pondere, id est 3 iv. præscripto modo, si necessitas urget, coqui pararique potest. Non enim vires amittit hoc remedium, vel etiam tertia coctione. Notandum autem ubi 4. lb. reliquæ fuerint sudorificæ potionis, novam parari debere, macerando & concoquendo modo recitato. Potio autem ad sitim sedandam, quolibet tempore præscripto modo parari potest.

Potio secundaria.
Modus usurpandi nobilissimum hoc decoctum.

Hujus saluberrimæ potionis utendi ratio hæc est. Omni die diluculo, i. e. hora quinta matutina, sudorificæ potionis lb. i. bene calidam ebibat patiens, & in lecto contentus per 2. horas strenuè sudet, sudoremque calidis linteolis sub tegumentis subinde detergendo, hora 7. sudore absterfo surgat, mundoque indusio vestiatur, in hypocausto vel conclavi obambulet, & sua exercitia exequatur, ac tandem hora 9. prandeat, à prandio amicorum dulci colloquio aut Musici instrumentis aut colludendo se oblectet: tandem circa horam 3. pomeridian. se rursus exuat, & alteram lb. sudorificæ potionis calidam exhauriat, rursusq; per 2. horas sudet, hora quinta surgat, sexta coenat, & usque ad nonam colloquio familiarium se oblectet, ac per totum tempus curationis à perturbatione animi omni studio abstineat. Porro imbecillioris naturæ hominibus, qui tantum sudoris perferre nequeunt, satis erit matutina sudatio, sed ea curatio longius tempus, 6. nimirum septimanarum requirit.

In imbecillioribus.

9. Verruca quid, quæ ejus causa, & quibus remediis curanda?

Verruca quid.

Ἀρχοδόσιαν, verruca, est tuberculum ex cute instar monticuli pronatum, subdum, scabrum & papillis mammarum non dissimile, unde & Germanicam appellationem sortita est, sine ullo dolore: & verruca quidem in omni partium cute oboriri potest,

sed in sola facie, fronte & manibus deformitatem infert; excrescit nonnunquam in pisi, ciceris aut fabæ magnitudinem. In inveterata verruca ut plurimum pili fruticant, & deformitatem augent.

Causæ *πρωτογενεῖς* Verrucarum, sunt *Causa.* frigidi excrementosi & mixti ex pituita crassa & melancholia humores, qui ex osculis capillarium venarum sub cute colliguntur. *Προγενετικαὶ* sunt hæreditaria ex parentibus verrucosis propagatio, creber contactus verrucarum nudo corpore, sanguis ex verrucis expressus & alterius corpori illitus.

Curatio Verrucarum perficitur aut chirurgica industria per evulsionem radicis, aut topicorum remedium impositione, quæ Verrucarum radicem exiccare & extinguere valeant. *Curatio.*

Chirurgica ejus curatio ita peragenda est: *Chirurgica* primum fomentetur pars verrucosa in calida *Fomentatio.* aqua in qua incoctæ sint rad. alth. malv. flor. chamæm. & meliloti an. ad arbitrii placitum: deinde scalpello caput Verrucæ liberetur à circumjacente cute: tandem funiculo adaptato circumligetur & radicitus evellatur. *Evulsio.* Aut forcipe obtuso, aut, si cui Galeni modus placet, primoribus dentibus apprehensa evellatur, vulnusque convenienti emplastro impositio aliorum vulnerum instar consolidetur, & ad cicatricem deducatur.

Saniori autem ratione quidam verrucarum capita auro aut aureo nummo candenti ter quaterque sensim inurunt, & ita facile Verrucas omnes extirpant, in qua curatione circumjacens cutis lamina ferrea contegatur, per cujus foraminulum caput Verrucæ promineat. *Inusio.*

Ab ea autem curandi ratione cum delicatiores homines abhorreant, hisce sequentibus topicis radices verrucarum extirpantibus facilius cura institui potest. Porro cum ejusmodi remedium natura ut plurimum causifica sit, & circumjacentibus partibus facile inflammationem inferre queant, præstat prius per ambitum Verrucæ, cutem omnem sequenti linimento in crustare. *Topica.*

℞. Boli Arin. terræ sigil. an. 3 i. contem- *Defensivum.* rantur cum q. s. aceti rosac. & aquæ in li-

lumbricis sunt similes, nec motu manifesto moventur sub cute, sed extremos excitant cruciatus in loco affecto. Aëtius autem dicit, Dracunculos nihil molestiæ inferre, nisi intra cutem discerpti sint. Sicut autem Dracunculi fuerunt proprii & familiares morbi Australibus, in Europa autem olim. ignotissimi, (*jam enim satis noti sunt illis qui in Indiam Orientalem navigant, illi enim sæpè iis molestantur*) ita judicamus nostros capillares vermiculos veteribus omnibus & Græcis & Arabibus ignotos fuisse: In Germania autem familiares, & nostris tonforibus notissimos. Cum enim Medici scriptores eorum nullam fecerint mentionem, eorum curationem tonfores & vetulæ sibi usurparunt, cum non exiguo Medicorum dedecore, quasi solis Græcis rerum investigatio fuerit alligata, & nemini libertas concessa, de novis morbis disserendi, & causam eorum investigandi.

Hypodermides Germaniæ familiares.

Hypodermides quid.

Causa.

Causa *αἰσθητικὴ* procul dubio est humor putrefactus collectus inter cutem & membranam carnosam. *Προσθητικὴ* est prava victus ratio, putrescentem generans sanguinem.

Signa.

Signa sunt lancinans & erodens dolor in parte affecta, cui processu temporis accedit tumor & suppuratio.

Curatio.

Curatio consistit primum in provocatione vermiculorum per poros cutis, deinde si tumor & suppuratio adsit, per chirurgicam maturationem, tumoris infectionem, absterfionem & consolidationem.

Evocatio vel extractio vermium.

Evocabuntur autem vermiculi capillares extra cutem, si crura aut pars affecta verminosa in vas ligneum aq. probè calida aut li-

xivio ex quercu cineribus confecto plenum collocetur, in eoque per unam aut sesquihoram maceretur quotidie, donec omnes vermes eliciati fuerint, id quod ita dignosci poterit. Fasciculi spicarum vacuarum filiginis ex quibus grana sunt excussa in superficie aquæ cuti partis affectæ filo alligentur. Iis enim vermiculi prorepentes omnes instar lanæ albæ adhærescunt, qui ubi omnes prodierunt, tum nihil tale spicis adhærescere conspiciunt. Semper autem post fomentationem, lorionemque partis affectæ, loco affecto cera nova emplastri instar extensa ac moderatè calida imponatur. Habet enim & ipsa cera hujusmodi animalcula prolicendi facultatem. *Alii tale conficiunt emplastrum ad eliciendos hosce vermiculos.* ℞. *Axungia campanarum, mellis, cera nova, picis crassioris q. s. fiat Emplastrum, quod extendatur super linteam crudum, & applicetur calidè sapinus renovando.*

Indicia evocatorum vermium hypodermidum.

Emplastrum.

Porro evocatis omnibus vermiculis, si tumor aut suppuratio adsit, maturetur seq. cataplasmate. ℞. *Farinæ tritici, hordei an. ʒ. i. hydrom. q. s. coquantur simul agitando ad pulvis formam, & tumenti loco crebrò applicetur calidum. Aut*

Cataplasma.

℞. *Pulv. bacc. lauri, & mellis an. q. s. commisceantur, & instar cataplasmatismis tumenti loco imponantur.*

Ubi deinde pus maturum & tumor mollior apparet, incidatur locus affectus novacula per longitudinem, pulque omne eximatur, & calido hydromelle eluatur, aliorumque vulnere modo convenientibus remediis consolidetur, & ad cicatricem deducatur.

Apertio loci suppurati.

Ubi vero vermes capillares in digitis ad radices unguum exorti fuerint, cataplasma ex stercore anserino cum q. s. succi Cardui Mariæ loco affecto calidum crebro imponatur, quod brevi vermiculos extinguit. In Echinis sive capitibus Diplaci seu virgæ pastoris, si ea per medium scindantur, vermiculi vivi reperiuntur, qui si digitorum tumoribus, aut locis verminantibus vivi alligentur, vermes capillares sua specifica proprietate statim extinguunt.

Hypodermides sub unguibus quomodo extinguendi.

Singulare experimentum.

Huc

Huc merito referri debet illud genus vermicum capillarium, quod in tergo infantulorum & aliis membris carnosus interdum exoritur. Hi vermiculi non tantum intolerabili ardore & pruritu vigilias ac inquietudinem in infantibus excitant, sed etiam alimentarium humorem absorbentes in tabem ac maciem eos coniciunt, unde **Miteffer die zehrende Wärme / oder durre Maden** Germanis dicuntur. Evocantur litu seu inunctione ex melle & farina frumentacea, & postea novacula abraduntur. Qua de re videatur Pareus l. 7. Chirurg. c. 21. in fine.

12. Vermiculi subcuticulares quid, quae eorum causa, quae signa, & quae ratione extirpandi?

Teredines quid.

Σκώληκες ἢ τερνίδες, Acari, teredines, Nostris **die Sürren** / Johannes de Vigo chirurgus Italicus Syrones vocat. Sunt autem animalcula admodum exigua instar ovorum haeccum piscium, sed longe minora, ita ut visum ferè effugiant, colore albicantia cum capitellis nigris, inter cutem & cuticulam generata, quae serpendo cutem exarant, & exiles & pruriginosas pustulas excitant, & si affecta pars igneo calori propè admoveatur, pruriginem cum ingenti voluptate affecto loco inducunt, ac confectionem postulant, quam subsequitur cruciatus: Ex pustulis autem, unguibus compressis, aquosus humor profilit.

Causa.

Causa αἰσχυρὴν est serofus humor in venarum officinis in cutem desinentibus contentus ac putrescens. Περὶ τερνίδων sunt alimenta serofos humores generantia, & manuum ac pedum absterfio per lintea quibus antea loca ejusmodi scabie affecta fuerunt absterfa.

Signa.

Signa sunt pustulae exiles & pruriginosae in manibus adutorum, ac infantum pedibus exortae, quae si comprimantur, exilit humor aquosus.

Curatio.

Evulso vermiculi.

Curatio duplex est, una vermiculorum evulso. Evelli enim possunt cum cuspe acus, si prius cuticula aperiatur. Statim enim albicans vermiculus cum nigro capitulo apparebit, qui exemtus, si in tersum spe-

culum imponatur, movebitur per se de loco, & si unguibus comprimatur, instar pediculi strepitum edit. Altera curatio est ejus enecatio. Extinguitur autem facile, si locus ol. vitriol. confricetur, aut cum hydrargyro saliva jejunata extincto & cum pauxillo sapone nigro commixto, aut crebra confectione cum rad. lapatii acuti, per noctem in aceto macerati, aut cum felle bubalo, cui aloës est admixta, & non nihil auripigmenti.

Enecatia per medicamenta.

13. Lentigo quid, quae ejus causa, quae signa, & quomodo tollenda?

Ἰσχυρὴ, lentigo, Celsus lenticula, Nostris **die Sprötelein oder Sonnenflecken** / exiles cutis maculae ex flavo rubescens per cutem faciei, manuum & pectoris confertim sparsae, quae nil molestiarum, praeterquam cutis deformitatem inferunt.

Lentigo quid.

Causae αἰσχυρὴν lentiginis sunt crassi vapores sanguinis biliosi per insensilem transpirationem ad superficiem cutis propulsi, ibidemque exsiccati. Eadem enim est materia lentiginum, & rubedinis capillorum. Nam qui rubeos habent capillos, hi plerumque biliosi & litiginosi sunt. Περὶ τερνίδων est solis calor, qui biliosos sanguinis vapores à centro ad circumferentiam seu superficiem cutis elicit. Lentigines ut plurimum in aestate efflorescunt, hyeme vero rursum evanescunt. Interdum naturales sunt, & tum non facile extirpantur.

Prognostica.

Curatio. Celsus dicit, ineptias esse curationem lenticularum suscipere: nos tamen in gratiam studiosorum mundicie, pauca quaedam Topica remedia, quibus lenticulae aboleri queant, recitare non gravabimur.

Curatio.

℥. Galbani, salis nitri an. ʒ i. contendantur cum aceto vini, & in linimenti formam redigantur, quo loca lentiginosa vesperi inungantur, & mane cum aq. calida & frustulo panis filiginei rursus abluantur & abstergantur, moxque pauxillo ol. amygdal. amar. inungatur. Aut

Linimentum.

℥. Stercor. columbini ʒ i. quod cum aceto acris in linimenti formam redigatur, partes lentiginosae vesperi cum

Aliud.

eo confricentur ac mane rursum abluantur. Aut

℥. Pul. rad. Ari. ʒ ii. mellis q. s. contherantur, fiat linimentum, quo lenticulæ illiniuntur. Quin & fabæ aut amygdalæ amaræ aut nuclei ceraforum commasticatæ, & lenticulis illitæ, eas præsentî auxilio abstergunt. Idem præstat, si lentiginosis locis sanguis albæ gallinæ vesperi illiniatur. Aut mane ac vesperi lentigines inungantur ol. Tartari.

14. *Macula cutis quid, quæ earum causa, & quomodo tollenda?*

Macula cutis major quid.

Ἐν τῇ δὲ, maculæ cutis majores, *Honigflecken/Wahl oder Sonnenbrandt.* Cutem crebrò maculæ defædant, præcipue faciei, quæ colore aut subflavæ sunt aut subnigræ, aut rubicundæ, quæ etsi nil molestiæ inferant, virgines tamen & mulierculæ quidvis magis pati volunt, quam faciem aut manus maculis deformatas habere. Cum itaque Mulierculis, ut Celsus monet, cura cultus sui eripi non possit nec debeat, ideo ejus curatio Medico non subterfugienda.

Causa.

Causæ macularum cutis αἰσθητικαὶ sunt, ut de lentigine dictum est, vapores crassi humorum in sanguinea massa prædominantium, ad cutis superficiem per poros propulsi, ibidemque condensati. Causæ αἰσθητικαὶ sunt solis æstuantis radii, cutem ferientes, vaporesque ad superficiem evocantes, & sordes cuticulæ copiosiores. Sæpè etiam macula connascentur infantibus, quæ *Müttermahl* generaliter dicuntur, si vel incendio vel vulnere cruento vel murium, alteriusve rei horribilis aspectu territa prægnans faciei aliquam partem attigerit, vel res aliqua solida & colorata, uti sunt fraga, cerasa, mora in faciem sit projecta, vel scintilla carbonum in faciem prosilierint. Talis enim macula infantis faciei innascitur, qualis color fuit rei matrem terrentis vel ludentis.

Signa.

Signa sunt visui obviâ ac nota. Materia autem vaporum ex colore macularum deprehenditur: Ex impensè refrigerato sanguine livescences, ex bilioso flavescences,

ex melancholico subnigræ, ex pituitoso sanguine albicantes progengerantur maculæ. A solis autem adustione variè maculatur facies, cum asperitate cutis.

Curatio macularum consistit primum in evacuatione prædominantis in massa sanguinea humoris. Quibus autem remediis singuli humores & præparandi ad expulsiōem & evacuandū sint, cum in tabellis supra traditis, tum passim in universa curandi ratione abundè traditum est. Secundò delentur cutis maculæ absterforiis & cutem venustantibus remediis, quæ à Medicis cosmetica pharmaca, & comptoria remedia nominantur, quorum hic nonnulla & quæ magis experientia comprobata sunt, in gratiam mundiciæ studiosorum subijciemus.

In delendis abstergendisque maculis cutis, potiss. autem faciei, & explanandis rugis cutis, ita procedi debet. Initio maculosa habentia corpora in sudorifico balneo per horam probè sudare jubeantur, deinde absterfo sudore in lavacrum descendant aq. cal. in qua incoctæ rad. Bryoniæ, sigil. Salomonis, Elenii & Althææ, malyæ, brancæque usina cum rad. & herb. parietariæ flor. cham. cum eisdemque herb. in ipso balneo maculosa cutis studiosè confricetur ac lavetur. Tandem egresso ex lavacro confricentur maculæ sol. ceraforum in cerevisia coctis, aut fursure triticeo cum aceto commixto, aut sacculo in quo insutæ sunt farina fabar. & orizæ in cerevisia tepida madafacto: deinde manè ac vesperi ad nitorem decoremque cuti inducendum, seq. topicis remediis quilibet uti poterit post ablutionem.

℥. Tartari q. s. quem in fornace singulina in calcem adustum in pulverem redigito, & cum alb. ovor. in linimenti formam redigito, maculasque cutis, potiss. faciei eo inungito. Præstat quoque & omnes maculas cutis tollit, si maculæ mane ac vesperi vino abluantur, in quo flor. foliaque recentia rosmarini sunt incocta. Aut ℥. Rad. urticæ q. s. & in vino concoquito, in ejusque Vini ʒ vi. stercoris passerini ʒ i. dissolvito, eoque tanquam linimento vesperi cutem maculosam confricato. Aut

℥. Fa.

Curatio.

Cosmetica remedia.

Ad maculas & rugas cutis balneum.

Fomentatio.

Linimentum cutis nitidam reddens.

Vinum.

Linimentum.

Aliud.

℥. Farinæ lupinor. ʒ s. alum. saccharini, boracis an. ʒ ii. Camphoræ ʒ i. cum q. s. succi limon. & fellis caprini, commisc. fiat linimentum, quo vesperi facies, aut alia pars maculosa inungatur. Aut ℥. Succi limon. ʒ vi. salis ʒ ii. commisceantur, fiat linimentum quo inungatur maculosa pars. Aut

Aliud.

Destilla-
tum venu-
stam red-
dens fa-
ciem.

℥. Sulph. vivi ʒ i. olibani, myrrhæ an. ʒ i. s. camph. ʒ i. pulverata macerentur cum aq. rosar. ʒ i. bene obturata per mensem, deinde destillantur in balneo Mariæ, & profluens liquor conservetur in vitro convenienti, qui linteo exceptus maculosa faciei illiniatur, imponaturque, venustam enim reddit faciem. Aut

Alius li-
quor stilla-
tissimus.

℥. Micæ panis ʒ i. flor. rosarum alb. & rub. fl. nymphææ fabarum, lilior. albor. an. ʒ iv. lactis caprini ʒ i. rad. Iridis Illyr. ʒ i. omnia simul commixta, & per octiduum macerata, destillantur in balneo Mariæ, cujus liquor faciei illitus eam venustam reddit. Aut

℥. Cerusæ ʒ ii. sal. nitri ʒ i. Camphor. ʒ i. mucag. sem. psylli cum aq. ros. factæ ʒ i. pulv. boracis ʒ ii. Camph. ʒ s. quæ simul in mortario probe commisceantur instar linimenti, quo facies & aliæ partes maculosa ac nigricantes vesperi inungantur: mane vero rursum aq. calida abluantur. Aut

Liquor ru-
bens ad
pallorem
faciei.

℥. Aceti bis aut ter destillati ʒ viii. in quibus per triduum sandali rub. ʒ s. aut q. s. ad colorem rubeum aceto inducendum, macerentur, & post unam & alteram ebullitionem coquantur & percolentur, in quo liquore dissolvatur ʒ i. alum. & odoris gratia moschi gr. iiii. aut olei Angelici gut. v. cum quo inungatur facies. Venustam enim rubedinem faciei inducit & pallorem omnem aufert.

Ruga cu-
tis ut e-
menden-
tur.
Fomenta-
tio.

Porro rugas cutis ita explanabimus. Ferrum nondum usurpatum candescere facito, candentique ferro vinum album inspergito, vaporemque ex eo excitatum in faciem aut aliam quamvis rugosam partem pannis ob-

tectam excipito, idque sæpius repetito, & sudorem ex vapore excitatum mundo linteo abstergito, deindeque eidem candenti ferro pulv. myrrhæ inspergito, ejusque fumum eodem modo, ut vaporem vini in faciem excipito. Idem præstat si facies rugosa crebro ol. è myrrha inungatur.

Ol. myr-
rha.

Maculas ex solis ardore contractas, & omnem cutis asperitatem, tollit mucago ex sem. plantaginis contusis & trizacanto simul in aq. rosar. q. s. maceratis facta, si maculis illiniatur.

Ad macu-
las ex sole.

Stigmata & cicatrices vestigiaque vulneris in cute detergit, illitio ol. tartari, aut ol. è myrrha, aut pinguedo piscium, qui Aschii nominantur, *Aschenschnitz*, aut pinguedo anguillarum, multoque magis serpentum.

Cicatrices
deleritia.

Macula connata autem, die Muttermahl oder angeborne mahl hisce re-
mediis raro tolli possunt, sed maxima ex parte sunt incurabiles. Interdum tamen per caustica tolluntur, auferendo cuticulam maculatam, & novam regenerando, vel tangendo maculas secundina recente, vel sanguine menstruat. Ejus enim attactu interdum evanescent.

Macula-
rum con-
natarum
cura.

15. Ambustio cutis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Πεχνησις, adustio, est ubi pars aliqua vel igne vel ferventi aliquo liquore, ut sunt aqua oleum, pix, & similes, vel metallo candenti, liquefactione, aut pulv. nitrato aut bombardico accenso perurit, quæ perpetuo cutis exulcerationem, pustulas, ac acerbissimos dolores infert. Ambustio autem alia pro materiæ diversitate, à qua infertur, alia est malignior, similibus tamen ferè remediis curari possunt.

Ambustio
quid.

Causa *απηναιστική* (ex ea enim sola fit ambustio, & nunquam ex *απηναιστική*) uti jam dictum; est aut ignis, aut liquor fervens, aut metallum candens, aut pulvis nitratus.

Signa sunt evidentia. Pustulæ enim excitantur per superficiem cutis, & subsequitur exulceratio & acerbis dolor. Materiæ autem varietas ex patientis relatione intelligi potest.

Signa.

Curatio ambustionis topicis duntaxat medicamentis perficitur, quæ debent esse

Curatio.

B b b b aut

Chirurgorum error.

aut refrigerantia & repercutientia, aut moderatè calida & adustionis calorem elicientia, & in leuiuscula quidem & superficiali cutis adustione refrigerantibus, in altius vero penetrantibus adustionibus, calidiusculis & igneam qualitatem ex ulceribus extrahentibus remediis commodius utimur. Perpetam consulunt patientibus uestionem Chirurghi, si in graviore ambustione statim in initio refrigerantia & percussiva remedia adhibent. Ab eis enim duplicatur in ulceribus uestionis cruciatus.

Ambusta quomodo tractanda.

Utriusque itaque generis & refrigerantia ad superficialem adustionem convenientia, & moderatè calefacientia inflammationem evocantia remedia, hoc loco seorsim breviter subijciemus. Notandum autem in adustionis curatione, vesiculas cutis in ambustione excitatas, primo die non esse pungeudas, sed altero aut tertio tantum, idque aurea aut argentea acu, & aquosum humorem lenissima spongia exprimendum esse. Cavendum est præterea, ne ulcera adustionis digitis aut manibus contrectentur, sed remedia pennæ mollioris apice illinenda, aut molliss. linteolis excepta ulceribus imponenda erunt.

Levioris adustionis remedia.

In levioribus adustionibus hæc comprobata refrigerantia caloremque in ulceribus extinguentia commodissimè usurpari possunt.

Cataplasma simplex utile.

℞. Ova cruda, cujus albugo & vitellus simul commixta linteolis excepta instar catapl. ulceri imponantur. Hæc enim vesiculæ citam eruptionem cohibent & dolorem statim mitigant. Commodè & unguentum album sive è cerusa cum aq. rosarum camphorata ulceri illiniri potest. Aut

Epithema.

℞. Albumen unius ovi, quod cum q. s. aq. rosar. diu agitando in spumam redigatur, eidemque ℥ s. ol. ros. commisceatur, & linteolis tenuiss. excepta ambusto loco subinde imponatur, donec dolor mitigetur. Aut

Linimentum.

℞. Cort. inter. sambuci minutim concisi ℥ i. aq. rosar. succi solani, plantag. an. ℥ ii. aceti rosar. ℥ s. ol. ro-

sar. ℥ ii. pulv. mastich. thuris an. ℥ ii. coquantur leniter in olla ad liquoris absorptionem, deinde percolentur, & colato oleo addatur ceræ candidæ liquefactæ q. s. & admisceantur cerulæ in aq. rosar. elotæ, tutiæ præpar. an. ℥ ii. album. ovorum ℥ s. & diutissimè simul subigantur in mortario, fiat linimentum, quod locis adustis illiniatur, aut linteolis exceptum imponatur.

Rusticum utiliss. tamen est remedium, si frustulum calcei antiqui incendatur, & ejus pinguedo in aquam frigidissimam extillare permittatur, eaque pinguedo collecta in aqua rosar. diu multumque subigatur, & loco ambusto illiniatur. Aut

℞. Ol. rosar. ℥ i. unguenti popul. ℥ s. alb. Cerotum. ovi unius, camphoræ tenuiss. contritæ ℥ s. cerulæ in aq. rosar. lotæ ℥ ii. ceræ candidæ q. s. fiat vel linimentum vel cerotum ambustioni imponendum.

Mucilago cort. tiliz aut sem. psylli aut sem citon. singulatim per se, aut simul omnium in aq. rosar. maceratorum facta, & ambustis locis illita, statim omnem dolorem mitigat & aufert.

In profundioribus, & valde inflammatis ulceribus, quales fiunt ex plumbeis globis sclopeticis & pulv. nitrato, aut metallis liquefactis, præscriptis refrigerantibus remediis uti tutum non est, sed hisce subsequenter inflammationem elicientibus, inter quæ primas habet salisago ex butyro salito collecta, aut muria ex aq. marina & sale confecta, & instar Epith. uesto loco imposta. Dolores enim citissimè compescit, inflammationem evocat, & ulcera adustionis consolidat. Aut ℞. Saponis nigri, mellis virginiei, butyri recentis an. p. æ. subigantur, & instar linimenti aut catapl. ulceri imponantur. Aut

℞. Ol. nucum juglandum, sevi cervini an. ℥ i. liquefacta commisceantur, & cum aq. rosar. subigantur, fiat linimentum.

Nihil autem excellentius est, ex ulceri-

bus

SECTIO IV. DE UNGUIUM AFFE- CTIBUS.

1. Unguis quid, & quibus morbis afficitur?

O Nux, & in plurali *ὀνυχες*, Ungues sunt *Ungues* tanquam clausulæ cutis tendonum, *quid.* nervorum, venarum & arteriarum ad digitorum extremitates protensorum. Ex eorum enim concrezione originem habent, & mediam ferè naturam consecuti sunt inter ossa & cartilagine. Nutriuntur & semper in- *Quamdiu* crescunt unguis instar pilorum & in cadaveribus donec omnis colluvies & humiditas *crescant.* subjectorum nervorum & tendonum exarescat. Non tantum autem digitorum ornamentum gratia ab opifice conditi sunt unguis, *Vsus un-* ut Aristoteli placuit, sed ob alias & insignes *guis.* utilitates, quas in artificiosa chirurgia, & manuum ope perficiendis operibus præstant: Præsertim autem in collectione & comprehensione exiguorum durorumque corporum.

Afficiuntur autem Ungues ratione subjectarum partium & adnatarum, Tumore inflammato, Defluvio vel decidentia, Scabrie & laceratione, contritione seu contusione violenta, & vermiculis capillaribus.

2. Tumor igneus circa unguis quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quæ ratione curandus?

Παράονυχια, Latinis Reduvia. Avicenna, *Parony-* & ipsum imitantes barbariores Medici corrupto & inverso Græco Vocabulo hoc malum *chia quid.* *παράονυχιον* vocant, Nostri *Ge-* *schwulst der Nägel.* Est autem *παράονυχια* abscessus ad radicem unguis excitatus, seu tumor venenatus partium ungui subjectarum & adjacentium, cum extrema inflammatione. Sentitur enim non secus ac adustio candentis ferri cum intolerabili cruciatu.

Causa *αἰσχυρισμὸς* est sanguis fervens & *Cause.* biliosus, aut venenata sanies collecta ad partes ungui subjectas ibidemque putrefacta. *Προκατακταὶ* est unguis violenta con-

bus ambustionis flammeum calorem extrahere, quam aqua in qua rapæ sunt incoctæ, in eaque colata frustula calcis vivæ aliquoties sunt extincta, rursusque percolata, si ea instar Epithematis ulceribus adustionis linteolis excepta frequenter imponatur. Aut

Cataplasma.

℥. Vitellos ovorum q. p. & cum q. s. ol. lini commixta instar cataplasmat. imponantur. Aut

Linimentum.

℥. Calcis vivæ in aq. rosacea extinctæ & ter quaterve elotæ q. s. quæ tenuissimè pulverifetur, & cum q. s. partium tamen æqualium, olei rosacei & hypericonis, & albuminum ovorum, conterantur, & in formam linimenti redigantur, ambustoque loco imponantur.

Adustionis ex pulvere nitrato remedia.

Porro in adustione ex plumbeo globulo aut pulvere nitrato, igneus calor statim est extinguendus. Præstat itaque crebro in vulnus succum sempervivæ & lentium palustrium imponere vel instillare: vel mucaginem ex cancris fluviatilibus contusis, cum aq. rosacea expressam, Epithemat. modo imponere. Cicatrici vestigiisque adustionis delendis, prodest vestigia inungere crebro pinguedine anguillæ aut asci piscis. Aut

Ad cicatrices adustionis.

Linimentum.

℥. Unguenti Citrini ℥ i. unguenti pomadæ (quorum descriptiones & parandi rationes extant in libellis pharmacopœiticis) olei rosacei an. ℥ ii. commisceantur, fiat linimentum. Aut abluantur frequenter adustionis vestigia seq. absterfio lique.

Liquor absterfio ad cicatrices & maculas.

℥. Sulphuris vivi ℥ i. olibani, myrrhæ an. ℥ i. vitri cristallini, in calcem adusti ℥ i. s. camphoræ ℥ s. succi limonum ℥ iv. Quibus omnibus simul contritis & subactis affundantur aq. flor. fabarum, rosarum an. ℔b. i. quæ simul commixta in tepido loco per mensem macerentur, ac deinde in balneo Mariæ distillantur, quò liquore linteola imbuta Epithematis instar vestigiis ulcerum imponantur, qui non solum adustionis, sed omnia genera macularum faciei potenter abstergit.

Vide scolopetarium Quercetani.

tritio, seu compressio dolorifica. Dolor enim perpetuo allicit ad se humores ex reliquis partibus.

Signa. Signa sunt manifesta, ut ex tumore inflammationeque extrema digiti & intolerabili cruciatu facile cognosci potest.

Prognosticum. Prognosticon. Nisi maturè succurratur paronychiæ, digiti recisionem, & sæpè mortem minatur.

Curatio. Curatio. Cum ut plurimum in paronychia febris ardens excitetur, præter remedia Topica, & victus ratio tenuis & refrigerans patienti præscribatur, ac si necessitas efflagitet, & venæ Epaticæ sectio, & humoris vitiosi evacuatio, vel cum 3 vi. Elect. rosati solut. Mesuræ & vel tandem cum confect. hamech. in aq. cichorii solutis evacuetur.

Venesectio. Venesectio. **Evacuatio.** Evacuatio.

Topicorum usurpatio legitima. Topica autem hac methodo applicanda erunt, ut primum adhibeantur igneum fervorem extinguentia, deinde cutem constringentia: tertio maturantia & ad suppurationem deducantia: postremo ulcus mundificantia & consolidantia.

Refrigerantia & dolorem mitigantia. In initio antequam tumor increseat, utile est partes affectas inungere fordē ex auribus auriscalpio excepta. Deinde inflammatio refrigerari debet dolorque mitigari sequenti remediis.

℞. Mucag. Psylli cum aceto rosac. factæ 3 ii. cum qua dissolventur opii Theba. 3 i. quæ tepida linteoloque excepta inflammato digito imponantur. Cavendum tamen ne refrigerans remedium diu usurpetur: etsi enim illud ipsum dolorem nonnihil mitiget; tamen paulo post exacerbatur, & duplicatur dolor ex *ἀνταρθεσίᾳ*, veluti fit in manibus gelu constrixis, si calori fornacis vel foci repente admoveantur.

Fomentatio. Mitigato paulisper dolore, digitus fomentetur aceto Vini acerrimo tepido, & obligetur panno laneo aceto imbuto: aut salustum cum ol. rosaceo mixtum & linteolis exceptum loco affecto imponatur: statim enim dolorem discutit. Deinde utendum est cutem constringentia & fluxum humorum

cohibente cataplasmate, quale est hoc sequens.

℞. Far. lentium, hordei, fabarum an. Cataplasma 3 i. pulv. gallar. Cortic. granatorum an. 3 s. *ma constringens & fluxum cohibens.* Coquantur simul cum æ. p. vini rubri & aceti, eisque admisc. ol. rosac. q. s. fiat cataplasma, quod tepidum loco affecto imponatur. Aut

℞. Aloës, Balauft. Gallar. Olibani an. Aliud. 3 s. pulverata & simul commixta mellemq; in cataplasmatibus formam redacta imponantur. Ab hisce remediis si dolor mitigetur, cum eisdem procedendum erit; si vero magis exacerbetur, statim ad maturantia, & vim suppurationi habentia, deveniendum est, quod hac ratione confici potest.

℞. Pulv. Violaris, sem. malvæ an. 3 s. Cataplasma far. hord. 3 i. rad. lilior. alb. contus. 3 ii. Olibani 3 s. commixta coquantur cum aq. fluviatili ad pulvis formam: deinde admisceatur vitellus 1. ovi, & butyri recent. q. s. fiat cataplasma.

Maturato tumore extremitas digiti secundum longitudinem novacula incidatur, pusque exprimat, ac vulnus ipsum mundificetur, illito seu indito ungu. Egyptiaco, aut Apostolorum, ac tandem Empl. Vulnerariis, qualia sunt Emplastrum Tripharmacum aut Empl. de Minio, consolidetur & ad cicatricem deducatur. *Aperio tumori.* *Consolidatio.*

3. *Unguium deflurium seu decidentia quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?*

Ἀπόπρωσις τῶν ὀνύχων, Unguium delapsio, Unguium est ubi unguis unus aut plures in digitis, putrefactis ligamentis, & à subjectis partibus resolutis, sensim avelluntur ac decidunt. *Unguium deflurium quid.*

Causa *κατὰ γὰρ τὴν φύσιν* est corrupta & purulenta colluvies sub unguibus collecta. *Causa.* Προκαταρκτικὴ est violenta unguium attritio seu compressio.

Signa defluentium Unguium sunt manifesta. *Signa.*

Prognosticum. Quibus ungues aut plures aut sæpè circa *κατὰ γὰρ τὴν φύσιν* causam, *Prognosticum.* id est violentam attritionem defluunt, extremam

tremam humorum putrefactionem, & vel lepram, vel morbi Gallici sævitiam indicant.

Curatio.

Curatio. In defluvio Unguium si adfit dolor & inflammatio, omnium primum mitiganda erit, ac si accedat & intumescencia digiti, tumor ad maturitatem reducendus est iisdem remediis, quæ in præcedenti curatione *ἡ παρονυχίας* descripta sunt: Deinde unguis resolutus à putrescentibus ligamentis & adjacente cute, scalpello liberandus ac sensim abstergendus. Mitigat autem dolorem, Cerotum ex q. s. Cerae novæ & ol. ros. simul resolutis, factum, & in aceto rosac. diu subactum digitoque impositum.

Cerotum.

Emplastrum.

Mitigato dolore, ut vacillans unguis facilius decidat, imponatur Empl. ex Gummi Ammoniaci aut Galbani, in calido mortariolo subactum, & in ceræ mollioris formam redactum. Ubi autem defluens unguis cuti & subjectis tendinibus tenacius adhærescit, scalpello molliissimè liberetur & auferatur. Post sublatum unguem, ut novus citius succrescat, satis erit ex cera nova, quam virgineam vocant, digitalia conficere, & quotidie novum apici digitorum imponere. Porro si aut ex Elephantiasi, aut ex morbo Gallico defluant ungues, ejus curationem ex superioribus earundem affectionum petere licet.

Ad regenerationem unguium adhibenda.

4. Vermes capillares circa ungues quid, qua eorum causa, qua signa, & qua curatio?

Vermes capillares sub unguibus.

Vermes capillares nonnunquam acerbissimos excitant dolores in digitis circa ungues, nostris *den Hartworm in den Fingern* vocant, & ut plurimum paronychiae adjuncti sunt.

Quid autem & quales sint vermes capillares, & ex quibus generentur causis, quibusve curandi sunt remediis, paulò ante inter affectiones cutis explicavimus. Satis erit hoc loco meminisse, præsentissimum esse remedium in enecandis Vermibus capillariibus digitorum, cataplasma ex fimo anserino, & scobe sive limatura æris seu cupri, aut paulo æuginis simul mixtis & cum succo cardui Mariæ confectum crebroque impositum.

Cataplasma fingulare ad vermes hosce necandos.

5. Scabricies & scissura unguium quid; qua ejus causa, qua signa, & quomodo curanda?

Τεραχύντης ἢ τὸ πικρὸν ἢ διῶχον, sunt ubi Scabricies ungues asperi & rugosi redduntur, aut per longitudinem in scissuras lacerantur. *quid.*

Causa *ἀσθενείαν* est melancholicus humor qui ad nutriendos ungues defluit ibidemque exarescit, & ungues proscindit aut rugosos efficit. *Προσκαρτερύειν* causa est unguium adustio.

Signa sunt conspicua. Prognosticon: Scabri ungues, sicut & defluentes, lepram incipientem minantur, nisi naturale & connatum sit malum, uti in quibusdam observatur.

Prognosticon.

Curatio scabriciei & scissuræ unguium, Curatio. quæ ex arido humore originem habet, instituenda est à melancholici & excrementitii humoris debita præparatione & è corpore evacuatione: quorum remedium copiam in plerisque superioribus locis ac potiss. in lepræ seu elephantiasis curatione abundè præscripsimus. Deinde Topica remedia ungues emollientia & mundificantia applicanda erunt: inter quæ plurimum confert, pulmentum avenaceum cum pulv. radic. althææ & aqua concoctum, & instar cataplasmatidis impositum. Aut

Topica.

℞. Rad. Symphyti maj. contusæ, pulv. Cataplasmatistici, sem. lini an. ad libitum, si-
mul concoquantur & in catapl. formam redigantur, quibus parum mellis addatur, & scabris unguibus applicetur. Aut

℞. Fecis Vini ʒ ii. cui commisce pulv. rad. consol. maj. ʒ s. mastic. ʒ iir. salis ʒ i. fiat cataplasma, quod tepidum crebro imponatur.

Confert quoque crebra inunctio cum ol. sem. lini cum æ. p. succi seu mucag. ex rad. consol. maj. factæ, commixto. Quin & Empl. ex Gummate cupressi & ping. o-
villa factum utiliter imponitur. Item glutin. piscium in decocto nucum Cupressi resolutum.

Inunctio.

Emplastrum.

6. Unguis contusio seu attritio quid, quæ ejus causa, quæ signa, & quomodo curanda?

Unguium contusio quid. Causa.

Κατὰ τὴν βαρύνειν ὀνύχων, attritio unguium est violenta compressio & coarctatio unguium, cum partibus subjacentibus. Causa contusionis unguium est tantum *ἀνέγκεται*. Fit enim ubi ungues inter duo dura corpora violenter comprimuntur.

Signa.

Signa sunt evidētia. Plerumque enim ex effusione sanguinis livorem contrahunt ungues, & intumescunt extrema digitorum. Acerbissimum etiam dolorem infert contusio, cum subjacentes partes sint exquisitissimi sensus.

Curatio.

Curatio contusorum unguium est, ut dolor mitigetur, quod fit, si sanguis sub ungue contuso coactus exprimat, id quod sine incisione unguium, quæ oblique fieri debet, perfici non poterit. Verum ubi ungues in minutas partes sunt contriti, post sanguinis expressionem procuranda est suppuratio & unguium ablatio, novorumque regeneratio. Quibus autem remediis peragenda sit suppuratio & novorum regeneratio, paulò ante diximus in curatione defluvi unguium.

Cataplasma ex alio.

Confert autem mirum in modum contusis unguibus post sanguinis expressionem, si bulbi allii conterantur & eis imponantur.

Emplastrum.

Aut si Gummi cupressi vel Ammoniaci in calido mortario contritum & in ceræ molliem redactum instar Emplastri imponatur.

Ablutio.

Abluantur autem ungues contusi vino rubeo, in quo myrtilli & granatorum cortices sunt incocti, antequam imponatur catapl. aut Emplastrum.

symptomata præcipationem subsequuntur, & quomodo curanda?

Πτώσις, præcipitatio est, ubi corpus ob gravitatem ab altiori loco deorsum cadit & collabitur. Causæ *ἀνέκρυται* sunt im-providentia, imbecillitas potentiae locomotive, & spiritum in cerebro perturbatio. *Προγενεσις* sunt constitutio in loco præcipiti, aut impedimenta locomotive à malitia malorum Dæmonum causata, qui vitæ ac sanitati hominum mille struunt insidias & omnibus hominibus ab infantia ipsa periculosos lapsus machinantur, collaque confringere conantur, nisi vigilantia sanctorum Angelorum custodirentur.

Præcipitatio quid. Causa.

Signa sunt evidētia. In casu præcipiti non una sed plures corporis partes afficiuntur, & varia subsequuntur symptomata cum interna tum externa. Veluti sunt vasorum, id est venarum & arteriarum membranarumque ruptiones, sanguinis & venis profusi in aliqua parte corporis concretio, ibidemque doloris sensus, difficultas respirationis, articularum dislocatio, & ossium tibiæ crurumque ac humeri præsertim fractio: foris autem partium collapsarum tumor & lividitas.

Signa.

Symptomata ex casu.

Curatio. Præcipitatis statim succurrendum est, aliàs augentur symptomata. Ac si articularum contingat dislocatio, aut ossium fractio, statim reponendi ac obligandi erunt, quam curandi rationem in morborum Chirurgiæ subsectorum curatione subiciemus. Reliqua vero symptomata sequentibus remediis cum internis tum externis, ne augeantur aut increcant, præcaveri, & si adhiat profligari poterunt.

Curatio.

Ad casum præcipientem quoque referendæ sunt plagæ, aut violentæ verberationes fistibus aut flagris illatæ. Et contusiones ex re aliqua dura & gravi in partem aliquam corporis incidente. Cum autem præceps collapsio cum ex improvidentia tum ex infortunio apud plebejos, aut maxime qui altiora loca conscendunt frequenter contingat, ut plurimum quælibet familia & domus sua peculiaria habet contra præcipientem casum experta remedia, quorum præcipua & ra-

Quæ affectiones huc referendæ.

SECTIO V. DE CONTUSIONE ET DOLORE, QUÆ TAM EXTERNIS QUAM INTERNIS PARTIBUS ACCIDUNT.

1. Præcipitatio, casus sive lapsus corporis humani quid, quæ causa, quæ signa, & quæ

& rationi magis consentanea hoc loco sub-
jiciemus. Sunt itaque usitata remedia, ve-
luti, ℞. Unguenti rubei potabilis, cujus
descriptio in libellis pharmacopæorum extat
℥ i. aut s. quod in aceto resolvatur calido,
& ebibendum propinetur. Aut ℞. Rad. vin-
cetoxici, succidæ seu morsus Diaboli an.
℥ s. flor. hypericonis, herb. veronicæ, cen-
taur. min. card. bened. Agrimon. an. M s.
concisa & contusa in q. s. vini aut cerevisiæ
ad tertias concoquantur, in cujus haustulo
resolvatur ℥ s. spermatis ceti, & quotidie
mane exhibeatur. Aut ℞. Ol. laurini, Te-
rebin. unguenti rubei potabilis an. ℥ i. com-
misceantur, ejusque ℥ s. pro una vice in præ-
scripto decocto aut in calida cerevisiâ reso-
luta propinetur. Aut

Pulvis.

℞. Mumix, Tormentillæ, lapillorum
cancrorum, Rapont. an. ℥ s. sperma-
tis ceti ℥ i. pulverata commiscean-
tur, cujus ℥ i. in vino aut aceto ex-
hibeatur. Aut ℞. Rhab. ℥ i. Mu-
mix ℥ ii. rad. rubeæ tinctoreæ ℥ i.
castor. ℥ s. commisc. pulverata, cu-
jus ℥ i. cum vino rubeo pro una vi-
ce bibatur. Vasa enim rupta perfanat
& concretum cruorem dissolvit.

Remedium
vulgare &
superfluum.

Cum vero præscripta remedia ad manus
non sunt, commune remedium est, si præci-
pitato ovi vitellum crudum cum aceto concus-
sum ebibendum detur. Prohibet enim
concretionem sanguinis. Rustici buphthal-
mi herbam cum floribus in cerevisiâ conco-
quant & tepidum haustum ejus decocti ex-
hibent, qui omnes obstructions & sangui-
nis concretionem ex lapsu dissolvit, vaso-
rumque ruptiones perfanat. Est autem Buph-
thalmus herba digitalis, flores luteos in-
star calendulæ habens, sed majores, qui pos-
tea in pappos vertuntur, quam nostræ Po-
meranicæ mulierculæ *Wulfferlen* vo-
cant. *Officinis communiter Arnica dicitur*,
Herbariis Aster luteus; flos enim ille quem
buphthalmum vocant, circumquaque alba
habet follicula, in medio verò luteus est instar
chamomilla. Idem præstat pisofella herba
cum rad. in cerevisiâ cocta & bibita. Nautæ
in præcipiti casu præsentiss. remed. utuntur,

℥ i. olei salis marini in calida cerevisiâ solu-
ta ac bibita, quod illi *Olie van Bapen*
vocant. *Bapen* autem illis sal marinum
& arenosum dicitur. Quomodo autem hoc
oleum ex sale conficiatur, nondum explo-
rare potui.

Milites in castris ad violentas plagas ca-
susque præcipientes exhibent ℥ i. aut s. pulv. *Pulv. tor-*
nitrati bombardici, cum haustulo vini aut *mentarium.*
aceti aut Cerevisiæ, qui tum ratione nitri,
tum carbonis salicis discutit omnem concre-
tum cruorem & colluviem. Nam & carbo *Carbones*
tiliæ in pulverem redactus, & exhibitus, *tilia.*
per se in casu præcipiti mirum in modum
conferit.

Ætius ex alto præcipitatis nil magis auxi-
liari scribit, quam si sarmenta Vitis concisa *Decoctum*
minutim in aqua coquantur, & ejus decocti *sarmento-*
haustus unus & alter potandus præbeatur: &
addit, si haustum hunc æger rejiciat, mor-
tis esse indicium. Qui ex casu violento san-
guinem expuunt, iis lixivium ex cineribus
sarmentorum Vitis confectum bibendum
præbere jubet, ex eoque grumos sanguinis
ex casu concretos dissolvi dicit.

Foris vero loco dolenti ex casu præcipiti *Topica.*
primum adstringentia sunt applicanda, ve-
luti sunt Rosæ, Balauſtia, cort. granatorum, *Epithema.*
Myrtilli, & sumach. an. ad libitum, quæ
contusa cum vino coquantur, quod linteo-
lis exceptum instar Epithematis imponatur;
ac tandem dolens locus inungatur aut un-
guento Dialthææ, aut oleo laurino. *Inunctio.*

Vibicibus autem ex violentis plagis ver-
beribusque probè auxiliatur, si statim ovil-
la pellis recens detracta imponatur. Una
enim die ac nocte & vibices ac dolores sedat.
Aut imponatur Emplastrum hac ratione pa-
ratum.

℞. Calcis Vivæ in aq. ros. lotæ ℥ iii. ol. *Empla-*
ros. q. s. Cerae ℥ i. s. Ex quibus o-
mnibus artificiosè commixtis, fiat *strum.*
Emplastrum, & quotidie recens
imponatur, aut illiniatur seq. lini-
mentum. ℞. Calcis vivæ cum suc- *Linimen-*
co solani ter elotæ, ol. ros. q. s. fiat *tum.*
linimentum.

2. Dolor quid, quibus potissimum accidit partibus, qua sunt dolorum differentia, qua significationes, qua causa, & quibus remediis mitigandi ac tollendi?

Dolor quid.

"Αλγος ἢ λυπη, cruciatus. Omnibus morbis commune symptoma est dolor. Qui enim aliqua in parte corporis affecti, teste Hipp. 2. Apho. 6. dolorem non sentiunt, iis mens laborat. Proinde diligenter considerare oportet Medicum, doloris in morbis species ac qualitatem quantitatemque.

Differentia doloris.

Duo autem sunt prima divisione dolorum genera in hominibus, Animi nimirum & corporis. Dolores animi, qui πᾶσι μὲν Græcis dicuntur, sunt tristitia, moeror, timor, sensus iræ Divinæ, & desperatio, quorum Medicus solus est Spiritus Sanctus, mediante suo verbo, & amicorum solidæ consolationes: de iis nihil hoc loco acturi sumus. Dolor corporis & partium ejus, est tristis & molesta dispositio, orta ex subita & vehementi alteratione in sensu tactus. Citra enim tactum impossibile est dolorem fieri, sicuti nec Voluptatem, quæ duæ dispositiones inter se opponuntur.

Subiectum doloris proprium.

Excitantur autem dolores potissimum in nervosis partibus. Nervi enim immediata organa sunt tactus. Sunt autem nervosæ partes omnes quæ membranæ tunica sunt vestitæ, ut cerebrum, nervi, venæ, arteriæ, muscoli & reliqua fere viscera omnia, ventriculus, intestina, pulmo, epar, lien, renes, ossa, ac potissimum costæ. Membranæ enim non sunt aliud quam nervi expansi. Et in omnibus reliquis partibus accidunt dolores, in quibus insertæ sunt fibræ nervosæ, seu furculi nervorum, ut sunt dentes, muscoli & prædicta viscera. Et membranæ quidem vestientes viscera quanto sunt crassiores, si lædantur, tanto inferunt vehementiores dolores; & quanto tenuiores, tanto inferunt dolores obscuriores, adeo ut vix sentiat in eis dolor, ut contingit in pulmonis, jecinoris & lienis affectionibus.

Vbi dolor vehementior.

Species dolorum varia.

Species dolorum Galenus lib. 2. de locis affect. plures enumerat, sed non omnes scribi posse dicit: ideo & nos dolorum species

notiores & magis perceptibiles recitabimus tantum.

Et sunt hæ: Dolor pulsatorius, punctorius, torpidus, gravans seu ponderosus, tensivus secundum longitudinem, tensivus secundum latitudinem, divellens ac lacerans, vagans, terebrans, persultans, ulcerativus, profundus, universalis, & vehemens seu magnus: quorum dolorum causas & significationes subjiciemus.

Has dolorum species in duas differentias dividit Galenus à causa efficiente sumptas, prima est quæ efficitur ab excellenti & repentina qualitatis calidæ, frigidæ & siccæ in toto corpore aut aliqua corporis parte, alteratione. Altera est quæ excitatur à continuitatis alicujus partis divisione seu solutione aut convulseratione.

Porro alterationum temperamentis Causæ πρὸς γενεάν sunt, contrariæ qualitates calidæ, frigidæ aut siccæ: hæque alterant aut per se nudæ, aut vitiosis humoribus contentæ. Vehementes autem dolores ex calido & frigido excitantur, & ex calore quidem dolor ut plurimum brevior, ex frigore verò diuturnior est. Siccitas autem conjuncta est perpetuò aut frigori aut calori, & per se moderatos excitat dolores, sed magis diuturnos. Humiditas verò per se nullum efficit dolorem, sed per accidens tantum, ut cum sua copia divellit dividitque partium continuitatem, veluti in hydrope, urinæ obstructione, œdematibus. Πρὸς τὴν γενεάν causæ temperiem partium alterantes, sunt aëris ambientis intensa vel caliditas vel frigiditas, item squalidior & venenata aliqua qualitate imbutus aër.

Signa doloris ex calore orti sunt rubedo cutis in loco dolente, & doloris remissio ex frigidi affusione aut applicatione. Ex frigiditate orti doloris signa sunt cutis albedo, vel ex constictione lividitas, & levamen ex calidi affusione applicationeque, qualitates dolorem concitantes non diu hic solæ permanent. Statim enim excitato dolore, ex aliis partibus attrahunt humores vitiosos aut vapores aut flatulentum spiritum.

Alteram dolorum differentiam concitare Continui dixi-

*salutatio-
causa.* diximus, partis alicujus continuæ divi-
sionem sive vulnerationem. Ejus autem divi-
sionis causæ *αἰτιολογία* sunt 4. humorum
in dolente parte collectorum copia, aut vi-
tiosa qualitas, aut vapores acres, aut flatu-
lenti spiritus. *Προκαταρκτικαὶ* causæ & fo-
ris incidentes sunt, ignis, liquor fervens, a-
cies ferri, remedia caustica corpori imposita,
& corpora dura ac graviora.

*Modus
quomodo
solutio con-
tinui dolo-
rem infre-
tat.* Hæc autem divisionis continui causæ do-
lorem excitat in partium substantia eroden-
do, ut acres mordacesque humores: dis-
tendendo & divellendo, ut copia humo-
rum ac flatuum: rumpendo, ut extensa ca-
liditas & frigiditas: contundendo per gra-
viorum corporum illapsum: incidendo per
armorum, gladiatorum acutorumque instru-
mentorum vulnerationem & incisionem:
exurendo, per ignis aut liquoris ferventis in
corpus illapsum.

*Species do-
loris quid
denotent.* Ex specie dolorum & causæ & pars affe-
cta ita dignosci potest.

*Pulsato-
rius.* Pulsans dolor arteriarum est proprius,
& indicat inflammationem magnam in do-
lenti parte, qualis contingit in phlegmone,
Erysipelate & tumoribus inflammatis.

*Puncto-
rius.* Punctorius sive pungens dolor proprius
est membranæ costas & subcostales muscu-
los contegentibus, caloris quoque est indi-
cium, & accedit in pleuritide.

Obtusius. Torpidus sive stupidus & hebes dolor,
accidit in carnosa membrana cuti subjecta,
quæ ex refrigeratione externa, contusione,
partisque alicujus carnosæ compressione
generatur.

Gravans. Gravans vel ponderosus dolor, fit ut
plurimum in renibus, nonnunquam & in E-
pate & liene, & excitatur ponderosus dolor
in eorum viscerum obstructione à frigidis
crassis humoribus, idque ratione membra-
næ. Nam hæc viscera ratione suæ substantiæ
non dolent.

*Tensivus
secundum
longitudi-
nem.* Tensivus secundum longitudinem dolor
nervis tantum est proprius, qui in utram-
que partem nervorum se extendit: talis
fit in luxatis vertebrais aut vulneratis nervis.

*Tensivus
secundum* Tensivus secundum latitudinem dolor
membranis est proprius musculos tegenti-

bus, & excitatur aut à vaporibus, aut flatibus, latitudi-
nem sub membranæ collectis.

Divellens similiter in membranæ accidit *Divellens.*
musculis insertis, ex flatibus aut vapore.

Vagans & instabilis dolor ut plurimum *Vagans.*
generatur in majoribus capacitatibus Ven-
tris, uteri & intestinorum, intercapedineque
musculorum ex flatibus ibidem collectis.

Terebrans & perfodiens dolor in intesti-
nis ex humoribus frigidis tunicis intesti-
norum impactis, qualis est pituita vitrea,
generatur, & colicis doloribus familia-
ris est.

Perfultans dolor in meningibus cerebri *Perfultans.*
contingit, ubi videlicet dolor tanquam ex
radice ortus repente in circumjacentes
partes profilit, à spiritibus flatulentis ex-
citatur in hemisphæria & antiquis capitis
morbis.

Ulcerativus dolor, ut plurimum in cute *Ulcerosus.*
& subcutaneis partibus, etiam in intestinis
ab acrimonia humorum & à vermibus
concitatur, dysentericiæque communis est.

Profundus dolor in *εὐστόμα*, id est mem-
brana ossa vestiente, accidit, & imaginem,
quasi ipsa ossa dolerent, aut medulla in ossi-
bus, sensibus offert.

Universalis dolor est qui se in totum *Vniversalis.*
corpus ac potissimum articulos expandit, & li-
vios humores per universum corpus
disperfos ad artusque delatos significat:
hunc dolorem semper præcedit spontanea
lassitudo.

Vehemens seu magnus est qui atrociter *Vehemens.*
& continuè affligit, nullas relinquens in-
ducias, & somnum adimens. Reliquas spe-
cies doloris à Gal. ex Archigene recitatas,
ut obscuriores consultò prætermittimus.

Prognostica in doloribus. Omnis dolor *Prognostica.*
fluxionem concitat, & vitiosos humores
ad se allicit. Nihil magis vires proster-
nit, naturam corrumpit, spiritus & calorem vi-
talem exstinguit, citiusque exitium infert,
quam vehemens & continuus dolor: Proin-
de licet quivis morbus prius debeat curari,
ac tandem symptoma; in magnis tamen do-
loribus symptoma omnem curam Medici
primò ad se convertit.

Curatio.

Curatio doloris consistit in ejus mitigatione & causarum sublacione, idque tum internis tum externis remediis. Doloris autem curatio 4. perficitur modis pro causarum diversitate. Primo qualitatis dolorem excitantis in contrariam qualitatem alteratione: Secundo Vitiosorum humorum, qui vel sua quantitate vel qualitate dolorem inferunt, evacuatione: Tertiò infarctorum & densatorum humorum, vaporum aut flatulentorum spirituum emollitione, digestionem, resolutione aut ad suppurationem deductione. Quarto indolentiam seu sensuum hebetationem in partes dolentes inductione.

*Correctio
intemperiei.*

Primo itaque, si dolor ab aliqua excellenti qualitate est excitatus, contrariæ qualitatis remediis & alimentis cum internis tum externis temperies naturalis partis dolentis est restituenda. Sunt vero adhibenda in dolore calido frigida, & in sicco humida, in humido exiccantia: quorum remediorum copiam in superioribus morborum particularium curationibus enumeravimus.

*Evacuatio
materie
dolorem
excitantis.*

Secundò si dolor internus ex continui solutione ab humorum aut vaporum acrimonia, aut flatuum distensione sit generatus, earum materiarum copia, per venæ sectionem aut convenientibus remediis evacuationem, aut partis dolentis cum calidis linteolis confricationem mitigandus & tollendus erit. In Divisione autem continui in externis partibus, ut sunt vulnus & exulceratio, dolor chirurgicis remediis removendus erit. Remediorum autem evacuantium tum alterantium sylvam ex superioribus, chirurgica autem præsidia infra in postremo libro proposituri sumus.

*Chirurgici
unde petenda.**Anodynorum
digestionem
usurpatio.*

Tertiò ubi humor vitiosus, flatus aut vapor infarctus & condensatus est in aliqua parte dolente, ut sit in tumoribus, tum remediis temperatis materia dolorum digerenda, resolvenda, discutienda, relaxanda, aut ad maturitatem suppurationemque deducenda est, remediis virtute ejusmodi pollentibus, quorum hoc in loco nonnulla tantum, & usitiora commemorabimus. Mitigant itaque dolorem contemperatione sua

omnia remedia quæ à Græcis Anodyna vocantur, ut sunt Althæa, Malva, Violaria, earumque herbar. radices ac semina, rad. liliorum alb. flor. Chamæm. flor. anethi, flor. meliloti, fœnugr. sem. lini, lac bubalum, lac muliebre, butyrum salis expers, medulla panis cum simlacci tum filiginei, adeps suillus, anserinus, gallinaceus, item ol. rosar. chamæmel. aneth. amygdal. & similia. Ex quibus commode confici & præparari possunt fomenta, irrigationes, Epithemata, Cataplasmata, pulveres & Electuaria.

Quarto modo tollitur mitigaturque dolor cum internis tum externis remediis indolentiam & stuporem partibus dolentibus inferentibus, & earum sensum hebetantibus, quæ remedia Græcis Narcotica, id est stupefacientia nominantur, quæ dolores mitigant, aut vehementi refrigeratione, & sensuum extinctione, aut venenata qualitate stuporem inducendo, somnumque conciliando. Sed non temerè Narcoticis remediis præsertim intra corpus, nisi extrema urgeat necessitas, utendum est.

*Observandum
in usu
Narcoticorum.*

Sunt autem præcipua stupefacientia remedia: Ex simplicibus, semper vivum, hyoschamus, cicuta, mandragora, & papaver, ex quibus folia, radices, semina, flores & succi in usum veniunt: Ex compositis sunt oleum è papavere expressum, ol. hyosch. & unguentum populeum, quæ foris illini & imponi possunt in calidis doloribus.

Inter hæc autem enumerata omnia extremam stupefaciendi & somnum conciliandi facultatem habet Opium. Est autem opium succus à calore concretus & ex capitibus viscentibus papaveris incisis promanans collectus, quo solo & incorrecto & in majori quantitate sine exitio vitæ intra corpus nemo uti potest: præterquam si ex opio glans seu suppositorium formetur, cui filum sit appensum, quod in exulceratione intestinorum & dysenteria, magna cum utilitate ano inseri potest, sed ultra horam intestinis non est immittendum. Si autem non cessaverit fluxus, potest reiterari & rursus inferri. Opium autem corrigi potest cum admixtione opii.

*Opium
quid.**Usus opii.**Correctio
mixtione opii.*

xtione castorei, croci, Myrrhae, & allii, sed in exigua tantum quantitate duorum triumve granorum intra corpus in extremis doloribus propinari potest.

Opiata composita. Ex compositis Opiatis laudatissimum est Philonium Romanum, cujus ꝓ i. aut ꝓ i. s. cum haust. vini in vehementissimo dolore intestinorum exhiberi possunt. Somnum enim conciliant & indolentiam inferunt. His addi possunt & pillulae à Cynoglossa, & Requies Nicolai.

Laudanum Paracelsi. Laudanum verò Opiatum Paracelsi quod & Nepenthes à quibusdam dicitur, omnes opiatas compositiones veterum antecellit. Est enim singulare non saltem anodynum, sed etiam confortativum omnium internorum vi-

scerum, si ritè preparetur. Exhiberi autem possunt ejus gr. iv. v. vi. ad x. pro ratione virium & doloris vehementia. Cumque mira in sedandis doloribus praestet, & ejus compositio admodum variet, nec ubivis obvia sit, praestantiorē hic colophonis loco annexere placuit.

℞. Spec. diambra ꝓ s. mumia electa ꝓ ii. croci orient. ꝓ i. cum alcohol vini f. l. a. Extracti. Cujus ℞. ꝓ s. Extr. opii ꝓ i. Extr. castorei ꝓ ii. misceantur in vase vitreo, postea addantur ol. cinam. ꝓ i. ol. caryoph. ꝓ s. magister. perlar. & corall. an. ꝓ ii. ambra grisea ꝓ i. s. moschi. ꝓ i. misceantur f. massa pro formandis pillulis. In feminis si ejus usus, moschus & ambra omittantur.

FINIS MORBORUM PARTICULARIUM OMNIUM.



I N D E X

In Tomum I. II. III. & IV. Operum JOELIS.



A.		
<i>Bortus proprie quid.</i> 486. <i>eius remedia.</i>	487	<i>Anodyna varia.</i> 569
<i>Acetum.</i>	47	<i>Anthraxis remedia.</i> 527
<i>Achores quid.</i>	200	<i>Antimonii usus in hydrop.</i> 372
<i>Actiones humana quotuplices.</i>	34	<i>Antipleuritica singularia.</i> 277
<i>Adeps leonis in scirrho hepatis.</i>	365	<i>Apepsia quid.</i> 308
<i>Aëris necessitas.</i> 36. <i>utilitates.</i> <i>ibid.</i> <i>constitutio salubris.</i> 37. <i>Aër qualis conveniat gravidis.</i>	482	<i>Appetentia canina quid.</i> 319. <i>quomodo extinguenda.</i> 320
<i>Ætatum differentia.</i> 9. <i>Ætatis mutatio temperamentum immutat.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Appetitus quomodo excitetur.</i> 38. <i>Appetitus laeso unde.</i> 318. <i>quibus corrigatur.</i> 319
<i>Affectus animi.</i> 61. <i>Affectus corporis prater-naturales.</i>	73	<i>Aphorismi in dolore capitis observandi.</i> 142
<i>Albus fluxus mulierum quid.</i> 468. <i>eius remedia.</i>	469	<i>Aphibæ, earumque remedia.</i> 250. 506
<i>Alimentorum genera.</i> 38. <i>delectus.</i> 39. 40		<i>Apoplegmatisini.</i> 172. 197
<i>Alimenta calculo materiam suppeditantia.</i> 389. <i>gravidis convenientia.</i> 482. <i>optime nutritia.</i>	522	<i>Apoplexia quid.</i> 181. <i>quibus potissimum accidat.</i> <i>ibid.</i> <i>eius præservatio.</i> 182. <i>paroxysmi curatio.</i> <i>ibid.</i>
<i>Alopecia.</i>	196	<i>Apostematis aurium remedia.</i> 221
<i>Alvi excrementa quid indicent.</i>	108	<i>Apoxema pro melancholicis.</i> 163. <i>pro epilepti-cis.</i> 179. <i>Apoxema pectorale.</i> 268
<i>Alvi fluor seu diarrhæa infantium.</i> v. <i>diar-rhæa.</i>		<i>Aqua benedicta Rulandi in pleuritide.</i> 277.
<i>Amaurosis.</i>	217	<i>Aq. carbunculi in syncope utilissima.</i> 290.
<i>Ambustionis remedia.</i>	561	<i>Aq. mellis capillos generat.</i> 193. <i>Aq. O-phthalmica ex croco metallorum.</i> 208. <i>Aq. stillatitia ad suffusionem composita.</i> 212.
<i>Anasarca, ejusque peculiaria remedia.</i> 374		<i>Aq. sambuci Quercetani in dolore ischia-dico.</i> 537. <i>Aq. theriacalis in calculo.</i> 391.
<i>Angina proprie dicta, ejusque curatio.</i> 257.		<i>Aq. tartarea & lapidosa quæ.</i> 389. <i>Aq. juniperi per descensum vomitum concitat.</i> 512. <i>Aq. vitæ locis ad memoriam confor-tandam probatissima.</i> 170. <i>contra apople-xiam.</i> 180. <i>contratissima.</i> 268
<i>Angina infantium quando periculosa, & quomodo curanda.</i>	507	<i>Ars medica quomodo addiscenda.</i> I
<i>Anhelitus factorem emendantia.</i>	237	<i>Arteriotomia an adhibenda.</i> 176. <i>Arteriotomia in peripneumonia salutaris.</i> 173
<i>Animalium partes, quæ in usum medicum ve-niunt.</i>	133	<i>Arthritidis species.</i> 528. <i>remedia.</i> 529. & <i>seq.</i>
<i>Anima facultates quotuplices.</i>	32	<i>Articulorum remedia.</i> 130. <i>Articulos robo-rantia.</i> 530
<i>Animi deliquium quid.</i> 289. <i>Animi dolores pharmacus non tolluntur.</i> 291. <i>Animi pa-themata quæ vitanda gravidis.</i> 481. 482		<i>Ascarides.</i> 314. <i>Ascaridum remedia.</i> <i>ibid.</i>
<i>Ani affectiones.</i> 344. <i>Scissura ut curanda.</i> 345. <i>Ani tubercula & fistula.</i> 347. <i>pro-cidentia unde & quibus accidat.</i> 352. <i>quo-modo corrigenda.</i> <i>ibid.</i> <i>Ani procidentia in-fantium.</i>	517	<i>Ascites ejusque curatio.</i> 374
<i>Annuli ex alcis ungula & cornu buffali spa-smo medentur.</i>	189	<i>Asthma quid.</i> 271. <i>ut curandum.</i> <i>ibid.</i> <i>asthma infantium.</i> 509
		<i>Astringentia & refrigerantia.</i> 326. <i>Astrin-gentia in arthritide non temere adhibenda.</i> 530
		<i>Astrologia necessitas in Medicina.</i> 113
		<i>Aurium</i>

INDEX.

Aurium affectus. 220. *timitus ut curandus.*
223. *purulentia.* 226. *vermes.* 227. *Aurium*
purulentia in infantibus. 505. *Aurium flu-*
xio non temere supprimenda. 227. *Auribus*
omnia tepide instillanda. 220. *narcotica*
caute infundenda. 221. *Si quid solidum il-*
lapsum ut eximendum. 228

Auripigmentum preparatum, ejusdemque oleum
fistulas sanat. 348

Aurum potabile in phthisi. 285. *in marg.*

B.

B *Alneum aqua dulcis confert melancholicis.*
162. *maniacis.* 167. *scorbuticis.* 243.

Balneum pro convulsis ex inanitione. 189.

Balneum in fluxu albo noxium. 496

Balsamus consolidans egregius. 348. *Bals. Sul-*
phuris asthmaticis utilis. 272. *Bals. Saturni*
in uteri exulceratione. 454. *Bals. puerorum*
foetum & matrem confortat, abortumque
praevert. 488

Barycoja. 221

Batrachos. 255

Beta succus cerebri expurgat. 149

Bibere in paroxysmo febrili capitis dolorem in-
fert. 154

Bilem alterantia. 124. *educientia.* *ibid.* *prapa-*
rantia. 175. *evacuantia.* 222

Bradypepsia. 308

Brassica. 42

Bubo pestilentialis. 527. *Veneri remedia.* 554

Buβavovkῆλῃ. 524

Bylimia quid. 321. *varius affectus.* *ibid.* *ejus cu-*
ratio. 322

Butyrum. 44

C.

C *Achexia, remediaque ejus.* 369

Calculus renum. 388. *vesica.* 413. *Calcu-*
lus infantum. 515. *calculus propellentia.* 414.
515. *calculus ut excidendus.* 415. 515

Caligo oculorum, ejusque curatio. 217

Callosam carnem in fistulis absumentia. 348

Callosus meningum tumor ut tollendus. 205

Calor innatus. 30. *calor natus in hepate quo-*
modo vitetur. 370. *Calorem nativum robo-*
rantia. 436

Camphora odorem non omnes ferunt. 247

Cancrofi polypi remedia singularia. 232

Capillorum & tegumentorum capitis affectus.

196. *Capil. luxuries.* 198. *erosio & tinea.* 199.

Capil. defluviu in lue Venerea. 551

Capitis partes interna. 20. *externa.* 22. *Capitis*
affectus quadruplices. 141. *Capitis dolori cau-*
te remedia adhibenda. 142. *Capitis doloris in*
lue Venerea remedia. 553

Carbones tilia contra casum. 567

Cardiaca remedia. 128

Cardialgia quid. 306. *ut curanda.* *ibid.* *Cardial-*
gia infantum. 510

Carminativa in dolore capitis. 151. *Carminati-*
va remedia varia in inflatione ventriculi. 335

Carnium differentia. 44

Carus & catalepsis quid. 171. *ut ab apoplexia*
differat. *ibid.*

Caseus. 44

Cataplasma in angina usurpandum. 258. *dolo-*
rem capitis sedans & somnum concilians. 154.

ad oculorum pustulas. 216. *anodynum.* 225.

malacticon. 225. 226. *suppuratorium.* 203.

282. *strumas absument.* 265. *Cataplasma a-*
nodynum emolliens. 295. *stipticum anodynum*

ad diarrhaam. 516. *ad condylomata.* 346. *ad*
rupturam. 516. *Catapl. in sanguinis copiosi*

affluxu. 530. *in hydropse.* 373. *maturans bu-*
bones. 527. *revellens in peste.* *ibid.* *rupto-*

rium. 528. *urinam provocans.* 408. *ad ver-*
mes sub unguibus. 565

Cataracta quid. 210. *ejus per chirurgiam cu-*
ratio. 212

Catarrhus quid & quotuplex. 192. *morbi ex ca-*
tarrho varii. *ibid.* *acrioris catarrhi reme-*
dia. 194. *frigidi curatio.* *ibid.* *Catarrhum*
intercipientia. 270

Cathartica fortiora in renum abscessu vitan-
da. 393

Causiticum ad aperiendos tumores. 285

Cautela in cura apostematum & inflammatio-
num. 457

Cauterium utile epilepticis. 180

Cephalica remedia. 128

Cephalalgia & cephalaa quid. 142. *quibus fa-*
miliarior. 157

Cerevisia salubres. 48

Cerebri ventriculi. 22

Cerota. 138. *Cerosum stomachale authoris.* 309.

ex ladano Cratonis. *ibid.* *in marg. adstricti-*
um. 327

I N D E X.

<i>Characteres ponderum & mensurarum.</i>	121	<i>fantium unde & quomodo curanda.</i>	503
<i>Chiragra.</i>	533	<i>Contraria quanam sint remedia.</i>	120
<i>Chirurgia seu excisio in calculo quando suscipien-</i>		<i>Cordialia remedia.</i>	288
<i>da.</i>	415	<i>Cordis partes. 25. Cordis affectus. 286. palpitatio. 286. dolor & anxietas. 290. Cordis motus diversi.</i>	78
<i>Cholera ventriculi quid. 325. quibus sistenda.</i>	326	<i>Cortices usitiores. 133. Corticum Guajaci decoctum ad sitim hydropicorum.</i>	374
<i>Cholagoga.</i>	124	<i>Corroborantia hepar & lienem.</i>	370
<i>Cibus & potus. 38. Cibi Venerem excitantes.</i>	422	<i>Cosmetica. 560. Cosmetica remedia unde petenda.</i>	199
<i>Cicatrices delentia.</i>	561	<i>Cotyledones.</i>	439
<i>Cingulum ex corio cervi ad suffocationem uteri.</i>	445	<i>Cranei fractura. 203. qua lethalis. 204. circa eam observanda.</i>	ibid.
<i>Clavus quid.</i>	557	<i>Crapula ut curanda.</i>	153
<i>Clysteres. 137. Clysteris usus quando conveniat.</i>	60	<i>Crisis quid.</i>	114
<i>Colica passio ut à nephritide distinguenda. 340. à qua causa proveniat ut dignoscendum. ibid. ejus remedia si à frigida causa. 341. ab acribus humoribus. 342. à vitrea pituita. ibid. à lumbricis. ibid. à proprietate juvenia. ibid.</i>		<i>Criticarum evacuationum species.</i>	114
<i>Colli affectus externi.</i>	263	<i>Critici dies quomodo invenendi.</i>	115
<i>Collutio dentes firmans. 247. ad putredinem gingivarum & dentes mobiles. 248. ad dolores dentium ex causa calida. 245. ex causa frigida. ibid. ex gingivarum affectu. 246. ad aphthas. 250. ad lingua apostemata fistulosa. 255. ad lingua apostemata nigra. ibid. ad tumores scirrhusos. 254. ad paralyfin.</i>	251	<i>Cruenta excretio quid denotet.</i>	109
<i>Collyria. 136. Collyrium abstergens ad albugines. 215. anodynum lene. 207. ex croco metallorum. 208. in marg. ad oculorum exulcerationem. 214. ad oculor. maculas lividas. 210. ad sugillationem. 209. ad suffusionem. 211. ad oculor. ungues. 209. phlyctanas. 217. narcoticum. 208. visum clarificans.</i>	217. 218	<i>Cruor e vena secta eductus quales prabeat indicationes.</i>	110
<i>Colostrum exugendum.</i>	498	<i>Crocus Martis utilis in cholera. 326. in lienteria.</i>	332
<i>Columella. v. Gurgulio.</i>		<i>Cucurbitularum usus. 146. 165. Cucurbitula revellunt in fluxu menstruo. 468. in uteri scirrho noxia.</i>	457
<i>Compositionum remediorum forma.</i>	133	<i>Curatio quid & quotuplex.</i>	119
<i>Conceptio ut fiat. 479. ejus indicia.</i>	480	<i>Cutis quid, ejusque affectus. 539. Cutis intumescencia in infantibus.</i>	522
<i>Condimenta usitata.</i>	46	D.	
<i>Condita.</i>	136	<i>Decocta. 135. Decoctum gypseam pituitam preparans. 263. pituitam preparans. 168. 184. 287. digerens melancholiam. 169. 253. 288. putridos humores preparans & evacuens. 197. antiscorbuticum simplex. 243. consolidans & astringens in dysenteria. 337. decoct. pectorale ad asthma probatissimum. 272. ad expectorationem puris in emphyemate. 282. ad peripneumoniam. 274. ad phthisin. 285. ad pleuritidem. 277. ad sputum cruentum egregium. 280. Decoctum ad corruptelam hepatis. 361. aperiens in hepatis obstructione. 360. ad hernias utile. 516. attenuans, abstergens & evacuens in inflammatione lienis. 378. bilem preparans. 462. China & sarsaparilla. 555. Decoctum digestivum atra bilis. 456. in obstructione lienis. 381. in scirrho lienis. 380. in obstructione renum.</i>	
<i>Condyformata circa anum ut curanda.</i>	346		
<i>Conserva.</i>	136		
<i>Contabescencia species diversa.</i>	283		
<i>Continuus solutio ut causa doloris. 568. in hepate lethalis.</i>	362		
<i>Convulsio quid & quotuplex. 186. Convulsio in-</i>			

INDEX.

- num. 387. Decoct. digest. melancholici humoris. 462. pituita. 374. 472. salsa pituita. 462. Decoctum muliercularum ad menses provocandos. 473. pro ablutione uteri. 447. in renum calculo. 390. in renum ulcere. 395. Rad. vincetoxici in anasarca. 374. sanguinem purificans in Cachexia. 396. Decoct. sudoriferum in hydropse. 372. ad hepatis tumorem. 363. in arthritide. 533. in morbilis. 541. in lepra. 550. ligni Guajac. & juniperi in lue Venerea. 551
- Dentifricia varia. 242
- Dentium affectus. 244. dolor unde. ibid. ejus remedia in causa calida. ibid. in frigida. 245. in omni dolore. 246. Dentium erosio & caritas. 248. mobilitas. 247. 553. nigredo. 246. stupor. 249. vermiculi. 248. Dentes ut absque dolore digitis excimendi. 248. Cur aurifabris & metalli fossoribus vacillent. 247
- Dentitio quibus promovenda. 240. 506
- Desiderata gravidis non deneganda. 485
- Destillatum in scabie singulare. 543. pro absu- mendis clavis & verrucis. 557. venustam reddens faciem. 561
- Decubitus recentis puerpera qualis esse debeat. 496
- Defensivum in vulneribus. 202. 205. frontale in ophthalmia. 207. in lippitudine. 213. in oculo- rum prolapsu. 219
- Diabetes quid. 398
- Diaphragmatis affectus. 301. perforatio lethali. ibid. inflammati remedia. ibid. tumor frigidus ut curandus. 302
- Diarrhaa quid. 332. ejus remedia si ex bile pro- veniat. 333. ex pituita. 334. ex melancholia. ibid. Diarrhaa infantum. 512
- Difficultas respirationis symptomata à quibus morbis excitetur. 271
- Digestivum ad cruditates ventriculi. 224. Di- gestivum in uteri scirrho. 457
- Diuretica quando usurpanda. 61. Diuretica in gibba hepatis obstructione. 360. in hydropse. 372. in dysenteria. 407. in ischuria. 411. in albo fluxu. 469. in renum abscessu. 392. cal- culo. 388. obstructione. 387
- Dolor quid & quotuplex. 568. Doloris causa. ibid. subjectum proprium. 568. species quid denotent. 369. remedia varia. 370
- Dolor capitis ex bile. 146. ex ebrietate. 153. in febris. 154. ex flatulentis spiritibus. 151. humiditate. 145. intemperie calida. 142. fri- gida. 143. sicca. 144. melancholia. 149. mor- bo Gallico. 155. pituita. 147. sanguinis copia. 145. vulnere vel contusione. 256. cum suis remediis & curatione. ibid.
- Dolor dorsi. 538. Dolor articulo- rum in lue Vene- rea. 554. Dolor oris ventriculi. 306
- Dolores partus quibus renovandi. 489. eorum cessatio malum. ibid.
- Dosis cholagogon. 124. melanagogon. 126. phle- gmagogon. 124
- Avonugia. 221
- Dyspepsia quid. 308
- Dyspnoea, ejusque curatio. 270
- Dysenteria quid & unde proveniat. 335. cujus intestini vitio contingat. 336. ejus varia re- media. ibid.
- Dysuria, ejusque curatio. 406. unde in infan- tibus. 515. ejus remedia. ibid.
- E.
- Ebrietatis effectus. 153. ab ea prae- servan- tia. 154
- Ebrietas velut pestis memoria est. 168
- Eclegma, seu loch. 136. Eclegma ad empyema. 283. ad haimoptosin. 280. ad peripneumo- niam. 274. ad pleuritidem. 277. ad tussim ex calida causa. 269. ex frigida causa. 270
- Electuaria usitata. 134. Electuarius catar- rhum sistens & incrassans. 194. cerebrum ro- borans. 149. ventriculum claudens. 192. pro memoria eximium. 170. pro melancholicis. 164. pro paralyticis. 185. pro scorbuticis. 243. ad tremorem. 190. prae- servans ab apoplexia. 182. ab epilepsia. 180. Electuar. analepticum pro phthisicis. 285. cordiale refrigerans. 287. cordiale calidum. 288. refrigerans pro ven- triculo inflammato. 313. ad picam. 321. Elect. antiparalyticum. 503. ad corruptionem he- patis. 362. hepaticum singulare. 358. in nimio menstrui sanguinis fluxu. 466. in uteri infla- tione. 451
- Elementa triplicia. 4. Elementorum qualitates. 5
- Elixir proprietatis Paracelsi ad tussim. 268
- Emplastra usitata. 138. Emplastrum ad angina- nam. 258. capitale Basilicum. 204. ad capitis vulnera. 157. 202. scirrhosos tumores emol- liens.

I N D E X.

liens. 226. 264. scrophulos absumens. 264.	Essentia troci Martis in vomitu cruento. 325. Ef-
Emplast. stomachale astrictivum. 280. refrigerans. 314. Emplast. Amati Lusitani in ischuria carunculas absumens. 414. adstringens in uteri procidentia. 448. ad luem Veneream ex hydragyro. 552. ad tumorem ventriculi. 510. ad rupturam. 525. ad vomitum & alvi fluxum. 511. sticticum Crollii in uteri exulceratione. 455	sent. croc. Mart. in deploratis obstructionibus. 361. in marg. Essent. croc. Mart. in cruenta mictione. 398. in nocturna permiſſione. 415. in nimio fluxu menstruo. 465. in fluxu hepatico. 375. in scirrho lienis. 380. Essentia satyrionis Crollii ad impotentiam. 426. ad sterilitatem. 478
Emollientia & resolutiva in scirrho lienis alternatim adhibenda. 379	Evacuatio quid & quotuplex. 54
Empyema quid. 281. quos morbos subsequatur. 282. ut curandum. ibid.	Eventus morbi ut ex luna motu judicandus. 116
Emulſio 4. sem. frig. ad tussim infantium. 509	Euporison ad icterum. 368
Enema pro apoplecticis. 182. pro epilepticis. 179. pro lethargicis. 172. pro paralyticis. 184. phlegmagogon. 169. in suffusione oculorum. 211. in vertigine. 175. Enema abstergens in diarrhaa. 333. 337. adstringens & alvum sistens. 327. 334. alimentaria enemata. 304. Carminativum. 314. ad colicam. 341. 342. emolliens. 282. 313. 326. emolliens & flatus discutiens. 339. lumbricos proliciens. 342. melanagogon. 334. mitigans, conglutinans & adstringens. 337. stipticum ad hemorrhoidum fluxum. 350. ad teneſmum. 338. Enema dolores à calculo mirifice sedans. 390	Exanthemata. 518. 540. saepe sunt maligna. 518
Εντεροκήλη, seu hernia intestinorum. 524	Excoriationis puerorum remedia. 518
Epatis affectus. 353	Excrementa alvi quid denotent. 108
Ephialtes quid. 191	Excreſcentia carnosae remedia. 203. 206
Epilepsia quid. 176. remedia paroxysmi. 177. praeservatio & eradicatio quibus perficiatur. 178. Epilepsia infantium. 499. in pueris ut curetur. 178	Exercitatio quid & quotuplex. 51
Επιπλοκήλη. 524	Exercitia ut moderanda. 52
Epithemata. 137. Epithema ad dolorem capitis in febribus. 154. in ophthalmia. 207. in oculi prolapsu. 219. pro phreniticis. 161. Epithema anodynon ad hemorrhoides. 351. adstringens ad choleram. 326. pro empyematicis. 282. ad cordis palpitationem. 287. 288. ad ventriculi inflammationem ex saccharo Saturni. 314. Epithema in fluxu menstruo pro mammillis. 467. plantis pedum applicandum. 468. ad uteri pruritum. 462	Experimentum singulare ad dolorem capitis ex flatulentis spiritibus. 152. ex ebrietate. 154. ad surditatem. 223. Experimenta singularia auctoris ad aquam intercutaneam. 372. ad abortum praecavendum. 488. ad capitis infantis scabiem. 502. ad calculum vesicae. 416. Hydragoga euporista. 372. ad hypodermides. 558. ad uterum. 383. ad lentiginem. 559. ad serpiginem & impetiginem. 547. ad verrucas. 557. ad uvula elongationem in infantibus. 508
Errhina. 136. Errhina in epilepsia. 180. in catarrho. 195	Exploratio an samina sit hysterica an mortua. 444
Erysipelas. 544	Extergens liquor in ulcere navium. 231
	Extractio foetus mortui chirurgica. 494
	Extractum hellebori nigri. 163. 167
	F.
	F acies à cicatricibus in exanthematibus ut custodienda. 520. Faciei macula in lue Venerea quibus delenda. 554
	Faucium partes & morbi. 257
	Femina variis affectibus obnoxia. 440
	Femella in utero aliquando citius moriuntur. 481
	Febris natura & differentia. 69. Febrilium accessuum ac periodorum causa. 72. Febrilium symptomatum causa. 71. Febris fere omnibus capitis dolor est symptoma. 154. in febribus, quae viscera potissimum afficiuntur. ibid.
	puerorum. 521. gravidarum methode non curantur. 485
	Ficus laxativi. 433
	Flores

INDEX.

Flores uscati. 131
Flores antimonii in phthisi. 286. in hydropse. 287
Flores & lac sulphuris in phthisi utile. 372. 285
Fluxus aurium periodicus quibus proliciendus. 227

Fluxus hepaticus. 375
Fœtus in utero constitutio. 271. quando facile
ladatur. 481. extincti in utero indicia. 489
mortui curatio. 493
Folia persicorum contra ascarides. 514
Fomētatio pro pleuriticis. 276. pro scissuris ani. 345
Fomentum ad aurium tinnitum. 124. ad my-
stropiam. 216. ad oculorum exulcerationem.
214. suffusionem. 211. sugillationem. 210
Fons lapides generans. 389
Formula remediolorum. 123
Fractura cranei indicia. 156. prognostica, reme-
dia. 204
Fructus arborei esculenti. 43
Fructus in officina usati. 132
Frumenti genera. 42

G.

G *Alla dolores dentium sedat.* 245
Gargarismi. 137. gargarismus abscessum
rumpens. 258. adstringens & repellens. 257.
ad columella affectus. 260. dolorem leniens.
258. emolliens. 258. pituitam e cerebro proli-
ciens. 149. ad tonsillarum tumorem. 262.
gargarismum adstringens. 278
Gemma usitatores. 133
Gentiana radix naribus inserta pituitam elicit.
149. 195
Gilla Theophrasti ad lumbricos. 344
Gingivarum vitia. 239. luxuries seu excre-
scientia ut curanda. 240. putrefactio seu cor-
ruptio unde. 241. ut curanda. ibid. Gingiva
cur sanguinem profundant in scorbuto. 383.
earum putrescentium remedia. 553
Glaſi, seu suppositorium. 61. 137
Globuli dentibus carvenosis imponendi. 249
Gonorrhœa. 428
Gravado quid. 234. ejus remedia. 235. gravedi-
nis infantium remedia. 508
Gravida non offendenda. 481. omni modo exhi-
laranda. 482. earum morbi. 483
Gummata usitata. 132. Gummi gutta 3 s. e-
*gregie obstructions venarum tollit, & pur-
gat.* 319
Gurgulionis affectus. 259. tumoris & inflam-

mationis remedia. 260. prolongationis reme-
dia. 260

Gustus depravatio unde. 252. ejus remedia. 253

H.

H *Æmodia quid.* 249. ejus remedia. ibid.
Hamoptosis quid & unde. 277. ejus cura-
*tio pro diversitate causarum & loci affecti
varia.* 278
Hamorrhoidum cacarum remedia anodyna.
349. aperientia. 350. internarum apertio
quibus procuranda. 351. Hamorrhoides im-
modice fluentes quibus sistenda. 350. suppres-
sa ut curanda. 351. periodica minime cobi-
benda. 351. à quibus morbis præservent. ibid.
quando salubres. ibid. Hamorrhoides uteri
a fluxu menstruo discernenda. 468
Hæmorrhoidum ventriculi cruditates purgans. 224
Hæmorrhoidum melanagogi. 268. 299. 334. 347.
Hemicrania quid. 158. ejus remedia singularia.
ibid.
Hepatica remedia. 129. Hepatis inflammatio-
nis remedia. 357. hepatis affectus præcipui.
353. Hepar & lien scirrhus obnoxia. 364. He-
patis atonia seu imbecillitas. 353. corruptio.
361. Intemperies calida. 354. frigida & hu-
midita. ibid. sicca. 355. inflammatio. 356. ob-
structio. 358. scirrhus. 364. Tumor & ab-
scessus. ibid. Hepatis calor in lue Venerea. 554
Hepatici qui dicantur. 353
Hepatis hircini succus ad oculorum caliginem.
*217. Hepar bubalum assatum in diarrhœa in-
fantium.* 513. Hepar galli nigri ad inflamma-
tionem hepatis ex Venere. 358. Hepar lupi ad
obstructions hepatis. 361
Herba in officinis usitata. 131
Hernia quid & quomplex. 523. puerorum. 516.
umbilicalis. 514
Hirudines. 58. Hirudinū usus commodissimus. 503
*Humiditas cerebri non dolorem sed gravitatem
capitis inducit.* 145
Humidum radicale, seu primogenium. 12. 30
Humores quid & quomplexes. 10. 11. Humores
præternaturales. 13. Humorum efficacia in
corporibus. 12
Hydatides quid. 362
Hydragoga potio hydropicorum aquas educens. 329
Hydromel in morbillis quando usurpandum. 541
Hydrops, ejusque remedia. 370
Hydropica gravida paracentesi curata. 373

D d d d

Hypo-

I N D E X.

Hypochondriaca melancholia curatio.	164	Κόρυζα, seu gravedo.	234
Hypodermides capillares. 558. sub unguibus. 559		Κωφότης, seu surditas.	221
Hypopya remedia.	210	L.	
Hysterica quomodo absq[ue] respiratione vivat. 444		L Abiorum vitia. 239. scissura ut curanda. ib.	
I.		Lachrymarum inviso manantiū causa. 212	
I Chthiocolia in diarrhæa infantium.	513	Lac generantia. 293. Lac quale esse debeat. 498.	
Icterus, ejusque curatio. 360. Icterus niger. 382		lactis nutricis emendatio. 503. lactis coagula-	
Iecur, seu hepar.	27	tio in mammis ut curanda. 294. defectus un-	
Ignis sacer.	544	de. 293. redundantia quibus reprimenda. 292.	
Ignavia & ocio intellectus & memoria vehe-		Lac tabidis utile.	284
menter labefactatur.	168	Lac caninum ad lingua scabritiem.	256
Iliac. 26. Iliaca passio seu ileos qualis affectus. 339.		Lac sulphuris ad tussim.	269
quibus curandus.	ibid.	Lacticia esculenta.	44
Imaginationis mira vis.	482	Lactumen quid.	521
Impetigo.	545	Laconicum pro paralyticis.	185
Impostorum dolus in judicio urinarum ut eluen-		Lapidis prunella usus.	161. in marg.
dus.	107	Lapis. Bezoar ad cordis anxietatem.	291
Impotentia.	422	Lapis medicamentosus Crollii ad scabiem. 543. ad	
Impuritas matricis quid. 442. ejus causa. ibid.		gingivas putrescentes.	553
Incantamenta & artes diabolica quibus novelli		Lapilli in pulmonib. respirationē impediunt. 271	
mariti ligantur.	425	Laudanum opiatum seu opium quid. 570. Lau-	
Incontinentia urina.	412	dani opiatī usus. 161. 166. in marg. ejus usus	
Incubus quid. 191. an à Physicis causis oriatur.		in cardialgia. 306. in catarrho. 194. in colicis	
ibid. ejus curatio.	ibid.	doloribus. 342. in peripneumonia.	274
Infantis recenter nati cura. 497. ejus nutritio		Lavacrum in cutis intumescencia.	522
conveniens. 498. Infantium agrotantium in-		Legumina esculenta.	42
dicia. 499. symptomata & morbi. ibid. ar-		Lentiginis cura.	559
dor capitis. 500. capitis intumescencia. ibid.		Lesiones sensus & motus.	174
Diarrhæa.	512	Lepra quid, ejusq[ue] differentia. 548. remedia. 549	
Infimi ventris partes.	26. 303	Lethalia indicia.	119
Inflammatio gingivarum ut curanda.	240	Lethargus quid. 171. ut à caro differat. ibid.	
Inguina. 26. Inguinum affectus.	523	Leucophlegmatia.	374
Infessus pro lethargicis. 173. pro paralyticis. 186. ad		Lienis affectus. 375. atonia. 376. inflammatio.	
condylomata. 347. ad hamorrhoides cacas.		377. scirrhus. 378. obstructio.	380
349. ad hamorrhoides apertas. 351. pro iliacis.		Lienteria quid, ejusque curatio.	330
340. ad inflammationem ventriculi. 314. in		Ligamenta.	19
renum obstructione. 387. in calculo renum. 390		Ligna usitata.	183
Insomnia denotant temperamentum & humores		Ligatorum vera curatio.	425
morbificos.	50	Lingua affectus varii. 249. apostemata ut cu-	
Intempestivus topicor. usus quantum noceat. 543		randa. 254. fissura. 256. paralysis. 251. pustu-	
Intestinorū descriptio. 27. 330. morbi principii. 330		la. 250. scabrities.	256
Ischiadicus dolor.	536	Linimenta. 138. Linimentum ad achores. 200.	
Ischuria.	409	ad capillos generandos. 198. ad porriginem.	
Iulapium refrigerans.	309	200. aurium nimium fluxum cohibens. 227.	
Iusculum lenitivum pro tabidis.	285	ad gingivas putridas & dentes mobiles. 248.	
K.		ad lingua ariditatem. 254. 256. lingua scissu-	
K Ηλη, rarnex, seu hernia.	524	ras. 256. ad memoriam. 170. pro paralyticis.	
Καρδιαλγία, seu cordis dolor.	306	183. 185. ad scissuras partium obsecanarum.	
Κεράμεν, seu Brassica.	42	239. ad soporosos affectus. 172. linim. soporife-	
		rum.	

I N D E X.

rum. 166. *strumas absumens.* 264. *pectorale.*
 272. 274. 276. *cordiale.* 287. 291. *pro ventre*
in lienteria. 332. *Liniment. cutim nitidam red-*
dens. 560. *ad dolorem & inflammationem te-*
stium. 434. *emolliens in uteri scirrho.* 458. *ad im-*
potentiam egregium. 414. *ad cohibendum afflu-*
xum in arthritide. 530. *ad defluuium capillo-*
rum. 553. *ad somnum conciliandum.* 512. *ad in-*
flammas gingivas. 506. *pro faucibus.* 553
Lipothymia quomodo à syncope differat. 289
Lippitudo seu illachrymatio involuntaria. 212. *ejus*
remedia egregia. 213
Liquor crystalli in obstructione lienis. 381
Liquor rubrus ad pallorem faciei. 561
Lixirium ad olopeciam. 198. *ad achores.* 200. *e-*
molliens rigidos pilos. 199. *ad erosionem pilorum*
& tineas. 199. *ad pediculationem.* 201. *ad porri-*
ginem. 200
Loch, seu Eclegma. 136
Lochiorum retentorum symptomata. 495
Lotio pedum in catarrho utilis. 194
Lues Venerea quid. 550. *ejus remedia.* 551. *sympto-*
matum remedia. 553
Lumbrici, eorumque differentia. 343. *unde gene-*
rentur. 514. *eorumque remedia.* 344. 514
Luna motus crisin facit. 115. *Luna vis in morvendis*
humoribus. ibid.
Luteum liliorum in difficultate parius. 491
 M.
Macula crurum in scorbuticis unde. 383. *cutis*
maiores. 560. *connata.* 561
Magisterium hyacinthi specificum contra spasmus.
 189. *perlarum ad suffusionem.* 212. *in marg.*
Mammillarum affectus. 292. *Cancer ut dignoscen-*
du & curandus. 298. *ejus preservatio.* 299. *re-*
media anodyna. 300. *oedema mammillarum.*
 294. *inflammatio.* 297. *protuberantia indecens.*
 300. *scirrhus ut curandus.* 296. *vena mam-*
millarum ut dilatanda. 293
Mania quid. 165. *confirmata incurabilis.* 166.
ejus remedia. ibid.
Margaritarum emulso cor admodum roborat. 288
Masculorum generatio quomodo procuranda. 481
Materia medica circa quam Medicus versatur. 3
Materia medicamentorum. 131
Matrix impuritas ut curanda. 442
Maxillarum dolor arthriticus. 538
Meatus urinarum quomodo aperiendus. 408
Medicatio laudatissima. 120

Medicina quid. 2. *Medicina finis, subjectum, &*
partes. ibid.
Medico praeoscenda ante curationem. 121. *Medicus*
in uterinis morbis exercitatus esse debet. 440
Medicamenta semen extinguentia. 427
Melanagoga. 150. 163. 164. 165. 169. 254
Melancholiam preparantia. 126
Melancholia quid & quatuorplex. 161. *quomodo cu-*
randa. 162. *Melancholia hypochondriaca.* 384.
ventriculum per consensum affligit. 312
Melancholici palpitatiōni cordis obnoxii. 288. *Me-*
lancholicorum varia phantasia. 162
Membra externa, artus. 29
Memoria quid. 167. *quibus laedatur.* ibid. *quibus*
confirmetur. 168
Meninges denudatae ut curanda. 205
Menses faminarum quid. 463. *eorum suppressio.* 470.
qua circa menses consideranda. 463
Menstrui sanguinis evacuatio praternaturalis. 484
Mensura remedium. 121
Mercurius viua hepar à corruptione preservat. 362.
 363
Mesenterium. 27
Metallica remedia. 133
Methodus quid & quatuorplex. 1
Mictio cruenta. 396
Miseria sexus foeminei. 463
Mixtio quid. 5
Mola quid & quatuorplex. 483. *ejus curatio.* 484
Morbi definitio. 66. *morborum causa.* 64. *differen-*
tia. 66. *Morbi in substantia cerebri rationem per-*
turbantes. 159
Morbilli puerorum. 518. *Morbilli & variola.* 540
Mores sequi temperaturam. 10
Morphea remedia. 550
Morsuli à catarrho preservantes. 196. *pro convul-*
sis. 189. *contra paralyfin.* 185. *visum roborantes.*
 213. *cordiales.* 288. *ad ebullitionem stomachi.*
 307. *pro phthisicis.* 285. *ventriculum claudentes.*
 309
Motus & quies. 51
Mundificativum pro vulneribus capitis. 205
Musculi. 20
Myrrhae acedinem tollit. 267
 N.
Narcotica varia. 570. *in arthritide caute u-*
surpanda. 531
Nares quae praeservent ab exanthematibus. 520. *Na-*
rium affectus. 228. *haemorrhagia causa & reme-*
 dia

<i>dia varia. ibid. factor ut curandus.</i>	233
<i>Nafalia.</i>	233
<i>Natura quid & ejus varia significationes. 3. natura humana ex tribus constat.</i>	10
<i>Naturalis excretio in somno.</i>	429
<i>Naturalis uteri angustia ut corrigenda.</i>	459
<i>Nausea quid. 322. odoramentum nauseam arcens. 324. Nausea infantium.</i>	511
<i>Nephritica remedia.</i>	129
<i>Nephritis quid. 385. ejus curatio.</i>	ibid.
<i>Nervorum paria quot.</i>	173
<i>Nicotiana utilis asthmaticis. 272. Nicotiana foeminae folia in scabie infantium.</i>	501
<i>Nigra excretiones.</i>	109
<i>Nigra urina. vid. Urina nigra.</i>	
<i>Nubecula urina.</i>	101
<i>Nutritio quomodo fiat.</i>	38
<i>Nuxrix qualis eligenda.</i>	498
<i>Nux muscata in stranguria utilis.</i>	409
<i>Nuctalops quid, ejusque curatio.</i>	216

O.

O bservatio singularis ex umbilicalibus ligamentis.	497
<i>Obstetricem qualem esse deceat.</i>	490
<i>Octimestris partus cur lethalis.</i>	480
<i>Oculi partes. 21. Oculorum nobilitas & affectus. 206. albugo vel cicatrix. 215. exulceratio. 213. proidentia. 218. sugillatio. 209. inflammatio. 207. unguis. 208. suffusio seu cataracta. 210. Oculos praeservantia in exanthematibus. 520. Oculorum inflammatio in infantibus. 504. 505.</i>	
<i>Odontalgia. 244. curatio. 245. Odontalgici Crollii usus. 246. in marg.</i>	
<i>Odoramenta ad excitandos lethargicos.</i>	172
<i>Odoriferum specificum Crollii ad impotentiam. 425</i>	
<i>Oesophagi affectus. 303. quo in loco ipsi remedia applicanda. ibid. inflammatio curatio. 304. tuberculi remedia. ibid.</i>	
<i>Olea usitatoria. 137. Oleum capitis dolorem sedans in lue Venerea. 155. ol. cham. ad surditatem. 223. angelic. ad epilepsiam. 177. rorismar. in paralysis lingua. 252. in marg. ol. ruta excitat soporosos. 173. trifolii tremorem abigit. 190. nigell. olfactum lationem emendat. 234. ol. hepatis gales fluxuabilis ad sugillationem oculorum. 210. ol. vitr. usus ad dentes dealbandos. 247. in dolore dentium. 246. in lethargo. 173. in ozana. 231. in polypo. 232. ol. cort. aurant. in dolore colico. 341. ol. de palma ad ani procidentiam. 352. ol. Saturni ad rhagodes.</i>	

<i>346. ol. vitriol. Mart. & Veneris ad ventriculi debilitatem. 309. ol. camph. in dolore dorsi. 538. in nephritide. 385. ol. Castor. still. in uteri suffocatione. 445. ol. cera in scirrhus hepatis. 366. cera & ovorum in dolore ischiadico. 537. cymini in tympanitide. 374. ol. de palm. ad excoriationem puerorum. 518. ol. salis marini contra casum. 567. ol. Saturni in vesica inflammatione. 402. ol. succini in uteri suffocatione. 445. tartar. ol. in virga ulcere.</i>	
<i>Olera esculenta.</i>	42
<i>Olfactus laeso. 233. quibus curanda.</i>	234
<i>Ophiasis quid.</i>	196
<i>Ophthalmia, ejusque curatio.</i>	207
<i>Opium quid. 570. opii seu laudani opii usus in cardialgia.</i>	ibid.
<i>Oris partes. 236. morbi & affectus. 237. factor. 237. contorsio.</i>	238
<i>Orthopnea quid. 271. ejus curatio.</i>	ibid.
<i>Ossium numerus.</i>	19
<i>Otalgia.</i>	220
<i>Ova. 44. Ova frixa in salubria.</i>	ibid.
<i>Ozana. 230. ejus remedia.</i>	230. 231

P.

P alpitatio cordis quibus familiaris. 286. ut curanda.	ibid.
<i>Panchymagogen Crollii.</i>	334
<i>Pancreas.</i>	27
<i>Pania genera.</i>	42
<i>Papillarum scissura. 300. ut curanda.</i>	ibid.
<i>Paracelsi opinio de fundamento curationis.</i>	120
<i>Paracentesis quando in hydropicis adhibenda. 373 tympaniticis magis convenit. 374. in gravidis quoque utilis.</i>	453
<i>Paralysis quid. 183. paralysis particularis. 186. ejus remedia. ibid. Paralysis infantium.</i>	503
<i>Pargareon. v. Gurgulio.</i>	
<i>Paria nervorum.</i>	81
<i>Paronychia quid.</i>	563
<i>Parotides, ejusque curatio.</i>	229
<i>Partium totius humani corporis descriptio. a fol. 14. ad fol. 30. Pars corporis quid & quatuorplex. 15. Partium temperamenta. 7. Part. differentia. 15. Partes abdominis. 26. Pars affecta indicat evacuandi modum.</i>	127
<i>Partus tempestivi causa. 489. Partus difficilis remedia.</i>	490
<i>Parturientem quid deceat.</i>	491
<i>Pastilli sublinguales ad sitim.</i>	330

Pavo-

I N D E X.

<i>Parviores infantium.</i>	502
<i>Pectoralia remedia.</i>	128
<i>Pediculatio quid.</i>	201
<i>Pedum intumescencia in gravidis.</i>	485
<i>Pedum manuumque cognatio.</i>	533
<i>Peripneumonia quid. 272. quibus curanda.</i>	273
<i>Perturbationes ut moderanda.</i>	63
<i>Pessi. 137. Pessus uterum dilatans.</i>	459
<i>Phacus.</i>	559
<i>Pedum ut minus noceant quid agendum.</i>	295
<i>Phlegmagoga. 169. 173. 185. 188. 212. 252</i>	
<i>Phlyctena.</i>	216
<i>Phrenitis quid & quotuplex. 159. ejus curatio. ibid.</i>	
<i>Phthisis quid. 283. ex quibus dignoscatur. 284. Ve-</i>	
<i>raphthisis incurabilis. 284. cura palliativa. ibid.</i>	
<i>quibus vita phthisicis possit prolongari. ibid.</i>	
<i>Phthiriasis seu pediculatio.</i>	201
<i>Pica ventriculi quid & unde excitetur. 320. ejus</i>	
<i>curatio. 321. Pica gravidarum quid, ejusque re-</i>	
<i>media.</i>	485
<i>Pillule uscata. 135. Pil. oculares. 207. 208. 211. bis.</i>	
<i>217. contra paralyfin. 185. stomachales. 233. me-</i>	
<i>lanagoga. 164. Pil. quo tempore assumenda. 195.</i>	
<i>196. Pil. ex ammon. & mast. in scirrho hepatis.</i>	
<i>365. Cachectici utiles. 369. tartarea Quercetan.</i>	
<i>in uteri scirrho. 458. ad scapula dolorem singula-</i>	
<i>res.</i>	536
<i>Piscium differentia.</i>	46
<i>Pituitam evacuantia.</i>	124
<i>Plenitudo seu Plethora.</i>	53
<i>Pleuritis quid. 274. ejus differentia. idid. Remedia</i>	
<i>varia.</i>	275
<i>Πνυκτοχλη.</i>	524
<i>Podagra.</i>	533
<i>Polypus qualis affectus. 231. ejus remedia.</i>	232
<i>Pondera medicamentorum.</i>	121
<i>Porrigo quid.</i>	199
<i>Potentia anima.</i>	32
<i>Potio ad digerendam melancholiam. 150. in scorbu-</i>	
<i>to. 242. pituitam in lethargo. 173. vulneraria. 202.</i>	
<i>346. melanagoga. 163. 346. sitim sedans. 330. Potio</i>	
<i>retentricem renum facultatem roborans. 400. si-</i>	
<i>stiens fluorem sanguinis ex utero. 465. ad scabiem.</i>	
<i>542. contra herniam.</i>	525
<i>Potus genera. 47. Potus grvida.</i>	482
<i>Præcipitationis symptomata & remedia.</i>	566
<i>Priapismus.</i>	421
<i>Pruritus gingivarum sedantia.</i>	506
<i>Prurigo oculorum in infantibus.</i>	504

<i>Psilothra, capillos adferentia.</i>	198
<i>Pterygium quid.</i>	208
<i>Puerpura ut tractanda. 496. earum symptomata.</i>	
<i>489. febres ut curanda.</i>	496
<i>Pulmonum morbi.</i>	266
<i>Pulsus natura & usus. 78. differentia. 79. quomo-</i>	
<i>do explorandus. 79. Puls. causa. 80. Pulsuum im-</i>	
<i>mutantes cause. 83. Puls. significationes.</i>	85
<i>Pulvis antiscorbuticus probatissimus. 243. antepi-</i>	
<i>lepticus expertiss. 178. dentes mobiles stabiliens.</i>	
<i>248. ad dentes erosos & putridos. 249. adstricti-</i>	
<i>vus in uvula. 261. ad albugines oculorum. 215. un-</i>	
<i>guem oculorum absument. 209. visum corrobora-</i>	
<i>rans. 208. 211. masticatorius ad aurium timi-</i>	
<i>tum. 223. 224. in catarrho. 195. in epilepsia. 180.</i>	
<i>in vertigine. 176. ad meninges consolidandos. 205.</i>	
<i>catharticus. 264. pro memoria. 170. sanguinem</i>	
<i>sistens in vulneribus. 156. 202. rubeus ad vulnera.</i>	
<i>202. stomachalis orificium ventriculi claudens.</i>	
<i>153. Pulv. adstrictivus ad diarrhaam. 335. ad dy-</i>	
<i>senteriam. 337. lienteriam. 331. 332. hamorrhoi-</i>	
<i>des. 350. Pulv. contra singultum. 328. contra car-</i>	
<i>dialgiam. 306. contra lumbricos. 344. Pulv. pro</i>	
<i>fumo ad catarrhum. 269. pro phthisicis. 285. pro</i>	
<i>exiccando ventriculo. 310. ad dolorem iliacum</i>	
<i>expertus. 340. Pulv. ad cardialgiam puerorum.</i>	
<i>510. Pulv. cicadarum in anasarca. 374. contra</i>	
<i>casum. 567. diureticus in nephritide. 385. 386. in</i>	
<i>renum calculo. 391. dysentericus Crollii in nimio</i>	
<i>fluxu menstruo. 465. ad epilepsiam puerorum. 504.</i>	
<i>expulsiuus ad variolas. 519. fœtum mortuum ex-</i>	
<i>pellens. 494. ad fluxum hepaticum. 375. ad gonor-</i>	
<i>rhaam. 433. ad hepatis abscessum. 363. ad hepatis</i>	
<i>corruptionem. 361. ad hepatis obstructionem cali-</i>	
<i>dam. ibid. ad hydropem. 372. Pulv. mensium tem-</i>	
<i>pore assumendus. 476. molam expellens. 484. ad</i>	
<i>partum facilitandum. 491. restrictivus in hamor-</i>	
<i>rhagia partus. 495. sanguinem sistens. 422. secun-</i>	
<i>dinam propellens. 493. ad singultum infantium.</i>	
<i>511. ad sphincteris resolutionem. 413. ad ulcus ve-</i>	
<i>sica. 420. ad uteri exulcerationem. 454. ad ven-</i>	
<i>tris inflationem.</i>	496
<i>Purgatio ut institienda. 9. Purgantium quantitas</i>	
<i>à quibus determinetur. 127. Purgantia exanthema-</i>	
<i>tibus noxia.</i>	518
<i>Puris in utero collectio unde percipiat.</i>	458
<i>Pustula oculorum & earum curatio. 215. Pustula</i>	
<i>& verruca in virga.</i>	419

I N D E X.

Q Valis sanguis tales sunt spiritus in corpore. 216.
 Qualis sanguis in hepate, talis color in corpore.
 364
 Quanam famina uteri suffocationi obnoxia. 444
 Quantitas urina quid indicet. 95
 Quarum partium ratio habenda in tussi frigida. 269
 Quietis utilitates & incommoda. 53
 Quiscula pinguedo ad impotentiam. 426

R.

R Adices esculenta. 41. Radices in officinis usita-
 ta. 132
 Ramex, seu hernia. 523
 Ranula sub lingua quid. 255. earū remedia. 255
 Raucedo quid & quomodo curanda. 267
 Regionum varietas temperamenta immutat. 9
 Regula curationis notabiles. 138. Regula generalis
 diata salubris. 309. Regula generales in renum
 curatione. 385
 Remedia in dolore capitis cum discrimine adhiben-
 da. 142
 Renum affectus varii. 384. abscessus. 391. calculus.
 388. inflammatio. 387. obstructio. 386. ulcus. 394
 Repositio infantis necessaria ad strabismum. 504
 Res naturales. 3. Res non naturales. 36. Res contra
 naturam. 64
 Respirationis difficultas, ejusque curatio. 270
 Rhagades seu scissura quibus partibus accidunt. 239.
 in manibus & pedibus ut curentur. ibid.
 Rigidorum membrorum in scorbutico remedia. 243
 Rima labiorum in infantibus. 507
 Rotula. 134. Rot. ad tussim frigidam. 269
 Ruga cutis ut emendanda. 561
 Ruptura peritonai. 523

S.

S Accharum Saturni ad ophthalmiam. 207. in
 marg. Sacch. Satur. in ardore capitis infan-
 tium. 500. in exanthematibus. 520
 Sæculi. 138. Saccul. in cephalaa applicandus. 158.
 pro hypochondriaci. 165. pro lethargicis. 172. pro
 maniacis. 166. pro memoria. 170. ad cardial-
 giam Foresti. 306. ad dolores colicos. 341. stom-
 achalis. 312. pro ventre in lienteria. 332. Saccul.
 fluxum sanguinis cohibens. 495. ex milio testeo ad
 fluxionem aurium. 505
 Salubritas matris & fœtus quibus conservanda. 481
 Sal corallorum ad hamorrhoides sistendas. 350. in
 fluxu hepatico. 375. Sal margaritar. in paralyfi.
 252. in marg. Sal margarit. & Crystallor. lac ge-

nerat. 293. Sal parietaria in lienis obstructione. 381.
 Sal Saturni in ventriculi inflammatione. 313. Sal
 succini in ischuria. 411. Sal. vitriol. in cardial-
 gia. 306
 Sanguinis sputum. 277
 Sanguis è vena educus quid significet. 110. sanguinē
 purificantis. 123. sanguinem incrassantis & sisten-
 tia. 229. sanguinem concretum dissolventia. 280.
 sanguinem cum urina profluentem sistentia. 398.
 Sanguinis post partus immoderatus fluxus. 494
 Σαρκωχλη. 514
 Σάκχαρον. 231
 Satyriasis. 423
 Scabies. 541. in capite infantum. 501
 Scabrities unguum. 565
 Scarificatio. 58. Scarificatio pedum in hydropē. 373
 Scissuras sanans vapor. 346. Scissura manuum &
 pedum in lue Venerea. 554
 Scorbutus quid. 241. 385. ubi potissimum grassetur.
 241. ejus causa, symptomata, signa & remedia.
 242. compendiosa curatio. 243
 Secundina quid. 492. eam propellentia. ibid.
 Sedimentum urina quid. 105
 Semina usitata. 191
 Semen quid. 428. ejus corrupti symptomata. 429
 Senum memoria debilis. 168
 Serpigo. 545
 Sexus diversi causa. 480
 Signorum natura & differentia. 77. Signa astrolo-
 gica. 113. Sig. ex urina. 86. ex alvi excrementis.
 108. ex sanguine. 110. ex sudore. 113. Signa sa-
 lutis & moris. 118. Sig. diversarum causarum
 doloris capitis. 142. Sig. conceptionis. 480. Sig.
 concepti sexus. 485
 Similia quomodo similibus curentur. 120
 Similares partes. 17
 Simplicia usitata in officinis. 131
 Sinapismus ad lethargum. 173
 Singultus quid. 327. quando lethalis. ibid. quibus
 sedandus. ibid. singultus infantum. 510
 Sitis immoderata unde. 328. ut restinguenda. 329.
 in hydropē. 374. in febris. 329. in quovis af-
 fectu. ibid.
 Somnia terrifica infantum. 502
 Somnus & vigilia. 49. Somnus ut moderandus. 50.
 Somnum conciliantia. 161
 Soporosa affectiones. 171
 Spasmi cynici causa. 238. curatio. 189. 238. spasm.
 particularis remedia. 189

Species

INDEX.

<i>Species in officinis usitata.</i>	134
<i>Specificum pulmonum asthmaticis utile.</i>	272
<i>Sphincter vesicae ut resolvatur.</i>	402
<i>Spiritus quid & quotuplex.</i> 30. <i>Spiritus naturalis an detur.</i>	31
<i>Spiritus formicarum ad surditatem.</i>	223
<i>Spiritus vitrioli.</i> 177. <i>Sp. vitr. ad viscerum obstructiones.</i> 381. <i>ad semen corruptum.</i> 430. <i>contra lumbricos.</i> 514. <i>Spir. salis in ischuria.</i> 411. <i>ejus usus in iliaca passione.</i> 340. <i>ad lumbricos.</i> 344. <i>Spir. tart. in hydrope.</i> 372. <i>Spir. aethereus in semine.</i>	479
<i>Splenitica remedia.</i> 129. <i>Splenitici qui.</i>	376
<i>Sterilitas quid.</i> 438. 474. <i>ejus remedia.</i>	475
<i>Sternutatio.</i> 235. <i>quando salubris vel insalubris.</i> 236. <i>ut compescenda.</i> ib. <i>Sternutationes crebrae infantium.</i>	504
<i>Sternutamentis cur salutem precemur.</i>	236
<i>Sternutatorius pulvis.</i>	172. 178. 183
<i>Stomachica remedia.</i>	129
<i>Strabismi curatio.</i> 219. <i>Strabismus infantium.</i>	504
<i>Stranguria.</i>	408
<i>Struma seu scrophula quid.</i> 263. <i>quibus endemia.</i> ibid. <i>quomodo curanda.</i> ibid.	184
<i>Sudor quid.</i>	184
<i>Succi usitati.</i>	132
<i>Sudorifera.</i>	185
<i>Sudor quid denotet.</i> 61. <i>Sudor criticus, symptomaticus.</i> ibid. <i>Sudorem movere quando conveniat.</i> ibid. <i>Sudor frigidus unde in syncope.</i>	289
<i>Suffragium seu vapor ad aurium dolores.</i> 221. <i>ad surditatem.</i> 222. <i>ad tinnitum aurium.</i> 224. <i>ad ulcera aurium.</i> 231. <i>ad scirrhum hepatis.</i>	366
<i>Suffusio oculorum quid.</i>	210
<i>Sugillatio oculorum, ejusque curatio.</i>	209
<i>Suppositoria.</i> 61. <i>Suppositorium acre.</i> 182. 183. <i>narcoticum in dysenteria.</i> 337. <i>Suppositoria acuta.</i> 377. <i>lumbricos revellentia.</i>	514
<i>Surditas quid.</i> 221. <i>ejus causa ut discernenda.</i> ibid. <i>curatio.</i>	212
<i>Sympathia remedium cum partibus corporis.</i>	127
<i>Symptomata quotuplicia.</i> 72. <i>Symptomatum nomenclatura.</i> 73. <i>Sympt. febrium.</i> 71. <i>Sympt. quando ante morbum curandum.</i> 256. <i>Sympt. difficilis dentitionis.</i> 506. <i>luis Venerea varia.</i> 553. <i>Sympt. ex argento vivo.</i> 553. <i>magnum erysipelas comitantis.</i> 545. <i>pustularum virga Sympt.</i>	420
<i>Synanche.</i>	257
<i>Syncope quid.</i> 289. <i>quibus signis cognoscatur.</i> ibid. <i>ut curanda.</i> ibid. <i>Syncope stomachica.</i>	290
<i>Syrupi usitati.</i> 136. <i>Syr. peculiaris in tussi infant.</i>	509

T.

<i>Tabella dierum criticorum.</i> 115. <i>Tabella morborum capitis.</i> 141. <i>Tabella diversitatem formationis motus & partus foetus indicans.</i>	480
<i>Tabes. v. phthisis.</i>	
<i>Tartari vitriolati usus.</i> 163. in m. 230. in m. <i>Tart. vitriol. usus in obstructione hepatis.</i> 360. <i>lien.</i>	381
<i>Temperamentum quid.</i> 6. <i>Temperamentorum differentia.</i> ibid. <i>Temperamentorum dignotio.</i>	8
<i>Temperatum quot modis dicatur.</i>	6
<i>Tempora morborum.</i>	113
<i>Tempus partus naturalis.</i> 479. 480. <i>dentitionis ordinarium.</i>	506
<i>Tenesmus quid.</i> 337. <i>ejus remedia.</i> 338. <i>Tenesmus infantium.</i>	517
<i>Testiculi in foeminis usus.</i> 438. <i>morbi & symptomata.</i>	439
<i>Testium affectus.</i> 428. <i>tumor ex inflammatione.</i> 433. <i>Oedematosus.</i> 435. <i>scirrhosus.</i> 436. <i>aqueus.</i> 437. <i>flatulentus.</i> 438. <i>Testium confusio.</i> 439. <i>pruritus & exulceratio.</i>	440
<i>Therma artificiales pro spasmodicis.</i> 188. <i>Therma Carolina utiles in cachexia.</i> 370. <i>in arthritide.</i> 533. <i>in uteri impuritate.</i> 443. <i>in mensiu nimio profusio.</i> 466	
<i>Thoracis partes.</i> 16. 23. <i>Thorax in empyemate quando & ubi aperiendus.</i>	283
<i>Tinctura perlarum & corallorum in phthisi.</i> 285. <i>in syncope.</i> 290. <i>corallorum in appetitus lesione.</i> 319. <i>in fluxu mensium nimio.</i>	465
<i>Tinnitus aurium quid.</i>	223
<i>Tonsillarum affectus.</i> 261. <i>inflammatio ut curanda.</i> 262. <i>exulcerationis remedia.</i>	263
<i>Tophi podagrici quando curabiles.</i>	535
<i>Topica in scabie quando adhibenda.</i> 543. <i>in arthritide sapius varianda.</i>	533
<i>Tormina ventris in infantibus.</i>	512
<i>Tragaa visum clarificans.</i> 218. <i>Tragaa stomachalis.</i>	319
<i>Tragemata.</i>	136
<i>Tremor artuum.</i> 190. <i>ejus remedia.</i>	ibid.
<i>Trepani usus.</i>	204
<i>Trochisci usitati.</i> 135. <i>Trochisc. Alkakengi ad ardorem urinae.</i> 554. <i>de baccis Sambuci in diarrhaea infantium.</i> 513. <i>de minio Pignonis.</i>	420
<i>Tumoris genera quatuor.</i> 362. <i>Tumor oculorum in infantibus.</i> 504. <i>Tumor inguinum Venereus.</i> 527. <i>Tumor mutabilis quid denotet.</i>	524
<i>Turpetum minerale in hydrope.</i>	372
<i>Tussis quid.</i> 267. <i>per consensum seu symptomatica.</i> 267. <i>cruenta.</i> 277. <i>a pituita crassa.</i> 268. <i>a causa calida</i>	

I N D E X.


ut curanda. 269. Tussis infantium quid.	508	contusio. 566. defluyum.	564
Tympanitiidis remedia.	374	Vnguis oculorum quid. 208. quando curabilis.	ibid.
V.		Volucrum carnes.	45
V ari faciei.	547	Volulus quid.	339
Variola ut curanda. 518. Variola & morbilli.	540	Vomitio quando utilis. 60. Vomitionem compescens potio.	324
Vena sectio quando & quomodo usurpanda. 55. qua in vena sectione observanda. 57. Vena qua in scorbuto secanda. 242. Vena frontis in suffusione oculorum aperienda. 211. Vena sectio in pleuritide ut instituenda. 281		Vomitioria.	152. 179
Venerem stimulantia.	426. 478	Vomitum prodest epilepticis. 177. Vomitu ventriculus commodissime evacuatur. 310. vomitus unde.	323.
Ventriculi cerebri.	22	ibid. post vomitum exhibenda. 324. Vomitus cruentus unde. ibid. ejus remedia. 325. Vomitus infantium.	511
Ventriculus quid. 26. 305. quibus afficiatur morbis. 305		Vrina quid & quomodo generetur. 87. Vrina quarum affectionum praebeat indicium. 87. Vrina hominis ut differat à brutorum. 106. Vrina quomodo excipienda.	
Ventr. abscessus ut curandus. 316. cruditas. 317. inflatio. 314. inflammatio. 312. imbecillitas. 307. ex intemperie calida. 308. frigida. ibid. humida. ibid. & sicca. ibid. ex copia bilis. ib. ex pituita corrupta. ibid.		88. Vrina regiones. ibid. consistentia. 89. Vrina color quid denotet. 92. odor. 94. quantitas 95. varia contenta. 100. Vrina aurea significationes. 96. pallida. ibid. alba. 97. lactea. ibid. aquea. ibid. rubra. 98. flava, crocea. ibid. livida, nigra. 99. Viridis, oleaginea. 100. Vrina contenta quid denotent. 95. circa urina judicium qua attendenda. 105. Vrina ardor.	
Ventris inflatio.	495. 512	402. Vrina incontinentia.	412
Vermes in quibus corporis partibus generentur. 343. Vermes capillares. 557. Vermes sub unguibus. 565. Vermiculi dentium ut enecandi & eliciendi.	249	Vterina remedia.	130
Verrucarum remedia.	556	Vterus quid. 439. ejus motus varius & mirabilis. ibid. affectus & symptomata. ibid. sympathia cum partibus principalibus. 440. odore movetur. 444. Vteri impuritas. 442. Vteri angustia. 459. suffocatio. 444. calida intemperies. 442. inflammatio. 449. inflatio. 450. hydrops. 452. exulceratio. 453. Cancer. 455. Occlusio à pellicula vel caruncula. 460. Vteri proidentia. 446. Scirrhus. 457. pruritus. 461. scisura. 460. tubercula.	461
Vertigo quid. 174. ejus remedia.	ibid.	Vulnera capitis ut curanda. 156. 281. qua lethalia. ibid. eorum symptomata praecipua qua. 203. lividitatis in vulneribus seu incipientis gangrana remedia. ibid. syncope & excrecentia carnea remedia. 203.	206
Vesica. 28. Vesica morbi. 401. inflammatio. ibid. Vesica exulceratio & scabies.	404	Vvula relaxatio in infantibus.	568
Vesicatoria.	180. 186	Y.	
Via per quas fit evacuatio.	127	Υ ΓΙΕΙΝ.	2
Vigilia immoderata incommoda. 51. Vigilia puerorum.	502	ΥΓΕΟΧΗΝ.	524
Vinorum differentia. 47. Vinum catarrhosis noxium. 193. item ophthalmicis. 207. Vinum guajacinum pro colicis. 342. Vinum saccharo copioso mistum hepar obstruit. 359. Vinum scolopendria spleniticis utile. 382		ΥΠΟΨΙΣ	105
Virga affectus. 415. pustula. 419. tumor. 416. exulceratio. 417. imbecillitas.	422	Z.	
Virus pro luna motu & lumine viget.	216	Z edoaria radix lochia promovet.	495
Viriliginis curatio.	550	Zinziber.	47
Vitificatio foetus.	479		
Vlcus fistulosum in ano. 347. ejus remedia.	ibid.		
Vmbilici prominentia. 514. Vmbilicus infantium ut à ligamenti solvendus.	497		
Vnguenta usitata. 138. Vnguentum anodynum pro lue Venerea laborantibus. 155. stomachale. 153. ad pediculos. 201. prohibens capillos renasci. 199. Vnguentum astringens in hamoptoe. 281. Vnguentum ex hydrargyro. 552. ad scabiem. 544. ex sapone ad ischiadicum dolorem.	538		
Vngues quamdiu crescant. 563. eorum affectus. ibid.			

I

FRANCISCI JOELIS
OPERUM MEDICORUM
TOMUS QUINTUS.

In quo
LIBRI DUO
De
FEBRIBUS & VENENIS
In genere & in specie continentur.

PRÆLOQUIUM.

 *Vm Febres omnium morborum inter homines sint communissimi, & maxime familiares; (pauca siquidem affectiones reperiuntur, quibus Febres non sint adjunctæ, adeo etiam ut in Proverbium abierit, Vis sine Febre mori, in eos, quibus aut gladius, aut laqueus minuitur) idcirco FEBrium differentias, species & causas novissè, summo opere necessarium est Medico.*

SECTIO PRIMA.
DE FEBRIBUS in GENERE.

Febris quid, & ex quali excitetur calore.

*Febris
quid sit?*

*Calidum
in viven-
tibus est
duplex.*

Π *Υεβρε, à πυρε, hoc est ab igne, Latinis à Fervore, Febris, est calor præternaturalis primum in corde incensus, & inde per arterias in totum corpus diffusus, lædens actiones. Ex hac definitione constat FEBrium morbum esse in calida & sicca intemperie. Extant & aliæ plurimæ FEBrium descriptiones apud Gal. quæ ab hac non discrepant. In Febris Definitione calor ponitur pro Genere. Observandum autem est duplicem, seu duplicatum potius esse calorem in omnium viventium vegetabiliumque corporibus; Divinum & æthereum unum, Elementarem alterum. Divinus*

calor sive æthereus & cælestis in prima creatione ab Opifice seminibus omnium viventium est insertus, qui non sensu sed ratione & cogitatione deprehenditur, cui nulla Elementaris frigiditas est contraria, nec ab ea etiam in excellenti gradu extinguitur, nec alteratur, nec extenditur, diminuiturve nisi post *αμην*; sensim ætatis decursu usque ad extremam senectam decrescit & diminuitur. Ejus caloris beneficio omnia corpora viventia & vegetabilia ex semitibus formantur, pronascuntur, vegetantur & conservantur: ejus ope ex ovis seu seminibus serpentis generantur serpentes, animalia frigidissima; & ex semine papaveris aut cicutæ herbæ frigidissimæ. Hunc calorem Græci *ἡγεμόν ἐμφύλον* & *ἐγγενον*, id est calorem innatum, congenitum & seminalem vocant. Hic calor in humido radicali, seu primigenio est fundatus, & per universi corporis substantiam sparsus: hujus caloris beneficio postquam in animantibus cor est formatum, excitatur alius calor, qui Calor naturalis seu vitalis & influens seu Elementaris nominatur, qui ex aëre attracto & vapore sanguinis in corde generatur, & cum æthereo calore cordis immiscetur, in unamque substantiam redigitur, ac per arterias in totum corpus distribuitur; quo universum corpus & omnes ejus particulæ vivificantur, & nutriuntur.

A

Hujus

Aphor.
14.

Hujus caloris subiectum est sanguis. Hic calor in corporibus alteratur semper, & ex ejus remissione frigidi morbi, extensione vero calidi morbi generantur, qui nimium extensus & in igneum conversus dicitur Febris. *Hipoc.* calorem nativum & naturalem vocat, ubi inquit: *Qui crescunt plurimum habent innati caloris.*

Februm differentia & species, Quæ?

Et veteres & recentiores cum Græci tum Latini in enumeratione differentiarum febrilium ad fastidium usque prolixi sunt, nos quam possumus brevissime omnes februm species methodo *ὁριστικῆ καὶ διαγενικῆ* contrahemus, & ad duas tantum differentias à propriis earum subiectis & accidentiis sumtas referemus.

Quæ sint subiecta Februm?

Cum Febris sit calor præternaturalis, & calor omnis sit qualitas, & nulla qualitas sine subiecta materia consistere queat, necesse est febrem omnem in aliqua subiecta materia fundatam esse. Cum autem universa natura humana ex tribus tantum substantiis inter se differentibus constet, *Spiritibus*, humoribus & solidis partibus, consequenter omnem febrem sitam esse aut in *Spiritibus*, aut in *Humoribus*, aut in *Solidis* partium substantiis, aut in his simul omnibus.

In Spiritibus qua Februm species excitentur?

Febres in Spiritibus.

Quantum & Febris pestilens semper *SPIRITUS* primum occupet propter analogiam aeris contagiosi, tamen non prius vires suas exferit, nisi (quod citissime fit) & humores in corpore putridos afficiat, de qua paulo post plura. Proprie autem Febris accenditur in spiritibus quam Græci *ἐν ψυχῇ*, Latini Diariam vocant. Quæ, si æger in victus ratione non delinquit, sua sponte intra 24. horarum spacium evanescit, & extinguitur per perspirationem insensilem, vel per sudorem. Si vero error committatur in cibo, ac potu & aliis rebus non naturalibus, tum à spiritu inflammato & sanguis in arteriis ebullire incipit, & in

Synochon non putridam transmutatur. Quæ & ipsa intra 4. aut ad summum 7. dies extinguitur; si autem diutius duret, in Synochon putridam, de qua paulo post dicemus, degenerat.

In humoribus qua species Februm excitentur.

Maxima pars & fere febres omnes, ex *ἐφελύξει*, ex putrefactione humorum excitantur. Quæ omnes humorales & putridæ generali vocabulo nominantur. Putrescunt autem humores aut in ipsis venis contenti, & generant febres continuas dictas, aut putrescunt extra venas profusi, & producant febres intermittentes, sive interpolatas. Sunt itaque continuæ & intermittentes febres omnes, species putridarum februm. Continuæ febres dicuntur, quæ unicam habent accessionem seu paroxysmum, & quæ, etiam si pro humorum putridorum natura aut quotidie aut tertio aut quarto die exacerbentur, durant tamen usque ad terminum sive finem, & nec frigus nec rigor earum exacerbationes præcedit. Continuarum februm quædam in eodem vigore durant usque ad finem, & Græci *ὁμοιοι*, id est, ejusdem tenoris nominantur. Aut statim ab initio magis magisque augentur, quæ *ἐπικρυσσιν*, id est, incrementales nominantur, aut statim ab initio sensim decrescunt, & *ὀδυνωσιν*, id est, decrescentes appellantur. Intermittentes seu interpolatæ febres dicuntur, quarum paroxysmus cum horrore, aut perfrigeratione, aut rigore incipit; & post certas horas remittit, & vel quotidie, vel 3. vel 4. die rursum revertitur. Cum autem 4. sint in humano corpore humorum species cum suis excrementis, ex eorum specie, 4. præcipua genera putridarum februm excitantur, ad quas reliquas species putridarum februm referri possunt, veluti sunt Synochus in sanguine putrido, Quotidiana in pituita putrida, Tertianæ in bile putrida, & Quartana in humore melancholico putrescente.

Ex

Ex sanguine putrescente qua species febrium excitentur.

Febres sanguinea. Cum sanguis reliquis humoribus inseparabiliter sit admixtus, solus sanguis nunquam putrescit, sed aut tota massa sanguinea putrescit, & synochon putridam, quæ improprie febris continens nominatur, producit, aut putrescit tantum *ἡσος*, id est, serosior pars massæ sanguineæ, quæ naturam habet flavæ bilis, & Tertianam febrim profert; aut putrescit feculentior pars massæ sanguineæ, quæ naturam melancholici humoris obtinet, & Quartanæ speciem excitat, & hæc quidem febres sanguineæ nominantur, & ut plurimum in corporibus Plethoricis contingunt: atque si hæc sanguineæ massæ partes in Venis putrescant, continuas; si extra venas, interpolatas febres generant.

Ex pituita putrescente qua generentur febres.

Febres pituitosa. Si Pituita in ipsa massa sanguinea intra venas putrescat, quotidianam continuam, si extra venas, quotidianam Intermittentem excitat. Quotidianæ febres Græcis *αἰμοφρεσίνος*, & Latinis pituitosæ nominantur. Ad pituitosarum febrium genera referri debet & febris *ἐπιπλὺς* Græcis, Latinis Epiala, & quæ *πυώδης*, id est, madida nominatur.

Epiala. Est autem *ἐπιπλὺς* febris, quæ ex pituita vitrea seu albuginea generatur cum bile aliqua putrida perfusa, qua laborantes eodem tempore simul & ardent & rigent vehementer per universum corpus.

Typhodes. *Τυφώδης* autem seu madida febris est ubi *ἡσος* seu serum pituitæ, quod sudoris est materia, vel extra venas putrescit & ad cutim propellitur, eaque laborantes, continuo sudore madent.

Verum cum sudor aliis quoque plurimis febribus sit commune symptoma, nos eam inter symptomata collocabimus. Crebro etiam pituita putrida commiscetur cum bile putrida, ex qua mixtione febres generantur complicatæ, de quibus sequenti quæstione dicam.

Ex bile flavâ putrescente qua excitentur Febres.

Ex sola bile intra venas putrescente producit tertiana continua, quæ Græcis *Βίλιος*. *Καὶρὸς*, id est, ardens febris nominatur. *Causus.*

Ex eadem etiam extra venas putrescente excitatur tertiana pura, sive exquisita intermittens. Si huic putridæ bili aliqua portio pituitæ putridæ sit admixta, tertianam spuriam seu notham generat.

Si vero ea mixtura constet ex ærugino- *Hamitri-* sâ præternaturalis bilis & pituitæ, *ἡμικραι- ταιὸς*, id est, semitertiana excitatur, quæ naturam habet & Quotidianæ & Tertianæ: in qua si processu temporis pituita putrescens asserit, Duplicem Tertianam profert, & hæc species febrium biliosæ nominantur.

Ex Melancholico humore putrescente qua Febres generentur.

Ex putrescente humore melancholico *Febres* aut feculentiori parte sanguinis intra venas, *Melan-* profertur Quartana febris continua: quæ *cholica.* si extra venas putrescat, Quartana interpolata: cujus paroxysmi quarto quolibet die recurrunt, & per duos dies inducias agunt.

Inter putridas febres recenset *Hipp.* & *Quinta-* Quintanam, Sextanam, Septimanam, & *na, Sex-* Nonam. Sed quia hæc febres in hisce borea- *tana Fe-* libus oris, aut nunquam, aut rarissime *bres Me-* conspectæ sint, nos eas in Græciam ad suos *dicos Bo-* autores relegabimus. *reales non* *exercent.*

In solidis partium substantiis qua Febres accendantur.

Tertium subjectum febrium diximus esse solidas corporis partes, in quibus febres excitatæ, difficilimæ sunt curationis. Vastant enim & absumunt in solidis partibus humidum radicale una cum carnosus partibus, & extremam maciem corpori inferunt. *Febres solidarum partium quæ Curationis difficilioris.* *Mara-* Hæc febres in solidis partibus Hæcticæ & *smus.* Marasmi nominantur, nostratibus *die Dürre / die Schwind sucht.*

Hæctica Febris dicitur habitualis, quod nimirum in habitum convertatur adeo, ut laborantes ea, se non sentiant febrile, nec

ex pulsu arteriarum, aut urina deprehendi potest eos Febri laborare, sed ex sola macilentia, & quod post sumptum cibum calor increfcit, & ad genas effunditur easque rubore tingit. Similis enim est

Simile ex C.V. Hectica febris calci vivæ, quæ ad tactum frigida esse deprehenditur, ubi autem humore perfunditur, igneum vaporem exhalat: Ita in Hectica febre post assumptum cibum igneus vapor excitatur. Duplex autem est

Hectica, Totalis, Particularis.

Hectica, totalis & particularis. Totalis est quæ universam corporis substantiam occupavit: Particularis vero, quæ ex corruptione alicujus visceris, epatis vel pulmonis excitatur, & in totum corpus diffunditur.

Qua Febris simul hæc tria subjecta, spiritus, humores, & solidas partes, id est totam naturam devastet.

Febris Pestilens.

Febris pestilens primum in spiritibus ab aëre pestilenti & venenato per respirationem hausto excitatur, moxque & humores putrefacit, & paulo post humidum primigenium in solidis partibus corrumpit, & brevi temporis spacio totam naturam extinguit. Sementem enim pestiferum à Deo per aerem sparsum non tantum sua putredine, quæ maxima est, sed tota sua substantia naturæ humanæ adversatur, & citissime ac validissime per omnia penetrat: & cum natura huic contagioni reluctetur, plerumque venenum ad adenosas & imbecilliores partes ut collum, axillas & inguina propellit, ibidemque bubones & anthracas excitat.

Qua Februm differentia sumantur ab Accidentibus.

Febres alia per se Morbi.

Ex accidenti, Februm alia sunt Morbi, alia Symptomata.

Morbi sunt omnia februm genera, quæ ex causis morbificis, & non ab antecedentibus morbis sunt generatæ, ut sunt putridæ fere omnes.

Alia Symptomata.

Symptomata sunt, quæ ex aliis antecedentibus morbis sunt excitatæ, tales sunt febres in Phrenitide, Angina, in Peripneumonia, Pleuritide, Phthisi & ex bubonibus excitatæ.

Porro febres symptomaticæ rursus duplices sunt: Aliæ enim ad putridas, alia ad *Febres symptomaticæ.* Hecticam referri possunt. Ad putridas referuntur quæ ex putrescente aliqua colluvie in cavitatibus viscerum ut ventriculi, uteri, in intestinis & in meatu venæ cavæ aut lienis excitantur, ut cum in ventriculo corruptus cibus in prassinam bilem convertitur, generatur febris tertiana aut *Kaisos*. Aut ubi in utero sanguis retentus putrescit, excitat febrim; aut ubi in radice venæ cavæ putrescit sanguinea massa, excitat febrim. Aut ubi in intestinis ex putrida colluvie lumbrici generantur, & ex eorum commotione lenta febris produciuntur. Ex hisce enim cavitatibus à putredine tetri vapores exhalant ad cor, ibidemque accenduntur & febrim producunt. Ad Hecticæ particularis speciem referuntur febres, quæ ex nuda inflammatione viscerum videlicet, pulmonis, epatis, ventriculi aut uteri excitantur; & hujusmodi febres Græcis *λεπτοειαι* nominantur, in quibus interiora ardent, exteriora vero frigent.

Ad particularem quoque Hecticam referuntur febres, quæ ex corruptione substantiæ viscerum, aut aposthematibus aut vulneribus excitantur; ut in pulmone Phthisis, & in Epate continua Hectica.

Quæ vero Græcis Febres *Καὶὸσι καὶ αὐτὴν* vocantur, id est, ardentes malignæ, præter has accidentarias differentias februm, quædam dividuntur in Typicas, quædam in Erraticas. Typicæ Febres sunt, quæ accessionum & remissionum suarum statum & ordinatum tempus servant. Id autem contingit ex æqualitate putredinis. Erraticæ sunt quæ nec paroxysmi, (id est, Erraticæ. *Causa erraticarum.* accessionis exacerbationis) nec remissionis suæ ordinarium tempus retinent, cujus rei causa est inæqualitas putredinis, ubi videlicet humor febrile subjectus partim putridus, partim putredinis expers est. Rursus februm putridarum alia sunt simplices & puræ, alia complicatæ seu compositæ.

Simplices & puræ, quæ ex unico & simplici humore putrescente producuntur, ut *Febres Simples.* sunt.

sunt Tertianæ exquisita, Quotidiana & Quartana simplices & Typicæ, hoc est, suum ordinem servantes.

Composita. Complicatæ febres sunt quæ ex mixtura duorum aut trium putridorum humorum procreantur, quales sunt Febris semiter-tiana, Tertianæ duplicata, Tertianæ spuria; pro diversitate enim commistionis, & pro extensione & remissione putredinis humorum, variæ & erraticæ ut plurimum generantur febrium species. Quas singulas ad sua genera & principales febres naturamque prædominantis humoris putridi in curatione referemus. Hippocrati familiaris est divisio febrium à caloris constitutione sumpta. Quæ febrium alias mites, alias acres, quasdam aridas, quasdam madidas, alias fumosas, alias vaporosas ponit. Ex enumeratis febrium speciebus nos subsequen-tium tantum cum suis symptomatibus curationem tradituri sumus, ad quas reli-quas omnes tanquam soboles ad suos pa-rentes reducemus. Sunt autem primariæ febrium species Diaria, synochos putrida, Quotidiana, Ardens, Tertianæ, Semiter-tiana, Quartana Hæctica, Lipytia & Pestilens.

Quæ communia symptomata febrium sint comites.

*Febrim
Sympto-
mata
commu-
nia.*

Omnes in universum febres gravia comitantur accidentia, quibusdam plura, in aliis pauciora. Quorum præcipua hæc sunt, Rigor, capitis dolor, vigiliæ, somnus profundus, sitis intolerabilis, ariditas & scabrities linguæ, difficilis respiratio, tussis, crebra vomitio, appetentiæ prostratio, virium imbecillitas, animi deliquium.

Antequam ad Febrium methodicam curationem accedamus, paucorum quarundam difficiliorum questionum ad curationem Febrium plurimum conducentium, explicationem breviter proponemus, iisdemque præcipuis Aphorismos Hippocratis ad prognosticon eventuum febrilium facientes subjungemus.

Quæ sint causæ quod Paroxysmi febrium ut plurimum ab horrore, partium refrigeratione, rigore, oscitatione & pandiculatione incipiant.

Priusquam causas horum accidentium febrilium proponam, brevissime vocabula hujus questionis, quæ in tractatione Febrium usitatissima sunt, explicabo.

PAROXYSMUS significat febrium ^{Paroxysmus, quid?} accessiones, seu invasiones. Horror, frigus & rigor inter se extensione & remissione tantum differunt, & sunt commotiones corporis ab expultrice facultate excitatæ.

Et HORROR quidem, qui Barbaris HORRIPILATIO quoque vocatur, est levis & cutanea tantum concussio, cum sensu alicujus refrigerationis.

FRIGUS seu perfrigeratio febris est, ubi in initio febris per totum corpus ac maxime in extremis partibus frigiditas sine concussione percipitur. RIGOR in febribus est totius corporis, ac præcipue maxillarum ac dentium concussio cum vehementi perfrigeratione totius corporis. Rigor quanto major, præsertim circa statum Universalis morbi seu febris, tanto plerumque faciliora sunt præagia: Natura enim tunc luctatur & discutit humores.

OSCITATIO est musculorum oris & faciei distensio, crassos halitus & vapores musculos gravantes discutere conantium.

PANDICULATIO idem est in Musculis Thoracis & totius superioris partis corporis, quod est oscitatio in Musculis oris, distensio videlicet ab expultrice potentia in Musculis gravatis excitata.

CAUSÆ porro horum motuum sunt vapores, fumi & flatulenti halitus à febrili calore ad subcutaneas partes propulsi. Quemadmodum enim in furnis seu fornacibus incensis flammam perpetuo præcedit fumus: Ita incensis in corde vaporibus & halitibus, antequam febrilis calor ad externas partes se diffundat, vapor, fumus & flatulenti halitus ab eodem calore & flamma ad superficiem corporis propelluntur, qui per sensibiles partes, veluti sunt fibræ & mem-
branæ

branz musculos involventes, & potissimum carnosâ seu subcutanea dicta, membrana, in quibus vapores impulsî refrigerantur ac nonnihil condensantur, ibidemque aliquamdiu hærent, donec flamma febrilis subsequens eos dissolvat & discutiat, per porosque cutis insensibiliter vel sensibiliter propellat. Hi itaque in membranishærentes ratione suâ densitatis partim, partim tenuitatis ac putrescentiæ & acrimoniæ, horrorem, frigus & rigorem excitant. Halitus autem crassos musculos obsidentes per ofcitationem & pandiculationem ante febris invasionem discutere & expellere natura conatur. *Gal. l. 2. de differ. febr. disputat contra Platonem & alios quosdam Philosophos, & negat hæc febrium accidentia frigidas esse affectiones, & alias horum motuum causas reddit; sed nobis hæc rationi & veritati magis consona videntur.*

Qua sint causa quod Paroxysmi Febrium intermittentium alii quotidie, alii tertio, alii quarto die recurrant.

Circuituum Febrilium causa.

Et si plurimum cum Græci tum Latini conati sint varietates temporum Paroxysmorum febrilium reddere, uti & nos Tomo primo nostrorum Operum indigitavimus, tamen eorum omnium rationes redargui possunt, & imperfectæ esse videntur; & ut Montanus recte ait: *Non potest alia causa veritati magis consona assignari, quam quod talis sit Natura, & latens proprietas putrescentium in corpore humorum, ut nimirum pituita putrescens quotidie, bilis flava tertio, melancholicus humor quarto die commoveatur, & paroxysmum excitet.* Nam quod de motus humorum facilitate & difficultate comminiscuntur, veritati non sunt consentanea, cum biliosus humor facilius quam reliqui commoveatur, & tamen non quotidie, sed tertio die suum concitet paroxysmum.

Qua sint causa, quod Febrium intermittentium paroxysmi quandoque statim horam anticipent, quandoque tardent & retrocedant?

Paroxysmum febrilem anticipare dici-

mus, quoniam citius, quam antea ægrotum invadit, ut dum antea 12. hora invaserat, altera vice vel 11. vel 10. vel 9. adoritur. Contra retrocedere dicimus, cum tardius quam antea ægrotantem adoritur, ut cum antea accedebat hora 12. nunc hora 1. 2. 3. aut 4. recurrit.

Duæ autem sunt harum mutationum *Qua causa* causa, quarum *causa* est humoris putridi inæqualis putrescentia, ejusdemque cruditas & concoctio, crassities & tenuitas. Inæqualiter enim putrefactis & crudis existentibus humoribus, febres semper anticipant, & incrementum ac longitudinem febris significant: contra æqualiter putrefacti humores, aut extenuati & concocti, si ve natura, si ve remediis retardant paroxysmum, & declinationis ac brevitas febrium sunt signa.

Neque hæc præcipue seu externa causa sunt error ac negligentia, vel sedula intemperantia in victus ratione: manifestum enim est, quod febre laborantes si cupiditati suæ obtemperant, & in Tertiana vinum forte largius bibant, aut in Quartana & Quotidiana aquam, Paroxysmum anticipare ac febrim in longius tempus protrahere; & vice versa, qui optima & convenienti diæta in febribus utantur, paroxysmos & tardius recurrere, & febres diminui mitioresque reddi.

Qua partes principales in putridis febribus singulis præcipue afficiantur.

In omnibus febribus, omnes quidem partes principales afficiuntur: cor quidem ex putridis vaporibus in se accensis; cerebrum ex eorundem vaporum exhalationibus; epar & lien & ventriculus ex æstuantibus putridisque humoribus in eis collectis; sed in specie omnium maxime afficitur ventriculus in Quotidianis & pituitosis febribus. Epar in Tertiana & biliosis febribus: Lien, in Quartana & melancholicis febribus, pulmo & cor in Hecticis.

Qui Hippocratis Aphorismi potissimum circa febres sint observandi.

Hi nimirum ex quibus de eventibus febrium

brium præſagia ſumi poſſunt, ut ſunt hi ſequentes.

1. Quibus in febris quotidie rigores fluunt, quotidie febres ſolvuntur. 4. Aph. 63.

2. Si Rigor incīdat, febre non deficiente agro jam debili, lethale eſt. 4. Aph. 46.

3. Febres quacunque non intermittentes tertio die fortiores ſunt, magis ſunt periculofa. Quacunque autem intermittunt, periculum abeſſe ſignificant. 4. Aph. 43.

4. In febris intermittētibz ſi partes exteriores frigida, interiores vero urantur & ſui premantur, lethale eſt. 4. Aph. 48.

5. In febre non intermittente, ſi labrum vel oculus, vel naſus vel ſupercilium contorqueantur, vel non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quicquid horum evenierit, mors proxima eſt. 4. Aph. 49.

6. Vbi in febre non intermittente difficultas ſpirandi & delirium acciderit, lethale eſt. 4. Aph. 50.

7. Quicunque in febris vel in morbis aliis ſponte illacrymant, nihil abſurdum, qui vero non ſponte, abſurdum. 4. Aph. 52.

8. Quibus in Cauſone ſicca tuſſes leniter irritantes ſunt, ii non multum ſiti inſeſtantur. 4. Aph. 54.

9. Ex bubonibz febres omnes mala, præter Ephemeraz. 4. Aph. 55.

10. Febricitanti ſudor ſuperueniens febre non deficiente malum, prorogatur enim morbus & multam ſignificat humiditatem. 4. Aph. 56.

11. A febre ardenti habito, ſuperueniente rigore, fit ſolutio. 4. Aph. 58.

12. Tertianæ exquiſita ſeptenis circuitibus, quod longiſſimum eſt iudicatur. 4. Aph. 59.

13. Quibus in febris aures obſurduerunt, ſanguis ex naribus fluens aut alvus turbata, ſolvit morbum. 4. Aph. 60.

14. Quibus in febris morbus regius ante diem ſeptimum accidit, malum. 4. Aph. 62.

Quibus vero ſeptimo, nono vel undecimo vel 14. ſupervenierit, bonum. 4. Aph. 64. Niſi dextrum Hypochondrion obduruerit. Scirrurum enim ſignificat, Epatis aut obſturbationem, aut magnam inflammationem, quæ periculofa eſt.

15. In febris circa ventriculum fortis æſtus, & in ejus oriſicio morſus ac dolor, malum. 4. Aph. 65.

16. In febris ex ſomnis timores & convulſiones, malum. 4. Aph. 67.

Omnis ſomnus ladens agrotum, mortalis eſt, luvans vero, ſalutaris. 2. Aph. 1.

Et à ſomno delirium, ſemper peſſimum eſt ſignum. 2. Aph. 2.

17. Quibus febricitantibus, urina ſunt turbata, quales ſunt jumentorum, iis dolor capitis vel adeſt vel aderit. 4. Aph. 70.

Quia ſpiritus flatulenti una cum calore occuparunt cerebrum, perturbata urina quæ cito reſident in hypochreſin craſſam, morbum ſolvi ſignificant: Quæ vero non reſidet, ſed turbata permanet, longitudinem morbi oſtendit, & ſi vires ſunt imbecilles, mortem.

18. Sudores febricitanti ſi inceperint, boni die tertio, 5. 7. 9. 11. 17. 20. 27. 34. Hi enim iudicant morbos; Qui vero non ita ſunt, laborem & morbi longitudinem & recidivam ſignificant; 4. Aph. 36.

19. Frigidi ſudores cum acuta febre, mortem, cum mitiori, longitudinem morbi ſignificant. 4. Aph. 37.

Quæ parte corporis ſudor eſt, ibi ſignificat morbum, 4. Aph. 38.

20. In febris acceſſionibus abſtinere oportet. Nam cibum dare noxium eſt. Iis itaque qui per circuitus acceſſiones habent, in ipſa acceſſione abſtinere oportet. 1. Aph. 11.

Viſtus humidus febricitantibus omnibus confert. 1. Aph. 16.

Febricum curatio quomodo fit inſtituenda.

Ut omnium morborum, ita & febricum Methodus curatio methodo & certa ratione eſt inſtituenda, via procedendi ſumpta ab indicationibus.

Eſt autem indicatio rationis dictamen & demonſtratio, quid in morbo ordine primo, ſecundo, vel tertio loco, & ita per conſequens ſit agendum, exhibendum, aut applicandum pro natura morbi ejusque conſtitutione.

Dictat autem ratio, in morborum curationibus ægroto primum imperare viſtus ratio-

rationem morbo contrariam; secundo materiam vitiosam concoquendam, & vacuandam esse, & partes laborantes corroborandas, ac in univrsam omnem intemperiem contrariis remediis & rerum non-naturalium vocatarum docta administratione alterandam, ad nativamque temperiem reducendam, & ita methodo perpetuo procedendum erit, nisi tam sint sæva & periculosa morbo adjuncta symptomata, ut univrsam sollicitudinem Medici relicto morbo, ad sui remotionem vel mitigationem convertant & abripiant.

SECTIO II.

De Febrium in Spiritibus accensarum curatione.

Diaria Febris quid, qua ejus causa, signa, & quomodo curanda.

Febris Ephemera.

Ephemera est quæ in tribus spiritibus nostras actiones gubernantibus, vitali potissimum, animali & naturali in arteriis contentis incenditur. Est itaque proprium Diariorum febrium subjectum spiritus. *Ἐφ' ἡμέρας* febris nomen obtinet à tempore durationis, unicam enim habet accessionem: & si æger in victus ratione non delinquat, ultra diem naturalem, id est 24. horarum spacium non durat, sed sua sponte extinguitur. Diariorum autem febrium alia est morbus ex solis procatarteticis causis orta, & alia est symptoma, quæ ex bubonibus non venenatis accenditur. Bubones autem seu glandularum tumores ut plurimum excitantur in pueris, qui crescunt, aut excitantur ex tuberculis vel ulceribus, quæ tubercula & ulcera si in capite sint sita; bubones in collo; si in manibus sint constituta, sub axillis, si in pedibus, in ipsis inguinibus, adenarum tumores, qui bubones nominantur, excitat, quos perpetuo febris Diaria comitatur. Tales autem bubones non sunt perniciosi; alias autem rata & verissima est Hipp. Sententia. 4. Aph. 55. *Febres omnes ex inguinum Bubonibus nata, ma-*

Bubones puerorum unde, & sibi excitentur.

la; præter Ephemeram, id est per unum diem durantes.

Causæ Febrium Diariorum omnes *πρὸς αἰτίαν* tantum sunt, inter quas præcipue sunt solis ardentis radii, corpus, ac potissimum nudum caput ferientes, & ambientis aëris vehementior caliditas, alimenta ac medicamenta impensius calefacientia, vini meracioris immoderatio potatio, unguenta oleaque calida nimirum penetrantia cuti inuncta, exercitium seu corporis motus laboriosus ac diuturnus, animi ex ira seu excandescencia commotio, pororum cutis constrictio aut obstructio perspirationem prohibens. Constrictio contingit ut plurimum ex balneis aut lavacris constringentibus & aluminosis. Obstructio pororum accidit ex inunctione obstruente, aut ex crassiss tenacibusque humoribus poris impactis. Diaria autem quatenus est symptoma, causæ sunt bubones extuberantes, non tamen venenati, quales in crescentibus ex ulceribus tuberculisque obortis excitari diximus.

Ejusmodi enim Bubones semper Diaria febris comitatur, extra istas causas Bubones perpetuo sunt suspecti, & ut plurimum venenati; & febres ex iis ortæ, periculosæ, juxta sententiam Hipp. 4. Aph. 55. *Febres omnes ex inguinum Bubonibus nata, mala; præter Ephemeram:* aut enim pestilens virus, aut maxima putrefactio eos excitat.

SIGNA. Calor febris Diariæ semper *Signa.* minor est quam aliarum febrium, pulsus magnus vehemens & frequens, æqualis tamen, urina tenuis est & perspicua, ad albedinem vergens, & propter tolerabilem concoctionem sedimentum habet inculpabile. Febris Diaria ut plurimum per sudorem aut madidam exhalationem terminatur; ephemera orta à calore cordis, facies squallida & oculi concavi apparent, reliquarum causarum Diariæ signa, ex ægri relatione deprehendi possunt.

CURATIO. Si non delinquatur in victus ratione, sponte sua evanescit Diaria sine auxilio Medico post 24. horas; & ideo rarissime

rissime & non nisi in Principium aulis & Gynecæis accersuntur Medici ad curationem Diariorum. Verum ubi Diaria exardescit, curatio ejus consistit in causæ remotione aut ejusdem alteratione; primum itaque debita victus ratione & morbo contraria, refrigerans nimirum & humectans, præscribatur; hujusmodi sunt pitana, pruna Ungarica acida, pisces Saxatiles, Lactuca cum aceto rosaceo & similes.

In potu præter aquam hordei debet esse Cerevisia clara & natura frigida, ut Brunswicensis. Et si corpus est plethoricum, ac Diaria protrahitur ultra 24. horas, commodissime vena epatica aut media dextri humeri incidendi poterit. Si Diaria aut a pororum obstructione, aut a solis ardore & ambientis aeris caliditate sit excitata, præstat laborantem in lavacrum aut balneum aquæ dulcis ducere, nisi corpus sit caco-

incalescit & ferveat. Ex iisdem causis, & maxime ex pororum cutis obstructione & errore in ratione victus contingit, idque præcipue in corporibus plethoricis.

CURATIO hujus febris consistit in venæ Epaticæ aut medianæ sectione, & victus ratione refrigerante & humectante. Commodissimum autem est præsidium sæpe bibere Syrupum acetositis citri cum aq. Spiritum Cichor. mixtum. commode quoque adhibetur Balneum aquæ dulcis, & inunctio cum ol. Rosar. *eiusdem Sacharum.*

De Febrium in humoribus accensarum curatione.

Alteram Naturæ humanæ substantiam ex 6. Epidem. Hipp. diximus esse humores, in quibus nulla accenditur febris, nisi vel intra venas contenti vel extra venas profusi putrescant. Omnes itaque febres in humoribus putrescentibus excitatae, nominantur febres humorales & putridæ, & ubi humores intra venas putruerint, excitant continuas febres: Extra vero venas putrescentes, interpolatas seu intermittentes. Porro humorum cum suis excrementis 4. sunt genera, sanguis, pituita, bilis flava, & humor melancholicus. Hi pro suæ naturæ & putredinis in ipsis inæqualitate, extensione ac remissione, & inter se commistione varias species putridarum febrium producunt, ut in sequentibus ordine docemus.

In Sanguine putrescente quæ Febres excitentur?

Per Sanguinis vocabulum hoc loco non sincerus sanguis & purior pars massæ sanguineæ, quæ nunquam nisi cogitatione à reliquis humoribus separari potest, intelligenda est, sed tota massa sanguinea ut in venis continetur & colore rubet. Hæc massa universa putrescens ut plurimum (ceu ex cruore è venis detracto conspicuum est) tres diversas habet partes; Sanguineam substantiam, aquosam, serosioioremque partem cruori innatantem, & partem limosioiorem fœculentioremque colore nigri-

Hipp. 6. Epidem. Sect. 5. v. 32.

Somnus est præstantissimum Diaria remedium.

Tunc enim evacuatio balneum præcedere debet; post lotionem inungendum est universum corpus ol. rosar. cum exigua portione aceti rosar. mixto, aut sequenti Linimento: R. ol. Rosar. Nymph. an. 3 ij. cera alba q. f. E. L. & eluatur cum aceto rosarum. Somnus inter cætera est præstantissimum remedium Diaria: Vinum quoque tenue & aquosum concedi potest, præsertim, ubi temperamentum ægri non sit biliosum. Vinum enim fumantes spiritus mirifice discutit per halitus. In summa cuilibet causæ contrarium adhiberi debet remedium, labori quies, vigiliæ somnus, repletioni inanitio, in æstu refrigerium, ulceri & tuberculis indeque excitatis Bubonibus persanatio ac discussio, conspitationi pororum apertio.

Porro si Diaria ultra unum diem perseveret, propter ægri intemperantiam, Diaria in Synochon non putridam degenerat, quæ & ipsa mitis est; & si non peccetur, ultra 4. aut ad summum 7. dies non producit.

Synochus non putrida.

Est autem Synochus non putrida, ubi ex spirituum vaporumque inflammatione etiam massa sanguinea in venis & arteriis

Unde Febria Sanguinea.

Sanguis habet. 3. partes.

nigricantem & in fundo pelvis subidentem.

Ubi itaque massa sanguinea putrescat tota, & quidem intra venas, *Synochon continentiam*; si vero extra venas, *Synochon interpolatam* excitat; cujus curationem nunc tradituri sumus. Aut ubi ferosior ejus massæ pars tantum putrescat, quæ bilis flavæ naturam obtinet, Tertianæ speciem producit; cujus curationem in febribus biliosis sumus dicturi. Similiter si sæx seu crassus limus, qui melancholici humoris naturam habet, putrescat, febrim excitat Quartanæ naturam præ se ferentem: ejus autem curationem in Melancholicis febribus tractaturi sumus. Febris in sanguinea massa excitata, plethoricis corporibus familiaris est, & dicitur febris Sanguinea, vel febris in sanguine.

Sanguinea Febris quid? Quæ ejus causa, signa, & quomodo curanda.

Synochos putrida quid?

Σ *Ἰνὸχος* putrida, febris Sanguinea, quam & continentem quidam appellant, ea est, ubi massa sanguinea intra venas contenta putrescit, & continuam generat febrim. Nam si sanguinea massa extra venas profundatur ibidemque putrescat, per se quidem non febris, sed tumores inflammatos, quos *φλεγμονές* vocant, generat; quibus si febris accadat, symptomata erit: *Synochon* febrim & Græci & Latini nimium scrupulose distinguunt à *Synocha*; quam distinctionem commentitiam, cum parum aut nihil faciat ad febrium curationem, & tantum discentium turbet ingenia, nos consulte repudiamus. Porro *Synochos putrida* suam naturam non diu retinet, sed vel in Biliosam, aut Melancholicam, seu in Tertianam, vel Quartanam degenerat.

Subtiles nimis distinctiones noxia.

Causæ *αἰσχυρίων* sunt redundantia sanguinis, seu plethora, & in Epate Chymi putrefactio. *αἰσχυρίων* sunt alimenta multum sanguinem generantia, putrefactioni tamen obnoxia, ut sunt ova non admodum recentia, fructus horarii cito

putrescentes, & pororum cutis obstructio, perspirationem & evaporationem sanguinis prohibens.

SIGNA ex constitutione corporis & *Nota.* colore florido & venarum dilatatione facile dignosci possunt. Prognosticon. In *Synocha* putrida 4. & 7. dies studiose sunt observandi tanquam Critici, in quibus si concoctio in urina appareat, aut Crisis vel Critica expulsio per narium fluxionem, aut alvi turbationem, aut sudoris eruptionem contingat, certam salutis spem promittit; sin vero nihil tale eveniat, fiet mutatio febris vel in Tertianam, vel in Quartanam.

CURATIO in venæ sectione, victus *Cura.* ratione, remediumque refrigeratione & putrefactioni resistentium usurpatione in primis consistit. Initio itaque ante venæ sectionem alvus sequenti *Clystere* à putrida *Clyster.* colluvie eluatur: *℞* fol. *Malva*, *Althea*, viol. lactuc. an. M. j. viol. sic. m. ℞. sem. *Anis.* ℞ ℞. prun. acid. num. vj. coq. in q. s. aq. ad tertias colati juris accipe ℞ j. cui admisc. cass. extract. ℞ j. ℞. elect. tenui. ℞ ℞. ol. viol. ℞ iij. sal. ℞ j. misc. Fiat enema, quod jejuno existente agrotante tepidum infundatur.

Aut qui usum *Clystæris* non ferunt, exhibe *Syr. ros. solut.* ℞ iv. cum aq. *Endiv. mixtas* s. q. Altero die vena vel Epatica vel Mediana dextri humeri incidatur, & sanguis non ad animi deliquium, ut *Galen.* suadet, (quod sane temerarium & periculi plenum est præceptum, præsertim sub climate hoc boreali) detrahatur, sed quantum natura patientis & vires tolerare possunt; præstat itaque, ut incisio venæ post horas 4. denuo reiteretur, & si vires ferant, largius detrahatur. In *Synocha* enim sive sanguinea febre, detractione Sanguinis vel per venæ sectionem, vel è naribus copiosam eruptionem, nullum est salutaris præsidium: per sanguinis siquidem detractionem putridus sanguis tollitur, obstructio referatur, & inflammatum corpus refrigeratur; post venæ sectionem si alvus est durior, devorandæ patienti præbeantur 3X, *pulpa cass. recent.*

cent. extracta, aut manna ℥j. β in jusclo prunorum dissoluta & colata. Statim autem in initio febris præscribatur victus ratio tenuissima, refrigerans & humectans. In alimento itaque conducunt Cremor Ptisana, pruna Ungarica; Lac. ex 4. sem. major. frigid. & Amygdal. dulc. cum aq. acetosa confectum: pisces similiter laxatiles & squammosi cum aceto rosar. conferunt: ita & juscula caponum & pullorum: Quin & Lactuca portulaca, aut Acetosa pauxillo aceto & ol. perfusa concedi potest. In potu conducunt aq. hord. cum succo Arant. ant granatorum temperata. Reliqua remedia omnia, quæ exhibentur, debent esse, quæ calorem præternaturalem alterandi, & putrefactionem prohibendi virtute polleant, ut sunt hæc sequentia:

Potio resists calori & putredini.
℞ Syr. Acetof. citri, granat. è succo Limonium, acetof. an. ℥j. Aq. card. benedict. ℔i. β commisce, & manè & vesperi ℥4. aut. v. tepide offerantur: iisdem Syrupis singulis aut simul mixtis & lambendo assumtis etiam sitis mitigari potest. Possunt quoque cum aq. hordei misceri & subinde pitifando gustari, alterant enim calorem, & sitim, ut dictum est, sedant. Ubi vero corpus plethoricum simulseroso sanguinis excremento redundet, sequens haustus commode exhiberi potest:

Potio ad serosum sanguinem.
℞ Syrup. è Succ. fumar. ℥i. Rosar. solut. ℥ij. Aq. centaur. minor. ℥ iij. aut loco aquæ decoct. centaur. minor. carani benedict. & Tamarind. ℥ iij. misce, & tepida mane exhibe.

At vero si vehementer dilutus ac tenuis sit sanguis, id quod ex crebra eruptione sanguinis è naribus, & substantiæ sanguinis tenuitate deprehendi potest: ℞ Tamarind. ℥ ij. confer. rosar. viol. Boragin. an. ℥i. Sem. plantag. Acetof. an. ℥ β 4. sem. frigid. major. an. ℥ ij. Scabesen No. x. Concoquantur simul in duplici vase ad sescui horam cum Ser. lactis caprini ℔ iij. & fortiter expressa colentur. F. Potio, de qua exhibeantur mane ac vesperi ℥ iij tepide: interim & corroboracionis cordis & spirituum vitalium habenda ratio.

Ex sequenti itaque Electuario crebro q. s. devorandum præbeatur, ℞ pyror. Moscatell. Condit. Citrinat. cond. an. ℥ β. Radic. cichor. condit. ℥ vi. Quibus minutim concilis commisceantur confer. rosar. Borag. buglos. an. ℥ iij. specier. Diamargar. frigid. ℥ i. Corall. rubr. preparat. ℥ β. Margar. preparat. ℔j. Syrup. acetof. Citri q. s. F. Electuarium. Topica autem remedia hæc commode applicari possunt:

℞ Spec. Diatrion Sant. Diamargar. frigid. ana. ℥j. Corall. rubr. preparat. ℥j. β camph. ℔ β. Aq. Rosar. Endiv. sativ. Boragin. an. ℥ iij. Aceti rosar. ℥j. misce. F. Epithema, quod duplicatis linteolis exceptum modiceque tepesactum regioni cordis atque epatis applicetur. Porro si in febre Sanguinea & plethorico corpore putrefactio sanguinis ex obstructione pororum excitata sit à frigiditate ambiente, id quod ex ægri relatione intelligi potest, præstat agrotantem statim in initio febris in Baln. aq. dulcis deducere atque lavare, in quo cocta sunt Mal. Lactuc. viol. & Melilot. & ablutum corpus Ol. chamamel. inungere: alias quotidie & hypochondria spinamque dorsi inungere utilissimum erit subsequenti Linimento:

℞ Butyri recen. ol. viol. an. ℥ β. Mucag. sem. citon. cum lacte muliebri aut succo Mercurialis parata ℥ y. cera alba parum. F. Linimentum.

De Febribus Pituitosis.

Præter illam naturalem Pituitam, quæ in massa sanguinea habetur, & sapore dulcis est; & quæ à calore nativo concocta in sanguinem convertitur, plura in diversis corporis capacitatibus, veluti in ventriculo, intestinis & cerebro generantur genera, quæ Excrementitiæ nominantur, & quæ pro substantiæ suæ constitutione, qualitate, mistionisque cum aliis humoribus ratione, varios generant frigidos morbos. Sunt autem pituitæ primariæ species, Naturalis & Excrementitiæ: excrementitiæ rursum species sunt pituita acida, falsa, serosa & vitrea: Quarum differentias novisse

maxime necessarium est Medico in recta curatione Februm pituitosarum. Ex illarum omnium enim putrefactione, putridaque earum ad Cor evaporatione generantur pituitosæ febres, quarum species hæc sunt: Quotidiana continua, Quotidiana intermittens, Quotidiana cruditatis, Epiala, & Lypiria; quarum curationem nunc ordine recensebimus.

Quotidiana continua quid? Quæ ejus causa, signa, & qua ratione curanda.

Quotidiana continua.

Εμφυέτω, Quotidiana febris est, quæ quotidie recurrit & hominem denuo invadit: Quotidiana autem continua generatur ubi pituitosus humor in ipsi venis putrescit; sed quoniam sola pituita rarissime in venis sine putrefactione totius massæ sanguineæ putrescat, raro Quotidiana continua cotripiuntur homines, sed aliis febrium generibus pro ratione & mixtura putrefactorum humorum inter se commixtorum. Si autem id contingat ut pituita potissimum in venis putrescat, generat diuturnam & longam febrem, protrahitur enim ejus paroxysmus fere ad 18. horas; Quibus præteritis, reliquæ 6. horæ, quæ debent esse Quietis, valde sunt laboriosæ; & hinc hæc pituitosa febris etiam si non sit continua, tamen ob longitudinem nominatur Continua, & sæpe Medicis non satis exercitatis hæc febris Quotidiana hectica putatur esse: Sed differt ab Hectica, quia Hectica corpus exiccat & emaciat: In Quotidiana autem continua corpus est molle, & quasi subtrucidum ac spongiosum.

Differentia inter hanc & Hecticam.

CAUSA *αἰνυμένη* est pituitosus humor intra venas putrescens. *αἰνυμένη* causæ sunt alimenta multam pituitam generantia & facilis corruptionis.

SIGNA. Quotidiana continua ut plurimum circa solis occasum cum extensissimo frigore invadit, & noctu magis magisque augetur, ac ut dictum est, protrahitur ad horas 18.

PROGNOSTICUM. Quotidiana continua ut rarior, ita longe periculosior est

Quotidiana intermittente. Reliqua causarum signa, & universam curandi rationem in sequenti tractatione de curatione febris Quotidianæ interpolatæ recensebimus.

Quotidiana intermittens quid? Quæ ejus causa, signa, & quomodo curanda.

Quotidiana Febris intermittens est vulgatissima propter ingluviem hominum, & est ex genere pituitosarum febrium naturalis pituitosis familiarissima, & debilem habentibus ventriculum, cruditateque laborantibus; cujus paroxysmus quotidie recurrit. Cavendum tamen, ne quis ex quotidiana invasione decipiat, & temere Quotidianam judicet, nisi pituitæ redundantia adsit: nam & duplicata Tertiana quotidie recurrit, cujus signa & differentias in sequentibus docebimus.

Quotidiana intermittens nota.

CAUSA *αἰνυμένη* est pituitosa colluvies putrescens vel in ventriculo vel intestinis, vel in venis Mesaraicis collecta, vel ex cerebro ad subiecta viscera defluens, quæ natura, ut diximus, aut insipida est, aut salsa aut acida, aut serosa ac tenuis; aut crassa crudaque aut vitrea. *αἰνυμένη* causæ sunt alimenta cruda, concoctuque difficilia & putrefactioni obnoxia, frigiditas ventriculi & cruditas, otium & desidia.

Proprietates Quotidianæ intermittentes sunt: circa vespere accessiones habet, non cum rigore, sed cum extensa frigiditate incipit, & ut plurimum horis 18. affligit. In omni Quotidiana ventriculus & epar vehementer debilitantur: Calor febrium Quotidianarum non admodum est extensus, seu æqualis, sed fumosus, calori ignis ex viridibus lignis accensi similis. Febris Quotidiana non ut reliquæ cum sudore desinit, præsertim in initio; sed processu temporis, ubi pituita est extenuata, tum desinente febre, sudor erumpit ex certis quibusdam partibus. Præter hæc signa Quotidianarum sunt, quod paroxysmus quotidie cum vehementi frigore recurrit. Et si ex crassa pituita excitata sit Quotidiana;

na, Urina alba est & tenuis, sed paulatim deinde rubescere incipit, & hypostasis crassior efficitur, ac os ipsum continuo madore est persusum. Ubi vero putrescens pituita salsa est, salsedo per linguam percipitur, & continua ariditas linguæ adest, & Urina est rubea & crassa, & cum caloris sensu ac acrimonia profuit. Si vero ex acida pituita febris sit genita, Urina alba est, & ructus acidi, & desiderium cibi, non ut in aliis pituitosis febribus, omnino prosternitur. Pituitæ vitreæ signa paulo post in epiala febre annotabimus. Præterea in Quotidianarum fere omnium paroxysmis ut plurimum nausæ & pituitosæ evomitiones excitantur, nullum adherentes levamen.

Curatio.

Curatio Quotidianarum consistit in debita victus ratione, putrescentis pituitæ concoctione, extenuatione, & ad evacuationem præparatione, & tandem convenienti evacuatione ventriculi, & epatis assidua corroboracione, & remediorum specifica proprietate febris adversantium exhibitione: Porro in Quotidianarum febrim, siue hæ sint continuæ, siue intermittentes, curatione, pituitæ putrescentis species, qualitas & substantiæ ejus constitutio omnium primum studiose cognoscenda erit, ac in primis utrum ea sit crassa aut tenuis. Crassa enim pituita ad sui extenuationem & concoctionem, & longius tempus & fortiora remedia crebrioresque evacuationes efflagitat, quam tenuis & aquosa pituita; quin & in crassa pituita omnia refrigerantia immoderate sedulo sunt vitanda. Sed in serosa salsaque pituita, quæ fere bilis naturam præ se fert, moderate refrigerantia, nonnihilque incrasstantia tuto administrari possunt. Vbi itaque crassa pituita febrim excitavit quotidianam, tum, ut dictum est in victus ratione & in remediorum usurpatione, omnia frigida sunt vitanda, ut aeris frigida constitutio, cibi, potionesque tam actu quam potentia refrigerantes, & pituitam augentes eamque condensantes; Item otium

ac desidia; nec illis alimenta sunt offerenda, nisi in remissione Febris. Debent autem alimenta esse moderate calefacientia & extenuantia; & in potu quidem conferunt hydromel & vinum tenue moderate bibitum. In Quotidiana continua, cujus materiam in ipsis venis putrescere diximus, in initio curationis alvus eluatur sequenti Clystere:

℞ Malv. Mercur. Parietar. Flor. centaur. minor. an. M℥. sem. Anisi, Feniculi, carvi. an. ℥iij. furfur. tritic. in linteolo ligati. flor. Chamam. anethi an. p. j. Ficum No. 5. fol. Senn. ℥ij. concisa & contusa coq. in q. s. aq. ad medias, colati juris accipe ℥j. cui admisce Hier. simpl. Diaphanic. an. ℥vj. ol. absinth. Chamam. an. ℥j. ℞. Salis commun. ℥j.

F. Enema, quod tepidum ano infundatur. Præstantior aq. Confert & vomitus ex ℥vj. aq. junip. per descensum destillat. Detracta è ventriculo, intestinis, & venis Mesaraicis hac ratione pituita, si corpus sit plethoricum, aut si pituita putrescens in Venis sit salsa, serosa vel acida, venæ hepaticæ dextrilateris fiat incisio, (in crassa enim pituita vena secari non debet) sed sanguis minime copiose detrahatur. ℥v. nimirum detraxisse, satis erit: post sectam venam, si pituita sit tenuis, levioribus; si vero crassa, fortioribus remediis concoquatur & ad evacuationem præparetur. Leviora remedia sunt hæc sequentia: ℞ Radic. Asparag. Graminis, Feniculi, Glycirri. Potio præan. ℥℞. sem. Anisi, fenicul. an. ℥iij. capill. Vener. Beton. an. m. j. cinam. ℥ij. pass. min. ℥j. concisa & contusa cum aq. ℥iij. in duplici vase coquantur ad ij. horas. Deinde per se refrigerata colentur; colati juris mane ac vespere pro singulis vicibus accipiantur ℥iij. ejusq. admisc. vel oxymel. simpl. vel Syr. bizant. vel Syr. de duabus radic. ℥j. ℞. F. Haustus, qui per 6. & 7. dies tepidus usurpetur, donec signa concoctionis in Urina conspiciantur.

Si Urina rubicundior & crassior cum subidentia magis, quam aptea appareat, pituita concocta deinde evacuetur sequenti haustulo: ℞ Diaphanic. Diacathol. an.

B 3.

℥iv. Aq.

3iv. Ag. absinth. 3ij. commisc. F. Haustus, qui tepidus mane horis 6. ante prandium ebibatur.

Presen-
tius Re-
medium
non est
quampill.
Mercu-
rialium a
prepara-
ta mate-
ria usus.

Fortiora remedia pituitam magis crassam & contumacem extenuantia sunt: *R Rad. apii, fenic. petrosel. pimpinel. Dauci cretic. an. 3ij. sem. anisi, fenic. an. 3ij. herbar. hyssopi, cardui benedicti, Origani, Rorismar. pulegii. flor. centaur. minor. an. M. B. absinthii p. j. passul. minim. 3j. Cinamom. 3j. Zingib. 3j. Agaric. Trochisc. in linteolo ligati 3ij. fol. sen. 3 B. concidenda concidantur, & contundenda contundantur, atque in caniharo cum 1 B. iij. aq. coquantur ad 2. horas & expressa colentur. Colati juris mane ac vespri accipiantur 3 iij. eisdemque admisceantur Syrup. de 5. radicibus aut oxymel. scillit. aut Syrup. de Eupatorio 3 j. B. F. Haustus, pro singulis vicibus: quo tepido mane ac vespri utatur æger, donec concoctionis signa appareant. Hæc potio egregie concoquit, & simul pituitam concoctam sensim evacuat; verum si alvus ab hac potione concitator reddatur, Agaricus & Sena omitti debent, & reliquis utendum.*

Extenuata & concocta pars pituitæ subducatur sequenti haustulo: *R Agaric. Trochisc. 3 iij. fol. sen. 3 j. Zingib. 3 j. Spica Indica 3 B. contusa macerentur in aq. cardui benedicti aut centaurei minoris 3 iv. per horas 24. quæ post calefactionem ad fervorem usque exprimantur ac colentur, colato jusculeo admisce Diacarth. Diaphan. an. 3 j. B. F. Haustus, qui 6. horis ante prandium tepidus exhibeatur. Aut purgetur & utere; concocta pituita sequentibus pilulis:*

R Mass. pilul. assaiereth. Agarici Trochiscat. an. 3 B. Trochiscati albandal. gr. iij. salis gemmei gr. ij. ex quibus cum melle rosac. formentur pilul. num. 15.

Avicenna sequentem pulverem in subducenda pituita putrescente vehementer commendat:

R Turbith. optimi 3 ij. Zingib. Mastich. an. 3 j. Sachar. Albissimi 3 j. Misce. F. pulvis, & propinetur cum haustu hydromelitis.

Idem præstat 3 j. pilular. de Agarico. Quia vero pituita crassa putrescens in Quotidianis febribus simul & semel, vel æqualiter tota nec concoquere nec vacuari potest, præscripta remedia & Concoquentia & Evacuantia iterum reiteranda erunt. Cum autem pituita salsa tenuis sit, & instar Tertianæ extensum excitet calorem, ea sequenti potione ad evacuationem præparari, & nonnihil condensari commode poterit:

*R Radic. Asparag. Gramin. Endiv. ci-chor. an. 3 B. Glycyrriza 3 iij. Semin. 4. frigidior. major. an. 3 ij. Semin. acetosa plantagin. an. 3 j. B. Capill. Vener. Plantaginis cum radicibus, Agrimon. an. M. B. passul. minim. Tamarind. an. 3 B. Cinamomi 3 j. concoquantur cum 1 B. iij. aq. in duplici vase, refrigerata colentur, & colato liquori admisce syr. de endiv. bizanti. acetos. citr. an. 3 ij. F. Potio. de qua mane & vespri exhibeantur 3 v. tepidæ; exhausta hac potione expurgetur salsa pituita sequenti haustulo: *R fol. sen. 3 ij. Agar. Trochisc. Rhabar. an. 3 B. aq. Cardui benedicti 3 v. macerentur simul per 24. horas, deinde ad fervorem calefiant & expressa colentur, colato juri admisce Syrup. rosac. solut. 3 j. Diacartham. 3 j. F. Haustus, qui mane 6. horis ante prandium exhibeatur: deinde corroboretur Ventriculus & Epar aut Arantior. condit. corticibus, aut Chebulis cond. aut rotulis diarrhodon. Abbat. ante cænam & prandium devoratis, confert & talis Pulvis qui *R Corall. rub. præp. 3 j. Cinam. 3 iij. Marg. præp. 3 B. santal. rub. lign. Aloes, Mastich. an. 3 j. sacchar. alb. 3 B. fiat Pulvis, de quo bis in die sumatur: foris vero regio Ventriculi & Spina dorsæ, & hypochondria mane & vespri inungantur sequenti linimento: *R Ol. absinth. & mastich. nard. an. 3 ij. quibus admisce cera alba q. s. F. Linimentum, deinde admisce quoque guttul. 9. ol. vitrioli: commode etiam, præsertim ubi crassa sit pituita, exhiberi potest semel in octiduo 3 j. Theriac. An-dromachi.****

Si autem Quotidiana ex acida pituita putrescente, quæ tenuis est & frigida instar Melancholici humoris, sit excitata, cuius signa sunt acidæ eructationes, alvi obstructio, dolor frontis & Hypochondrii sinistri, urinaque alba & tenuis, ut antea diximus: Quæ febris nisi seite curetur, transit in Quartanam, & non caret periculo.

In enor-
mibus ob-
structionibus præ-
sertim
Melan-
cholicis
semper ex
Tartaro
Medicina
misceri
debet.

Ideo statim in initio si corpus est plethoricum, sanguis ex Vena epatica sinistri lateris detrahatur, & altero die vomitio excitetur, aut vino, in quo cortic. Radic. jugland. sunt macerati & cocti. aut cum haustulo aq. Juniperi per descensum destillatæ. Deinde præparetur acida pituita ad evacuationem sequenti potione: *℞ Radic. Asparag. Fœnic. Cicbor. Polypod. Glyzir. an. ʒ iij. Sem. Anisi, Fœnic. ana ʒ ij. Herb. cetrach. capill. ven. Fumar. an. M. j. El. Thymi Centaur. min. ana M. S. pass. mi. ʒ j. Cinamo. ʒ j. s. concisa in duplici Vase cum ℥ iij. feri lactis caprini ad duas horas coquantur; Refrigerata colentur, colato juri admisc. Oxy mel. simpl. aut syr. acetosif. aut Syr. Fumæ. ʒ vj. F. potio.* Tandem apparentibus signis concoctionis evacuetur acida pituita sequenti haustulo: *℞ Elect. Diacathol. ʒ x. Resolvantur in ʒ v. aq. card. Bened. aut centaur. mi. F. Haustus*, qui 6. horis ante prandium tepidus ebibatur. Deinde corroboretur ventriculus aut rot. Diarhod. Abb. tribus, ante cænam & prandium devoratis, aut cortice citri condito, & inungatur foris oleo Mastich. & Nard. cui parum Aceti rosa. sit admixtum. Postea semper ante paroxysmum exhibeatur aliquod remedium, quod specifica sua proprietate febri adversetur, quorum præcipua & magis experientiâ comprobata remedia paulo post recensebimus. Præter has species pituitosarum febrium & Quotidianæ naturam æmulantium, supersunt adhuc duo genera, quæ febres sunt Symptomaticæ, quarum altera ex cruda pituita, quæ ex corruptis alimentis in ventriculo generatur, & febris cruditatis nominari potest: Altera vero excitatur ab excrementis pituitosis, quæ ex

Febris ex
cruditate.

cerebro ad subjectas partes defluunt, & febris Catharralis nominatur; quarum signa manifesta sunt, nimirum ventriculi gravitas & dolor, & catharrus in gulam decumbens. Utraque autem curatur remotione causæ; & cruda quidem pituita ex ventriculo vomitorio haustulo; defluxio autem cerebri aversione pituitæ, & subductione per palatum cum Gargarismatibus. Et crudæ quidem pituitæ Ventriculi, curationem in tractatu de Morbis Particularibus de curatione cruditatis ventr. tradidimus, similiter & catharri curationem, quæ loca huc transferenda sunt. Demum ante paroxysmum exhibendum erit aliquod remedium quod specifica proprietate pituitosis febribus in universum adversetur, quorum nobiliora & experientiâ comprobata paulo post, ubi omnium febrium pituitosarum curationem absolvimus, subjiciemus.

Epiala Febris quid, quæ ejus causa, signa, & ut curanda.

Ἡ πιάλα πύρετος est ex genere pituitosarum febrium & Quotidianarum intermittentium, in qua interiora viscera vehementer frigent, exteriores vero partes calent, & exuri sentiuntur, vel in qua simul corpus alget & calet.

Epiala.
Galenus
Epialam
ad conti-
nens te-
stet.

CAUSA *πύρετος*. Epialæ febris est vitreus seu albugineus humor, qui omnium qui in corpore generantur præternaturalium humorum est frigidissimus, & glaciei similis, & ideo per se non putrescit; nec totus nec ejus aliqua pars, (ut multis videtur) febrem excitare potest per se, sed per accidens, videlicet, obstruendo & adfluentem Chylum corrumpendo; generatur autem vitrea pituita in viscerum aliqua cavitate, ut ventriculi, Intestinis, & Porta vena, rarissime vero in meatibus cerebri; Collecta in Intestinis non febrem, sed colicum eumque acerbissimum dolorem infert. In cerebri meatibus, aut si colligatur, Lethargum sive veternum, aut Apoplexiam inducit. Ubi vero in ventriculo aut porta vena colligitur, febrem Epialam excitat.

Pituita
vitrea
& ideo per se non putrescit.
Quomodo
existat il-
la Febris?

καταρρευνα causæ sunt, alimenta frigida & corruptioni obnoxia, diuturna-que in frigido aëre aut aqua, mora, & conversatio.

SIGNA Epialæ sunt extensi frigoris sensus in internis visceribus, & calor præternaturalis in externis partibus; urina cruda est & aquosa, calor etſi præternaturalis, mitis tamen est, per totum corpus diffusus, acris autem & vehemens in manuum volis & pedum plantis. *Prognostica.* Erratica est hæc febris, quosdam enim quotidie, quosdam tertio, quosdam quarto, quosdam etiam longioribus intervallis affligit. Venterculus omnium maxime in Epiala afficitur, ejusque vires prosternuntur; ideo non caret periculo, nisi tempestive succurratur.

CURATIO in victus ratione, vitrei humoris per fortiora remedia incisione, concalescentia, extenuatione & evacuatione, consistit, & ventriculi corroboratio. Venæsectio minime est tentanda in febre epiala, alimenta commodè aromatibus calefacientibus, & incidentibus condienda erunt; & omnia refrigerantia, maxime autem fructus horarii, studiosè fugienda: potus erit aut Hydromeli, aut vinum pleniùs, ac forte Rhenanum: in principio curationis eluantur Intestina, & subtrahatur pituita ex ventr. & venis Mesar. acri Clyſtere hac ratione parato: *R. fl. centaur. mi. Absinth. chama. Anethi, Melilo. ana. m. 5. Menta, Scordii ana. M. 1. sem. Anisi, Fennic. an. 3 iij. Carthami 3 5. concoquantur in q. s. aq. ad tertias, & in fine cum eisdem ebulliat pulpa colocynth. in linteolo ligati 3 j. colentur, & colati juris accipe 3 x.* In quibus dissolve *Diapha, Hyer. simpl. ana 3 vi. ol. Absinth. Anethin. ana 3 i. 5. salis 3 i.* F. Clyſter, qui per Siphonem recto intestino infundatur tepidus; Altero die provocetur vomitio, aut cum 3 vi. aq. Junip. per descensum destil. aut cum hauſtu vini in quo rad. Jugl. sunt per noctem maceratæ & ebullitæ. Præclare enim per vomitum pituitosa colluvies è ventriculo exturbatur.

Vomito-
ria.

Deinde ventr. subinde corroboretur ante cænam & prandium ventr. inungendo sequenti Linimento: *R. Ol. Absinth. Menthæ, Nardi. an. 3 iij. cera q. s. F.* Linimentum, cui admisce *gutt. vj. ol. vitr.* Intra corpus autem exhibeatur bis per hebdomadam 3 j. *Ther. Andro. cum vino,* aut devorentur ante prandium ac cænam *ij. rot. Diatrio-
pip. Aut. Diacalamenth.* Tandem incidatur & extenuetur vitrea pituita sequenti potionè: *R. Hyssopi, Calament. Origani, Thy-
mi, Satureia, Stæchad. Rorisma. Centau- hic Spiritus Nistri
mi. Card. Benedict. ana M. s. Rad. Pimpin. in aqua
Dauci Cretic. an. 3 iij. zinz. 3 ij. cinam. Juniperi.
cardam. ana 3 j. confusa & concisa coquantur in duplici vase cum 4. vini Rhena,
per ij. ho: Refrigerata colentur, & colato liquori admisce. oximeli scillit. Syr. è calam. ana 3. 4. F.* potio, de qua sumantur mane ac vespèri 3. 4. exhausta potionè subducatur pituita qualitercunque concocta validiore cathartico: ut *R. Mass. Pill. Hyer. Galen. Troch. de Agar. ana 3 s. Diagrid. gr. iij. formentur pill. num. 15.* quæ in aurora devorentur sex horis ante prandium. Aut *R. El. Diapha. Diaturbi. Benedict. laxativ. ana 3 ij. Aqua cent. mi. 3 iij. commisc. F.* hauſt. tepidus sex horis ante prandium ebibendus. Quia vero contumacior sit pituita Vitrea quam ut semel incidi, concoqui, & evacuari queat, ideo præscripta remedia & Clyſter crebrius repetenda erunt. Verum cum nostri Borea-
les homines crebras Syruporum medicamentorumque potiones plurimum averſentur, & si paucis remediis non statim liberentur, Medicum deferant, & artem ejus calumnientur: ego loco potionum exhibere soleo mane ac vespèri, 3 ij. aq. cremabilis ex granis juniperi per ascensum distillata, pauco sacch. dulcorata: aut guttas 9. plus minus, pro ratione virium, Ol. Vitri. cum ij. cochlearibus Vini generosi, quod non tantum crassam & Vitream Pituitam incidit & concoquit, verum etiam putredini & paroxysmis febrilibus resistit. Verum ventriculus in hac febre subinde corroborandus

dus & calefaciendus est, devoratis ij. aut iij. rot. Diatriopiperion, aut Diacalam, & foris crebro inungendus cum Ol. Nard. & Menta: Quibus & nonnihil aqua luniperi cremabilis sit admixtum; Apparente signo concoctionis & consistentibus viribus, deduci æger potest in balneum aquæ dulcis, in qua concocta sunt Menta; Calamenth. Absinth. grana juniperi contusa & flores Chama. prodest quoque per Hebdomadam semel exhibere ℥j. vel Ther. Andro. vel Aurea Alex. cum vino generoso.

Lipyrria. Δειπύρρεια Febris quid, qua ejus causa, signa, & curatio.

Δειπύρρεια & Græcis & Latinis nominatur Febris Epialæ contraria, in qua interiora viscera calore exuri, exteriores verò partes vehementi frigore rigere sentiuntur. Ut autem rarissima est hæc febris, ita valde est perniciofa, testificante Hipp. 4. Aph. 48. In febris, inquit, non intermittentibus, si exteriora frigent, & interiora uruntur, & sitim habent, lethale est. Quam sententiam Gal. de causone & Lipyriæ febris interpretatur.

CAUSÆ. De causis Lipyriæ non sentiunt auctores; alii enim bilem flavam, alii pituitam, alii Melancholiam putrefactam in internis visceribus inflammationem magnam excitare statuunt. Nos eam ad pituitosarum febrium species referimus; causamque ejus πτυρίδιον, Pituitam putrescentem, non quidem simplicem, sed bile flava putrescente persusam, & in meatibus viscerum impactam, esse constituimus: & quidem in ejusmodi corporum constitutione, in qua extremæ Venæ & Arteriæ crassâ pituitâ ita infarctæ sunt, ut vapores & fumi in corde inflammati, ad partes exteriores transire minimè queant, sed ad viscera reverberentur, ut flamma in clibano clauso. Quæ inflammatio allie ad se ab exterioribus partibus & sanguinem & spiritum vitalem, & inde necessario exteriora frigent; concedimus quidem Lipyriam nonnunquam consequi etiam

phlegmonas, & Erysipelata viscerum, sed non perpetuò.

SIGNA sunt Urina livida & tenuis, cutis ac faciei color lividus, interiorum viscerum & præcordiorum intolerabilis æstus, linguæ ariditas & nigrities, & exteriorum partium continua frigiditas.

CURATIO. Præstat huic perniciosæ febris Medicum manus non admovere; si autem omnino curanda sit, & remediis quidquam tentandum, intra corpus quidem refrigerationi & putrefactioni adversantia sunt adhibenda; extra verò, post partium frictionem calefacientia, & poros aperientia sunt inungenda & applicanda. Refrigerat autem & putrefactioni resistit potio ex ℥iij. Syr. acetos. citri, aut Viola. Addito cum ℥xij. aq. Cardui Benedicti mixtis & Spiritu Sulphuris & nitri. Poros verò aperit & exteriora recalefacit Oleum Anethi & Irini ana ℥s. cui ℥j. ol. Vit. aut ℥ij. aq. luniperi cremabilis sunt admixtæ. Hæc de pituitosarum febrium curatione Tyronibus Medicinæ observasse satis esse judicamus. Nunc restat ut pauca remediorum genera, quæ tum primis qualitatibus suis, tum latentibus proprietatibus omnibus pituitosis febribus auxiliari experiëntiâ didicimus, subjungamus. Post concoctam & evacuatam putrescentem pituitam, (quod una vice ut diximus perfici non potest,) præstat semper una hora ante paroxysmum gutt. 9. aut 11. usque ad guttas xv. pro ratione virium & ætatis, ol. Vit. aut mixtura corall. cum tribus aut quatuor cochlearibus Vini exhibere; Quæ non tantum in pituitosis, sed & in aliis febribus à putrida humorum colluvie ortis plurimum confert: Concoquit enim & absorbet putrescentem materiam, omnes obstructions tollit, sitim sedat, & febribus ipsis occulta qualitate resistit. Utilissimum quoque est 31. aut Pulvis pul. herb. Card. Benedict. cum radicibus Cardui bened. aut sequentis pulveris nostri cum tepida cerevisia quinquies ante paroxysmum exhibere. R. Folia Card. Benedicti Visci quercini, flores centaury. mi. an. ℥iij. Coral. rub. cor

*Lipyrria
ne pluri-
mum per-
niciofa.*

Succus Eupatorii. *cervi usi ana 3 s. commiss.* F. pulvis & pituita putrida & Bilis flava generari in quinque partes dividatur. Aut exhibeantur ante paroxysmum ʒij. *succi Eupatorii officinarum cum ʒs. Mel. rosa. mixti.* Foris autem prodest omnibus pituitosis febribus spinam dorsi, carpos manuum & plantas pedum *ol. scorp. cui aqua Juniperi cremabilis sit admixta*, ante paroxysmum inungere; quin & *Bursa pastoris viridis & contusa cum pauxillo aceto carpis manuum* imponi potest. Arabes plurimum commendant *vivam araneam*, quam maximam & albicantem syndone oclusam collo vel carpo sinistro alligare solent, quæ latenti proprietate febribus quibuscumque adversatur; idem præstant *tela Aranearum cum aqua Rosa. contrita*, & instar cataplasmatum temporibus & carpis applicatæ. In pituitosis febribus 9. *grana piperis nigri* singulis diebus jejuno ventriculo devorasse, plurimis profuit.

Piperis grana.

De Febrium Biliosarum Curationibus.

Febri biliosa. *Ex Bilis flava putrescentia qua species Febrium accendantur.*

Quomodo bilis putrescat.

Quamquam Bilis flava, cum sua natura sit tenuis, sicca, acris & amara, per se non putrescat, sed putrefactioni plurimum adversetur, tamen Bilis in Venis contenta & cum reliquis vitiatum humoribus commixta, si sua copia reliquos superet, naturam propriam exuit, & simul cum putrescentibus sanguine & pituita corrumpitur, & putrescit: ex cujus putredine acres & ardentes vapores elevati, cor ipsum inficiunt, & ardentissimas excitant febres. Sunt autem biliosarum febrium species, *Ardens* sive *Tertianæ continua*, *Tertianæ intermittens*, *Tertianæ duplicata* & *semitertiana*. Medici Tertianas Febres prima divisione partiuntur in Tertianam sinceram exquisitam seu puram, quam ex pura & sincera bile flava putrescente oriari ajunt; & in spuriam, notham impuramque Tertianam, quam ex miscellanea

pituita putrida & Bilis flava generari scribunt. Nos hanc divisionem consulto negligimus; certum siquidem est, bilem flavam, sinceram & puram, in corpore non reperiri, sed aliis humoribus mixtam, nisi in sua capsula, & ut antea diximus, Bilem per se & sine mixtura sanguinis & pituita putrida minime putrescere posse; unde nec pura Tertianæ aut exquisita dari potest. Et bilis flava per se etiam si in corpore redundet, ut in Icteria, febrem generare nequit, nisi putrida colluvie aliorum humorum mixta. Quod autem in omnibus Tertianis & Ardentibus febribus una cum bile & sanguine totus vitietur & affetur, & pituita una putrescat: ex cruore ex venis detracto perspicuum est, cujus superficies ut plurimum cinericia pellicula contegitur, quæ sanguinis cum pituita admisionem significat, & in pelvis fundo pituitosa mucago innatat. Item, quod in Urinis ardentem febricitantium si per noctem in matula retineatur, matulæ parietibus retorridus sanguis instar arenæ rubæ aut subflavæ tenacissime adhæret. Quam vulgus Renum calculum falso esse judicat, & pronunciat. Et quod in evolutionibus biliosis una mixta pituita conspiciatur, manifestissima sunt indicia bilem non sinceram, sed una cum sanguine & pituita putrescere: satis itaque arbitramur, si Studiosi Febres Tertianas distribuunt in Tertianam continuam sive ardentem, & in Tertianam intermittentem, ex earumque curandi ratione reliquas species biliosarum febrium persanandas discant. Nos itaque inter Ardentem & Tertianam continuam nullam ponimus differentiam, nisi extensionem ac remissionem caloris febrilis & symptomatum. Extensiora enim sunt & acutiora in ardentibus febribus, quam forsitan in continua. Alias utraque ex iisdem causis excitatur, eadem adfert symptomata, & iisdem curatur præliis.

Ardens

Ardens sive Tertiana Continua Febris quid, quæ ejus causa, signa; & quomodo, quibusve remediis curanda.

Causus.

Καύσος, Ardens febris, ut dictum est, eadem est cum Tertiana continua, & nostris die Breune dicitur. Est autem Tertiana continua sive Ardens, quæ etsi tertio quolibet die exacerbetur, & novum inferat paroxysmum, tamen quieti tempus nullum remittit, sed patientem continue affligit & molestat, donec solvatur, materia putrescente consumpta.

Causæ.

CAUSÆ αἰώνυα. Sunt Bilis flava in massa sanguinea redundans, & cum admixtis humoribus putrescens, cum exasatione sanguinis & corruptione pituitæ. *Προγασπυρελικαί* sunt alimenta impenſe calefacientia & extenuantia, bilemque flavam generantia, aeris continuus æstus, laboriosæ corporis commotiones, vini meracioris crebra ingurgitatio, immoderata Venus, & similes.

Signa.

SIGNA ardentis seu continuæ Tertianæ febris sunt intolerabilis æstus & sitis, continuus vehemensque capitis dolor, linguæ instar ligni ariditas, asperitas & nigrities, vigiliæ continuæ; interdum tamen, si adsit cruditas, somnus adest profundus; accedit nonnunquam delirium, pulsus arteriarum parvus & velocissimus; Urina crassa & turbida propter humorum ebullitionem, colore flammea aut crocea; & si linteolum in ea madefiat, acquirit roseum colorem. Signa autem præſagientia hæc sunt: In Causo & ardentibus febribus, adeoque in gravioribus morbis omnibus, si jam vires sunt prostratæ, & sequentia incendant symptomata, crebra anxietas, delirium diurnum, pudoris in regendis obſcœnis partibus neglectus, sudor frigidus circa frontem & claviculas, convulsiones, floecorum carptio, tegumentorum complicatio, loci subinde mutatio, extremarum partium & respirati aeris per nares frigiditas; item Urina

pauca & nigra, & excrementa instar fecis dissoluta & liquida, & paucae guttæ sanguinis è naribus erumpentes, sunt certissima indicia, præſentis mortis; & tum præstat Medicum à curatione manus abstinere. Si *καύσος* sive Tertiana continua in biliosam naturam incidat, & vires sunt debiles, quarto aut sexto die ægrum extinguere, nisi à Deo miraculose conſerveretur, necesse est. In febribus ardentibus, maxime si corpus sit plethoricum, & cervix, aures & genæ præter consuetudinem rubeant, naresque pruriant, eruptio sanguinis è naribus exspectanda erit; quæ si die critico accadat, & copiose profluat, salutis spem promittit; & in omni ardenti febre, si vires sint moderatæ, seipſo die critica evacuatio superveniens, ut sanguinis è naribus effusio, aut copiosus sudor, aut biliosa evomitio, aut alvi excretio, febrem solvit. Si vero ardens febris ultra septimum diem provehatur, Phrenitis est metuenda. *Ἰκτερίτις in ardentibus febribus ante septimum diem oborta, lethale est signum.* 4. Aph. 62.

Prognostica lethalia.

Prognostica salutifera.

CURATIO ardentium febrium consistit in victus ratione, biliosæ colluviei evacuatione, sanguinis detractione, æstuantis caloris & aliorum symptomatum mitigatione, & virium corroboracione. Priusquam autem methodica curatio instituat, in principio, viribus adhuc non omnino prostratis, alvus & venæ Mesaraicæ à fecibus & biliosa colluvie eluendæ & evacuandæ erunt sequenti Clyſtere: *Rx Viola. Lactuca, Malv. Cichor. Roſtri porcini (alias caput monachi) ana M. ʒ. sem. 4. frig. ma. ana ʒ ij. concisa coquantur in q. s. feri lactis ad tertias colentur, colati luris accipe ʒ xij. In quibus dissolve pulpa Cass. ʒ j. El. lenit. ʒ ʒ. ol. violarum ʒ iij. salis ʒ j. F. Enema, quod tepidum recto Intestino infundatur. Postero die si nihil obstiterit, nec vires sint prostratæ, & corpus sit plethoricum, sanguis è Vena Epatica dextri lateris subtrahatur*

trahatur ad \mathfrak{z} . usque 8. aut plus minus pro ratione temperamenti, & non, ut Gale-
no placet, ad animi deliquium usque. San-
guinis autem detractio per vices debet fie-
ri, suppressio vulnuscule, & rursus aper-
to; deinde ubi lingua nigricet, & venæ
sub lingua sitæ commodè incidi possunt,
in quibuscunque corporibus. At ubi cor-
pus extenuatum & natura biliosum est,
aut vires sunt debiles, sectio venæ in hu-
mero penitus est omittenda. Post sectio-
nem venæ præscribatur ægroto victus re-
frigerans & humectans; decumbat itaque
æger in loco frigido, qui, si naturâ ha-
beri nequit, arte talis efficiatur, crebrâ
aquæ frigidissimæ per pavimenta consper-
sione, & frigidarum herbarum florum-
que, quales sunt folia Salicis, pampini seu
Vitium folia. Nymph. gramina aquâ con-
spersa, flores Rosarum per solum consper-
sione, circaque lectum fiat aq. rosa. con-
spersio. Lecto decumbat æger satis amplo,
ut de uno loco concalescat in alium fri-
gidum se convertere & collocare queat.
Substernenda quoque in lecto sunt lintea-
mina mundissima, quæ sæpè renovari de-
bent. Quia verò plumæ calefactæ æstuans
corpus magis inflammant, inter stragu-
lam & linreamina pellis sive aluta tenuis-
sima interponi potest. Similiter & capiti
cervicalia ex pellibus facta subjici debent,
& sæpè inverti. Quin & aer corpus ægri
ambiens, & ipsum corpus æstuans flabel-
lo excitato ventulo refrigerari debet. Cibi
sint cremor ptisanæ, grana hordei excort.
& in juscule pullorum cocti, lac. ex 4.
sem. frig. & sem. papav. cum ferventi aqua
confectum; pullorum juscule cum uvis im-
maturis cocta, & caro avicularum; ex pi-
scibus perca aculeatæ cum aceto vini co-
cta; ex pomis acidis pulmenta saccharo
condita, pruna acida & ova sorbilia, ex ovo-
rumque luteis & cerevisia confecta juscule.
In potu utatur æger aqua hordei mundati
M. l. Glyc. rasa & confusa \mathfrak{z} s. Anisi \mathfrak{z} iij.
cinamo. \mathfrak{z} j. pass. m. \mathfrak{z} j. affunde aquæ pu-
rissimæ congiunt semis sive pocula duo, co-

Incoqui
atiam de-
sist in pe-
tra Cor-
nu Cer.

quantur in cantharo per ij. horas. His ita ^{hac febre} ^{divinum} ^{medica-} ^{mentum} ^{restit in}
studiosè ordinatis, biliosa colluvies eva-
cuetur sequenti haustu: \mathfrak{R} Rhab. el. \mathfrak{z} j. s. ^{medica-}
Fol. senæ sine stipitibus \mathfrak{z} j. se. Anisi \mathfrak{z} j. con-
tusa macerentur per noctem in \mathfrak{z} v. aq. Ci-
cho. Manè expressa colentur, colato liquori
admisc. aut \mathfrak{z} ij. El. Rosa. Mes. aut \mathfrak{z} s. Man-
na, aut \mathfrak{z} v. j. pulpa cass. rec. exp. F. Haustus,
qui sex horis ante prandium calidè ebibatur.
Aut \mathfrak{R} Rhab. el. \mathfrak{z} ij. Fol. senæ \mathfrak{z} j. s. cina-
mo, Anisi an. \mathfrak{z} j. contusa ligentur in Syn-
done. F. nodulus laxus, qui per noctem in
aqua Cardui Benedicti aut Cichor. \mathfrak{z} v.
maceretur. Aut in haustulo cerevisiæ cla-
ræ imponatur, & summo mane nodulo
expresso liquor per se ebibatur, aut eidem
 \mathfrak{z} ij. Syr. Rosa. Sol. admisce. F. Haustus. ^{Aqua de-}
Delicatiores, qui à commixtorum reme- ^{stillata}
diorum usu abhorrent, veluti sunt pueri, ^{purgans.}
virgines & illustres fœminæ, sequenti aqua
stillatitia commodissimè purgari possunt:
 \mathfrak{R} Rhab. \mathfrak{z} ij. folior. Senæ \mathfrak{z} j. sem. cartha-
mi \mathfrak{z} s. Mercur. M. ij. Cinamo. \mathfrak{z} j. Anisi
 \mathfrak{z} s. contusa macerentur per diem & no-
ctem in aquis Cicho. Centau. mi. Card. Be-
ned. an. \mathfrak{f} s. Deinde è vitrea cucurbita
ferventi arenâ imposita destillantur, &
omniliquore extracto feces eximantur, &
resiccentur minutimque conterantur. Qui-
bus liquor extractus rursus admisceatur,
& iterum per diem & noctem macerentur,
denuoque in arena destillantur, ejusque
limpidiss. aq. \mathfrak{z} iij. aut 4. plus minus pro
ratione ætatis & virium exhibeantur; & si
æger non advesetur, admisceri potest Man-
na \mathfrak{z} s. vel \mathfrak{z} j. Syr. ros. sol. Et præscripta
quidem cathartica omnia, quia sunt lenis-
sima ad evacuationem biliosi humoris,
quinto quoque vel octavo die, si expositulat
necessitas, reiterari possunt. Robustiori-
bus verò corporibus exhiberi potest se-
quens haustus: \mathfrak{R} Syr. ros. sol. \mathfrak{z} iij. Dia- ^{Haustus}
cathol. \mathfrak{z} iij. Diapha. \mathfrak{z} j. Aqua Emulsa ^{purgans}
in qua Tamarind. \mathfrak{z} j. per noctem est ma- ^{in robu-}
cerata, deindeque expressæ \mathfrak{z} v. Misce
F. Haustus. Evacuata hac ratione sensum pu-
trida colluvie, omnis cura in extinctione
caloris

DE FEBRIS TERTIANÆ CONTINUÆ CURATIONE. 21

caloris febrilis; Symptomatum mitigatione, & Virium corroboratione collocari debet. Quæ per sequentia remedia cum intra corpus exhibenda, tum foris applicanda feliciter perfici possunt. Calorem febrilem extinguit, furorem bilis compescit, & simul vires corroborat sequens potio crebro-pitissando assumpta: *℞ Aq. Card. Bened. Cicho. an. ℥ s. Suc. citri acidi aut granatorum ℥ ij. Suc. arantiarum ℥ j. Syr. acetos. citri ritè parati, aut ejus loco Rob. è ribes ℥ ij. misceantur. F. potio. Vel ℞ Aq. uvæ imm. ℥ vj. Syr. Corall. ℥ ij. Corn. cerv. prap. ℥ j. Sacch. niiri ℥ ij. spir. sulph. ℥ j. Misce. Similiter æstus febrilis sequenti potione extingui potest: *℞ Rad. Endi. Cicho. Bugl. Nymph. ana ℥ j. Hord. mandati M. s. Conf. Ros. Viol. Nymph. an. ℥ j. Se. Lactuca portul. Acetosa. an. ℥ ij. Radicibus & seminibus contusis in duplici vase coquantur cum ℥ 4. aq. purissima per 2. horas. Refrigerata colentur & colato Juri admisc. Syr. Acetos. citri Viola. ana ℥ ij. vel pro arbitrio ad palatum patientis F. potio, qua frigida sæpe utatur: vel aq. hordei superius præscriptæ ℥ ij. accipe, & fervefactam per conservam Rosarum & Nymph. percolato. F. potio. Vires in ardentibus febribus corroborari & refici possunt sequenti Elect. nucis avellanæ quantitate crebro assumpto: *℞ Pyrorum Moscatell. condit. & minutissime concisorum conf. Ros. Borag. Bugl. Nymph. an. ℥ s. Sp. Diamarg. frig. ℥ ij. pul. Coral. rub. prap. Marga. prap. an. ℥ s. cum q. s. Syr. acetos. citri F. Elect. Foris verò ferventi ægrotantis corpori sequentia Topica remedia applicari felici successu possunt, carpis manuum imponatur catapl. ex fol. & radicibus Bursæ Pastoris cum pauxillo aceto contusis. Aut ex herbæ Senecionis aut semper viva contusa cum aceto, Spina dorsi, stomachus & utraque Hypochondria bis quotidie inungantur sequenti Linimento: *℞ Ol. Ros. viol. Nymph. an. ℥ ij. citon. ℥ j. cera candida q. s. F. Linimentum, quod ter eluatur cum suc. aut aq. ros. ac deinde eidem Linimento****

admisce *Mucag. ex seminibus Psyllii & Citon. simul contusis in aceto rosa. maceratis factæ ℥ ij. F. Linimentum. Quin & dextro Hypochondrio sive epatis regioni volisque manuum & pedum plantis sequens catapl. utilissimè imponi potest: ℞ Herb. virid. plantag. Acetosa, Senecion. Trifolii acidi, polygo. ana. M. l. irrorata aceto rosa. contundantur, contusisque admisc. nonnihil far. hord. F. catapl. quod calefactum in partibus crebro immutetur. Mirificè quoque *Tinea viva. calorem febrilem à visceribus subtrahit ac mitigat Tinea piscis, viva plantis pedum alligata, donec emoriatur, si crebrius imponatur: aut loco catapl. regioni Epatis & cordis & carpis manuum applicetur sequens Epithema duplicatis linteolis exceptum & intra volas paulò tepesfactum: ℞ Aq. Rosa. ℥ iij. plantag. Borrag. fl. Nymph. ana ℥ iij. Aceti rosa. ℥ ij. Quibus admisc. fl. Diamarg. frigid. Diatrion sand. an. ℥ j. s. pul. coral. rub. ℥ s. Troch. è camphora ℥ j. F. Epithema, quod non solum præscriptis partibus refrigerandi causa utiliter admoveatur, sed plurimum confert, & calorem mitigat, si linteolis exceptum testiculis circumponatur. Tempora & coronalis futura inungantur *Unguento populino cum aq. rosa. sæpe loto, vel ol. Rosar. cui pauxillum aceti Rosa. est admixtum. Aut sequens Epithema iisdem locis imponatur, ℞ Sem. papa. albi. ℥ j. contundantur, iisdemque admisc. aq. Rosa. ℥ v. Aceti Rosa. ℥ l. & simul probè agitentur ac percolentur & F. liquor lacteus, cui albumen ovi conquassatum admisc. F. Epithema. Et præscripta quidem remedia dolores capitis mitigant, & somnum conciliant in febribus. Os verò ipsum & lingua arida & siticulosa creberrimè eluatur aq. fontana, eaque quam frigida, cujus ℥ ij. admisc. Aceti Rosa ℥ ij. Aut eluatur cum *Hic Sale aqua Fragorum aut aq. fl. prun. Syl. post. prunella elutionem oris, scabræ linguæ illinia. nihil ele-tur mucago ex seminibus psyllii & Citon. gantius. confecta, cujus ℥ s. ol. Vir. ℥ s. aut ℥ ij. Syr. Acetos. Citri. aut ℥ ij. Rob. è Ribes admisceri.****

misceri possunt. Tollunt enim scabritiem, & humectant oris linguæque ariditatem. Sitis molestiam mitigat crebra masticatio Trifolii acidi vel acetosæ, vel pass. in aceto rosa. macerat. vel Tamarind. vel crebra succio succi ex Arantiis acidis. Reliqua Symptomata febrium ardentium quibus præsidii sint tollenda, in fine hujus tractationis de Febribus ordine recensimus.

Febris Tertianæ Intermittens, quid; quæ ejus species, causæ, signa, & quæ methodo curanda.

Tertianæ intermittens.

Πυρετός tertιανός. Etsi paulo ante monuimus Bilem natura sua non putrescere, nec simplicem & sinceram bilem nisi in Vesicula Bilis reperiri in corpore, & ideo non recte distribui febrem Tertianam in puram ac spuriam; tamen creberrime Bilis in bilem præternaturalem convertitur, coloremque & substantiam suam immutat, & redditur magis rubea, aut viridis, aut pallida. Substantia vero redditur aut justo tenuior, & mensuram quoque propriam seu quantitatem excedit naturalem. Quoniam itaque ejusmodi præternaturalis bilis cum putrescente colluvie humorum, vel in venis ipsis, vel in aliis capacitatibus viscerum commisceatur, vel ad musculos profundatur, varias species Tertianæ febris excitat: & quanto hæc biliosa colluvies crassior existit, tanto diuturniores & periculosiores febres Tertianas profert. Quanto autem ejus copia minor est, & substantia tenuior, eo erunt & febres breviores, & minus periculosæ: Generatur & in Ventriculo ex alimentis facile putrescentibus, & venenatis biliosa quædam colluvies, quam bilem *prassinam* sive porraceam vocamus, quæ & ipsa bilis febrem excitat Tertianam continuam sive ardentem, & valde perniciofa inducit symptomata; adeo ut nisi vel arte, vel natura per vomitum ejiciatur, brevi interitum inferat. Itaque biliosarum febrium seu Tertianarum species pro copia & materia præternaturalis bilis & putrescentis colluviei extra Venas profusæ, sunt, *Tertianæ In-*

Bilis prassinæ.

termittens seu simplex: Tertianæ duplicata seu semitertiana, de quibus nunc breviter differemus. *FEBRIS TERTIANA* est, quæ tertio quolibet die, id est, alternis diebus recurrit, & hominem affligit, una die inter duos paroxysmos quietem relinquens. Febris Tertianæ simplex in hisce regionibus borealibus est valde familiaris & frequentissima, quam vulgus salutarem esse judicat, eo quod per eam plurimi vitiosi humores conflagrent & absumantur; & ea est natura hujus febris, ut si in victus ratione æger non delinquat, sola quiete & abstinentia curari queat, & septimum paroxysmum minime excedat.

CAUSA πικρῆ. Tertianæ simplicis *Causa.* seu intermittentis sunt biliosa colluvies putrescens, & extra venas profusa & in totum corpus sparsa, aut in certis capacitatibus collecta, in qua humorum putrescentia bilis sua copia excellit: Ventriculus frigidior, & Epar calidum; ii enim potissimum qui frigidum habent ventriculum, & calidum Epar, tali biliosa colluvie infestantur, & in Febrem Tertianam incidunt. *Πικρὰ.* sunt alimenta facile corruptibilia & venas Mesaraicas obstruunt, Epar inflammantia & bilem generantia.

SIGNA Tertianæ Intermittentis sunt; *Signa.* paroxysmus alternis diebus cum vehementi rigore & punctationibus subcutaneis excitatus. In corporibus biliosis paroxysmus cum biliosa excretionem, aut per vomitum aut per alvum invadere consuevit. Tertianæ febris ab hora invasionis ultra 12. horas non protrahitur, & ut plurimum cum sudore evanescit. Urina ut plurimum in Tertianæ febri aut est crocea, aut rubea ac flammea, & nonnihil crassa, in *quasi primo aut secundo die ab invasionem sedimentum album*, & *larve conspiciuntur; paroxysmum quartum non excedit*: Si vero talis hypostasis tertio die non appareat, producit ad septimum paroxysmum. In Tertianæ pulsus arteriarum vehemens est & celer: Corpus patientis si manu tangatur, vehemens & mordax calor sentitur, sitis, vigilæ,

vigilia, & corporis jactatio semper comitatur Tertianam Intermittemem.

Diata. CURATIO, cum in victus ratione, tum venæ sectione, & remediorum usurpatione eadem est instituenda, quam paulo ante in curatione febris ardentis sive Tertianæ continuæ tradidimus; & quidem victus debet esse refrigerans & humectans: in alimento itaque conveniunt cremor ptisanæ, pruna acida, juscula & carnes pullorum aut avicularum cum uvis omphaceis aut aceto conditæ. Ex piscibus Melanuri sive perca aculeatæ, & cum aceto conditæ solæ conveniunt. Ova quoque forbilia concedi possunt, & capita ovicularum. Potus erit aqua hord. cum cinamomo cocta; cujus coquendi rationem paulo ante descripsimus: quæ præstantior redditur si per *Conf. Nymph. Rosa.* percoleatur; aut bibat aquam *Cardui Bened. aut Cicho. cui nonnihil Syr. Acetof. Citri* sit admixtum: aut utatur pro potu Lacte ex quatuor *sam. frig. ma. cum aq. Cicho. & Cardui Bened.* & cum sufficiente q. Saccha. cand. quod in *Syr. Viola.* condensatum est, factio. In paroxysmis arceatur æger à somno. Si alvus est obstructa Clyst. paulo ante in curatione febris ardentis descripto emollienda erit, ac tandem si corpus sanguine redundet, & ætas ac vires tolerant. Vena secetur Epatica dextri lateris: Sed venâ in Tertiana febris ante tertium paroxysmum non est incidenda: & tum debet Medicus prædicere sequentem, ut vult Rondletius, quartum paroxysmum gravissimum futurum; & si corpus sit plethoricum; & febris non cesset septimo paroxysmo, tum Venæ sectio commodè reiterari potest. Post venæ sectionem biliosa colluvies, quæ est in ventriculo collecta, per vomitum

Sal Vi- evacuetur, primum exhibitis \mathfrak{z} v. *aq. In-* nuperi per descensum cum pelvi destillata. Si autem ea colluvies in venis Mesar. & Epatici hæreat, subtrahatur crebra usurpatione sequentis noduli, portione ex eo parata: *R. Rhab. fol. Senæ an. 3j. Sem. Anisi 3j.* contusa involvantur in syndonem

rub. F. nodulus laxus, qui per noctem maceretur in \mathfrak{z} v. aq. Cicho. Mane fortiter exprimatur, & calefacta sex horis ante prandium ebibatur. In robustioribus corporibus præscripto liquori utilissime admisceri potest vel \mathfrak{z} iij. *Elect. Rosa. Mes. vel 3. ii. El. lenit. aut Diaprunis laxat. vel 3 i. Syr. rosar. sol. vel 3. vj. pulp. cass.* & cum una vice biliosa colluvies subtrahi nequeat, præscriptis remediis crebrius utendum erit: & semper cum vena est secanda, tum evacuantia remedia sunt exhibenda die quietis. Interim & virium subinde habenda est ratio, & sequentis *Elect. Semijugland. q. devorata, reficiendæ. R. Pyrorum Moscatell. condit. citrinati conditi ana 3j. Rad. Cicho. condit. 3j. Chebul. condit. 3vj.* concidantur minutissime, iisdemque admisc. *Conf. Rosa. Borag. Nymph. ana. 35. Sp. Diamarg. frig. 3j. B. Syr. Acetof. Citri q. s. F. Elect.* Quin & corroborat vires, & tuto concedi potest ubi cessavit calor febrilis, exhibere buccellam panis in vino Cretico aut Rhena. maceratam. Durante calore febrili præstat ab omni potu abstinere. Verum si sitis sit intolerabilis, sequenti portione levare potest: *R. Aq. Cicho. Card. Bened. ana lb 5. syr. acetof. citri 3ij. Suc. Citri acidi 3j. Misc. F. potio.* Specifica proprietate sua febrem extinguunt Tertianam, & biliosam colluviem absorbunt sitimque extinguunt, gutt. 7.9. aut 11. ol Vit. pro ætatis ratione ac virium; cum tribus cochlearibus aquæ Card. Benedicti commixtis, ante paroxysmum, aut etiam quotidie Ventriculo jejuno exhibitæ. Ejusdem efficaciz est & sequens pulvis ante paroxysmum, 3j: cum haust. Aq. Cardui-Benedicti aut centauri. mi. quater aut quinquies ebibitus: *R. Card. Bened. fl. centaur. mi. cornu cervi Visci querci. rub. ana 3j. commisc. F. pulvis.* Vidimus, & ipsi in proprio corpore experti sumus, Tertianam febrem intermittentem solius aq. frigidiss. largiori haustu dissussam & sanatam esse, præsertim ubi ejus tanta copia assumatur, ut patiens eam rur-

sus

Majorum virium est Sal absinthios in spiritum solutum &

rerum in
Cryſtallos
coagula-
tum ad
3j.

ſus evomat: Ea enim ratione magna copia bilioſæ colluviei cum vomitu projicitur: Sed non temerè in quibuslibet corporibus, niſi in robuſtis eſt utendum. Topica remedia, veluti ſunt Catapl. Epith. Lini-menta & reliqua quæ foris applicari debent, paulò ante in curatione ardentis febris commemorata ſunt. Symptomata vero febrilia quibus remediis ſint tollenda, ac mitiganda, paulò poſt ſeorſim deſcribemus. Hoc tamen unicum topicum obſervandum erit; tollere febrim Tertianam, ſi

Topicum.

manuum carpo alligentur folia plantag. Sambu. & Senecionis, vel ſola Buſſa paſto. cum aceto roſa, conſperſa & contuſa, inſtarquè cataplaſmatis applicata. Ejusdem efficaciz quoque eſt pul. fuliginis cum viſcente Salvia contuſus, addito albumine ovi & aceti pauſillum, & carpiſ alligatus.

Fuligo.

Tertiana Duplicata quid, qua ejus cauſa, ſigna, & quomodo curanda.

Tertiana duplex.

Τριπλῆς διπλὴς, Tertiana duplex eſt Febris bilioſa acuta, rara tamen, quæ omni tertio die bis hominem invadit, ut hodie bis paroxyſmum excitet, cras verò nullum, tertio die iterum bis affligat.

CAUſA *αἰσχυρῆς*. Eſt bilioſa colluvies, eaque copioſa, vel in venis portæ, vel cava, vel in Ventriculo collecta. *Πεονγλ.* ſunt fructus & olera citò putribilia, & alimenta omnia vitioſam bilem gignentia, & concoctionem impediencia.

SIGNA duplicatæ Tertianæ ſunt, alternis diebus bis paroxyſmum excitare, ſitis intolerabilis, vigiliæ & Hypoch. inflammatio, & reliqua quæ paulò ante in Tertianæ ſimplicis & ardentis curatione ſunt enumerata.

CURATIO eadem erit quæ in ardenti febre & Tertiana eſt præſcripta, niſi quod bilioſa colluvies crebrius ſubtrahenda eſt, & Venæ ſectio non niſi in plethoricis corporibus ſit molienda. Alvus ſi ſit aſtricta, ſequenti bolo ſubducere oportet: *℞ pulp. Caſſ. ʒ ʒ. Diacathol. ʒ ʒ. F.* Bolus. cum ſaccharo conſpergatur, duabusque horis

ante acceptum victum quietis die devoretur. Experienciâ plurimorum comprobatum eſt, ut & paulò ante meminimus, nullum remedium tam in ardentibus febribus, quàm Tertiana duplicata præſtantius eſſe, quàm *aq. frigida*. largiſſimè & uſque ad ſatietatem, vel potius uſque ad vomitus rejectionem hauſtam: ſed ut diximus, non temerè eſt eo remedio utendum, niſi hiſce conditionibus diligenter obſervatis: Primò ut vires conſtent, & corpus ſit robuſtum. 2. Ut ſigna concoctionis in Urina appareant, h. e. hypotaſis alba & lævis conſpiciatur. 3. Ut non adſit tumor vel Epatis, vel Lienis vel Diaphrag. In iis enim pernicioſa eſt frigida potio. 4. Ut non adſit obſtructio vel alvi, vel venarum portæ, vel cavæ. Verum aqua frigida in febribus bibenda debet eſſe quàm optima, qualis in hiſce borealibus regionibus eſt, ex ſcaturientibus fontibus hauſta, & quæ citò caleſcat, citoque refrigeretur, nec ſit alieno colore, ſapore odorequè vitioſo infecta. Reliqua remedia ex ſuperioribus februm bilioſarum curationibus peti poſſunt.

Semitertiana Febris quid; qua ejus cauſa, ſigna, & qua methodo curanda.

Πυρετός ημικρῆς τριπλῆς eſt febris compoſita ex Quotidiana continua & Tertiana intermittente, & eſt febris ex genere continuarum: Ratione enim pituitæ putridæ in Venis ſparſæ quotidie affligit; ratione autem bilis præternaturalis extra venas profuſæ, vel in aliqua corporis capacitate collectæ, tertio quolibet die paroxyſmum habet duplicem vel reduplicatum. Rara quidem hæc febris in hiſ frigidis regionibus, ſed ut plurimum lethalis.

Rara in
his locis.

Hæc febris ſi corpus natura bilioſum occupet, tertio die vehementius affligit; ſi pituitoſum, tum quotidie gravius affligit, mitior autem eſt tertio die.

CAUſA *αἰσχυρῆς*. Sunt pituita putreſcens intra venas, & bilis vitioſa extra venas collecta. *Πεονγλ.* ſunt intempeſtiva & prava victus ratio, per quam & pituita putreſcens, & bilis præternaturalis in corpo-

re generatur. Supra diximus ineptam esse divisionem febrium biliosarum in exquisitam sive puram, & notham sive spuriam; Exquisitam enim ajunt generari ex pura vel sola bile, quæ in corpore non nisi in vesicula fellis reperitur; spuriam generari ajunt ex commistione vitiosæ bilis & pituitæ spuræ; ergo spuria febris Tertianæ ex iisdem causis, ex quibus semitertiana generatur, & iisdem remediis curatur; consulto itaque spuriam tertianam omisimus, ne turbarentur Studiosorum ingenia.

SIGNA semitertianæ varia sunt, pro alterutrius humoris vitiosi naturæ exuperantia; si enim bilis in corpore redundet, cum horrore invadit, & crebro cum vomitu, & egestionem aut sudore bilioso. Præterea, ut diximus, singulis diebus ratione pituitæ affligit; tertio autem die bilis ratione binos facit paroxysmos. Siverò pituita redundet in corpore, calor est remissior, & paroxysmus è frigore externarum partium incipit, & sitis nulla molestat, & desinit cum sopore; semper autem in Hemitritæo urina est turbida & crassa.

CURATIO. Semitertiana cum ex pituita putrida & præternaturali bile accendatur, qui humores planè contrarii sunt, pituita quidem frigida & humida, Bilis autem calida & sicca: Eam ob causam curatio quoque mixta esse debet ex contrariis facultatibus. Id tamen semper artificiosa conjecturâ inquirendum est, qui vitiosorum humorum in corpore excellat, id quod ex constitutione corporis, & ex aliis signis Temperamentum indicantibus, à perito Medico faciliè deprehendi potest. Si pituitosa fuerit constitutio corporis, major erit ratio habenda concoquendæ, abstergendæ, & detrahendæ pituitæ, quàm Bilis, & tamen interim nec Bilis emendatio & evacuatio negligenda erit. Viæ itaque ratio in Hemitritæo talis condu-

verò sunt omnia sorbilia, juscule ex luteis ovorum, & cerevisia facta, quibus momentum croci admisceri debet. Lac Amygdal. cremor aut pulmentum Avenaceum, cui nonnihil piperis sit admixtum, carnes pullorum & vitulorum assatæ; ex oleribus Spinachia & Gingidion, ex Radicibus petroselinum & Cariotæ. Cibare autem largius iis diebus decet, quibus unico Paroxysmo molestantur; tenuius autem tertio die, quo duobus paroxysmis affliguntur. Potus sit aq. hord. in qua Cinnamon. & nonnihil Zinziberis Sem. anis. incocta & saccharo condita; & si pituita excellat in corpore, mulsæ seu Hydromeli concedi potest, & aq. hord. cum oxymel. mixta. Post victus rationem institutam subducatur colluvies ex intestinis & venis Mesaraicis sequenti Clystere: *R. Malv. Mercurialii Violar. ana. M. I. Fl. Absinth. Clyster. Centaur. mi. ana M. S. concisa coquantur in q. s. aq. ad tertias, colentur, colati juris accipe ℥j. admisce Elect. Lenis. Diaphoe. Hyera simpl. ana ℥j. ol. chamom. Violarum ana ℥j. s. salis ℥j. Commisc. F. Enema*, quod tepidum intestinis infundatur. Altera die ventriculus leni Pharmaco evacuetur sequenti: *R. Rhabarb. el. fol. Sena Alex. Aga. Troch. ana. ℥j. Anisi, Cinnamon. ana ℥j. contusa & in Syndone colligata simul macerentur per noctem in aq. Absinth. ℥v. diluculo verò in ferventem aquam poculo cum medicamentis imposito ferveant, & fortiter expressa colentur;colato juri admisc. aut ℥j. Diaphoe. Fernelii, aut Elect. Rosa. & Diaphoe. Mes. ana ℥j. F. Haustus: qui 6. Horis ante alimenti assumptionem calidus ebibatur. Porro si constitutio corporis magis est pituitosa, & signa concoctionis in urina conspiciantur, præclare facit statim à cibo sumto vomitum concitare, & colluviem pituitosam biliosamque ex Ventriculo proluere. Vomitus autem excitat, ut superius diximus, haustulus aq. Juniperi per descensum destill. cum pelvi, aut haustulus vini in quo rad. Iugl. per no-*

Item sunt macerata & mane bullita; peracto vomitu ventriculus corroboretur duobus cochlearibus succi granatorum vel citri acidi, vel Syr. acetos. citri assumptis. Quin & vomitus excitari commode potest ebibitis ℞. ij. ol. Olivarum calefactis; oleum enim non solum vomitum prorit, sed & alvum benigne emollit. Deinde post tertiam invasionem, si corpus est plethoricum, & vires adhuc constant, sanguinem è vena Epatica dextri lateris de trahere ad ℞ 4. tuto licebit. His ita procuratis, mixtis remediis, cum alterantibus, tum evacuantibus, subinde utendum erit. In alteratione quidem confert plurimum Syr. Acetosus, qui pituita putrida crassitiem attenuat, & bilis præternaturalis acrimoniam obtundit, & meatuum obstructions aperit. Idem præstat etiam Syr. de Endiv. Syruporum autem duorum per triduum mane ac vesper erit ℞ ij. pro una vice, & cum aq. Card. Bened. aut Cent. mi. aut Petros. vel loco aq. earundem herbarum decocti ℞ ij. simul commixtis. In evacuatione vero colluviei & pituitosa & biliosa, præstantissimum est 3. aut 4. subinde dies repetere præscriptum haustulum, ex maceratione Rhab. fol. Sena. & Aga. Troch. confectum; cui liquori admisceri possunt, si calor vehementius urgeat, ℞ iij. Syr. rosa. solat. aut si validius requiratur purgatio, pro præcellentis humoris copia in biliosa colluvie, ℞ i. 5. El. Rosa. Sol. Mes. Si vero pituita magis redundet, ℞ j. 5. Diaphæn. interim & ventriculus corroboretur, & viscera, internis & externis topicis remediis. Subinde itaque præbeatur ægrotanti semijuglandis quantitas sequentis Elect.

Confor-
sant.

℞ Citon. condit. Pyrorum. Moscatell. cond. ana ℞. s. Cort. Arant. condit. ℞ j. concidentur minutissime, eisque admisc. conserv. Borag. Bugl. ana. ℞ i. Spe. Diarhodon. Abbatis, Diamarg. frig. an. ℞ 5. Pul. Coral. rub. præp. ℞ i. ol. vitri. rectif. ℞ i. Syr. Acetos. Citri q. s. commisc. F. Elect.

Si corporis constitutio pituitosa est, purgata prius pituita, commode exhiberi possunt singulis diebus mane gutt. 7. ol. vitri. li. corallia cum tribus cochl. aq. Card. Bened. Absumit enim colluviem, sitim sedat & obstructions aperit; & omnibus fere febribus despecifica virtute resistit. Foris vero singulis diebus bis inungantur Ventriculus & Topica. Spina dorsi, & utraque Hypochond. sequenti Linimento: ℞ Ol. è Mastich. Rosar. ana. ℞ 5. Nymph. Menta ana ℞. ij. cera albæ q. s. F. Linimentum: Et si calor febrilis vehementior existat, admisceri potest Mucilag. ex Seminibus Citon. & Psylli cum aceto rosa. facta ℞ ij. Carpis manuum instar cataplasmatum in ipso Paroxysmo alligetur Bursa pastoris virescens cum paulillo aceto rosac. confusa. Si vigilie infestant, pedes vesperi laventur in aq. calid. in qua incocta sunt capita papa. fol. Salicis & fl. Chama: & Beton. Tempora autem & coronalis sutura inungantur ol. Rosa. cum aq. & aceto rosa. mixta. In tota curatione ratio habenda est Symptomatum, quæ in hac febre sæviora esse solent, semperque sunt auferenda, aut saltem mitiganda ante Methodicam curationem. Quibus autem remediis febrium Symptomata omnia sint profliganda ac mitiganda, paulo post, absolutis Febrium curationibus, fideliter docebimus.

De Febribus Melancholicis.

In humore Melancholico putrescente, quæ Febrium species excidentur.

In Chymi, seu massæ sanguineæ purificatione limosioris sanguinis partem Lien in proprium alimentum attrahit: Hæc pars terrestrior sanguinis à colore Græcis Melancholia, Latinis Nigra Bilis nominatur, quam si Lien propter imbecillitatem, obstructionem, aut intemperiem ex massa sanguinea assugere nequeat, cum sanguine in totum corpus dispergitur, & varios generat morbos melancholicos, ut Ictericam Nigram, Stomacacem, quam Scorbutum

Sp. Vitrioli
li. corallia
impræ-
gnatus
mire pro-

Pediluvium in
omnibus
febribus
condans-
cens.

Hanc
sententiam alii
aliter ex-
plicant.

butum appellant, & scyrrhosos tumores. Ubi vero idem humor aut putrescat, aut à præternaturali viscerum calore aduratur, aut retorrida bile commisceatur, suosque tetros vapores sursum ad cor demittat, febrem Quartanam generat. Cujus species Veteres duas constituunt, *Quartanam continuam*; (quæ mihi septuagenario nunquam visa est, & ideo eam aut rarissimam, aut nullam esse judico.) *Et interpolatam*, quæ frequentissima est. Nos itaque omiſſa ea divisione Quartanarum, pro humoris Melancholici natura dividimus in *quartanam mitem minusque periculosa*, (ideo quod neminem jugulavit unquam, nisi fortè culpâ ægroti vel Medici) quæ ex putrescente Melancholico humore in sanguinea massa generatur; & in *quartanam sævam & pernitosam*, quæ ex adusta flavâ bile putrescente; Melancholico humore mixta, originem ducit; & hæc duæ species Quartanarum distinguuntur, & propriis signis & curandi ratione.

Quartana Febris Mitis & securâ quid; quæ ejus causa, signa, & quomodo curanda.

Quartana mitis. Περὶ τῆς μετρίου Quartana mitis est, quæ quarto quolibet die recurrit, & suo Paroxysmo hominem affigit, ac inter duas accessiones per duos dies inducias concedit.

Causa. CAUSÆ αἰτιατὰ. Sunt Melancholicus humor putrescens aut in splene, aut in sanguinea massa, Lienis obstructio & imbecillitas, corporis Melancholica constitutio, consuetarum hæmorrhoidum, & in scemellis menses, suppressio. πρὸς αἴτιον. Sunt omnes res Melancholicos humores in corpore augentes & putrefaciētes, lienemque obstruētes, ut sunt alimenta crassi succi, carnes ac pisces fumo durati, caro asnerina, leporina, cervina, hircina, caseus vetus, & legumina fere omnia; item tristitia ac mœror animi.

Signa. SIGNA mitioris Quartanæ sunt; quarto quolibet die affligere; & ejus rei præter occultam putrescentium in corpore

humorum proprietatem, uti diximus jam ante, causa est, quia Melancholicus humor putrefactioni, motuique ad putredinem usque ad 4. diem resistere potest, & quarto tandem die movetur Melancholicus humor ad putredinem, & natura excitatur ad eum exturbandum. Paroxysmus Quartanæ leniter & sensim incipit 1. Cum oscitatione & pandiculatione, quam subsequitur horror, & mox frigus, quod paulatim extenditur, & altius usque ad ossa penetrat, ita ut ossa sibi confringi patiens conqueratur; & dentes vehementissimè concutiuntur, ac tandem calor febrilis paulo mitior quàm in tertiana subsequitur; qui in rara constitutione corporis cum sudore exhalat; adest præterea ut plurimum etiam Lienis seu sinistri Hypochondrii dolor; urina extra paroxysmum aquea est, tenuis & alba, sed die paroxysmi magis ad obscuram flavedinem vergit; ante solutionem febris ut plurimum turbida & nigra excernitur. Nigra itaque urina in quartanis & mensium retentione salutare est si-
gnum, in aliis morbis periculosum. Qui Quartana laborant, iis faciei & oculorum color plumbeus efficitur. In Quartana mitiore apperentia inculcata manet; & vehementior redditur, scilicet ob humoris aciditatem. Προγνώστις. In omni Quartana splen debilis est & malè affectus. *Insitica.*

quacunque Quartana Lien intumescit, Hydrops & periculum vitæ est metuendum. Quartana in senibus raro & difficilimè curatur. Quartana æstiva brevior, Autumnalis longa, præsertim si hyemem attingat; Quartana ut plurimum finitur, post nigram & turbidam urinam, aut hæmorrhoidum vel mensium eruptionem, aut (rarius tamen) sanguinis è naribus profluvium, aut post livida Aposthemata crurum. A Quartana capti, ab Epilepsia & convulsione immunes sunt.

CURATIO Quartanæ mitioris Methodica, qua Medici praxin exercentes, utuntur, est valde tarda, difficilis ac incerta, & ea quidem consistit in victus ratione,

venæ sectione, humoris Melancholici extenuatione & incisione, crebraque sed mitiore evacuatione, atque Lienis & Epatis corroboracione. Inprimis autem in omni curacione Quartanæ ratio habenda est Lienis primò, deinde humoris Melancholici putridi, & corporis innati Temperamenti. Alia enim curatio debetur Quartanæ in calidis, alia in frigidis corporibus, alia in Melancholicis & pituitosis, alia in biliosis. Quia verò hæc febris violentis remediis magis exacerbatur, ideo in initio blandè & leniter est tractanda, aliàs intempestivis remediis ex simplici, duplicata & triplicata efficitur Quartana; subinde itaque Quartanæ Paroxysmos & Symptomata prioris febris cum sequentis conferre debet Medicus, & inde de Medicatione ratiocinari. Quartana itaque mitis, si in corpus naturâ Melancholicum aut pituitosum, hoc est, frigidum incidat, tum & ratione victus & medicamentorum, moderatè calefacientia & incidentia sunt adhibenda. Quod ad victus attinet rationem, in naturis Melancholicis & pituitosis jussula debent parari ex iis quæ calefaciunt & faciliè concoquuntur: conveniunt autem excarnibus ovillæ, vitulinæ, pull. gallin. perdicum & columbarum. Pisces verò rarò, & non nisi percaræ aculearæ & Luci ex sale cocti concedi possunt: condiantur autem & coquantur alimenta cum pipere, Cinamomo, Petroselino & Zinzibere; concedi quoque possunt & ova forbilia & lac Amygd. & cerasa cocta, & jussula ex ovorum luteis & vino & cerevisia facta. Quin & Condimentorum loco vesci possunt Capparibus & Limoniis Sale conditis, vel intinctionibus ex Sinapi, Pipere, Eruca, Zinzibere & Cinamom. cum q. s. Vini & Sach. confectis, aut resolvantur in vino rot. Diatrion. piper. & fiat intinctus. Aceti acidorumque usum sine discrimine Temperamentorum corporis in Quartana fugiendum esse, docent Medici. Nos verò in Melancholicis & pituitosis corporibus, in quibus febris non ex adusta atra

bile originem ducit, moderatum aceti acidorumque usum, eò quod incidat, salutare esse judicamus: Abstinere autem jubetur æger ab omnibus alimentis putrefactioni subjectis, & crassum ac Melancholicum humorem generantibus, quales sunt Bubula caro & Pisces sale fumoque indurati: Item carne anserinâ, Agninâ, Hircinâ, Cervinâ, Leporinâ & Leguminibus omnibus, veterique cæleo. Potus convenientissimus erit Vinum tenue & album, vel si sit Rhenanum forte, cum aq. hord. diluendum erit. In eo autem vino saluberrimum est nodulum ex syndone confectum, in quo insuta sunt cort. Tamarisci & Ceterach herba, imponere, ac imacerare. In paroxysmi die præstat ægros à cibo omni abstinere, vel si virium prostratio metuatur, cibandi sunt 4. horis ante febris invasionem. Postquam autem calor febrilis omnino exhalavit, corroborandi sunt oblata buccella panis in vino Gretico aut Rhenano, imbuta ac comesta. Reliquis autem diebus quietis largius nutriendi sunt, post primam aut secundam invasionem; si alvus est obstructa, sequenti Clystere emolliatur, & colluvies ex venis Masaraicis & Liene subtrahatur:

℞ Malva, Mercur. Fumar. Cetrach. ana M. s. fol. Senæ. ℥ 5. fl. Anethi, Chama. Centaur. mi. ana. P. l. Thymi, Epithy. ana ʒ i. concisa coquantur in q. s. aq. ad medietas colati juris accipe ℥ ij. in qua dissolve Elect. Lenit. Diacathol. ana ʒ 5. confect. Hamech. ʒ ij. ol. Anethini, Absinth. Ruta ana ʒ j. Salis ʒ j. F. Enema, quod tepidum intestinis infundatur. Eluta alvo si corpus gracile sit, & multo redundet sanguine, id quod ex intumescencia Venarum deprehendi potest, Vena Lienaria sinistri humeri, vel ramus ejus qui inter minimum & annularem digitum situs est, die quietis, idque post alterum aut tertium Paroxysmum incidatur, habita semper ratione virium & ætatis. Ex secta autem vena si sanguis profluens crassus & niger existat, largius detrahatur; ubi verò tenuis, purus, rubeus aut sub-

Cautio-

Quartane cura in Temperamentis frigidis.

Victus ratio.

Opinio de Aceto.

Potus.

Die paroxysmi abstinentiam.

Salvatellio.

subflavus conspicitur, statim supprimatur. Ad medicationem mitioris Quartanæ quod attinet, cum Melancholica colluvies valde sit instar picis liquidæ tenax, & non facile ablui abstergiquè possit, crebro & longiori tempore sequentibus portionibus incidenda, extenuanda, abstergenda, & sensim per intervalla evacuanda erit, sensimque viscerum obstructions aperiendæ, & eadem remedia tum incidentia tum evacuantia subinde repetenda erunt; quando verò Melancholicæ resolutiones sunt concoctæ, singulis septimanis semel leniter subducendæ veniunt. Incidunt autem & concoquunt & abstergunt, obstructionsque aperiunt sequentes Syrupi: Syr. Byzantinus, Syr. de duab. rad. Syr. è fumaria, S. de lupulis. S. è Capill. Ven. Oxymel. simplex, & similes, quorum singulorum aut ex his nonnullorum mixtorum dōtis pro una vice ℥ ij. cum aq. Fuma. Cardob. cent. mi. aut singulorum aut simul mixtorum ℥ iij. cum Syr. mixtis mane offerri possunt. Vesperī autem ituro cubitum præstat duas aut tres rotulas Diatrion piper. devorandas præbere; extenuant, calefaciunt, & status in Hypochondriis dissipant, & obstructions aperiunt. His per octiduum aut circiter usurpatis, putrida. & resoluta colluvies leniter per alvum educatur, aut ℥ x. pulpa Cass. in die quietis paulò ante prandium devoratis, aut ℥ j. Diacathol. cum ℥ 4. Vini, in quo Cetrab. & sol. Sena. ana ℥ ij. sunt macerata & incotta: vel, loco Syr. & aq. Stillat. pro concoquenda melancholica colluvie, & aperiendis obstructionibus viscerum, sequentis potionis ℥ 4. manè ac vesperī per octiduum exhiberi possunt:

Huius
Censur
sunt Pill.
extr. bel.
neg. trof.
cum Spe-
cif. pur-
gante Pa-
racels.

℞ Cort. Tamarisci. Fraxini, Rad. Petrosel. Asparagi, Polypo. an. ℥ 5. Elebori nigri prius in aceto ebullit, & rursum Fumaria ana M. i. Rosm. Card. Bened. Cent. min. ana M. 5. se. Anisi, Petrosel. ana ℥ iij. Cinam. ℥ ij. Thymi, Epithy. ana ℥ ij. fol. Se-

na Alex. ℥ j. 5. pass. ℥ ij. concidenda concidantur, & contundenda contundantur, & cum lb v. albi vini in Cantharo pasta farinacea oblinito, & in ferventem aquam imposito, per 2. horas coquantur, & refrigerata colentur: cuius potionis ℥ v. 6. horis ante accessionem exhibeantur die paroxyfmi; hæc enim potio non tantum concoquit, extenuat, obstructionsque aperit, verum etiam sensim & leniter subtrahit & expurgat colluviem Melancholicam. Reliquo autem tempore mane ac vesperī devorandi patienti dentur 2. rot. Diatrion pip. aut corroborentur Ventr. & viscera sequenti Electuario:

℞ Conf. Rosism. Meliss. Borrag. Fuma. Confor- ana ℥ j. Cort. Arant. cond. & rad. cichor. cans. cond. ac zinzib. conditi simul concisarum ana ℥ 5. Ther. Andro. ℥ iij. Spec. Di Anthos, Diarhodon. abb. ana ℥ ij. cum Syr. in quo cort. Arant. sunt condit. commisce. F. Elect. cui admisc. ol. cina. gutt. vj. cuius semijugl. q. mane ac vesperī utiliter exhiberi possunt. Quum autem ventriculus in mitiori Quartana facile piritam concipit, & febrim auget, oportet vomitu per intervalla ventr. evacuare, haustulo vini prius ebibito in quo cort. medianæ. rad. jugl. sunt macerata ac ebullita; aut assumpto haustulo aq. ex granis Juniperi per descensum cum pelvi destillata; præstat autem vomitum ciere paulo ante Paroxysmum; post vomitum, ante sequentem Paroxysm. felicissimo successu exhiberi possunt ℥ j. 5. Specifica Ther. And. cum vino resolutæ, idque contra Quartanam. crebro repeti debet, ut Galenus jubet. Alia quoque Antidota adversus Quartanam paulo ante Paroxysmum exhiberi possunt, quale hoc sequens est:

℞ Mitrid. ℥ ij. quæ resolvantur in haust. vini in quo incotta sint fol. Rosism. & Cetrab. ana q. s. utilissimum est & sequentem pul. cum præscripto ante paroxysmum propinare:

℞ Cinam. Piper. nigr. ana ℥ j. croci, Myrrha, Styracis calam. Sagapeni ana ℥ 5. Benzoi ℥ ij. Rad. Gentia. ℥ j. 5. conterantur

tur tenuiss. F. Pul. Dosis est \mathfrak{z} j. \mathfrak{s} . Aut in eodem vino ante Paroxysm. exhibeantur gutt. 9. ol. Virr. Aut pul. castor. \mathfrak{z} ij. præscriptis remediis non est utendum statim in initio febris, sed ubi aliqua concoctionis signa in urina apparent, & evacuatio colluviei præcessit. His omnibus per mensem usurpatis, tandem absteineat æger ab usu medicamentorum per octiduum, ac deinde eadem remedia repeti possunt. Porro topica & foris usurpanda remedia in simplici sive miti Quartana, præcipua hæc sunt, ubi concocta & evacuata est colluvies melancholica, & obstructions viscerum sunt apertæ, utilissimum est ægrotum in die quietis in lavacrum sive balneum deducere ac lavare; debent autem in lavacro concoqui *fl. chama. Melilo. Anethi, Origani, Serpil. Betho. Fœnic. Salvia & similes ana. q. s.* Minimè obstante quod Fuchsius balnea in Quartanis improbet. Tandem post balneum & aliàs quotidie mane ac vespere dorsi spinam & Hypochondrium sinistrum inungere, sequenti Linimento, magnum adfert præsidium: *R. Ol. de Cappare, de Castor. ana \mathfrak{z} \mathfrak{s} . Nardini \mathfrak{z} ij. Chamam. \mathfrak{z} j. Cera q. s. F. Linimentum, quod aceto rosa. ter eluatur. Aut sol. abrotani in ol. Ruta contusa coquantur, & eo prædicta loca inungantur, carpis manuum instar catapl. alligentur, aut Bursa Pass. cum aceto contusa, aut Ruta ac. salv. cum acetorosa. contusa.* His omnibus si non cedat febris in corporibus pituitosis & Melancholicis, felicissime uti possumus quotidie bis \mathfrak{h} j. sudorificæ potionis ex sarmento Indico Sarsa parilla dicto, cujus parandi utendique rationem in peculiari libello descripsimus. Porro si quartana Febris corpus Temperamento calidum & siccum, sive sanguineum & biliosum occupaverit, præscriptis remediis minimè utendum est, in ejusmodi enim Quartanis Epar ut plurimum inflammatur, & sanguis torretur, bilisque flava aduritur; unde adusta colluvies Melancholica constans ex retorridis sanguine, bile fl. & putrida Melanch. gene-

ratur, in qua moderate refrigerantia sunt adhibenda. Talis autem corporis constitutio hisce signis dignoscitur in Quartanis: 1. Prosternitur appetentia, sitis adest vehemens, & capitis dolor; & calor febrilis instar Tertianæ extensior est, & urina rubescit; itaque in ejusmodi constitutione corporis & victus ratio, & medicatio refrigerans & humectans prorsus diversa à præscriptis remediis institui debet. Ac primum quidem præmissa alvi evacuatione per Clyst. & Venæ Epat. dextri humeri sectione, alimenta sunt præscribenda quæ refrigerant & humectant; ut sunt, Pruna, Crémor Psitanæ, ova forbil. caro vitul. ovilla, ac pull. gall. Pisces autem non nisi fluviatiles & squammati, & ex his percaræ aculeatæ & lucci concedi possunt: alimentata quoque cum uvis omphacii condiri affuso aceto possunt, nec lactucæ usus in acetariis improbat. In potu conducit aq. hord. aut vinum tenue cum aq. dilutum, aut lac ex 4. sem. frig. major. cum aq. hord. & Saccha. candi confectum, aut cerevisia clara & refrigerans, qualis est *Brunsvicensis*; aut apud nos *Hildensis*. Vinum autem plenum, & omnia quæ melle & aromate sunt condita, vitanda sunt. Fervorem & acrimoniam ustulatæ colluviei Melancholicæ ante evacuationem crebra usurpatione Syr. Viol. de Cicho. Endi. Acetos. Citri Oxy. Sacchari. Syr. de lupulo Borag. & de Fuma. obtundere & mitigare oportet. Ex eorum autem Syr. singuli aut quorundam ex eis commixti mane ac vespere pro singulis vicibus exhibendæ sunt \mathfrak{z} ij. cum \mathfrak{z} iij. vel 4. aq. Cichor. vel Endi. vel Fumar. commixtorum. Prodest pro Syr. uti haustulo uno singulis vicibus seri lactis caprini, in quo Cerrah & Fuma. incocta sint. Aut *R. Rad. Cicho. Polypo. ana \mathfrak{z} \mathfrak{s} . cetr. capill. Ven. ana M. l. 4. se. frig. mai. ana \mathfrak{z} ij. Conf. Viola. Borrag. Bugl. ana \mathfrak{z} j. sacch. candi. \mathfrak{z} iij. seri lactis Caprini \mathfrak{h} 4. Aceti vini \mathfrak{z} 4. simul concoquantur in duplici vase per 2. horas, F. Porio, cujus \mathfrak{z} 4. mane ac vespere exhibeantur. Præscriptis remediis per intervalla*

Topica.

Sudorifica in quartana.

Cura Temperamenti calidi.

Diet.

Alterantia.

Purgantia.

tervalla duorum Paroxysmorum usurpatis, putrida colluvies subtrahatur aut \mathfrak{z} x. Pulpa Cass. aut \mathfrak{z} i. Elect. Lenit. in aq. Endi. dissoluti. aut sequenti haustu: \mathfrak{R} Rhab. el. fol. Sena ana \mathfrak{z} j. s. Thymi Epith. ana \mathfrak{z} s. contusa colligentur in syndone. F. nodulus laxus, qui per noctem, in \mathfrak{z} 4. aq. Card. Bened. aut Cicho. maceretur, & diluto poculo in aquam ferventem imposito ebulliant per octavam horæ partem, deinde Nodulus fortiter exprimatur. F. Haustulus, qui die quietis, 6. horis ante prandium exhibeatur. Si quis autem remedium fortius habere velit, huic liquori admisceri potest \mathfrak{z} ij. Diacathol. aut \mathfrak{z} j. Syr. rosat. solut.

In biliosa constitutione vomitus spontè veniunt.

Corroborantia.

Quartana febris quæ corpora Temperamento biliosa occupat, ut plurimum in ipsa invasione evomitiones spontaneas excitat: Tales quartanæ sola aq. ros. probè refrigerata ad \mathfrak{z} vj. mensuram ante Paroxysmum exhibita, & paulo post cum vomitu ejecta, felicissimè curari possunt. Superiores purgationes subinde repetendæ erunt, post 3. aut 4. Paroxysmos. Vires ægroti continue sunt corroborandæ seq. Elect. \mathfrak{R} Rad. Cicho. Cond. Pyrorum Moscat. condit. & concis. ana \mathfrak{z} j. conf. Borag. Bugl. Viol. ana \mathfrak{z} s. Marga. prep. Coral. Rub. prep. ana \mathfrak{z} ss. Syr. Acetof. citri q. s. F. Elect. cujus semijugl. q. sæpe exhibeatur. Idem præstat & rot. manus Christi vocatæ, & Diarhodon. Abb. in ipso Parox. gustatæ. Topica remedia foris applicanda in febre quartana præcipua hæc sunt: In omni Quartana laudatur à Medicis Baln. aq. dulc. verum cum in corporibus biliosis Quartana laborantibus, vires magis, quam in pituitosis ac Melancholicis prosterantur, ego pro balneo, sola pedum lotionem, tum ad refrigerationem, tum ad somnum conciliandum, vespere cubitum ituro uti consuevi. In ea autem lotionem concoqui debent fol. salvia, violaria, capita Papav. & Chamam. Venterculus & utraque Hypochondria & tota spina dorsi quotidie bis, & simul paulo ante paroxysm. sequenti Linimento inungantur:

\mathfrak{R} Ol. Rosæ. Nymph. Citon. ana \mathfrak{z} s. Mucag. ex sem. Citon. cum aceto rosæ. facta \mathfrak{z} ij. Cera alba q. s. F. Linimentum, cordis regioni & manuum carpis & dextro Hypochondrio in Paroxysmo, & aliàs sequens Epithema duplicatis linteolis exceptum applicetur:

\mathfrak{R} Aq. ros. \mathfrak{z} 4. Borag. Meliss. ana \mathfrak{z} iij.

Aceti rosæ. \mathfrak{z} ij. Sp. Diatrionsant. vel Spec. pro Epithem. cordis \mathfrak{z} iij. commisc. F. Epith.

quod tepidum imponatur. Hæc est curatio

Quartanæ Methodica, habita ratione con-

geniti Temperamenti in singulis corpori-

bus. Dixi autem supra in quartana febre

tardas esse Methodicas curationes; itaque

irregularem curationem hoc loco subjun-

gam, qua non tantum recentiores, ut

Arculanus & Amatus Lusitanus, verum &

Hipp. ipse, vel ipsius gener Polybius usi

sunt, qui jubent post humoris concoctio-

nem exhibendam esse purgationem non

tempore quietis, sed paulo ante Parox.

viribus tum constantibus. Cum enim Me-

lancholica colluvies valde tenax, & ad mo-

tum contumax sit, in Paroxysmo autem à

natura commoveatur, eò facilius cedit, &

per purgationes subduci potest. Ego hac

ratione non tantum febres quartanas, sed

& quotidianas felici successu curavi. Ve-

rum in hujusmodi curationibus, ut supra

monui, ratio est habenda non tantum

humoris putridi, sed & virium & conco-

ctionis.

Nunc remedia quæ specifica proprietate

& congenita *dispositione* quartanam febrem

pellere possunt, & quæ longa experientia

comprobata sunt, subjungemus: præmis-

sis evacuationibus, & reliquis superius

præscriptis aq. rosæ. \mathfrak{z} vj. in ipso Parox.

exhibitæ, & paulo post per vomitum re-

jectæ, ut ante diximus, & quartanæ &

ardentibus febribus medentur. In pituitosis

& Melancholicis corporibus post tertiam

colluviei evacuationem, haustus vini, in

quo fol. Rorism. sunt incocta; cuive,

\mathfrak{z} j. s. Theria. Andro. & \mathfrak{z} s. aq. Juniper.

sunt admixtæ, in ipso Paroxysmo exhi-

bitus.

Linimentum.

Purgans brevis ante paroxysmum.

Experientum.

Egregium est Elixir proprietatis rite paratum.

bitus, ter quaterve repetendo quartanam tollit; aut

Vini u-
sus.
℞ *Calamenta viridis M. l.* aut paulo plus, quæ conspergatur vino Malvatico, ac contundatur, succusque exprimatur ac coletur, cujus ℥iij. ante paroxysmum ebibitæ certâ experientiâ Quartanam pellunt. Guttulæ quoque novem ol. Vitriol. cum tribus aut quatuor cochlearibus Vini generosi quotidie manè assumti, ac potissimum in ipso paroxysmo exhibitæ, absument materiam Quartanæ. Si calida & biliosa sit corporis constitutio, hæc sequentia magis conferunt: ℞ Syr. è Cicho. ℥j. Aq. absinth. ℥. ij. ol. vitri. gutt. 9. Misc. F. haustus, qui omni die manè repidus exhibetur; Præclare item facit ad Quartanam, si spina dorsæ & sinistrum Hypochondrium manè ac vespri sequenti Linimento inungatur:

℞ Ol. Lauri ℥vj. suc. Ruta. ℥j. Aq. Juniperi. ℥j. simul concutiantur & conquassentur, donec Linimenti formam consequantur. F. Linimentum. aut ℞ Salvia, Ruta, Absinth. Rosin. Cetrach. ana M. s. Mastic. Olibani ana ℥j. Vini sublimati aut aq. Junip. ℥. ij. ol. Olivæ aurum Laurini. ana ℥. ij. Macerentur per octiduum, deinde concoquantur ad aquosi liquoris evaporationem, colentur. F. Linimentum. Aut ℞ Pimpinell. Torment. Card. Bened. Cornu cervi usti. Diptami albi ana ℥j. F. pul. cujus ℥j. in vino generoso 2. horis ante paroxysm. propinetur. Vel ℞ Ol. Chama. ℥j. Laurini, Rutacei ana ℥. ij. Cort. Arant. rec. minutim concisorum No. ij. Vini sublimati ℥ij. ebulliant ad vini evaporationem, & colentur, quo quotidie spinam dorsæ, Hypochondria, & manuum carpos confricare utilissimum est. Magis autem efficax fit remedium, si prædictæ partes ante inunctionem confricentur sacculo ex fl. Chama. confuto & in vino cocto atque expresso. Item,

℞ Tela araneorum ℥j. Unguenti popul. q. f. ex quibus mixtis formentur sphaerulæ, quæ carpi manuum illigentur in Pa-

roxysmo. Aranea viva, quam fieri potest magna capta, inter duas testas nucis jugl. occlusa ac colligata, & collo appensa, & per 4. dies gestata, specifica virtute à Quartana liberare creditur. Similiter & Cantharides 4. telis Araneorum involutas, & collo appensas, Quartanam tollere, proditum est. Urina patientis in Paroxysmo projecta, & cum farinæ q. f. subacta, & in massam redacta, & in clibano panis modo cocta, si famelico cani, masculo quidem, si masculus est æger, & fœmellæ, Medicina si fœmina, projiciatur comedendaque præbeatur, idque ter aut quater reiteretur, patiens quidem liberatur à febre, sed laborabit canis; Novem item piperis integra grana plures dies deglutita, liberant à quartana febris.

Quartana Sæva & Periculosa, quid, quæ ejus causa, signa, & quomodo curanda.

Paulo ante dixi nunquam à me visam Quartanam continuam, sæpissimè autem Quartanæ sævam & periculosam à simplici Quartana perniciofa. Est autem quartana sæva & perniciofa, quæ quarto quolibet die, ut simplex Quartana, accessionem habet, sed ab ea differt, quia hæc statim ab initio & vires & appetentiam prostermit, & per duos quietis dies, natura nullo modo resciri potest, sed inducta debilitas semper perseverat.

CAUSÆ & signa. sunt morbi ardentes febrim antecedentes, & atra bilis, ex adustione vel melancholici humoris, vel flavæ bilis, & in cinerem conversione generata, sanguineæque massæ commixta, vel in Epate aut Liene cumulata. PERNICIOSA sunt omnia quæ Epar & Lienem inflammare, & sanguinem & utramque bilem adurere, in cineremque convertere possunt. Qualia autem hæc sint, paulo ante in curatione mitis Quartanæ enumeravimus.

SIGNA perniciofæ Quartanæ hæc sunt, Signa quarto die Paroxysmus redit, cum maxima virium debilitate, in quo frigus est exiguum, sed calor acris & extensus ac diutur-

diuturnus; Appetentia labefactatur; Urina valde rubet, & est turbida, adest & siccitas linguæ & sitis continua. *Prognost.* In Quartana sæva si Epar vel Splen inflammetur aut intumescat, maximè in corporibus biliosis, aut Melancholicis, citam mortem infert; in Quartana sæva non tantum Lien, sed & Epar obstruitur & inflammatur.

Quomodo cura institienda. CURATIO. Præstaret Medicum huiusmodi Quartanis manus non admove-
re. Hic enim locum habet: *Hydrops, Quartana, Medicorum scandala plana.* Sed si curatio tentenda est, ea mitissimè est tractanda, ne nimirum Medicamentorum usu vires magis debilitentur. Debet autem & victus ratio & medicatio refrigerans & humectans esse. Initio itaque si adsit obstructio alvi, vel venarum Mesaraicarum, subducatur & aperiantur leni Clystere ex *℞ j. decocti sive jusculi Malva Viola. Mercur. Alb. & Fuma. cui admixta sunt Pulp. Cass. ʒj. s. ol. viol. ʒiij. & Salis ʒj.* Deinde si corpus sit sanguineum, seu plethoricum, & vires moderate consent, Vena lienaris in sinistro Hypoch. latere, si dolor aut punctio in sinistro Hypochondrio sentiat; aut Epatica dextri lateris, si in dextro latere dolor affligat, secetur; & ʒ4. aut ʒ5. sanguinis detrahantur, quo facto victus ratio præscribatur, ut diximus, refrigerans & humectans, in quem usum conferunt *cremor ptisa. Lac. Amygd. cum aq. hord. paratum, Pruna & Cerasa cocta, ova sorbilia, caro pullorum, & ovilla, & pisces fluviatiles ac squamosi, quales sunt Lucii, perca aculeata & perca simplices; quæ omnia aut uvis immaturis, aut aceto rosa. condiri possunt; potus sit aq. hord. quæ fervens per conf. rosa. Nymph. Borag. percolata est: Virium reficiendarum causa quoque potest vinum tenue concedi, sed in modica mensura & aq. hord. dilutum. Tandem atræ bilis colluvies sensim & blandè subducatur exhibitis. ʒj. ʒ5. Manna in q. f. aq. Card. Bened. resolutis; aut ʒx. pulp. cass. devoratis; aut ʒiij. Syr. Viola. solut. cum aq. Lactuca; aut Ci-*

cho. ʒij. solutis & ebibitis. Aut. ʒj. El. lenit. cum haust. aq. Endi. resoluta. Reliquæ verò & cinerosæ partes ejus colluviei, quæ in corpore fumigant, earum acrimonia mitigetur & extinguatur aut ʒij. Syr. Viol. aut Syr. de Nymph. aut Syr. acidi de Citro, aut Syr. de Endi. cum ʒiij. aq. Cicho. aut Card. Bened. aut Fumar. aut Lact. commixtis, & manè ac vesperi ebibitis. Aut loco Syr. manè ac vesperi assumat Lactis haustum ex 4. sem. frig. major. & sem. papav. cum aq. hord. vel cum aq. Fuma. vel cum aq. Cicho: confectum, & q. f. Sacch. candi. quod in Syr. Viol. concrevit dulcoratum; quin & serum lactis caprini, cum ad colluviei adustæ temperationem & ejus lenem subtractionem faciat: eo commodè alternis diebus uti æger poterit in aurora. quæ præstantius sit & magis evacuat, si nodulus ex ʒj. Rhab. & ʒj. fol. Sena & ʒj. Polypo. contusis & ejus seri ʒvj. per noctem mace-retur. Et si æger sponte ad vomitionem feratur, per intervalla sumptis (ut ante diximus) in Parox. ʒvj. aq. Rosa. & rursus vomitis, diminuetur per vomitum & cinerea materia, & mitigabitur febrilis calor. Præter hæc subinde corroborentur vires, rotulis ij. Manus Christi devoratis, aut pyris Moscatellinis condit. vel rad. Cicho. condit. vel (si haberi possunt) baccis fragorum elotis: & cum vino rub. tenui perfusis saccharoque conspersis. Prodest etiam suc. Arant. & Granator. exhibitus, aut corroboretur sequenti Elect.

℞ Rad. Cicho. cond. ʒj. pyrorum Moscat. Corroborant. cond. ʒ5. quæ minutissimè conscindantur, eisque admisc. Conf. fl. Cicho. Ros. Borag. Bugl. ana ʒiij. Sp. El. de gemmis. Diamarg. frig. ana ʒj. Syr. Citrorum acidorum q. f. F. Elect. cujus quantitate duarum avellanarum crebrò devoranda exhibeatur. Inter Topica & externa remedia plurimum conferunt, pedum manuumque circa vesperam collutiones; in lavacro verò concoqui debent fol. Salicis, Lactuca, caputum papa. Rosa & Chama. fl. Conferunt quoque plurimum quotidianæ

dianæ inunctiones spinæ dorsi & Hypochondriorum manè & vesperi adhibita, cum sequenti Linimento:

℞ Ol. Rosa. Nymph. Viol. ana ℥ ʒ. Mucag. ex sem. Citon. & Psylli cum aceto. Rosa. facta ℥ ij. Vnguenti popul. ℥ j. cera alba. q. s. F. Linimentum. carpis manuum applicetur in Parox. aut Bursa Pastoris herba virescens cum aceto rosa. contusa, aut placentulæ ex telis araneorum cum q. s. Unguenti pop. confectæ, & collo appendatur aranea viva in Syndone aut testis nucum jugl. inclusa, & gestetur per quatrimum. Symptomata hujus Febris quibus remediis sint tollenda, paulo post enumerabimus.

Quæ Febres in Solidis corporis partibus accendantur.

Naturam humanam ex tribus substantiis, Spiritibus, Humoribus & solidis partibus constare, ex Hipp. docuimus. Omnem itaque febrem in una earum vel omnium accendi, & fundari, necesse est. At febres, quæ in spiritibus & humoribus excitantur, quibus item mediis curandæ sint, in superioribus declaratum est. Sequitur itaque nunc ut de ea febre differamus, quæ in solidis partium corporis substantiis, in primis autem cordis, figitur atque hæret, easque vastat ac depopulatur. Hanc & Græci & Latini *Hæcticam* vocant.

Hæctica febris.

Hæctica Febris Quid? Quæ ejus causa, signa, & qualis curatio in ea instituenda?

Ποσὶς ἐκλήν, id est, Habitualis, vel in habitum conversa febris, quæ in solidis partibus tam hæret firmiter, ut congenita esse videatur, & difficilimè ab eis divelli queat; Hæc febris processu temporis confirmata Græcis *πνεύμας*, Latinis Tabes, Marcor, nostratibus die Dörre q. d. ariditas, oder die Schwindt-sucht nominatur, id est, morbus consumens.

Marasma.

Quid?

Est autem Hæctica febris continua, id est, semper in corde & partium substantiis ardens, easque absumens, arefa-

ciens & ad extremam macilentiam totum corpus deducens, calor etsi quidem mitis, uniformis & æqualis esse videatur, adeo ut æger ipse minimè se febrile sentiat, nec dolores inferat, (nullos enim excitat Paroxysmos) tamen præternaturalis & acris est, urens & exsiccans, qui brevi tempore omne primogenium sive humidum radicale primum in corde & per universas partium substantias persusum absumat ac depopuletur. Deinde & humores secundarios ex assumpto alimento confectos, & partibus nutriendis apponendos absumit & exsiccat. Tercio, quicquid in corpore pingue ac molle est, id omne colliquat & instar flammæ absumit, & ita universum corpus in extremum marcorem conjicit, nec medullis ossium parcens.

CAUSA autem cur Hæctica febre deprehensi nec se febrile sentiant, nec calorem doloremque percipiant, ita ut sæpe & probè ratiocinando, & compositè loquendo, extinguantur, instar accensi luminis, hæc est, Quod intemperies in Hæcticis æqualis & uniformis, & calor febrilis calorem nativum suppressit ac vicit, in ejusque locum in tota Substantia hominis successit, nullamque in corpore sibi habeat contrariam Qualitatem, ex qua contrarietate & dolor & Paroxysmus excitetur. Ideo calorem febrilem non sentit æger in Hæctica, nisi post sumptum alimentum, ex quo cordis substantia ardens nonnihil irrigatur, qui mador ferventem vaporem excitat, & exteriorem propellit. Quemadmodum calx viva aut silex candens si aqua conspergatur, vaporem & æstum exhalat. Figmentum anile est, Febrim hæcticam in 3. Species distinguere, cum unicus & uniformis sit calor, solidas partes vastans: non tamen ineptè eam quis remissionis & intensio-
nis ratione, in tria tempora dividere potest, in *Principium*, *Medium* & *Finem*: vel porius in 3. gradus; & principium quidem

Cur hæctica febris corripi non sentiant.

Tria hæctices Tempora.

quidem Hecticæ difficulter cognoscitur, sed cognitum facile curatur: Finem autem & confirmatam Hecticam, quam

Maras- *μωροσ μὲν* à Græcis vocari dixi, non nisi
min incu- Deus ipse miraculose curare potest.
rabilis.

Causa.

Causæ Hectices αἰτιῶν. Sunt febres ardentes vel putridæ, vel Ephemeræ diu perdurans, Hecticam antecedentes & in ipsam degenerantes: Item viscerum internorum ac potissimum cordis & partium Thoracis, Renum, Ventr. Diaphr. & colluvies biliola, & salsa pituita in thoracis capacitate collecta, similiter & pleuritidis & *φρίξις*, & *αἰτιῶν μωρία*, & Ventriculi inflammatio, & colicus dolor malè & infeliciter curatus. Excitatur quoque nonnunquam Hectica febris ex mœrore, doloreque animi cor torrefaciente. *Σύμψυξις*. Quidquid cor ipsum arefacit, Hecticam excitare potest; sine enim cordis sicca temperie ea generari nequit. *Προγνῶσις*. seu foris incidentes causæ sunt, assumpta intra corpus venena, alimenta ac potiones impensius calefacientes, & exsiccentes, aut exulcerantes, diuturna mora in gelido balneo, aut vaporario, & post balneum frigidissimæ potionis larga assumptio, & diuturna mora in gelido & extremè frigidò aëre, item viscerum vulnerationes.

Signa incipientis hectice obscurissima.

Signa Hectices febris incipientis quidem nulla dari possunt, nisi quis eam ex gracilitate tenuitateque & biliola constitutione corporis & pectoris angustia, aliquem in Hecticam incidere, prædicere velit; *ὑποερμία* enim & pingua corpora non facile ab Hectica febre infestantur. Jam verò factæ Hecticæ signa manifesta sunt, nimirum totius corporis macilentia; quæ processu temporis ita ingravescit, ut præter cutim & ossa in corporis partibus nihil conspiciatur, aut deprehendi queat. Faciei cutis squallida est, oculi concavi, Tempora collapsa, ungues longi & incurvi, & totius corporis vividus color evanuit, somnus est inquietus & turbulentus, calor corporis ad contactum initio

quidem mitis esse videtur, sed paulo post magis magisque acris, erodens & siccus redditur. Volæ autem manuum & plantæ pedum semper calidiores sunt quam reliquæ partes corporis; id autem certissimum signum est Febris Hecticæ, quod paulo post assumptum alimentum & æger sentiat vaporem calidum in corpore ascendere, & à quolibet tactu deprehendatur, & ex pulsu dignoscatur, calorem solito majorem in corpore excitari; cuius rei causam paulo ante commemoravi, dato exemplo à viva calce liquore perfuso. In medio Hecticæ febris puncto, propter pinguedinis & mollium partium colliquationem, & excrementa alvi pinguedine perfusa cernuntur, & in urina pinguedo instar araneorum telis innatat; quæ tamen signa cessant, ubi Hectica ultimum gradum attingit, & in *μωροσ μὲν* transivit, quia nulla amplius pinguedo in corpore superest. Pulsus autem durus est, tenuis & creber, verum urina in principio salubri similis est, sed deinde tenuis, subtilis & paulo rubicundior evadit.

Signa Prognost. hæc sunt: Hectica febris in initio non curata, processu temporis in *μωροσ μὲν* transit, *μωροσ μὲν* autem est certissima via ad mortem. Pinguedo urinæ innatans Hecticæ certum est indicium. Quamquam etiam in plerisque putridis febribus & inflammatione Renum discerni potest. Furfures in urina non affecta vesica, item crurum tumor in Hectica, & fluxus ventris, & capillorum defluvium, præsentis mortis indicia sunt.

CURATIO: Etsi Hectica curatio difficillima sit, quantum tamen in Medico est, minimè debet operam suam ægrotò & suis amicis denegare, prædicendo saltem causas difficultatis. Oportet autem Medicum in Hecticæ curatione vigilantissimum esse, & omnem errorem in curando præcavere, præsertim qui deinceps emendari nequit; ac primum considerare debet, utrum Hectica morbus sit aut Symp-

Signa facta hectica;

Consummata.

Curatio.

Cautio.

toma, qualis est in exulceratione pulmonum: Ubi enim Symptoma est Hæctica, frustra laborabit Medicus in ejus curatione, nisi prius morbum tollat. Porro universa curatio Hæcticæ febris consistit in alteratione, id est, refrigeratione, & humectatione potius quàm in evacuatione. Quamquam nec ipsa evacuatio pharmacis mitissimis, si corpus sit *κακόχυμον*, aut viscera sint obstructa, negligenda. Alteratio autem, id est, caloris & siccitatis refrigeratio & humectatio, perficitur victus ratione, remediorum intra, tum extra corpus exhibitione, & Symptomatum, quæ Hæcticam comitantur, emendatione. Circa victus rationem causæ naturam nostram alterantes, quas *Res non-naturales* Medici vocant, ita gubernandæ erunt; Aerem in quo versetur æger & decumbat, oportet esse vel naturâ vel arte frigidum & humidum. Talis autem arte redditur, si cubiculi pavementum vel solum aqua frigida crebrò conspergatur, aut floribus foliisque virescentibus refrigerantium herbarum, ut sunt rosæ, violæ, gramina, fol. Salicis & Nymph. confestatur. In tali loco versetur æger, & lectus in quo decumbat adornetur. In lecto autem subjiaciendæ sunt stragulæ molles, non multis plumis tumentes, quibus utilissimè aluta seu pellis undè culcitricæ præparantur, imponitur, & molissimis & quàm mundissimis linteolis obtegatur, quæ lineæ veluti & stragula subinde mutantur. Stragula autem quibus se contegit æger, non plumacea, sed ex panis & lana, aut ex alia materia consuenda sunt. Ex plumis enim facillè inflammatur corpus, & exacerbatur Hæctica. Hymne tamen & frigida constitutione aeris, antequam se in lectum conferat æger, moderatè calefacere oportet stragula.

Ad cibum ac potum quod attinet, omnia debent esse refrigerantia & humectantia optimumque sanguinem generantia, cujus generis sunt ex carnibus caro pullorum gallinaceorum, caponum, perdicum, avicul. sylvest. hæ-

dorum, vitulorum, agnorum, & bovis juvenuli. Hæc autem elixa potius & jurulenta quàm assa conveniunt, & omnia saccharo & uvis passis minutis condenda sunt: ex piscibus concedi utiliter possunt perca aculeatæ, simplices, & lucii, item passeris & strumuli ac aselli indurati pisces, qui nostratibus *Schullen* *Gibus* & *nud* *Bergerfisch* nominantur, probè *potius* macerati ac cocti, anguillæ pinguiore non elixæ, sed assæ concedi possunt. Reliqui autem elixari debent & condiri saccharo & uvis passis, quorum juscula addita pauca Icthiocolle cogi ac congelari debent. Inter pisces autem omnes convenientissimi sunt Hæcticis, canceri fluiat. non ultra modum saliti: ex oleis profunt, Lactuca, Portulaca, Spinachia, Gingidion & Cariotarum radic. His addi licebit ova sorbilia, aut ova confracta & in ferventem aquam elixa, ac cum albuminibus non nimium induratis comesta; item ex ovis & lacte parati casei, utilissimum quoque est lac ex amygdalis confectum, & cremor Psisanæ. & Hord. excorticatum; lac. item caprillum recens multum & saccharo conditum. Ex fructibus profunt pruna Ungar. dul. cerasa, uvæ passæ & uvæ recentes, Amygdala, Pineæ & Pistacea. Lac omnium utilissimus cibus est Hæcticis: id enim non modò nutrit, sed & assumptam substantiam restaurat, humectat & refrigerat. Inter lactis autem genera laudatissimum est sugere lac mulieris sanæ & nitidæ; quod si haberi nequit, Lac caprinum recens multum & adhuc tepens pauxillo saccharo conditum manè ac vespèrè bibitum. Verùm circa lactis & lacticiniorum usum id observabit Medicus, ut ne Hæctica adjuncta sit alia febris putrida, ne *cautio in* *usa La-* *ctis.* adit capitis dolor, ne ventriculus biliosa, aut alia vitiosa colluvie sit infartus. His enim minimè convenit Lac, statim enim assumptum corrumpitur & varia infert Symptom. Ideo explorare debet Medicus, utrum æger lactis usum tolerare queat,

Ventri-

*Victus
ratio.*

Ventriculo prius leni purgatione evacuato, exhibeat initio ℥ iij. aut 4. lactis; id si probe concoquat, & nihil molestiarum ex eo sentiat, nec post assumptum lac gravitas in ventriculo sentiat, aut singultus excitetur, aut vomitus nausaeque succedat, nec calor in corpore, nec pulsus intendatur, tum potest integra ℥b manē ac vesperi propinari; post sumptum autem lac, nec violentius se commovebit, nec dormiet æger. In potu ad mensam utilis est Hecticis Cerevisia clara, qualis est *Brunsvicensis*, vel apud nos *Hildensis*. A mensa verò si sitis urgeat, levanda est aq. hordei cum Sacch. aut Syr. Viol. dulcorata, aut lacte ex 4. sc. frig. ma. & aq. hord. confecta. Aqua autem hordei præparabitur ex hordeo & uvis passis adjectis, quæ per conservam Ros. ac violar. transcolari potest fervens. Aut leviter sitis aq. Stillat. ex capone, quæ non tantum sitim sedat, verum etiam corroborat, & assumpta restaurat. Aromata autem omnia & quæcunque exiccant ac calefaciunt edulia ac potabilia, ut pernitiola, fugienda erunt. Cum autem in Hectica febre nihil sit magis perniciosum repletionem cibi ac potus sive saturitate, hic ordo & motus in alimentorum assumptione est servandus. Parum cibi ac potus pro vice assumat æger; interim tamen inediam ac sitim evitet diligenter. Præstat itaque Hecticis, ter aut quater cibum ac potum offerre, & quidem parum ac boni succi ex iis quæ paulo ante sunt enumerata.

Somnus.
Vigilia.

Somnus longus utilis est Hecticis, sed præfertur nocturnus diurno. Verum ubi vigiliis nocturnis infestantur, à somno diurno minimè sunt arcendi. Somni autem tempus opportunissimum est, 3. aut 4. horis ante alimentum assumptionem, aut post Balneum, de quo paulo post dicam. Exercitium omnemque corporis validiorem motum debet vitare Hecticus, quia exsiccat & calefacit. Satis itaque fuerit si peracto somno æger artus omnes leniter volâ confricet, & caput pectine demulceat, ut pori aperiantur, & leniter obambulet.

Exercitia.

Quantum ad excretionem & retentionem superfluitatum attinet, cavendum est, ne alvus Hecticorum sit adstricta; neve excrementa cum alvi tum Vesicæ diutius retineantur; id si contingat, leni Clystere subducatur alvus hunc in modum parato: *R. Malva. Mercur. Violar. Lactuca ana M. 5. Fl. Viol. Rosa. Nymph. Hordei ana M. I. Sem. Lini ℥ iij. concisa & contulâ coquantur in q. s. aq. ad tertias, colati hujus juris accipiat ℥b j. cui admisceantur Pulpa Cass. ℥ ij. ol. Viol. ℥ iij. Salis ℥ j. F. Enema.* Ubi verò & reliqua viscera obstructa esse concipiantur, violenta quidem omnia pharmaca evacuantia vitanda erunt, & satis erit exhibuisse *℥ x. Pulpa Cass. aut ℥ j. s. Manna in jure gallinaceo solutas, aut ℥ 4. Syr. Viol. sol. cum aq. Lactuca.*

Animi vehementes perturbationes, ac imprimis Ira, Tristitia & Sollicitudo vitandæ sunt Hectico; convenit autem moderata lætitia, quæ per Musica Instrumenta, & suavia amicorum colloquia comparari potest.

Animi
motus.

Medicatione autem & Topicis & intra corpus assumtis remediis, ita procedendum est. Initio si alvus sit adstricta, aut si hectica febris ex affectione Viscerum, Epatis, Renum, Ventr. aut intest. originem traxit, Clystere leni paulo ante descripto, aut Cass. Mannavæ excrementa flatulque subducenda veniunt. Deinde in Hectica febre utilissimum est singulis diebus bis, aut ad minimum semel in lavacrum aq. dul. tepidæ ægrum deducere. Cupham autem sive tinnam lavatoriam oportet tantæ altitudinis esse, ut æger usque ad collum se mergere queat, & in ea quidem aq. concoquendæ sunt sequentes herbæ: *R. Malv. Alib. Viola. fol. salicis capita papa. albi fol. Lactuca, graminum viridia. fol. Tilia. fl. Rosa. Nymph. an. ad libitum conscindantur & concoquantur.* In eadem aqua decoquatur quoque sacculus in quo consuta sunt *Semi. Lini sœnis Graci, ana ℥ 5. Se. Psylli ℥ ij. Rad. Althea ℥ 5. Cort. Tilia ℥ iij. Quo sacculo in balneo universum corpus confricetur.*

fricetur. Fiat autem lotio pro virium ratione ad spacium unius aut semihoræ, & oportunissimum lavandi tempus erit vel manè jejuno existente Ventriculo; vel paulo ante cœnam, semper prius depositis excrementis alvi & vesicæ, si modò natura ad egestionem sit prompta. Cavendum autem ne inter lavandum ipsum caput humectetur. At si vires valde sunt debiles, una hora antequam in balneum descendat æger, commodè illi offerri comedenda possunt ova tremula ex aq. Rosa. saccharo conspersa, vel si famem ferre queat, ea ipsa ova post balneum offerantur. Lotione peracta, universum corpus mundis lintheolis ætate ad luculentum ignem; Hyeme verò in tepido Hypocausto abstergetur, ac postea rursus madefiat cum madidis lintheolis in aq. Ros. imbutis, & ita per se siccare dimittatur; corpore exiccato inungatur spina dorsi, & utraque Hypochond. sequenti Linimento: *℞ Ol. viol. Rosa. Nymph. Citon. ana ʒij. Amygd. dul. ʒijj. Mucag. ex se. Citon. & Psylli cum lacte muliebri confecta ʒij. cera alba q. s. F. Linimentum. aut ℞ Ping. Gallin. rec. Medulla cruris vitul. Butyr. rec. non saliti ana ʒij. liquefiant, eisq. admisc. ol. viol. Amygd. dul. Nenuph. ana ʒj. Cera q. s. F. unguentum, quod ter quaterve eluatur cum aq. Rosa. Deinde admisc. Mucag. ex se. Citon. & Psylli ʒij. cum lacte muliebri facta, probè subigantur. F. unguentum. Hisce unguentis & inunctionibus uti poterit æger quotidie bis, etiam extra lotionem. Interim tamen si in Hæctica adsit quoque vel Epatis, vel Renum, vel Ventriculi vel intestinorum inflammatio, illorum quoque viscerum regiones peculiaribus Linimentis & oleis convenientibus diligenter sunt inungendæ; ut si Epar sit inflammatum, dextrum hypochondrium inungatur ol. Rosa. & Nymph. si ventriculus uratur, inungatur ol. Masti. & sic de reliquis. Post balneum & inunctionem ad unam vel semihoram quiescat æger; si somnus irrepit, dormiat parum; sed si à siti urgea-*

Linimen-
tum à
balneo.

tur, ante somnum bibat haustum vel lactis Amygd. vel Caprilli. Ac tandem post unam vel alteram horam alimenta seu cibi ac poriones parcissime, ut supra monuimus, ex iis quæ annotata sunt, vel ex caponibus pullisque contusis eis offerantur. Remediis autem & alterantibus, & naturam corroborantibus absumptamque substantiam restituentibus, & hisce similibus hac sequenti ratione utatur: Foris applicentur Epithema per intermedias horas, & cordi quidem tale: *℞ Aq. Still. Nymph. Lact. Viola. Rosa. ana ʒij. Aceti rosa. ʒj. Camphora in eis dissoluta ʒj. Sandali rub. sp. Diamarg. frig. ana ʒj. F. Epithema, quod duplicatis lintheolis exceptum cordis regioni imponatur, & exsiccata in eo iterum madefiant; Epatis verò regionis seu dextro Hypochondrio tale concinetur Epithema: *℞ Aq. cich. Ros. ana. ʒij. Acet. ros. ʒj. Spec. Diarrh. Abb. Santal. omnium ana ʒj. Aq. viol. ʒi ss. Misce, fiat Epithema; quod lintheolis exceptum imponatur; intra corpus hisce utatur remediis: *℞ Rad. Pimpin. Endiv. Cicho. ana ʒss. Rad. Borrag. ʒj. Cons. Ros. Borrag. Bugloss. Viol. Nymph. ana ʒvj. Hord. mundati M. l. pru. Vngar. No. x. Pass. mi. ʒj. Sebesten No. x. concoquantur cum ʒb 4. aq. in duplici vase per ʒj. horas colentur, colato juri admisc. Syr. Cicho. Nymph. ana ʒj. ss. Viol. ʒij. cujus mane ebibat ʒv. donec tota potio sit assumpta. Vespere autem ituro cubitum, præbeatur lactis ex 4. se. major. contusis cum q. s. aq. Hord. parati & Saccha. Candi. in Syr. Viol. concreto, ad palati ægrotantis placitum dulcorati haustus. Et eo quidem lacte & interdium ad sitim restringendam uti poterit. Quamvis nihil utilius hæcticis quàm aqua ex 4. sem. frig. major. s. Cordial. & herb. Epat. cum sanguine porcelli destillata, & mani. Christi cum perlis dulcorata. Aut matutino tempore bibat haustum sequentis potionis: *℞ Lactuca. Bugl. Portul. omnium virescens M. S. 4. se. frig. ma. ana ʒss. se. Berberis ʒij. cum hisce præscriptis her-****

Aqua Ca-
ponum.

bis

bis decoquatur capō vel pullus gallin. qui è jure extractus unā cum herbis contundatur, & in balneo Mariæ destilletur. F. liquor limpidiſſ. Aut R Caponem aut pullum galli evisceratum, cujus capacitati impone anguillas excoriatas & in frusta concisas, ſimulque concoque ad ſemperfectionem. Deinde è jure exemptus contundatur & in balneo Mariæ destilletur; præſcripti utriuſque liquoris ſæpe bibat æger 3. 4. Mirum enim in modum refrig. & humect. Idem præſtat & aq. ſtil. cancr. flu. à teſtis liberatorum & ſemicoctorum ſine ſale, aut utatur ſequenti portione manè ac vespèri: R Rad. Bugloſ. 3j. Glycyrr. abraſa 3ſ. Rad. Satyr. 3j. 5. Herb. Lactu-
ca, Portul. Ciccho. ana M. 5. Se. Malva M. 1. Gebeſſen N°. x. 4. ſem. frig. ma. ana 3ij. Sem. Alkekengi 3j. 5. Berberis, Sem. Citon. ana 3j. Conf. Viol. Bugloſ. Nymph. ana 3ſ. carniū cancrorum ſemicoctorum ſine ſale & à teſtis mundatorum 3ij. His omnibus contruſis & concuſis affundatur aq. hord. ſimpl. 1b 6. & ſimul concoquantur in cantharo probe obturato & in athenum aq. plenum collocato, ſive in duplici vaſe per 2. hor. refrigerata colentur, & colato liquori immiſce Saccha. candi Viola. q. ſ. pro dulcoratione: F. potio. Utiliſſimum quoque erit ſubinde bibere aquam ſtillatic. Violarum purpurearum cum aq. Nymph. aut aq. cancrorum, prius ſine ſale coctorum, aut aq. teſtudinacea. quæ ſi in promptu haberi nequeunt, ſubinde, ut diximus, utatur æger aut lacte caprillo, aut cremore ptifana, aut aq. hord. cum q. ſ. ſacch. candi. aut Syr. Viol. dulcorata. Porro ad virium corroborationem, & aſſumptæ ſubſtantiaæ reſtaurationem crebro, & diu & noctu, guſtet æger fruſtulum Marcypanis placenta, quæ conſicienda eſt ex Amygdalis, nucleis pineis, aut Piſtaciis ana 3ij. prius probe emundatis & craſſiuſculè concuſis, & in aq. Roſ. per noctem maceratis, ac deinde cum albiſſimi ſacchari 1b j. in mortario diligenter contruſis, irorato pauxillo aq. Roſa, cum quibus ſimul

contundi poſſunt 4. ſe. frig. ma. ana 3ſ. F. ſ. a. panis Martius. Ex præſcriptis rebus commodè conſici quoque poſſunt & morſuli adjectis carniſus caponum aut perdium concoctis & minutiſſimè concuſis cum ſach. albiſſ. in aq. Viol. reſoluto & ad perfectionem cocto, quibus addi poſſunt & Spec. Diamarg. frig. aut Diatrag. frig. pro Medici arbitrio, aut æger guſtet crebro & ſemper poſt ſumptum alimentum, ubi amplius non bibere vult, ſemijuglandis quantitate ſequentis Electuarii: R Rad. Ciccho. condit. citri. condit. ana 3j. pyrorum Moscat. cond. Diaciton. ex ſucco Citon. & Sacch. ſine ſpeciebus conſ. 3ſ. quibus miniſſimè concuſis admisc. conſ. Roſ. Viol. Borr. Nymph. ana 3ſ. ſp. Diamarg. frig. Diatrag. frig. ana 3j. 5. pul. ſem. pap. albi ſem. Portul. ana 3j. Coral. rub. præp. 3ij. cum q. ſ. Syr. Viol. F. Elect.

Quia verò diuturnior ſemper eſt curatio Hecticæ, quàm aliarum febrium, ne æger unius aut alterius remedii continua uſurpatione ſatiſdium concipiat, ſubinde medicamenta mutanda ſunt, & nunc illud, nunc aliud ei offerendum. Porro ubi Hectica febris adjunctam habet ſibi putridam febrem, quod non raro accidere conſuevit, tum nec illius curatio omitti debet: Sed ſi vires ferant, certis interval- lis validioribus remediis putrida illa colluvies & materia putridæ febris concoquatur & evacuetur, benignis tamen Pharmacia: Quibus evacuatis præſcriptis remediis, ad Hecticæ curationem ſtatim procedatur. Quæ autem remedia ſingulis putreſcentibus humoribus maximè accommodata ſint, ſupra in curatione febrium humoralium tradidimus. Quibus præterea remediis Symptomata Hecticæ febris, ut ſunt alvi fluxio, Syncope, & ſimilia, quæ Hecticam comitari ſolent, mitiganda ac tollenda, paulo poſt in Symptomatum febrilium curatione & enumeratione dicemus.

*Hæctica
senilis.*

*Hæctica Senilis, sive Senum marcor,
quid? quæ ejus causa, signa, &
quomodo curanda.*

Non ab Hæctica febre tantum exare-
scit humidum primigenium in corde &
aliis visceribus, & absumuntur molliores
corporis partes; verum etiam à senio æta-
teque decrepitorum, quæ tamen absum-
ptio longè diversa ratione fit, quam in
Hæctica febre; in qua præternaturalis ca-
lor Substantiæ partium imbutus depopula-
tur & humidum radicale & humores ali-
mentarios, & colliquat corporis partes.
In senectute autem diminuitur calor natus,
& augetur frigiditas, quæ conjuncta est
cum summa siccitate; per exiccationem
itaque, non per inflammationem, in seni-
bus absumitur substantia partium, cor-
rugaturque cutis ac debilitantur omnes vi-
res. Constat autem macilentia & absum-
ptioni senum nullum hæcenus remedium
inventum fuisse, quo & natus calor & hu-
midum radicale restaurari potuisset. (Hoc
enim si possibile esset, immortalitatem se-
nibus polliceri possemus.) Quicquid tan-
tem impudentissima Paracelsi pecora de suo
auro potabili & gemmarum tincturis ac
magnalibus nugentur ac gloriantur, se
nimirum posse illis hominibus jam decre-
pitis juvenilen formam, & vires restituere,
& vitam ad multa secula producere:
quæ meræ sunt præstigiæ. Cum itaque
inevitabile sit fatum semel mori, satis erit
cordatis Medicis de conservatione sanitatis
senilis Homericum præceptum illis adhi-
bere. Ita autem inquit Homerus; *ἔπλεον ἔστι γὰρ
φύλαττε Εὐδαιμονὺν μελαινὸς ἢ ῥόδινον ἐστὶ γὰρ
ρόδινον.* Hæc conveniunt & salutaria sunt se-
nibus, crebè lavari, ferculis bonis vesci,
que vino uti, in molli lecto placidè dor-
bonomire, nullis curis gravari.

*Dista se-
num.*

Est tamen marcor morbus, quo non
tantum senes, sed & in aliis ætatibus con-
stituti corripui possunt; quam Hæcticam
senilem, inde quod marcorem & rugas se-
niles inducere consuevit, sed minus propriè
vocitant. Non enim est Hæctica, nec febrim

habet adjunctam ut Hæctica, sed potius ex
siccitate solidarum partium originem habet.

CAUSÆ hujus seniles marcoris sunt,
αἰσχυρ. quidem, extrema siccitas, & calo-
ris nativi penuria in solidis partium substan-
tiis, ac potissimum cordis & aliorum visce-
rum, in quibus humidum radicale & ali-
mentarium exsiccat. Item immoderata
refrigeratio partium Nutritioni servien-
tium: Aut durus & Scirrhus tumor ea-
rundem partium, imprimis Epatis, Ven-
triculi, Renum & intestinorum. *Πεσος.*
causæ possunt esse venena & alimenta im-
pensius refrigerantia & exiccantia; im-
primis mæror.

SIGNA Hæcticæ senilis, quantum ad ha-
bitum corporis attinet, similia sunt mar-
cori Hæcticæ febris atque *φθίσις*. In his
tamen differunt, Extremæ partes semper
frigent, ideo ignis luculenti præsentia de-
lectantur, nec post assumptum alimen-
tum calor in corpore, uti in Hæcticis ma-
gis augetur, neque volæ manuum sunt ca-
lidæ, Urina magis est cruda, & albidior,
verum ex urinis non potest certi aliquid sta-
tui, cum & color urinæ & substantia per
assumpta subinde mutantur.

Prognosticum est; consummatus diutur-
nusque marcor sine febris; in quo cor aridius
est factum, ejus frustra curatio tentatur.

CURATIO Hæcticæ senilis in hume-
ctatione & moderata calefactione, virium
corroboratione, & assumptæ substantiæ
restauratione consistit, quæ per victus ra-
tionem, remediorum adhibitionem, &
balnea humectantia ac modicè calefacien-
tia tentanda sunt.

In victus ratione aër ad humiditatem &
moderatam caliditatem declinare debet,
cibi quoque sint humectantes & moderate
calefacientes, concoctique faciles, ac pu-
rum sanguinem generantes, ut sunt carnes
pullorum gall. caponum, perdicum, avi-
cularum sylvestrium & bovis juvenculi, ex
iisque parata juscula, ova sorbilia, & ex
iisdem cum cerevisia confectum juscu-
lum. Ex piscibus percæ aculeatæ cum
febrim

Cura.

vino coctæ, ac cum cinamomo ac saccharo conditæ; item lac amygd. Amygdalæ pineæ nuclei & uvæ passæ. Lac caprillum & oryza cum lacte caprillo, & saccharo cocta; Item cremor ptisanæ & grumi hordeacei, id est, hordei excorticati (Gerstgruben nostrates vocant,) cocti cum jussulo carnis ovillæ aut caponum. In potu conferunt vinum Rhenanum opt. cujus Hb admixtæ sint ℥iij. aut 4. aq. hord. & sacchar. ad arbitrium ægrotantis: de ordine & modo bibendi edendique id observetur, ut pro vice parum, & in die ter aut quater alimentum offeratur; idque prospiciendum, ut si alvus sit obstructa, leniatur enemate ex foliis Mal. alb. flo. chama. Melil. & anethi decoctis, cujus Hb admixta sint pulpa cass. ℥ij. & ol. anethi ac Chama. an. ℥j. s. salis ℥j. Quo Enemate singulis seprimanis semel aut etiam pluries, si necessitas exigit, uti poterit. Balneum instituitur aq. dulcis in tinna sive cupha, in qua concoquantur herbæ odoratæ humectantes & moderatè calefacientes, ut sunt rad. Alb. Malv. cum foliis Meliss. Salvia, Major. Melil. Chama. Aneth. Beihon. Serpill. & similes. Post balneum inungatur spina dorsû ol. amygd. dul. chama. Aneth. ping. rec. gall. & ex his præscriptis concinnato unguentum, cui mucago ex se. lini & rad. Alb. cum lacte muliebri confecta pro arbitrio admisceri potest. Ventriculus autem semper inungatur cum ol. calefacientibus & humectantibus, qualia sunt de Menthâ, Absint. Nardo & Mastiche. Vires corroborentur, & absumpta substantia partium restauretur Elect. & Morfellis & Marcipane, quæ paulo ante in hectica febris præscripta sunt, additis tamen aromatis, ac speciebus moderate calefacientibus; ut Zingib. condit. cinam. & speciebus aromatic. Rosa. Diarhod. abb. & similibus. Hæc de hectica senili mihi dictanti anno 1577, die 12. Augusti oblatas est æger, Vir Nobilis Iohannes Requentin Hectica senili satis confirmata correptus, & tam macilentus ut vix ossibus hæerere vide-

retur, in cujus curatione præter præscripta remedia primum exhibui ℥x. P. Cass. Deinde cum originem mali ex ventriculi & intestini vitiosa constitutione haberet, quotidie manè ac vespere exhibui gutt. xj. ol. vitriol. & quotidie semel in balneum collocavi & inunxi, ac spero salutare manus Christi summi Archiatri, quem mihi collegam exoravi, adeoque meam curationem prosperum eventum habituram, confido.

SECTIO III. DE PESTE.

Qua Febris in omnibus humana natura partibus accenditur, totique natura perniciem adfert?

Pestis, sive febris pestilentialis. Omnes enim aliæ febres incendantur aut in spiritibus, aut in humoribus, aut in solidis partibus tantum. Ex iis enim tribus partibus constare humanam naturam, ait Hipp. Pestilens verò febris, omnes hæc partes brevissimo temporis spatio adurit, vastat & destruit: ac primum quidem pestilens contagio cum aëre infecto intra corpus hausta, accendit Spiritus, & levissimam excitat febrim, Ephemeræ similem, ac mox in humores transilit, eosque corrumpit; aut primum humores aggreditur, cum sævissima febre, & diris symptomatibus: Paulo post humidum primigenium in solidis partibus sparsum depopulatur, in eoque calorem nativum extinguit, vitæque perniciem adfert.

Pestis sive Pestilentialis Febris quid.

Λοιμὸς Pests, & ἰνδηνία morbus popularis, πυρετὸς λοιμώδης Pestilens febris seu contagio idem significant, & sunt nomina unius sævissimi & contagiosi perniciosissimi morbi, qui eodem tempore certisque in locis sua contagione permultos inficit & jugulat. Febris autem pestilens nominatur, quia perpetuò cum febre niti quidem, si spi-

ritus occupavit; savissima autem, si in humoribus primum est accensa, homines invadit. Pestilentem febrem Hieronymus Fracastorius Italus, Medicus ac Philosophus Doctiss. Ita describit: *Pestilentem febrem dicimus esse febrem sordida & profunda putrefactionis, includentem seminaria acutissima contagionis per se, propter quod & lethalis est, & ad alios contagiosa.* Verum cum putredo per se non sit sufficiens, ut contagiosa sit febris, nisi inclusa habeat seminaria pestis; & quid illud sit seminarium, nondum sit satis explicatum, quod nos Qualitatem seu tincturam venenosam esse judicamus, & tamen quale sit illud seminarium, & unde in aërem accedat, ignoremus, aliam definitionem Pestis causalem, Christianæ fidei analogam subjiciemus. Nimirum, *Pestilentiam sive pestilentem febrem esse poenam divinam ulciscentem enormia scelera hominum, per venenata seminaria pestis in aërem à Deo sparsa, ac deinde per contagionem, in multos propagata.* Et ab hac definitione non dissentit Hippocr. Qui pestem Divinam quiddam esse fatetur; nec Gal. ipse, qui lib. 1. cap. 4. de differentiis febrium, ubi de causa febris pestilentialis disserit, ita inquit, τὸ αἰετοειδὲς ἐμφέρονται πρὸς τοὺς σπέρματα, id est, in aëre contineri quædam pestilentiae seminaria. Et cum Galenus non explicet quid sint seminaria pestis, nos venenatam & contagiosam qualitatem à Deo in aërem sparsam judicamus.

Quid vocetur contagium, & qui morbi sint contagiosi.

Contagium est quicquid aut corporali suo contactu, aut mediante spiritu, aut aëre halituque, aut fomite alium inficit, & suam venenatam qualitatem communicat. Fracastorius dicit: *Contagium esse infectionem quandam ab uno in alium transeuntem.* Plures autem sunt morbi contagiosi, sed non, ut pestis, lethales, quales, lepra, elephantiasis, & Siphilides, quas morbum Gallicum vocamus, variolæ & morbilli, qui suo contactu inficiunt; plures contra-

giosæ est per halitum ex infecto attractum. Lippitudo contagiosa est per radios spirituum; Pestis autem contagiosa est, cum per aërem infectum, tum per halitum infecti, tum fomitem semina pestilentiae in se continentem.

Quomodo, & quod modis Pestilens contagio inficiat hominum corpora.

Diximus seminaria pestis sive tincturam per aërem esse sparsam; cum autem ad conservationem vitæ, aëre ne momento quidem carere queamus, sed subinde intra corpus nostrum attrahere cogamur, idque tum per inspirationem per os & nares; tum per perspirationem per poros cutis, qui non aliud sunt, quam oscula arteriarum ac venarum, per quæ corpus universum perspirabile est, in quæ ubi aër pestilens irrepsit, statim in venas ipsas fertur, & sanguinem reliquosque humores inficit ac corrumpit, si verò per oscula arteriarum irrepsit, ad cor defertur, & spiritum vitalem inficit, & febrem pestilentialem accendit. Secundò inficiuntur corpora per halitum & vapores ex conversatione infectorum attractos, simili ratione ac per aërem inspirando & perspirando. Tertiò inficiuntur fomite, id est, contrectatione & usurpatione rerum corporumque à pestilenti contagione infectorum, in quibus seminaria pestis continentur, tincturaque pestifera imbuta sunt, ejusmodi sunt vestes, stragulae, lectuli, merces, cista, vasaligneæ, ædes infectæ, conclavia infecta, parietes, libri, & omnia vasa utensilia in loco non perslabili, & pestilentiali contagione infecto contenta & occlusa, in quibus pestilens contagio etiam per multos annos delitescere, ac alios suo contactu inficere potest. Nec id sanè admirationi nobis esse debet, cum videamus alieno odore & lignea vasa & cubacula imbui, imbutumque odorem longo tempore in iis conservari; & videmus parietibus tabulatisque tincturam fumi tam tenaciter in-
 cior,

Definitio
Theologi-
ca.

Contagium
quid.

Pestis
quod mo-
dis conta-
giosæ.

Pestis
communi-
catur cor-
pori tri-
bus modis.

Simile.

cior, quam ullus odor aut fumus, quæ tinctura similis ferè est odori exigui fili sulphurati, si accendatur, qui citissimè totum conclave replet & inficit, & ad nares omnium, qui in cubiculo sunt, sine deprehensione visus, fertur.

Quæ corpora sint magis apta ad concipiendam pestilentem contagionem? Et cur quidam, cum contagiosis continuè conversantes, non inficiantur.

Corporum in corpore imbibenda peste capacius.

Non omnis pestifera contagio ejusdem est naturæ, vel non ad omnia corpora æqualem habet conformitatem; aliæ enim contagiones pestiferæ analogiam habent ad corpora puerorum æt juvenum; aliæ ad corpora adultorum; aliæ, sed rarius, ad senes; & si quid conditio fortunæ ad id faciat, aliæ habent analogiam ad corpora prædixitum; aliæ ad tenuioris fortunæ hominum corpora; aliæ magis ad alterutrum sexum; præterea aliæ analogiam habent ad spiritus, quæ omnes, quotquot corripunt, jugulant; aliæ ad corpora sanguinea, aliæ ad biliosa, aliæ ad pituitosa; rarius ad Melancholica. Ea itaque corpora ad quæ pestilens contagio analogiam & similitudinem habet, omnium maximè & citissimè inficere solet. In genere autem ea corpora, quæ temperamento humidiora & calidiora sunt, & quæ multa fordida colluvie sunt referta; item quæ cutis raram habent texturam & constitutionem, & poros nimium dilatatos ac patentes, ea magis sunt apta ad concipienda seminaria Pestis. Quod autem quidam in pestilenti aëre, & inter infectos continuè versantes, non inficiantur à pestilenti contagione, hujus rei tres potissimum possunt dari rationes: *Prima* & *præcipua* est Divina conservatio ac protectio, quæ eos potissimum conservat mirabili ratione, qui in officio suo versantur fideliter, ut sunt, ægri administrati, verbi Divini Concionatores, & fideles Medici, qui ratione officii suam operam & præsentiam infectis denegare non possunt; idque juxta illud; *Angelis suis mandavit de te, ut cu-*

Rationes, cur aliqui, cum pestilentibus conversantes, non inficiantur.

stodiant te in viis tuis, id est, *in tua vocatione*. *Secunda* est, quod pestis seminarium sive tinctura, ea corpora, ad quæ non habet analogiam, non facillè tingit aut inficit. *Marsilius Ficinus* recitat historiam, quales & hodie sæpe contingunt, se habuisse puellam 12. annorum peste infectam, quæ filiolum infantem per integrum diem gestavit, & præmansum cibum ex ore infecto præbuerit, & tamen non sit infectus infans, reliquos autem qui procul starent, infectos fuisse. *Tertia* est, assuefactio & audacia: *Consuetudo enim minus ladunt, teste Hipp. 2. Aph. 50.* Qui itaque soliti sunt diutius cum infectis conversari, non facillè inficiuntur.

Quæ sint causa Pestilentis contagii.

Causas morborum distinguunt Medici *Causa pestilentie.* in *æternas* interiores sive intra corpus delitescentes, & in *æternas* exteriores, id est, externas, quæ foris accedentes, morbos excitant. Pestilentis autem contagii *æternas* causas ajunt esse Medici, sordidam in corpore putrescentem humorum colluviam: Venarum & arteriarum obstructions, quam semper sequitur putrefactio, & animi perturbationes & anxietates; *Nam tempore pestis plures metu pestilentie & mortis ferè inficiuntur, quam è contagioso aëre.* Perturbationem itaque animi ego maximi momenti causam esse judico, per quam magna hominum pars peste corripitur. Omnium autem causarum *æternas*, quarum aliæ ex astris, aliæ ex aëris suprema regione, aliæ ex aquis, aliæ ex terra pendent. Ex astris aërem infici ajunt Medici, ubi Martis & Saturni stellæ in humana figura asterismo cœunt, vel cum ipsis erraticæ stellæ aut conjunguntur, aut nos infelicitèr intuentur; id autem probant astrologicis rationibus: Sed certum est ex astris non posse contagionem pestilentem pendere, nisi per accidens, ubi nimirum motu aut lumine suo vapores tetros ac venenatos è terra & aquis eliciunt & in aëra trahunt: Itaque hæ causæ ex astris ut non contemnendæ ita non magnè operè extimescen-

timeſcendæ. Ex aëris ſuprema regione inferiorem & noſtrum corpus ambientem aërem inſici tradunt, ubi ex aquis & terra, ut diximus, vapores halitusque ſyderum virtute ſuſum trahuntur, & in ſuprema aëris regione exiccati incenduntur & exuruntur, quorum cinis recidens inferiorem aërem venenata peſte tingit. Ut cum Cometæ, aut cauſinata ſeu incenſiones aliaque ignita portenta in aëre flagrant & conſumuntur: & Porphyrius de Cometis ſcribens, Cometam ab Oriente emergentem ad Occidentemque vergentem, graviffimam peſtem, quam nemo evitare queat, inferre hominibus, ait. Ex aquis peſtilenti contagione aërem inſici ajunt, ubi ex putreſcentibus Jacobus, & ſtagnantibus aquis, in quibus ob inſignem putredinem piſces moriuntur, anguillæ ad ripas progrediuntur, & reptilia innatantia in littus prorepunt, matutino tempore halitus elevati in aëre tanquam nebulae diutius hærent, ac tandem per aëra diſperguntur. Ex Terra oritur contagio, cum per terræ motum venenatus halitus erumpit, qui aërem facile inſicere poteſt; aut ubi per terram in aliqua regione cadavera clade occiſa inhumata manent ac putreſcunt; aut ubi in aliqua regione annonæ caritas famelique durius ac diutius homines affligit. Ex prava enim victus ratione peſtilens putredo in corporibus generatur, quæ tandem per mutuam converſationem ex venenata exſpiratione ſe mutuò inſiciunt, juxta vulgatum dictum: λοιμὸς καὶ λιμὸς. *Peſtis poſt famem.* Et has quidem cauſas ac conſimiles, peſilentem contagionem excitare & ſignificare poſſe, ipſa ratio & experientia teſtatur. Verum quia non ſemper eventus has cauſas ſequuntur, ſæpiusque fallunt, vel ſanè aliam calamitatem quàm peſtem mortalibus adferunt; (pura enim corpora aquæ, & ſæpe citius quàm ſordida colluvie & belluinatione inſectata, inſiciuntur) ſæpè & ad Cometarum apparitiones, & ſtagnorum putreſcentiam

Peſtes non ſequuntur. Longè alias & certiores venenatæ Peſtis cauſas è *Moyſe & Prophetarum* ſcriptis haurire poſſumus. *Πενη.* quidem eſſe flagitia, & enormia peccata hominum; *Προηλ.* autem iidem docent eſſe, ipſum Deum iracentem peccatis, & ſpargentem ſeminaria Peſtis in aërem, quibus flagitia puniuntur, non multum habita ratione corporis, utrùm ſint pura vel impura, nec ætatis, aut ſexus.

Signa Peſilentia, & infectorum, quæ.

Triplicia ſigna peſilentis contagionis traduntur, Peſtis videlicet futuræ, præſentis & infectorum.

Signa futura peſilentia in cauſis Proca-tharcticis, quæ & cauſæ & ſigna ſunt, recensuimus, nimirum aſtrorum inſelices collocationes, cometarum & cauſinatum incenſiones, aſtrorum crebros & pluvioſos ſtatus, aquarum inuſitatas inundationes, ſtagnorum putrefactiones, locuſtarum & cadaverum corruptiones, terræ motus, annonæ diuturnam caritatem, & ſimiles, quæ ſigna ut plurimum hæc lues ſequi ſolet. Præterea certiffima futura Peſtis indicia ſunt, ubi in alia regione vel urbe ſcelera hominum accumuluntur, & vitia pro virtutibus habentur, & enormia flagitia impunita relinquuntur, Deique verbum contemnitur, hominesque amplius à Spiritu Dei ſe regi non patiuntur.

Signa præſentis Peſtis evidentia ſunt; ubi-
cunque enim in eodem loco ac tempore
conſimili morbo plurimi moriuntur, &
alii ab aliorum conſuetudine ac converſatione inſiciuntur, præſentis peſtis ac contagii certiffima ſunt indicia. Remotiora ſigna præſentis peſtis ſunt, canum nocturni ſædi latratus atque ululatus in ſtagiis domorum.

Signa verò contagione jam infectorum,
alia ſunt communia, alia lethalia. Communia, & vulgata ipſa ſymptomata ſunt, ab infectione in corporibus excitata, quæ tamen variantur pro natura & temperamento corporum; ejus generis ſunt febres vel mites & inſidioſæ, vel feroces
atque

atque malignæ. Februm autem satellites, qui & antecedunt & comitantur febres pestilentes, sunt hi præcipui; Insolita lassitudo corporum, capitis dolor, somnus profundus, nonnunquam vigiliæ, faciei decoloratio, anxietas, cordis palpitatio, morsus circa præcordia, appetitus prostratio, nausea, vomitiones, fitis vehemens, linguæ ariditas, quandoque sordities, bubones & anthraces circa emunctoria; ex quorum eruptione quoque dignosci potest, quodnam principale membrum maximè sit infectum; Bubones enim sive tumores, vel carbunculi, ponè aures aut circa collum erumpentes, cerebrum; subalis, cor; circa inguinæ, epas, venenata pestis qualitate imbuta esse, ostendunt. *Quando verò nulli vel bubones vel anthraces in pestilenti infectione erumpunt, eo est pestis perniciosior.* Venenum enim tum in spiritibus, & non in corruptis humoribus delitescit, & naturæ expulsi-
vis, quæ venenum expellere debebat, prostrata est. His signis accedunt alvi nonnunquam obstructio, item excretio alvi putrida & foetida. Ex pulsu autem & urina infectorum nulla certa indicia sumi possunt, quæ subinde variantur pro humoris corrupti natura. Urina enim in quibusdam rubet, in aliis livida aut subnigra, in aliis crassa & urinæ subjugalium similis, in quibusdam tenuis & cruda. Nonnunquam sanis & inculpatis urinis similima. Hujus causa est tinctura pestis non in sanguine aut humoribus, sed in spiritibus hærens. Alii dicunt causam esse expulsi-
væ facultatis imbecillitatem, quæ crassiores sanguinis & humorum partes per renes non ampliùs secernere & propellere queat.

Signa lethalia.

Signa lethalia & perniciofa sunt repentina omnium virium in initio prostratio, nigra evomitiones, bubonum carbunculorumque & macularum subita eruptio extra cutem; & subita iterum evanescentia, anhelitus foetidus, sanguinis

è naribus profusio, si nulla sequatur morbi levatio; Remotum signum mortis est, nocturnum ad fenestras ægrotantis volatus, & infelix clamor. Punctorum livescientium subnigrorum per cutem effusio, certissimum est indicium præsentis mortis.

Pestilenti contagioni qualis sit adhibenda curatio.

Admiratione dignum est, quod veteres Medici, Hippocrates, & Galenus, etsi Pestis & pestilentium febrium sæpe mentionem faciunt, de ejus tamen curatione nihil laude dignum tradant; forsan quod ejus curationem valde incertam ac difficilem esse viderint; vel quia pestem à Deo ipsis mortalibus immitti, cujus potentia ac voluntati nullis remediis resisti possit, arbitrati sunt. Hippocrates enim pestem divinum quiddam esse dicit: Et Galenus ejus causam præpotentem esse, scribit. Et Hipp. quidem hæc verba subiungit: τὰ φυσικὰ βοηθήματα & λόγος τῷ ἐπιδημίῳ λοιμικῇ πάθει, id est, *Naturalia remedia non tollunt luen pestilentis morbi.* Nos Deo auxiliante tripartitam Pestilentis contagionis instituimus curationem; nimirum, *Præservativam, Liberativam & Symptomatum remotivam.*

Curatio Pestis Præservativa, in quibus rebus consistat.

Præservativa curatio, quæ Græcis πρὸς φυλάξιν nominatur, versatur circa justam gubernationem causarum naturam nostram conservantium, seu earum rerum, circa quarum inculpatam administrationem homo diu vivere nequit, quas Medici *Res non-naturales* vocant, quæ sunt numero VI.

I. *Ær.* II. *Cibus & potus.* III. *Somnus & Vigilia.* IV. *Motus & quies.* V. *Excretio & retentio.* VI. *Animi perturbatio seu affectus.* His adjicitur & remedium intra & extra corpus administratio: de quibus rebus brevissimè differemus, & remedia prophylactica ubique referemus; ac in fine experta quæque pharmaca enumerabimus.

Aëris qualis habenda ratio faviente Pestilente contagione.

Aër principale pestis receptaculum.

Aërem seminariorum Pestis esse receptaculum, & tempore Pestis semper venenata qualitate tinctum & imbutum esse, paulo antè commemoravimus. Quicunque enim peste inficiuntur, sive id contingat per inspirationem, sive per perspirationem, sive per fomitem, corporumque infectorum contrectationem aliorumque exhalationem, ac transitum ab uno ad alium, omnes eos Pestè contaminari mediante aëre, necessum est. Quare inter omnes causas, quibus natura nostra conservatur, curatione preservativa omnium maxima & diligentissima habenda est ratio Aëris, ut nimirum quàm fieri possibile est, eum evitemus infectum, & è corporibus nostris excludamus, aut tantum ut prius correctum & probè purgatum purificatumque admittamus & hauriamus. Ad evitandum autem aërem contagiosum, omnium Medicorum consensu, & rationis approbatione, nullum præsentius remedium est tempestivo discessu è loco infecto in salubrem. Hæc tria enim adverbia cum tribus suis verbis certissima sunt remedia Pestis: *cito fugere, procul discedere, & tardè redire.* Verum cum non omnibus liceat suæ salutis fugam consulere, & sine notâ impietatis vocacionem suam deferere, ex infecto loco in salubriorem discedere, summa cura adnitendum est, ut & publicus communisque aër, & domesticus subinde alteretur, corrigatur, purificetur, & pestis seminaria in eo extinguantur.

Quomodo & quibus rationibus publicus ac communis aër commodè purificari queat.

Publici aëris purificatio quomodo instituerenda.

Ad publici aëris purificationem necessarium requiritur boni ac pii Magistratus autoritas & officium, ut nimirum Magistratus præcidat omnes occasiones putrefactionis & infectionis publici aeris; id quod fieri potest, si omnibus subditis severè injunxerit studium mundicie, & curaverit ex publicis plateis ac cisternis omne cœnum,

sordes & spurcitiem, in quibus maxime hæret & delitescit tinctura Pestis, extra urbem removeri ac deportari. Si stabula porcorum (quorum virulentus fœtor ipsa pestilentia perniciosior est,) è publicis plateis demoliantur. Si laniis ac tonsoribus severè interdicator, ne mactatorum animalium, aut venæ sectione detractum cruorem venenatum; & salsamentariis, ne suos putridos garos & putrefactorum piscium salsugines fortescentes, ante ædes suas (ut hic moris est) profundant; si denique curaverit, ne publica balnea, in quæ promiscuè & bene habentes & infecti simul ingrediuntur, haberi permittantur; si caveatur, ne peregrini ex infectis locis intra civitatem hospitio excipiantur, aut contagio infectæ merces importentur: si ædes, ex quibus plura funera elata sint, ad minimum ad duos menses studiosè occludantur, & inhabitantibus injungatur, ut interim purificationi ædium & aëris contagioni per fumigationes & flammam studeant; si Magistratus publicam aliquam habitationem in aliquo Templo extra urbem cum lectis aliisque rebus necessariis & oportunis administris exstruat, & adornet sumptibus publicis à civibus exactis, in quas misera plebecula, pauperiores, famuli & ancillæ deduci & sustentari queant; si corpora mortuorum Pestè, non intra mœnia, sed ante portas urbis in honesto cimiterio sepeliantur, & in terram altius defodiantur. Cum autem nulla re citius commodiusque infectus publicus aër purificari, & seminaria pestis in eo extinguì possint, quàm flammâ aut fumo: procurare debet Magistratus, ut vesperi post occasum Solis, & manè ante ortum, per compita & publicas plateas fumi suffususque ex congerie fruticum juniperi, & flamma luculenta, ex doliis picatis incensis excitetur; ea enim ratione, nimirum flamma & fumi beneficio, olim divinus Hippocrates pestilentem luem ex Æthiopia in Graciam delatam, citissime extinxit, & Athenas à contagione liberavit: Non dissimili

mili quoque modo Patrum nostrorum memoria Civitas *Tornacensis* à Peste, fumo ex bellicis tormentis sive globulis pulvere nitrato explosis ante Solis ortum & post occasum excitato, brevi liberata est. Hæc Magistratus prudentia etsi non careat calumniis & detractionibus, tamen plenissima est officiis pietatis & humanitatis; & Deo plurimum placet.

Aër privatus ac domesticus, quibus rebus corrigendus ac purificandus.

*Aër privatus
veterum
quomodo
corrigendus.*

Nihil magis alterat aëris quamlibet constitutionem, quam gelus, sive excellens ac constringens frigus, ignis sive flamma, & fumi sive vapores odorati; ut igitur de publico aëre est dictum; ita omnium primum ex aëre domestico & privatis domiciliis removenda erunt omnia putrescentia, & cœnum & sordes, quæ aërem corrumpere & suo vapore inficere queant, summaque cura munditiei est studendum; cum autem, ut dictum est, flamma ignisque luculentus aërem exsiccando purificet, & pestis seminaria extinguat, ut Atheniensium testatur historia, qui moniti ab *Hippocrate* integram sylvam propè urbem incenderunt, & à lue pestilenti statim sunt liberati: Plurimum itaque ad præservationem & aeris infectionem confert, ubi & facere licuerit, in ædibus & conclavibus cubiculisque perennis focus ignisque luculentus, Autumno potissimum & Hyeme, ex lignis solidis, ut sunt robur, juniperus, picea, fagus & *fraxinus*, (quæ tantam habet *antipestis* cum venenis, ut nec serpentes, nec virulenta animantia ejus umbram ferre possint) incendatur ac foveatur; cavendum autem, ne *putrida ligna* in ignem consiciantur, quibus nihil est pestilentius. Ad domestici quoque aeris purificationem plurimum proderit, ventos (qui non sunt aliud quam commotiones aeris) australes, pluviosos & à regione infectâ flantes; item nebulas matutinas & vespertinas, oclusis fenestris & januis excludere, & flantem Aquilonem, si serenus est, in persflanda conclavia fenestris pa-

refactis admittere. Præcavendum quoque quàm fieri potest diligentissimè in præservatione aeris domestici à contagione, ne aliquis peste infectus, aut cum infecto commercium continuum habens, ædes non infectas ingrediatur. *Persape enim contingit, ut per colloquium & familiaritatem tertia persona media inter infectum & non infectum aliquis vel ex halitu vel fomite inficiatur*, pro analogia seminariorum pestis ad diversa corpora. Et sanè non tantum per personam tertiam pestilentem contagionem in salubres ædes propagari posse; verum etiam per feles & canes in infectorum lectulis cubantes, pestem in vicinas ædes esse introductam, disertè testatur *Marsilius Ficinus*, etiam si ipsi canibus catisque non fuerit noxia contagio; ideoque arcendi sunt ex ædibus alieni canes & cati. Id quoque in aeris domestici commutatione observandum est, qui diutius aliquo in infecto loco sine noxa commorati sunt, minimè consultum esse, ut deinde subito locum mutant, & se in salubriorem aerem conferant; si enim seminaria pestis ii ante conceperint domi, nec eis fuere noxia, ubi in alienum aerem pervenerint, citius ac acrius incendentur; sicuti etiam manifestum est ex salubriore aere in infectum temerè se ingerentes, citius corripì & interire, quàm qui contagioso aeri sunt assuefacti. Quia verò non omnibus nec ubique semper datur copia luculenti ignis & flammæ, tum ex usu erit, quotidie manè ac vespere fumis odoratis & suffitibus domesticum aerem lustrare & purificare. Quibus autem rebus odoratis in ædibus & omnibus conclavibus fumi excitari debeant, nunc præcipuas tantum enumerabo, videlicet fureulis juniperi accensis, ac baccis juniperi carbonibus incensis impositis; *comis floribusque absynthii & lavend. ruta, menta, spica Cellica, basiliconis, majoran. meliss. & rad. angel.* accensis, vel in cacabum igni impositis; præstantiora iis sunt *Myrrha, thus & succinum* in ignitos carbones injecta; opulentiores

Suffitus.

tiores verò possunt aërem purificare suffitibus pretiosioribus, quibus & spiritus animales ac vitales suavi odore recreantur, quæ ex myropoliis facile comparari possunt, ex quibus præstantissimus est pulvis subsequens: *R. Benzoi, styrac. calamit. ana ʒ j. Carioph. Fl. Lavand. an. ʒ ʒ. Gran. juniperi ʒ v. Succ. albi ʒ iij. Ros. rub. fol. menta ana ʒ j.* conscindantur crassiusculè ac contundantur, commisceantur, fiatque pulvis grossus, cujus tanta quantitas, quæ tribus digitis comprehendi potest, aut ignitis carbonibus in cubiculis & conclavibus imponatur, eorumque fumo cubilia compleantur, in quo fumo & vestes & indusia tingi possunt; nam spirant suavissimum odorem; aut idem pulvis ejusdem quantitatis potest inspergi in cacabos fornacum. Alio modo ita præparari potest: *R. Ligni Aloës, lig. cupressi ana ʒ ʒ. Myrrha, Caryophyllorum, Styrac. calam. Benzoi ana ʒ ij. crass. contusa misceantur*, quo ut antea dictum est suffitus odoratus excitetur; quin & suppellectilia, stragulæ vestesque & quæcunque alia corpora porosa, si sequenti liquore odoratissimo conspergantur, ea ab omni contagione ac labe pestilentiae conservat, qui hoc modo præparabitur: *R. Spe. Diambræ ʒ j. ʒ. Cariophy. Nucis Moscha. Cinnamo. ana ʒ j. Campho. gran. iv. Benzoi Styrac. cala. ana ʒ j. Moschi gran. vj. Hac omnia crassiusculè contusa in vitream cucurbitam reponantur, eisdemque assundantur ol. Angel. ʒ j. ol. ex gr. juniperi gutt. v. Aq. Ros. lb j. ʒ. Aq. Lavand. lb j. Aq. juniperi, vel ejus loco vini Rhena. Opti. ʒ iij. Aq. menta odorata ʒ iij. Aceti Ros. ʒ ij. commisc. & probe obturata in aquam tepidam sive balneum Maria imponantur & per triduum macerentur, orificio vitri probe obturato, deinde ebulliant per semihoram, & ad usum conserventur. Hoc liquorè tempore pestis non tantum vestes & alia suppellectilia utiliter conspergi queunt; verum etiam eo, in publicum progredientes, manus, nares, regionem cor-*

dis & arterias carpi inungere possunt. Excindit enim omnem aëris venenatam qualitatem; Præstantissimus est hic liquor si spongiola exceptus, & in sphaerulam vel argenteam, vel ex ligno juniperi fabricatam pluribus foraminibus perviam includatur, manibusque gestetur, & odorandi causa naribus subinde admoveatur. Plurimum confert tempore pestis, cordis quoque omnium maximè rationem habere. Est enim cor vitæ fons, ac domicilium spirituum vitalium, & cordi potissimum adversatur contagio pestilens. Itaque subinde cor roborandum, & spiritus vitales reficiendi. Sacculus ex syndone paratus in quo sequentia sunt insuta, regioni cordis applicatus, & diu nocturne gestatus conservat & corroboret cor & spiritus vitales; Res autem sacculo imponendæ hæ sunt: *R. Ros. rub. redolentium, fol. Melissa, ana M. l. Pul. Sandali rubri, ligni aloës, Cinnamo. Benzoi ana ʒ j. Zedoar. Carioph. ana ʒ ʒ. Cort. arantiorum se. citri. ana ʒ j. commisc. & sacculo insuantur*, qui quotidie vel præscripta aqua odorata, vel vino generoso irrorari commodè poterit.

Sacculus
pro cordæ.

Quid privatim agendum antequam quis in publicum aërem prodeat.

Satius sanè esset tempore Pestis in domicilio & domestico aëre nondum infecto se continere, & à conversatione hominum & ab omni congregatione abstinere; sed quia tum propter privata cujuslibet negotia atque officia, & propter assuetudinem societatis paucissimi se continere in domestico aëre possunt, idcirco qui in publicum prodire vult, ita se gerere debet: initio antequam à lecto surgat, omnes artus leniter volâ manuum confricabit; deinde; ut pori cutis præmuniatur à receptione seminariorum Pestis, si fieri possit, universam cutim, aut saltem emunctoria & cordis regionem illinat aut confricet paucis guttis præscripti liquoris odorati, aut com-

masticet

Quid
prodenn-
tibus in
publicum
agendum.

masticet allium, aut rad. Angel. & inungat saliva aut aquâ tantum rosarum, cui pauxillum vini sit admixtum, & in qua rad. Tormentill. & caryoph. & nonnihil Theriac. Andro. sunt macerata. Deinde surgat à lecto, sed non nisi post horam à solis ortu, seque induat, quàm fieri potest vestibus mundissimis, indutis prius odorato fumo, ut diximus, imbutis, tandem caput pectine leniter confricet, & aquâ pura & non fetida, in qua per noctem sunt macerata vel cort. malorum Arantiorum, vel fl. Lavend. vel majoran. vel ruta in linteolum colligata, manus & faciem abluat, dentes perpurget, & os ipsum aquâ, cui nonnihil aceti vini vel Rosa. sit admixtum, colluat, naribus autem momentum ol. nucis mosch. illinat, aut saltem aq. odoratâ paulò antè descriptâ guttam, & arterias manuum potissimum, ut diximus, inungat. Et ita in verâ fiduciâ & ardenti precatione se suosque Deo commendet, & assumpto aliquo salutari antidoto in publicum prodeat, negociaque sua & officia in timore Domini exequatur.

Quibus antidotis, seu remediis, Pesti adversantibus, singulis diebus quilibet uti debeat.

Antidota per vices usurpanda, I. Ore mandenda. Remediorum pestilentis veneni & seminariorum ejus in aëre hærentium, quæ Græcis antidota nominantur, tria sunt genera. Alia enim in ore manduntur ac tenentur tantum; alia in manibus gestantur odorandi causa; alia intra corpus assumuntur; Quæ in ore masticantur ac retinentur remedia magis comprobata, hæc sunt: Ex simplicibus quidem, Rad. angel. Zedoa. Danci Cretici, Nasturtii. Pimpinell. Cardopat. Quæ radices si per noctem in aceto vini macerentur, præstantiores fient; item his quoque præstantius habetur nobile Scordion. Scordion, sive recens, sive ore masticatum & retentum; deinde gr. juniperi, Bacca Lauri & semina citri. Ex compos. sunt præstantissimi pastilli in ore retinendi, qui ex his conficiuntur: R. Sp. Diamos. dulc. Diambra ana 3 i. Zedoa. Angel. Danci Cre-

ti. ana 3 ij. Caryoph. Styra. Cala. ana ʒ ij. Sacch. candi ʒ ij. cum q. s. Theria: Andro: diutissimè conterantur, fiat massa duriuscula, ex qua formentur exigui pastilli, qui in umbra exiccantur, & necessitate exigente unus ex hisce sub linguâ retineatur, donec resolvatur, qui tandem deglutiri potest. Excludunt enim seminaria Trochiscæ sublin-guales. pestis, & purificant aërem per inspirationem attractum, & cerebrum, spiritusque animales mirificè corroborant: Utilissimè quoque dentes & gingivæ inungi possunt pauxillo Ther. Andro. aut antidoto nostro de scordio, cujus præscriptionem in Antidotis intra corpus sumendis tradituri sumus.

Antidotorum, quæ tempore Pestis ad corrigendum aërem infectum, corroborandum cor atque cerebrum, reficiendisque spiritus, odorandi gratia in manibus gestari soleant, exquisitiora hæc sunt:

Ex rebus quidem simplicibus, Mala Arantior. Cidonia. Absinth. ruta, Majoran. Mentha, Rad. Angel. Valeria. Campho. Casto. & styraç calam: Ex compositis, Ruta viridis cum pul. Caryoph. contusa & pauxillo aceto conspersa, ac in syndone aut tenui linteolo colligata, est præstans odorativum remedium. Præstantior autem est sequens aqua spongiola excepta & in sphærulam inclusa: R. Aq. Ros. Lavend. Aceti rosa. ana cochlea. vj. commisc. in vitro quibus parum pul. caryoph. admisceri potest, aut parum camphoræ. Eadem ratione & spongiola liquore odorato paulò ante ad conspergendas vestes præscripto, imbuta & odorandi causa in sphærule inclusa manibus gestari potest; aut manu gestetur sphærule, quam pomum Ambræ vocitant, quæ hac ratione in officinis paratur: R. Ladani rec. & odorati ʒ ij. Ros. rub. Sandali Citrini ana ʒ j. styra. cala. Benzoi. ana ʒ ij. cinamo. odoratiss. Macis. Ligni Aloes, Caryoph. ana ʒ j. Myrrha ʒ s. pulverisata in præcalido mortario & pistillo contundantur, subinde admiscendo G mucag.

Acetum ruta, præsertim autem mille folii, præstantius.

Pomum ambræ.

mucag. liquidam ex aq. rosa & Tragacantho macerato, factam, donec in massam tractabilem redigatur. Ex qua massa sphaerulæ conformentur & inungantur pauxill. ol. Angel. aut oleo Caryoph. & involvantur Bombaci seu lanæ Xylinae, quæ prius paucis granis, pro cuiuslibet arbitrio, excrementi Zibetti felis aut Moschi illita sit, & Sphaerulis vel argenteis vel ligneis includantur, quarum odor aërem contagiosum mirum in modum emendat, & cor cerebrumque corroborat; Nullæ siquidem res spiritus vitales & animales magis reficiunt, ac refocillant quam suaves & fragrantis odores; in olfaciendis tamen rebus odoratis, ratio habenda est temperamenti cerebri, ut quilibet eos eligat odores, quibus omnium maxime delectatur; calidis enim & siccis cerebris frigidarum rerum odores; frigidis vero & humidis calidarum magis conveniunt, quibus & natura magis delectatur.

3. Intra corpus assumenda.

Antidota porro pro depulsione contagionis intra corpus assumenda & ab infectione præservantia omnia debent esse talia, quæ tota sua substantia sive forma substantiali adversantur pestilenti veneno, & quæ simul spiritus vitales & animales reficere, atque humores à putrefactione præservare, & interna viscera principalia corroborare queant. In his autem usurpandis habendus est delectus pro diversitate temperamentorum corporis, aliis enim alia magis conveniunt & salubriora sunt. Cavendum deinde diligenter ne talia sint remedia, quæ suis primis qualitatibus extensis, congenitam corporis temperiem destruant, neve impensius vel calefaciant vel refrigerent, exiccentque. Tum enim non levem naturæ noxam inferunt, magisque destruant, quam præservant. Ex antidotis autem intra corpus assumendis simplicia quidem probatissima hæc sunt: Pul. terra Lemnia, boli Arme. Si hæc vera & non adulterata in myropolliis haberi possunt, cornu cervi, qui in Autumnno captus est, ramenta, pul. nobilis scordii, pul. Cardui Benedicti, pul. tor-

Cautio in usurpatione antidotorum. Simplificia.

ment. pul. se. citri mali. pul. corall. præparat. & sal. absynth. vel scordii, quod ex lixivio à cineribus eorum in vino maceratis coquitur. Laudatissimum quoque est sal urinæ (quod ex urina hominis coquitur.) Hæc præscripta antidota intra corpus assumpta, non tantum à contagio præservant validissime, sed liberant infectum etiam efficacissime: Assumuntur autem pro ætatis ratione & temperamenti, pulveres quidem pondere ʒj. aut. ʒ. Salia vero pondere ʒ ʒ, aut ʒj. cum haustulo vini aut aquæ Scordii, aut aq. rosa. aut aceto rosaceo.

Composita autem nobiliora ab infectione præservantia, quæ partim in myropolliis præparata servantur, partim à nobis experientia comprobata, & hæcenus in secretis habita, hæc fere sunt: Pill. communes pestilenciales, quarum ʒj. semel ad minimum per septimanam deglutitæ humores à putrefactione tuentur, Ventriculum & Epar corroborant, & spiritus vitales reficiunt, alvi que obstructionem prohibent. Earum compositio talis est: R. Aloës puriss. croci, Pill. Pæmyrrha ana ʒij. contundantur cum vino generoso, vel Syr. citri acidi, fiat massa, ex qua formentur pillulæ exiguæ, & ante cænam assumantur. Egregiè quoque præservat semel vel bis in septimana ʒj. Conf. Mithrid. in haustulo aq. scordii resoluta & exhausta, confectio quoque Liberantis in rotulas confecta, quæ in myropolliis prostat. Nobilissimum est antidotum, si ejus rotulæ ij. aut iij. jejuno ventriculo devorentur: quæ quia sunt suaviores gustu, & gravidis, & infantibus, & cuiusque ætatis hominibus, tuto exhiberi possunt; Cor enim & spiritus vitales corroborant, & singularem habent virtutem contra seminaria Pestis. Præterea pueris & gravidis, infantibusque, quia non ferunt validiora remedia, exhiberi possunt rotulæ ex albisimo saccharo, in aqua scordii soluto ʒ ʒ, cui admixta sint Antidopulvis Coral. rub. ʒij. & ol. Angel. ʒj. Simili ratione & Antidotum, sive electuarium Angelicum à nobis confectum, cuius si vel avellanæ nucis quantitas aut devoretur,

Sic Sal vitium & Millefiantia.

Pæmyrrha silentiales.

Antidoti Angeli- ra loëlis.

retur, aut cum haustulo aquæ cardui Benedi-
 cti ebibatur, eo die tutum reddet à
 contagione. Ejus compositio ita habet:
*℞ Rad. Angel. odorat. ʒ ʒ. Rad. Cardo-
 pat: Dauci Cretici, Diptami albi ana ʒ ij.
 Zedoar. myrrha ana ʒ ʒ ʒ. fol. cardui Be-
 nedicti ʒ ij. fol. ruta, Veron: ana ʒ i. cor-
 nu cervi usti preparati ʒ ij. camphora ʒ ij.*
 omnibus tenuissimè pulverisatis admiscean-
 tur confect. Mithridati optimi ʒ ii. Syr. è suc-
 co cardui Benedicti q. s. Diu multumque
 contundantur in mortario, & redigantur
 in massam mollem sive electuarii. Nobil-
 issimi quoque sunt morsuli nostri contra
 pestem, si unus eorum manè comedatur.
 Quorum compositio sic se habet: *℞ Spe-
 cier. Liberantis ʒ j. pul. scordii ʒ ʒ. Zedo. ʒ ij.
 cornu cervi usti & cum succo scordii prepa-
 rat, corall. rub. preparat. ana ʒ ʒ ʒ. sem. ci-
 tri excorticati & incisi ʒ ii. Sacch. albi in aq.
 cardui Benedicti resoluti ʒ i. quibus inter
 commiscendum admisc. Ol. Angel. ʒ j. ol.
 cinam. gutt. v. Ex quibus formentur morsu-
 li Rhomboides pondere ʒ ii.*

Aq. vita
contra pe-
stem.
 Efficacissima quoque est Aq. vitæ con-
 tra pestem, quæ & contagium arcet, &
 Spiritus vitales, omniaque viscera corrob-
 rat, cujus parandi ratio hæc est: *℞ Ze-
 doar. Angel. Pimpin. ana ʒ ij. Valeriana,
 Ostrutii ana ʒ j. Dauci Cretici ʒ j. ʒ. Croci
 ʒ ʒ. Scordii. Veron. Card. Bened. ana M. S.
 Rosa. rubr. p. 1. Radices contundantur, &
 herba minutim concidantur. Quibus admisc.
 ʒ iij. Sacchari candi. pulverisati, in vitrum
 angusti orificii imponantur, eisq. affun-
 dantur ʒ v. Aq. juniperi: & simul per o-
 striduum macerentur in loco tepido probè
 obturata. Deinde vitrum in balneum Ma-
 riæ, sive Ahenum aq. plenum imponatur,
 & simul per semihoram ebullire sinatur, ac
 per se frigerata percolentur, & in vitrea
 cucurbita probè clausa conserventur. In
 liquorem imposito prius nodulo ex Syndo-
 ne. rub. cui illigatæ sint Sp. Diamb. Dia-
 moseh. dul. Elect. Liberant. an. ʒ j. Garyoph.
 Cinam. an. ʒ ʒ ʒ. cujus aq. vitæ contra pe-
 stem unum cochleare ebibitum manè, co-*

die immunem reddit à pestilenti contagio-
 ne. Hæc quidem enumerata antidota om-
 nia, ut antea de simplicibus diximus,
 & præservare & ab infectione liberare pos-
 sunt, si iusta mensura & tempestivè exhi-
 beantur. Quorum, in præservatione, non
 semper uno, sed alternatim, hodie illo,
 cras alio uti decet, ne videlicet per unius
 continuum usum, id in naturæ familiarita-
 tem tanquam alimentum convertatur. Porro hæc omnia præscripta remedia; vir-
 tute & admiranda efficacia superat cœlestis
 illa confectio miseris mortalibus divinitus
 tradita, quam ab ejus inventore Theria-
 cam Andromachi vocant, si ejus ʒ j bis in
 septimana cum vino aut Scordii aq. assu-
 matur. Galenus inter pestem & Theriacam
 venustam ponit similitudinem, inquit,
 Pestem quidem Draconem esse, cum corpo-
 re aëreo suum virus & venenum contra ho-
 mines spirantem; Theriacam autem pur-
 gatorium esse quoddam, venenum subin-
 de expurgans & Draconem domans. Cur
 autem ego Theriacam inter Antidota præ-
 servantia non posuerim, nec ea quenquam,
 ut intra corpus pro præservatione utatur
 velim, ratio hæc est, quam veram esse
 longâ observatione & experientia didici-
 Quicunque efficacissimis Antidotis, qua-
 lis est Theriaca; in præservatione utuntur,
 ad eam natura adsuescit, eique tanquam
 familiare redditur remedium, ac crebra con-
 suetudine efficacia diminuitur; ideo illos
 deinceps, si Peste infici contingat, ve-
 nenum Pestis iisdem remediis, quibus ante
 usi sunt, discutere & propellere minimè
 posse, sed naturam à virulentia Pestis vinci,
 & succumbere necessum est. Quare præ-
 stantissima remedia, quæ omnium maxi-
 mè præservant, reservari debent, & inter
 Alexipharmaca (quæ vincunt venenum)
 retinenda, donec necessitas eis uti com-
 pellat: & hæc est ratio, cur Theriaca ad
 præcautionem neminem uti velim ac sua-
 deam, nisi forsan quis ejus fabæ quantita-
 tem in ore tenere velit, ubi cum infecto ei
 converſandum sit.

Antipe-
stentialia
tolerabi-
lioris pre-
cii.

Quibus Medicamentis se à contagione praeservare debent homines tenuioris fortuna & domestica familia?

Paterfamilias non suae familiae permittat quonquam jejunum in publicum prodire. sed imperet ut antequam prodeat, buccellam tostii panis aut aceto vini maceratam, aut butyro oblitam; & pul: vel scordii vel Pimpin. vel Rutæ conspersam edat, aut 9. gr. plus minus Juniperi comedat; aut iij. baccas lauri, aut nucleum allii devoret, aut sequentis Michridatii domesticici à veteribus celebrati, quod quilibet paterfamilias facile conficere & comparare potest, semijuglandis quantitatem absumat, cujus ratio conficiendi hæc est: R. Ficuum ping. 3 iij. Nucle: Jugland. à pelliculis purgator. 3 ij. Ruta virid. 3 j. Scordii. Card. Bened. ana 3 ij. concidantur crassiusculè, & cum pauxillo aceti vini irrorentur, & in formam Elect. reducantur. Uti quoque cum magno praesidio jejunii poterunt uno aut duobus cochlear. sequentis aceti medicari. R. Theriac. Androm. 3 j. pul. Bacc. lauri, Tormentill. Aristol. rot. an. 3 5. Castor. Angel. ana 3 ij. Scordii M. 5. Ruta p. 1. contundantur & conscindantur, & per plures dies in vitro macerentur affusis lb iij. Aceti vini; Pauperiores qui ea habere non possunt, edant singulis diebus vel frustulum rad. Angel. aut devorent folia quinque Ruta. cum nucleis jugland. & sicu modico Sale conspersis.

Theriaca
Saxoni-
ca.

Acetum
antipe-
stientiale.

Peste infectos adituri, quibus remediis sese munire debeant?

Peste in-
fectos con-
gressuri
quid agen-
dum?

Pestilens contagio & seminaria ejus non tantum ex infecto aëre concipiuntur, verum etiam, & quidem citissime ab infectorum halitu & venenata respiratione hauriuntur ab iis, qui ejusdem sunt naturæ ac temperamenti cum infectis. Ad eos enim protinus transilit pestis & tenaciter adhæret, & quamquam præstaret à conversatione & colloquio peste infectorum abstinere, tamen cum id sine violatione suæ conscientiae plurimis intermittere non liceat, præsertim iis, qui

ratione officii sui ægrotos invisere coguntur, ut sunt verbi Divini Ministri, ordinarii in rebus publicis Medici & Chæirurgi; alique coguntur infectos accedere ratione Philanthropiæ & sanguinitatis conjunctione; quæ est inter conjuges, parentes, liberos, fratres & sorores. Exigit quoque in genere ab omnibus Christiana Pietas, & humanitas ægrotantium visitationem; ut nequeant amicos vicinos & proximos, in extremo periculo constitutos deferere, juxta dictum filii Dei: Quod vobis fieri non vultis, id nec proximo faciatis. Et quid quæso crudelius, & ab omni humanitate & pietate magis alienum, quam tempore pestis exuere pietatis, & parentes deferre suos liberos, aut liberos suos parentes? ut in superioris Germaniæ partibus contingere vidimus! Non decet certè hominem Christianæ professionis mortem ita expavescere, ut Christianam charitatem propter pericula deponat, & vel suæ fidei commissos, aut vinculo amicitiae devinctos, operâ suâ & consolatione omni negligat. Spe itaque & certissima fiducia in Filii Dei protectione coniecta, omnes qui in officio administratorio constituti sunt, aut sanguinis conjunctione inter se devincti, audacter miseros ægros, aut peste infectos accedant, eosque amanter consolentur, & quantum in ipsis est, suâ operâ & industriâ juvent, certoque statuunt, Deo ipsos curæ esse, ab ipsiusque Angelis protegi, juxta illud: Angelis suis mandavit de te &c.

Statuantque si in suâ vocatione vel vivant, vel moriantur, ipsos esse Domini, & dominos mortis. Et quidem quæso, cur quis mortem in Peste ita expavescat, quæ per Christi mortem sanctificata est; & cum omnibus semel paulò post moriendum sit, quis non mallet Peste magis mori, quæ nec diu, nec magnis cruciatibus ægrotantes affligit, sed ut plurimum intra quartum diem finem imponit? Et mens ac ratio in Peste rarissime labefactatur, & plerumque homines magis intenti sunt pietati, quam

Pia cogitationes
de morte
contem-
nentia.

quàm in alijs morbis ullis, in quibus per plures menses cum morte conflictandum est. *Sed horribile est tot millia hominum simul interire?* At quis non mallet cum tanto Sanctarum animarum comitatu in regnum alienum & rationi ignotum commigrare, quàm solum? Hæc etiam *nieppa* videntur, tamen & consolationis plurimum habent, & meditatione digna sunt tempore Pestis. Non tamen vellem quenquam temerè & sine ulla necessitate & præter officii rationem, (si modò apud ægotantem propinquiore adfint,) seipsum in periculum conjicere, & sua spontè se ingerere: Qui autem ex officio & conjunctione sanguinitatis infectos adire coguntur, iis suadeo, ut remediis & antidotis paulo ante enumeratis, cum iis quæ in ore masticanda tenendaquè, tum iis quæ odorandi causa, manibus gestanda; tum etiam quæ intra corpus assumenda præscripsimus, utantur sedulò: Inter reliqua præstantiora sunt hæc; Si narium foramina *pau-xillo. Theriaca Androm*: oblinantur, aut ejusdem fabæ magnitudinem in ore retineant, aut pastillos paulò ante commemoratos. Intra corpus verò aut ex superioribus antidotis, aut sequentis *Elect. q. nucis avellana* devorent: *R. Bac. Juniperi, terra Lemnia* vera an. 3 ij. pulverisata cum Syrupo citri, excipiantur & in formam *Elect.* redigantur. Aut frustulum *Zedoar. cum pau-xillo Glycyriz. & uvis passis* mandant & deglutiant. Utilissimum quoquè esset, si ea commoditas haberi posset, ut inter ægotantem & astantes luculenta flamma, aut saltem plures cereæ candelæ accenderentur: Talis enim flamma absument semina Pestis, & corrigit respirationem pestilentem; id si fieri nequeat, suffitus tamen & fumigationes odoratæ ex rebus supra recitatis inter infectum & colloquentes excitentur. Præstat autem colloqui procul & per justam distantiam cum infecto; minus enim ab ejus exhalatione & respiratione afficitur. Hæc de aëris infecti purificatione, & remediis præservan-

tium usurpatione dixisse, satis esto; jam quid circa cibum & potum aliasque causas naturam nostram conservantes & alterantes, sit observandum tempore Pestis, brevissimè commemorabimus.

Circa cibum & potum tempore Pestis qua sint observanda.

Sine cibo potuque salubritas corporis diu consistere non potest; horum abusu, non tantum corrupti & putrefacti humores generantur, qui Pestis sunt receptacula; verum etiam cum cibo ac potu tanquam fomitibus sæpe pestilens contagio devoratur & hauritur. Studendum itaque ut quilibet tempore Pestis vescatur alimentis concoctu facilibus & purum sanguinem generantibus, & ex quibus puri generantur Spiritus. Vitentur studiosè omnia quæ facile putrescunt in ventriculo, vel difficulter concoquuntur. *Vitanda quoque sunt alimenta in infectis adibus pendentia, præsertim recentia*; similiter & fructus atque olera in infecto aëre generata aut exposita. In genere autem esculentorum ac potulentorum *ca, quæ consuetudine sunt recepta, eisi paulò sint deteriora, non tamen subito sunt mutanda, teste Hipp. 2. Aph. 50.* Cum nulla repentina mutatio careat noxa. Et si autem frugalis temperantia omni tempore, & maximè tempore pestilenti, meritò laudanda est, tum in hac parte consuetudini est aliquid tribuendum propter dictam causam. Cavendum tamen sedulò ne corpus nostrum tempore Pestis gravetur crapulâ, ebrietate & ingluvie; neque corpus varietate multoque cibo refarciatur. Simili ratione caveatur ne inedia ac fame diuturnâ natura nostra fatigetur. Cibi vero ex carnibus & piscibus tempore potissimum autumnali concoquantur, & condiantur *Omphaciis* sive immaturis uvis, quæ peculiari sua proprietate omni-venenatæ Qualitati ac putrefactioni adversantur. Condiantur & croco & cinamomo, quæ spiritus vitales reficiunt, & viscera corroborant. Alia aromata calefacientia vitare, est melius; potus sit cerevisia clara & de-

Alimentorum delectus infirmis.

Consuetudinis surpanda.

Electuarium.

*Cautio in
assumen-
da aqua
pro cibo-
rum præ-
paratio-
ne.*

foecata, aut vinum optimum moderatè sumptum: circa ciborum præparationem id quoque observatu utile est, aquam, in qua alimenta elixantur, nisi sit scaturiens, semper esse prius decoquendam & despumandam. Domestica enim aqua, & præsertim stagnans, faciliè seminaria pestis ex ambiente aère concipit. Condimenta mensæ utilia sunt Limones, Capparis, Accetum, Radicula, Sinapi & Vinum cum Sacch. & Zinzibere temperatum. Sed quæ & qualia debeant esse in genere alimenta, illud cuiusque vitæ conditio ac consuetudo docet.

Circa somnum & vigilias tempore Pestis, qua sint observanda.

*Somnus.
Vigilia.*

Somnus & vigilias sunt quoque exiis rebus, quæ sanitatem nostram ac naturam conservant ac tuentur, si moderatè debiteque usurpentur. Rectè enim dixit Hippocrates 2. Aphor. 3. *Somnus & vigilia, utraque si modum exceßerint, malum.* Longæ enim vigilias extinguunt calorem nativum, & labefaciunt spiritus animales. Somni similiter longi generant in venis, ac potissimum in cerebro, plurimos pituitosos humores putrefactioni obnoxios. Est itaque & in somno & in vigilia modus servandus, & eis alternatim utendum. Naturæ convenientissimus est somnus placidus septem, vel ad summum octo, horarum. Somnus diurnus omnibus est noxius, præterquam calidum & siccum cerebrum habentibus, & qui nocturna vigilia fatigati sunt.

*Somnus
diurnus.*

Circa exercitium sive motum quietemque corporis, qua sint tempore Pestis observanda.

*Motus.
Quies.*

Quiete moderata reficiuntur vires, & ad consuetas actiones vegetiora redduntur corpora; otio autem, ignavia ac desidia & corporis & animi vires enervantur, & universum corpus crassis & vitiosis humoribus completur. Quemadmodum enim aqua stagnans non commota faciliè putrescit; ita sanguinea massa, nisi per exercitia corporis subinde commoveatur, putrescit faciliè & contagium admittit; quies ita-

que & labores motusque corporis moderatè alternatim ac tempestive adhibenda sunt. *Nam Quod caret alterna requie durabile non est, &c.*

Vitanda sunt tempore Pestis laboriosa corporis exercitia, per quæ pori cutis aperiantur, & sudores profunduntur, ut choreæ, saltationes. Et cum in Venere vehementior fiat corporis commotio, nihil tempore Pestis est perniciosius immoderata ac difficili Venere, per quam vires prosteruntur, cor affligitur, & spiritus vitales diminuantur: in laboribus quoque corporis consuetudini & vitæ conditioni aliquid est tribuendum.

*Nihil Ve-
nere per-
nitiosius.*

In evacuatione superfluitatum, & retentione utilium tempore Pestis qua sint observanda.

Non aliter, ac alimentorum assumptorum Retentio, Alteratio & Assimilatio in Substantiam, partim necessaria est ad naturæ conservationem; ita sanè ad sanitatis tutelam humorum excrementitiorum, qui subinde in corpore colliguntur, evacuatio summè est necessaria. Sæpe autem impeditur aut debilitatur facultas expultrix in Natura, ut excernere superflua nequeat. Id ubi contingat, diuturniorem excrementorum retentionem semper comitatur putrefactio; Putrefactionis comites sunt Febres & aliæ ægritudines, quæ occasionem præbent infectioni pestilenti. Ut igitur excrementorum corporis, præcipue autem ventriculi, alvi, vesicæ & cerebri, quotidie vel natura vel arte debita fiat evacuatio, & superfluatorum humorum subtractio, omni quidem tempore, sed maximè vigente Peste, studiosè laborandum est; Ventriculus itaque si pituitosa colluvie sit repletus, per vomitum statim evacuandus erit, assumto prius haustulo vini, in quo rad. vel cort. potius rad. Iugland. per noctem fuere macerata, & sequenti die coctæ. Excitat enim hic haustus facilem vomitum. Quibus autem alvus est suppressa, emolliatur aut subducatur assumpta 3j. pill. communium, aut comedantur 3 x. pulp. cass.

*Excer-
nenda.*

Vomitum.

Ol. Vitrio-
li.Radix
gentiana
in Cory-
za.

cast. rec. extr. aut moveatur alvus leni aliquo Clystere, ex consilio periti Medici, aut inseratur recto intestino Glans sive suppositorium ex Saponis confectum. Si verò vesica sit obstructa, & urina debito modo non procedat, *Gutta novem* aut paulò plures *Ol. vitr. cum ij. cochl. vini* exhauriantur. Meatus enim urinæ probè aperiunt, & ventrem roborant, appetentiamque excitant; si verò cerebrum coryza laboret, & cribriforme os circa radicem nasi sit oclusum, pauxillum *suc. Beta* defecati per rases sursum attrahatur; aut *radicula Gentiana* instar calami adaptata naribus inferatur; si autem sanguis in corpore redundet, corpus plethoricum afficiat, ut ex rubedine totius corporis & faciei facile deprehendi potest, venæ sectione sanguinem diminuire convenit, secta nimirum vena vel Epatica dextri lateris, vel vena Mediana vocata, sinistri humeri. At ubi redundant in corpore vitiosi humores omnes, & corpus fuerit *κακοχρεματόν*; aut unus tantum humor redundet, per pharmaca convenientia subduci & evacuare ex prudentis Medici consilio debet. Medicis autem destituti, primum studeant dignoscere redundantis humoris speciem, ac deinde sequentibus remediis subtrahant. Corpora *κακοχρεματόν*, id est, in quibus humores omnes ex æquo vitiosi sunt, dignoscuntur ex fædo & faciei & cutis colore, ea sæpe sunt evacuanda sequenti haustulo: *℞ Agar. Troch. Rhab. fol. sena an. ʒj. seminis Anisi ʒj. crass. confusa* ligentur in Sindone, & fiat Nodulus laxus, qui in cantharum aut poculum ponatur, eique adfundantur *ʒ 4. aq. Card. Bened.* & simul per noctem macerentur. Manè poculum in aquam ferventem collocetur, & simul aliquantisper ebulliant, deinde nodulo fortiter expresso tinctus liquor tepidus 9. horis ante prandium ebibatur. Huic liquori in robustis corporibus admisceri poterit *Elect. Diacathol. ʒ iij.* Si corpus est pituitosum, id quod ex albedine faciei & cutis, atque ex continua humiditate oris ac linguæ, & sapore per lin-

guam vel insipido vel falso cognosci potest, tum sequenti haustulo pituita expurgari debet. *℞ Agar. Troch. fol. sena an. ʒj. ʒ. Zinzib. albi ʒj. confusa in sindone colligentur, F. nodulus. qui in poculo cum ʒ 4. aq. Absinth. per noctem maceretur, ac diluculo in ferventi aqua ebulliat, expressoque nodulo liquor tepidus exhauiatur 6. horis ante prandium; cui in robustis corporibus admisceri possunt ʒ. ij. Diaphen.* Corpora biliosa ex flavedine faciei, & cutis ac oris amarore deprehenduntur, quæ purganda erunt sequenti haustulo: *℞ Prun. Vngar. N. o. V. Thamarind. ʒj. Macerentur in aq. Ciccho. ʒ vij. per ix. horas, deinde ebulliant, & expressa colentur, colati jusculi accipe ʒ v. in quibus macerentur per noctem rad. Ellebo. nig. præp. ʒ. iij. Fol. Sena. Zinzib. ana ʒ. ss. quæ confusa & in sindonem ligata, per noctem macerata, altero die leniter ebulliant, & expresso nodulo liquor tepidus ebibatur; vel expurgetur Melancholicus humor, *Confect. Hammech. & Elect. Diacathol. ʒ vj. cum ʒ v. aq. Card. Bened. resolutis*, & sex horis ante prandium assumptis. Porro in evacuandis muliercularum, virginum & puerorum corporibus, pro ætatis & virium ratione, satis erit, *Cass. rec. evulsa ʒ x.* devorandas præbere: Pueris verò tantum ʒ vj. vel ʒ 5. aut exhibere *Manna ʒ vj.* Et junioribus paulo minus, usque ad ʒj. ss. in jusculo puli resoluta. Brevissimè enim corpora tenella expurgant. Mallem tamen semper ut purgantia remedia ex consilio Medici assumerentur. Quicunque corpora vitiosis humoribus obnoxia hac ratione tempore Pestis evacuant, & tandem reliquis præservantibus Antidotis tempestivè utuntur, rarissime inficiuntur, & infecti celerius liberantur.*

Affectus, & animi perturbationes tempore Contagionis quomodo sint moderanda?

Fœlix & beata esset vita hominis, si non continuis affectionum procellis perturbationibusque ageretur: Adeo enim obnoxia est mens humana affectibus, ut do-

Purgan-
tia sine
consilio
Medici
non usur-
panda.

Affectus.

nec

nec ratio & sensus vigent, semper cum eis inter dormiendum etiam consistendum sit.

Affectuum autem genera duplicia sunt, Bona nimirum & mala, sive tristitia & suavia. Bona seu suavia tantum sunt, Bona spes & moderata lætitia, quæ naturam conservant: reliqua autem mentem excruciendo destruant, ac demoliantur. Is itaque prudentissimus censendus est, qui affectus moderari novit. Omnium autem pestilentissimæ affectus sunt tempore contagionis, *Tristitia, sollicitudo, Timor & metus mortis atque consternatio*. Hi enim affectus insidias struunt vitæ, qui Spiritus Sancti subinde quoque fugandi, vincendi & discutendi sunt auxilio. Plures enim horum affectuum faculis, tempore Pestis, inficiuntur & intereunt, quam ipsa Peste, vel venenatis halitibus morientium; & experientia testatur, ut qui hujusmodi affectibus non sunt obnoxii, quales sunt mente capti, aut servi fatui, eos Peste nunquam, aut rarissime infici & interire. Cum itaque animi anxietas, & de vita præsentis sollicitudo, mortisque metus tempore pestis animum tam violenter perturbent, spiritus vitales labefactent, & cordis, quod vitæ arx est, temperiem destruant, & pestilenti infectioni, adeoque morti fenestram & januam aperiant: omnibus singulari diligentia enitendum est, ut forti animo, indubitata fide, & spe bonâ per moderatam lætitiâ & hilaritatem in timore Domini talia discutiamus, ut omnes occasiones, nobis ejusmodi terrores ac perniciosos carnifices, per profundas cogitationes mortis, & sensus auditum & visum inferentes, omni studio fugiamus atque evitemus. Sunt autem occasiones talia monstra nobis suggerentes, tremoremque incutientes, profundæ cogitationes, de morte narrationes, crebræ historiarum & eventuum, qui circa præsentis temporis mortuos contingunt, de celeritate obituum: de miserabili pauperum ac peregrinorum sollicitudine ac desertione; de defunctorum multitudine

seu pluralitate. Item aspectio pompæ funebrium divitum; & contra aspectio miseræ conditionis pauperum & peregrinorum, quibus vix ea pietas contingit, ut reperiantur quidam, qui eos efferant terræque mandent. Aspectio processuum funebrium, in qua demortuorum corpora ordine & agminatim ad sepulchra deferuntur. Hæc omnia animos hominum non possunt non validissime perturbare, terrorem, tremoremque & consternationem animis incutere, & infectionis mortisque causam præbere. In his non postremum locum obtinet superstitiosus, non dicam impius, campanarum boatus; primum ut puto per sacrificulos & monachos in Ecclesiâ Dei introductus, & ad avaros fructus excogitatus, qui tamen nec animæ, nec corpori, nec famæ demortuorum quicquam prodesse potest. Nec caret hic campanarum abusus manifestâ ferme impietate, cum vulgus arbitretur, se salvari non posse, nisi cum sonitu efferatur. In quos rectissime convenit illud Davidis, de impiis loquentis: *Memoria eorum perit cum sonitu*. At pietati magis consonum esset, præsertim tempore Pestis, unius tintinabuli sonitu plebem ad funera convocare, quàm miserorum amicorum & propinquorum animos tali campanarum strepitu & tumultu magis magisque excruciare & vulnerare.

In benè constitutis Ecclesiis ac Rebus publicis, jam dudum abrogatum est ejusmodi aucupium; & *Lipsiæ* quidem, *Noribergæ*, & in *Ioachimica Valle* in funebribus pompis, vix una auditur campana; ne videlicet boatu campanarum, ac strepitu, animi hominum, præsertim pusillanimatorum, magis perturbentur. Idcirco piorum Ecclesiæ Doctores & boni Magistratus officium erit, ejusmodi infectionis occasiones præsertim tempore Pestis tollere, & hanc consuetudinem inutilem emendare & abrogare.

Præter has occasiones mortis, solet Sathan quoque tempore Pestis, vitæ humanæ acer-

*Motu-
ciores
expeden-
di.*

*Campanarum
frequentior
pulvis
formidinem
incutit.*

Spectra.

acerbissimus hostis, miseris mortalibus pavorem & perniciosam consternationem incutere, & varia spectra eaque horribilia, & phantasmata mortis nocturno tempore afferre & objicere, per apparitiones Dæmoniorum, & per voces mortuorum, præsertim in plateis & circa cæmiteria ambulantis; quibus ita consternantur & exanimantur homines, ut nulli ferè, quibus apparent, supervivere possint, sed paulò post moriendum iis sit. Quilibet itaque nocturno tempore in Peste se apud suos, vel in sua habitatione continere debet, nec per plateas, ac potissimum ubi corpora mortuorum sunt sepulta, divagari. Magna sanè est barbaries & inconsiderantia apud nos Boreales, qui tempore Pestis omnium ferè demortuorum corpora, non tantum in templis, verum etiam in cæmiteriis in media urbe constitutis, sine discrimine sepeliunt; unde tandem adveniente Vere per exhalationem cadaverum novam pestem excitamus, & nos nostrosque inficimus. Sed hujus mali quoque correctio, ad officium Pastorum Ecclesiæ, & pium Magistratum pestinebat. Pia & sapiens Antiquitas inde ab initio extra urbem suos demortuos in honesto loco contumulare curavit; & adhuc hodie in benè constitutis Rebus publicis observatur studiosè.

Hæc de curatione præservativa dixisse, satis esto. Hic tamen colophonis loco adjiciatur, homini Christiano nullum esse præstantius & efficacius præservativum remedium, quam posse contemnere mortem, vitam caducam parvi facere, & cum æternâ vitâ, nobis per Christum partâ Deo sic volente, commutare libenter velle. Hæc sunt S. S. Alexipharmaca.

*Curatio Pestilentis contagii liberativa
qua, quotiuplex, & quando
adhibenda.*

Curatio
Infectio-
tum.

Θεραπεύεια ἐλασθεραλκή pestilentis contagionis est, quæ jam infectis & ægrotantibus extirpandi veneni contagionis, & sublevandæ humanæ naturæ causâ adhibe-

tur, præsidiumque adfert. Duplex autem, & quidem statim in initio infectionis, ac simul eodem tempore instituenda est *Liberativa curatio*, una animi, altera corporis.

Qualis, & unde peti debeat animi curatio Peste infectorum.

Cum tanta sit Pathematum, seu Perturbationum animi vis, & violentia cum in conservatione valetudinis, cum in destructione humanæ naturæ, ut paulò ante demonstratum est, præsertim tempore Pestis, impossibile est corporis sanitatem restitui, & à morbo quinquam liberari, nisi prius animi tollantur perturbationes, aut saltem in tranquillum statum reducantur, liberenturque à naturæ adversis affectibus, ut sunt sollicitudo, metus, terror & anxietas. Horum hostium naturæ depulsio, non è Medicorum decretis petenda est, sed S. S. Alexipharmacis, hoc est solidis consolationibus, ex verbo Dei per Ministerium haustis, & cum spirituali, tum Sacramentorum corporali usu ac manducatione Corporis ac Sanguinis Jesu Salvatoris obsignatis, occurrendum erit. Eam enim curationem, facile ac spontè sequetur & corporea liberatio à Peste. Nul- lum autem præsentius & efficacius Remedium, anxium animum, pacatum ac tranquillum reddere potest, quam bona conscientia in fide ac spe in Christum collocata: id quod Nazianz. hisce testatur verbis: ἐδὲν ἑπὶ τὸ εὐφραίνειν ἡμᾶς εἰσάγει, ὡς τὸ συνέδος κατὰ τὸν, καὶ ἐλπίδες ἀγαθὰς; id est, nihil nos magis exhilarare solet, quam pura conscientia & spes bona. Conscientia autem pura fide comparatur, D. Paulo teste, *Insignificati fide pacem habemus cum Deo.* Corporibus infectis Peste quando & qualis adhibenda curatio liberativa.

Statim ubi aliquod ex paulò ante enumeratis signis, & qualia in præsentī peste sunt, capitis dolor, somnolentia inusitata, frigus febrile, Nausea, Tensiones Præcordii, Tormina ventris, & Bubones seu glandularum tumores in emunctoriis: ex his, inquam, signis si unum aut plura compareant, nullo

Animo-
rum Cura.Non sunt
infectis
danda in-
ducia.

H

nullo

nullo modo sunt parvi facienda, aut procraftinanda, & contagioni induciæ concedendæ, sed statim ac celeriter in ipsa infectionis hora aut paulò post, etiam in media nocte, antequam vis pestilens contagii, & fraudulentus vitæ hostis cor (*arcem vitæ*) occupet, & Spiritus vitales prosternat, vitæ dimicanti quovis modo auxilia & subsidia sunt ferenda. Methodus autem liberativæ curationis consistit primum in celeri excrementorum ventriculi, & intestinorum, si necessitas requirit, (sæpè autem necessitas non exigit,) evacuatione. Secundò in venæ sectione, quæ & ipsa non in omnium corporibus admitti debet, aut potest. Tertio in Alexipharmacorum, id est, remedium venenum pestiferum vincendum, & per sudorem propellendum exhibitione. Quartò in cordis & Spirituum vitalium corroboracione.

Circa evacuationem ventriculi & Alvi contagione infectorum qua sint observanda.

Non omnia peste infecta corpora necesse habent vel ventriculi vel alvi evacuationem, sed ea tantum quæ ventriculum habent cruda colluvie refertum, aut paulo ante infectionem cibo potuque repletum, aut quæ tensiones punctionesque circa præcordia sentiunt. His ante venæ sectionem, si ea necessaria videbitur, aut ante Alexiteriorum sudorificorum assumptionem, ventriculi colluvies statim in principio morbi, per vomitum evacuanda erit. Vomitum autem facillè excitabitur præsertim iis, qui sunt apti ad vomendum, assumpto haustulo aquæ tepidæ; qui verò difficilius vomunt, assumptæ haustulo liquoris aquosi ex granis Luniperi cum pelvi per descensum destillati, & immisso in fauces digito. Quibus verò pestilenti contagione infectis alvus sit adstricta, & triduo aut amplius nihil per alvum egresserunt, aut qui torminibus ventris affliguntur, statim in pestis invasione, antequam vel sanguinem detrahant, aut sudorifico remedio utantur, alvum solvere oportet, aut glande

medicata, quam *suppositorium* vocant, ex melle salv. pulv. Colocyn. parata, aut ex Sapone Veneto instar calami formato, & oleo inuncto, & ano indito; aut quod salubrius est, Clystere ex jure carnis bovillæ, aut gallinæ, in qua incoctæ sunt Malva, Mercur. fl. Chamam. & Anethi cujus Hb. admixta sint Cass. ℥ij. Ol. Cham. ℥ij. Sal. ℥. quæ tepida in rectum intestinum infundantur. Ab aliis verò violentioribus Pharmacis evacuantibus omnino abstinendum est, nisi forsân processu temporis, aut corruptæ bilis copia purgationem desideret, quæ aut 3 x. Cass. aut ℥ij. Syr. Ros. sol. evacuari potest. Pituitola autem colluvies expurgari debet infuso Agarici. Qui autem nec ventriculi evacuatione, nec alvi emollitione, nec sanguinis missione egent, infecti, iis statim in initio Alexipharmacum sudorificum propinandum est.

Circa venæ sectionem Peste infectorum, qua sint observanda.

Magna est inter Medicos dissensio de quæstione, *Virum Peste infectis corporibus prosit venæ sectio, aut non?* Maxima eorum pars non modo utilem, sed & necessariam sanguinis extractionem esse judicat. Excellentissimi verò nostræ ætatis Medici, Montanus, Fernelius & Hieronymus Fracastorius, non modò inutilem, sed & perniciosam esse venæ sectionem, peste affectis, asseverant, his nixi rationibus: Per vehementem putridorum humorum agitationem, magis augetur putrefactio, & perniciosi excitantur halitus. In venæ sectione vehemens fit corruptorum humorum agitatio. Ergo venæ sectio infectis noxia & perniciofa est. Item: Pestilentia seminaria extrinsecus in corpus trahuntur, & in venis arteriisque extremis in initio morbi hærent tantum. Venæ sectione autem propter commotionem universi sanguinis introrsum ad principalia membra corporis trahuntur, & universæ massæ sanguinis miscentur; Ergo præstat sanguinem non commoveri.

Hæc

Methodus infectos curandi. Hac omitti debent, & statim ad alexiteria properandum.

Suppositorium ex Colocyn. ibide.

Aut tantum clyster ex lacte & butyro, vel oleo oliv.

In Peste non phlebotomia.

Simile.

Hæc probant similitudine quadam: Ut enim, inquiunt, si poculo aquæ, salis aut fellis quippiam injiciatur, donec aqua quiescit, minus salsa aut amara percipitur. Vbi autem aqua agitetur, tota salsa & amara redditur; Idem contingere & in sanguinis missione, cum seminariis pestis; & addunt experientiâ compertum esse, maximam partem insectorum, quibus secta est vena, periisse. Idè venæ sectionem fugiendam docent. Verùm etsi hæc excellentissimorum Medicorum argumenta plurimum ponderis apud me habeant, tamen venæ sectionem, ut non in omnium corporibus molendam esse profiteor, non tamen omninò è curatione Pestis tollendam esse, judico, hisce regulis observatis:

Cap. V. S.
interdum
admit-
tenda?

I. Omnis tinctura contagionis à valde-jac habet aut ad Spiritus, aut ad putridos humores; Quæ ad Spiritus, citius infectos interficit, ut plurimum sine tumoribus, Bubonibus & Carbunculis perdit; iis quidè frustra, & non sine noxa adhibetur venæ sectio. Quæ ad humores, tardius interimit, & cum tumoribus, carbunculisque erumpentibus interficit; in ea concedi potest venæ sectio, si cætera consentiant.

II. In venæ sectione semper habenda est ratio virium, ætatis & constitutionis temperamenti que corporum; quibuscunque enim infectis robur virium adest; & ætas non prohibet; & illi corpus habent Plethoricum, id est robustum, carnosum, rubrum & pilosum, & venas sanguine turgentes, iis maxima cum utilitate, audacter vena incidenda erit. E-contra in quibus corporibus unicus tantum humor vitiatu prædominatur, si vires & ætas ferant, præstat illis redundantem humorem ac vitiosum benigno Pharmaco subducere, quàm per venæ sectionem sanguineam massam agitare.

III. Peste infectis, quibus aut menses fluunt, aut Hamorrhoides, aut sanguis è

naribus uberius erumpit, iis non est vena secanda.

IV. Quibuscunque infectis vires, ætas & constitutio corporis, vena sectionem concedis, iis statim in initio & ipsa horâ invasionis, aut paulo post intra quatuor horas priusquam indormiat ager, vena incidenda erit. Nam ubi differatur & procrastinetur venæ sectio, ægritudoque aliud morbi genus esse putetur quàm Pestis, & interim seminaria pestis per spiritus & universam sanguineam massam diffundantur, (quod ut plurimum intra 24 horarum spatium fieri contingit,) tum non tantum frustra, verùm etiam noxia est Venæ sectio.

V. Quibuscunque peste infectis ætas, vires & constitutio corporis, vena sectionem desiderant, & vel tumor, vel Bubo vel Anthrax prodiit, si prope aures hæreat, aut circa collum, Cephalica; si sub alis, Mediana aut Hepatica, semper ejusdem lateris incidi debet.

VI. Vena sectio periculosa est Nauseantibus, & qui per Vena sectionem in Lipothymiam incidere solent. Difficilis quoque iis qui ad vena sectionem non sunt assuesciti.

VII. In incisione Vena cavendum est; ne scalpellum, quo inciditur vena, antea infecto & venenato sanguine pollutum sit & contaminatum.

VIII. A vena sectione per 6. ad minimum horas ager à somno est arcendus.

Quibus Remediis tinctura & Seminaria Pestis ex infectorum corporibus sint propellenda, & extinguenda?

STatim in initio pestilentis morbi, paucis aut pluribus signis infectionis apparentibus, post peractam evacuationem ventriculi & alvi, & sanguinis detractionem, Alexi-pharmaca, si necessitas efflagitet, nec ætas, nec temperamentum impediat, aut eis, si non sit opus, prætermittis, Remedia Alexipharmaca intra corpus sunt adhibenda, quæ sua virtute specificaque proprietate Venenatam Pestis tincturam per sudorem propellere, & seminaria pestis extinguere valeant, & quæ primis suis Qualitatibus corporis temperamen-

ramentum non destruant. Nulla enim est via in corpore humano, per quam contagionis seminaria commodius expelli queant, quàm per poros, cutis sudorem movendo, præsertim in eo genere pestis, quod *avalozicu* habet cum spiritibus.

Quaquam & putridi humores per sudorem purificentur. Sunt autem Alexipharmaca ferè infinita & varia à Medicis enumerata, quorum pleraque non tantum sunt inepta & fallacia, verùm etiam sæpè noxia; plurimjs enim libellis de Peste hujusmodi inserta sunt remedia, cum præservantia, tum liberantia, quorum nemo fermè experientiam fecit, sed aut proprio ingenii discursu excogitavit, aut unus ex alio recepit & suis scriptis inseruit. Ista omnia nos consultò negligimus, ea tamen fidelissimè tradituri, quæ per plures Pestes, usu, observatione & experientiâ comprobavimus.

Omnia remedia in præcedentibus, quæ pro præservatione proposita sunt, commodè & in curatione liberativa, certâ tamen mensurâ ac modo usurpari possunt, quorum alia simplicia, alia composita existunt. Ex simplicibus præstantissima sunt, si una. 3. pul. vel nobilis scordii, vel rad. Petasitidis, vel Sarmienti Indici, quam Salsam Parillam Hispani vocant, aut fol. Card. Bened. tepida propinetur. Est & insignis vis in propellendis seminarijs pestiferis, (si in initio invasionis ebibantur,) 3 iij. succ. Calendula, aut tantundem succ. Scabiosa, quorum tamen succorum periculum ego nullum feci. Iis tamen autoritate Galeni excellentiora sunt Pulv. 3. j. Boli Armen. aut Terra Lemnia, si genuina & non multum adulterata ad nos portaretur. Sed his omnibus præstantior est pul. unicornu Hercinii 35 cum haustu aq. Scord. vel Card. Bened. vel aceti vini assumpta. Est autem Unicornu Hercinium, nio quidem judicio, species Mineræ, quæ ante paucos annos è montibus Sudetorum in Hercinia sylva effodi cepit, similis ossibus grandium animalium. Et incolæ fabulantur in Diluvio montes ipsos unâ cum unicornibus & alijs grandioribus animalibus ibidem

esse conglomeratos & induratos. Cujus vires in expellendo sudore tantæ sunt venenis extinguendis, ut experientiâ propriâ didici, acullius alterius rei. *Corallia quoque & Margaritæ in succo Limonium aut aceto resoluta, præterquam quod pestilenti contagioni adversentur plurimum, Cor, Epar & Venter mirificè corroborant. Dosis autem earum in robustis est 35; in imbecillioribus, ʒ i.* Hæc si haberi nequeunt, præstantissimum est Cornu cervi, apices præsertim, respondent enim unicornu in duplo sumptis tempestivè capti, cujus abrasus pulvis, & tenuissime contritus, per sudorem venenum efficacissimè propellit: Utum verò seminaria pestis exiccando extinguit. Inter has *sal Scordii & sal urina humana*, si eorum 35 exhibeantur cum haustu aq. Scordii, aut aq. Card. Benedicti. Porro compositionum Alexipharmacorum omnium nobilissima & maximè veneranda est *Theriaca Andromachi*. Quæ suâ divinâ quadam *avla* prædita & compositionis suæ cœlesti Harmonia venenatis omnibus & Pestilentia tincturis mirificè adversatur, ejusque vestigia delet. Intellige autem Ther. Andro. non illam, quàm vel Italiæ Vrbes, Venetia, Genua, & aliæ Civitates, vel quam Belgium in doliolis nobis mittit; sed eam quæ in Germaniæ plerisque Urbibus, in Norimberga, Lipsia, Witeberga & alijs locis ab eruditjs & industrijs Pharmacopolis in corona plurium Medicorum paucos ante annos, & hodie cœpit præparari, atque præparatur. Reliqua pretiosa auro gemmisque splendentia, & ad ostentationem confecta alexipharmaca, nec rationi consentanea, nec experientiâ comprobata, ut vana, stulta & sæpè venenata, prorsus rejicimus. Qui enim libellos de Peste conscriptos legerit, reperiet ea non à se excogitata, aut discursu ingenii inventa, sed ex aliorum libris descripta esse. Ego verò adnotabo tantum ea Alexipharmaca composita, & quidem perpauca, quæ jam septuagenarius per plures Pestes observavi, & expertus sum salutaria; & verè Alexipharmaca, quibusque semper felici successu

Author
propriâ
experien-
tiâ com-
probata
tantum
recenset.

Optima
simplici-
um An-
tidotus.

Vni cornu,
Hercinium
quid?

Composi-
ta Anti-
dota.

cessu usus sum, enumerabo, quorum primum erit Pulvis aureus loëlis, qui sic habet:

℞ Scordii ℥j. Card. Bened. ℥j. Veron. 3.

Pulvis aureus loëlis, cui officina semen citri addere solent, quod tamen in Manuscripto non extat.

11. Rad. Petasitidis, Sarmentis Indici, (quod Hispani salsam Parillam vocant) ana ℥ss. coru cerviusti cum succo scord. præpar. 3. v. Coral. rub. præpar. 3. III. Tenuiss. pulveri sata commisceantur, & ad usum probè referentur. † Dosis hujus nostri pulveris robustioribus est 3. i. pond. Mediocris constitutionis 3. i. v. Imbecillioribus, mulierculis & virginibus 3. i. Infantibus puerulis ̄ I. aut paulo plus: Exhibetur mixtus cum haustu aq. Scord. aut Card. Bened. aut aceti medicati, jam ante in Præservat. Pestis descripti.

† Dosis. Ex hoc aureo meo pulv. & Andr. Ther. valde salutares haustulos sudorificos pro infectis à præsentī contagione ita parare soleo, nec aliis utor remediis:

Robustis. ℞ Pulv. Aur. loëlis. 3. i. i.

Sadorificum. Ther. And. 3. i. 5. aut vice versa, Ther. And. 3. i. i. Pulv. 3. i. Commisc. cum haustu aq. Scord. aut aceto medicato, fiat Haustus. In mediocri corporis const. viribus adhuc constantibus:

℞ Ther. Andr. pulv. Aurei. ana 3. i. 5. cum præscriptorum liquorum uno, fiat Haustus. Imbecillioribus puellis, ac pueris:

℞ Ther. And. pulv. Aure. ana 3. i. cum uno liquorum præscript. Commisc. F. Haustus. Infantibus bimulis & infra accipi potest, singulorum ̄ I. plus aut minus, pro annorum numero & virium robore, cum iisdem liquoribus.

Hiscæ præscriptis Alexipharmacis & sudorificis haustulis quicunque in præsentī Peste tempestive, antequam Pestilens venenum spiritus vitales & humores tinxit, usi sunt, omnes (soli Deo gloria) iterum sanitati restituti sunt; ne uno quidem mortuo.

Electuarium de Scordio loëlis. Alium meum Alexipharmacum paulò efficacius priori, propter celerem penetrationem, ejusdem est farinæ, cui nomen in Myropoli indidi Electuarium de Scordio loëlis, cujus compositio sic se habet:

℞ Pulv. Scord. Card. Bened. ana 3. 5. Veroni. 3. II. Rad. petasitid. 3. VI. Sarm. Ind. seu sals. parill. 3. 5. cornu. cervi rasi & in tenuiss.

pulv. redacti 3. V. unicornu Hercin. paulò antè descripti 3. III. Croci. 3. I. Corall. rub. præpar. 3. i. 5. omnibus tenuiss. pulverisatis & commistis admisc. Ther. And. 3. IV. & diu multumque in mortario contundantur, admiscendo si necessitas exigit q. s. Syr. de suc. citri acidi ad consequendam formam duriuscula massa, qualis est recens massa Pill. cui massa circa finem confusionis admisc. Olei Viir. 3. III. Ol. Angel. ̄ II. F. massa; & in denso fictili aut in argenteo vase conservetur. Dosis exhibendi hujus Dosis & Elect. nostri, Robustis quidem est 3. I. Pueris 3. 5. Infantibus ̄ I. cum haustu aq. Scord. aut Card. Bened. aut aceto medicato, Pauperiores, & qui præscripta remedia præsto habere nequeunt, ut qui vel in villis, aut itinere, contagione deprehenduntur, ii recipiant herbas virides paucas aut plures, quas habere possunt, Scordii, Card. Bened. Ruta, Calendula aut Rad. Tormentill. aut Petasitidis, quæ contundantur aceto conspersa, & succus exprimatur ad mensuram 3. IV. aut unius mediocris haustuli, & tepidum ebibatur pro sudorifica potione.

℞ Pulv. Bacc. Lauri & Bacc. hedera arborea ana 3. i. cum haustu aceti ebibantur. Habitâ tamen ponderis ratione ad ætatem & vires. Adjiciam hoc loco duo remedia à Paracelsi affeclis vehementer commendata, quæ quia à ratione non abhorrent, uti illis licebit; sed cum ratione, & in robustis corporibus: quorum 1. est Georgii Phadronis in libello de Peste, quod sic habet:

℞ Euphorbii, Myrrha elect. Thuris albiss. ana 3. II. Trag. puriss. 3. i pulverisata involvantur in massam panis farinaceam, quæ coquatur in forno donec panis sit perfectè coctus. Deinde ex refrigerato pane eximatur ex recitatis rebus materia compacta, ac iterum in pulverem redigatur, eisque admisc. tenuiss. pulverisat. Corall. rub. præpar. succini fulvi præpar. ana 3. II. unicornu veri gr. VII. Opii puriss. 3. 5. Moschigr. III. Croci ̄ 5. cum q. s. Syr. de Citro acido, F. massa Electuarii. cujus dosi puerulis infra x annos est ̄ I. Adultioribus 3. II. Robustis verò 3. i cum haustu vini. Verum cum unicornu

verum rarissimè haberi queat, ejus loco ego substituerem 3 ℞. *Unicornu Hercinii. aut 3 i. Rasura cornu cervini in Septemb. capti.* Alterum Alexipharmacum est prorsus Chymicum, id est venenatum, quo neminem uti velim, nisi in rigidis & robustis corporibus, quod ita habet:

N. Chymica cum venenatis convertuntur.

℞. *Mercur. siv. Argenti vivi Chymica arte pp. & sapius abluti 3 s. Auri Ungari. in scobem rasi gr. V. Misce. Quibus adijci poterit unicornu Hircin. 3 s. F. Pulv. cum vino aut aq. Scord. ebib. poterit.* Reliqua Remediorum Alexipharm. genera ad imposturam excogitata, quæ à Paracelsi pecudibus, passim viris Principibus & opulentioribus proponuntur, iisque plus quam divinæ vires in profligandis Pestilentia contagii tribuuntur; cujus generis sunt *Aurum potabile. tinctura Saphyri, tinctura Hyacinthi, liquoresque aliarum gemmarum; Item venenata olea Antimonii & Mercurii; quoniam meræ sunt imposturæ & perniciosæ, hic non commemorabo; nec eis uti velim quenquam, priusquam fabricatores eorum præbierint prægustarintque, & in proprio corpore periculum fecerint.* Detector quoque ego inconcinnam, ineptem, fatuam & omni *Utiæ* carentem atque venenatam compositionem popularis Alexipharmaci, quod *Ovum aureum* vocant; & quo in tota ferè Europa in omnibus familiis, ob quorundam Medicorum commendationem, tanquam divinitus monstrato remedio utuntur: Ex cujus usu infiniti quoque extinguuntur. Jure autem *aureum ovum* tanquam perniciosum toxicum damno: *Primum*, quia recipit Nucem Vomicam, fructum venenatissimum, & citò extinguentem; ut quilibet periculum facere queat in cornicibus & canibus. *Secundo*, quia admiscetur extremè calida, quæ sua caliditate destruant *idiosyncrasias* & corporis & spirituum. *Tertio*, quid quæso crocus exustus, & ovi luteum adustum in corpore aliud agere possunt, quam ut cinis & fuligo, nempe viscera exurere? *Quarto*,

Ovum aureum exploditur.

Quare?

Ejus descriptio non est uniformis, sed in omnibus Myropoliis, adeoque in omnibus familiis diversam & aliam aliamque habet præparandi rationem.

Quando & quomodo utendum præsertis Alexipharmacis, iis, qui Pestis infecti sunt?

Quemadmodum antea de evacuatione ventriculi & alvi, atque de sanguinis detractone diximus, ea statim in initio morbi sive infectionis, antequam pestilens virus & spiritus & humores tinxit, eisdemque se in totum miscuit, molienda esse, ita & de Alexipharmacis assumendis statuimus, nimirum ea statim in initio morbi, ubi unum aut plura signa infectionis comparuerint, & intra 4. horas, & antequam somno opprimatur æger, assumenda esse, nisi sanguinis missione sit opus; duabus enim horis post sanguinis missionem quiescere à Medicamentis oportet. Nam si opportunum tempus in infectione prætereatur, & leviora Pestis signa contemnantur, aut ad aliud morbi genus referantur, veluti vulgus facere solet, & sic argumentari: *Nullus adest tumor, aut Bubo, aut carbunculus; Ergo non adest Pestis; Sed esse febricula, aut capitis dolor.* At certe tempore Pestis omnis morbus, etiam ipsa vulnera suspecta nobis esse debent. Si quis enim signa lethalia expectat, nempe halitum ægri foetentem, vomitiones, & egestionem alvi nigricantes, vel Bubonum Anthracumque eruptiones, quæ mox evanescant, aut postliminò erumpant, iis & evacuatio frustranea est, & sanguinis missio noxiæ, & Alexipharmaca assumpta parum efficere poterunt: quia venenum jam vicit Naturam, & mors triumphare videtur. Ex recitatis itaque sudorificis haustulis unus isque tepidus ebibatur, & æger in lecto decumbens, probè obtectus vestibus, ad sudandum se componat, & per duas, aut ad minimum ad fescui horam sudet strenuè, sudorèmq; subinde calidis linteolis sub ipsi stragulis abstergat, caveat-

Alexipharmacia statim in principio exhibenda, antequam somnum capiat æger. Occasio.

Non dormiendum inter sudandum.
 Caveatque ne frigidi aëris appulsu aut stragularum remotione, sudoris effusio impediat, intraque viscera repellatur. Arceatur quoque æger sudans ne inter sudandum dormiat, & si somno vehementius infestetur, subinde spongiola, aut linteolum aceto vel vini, vel Rosar. imbutum nariibus odorandum admoveatur. Sudore ita probè effuso, denuo mundis linteolis per totum corpus abstergetur, & novo indusio vestiatur, & in lectum novis linteaminibus adornatum deponatur, mundis cervicalibus suppositis; & si dormituriat æger, prius panis buccellam in vino maceratam, & pauxillo Saccha. Cinamomoque conspersam, corroborationis virium gratiâ devoranda præbeatur, & sic per unam aut alteram horam, quiescere ac dormire permittatur. Qui ubi evigilaverit, tandem & remediis & alimentis spiritus vitales & cor corroboretur.

Quibus remediis ad cordis & spirituum vitalium corroboracionem, & quâ ratione, utendum.

Confortantia.
CUm Peste infectis cor & spiritus vitales omnium maximè periclitentur, veluti milites in acie constituti, ne à continua pugna cum veneno Pëstis succumbant, eis & remediis & alimentis convenientibus subinde succurrendum & opitulandum erit.

Cautio.
 Sunt autem corroborantia remedia duplicia; Alia quæ intra corpus assumuntur, & quæ foris applicantur alia. In remediis autem corroborantibus exhibendis duo sunt consideranda. I. Ut eis semper admisceantur ea quæ seminariorum pestis reliquias extinguere queant. Deinde considerandum est corporis ægrotantis Temperamentum, utrum vel calidum vel frigidum sit; ut si calidum est, & calidos æstus circa præcordia sentit, crebrasque calidas exhalationes per universum diffundi corpus percipit, tum sequenti Elect. subinde refocilandus erit:

R. Conf. Ros. Borag. Bugl. Pyrorum

Moscatell. condit. & minutim concisorum Calidiana 3. j. commisc. eisdemque admisc. pul. temperatenuiss. Coral. rub. & Boli Arm. veri ana 3 l. quomodo sp. Diamarg. frig. 3 ll. se. Card. Bened. Ace. rescificiosa ana 3 4. Marga vel prepar. vel in suc. Li. da. mo. vel aceto rosa: solutarum. 3 ll. Syr. Acetof. citri q. s. F. Elect. cujus q. semijugl. aut nucis Avellana crebro & diu & nocte gustet, aut sapiuscule devoret rot. ll. Manus Christi cum perlis vocatis, aut rot. Diamarg. frig. Foris autem in Temperamentis calidis cordis regioni & manuum carpo subinde applicetur sequens Epithema, duplicatis linteolis exceptum:

R. Aq. Ros 3 VI. Nymph. Viol. Boragin: ana 3 ll. Acetosa 3 l. Spec. Diatrion sant. pul. sem. Acetosa ana 3 ll. vel conficiatur saccus quadratus cordis regioni adaptatus ex sindone, in quo sequentia consuantur:

R. Rosa purpur. M. ll. Fl. Nymphae Citrina M. l. pulv. Sand. rub. 3. ll. sp. cordialium frig. Diamarg. frig. ana 3. j. Sem. Acetosa 3. B. contusa misceantur, ac cum Epithemate præscripto irrigentur, & cordis regioni alligentur.

In frigida verò constitutione corporum, qualia sunt Pituitosa, & ut plurimum *Quomodo frigida temperamenta rescicienda.* reliquias, quæ nullas sentiunt febrium reliquias, nec calidas evaporationes, sed potius ventriculi cruditatibus laborant, iis hæc sequentia exhiberi & applicari utilissimè possunt:

R. Cort. Citri Condit. Arant. Condit. ana 3. j. conf. Rorisma. Borag. Meliss. ana 3. 5. pul. se. Citri excort. & tenuiss. concisorum 3. ii. pulv. Cinam. el. 3 l. Garioph. 3 l. Coral. rub. pp. Marga. ana 3. B. Sp. Aromat. rosa. 3. ii. commisc. eisdemque admisc. Ol. Cinam. gutt. IV. Ol. Virr. 3 5. cum q. s. Syr. Citri condit. F. Elect. cujus nucis avellanæ quantitate sæpè devoranda ægro; aut sæpè gustet mearum morsularum particulam, supra in præservandi ratione descriptarum; aut bis in die exhibeatur Vnius Coch. mensura, aq. Cinamomi. Foris autem imponatur frigidioribus corporibus sequens Epithema:

R. Aq.

Externa.

℞ Aq. Meliss. Borag. Bugl. ana ℥ i i
vini Malv. seu alterius generosi, & aq. Ro-
rismar. ana ℥ i. suc. Citri mali ℥ 5. Aq.
Cinam. 3 i. Sp. Diamb. 3 i. commisc. F.
Epithema: Quod linteolis exceptum cor-
dis regioni & carpis manuum applice-
tur. Hoc ipso liquore & nares confri-
candæ sunt. Aut cum ipso liquore irri-
getur sequens ex Syndone Sacculus:

℞. Melissa M. j. Rorisma. Basilic.
ana M. 5. Pulv. Gargoph. Cinam. ana 3 lb.
corr. Citri 3 i. 5. styrac. calam. Benzoi. j.
ana 3 j. Sp. Diambra 3 lb. commisc. &
Syndoni insuantur. F. sacculus. Plurimum
quoque corroborat, in calidis quidem cor-
poribus & æstuantibus præcordiis, si orifi-
cium Ventri, bis in die ante alimenti assump-
tionem sequenti Linimento inungatur:

℞ Ol. Ros. Nymph. Citon. ana 3. i i.
cera alba q. s. Redigantur in Linimenti for-
mam, ac tandem eluantur ter cum aq. Rosa.
ac postremò cum succo Citri vel aceto rosa.
cui deinde admisc. tenuiss. pul. Coral. rub.
prepar. ana 3 i. F. Lin. In frigidis verò
corporibus, ventriculi orificium inun-
gatur aut Ol. è nucibus Moscatis, cui pa-
rum Ol. Gariophyl. sit adjectum, aut sequen-
ti linimento:

℞ Ol. è Mastich. Nardi, Menta. ana
3 i i. cera q. s. F. linimentum quod eluatur,
aut cum aqua Juniperi aut aq. Cinam. ac
deinde admisc. tenuiss. pulv. Mastich. &
Garioph. & Coral. rub. ana 3 j. F. unguen-
tum.

Etsi præscriptis remediis spiritus vita-
les, cor, ac reliqua viscera plurimum cor-
roborari certum sit, tamen nihil magis
universam naturam & omnia viscera cor-
roborat ac reficit, quam alimenta conve-
nientia assumpta. Sed quia ut plurimum
appetentia prosternitur in Peste, præ-
sertim in puerulis & foemellis, iis pro ali-
mento subinde offerenda est, aq. Stillat.
caponum, cum cujus carne & conserva, &
species paulò ante enumerata commodè
destillari possunt. Reliqua insectorum
alimenta, quum pro cujusque conditio-

ne ac fortuna liceat, debent esse optimi
succo & facili concoctionis: Cum autem
alii acidis, alii dulcibus magis delecten-
tur, ad palati cujuslibet placitum debent
preparari. In genere autem convenien-
tissima sunt insectorum alimenta, cremor ^{Insecto-}
hordei, Avena, aut cum sacch. passulisque ^{rum cibi:}
dulcoratus, aut aceto aut Omph. conditus.
Præstant enim acida dulcibus ad veneni
extinctionem. Omphacia autem cum a-
limentis cocta, suâ quadam proprietate
specifica extinguunt reliquias seminario-
rum Pestis, & ventriculi corroborati-
onem appetentiamque excitant; Ideo-
que commodissimè cum omnibus ferculis
concoqui possunt. Item conferunt insectis
quoque ova rec. sorbilia, in quorum luteo
commodè pul. Coral. rub. Marg. & Macis
immisceri possunt. Conferunt & juscu-
la ex ovis & cerevisia; item juscula pul-
lorum, & caro contusa pullorum, item
juscula carniū Bovillarum cum Omphac.
aut aceto condita: Oryza quoque in jure
Gallinæ aut carnis bovillæ cocta, item pru-
na Ungar. acida, Lac Amygd. ex carni-
bus pullorum, perdicum & avicularum
Montanarum cum aceto aut omphac. &
paucò croco condit. Ex piscibus lauda-
biles sunt, soli Lucii & Percæ aculeatæ.
Conferunt quoque poma pyraque affata,
aut in pulmentum cocta. Potus insecto-
rum convenientissimus est cerevisia clara
& palato grata; verum si calor febrilis in
insecto nondum est sedatus, aq. hordei cum
Cinam. cocta, quæ fervens per conf. Ros.
Borag. & Nymph. percolata est ac refrige-
rata. Confert quoque cremor hordei,
cum uvis pass. & Lac ex 4. sem. maj. cum
aq. acetosa paratum, saccharoque candi dul-
coratum.

Post virium aliquam restaurationem
quid agendum cum infectis?

ET ante & post corroborationem vi-
rium, post sudorificam potionem as-
sumptam, pro extinctione reliquiarum
Pestilentis veneni, & dilutione putridorum
humo-
rum ^{Post con-}
^{fortantia}
^{exhibita}
^{quid a-}
^{gendum.}

Aq. Ca-
ponum.

humorum, quotidie manè ac vesperi præbeantur ægrotanti \S III. sequentis potionis:

R. Syr. de Citro acido, è suc. Limonum, & è suc. Card. Bened. ana \S II. Aq. Scord. Card. Bened. ana \S IV. Misc. F. portio. Quarto à sudore die, si vires mediocres sint, humorum putridorum à Peste tinctorum colluvies, quæ adhuc in corpore hæret, placidissimo aliquo remedio iterum subducatur, qualia hæc subsequuntur: \S x. Pulp. Cass. Fistul. aut \S III. Syr. rosa. sol. aut nodulo ex Rhab. Agar. Troch. & fol. Sena ana \S j. in Sindone ligatorum, & in \S IV. aq. Card. Bened. per noctem maceratorum, & diluculo fortiter expressorum; in eo liquore validioribus misceri & resolvi possunt, aut El. lenit. \S ij. aut Diaphen. \S ij. aut in biliosis corporibus El. Ros. Mes. \S j. Hæc assumi debent diluculo, 6. horis ante prandium.

Curatio Symptomatum in Peste. Quæ Symptomata comitentur Pestilentem infectionem.

Symptomata
qua?

Symptomata pestem comitantia duplicia sunt: Propria & Communia. Propria, quæ simul & signa sunt Infectionis, sunt I. Tumor Glandularum, sive Bubo in Emunctoriis vocatis partibus. II Anthrax seu carbunculus in musculosis partibus. III Febris pestilens, quæ est aut mitissima aut ardens & sævissima. Quam deinde IV comitatur capitis dolor. V Dormiendi inexpugnabilis cupiditas. VI Aëstus præcordiorum. VII Sitis vehemens. VIII Vigiliæ continuæ, sive dormiendi impotentia. IX Nausea & vomitio. X Alvi fluxio. XI Alvi nimia suppressio. XII Respirationis & suspirii difficultas. De quorum Symptomatum curatione brevissimè quam possumus ordine differemus.

Circa tumores seu bubones Pestilentes, quæ sint observanda, & quæ curatio.

Bubo pestilens. **I**N peste, potissimum quæ ad humores putridos habet analogiam, ut plurimum

circa adenosas partes, ut sunt ponè aures, circa collum, sub alis & circa inguina, tumores pestilentes excitantur, qui Græcis generaliter Bubones appellantur. Quamquam proprie tumores inguinum eo nominetantum vocentur, circa quos notatu necessaria sunt hæc.

Tumores pestilentes quantò sunt majores, & è cute eminentiores, tanto sunt securiores. Minores verò, & sub cute altius delitescentes, magis sunt periculosi, quam flavi; perniciosi autem lividi & nigri. Bubones circa collum & sub alis periculosiores sunt, quam in Inguinibus, propter cordis vicinitatem. Statim in initio erumpentes Bubones securiores sunt, quam qui tertio aut 4. die primò apparent. Maximè autem perniciosi sunt, qui erumpentes paulò post evanescent manente virium debilitate.

CURATIO BUBONUM in eruptione nis principio ejusmodi institui debet: Si Bubo altius sub cute delitescat, foras eliciatur; aut cucurbitulæ affixione, aut catapl. ex rad. Raphani & Scroph. maj. & sale pauillo acetoque conspersis ac contusis facta impositione. Si verò tumor sub extensa cute emineat, summo studio conandum est, ut à nobilioribus partibus cordique vicinis ad ignobiliores & remotiores detrahatur, ut si ponè aures, aut circa collum, aut sub alis hæreat, ad volam manus; ab inguinibus vero ad plantam pedis revellatur. Ubi commodius & cum minori periculo curari, incidi & venenata materia ex eo extorqueri potest. Revelli autem aut detrahi tumor pestilens, qui nondum radices egit, facile sequenti catapl. poterit, eo volæ manus vel plantæ pedis ejusdem lateris, in quo Bubo insidet, imposito, ac per noctem ter quaterve renovato.

R. Rad. glandularum Scrophul. (Braunwurth / qua est species Ballotes seu Urtica moriua, & qua Bubonium jure appellari debeat.) maj. \S II. Rad. Raphani \S j. contund. ejusdemque admisceatur fermenti acerr. \S j. 5. & cum aceto

Prognostica.

Quæ bubones eliciunt.

vinum

Cataplasma pro
translo-
cando
bubone.

vini q. s. concoquantur, & in formam catapl. redigantur, & volæ aut plantæ, prout necessitas exigit, imponantur calida. Verum ubi Bubo sive Tumor radices egit, & tenacius loco hæreat; quàm ut in alium locum se trahi patiatur, tumori statim cucurbitula magna cum multa flamma per horam unam imponatur, crebroque avulsa iterum affigatur, sine ulla cutis incisione; tandem post avulsam cucurbitam sequentium cataplasmatum maturantium & attrahentium unum calidum ter quaterve per horas vi. imponatur, subindeque renovetur:

℞ Rad. Raph. Scroph. ana ℥ ii. salis 3. Vl. Saponis nig. ℥ i. Fermenti acer. ℥ i. s. cum aceto sufficienti concoquantur, confusa & in catapl. formam redigantur, per duplicatum linteolum extensa, tumori imponantur. Post horas autem sex, remoto catapl. rursus cucurbita imponatur, cutisque totius Tumoris altius scalpello convulnere- tur, & sanguis venenatus tam diu elicia- tur, donec nihil amplius sanguinis profluat. Post sanguinis evulsionem iterum aliud se- quens cataplasma, maturativum & attra- ctivum, per noctem imponatur: sæpius- que renovetur calefactum.

℞ Caspam grand. cujus interna medulla excavetur; ejusque cavitas Theriac. Andr. repleatur, & aut linteolo, aut lino madi- do involuta in ferventibus cineribus ad mollitiem usque concoquatur; quæ deinde confusa in pulvis formam redigantur, ac tantundem pulmenti Avenac. in Aceto cocti admisc. F. catapl. Aut, ℞ Farin. sem. Li- ni. fœnug. Pulv. rad. Alib. ana ℥ i. Rad. lil. Alb. Scroph. ana ℥ i. s. contundantur omnia, & cum q. s. Aceti decoquantur. F. catapl. Aut ℞ Cortic. Med. Sambuci M. ij. concisa coquantur cum flore lactis: Quibus confusis admisc. fermenti a. p. F. catapl. quod mirum in modum maturat & attrahit. Aut ℞ Ra- dic. Symphit. maj. conterantur inter duos lapides; & tumori cataplasmatibus modo imponatur; altero die nulla expectata am- pliori maturatione, ipse tumor in infe-

Cataplasma val-
de matu-
rans;

riori parte, aut candenti auro altius inu- ratur, aut novacula incidatur, aut grandi scalpello perfodiatur; (cavendo tamen ne nervus subjectus ulla ratione lædatur,) ex quo & sanguis & venenata sanies expri- matur, & mundificetur, vulnusque aper- tum ed usque retineatur, donec omne ve- nenatum pus fuerit expurgatum, subinde imponendo Empl. mundificativum, quale est hoc sequens:

℞ Terebinth. cum aq. Scordii elota ℥ i. Mundifi- Mellis rosac. ℥ 5. Misc. F. Empl. Aut ℞ Me- cans: dulla panis Silg. in lacte macerata urvarum passar. seminibus seu acinis evulsis, Ficum ping. ana ℥ i. coquantur in q. s. cervi- sia, quibus addantur butyri sine Sale pro arbitrio, & redigantur in formam Catapl. Emollit enim & mundificat egregiè. At si Tumor adhuc durus est & callosus, emol- liatur Empl. Diachyl. aut imponatur Empl. ex Gum. Galbano Ammonia. & Serapino ana ℥ 5. in aceto liquef. compositum. Id quoque pro Naturæ miraculo haberi de- bet, si quis Busonem terrestrem (venena- tum animal) ligneo cuspe transfixum sub Attrahi- um ex busones: dio exiccavit, siccatumque tempore Pe- stis per noctem in aceto maceravit, tumo- rique aperto vel carbunculo imposuit, om- ne contagii venenum ad se trahere, & ho- minem certo præsidio à periculo Pestis li- berare. Porro delicatiores, quales sunt virgines, fœmellæ & pueri, qui nec ustio- nem, nec incisionem tumoris tolerare queant, iis Empl. cutem rumpens imponi tumori debet, quale est:

℞ Ammon. Bdellii Sagapen. ana ℥ 5. colliquefiant in pauxillo aceto, ut fiat similis pulvi. Quibus admisc. acris fermenti ℥ j. pul. Rampens: rad. Pterri, Sem. Sinapi ana 3. ii. Euphorb. castor. ana 3 lb. Vitrioli. Ro. 3. i. i. Can- tharid. 3. ii. Misc. F. Empl. quod per lin- teum extensum Buboni imponatur; sed quia hoc empl. adurendo dolorem excitat, se- quens sine dolore cutem perumpit, & do- lores aperit:

℞ Sem. fœnugrec. Lini ana ℥ 5. confusa Dolorem macer. in pauxillo aceto vini donec F. crassa mitigans.

mucago, qua per rarum linteum transfigatur, cujus ℥ 5. admisc. ℥ i. fermenti acerr. & pul. canthar. ℥ ii. F. catapl. & imponatur tumori per noctem.

Carbunculus Pestilens quomodo tractandus, & curandus.

Carbunculus quid?

A Nthrax est pustula fervens instar igniti carbonis, adjacentem carnem & cutem adurens, exedens, exulcerans & crustam generans, (sive Gewerblase oder brandige Pestilenzblätter nostrates vocant) qui colore quamquam rubeus est & minus periculosus, nonnunquam cinereus & niger, perniciosus; & omnis carbunculus per carnosas partes erumpit. Carbunculi qui circa cordis regionem erumpunt, perniciosi sunt; deinde qui circa Epar & circa Orificium ventriculi; nec illi periculo carent, qui in collo nascuntur. Minus autem periculosi sunt, qui in cruribus, brachiis, aut natibus proveniunt. Cavendum est sedulo, ne refrigerantibus remediis impositis carbunculi ad interiora repellantur, aut eorum eruptio impediatur, sed semper attrahentia & venenum elicientia imponantur. Exploraturus utrum sanabilis, aut lethalis sit carbunculus, Empl. ex molli Galbano imposito, quod si ulceri tenacissimè adhæreat, ut non nisi cum crusta revelli valeat, salutis spes est; si eidem non adhæreat, incurabilis, & ut plurimum lethalis est.

Pregnost.

Cautio.

Probabilis aut lethalis carbunculi.

Similiter si Empl. ex Ther. Andro. carbunculo imponatur, & ipsa Theriaca super carbunculum citò exareseat, aduraturque, & Anthracis constitutio à Theriaca nihil immutetur, lethale signum est.

Sectio periculosa.

In curatione pestilentis carbunculi frustra & non sine periculo sectio tentatur, ipsum tamen auto candenti inurere utilissimum esset. Quod si nec id fieri liceat, statim in initio Cucurbitula magna pustulæ imponatur, & altius scalpello scarificetur, virusque pestilens eliciatur.

Post sufficientem scarificationem sequens ex fuligine Emplastrum, (quod mirificè maturat, & venenum elicit, & maturat, & putri-

da à puris partibus separat, crustamque aufert,) imponatur, cujus parandi ratio hæc est:

℞ Ther. Andr. Mithrid. opt. ana ℥ ii. Terebinth. in suc. aut aq. Scord. elota ℥ 5. Mellis rosa. ℥ iii. buty. rec. sine sale, ℥ 5. salis torrefacti. ℥ ii. Fulig. (qua fumus est in caminis concretus) ℥ v. saponis nig. ℥ vi. Vitell. ovorum N. O. j. contundantur, & subigantur omnia diutiss. F. Empl. Maturat quoque Carbunculos, doloremque in eis mitigat sequens Epithema:

℞ Album. ovorum No. iii. In quibus Epithema resolvantur ℥ iii. Alum. crudi, & simul mitigans. diutissimè concutiantur, in spumamque redigantur, quæ linteolis excepta carbunculo imponantur, & arefacta lintea subinde renoventur; Idem præstat & maximè mundificat sequens Linim. linteolis exceptum & carbunculo impositum, sæpeque renovatum:

℞ Terebinth. in aq. Scord. lota, Mellis Rosa. ana ℥ 5. commisc. Simpliciora sunt & pauperibus magis obvia, non minus tamen in maturando attrahendoque & mundificando carbunculo efficacia hæc quæ nunc ponimus:

℞ Ovi luteum, cui admisc. sal torrefactum pro arbitrio, & parum fellis bovini, ex quibus F. Lin. Aut:

℞ Pomum Arantium per medium divisum, & utramque partem circa medullam Ther. Andro. infarctum, quæ iterum conjunctæ in linum madefactum involvantur, & sub cineribus ferventibus ad molitiem coquantur, & Anthraci imponantur. Aut pauperiores Cynoglossam herbam, aut Rad. Consolid. maj. aut scabiosam inter lapides contusam, carbunculo imponant, sæpiusque immutent: Similiter trititum ab homine sano & adhuc jejuno existente commasticetur, & instar Emplastri, carbunculo imponatur. Maturat enim egregiè & dolorem mitigat. Specifica virtute carbunculum extirpant, & virus eliciunt fol. uræ lupina, quæ Aconitum est Gracorum. Est autem Aconitum herba un-

Specificæ.

nico caule, 4. fol. è regione sibi ipsis instar stellæ posita habens, & in summitate unicum nigerrimum fructum ferens. Vnde nostris *ein Bärentraut* / aliàs *Herba Paris* dicitur.

Buso.

At buso exiccatus & in aceto maceratus Carbunculo impositus; in Veneno eliciendo reliqua omnia superat. Ne autem carbunculus latius serpat, & adjacentes partes adurat & inficiat, sequens defensivum Lin. circumquaque per ambitum Anthraci illiniatur, cavendo ne eo Anthrax attingatur:

Defensivum.

R. Boli Arme. tenuiss. contriti 3 ii cum q. s. ol. Rosa. in plumbeo mortario exactè commisc. & in unguenti crassioris formam reducantur. Crusta carbunculi Butyro non salito inungatur, donec sine dolore detrahi & adimi queat. Detrasta. crusta superioribus recitatis remediis facillè mundificari, & catapl. ex fuligine persanari potest. Si impura & superflua caro ex ulcere carbunculi pronasce deprehendatur, extirpari debet, vel unguento Egypt. aut Rad. Ranunculi, quæ & flammula dicitur, contusa & imposita. Porro in curatione tum Bubonum tum carbunculorum pestilentium, studiosè cavendum est, ne vel sanies virulenta, aut catapl. Empl. & alia remedia ab iisdem sublata manibus contrahantur, ac pedibus conculcentur à quovis, sed statim aut in fluvium projiciantur, aut in loca solitaria deportentur ac sepeliantur. Facillimè enim suo contactu & venenata. contagione homines inficere possunt. Plura vide in Chirurgia nostra.

Observatio.

Æstus Febrilis infectorum, quibus remediis curandus.

Æstus.

PEstis per se, ut diximus, morbus est, & quidem, ut Hippocrates vocat, divinus, & ut Galenus ait, ex omnipotenti causa ortus. Febris autem est perpetuum accidens pestis; ideo Medici Pestem inter species Febris retulere. Pestilens autem febris vel est micissima, vel sæva & perniciofa. De Februm curatione in superioribus tradi-

dimus: sæpe verò in infectis æstus Febrilis reliquias habet, & inflammationem circa præcordia sentiunt. Quod Symptoma infectorum sequentibus remediis extingui & mitigari potest: *R. Syr. Acetos. Citri 3 ii. Aq. fragorum aut Card. Bened. 3 vi. Misc. ac crebrò bibenda offerantur, aut subinde bibat ager lac ex seminibus frig. Inlapi- ma. cum aq. Cicho. confectum, aut bibat crebrò aquam hordei. Foris autem Spina dorsi & Hypochond. sequenti Linimento inungantur:*

R. Ol. Rosa. Viola. Nymph. ana 3 ii. Mucag. ex sem. Citon. & Psylli facta 3 i. 5. Cera parum. F. Lin. Æstum febrilem semper comitatur sitis & linguæ ariditas; si- Linim. tim sedat succ. Arantiarum Syr. è citro, Rob. è ribes linguæ illita, aut Tamarindi fructus in ore retenti.

Capitis dolor in Peste affectis quibus remediis curandus.

Capitis dolor in Peste infectis provenit ex venenatis & calidis halitibus, ad cerebrum delatis, qui vix in totum tollitur, donec causa evaporationum non evacuetur. Supprimat tamen vapores ad cerebrum ascendentes creber usus Syr. Viol. cum aq. Cicho. mixti, & mitigat dolorem sequens Epithema capiti impositum:

R. Aq. Rosa. 3. vi. Acei rosa. 3 ii. Albu. ovo. concuss. No. ii. commisc. & duplica- Epithema. tis linteolis excepta capiti imponantur.

Dormiendi cupiditas, sive Somnus profundus in infectis, quibus remediis discutiendus.

Somnus & dormiendi cupiditas in Infectis provenit ex crassis vaporibus ad cerebrum delatis, & venas arteriasque soporales Carotidas dictas, obstruentibus, qui discuti debet leni frictione Temporum cum linteolis calidis, & odoratione acrium; qualis est sequens nodulus: *R. Castor. 3 ii. Olorise. in syndone colligantur, & in aceto vini rum ac- forti*

forti macerentur, naribusque ægri subinde olfacienda applicentur.

Vigilia continua, sive Dormiendi impotentia in Peste infectis, quibus remediis curanda.

Vigilia. **C**ontinua vigilæ & inquietudo oritur extenuibus, acribus & calidis vaporibus ad cerebrum delatis, ibidemque spiritus animales turbantibus. Infectis itaque inquietudine laborantibus somnus est conciliandus; somnum verò conciliant, si vespere crura, pedesque & brachia ac manus lavantur in aq. cal. in qua sunt incocta fol. salicis, Malva, Lactuca, Rosa, fl. Cham. ac capita Papav. ana ad placitum. id si peragere non liceat, temporibus imponatur, atque Saturæ coronali sequens Epithema:

Epithema pro capite. R. Sem. Papa. albi ꝯ. j. Nuc. Persic. ꝯ. ss. quæ minutissima conterantur in mortario, eisque admisc. album unius ovi, Aq. Ros. ꝯ. ii. Solani, Lactuca & Aceti Rosa. ana ꝯ. j. Diu agitata & subacta linteolisque duplicatis excepta imponantur.

Nausea & vomitiones in Peste affectis, quomodo & quibus remediis curanda.

Vomitus. **N**ausea & vomitio in Peste excitantur à venenata colluvie in ventriculo collecta. Vomitiones non sunt temerè sistendæ, nisi prius omnis colluvies per vomitorium haustum probè sit eluta: in quem usum, **Prognost.** ut supra diximus, plurimum facit, si exhibeatur haustus ægro liquoris aqua ex gr: Juniperi per descens. in pelvi destillati. Aut haustulus aceti & aq. simul mixtorum; in quibus per noctem simul macerati & manè incocti cortices rad. Ingland. Post tractam per vomitum colluviem, statim vomitum sistunt 2. aut 3. Cochl. vini, in quo cocta sunt Carioph. Masti. ana ꝯ. 3. Ros. sic. p. j. Ventriculus autem foris inungatur Ol. Rosa. aut Masti. ac post inunctionem Lamina panis tosta & cal. cum aceto vini aut rosa. irrigata, & cum Pulv. Mastich. & Carioph. conspersa.

Vomitum sistens.

Alvi fluxio in infectis quomodo curanda.

UT nec vomitum temerè sistendum esse diximus, ita nec alvi fluor, si non inferatur virium sensibilem prostrationem, restringi debet, quia per alvi fluxionem venenata ac putrida colluvies ex intestinis & Venis Mefaraicis evacuat. *Nigra alvi fluxio lethale est signum.* Verum si vires per egestionem continuam debilitentur, & per se non subsistant, utendum crebrò est Patienti Prunellis Sylv. Sacch. conditis & lacte Amygd. cum aq. in qua extinctum sæpius sit ferrum candens. Conducunt & lutea ovorum dura ac in aceto macerata. *Aut:*

R. Sem. sanguinaria ꝯ. i Nucis Moschata, Carioph. ana ꝯ. 3 Pulverisata commisc. cum Placentæ ovi vitello, & in focum ferventem ab igne & cineribus purgatum adfundantur, & in placentulam pinentur, & ægro comedenda per duas vices præbeantur. Sanguis quoque leporinus exiccatus, & ꝯ. i cum vino rub. exhibita potenter alvum sistit: aut ꝯ. i sequentis pul: exhibita:

R. Bol. Armen. Acatia vulgaris. Coral. Sanguis leporinus, præferatim si caput sit in Martio. rub. præpar. ana ꝯ. j. Misc. Epul. ventri imponatur Catapl. ex far. fab. albu. ovorum & pauxillo aceto confectum.

Alvi suppressio infectorum Peste, ut solvenda?

TOto morbi tempore alvi suppressio noxia est propter virulentas exhalationes ad cor & cerebrum delatas, ex alvi suppressione ortas. *Alvi suppressio.* Semper itaque ut alvus lenis sit & laxa, enitendum est; & suppressio quidem alvi facilimè aperiri potest, aut leni Clystere, aut glande, ex melle aut Sapone confecta, quæ superius annotata sunt; aut si febrilis calor abest, imponatur umbilico Fel Bubulum, cui nonnihil Aloës & Salis est admixtum, lino aut stupa exceptum.

Sanguinis è Naribus effluxio in Peste affectis quomodo sistenda?

Prognost. **N**onnunquam erumpit Sanguis ex naribus infectorum, plerumque in plethoricis & mulierculis menses suppressas habentibus. Post sanguinis eruptionem si nihil levaminis sentiat æger, lethale est signum. Siftitur autem sanguinis eruptio hisce sequentibus: Fronti applicentur Rosæ, quæ in aceto Rosæ servantur expressæ; aut macerentur rosæ siccæ in aceto, & linteo fronti constringantur & alligentur. Lanugo sive Papulæ in capitibus Card. Bened. repertæ & convolutæ, naribus inditæ, sistunt sanguinis fluxum. Similiter si auricularis digitus ejus lateris ex quo sanguis erumpit, dolorificè constringatur vinculo, statim sistitur sanguis; Sed his magis præstat Ranæ palustris in ollula crematæ cinis, instar noduli in Syndonem colligatus & naribus insertus.

Hæmorrhagiam sistenda.

Suspiria ac Respirationis difficultas in Peste affectis, quibus remota remediis.

Respirationis difficultas. **D**ifficultas respirationis & suspirii, oscitationisque & eructationis in Peste infectis provenit ex crassis vaporibus, vel diaphragma opprimentibus, quod ex gravitate Hypochondriorum deprehenditur; aut thoracis cavitatem replentibus; cujus indicium est tussicula sicca; aut capsulam cordis occupantibus, id quod ex palpitatione cordis dignoscere licet; tumque præstat, 3 Sol. vel Anisi, vel Angel. vel cimini cum tribus cochlear. vini aut aquæ *Remedia.* Card. Bened. exhibere; Hæc enim per eructationem expellunt crassos vapores. Similiter & cortices Arantiarum condit. comestæ, aut radix Zedoariæ comesta ac deglutita. Extenuant enim & discutunt crassos vapores, & organa respirationis ab impedimentis omnibus liberant.

SECTIO IV.

De Curatione symptomatum Febrilium.

Quæ Symptomata comitentur Febres.

Symptomata sive accidentia Februm *Februm sympto-* sunt affectiones non per se, seu à causis *mata.* morbificis ortæ, sed ex aliis antecedentibus morbis genitæ. Nulla Febris est quæ non alia Symptomata molestaque accidentia secum trahat. Etsi autem regulare est, morbum prius esse curandum, quàm ejus Symptomata, sit tamen interdum ut neglecto morbo, Medicus cogatur statim in initio ad symptomatum curationem accedere. Sunt autem præcipua Februm Symptomata:

- I. RIGOR.
- II. ÆSTUS VEHEMENS.
- III. CAPITIS DOLOR.
- IV. SITIS.
- V. ARIDITAS LINGVÆ.
- VI. SOMNVS PROFVNDVS.
- VII. VIGILIÆ CONTINVÆ.
- VIII. DELIRIVM.
- IX. SANGVINIS E NARIBVS ERVPTIO.
- X. RESPIRATIONIS DIFFICULTAS.
- XI. VENTRICVLI DOLOR.
- XII. APPETENTIÆ PROSTRATIO.
- XIII. VOMITIO.
- XIV. ICTERITIA.
- XV. ALVI OBSTRUCTIO.
- XVI. ALVI FLVXIO.
- XVII. SVDORIS IMMODERATA PROFVSIO.
- XVIII. ANIMI DELIQVIVM.
- XIX. TVMOR PEDVM.
- XX. RECIDENTIA FEBRIS, sive RECIDIVA.

Horum Symptomatum nudam tantum medicationem brevissimè subjiciam.

Rigor

Rigor Febrilis quomodo curandus.

Rigor. **F**ebres communes ut plurimum cum rigore seu frigore invadunt: Rigor autem & frigus febrile, extensione ac remissione tantum differunt. Rigor enim fortis est frigiditas, in qua membra concutiuntur. Frigus autem est, ubi extremitates partium manuum ac pedum, Digiti, Nasus & Spina dorsi tantum refrigerantur. Vterque autem oritur ex fumosis vaporibus; à cordis inflammatione ad carnosam membranam propulsis, ibidemque refrigeratis, quæ ubi flamma è corde tanquam elibano erumpit, eos discutit & extinguit, rigoremque sistit, & immensus æstus subsequitur; Rigor molestissimus est, & in Quartana ac Quotidiana Febre.

Cura. **CURATVR FRIGVS** febrile confricatione partium refrigeratarum cum pannis aut linteis calefactis, & tegumentis conca-
Remedia. lefactis corporique impositis. In Rigoris initio utilissimè exhiberi possunt, 3 j. ℞. Ther. Andro. cum 3 i i aq. Iuniperi cremabilis. Foris autem prodest, inungere spiram, paulò ante Paroxysmum, vel ol. Chamam. vel Anethi, vel Ruta, cui momentum aq. Iunip. aut vini sit admixtum. Poros enim aperiunt, & crassos vapores extenuant, & membranas musculorum molliter calefaciunt. Sed raro admittitur Rigoris curatio.

Ardor sive æstus Febrilis quomodo curandus.

Æstus. **Æ**stus sive ardor in Febris est ipsa Forma Essentialis Febrim. Æstus ut plurimum rigorem subsequitur. Nulla recitius restinguitur calor Febrilis atque finitur, quam abstinencia Potus in ipso æstu. Bibere enim in Paroxysmo, est frigidissimam aquam in silicem, aut candens ferrum affundere. Remedia, æstum febrilem mitigantia sunt Syrupi refrigerantes, quales sunt Viol. & Citri acid. & è succ. Granatorum, quorum 3 i. admisceri possunt 3 i i aq. Card. Bened. & in febrili ardore crebrò cochlear pro vice haurire. Quin & se-

quens haustulus mirificè extinguit æstum Febrilem;

℞ Iulapii vel Syr. Viol. 3 iiii Aq. Rosa. Iula-
3 ii Aq. Iun. cremab. 3 i ol. vitr. 3 ℞ Mo-
schi gr. i x. Misc. F. posio, cujus cochlearis
mensura subinde assumatur. Foris autem
ante Parox. spinam dorsi & Hypochond.
inungere, utilissimum est, sequenti Lini-
mento, quod extinguit Æstum Febrilem.

℞ Ol. Ros. 3 ℞ Nymph. Citon. ana 3 i i Topica.
Mucag. ex se: Citri & Psylli, cum aq. Rosa.
facta 3 i ℞ cera candida q. s. F. Lin. Cui
admisce momentum Aceti Rosar. cordi ve-
rò, Epatis, & carpis manuum imponatur se-
quens Epithema in æstu Febrili:

℞ Aq. Rosa. 3 i i i Lactuca, Borrac. Epithe-
ana 3 i i succ. semperviv. maj. 3 i s Aceti ma.
Rosa. 3 j Sp. Diatrion: Sandalon 3 i i Misc.
F. Epithem. Quod duplicatis linteolis ex-
ceptum imponatur. Abstrahit quoque æ-
stum Febrilem à partibus principibus Tin-
ca piscis, si viva sub plantis pedum, donec
spontè emoriatur, ligata fuerit, Idem præ-
stat, si carpis manuum Bursa pastoris cum
rad. contusa & Aceto rosa: confersa instar
catapl. imponatur.

Capitis dolor in Febris quomodo curandus.

Dolor capitis in febris à calidis & a-
cribus vaporibus ad cerebrum dela-
tis, ejusque temperiem turbantibus exci-
tatur. **CURATIO** ejus requirit Pu-
tridorum humorum, in quibus accensæ est
febris, artificiosam evacuationem, sive id
fiat per venæ sectionem, sive per purgans
medicamentum, sive per Enemata; quo-
rum omnium utendi ratio in febrim cu-
rationibus est descripta. Hoc loco Topi-
ca tantum pauca subijciam; in quibus no-
bile est sequens Lin.

℞ Ol. ex st. salicis. Nymph. Viola. ana
3 i i Cera alba q. s. F. Lin. Eluatur cum
aq. Rosa. eoque inungantur Tempora & su-
tura Coronalis: aut imponatur sequens
Epithema:

℞ Aq. Rosa. 3 i i i Aceti Rosa. 3 i.
Aq.

Aq. fl. Sambuc. & suc. semper viviana ʒj. Albu. j. ovi concussa & stupa excepta, ac potissimum Coronali futuræ imponantur. Cucum. condit. ex frigidiss. aq. elota & in latis laminas concisæ, frontique & Temporibus impositæ, capitis dolorem tollunt.

Sitis immodica in astu febrili quomodo restringenda.

Sitis. **S**itis in febris est soboles æstus. Sitis vehementis cum ariditate & nigritielinguae si repente & sponte cesset, lethale est signum. Sitis in febris post somnum cessans, est salutare signum. In initio Paroxyismi ab omni potu studiosè arcendi sunt ægri. In declinatione verò febris, si amplius sitim tolerare nequeunt, largiss. haust. aq. hord. propinare convenit: vel etiam purissimam ac frigidissimam aquam fontis scaturientis; quam si rursus vomat æger, salva res est: Omnis enim calor febrilis extinguitur. Interea autem sitis vehementia mitiganda erit suctione suc. Arant. aut suc. granat. aut crebra collutione oris cum aq. frig. cui parium aceti sit admixtum; aut retentione & commasticatione in ore fructuum Tamarind. aut uvæ-rum pass. in aceto maceratarum, aut saccha. cand. cum suc. viola. parati, aut quod in Syr. Viola. concrevit. Gustare quoque crebro utilissimum est Syr. Citri acidi, sive per se, sive cum pauxill. aq. Fragor. aut Viol. commistum. Aut lambendo sæpe intra os assumat Rob. è ribes. Aut:

Inlapi-um. **R** Syr. acidi citri ʒj. Suc. Citri ʒss Aq. Card. Bened. ʒ III. F. potio. de qua sumat crebro i. cochlear. mensuram; aut bibat in ipsa declinatione Febris aquam Hord. quæ hac ratione parari potest: **R** Hord. mundati M. i i Vvarum pass. m: M. j. Se. Anisi ʒ III Cinamo. Glycer. rasa ana ʒ I I. Excepto hordeo, reliqua contundantur & cum aq. ʒb 4. in cantharo fermento oblinito, & in ahenum aqua plenum collocato, per i i horas coquantur.

Ariditas, scabrities, nigredoque lingua in Febris ut curanda.

IN ardentibus Febris exarescit Lingua, & exusta scabra fit, & fuliginoso vapore imbuitur atque nigrescit. Tale Symptoma vulgus *Lingua arida, nigra, scabra.* die Breune vocat. In curatione ardentis febris & hujus Symptomatis magna est habenda ratio, ac primum quidem prodest venam utramque sub lingua sitam incidere; deinde os aq. Hord. tepida colluere, moxque omnem scabritiem & sordes vel ferrea furcula, vel ex ligno salicis facta, aut argenteo cochleari abraderet & emundare oportet, rursusque colluere cum aq. Stillat. vel Fragor. vel fl. *Remedia.* prunell. vel aq. Prunell. herba, aut decocto cort. rad. Prun. Sylv. ac tandem inungenda est lingua paucò melle rosa. cui ol. vitr. sit admixtum. Hæcque omnia sæpe per diem sunt molienda, sæpeque confricanda lingua aut aspero panno, aut fol. Salvia in aceto madefactis. Si verò rursus areseat, subinde inungatur sequens mucago:

R Se. Citon. ʒss Se. Psylli ʒj. confusa macerentur in ʒij. Aq. Rosa. donec crassa mucago efficiatur, quæ per rarum linteolum cernatur, cujus ʒj. admisc. ʒj. ol. vitr. & Sacchar. Candi in Syr. Viol. concreti ʒ s. F. Lambile.

Somnus profundus, sive sopor continuus in febris, quomodo curandus.

Somnus profundus in Febris generatur ex crassiss vaporibus ad cerebrum delatis, ibidemque refrigeratis & nervorum meatûs leniter obsidentibus. In profundo somno si excitati absurda loquantur, nec paulò post ad se redeant; aut ubi somnus in febris laboriosus est, id est ubi expavescentiam & tremorem infert, lethale est signum, juxta illud Hipp. 2. *Sopor.* Prognost. Aphor. i. In quo morbo somnus laborem facit, mortale est; si vero juvet, non mortale. Somnus in declinatione Paroxyismi, ubi calor jam evanescere incipit, salutaris est.

CURATIO soporis seu somni profundi

di in febris est, ut æger crebro excitetur, & suavis confabulationibus à sopore avocetur, & ut caput leniter calefactis linteolis confricetur, nimirum ut vapores crassi extenuentur ac discutiantur. Naribus autem in somniculosis nodulum admove ex *castor.* in Syndonem ligato confectum & in aceto *acerr.* maceratum, aut *succ. rad. Fœnic.* naribus oblinire, utilissimum est.

Vigiliis in Febris quomodo medicandum.

Vigilia. **V**igiliae continuæ in Febris facile turbant Rationem, & vires prosterunt, propter calidos & siccos vapores ad cerebrum delatos, idque mordicantes; Somnus itaque conciliandus primo quoque tempore erit. Somni ergo tempore in tenebroso loco detineatur æger, & silentium imperetur, ac intra corpus haustulus lactis ex seminibus Papaveris albi cum aq. Lactuc. confecti exhibeatur. Foris autem temporibus & futuræ coronali imponatur sequens Epithema:

Emulso. *R. Se. Papav. albi ʒj. Nucl. Pers. ʒss* conterantur tenuissimè, eisdemque admisc. *albu. j. ovi. Aq. Rosa. ʒi Aq. Solatri, Lact. Aceti rosa. ana ʒj.* Diu agitata ac commixta linteolis duplicatis excepta applicentur. *Aut:*

Epith. *R. Se. Papav. albi ʒj. Coriand. prepar. ʒss* *Se. Lactuca ʒi Santal. albi ʒi fl. Ros. Viol. Nymph. ana M. j.* contusa insuantur raro linteolo. *F.* sacculus capitalis, qui ambo tempora & futuram coronalem contegere queat, & irroretur *Aq. Rosa.* cui pauxillum *Aceti Rosa.* sit admixtum, & capiti alligetur. Violenta somnifera, quale est *Opium* & *Mandragora*, semper fugienda sunt, nisi extrema urgeat necessitas: Tumque citissimè somnum conciliat sequens Linim. temporibus & naribus illitum:

Linim. *R. Opii Thebaici ʒss in aceto Rosa. ad ignem resoluti, cui admisce unguenti popul. ʒi F. Lin.*

Delirium Febricitantium quomodo curandum.

IN ardentibus febris ex calidis & mordacibus vaporibus cerebrum ferientibus, item ex capitis dolore, & continuâ vigiliâ sæpè turbatur ratio, ut æger absurda loquatur, sed discussio febrili calore & somno concepto, iterum placatur delirium; si vero cessante febre maneat mentis turbatio, lethale est signum. Ideo studendum est, ut primo quoque tempore in febrili delirio somnus concitetur; conciliandi autem somni remedia jam commemorata sunt; Nunc satis sit formulam sacculi subjecisse ad vapores è cerebro eliciendos, & somnum conciliandum, quæ sic habet:

R. Fol. Lactuca, salicis ana M. l. fl. Rosa. Viol. Nymph. ana M. ʒ. capit. Papa. albi cum Sacculus. sem. contusi. M. l. Fol. Rorisma. Majora. fl. Chama. ana P. i. concid. & in sacculo oblongo, qui & synciput & tempora obtegere queat, insuantur ac intersuantur, ac tandem ebulliant in *aq. Rosa.* aut *aq. Simplici,* & sacculus fortiter expressus calidus coronali futuræ imponatur.

Sanguinis è naribus in Febris eruptio quomodo sistenda.

EX vehementiore Febrili calore fervet & extenuatur in corpore sanguis, & ab inflammatis spiritibus sursum per venas jugulares in cerebrum propellitur, indeque per nares sæpè excernitur, præsertim in Corporibus Plethoricis. Aëtius utramque & exiguam & immoderatam sanguinis è Naribus eruptionem in febris malam esse dicit. Sanguinis autem è naribus immoderata fluxio, quæ die Critico, id est die 4, aut 7, aut 14, ab initio febris accidit, salutaris est; eo enim capitis dolor cessat, & febris solvitur, juxta Hipp: 6. *Aphorism. 10. Caput dolenti & circumdolenti pus aut sanguis è naribus effluens, salutaris est.* Ideo non temere est sistendus sanguis, qui in crisi profuit, nisi forte vires dejiciantur.

At si extra *κρίσις* sanguis copiosus erumpat, & nec capitis dolor, nec mitigatio febris effluxionem sanguinis sequatur, perniciosum est, ideoque omni curâ compescendum. Præterea sanguis è naribus manans, quantò rubicundior, eò melior; quantò nigrior, eò pejor existit. Salutaris quoque est effusio sanguinis è naribus, iis qui in Febribus surdescent, & mulieribus menses suppressos habentibus.

CVRATIO fluentis è naribus sanguinis, consistit in sanguinis refrigeratione & condensatione; ea autem perfici possunt crebrâ exhibitione *Syr. & Aq. refrigerantium*, ut sunt *Syr. Viola. Syr. è Portulaca cum Aq. Plantag. aut Tormentilla*, de quibus supra in nostris curationibus abundè diximus. Ideo satis sit hoc loco pauca quædam Topica subjecisse. Sedato calore Febrili, si corpus est plethoricum, vena sece-
tur Epatica dextri lateris; aut aversionis ergo applicetur magna cucurbita dextro Hypochondr. sine tamen scarificatione. Collo imponatur *instar Epithe. aq. frigidiss.* cui pauxillum aceti vini est admixtum, latis fasciis excepta, quibus venæ jugulares moderatè constringantur. Fronti imponatur sequens Epithema:

R. Aq. Rosa. ꝯ VI. Aceti Rosa. ꝯ I. Albu. unius ovi, simul concutiantur eisdemque admisc. pulv. Thuris & Boli Armeni. ana ꝯ I I. F. Epithema. In Masculis sanguine è naribus erumpente, si testiculi involvantur panno in aceto Rosa. aut aceto vini imbuto, statim sistunt eruptionem sanguinis. Auricularis quoque digitus ejus lateris ex quo effluit sanguis, si vinculo arctissimè constringatur, cessabit fluxio. Odor quoque *aq. Rosa. in qua Camph. est resoluta*, linteolis excepta naribusque admota, sistit sanguinem.

Respirationis difficultas in Febribus ut removenda.

Ubi in Febribus aut crassi vapores Thoracis cavitatem complent, aut vitiosi humores circa orificium Ventr. Diaphra-

gma obident, atque gravant, Respirationis difficultatem & angustiam inferunt. *CVRATVR hoc malum* remediis vapores crassos extenuantibus, & per eructationem discutientibus, aut per vomitionem humores gravantes evacuantibus. Resolvunt & discutunt vapores *7 gutt. olei Cymin. aut ol. Angel.* cum duobus cochlearibus vini extra Parox. exhibitæ. Si circa orificium Ventr. tensio & dolor sentiatur, vomitus est irritandus *ꝯ V. aquosi liquoris Juniperi per descensum destillati* exhibitione. Post vomitum verò corroborat ventr. *Ol. Vitr. si ejus gutt. 2. cum I I Cochlear. vini* exhibeantur: similiter plurimum facit ad respirationis difficultatem *aq. Juniperi per ascensum destillata*, & cum *Sacch. cand.* concrematis, si ejus cochlear. II exhibeantur. Idem præstat & comestio ac deglutitio *rad. Zedoar.* Foris autem utilissimum erit præcordia *ol. Menta & ol. Anethino* inungere, & hæc omnia extra Paroxysmum sunt molienda.

Ventriculi dolor in Febribus ut mittigandus.

Ventriculus sæpè dolet in Febribus aut ex colluvie pituitosa in eo coacervata, aut ex flatulentis vaporibus ipsum distendentibus. *CVRATVR* evacuatione per vomitum haustu *liquoris aquosi Juniperi per descensum destill.* *ꝯ. 4.* aut haustu vini assumpto, in quo cortices *rad. Iugl. arboris* per noctem sunt macerati & ebulliti. Si flatulentis & crassis vaporibus distendatur Venter, tum exhibendæ sunt *7. gutt. aut ol. Cymini aut Angel. aut Anisi aut Absinth.* destillati, ut paulò ante de difficultate respirationis removenda, à nobis dictum est. Imbecillum ventriculum habentibus post Paroxysmum & caloris febrilis remissionem panis lamina tosta, & in vino Cretico sive alio generoso macerata, utilissimè devoranda exhiberi potest. Utile quoque est *Corr. Arant. condit.* sæpè gustare, & *ꝯ sol. vitr. cum haustu vini*; mirum in modum corroborat ventriculum, Febrim extinguit, ac pituitosam materiam absorbit; Foris verò inungatur Orificium Ventriculi, si æstuet, *ol. Rosa.*

Respirationis difficultas.

Medicamina Vomitus.

Linim.

Dolor ventriculi.

Vomitum.

DE APPETITU PROSTRATO RESTAURANDO IN FEBRIBUS. 77

Rosa. è Mastiche & Ol. Nymph. ana ʒ i i simul mixtis; Si verò absit calor, inungatur ol. è Menta & Absinth. Flatibus referto ventriculo imponatur pannus madefactus in decocto Menta, Ruta & Chama. & sem. Cimini cum vino, sed extra æstus Febrilem.

Appetentia prostratio in Febris quomodo restauranda.

Anorexia.

EXcepta Quartana Febre in reliquis omnibus semper prosternitur appetentia, cum propter imbecillitatem Ventriculi, tum propter Epatis præternaturalem calefactionem. Appetentia refectionis in Febris diligens est habenda ratio; longa enim inedia extinguit vires, & augetur putrefactio & calor præternaturalis. Non ergo omnia vitanda sunt in Febris quæ æger appetit, sapissimè enim ea quæ appetit æger, & famelico sunt verita, avidius assumpta salutem attulerunt. Quæ enim cum aviditate & voluptate assumuntur, ea facile à Natura alterantur. Ideò rectè monet Hippocr. ubi inquit: 2. Aph. 38. *Parum deterior cibus & potus, suavior tamen, melioribus & minus salubribus est antefendus.* Idem 2. Aphor. 50. *Consueti, etsi paulò deteriora, salubribus insuetis, tamen præferenda sunt.* Id tamen studiosè adnitendum est, ut causa prostratæ appetentiæ, siue sint humores vitii in ventr. siue in Epate, sensim subtrahantur, & vis eorum viscerum subinde corroboretur. Porro appetentiam excitant suâ naturâ omnia acida, qualia sunt alimenta cum aceto vini, aut uris immaturis cocta. Confert quoque plurimum in restauratione appetentiæ Diacitoniton simplex ex succ. Citon. & Sacch. confectum. In prostratione appetentiæ varia fercula, pro cuiusque palati arbitrio ingeniosè sunt excogitanda, & crebrò ægris offerenda. Alii enim acidis magis, alii dulcibus delectantur. Ubi verò æger omne repudiet alimentum, tum nutriendus est per intestina, infuso nimirum per Clysterem iussulo Caponum aut carniū, & luteorum ovorum, cum lacte Amygdalino mixtorum & similibus alimentis. Ex alimentis

Acida appetitum excitant.

Enmata nutrienda.

enim in intestinis existentibus Venæ Melarai-
cæ benigniorem partem exungunt, & ad Epatis
sanguinis officinam deferunt; verum semper
intestina antea per convenientem Clysterem à fecibus evacuanda sunt.

Vomitio immoderata in Febris ut sistenda.

Vomitus.

Vomitio est actio ventriculi, quæ putridam colluviem in se contentam exonerare conatur. Vomitus non prius est compescendus, donec noxia colluvies omnis probè sit evacuata. Si enim ante vitiosorum humorum evacuationem sistatur vomitus, laborem & anxietatem infert; Nee critica vomitio, quæ circa 4, aut 7, aut 14 diem accidit, est sistenda; ut plurimum enim magnum adfert levamen. *quid agendum?* Primum itaque antequam sistatur vomitio continua, exhibeatur ægro haustus vomitorius, videlicet haustus aq. calid. cui salis nonnihil sit admixtum, aut haustus aquosus liquoris Iuniperi, aut vini in quo Corj. lugl. sunt incocti, de quibus antea diximus: & fiat vomitio ante Paroxysmum. Ac si neque tum spontè cesset vomitio, sciendum erit colluviem internæ Tunicæ Ventri. imbutam esse, tum præstabit alvum subducere, cum Diapœn: & Hyer. simpl. ana ʒ iiii. in ʒ 4 aq. Absinth. solutis. Tandem si opus sit constrictione & prohibitione vomitus:

R. Carioph. 4. ss. Masti. ʒ j. Ros. rub. p. i. concisa coquantur in ollula vitreacea & cooperta cum vini rubei ʒ vi. ad tertias, ac colentur, huiusque liquoris mensura unius aut alterius cochlearis post assumptum cibum exhibeatur. Foris autem inungatur Ventriculus, si æstuet, Ol. Rosa. & Citon. si absit calor, ol. è Mastich. Nard. è Menta aut Absynth. Quin & corroborationis ventriculi causâ fortis imponatur Empl. de crusta Panis, cuius descriptio extat in libris Pharmacopæorum, quos Dispensatoria vocant.

Îteritia in Febris ut curanda.

Morbus Regius in Febris Epatis inflammationem, & Bilis ex propria vesicula

Îterus.

ficula in Epar regurgitationem, meatusque ex vesicula fellis in Intestina obstructionem sequitur; *Quibuscunque in febris ante diem 7. morbus regius accedat, est signum malum, inquit Hipp. 4. Aph. 62.* Ita videlicet si nulla sequatur materiae expulsio, vel per alvum, vel per vesicam cum urina, vel per narium eruptionem, vel per sudorem; quæ evacuationes si sequantur Ictericam, non est perniciofa: *Septimo die apparens Ictericia, quia est Critica, non potest esse mala: post 7 quoque diem, omnis Ictericia in Febribus apparens, si non sequatur expulsio excrementorum, mala est censenda.*

CURATIO Ictericia peti debet ex superioribus, quæ tamen non potest commode adhiberi, nisi prius curata febre. Cessante Febri subducatur Bilis flava nodulo hunc in modum parato:

Remedia. **R** *Rhab. 3 i i Se. Anis 3 i i* colligantur in Syndone contusa, *F. nodulus qui per noctem maceretur in Aq. Absynth. 3 iv.* Altero die ebulliat, exprimatur & exauriatur. Cessante Febri exhibeantur sequentes potiones mane ac vespere 3 v:

R *Rad. Chelido. 35. Asari. 3 i i. Fragar. cum rad. Card. Bened. Centau. Min. Rorisma. ana M. S. Bacc. Juniperi 3 i i i Croci 3 j.* concisa & contusa coquantur in *vini albi 1b ii* in Cantharo probe obturato, & in atheno collocato ad 11 horas, fiat potio. Fædum colorem cutis in Ictericia tollit crebra lavatio cum aq. dicta, in qua cocti sunt flores Chamæ. & Melil. In faciem autem & oculos quotidie bis excipiat vapor *acerr. aceti* ferventis, & evanescet flavus color. Interim & bilis flava *Rhab. infusione* subducatur, & Hypoch. præsertim dextrum, sæpè *ol. Ros.* inungatur.

Alvi obstructio in Febribus quomodo lenienda.

Obstructio alvi.

Alvus ob caliditatem & siccitatem febris, præsertim in corporibus siccioribus, conspatur atque constringitur. Cum autem obstructiones alvi plures vapores ad cor & cerebrum sursum pellant, minimè ejus curatio negligi debet, sed statim vel eodem vel altero die glande *ex melle, Sale* &

pulv. Colocynth. facto, aut leni Clyst. aperiat & leniatur. Clysteris formula talis esse poterit:

R *Malva. Mercu. viola. ana M. 5. fl. Clyster. Chama. Anethi ana p. i.* concisa coquantur in jure pulli non saliti ad tertias, colati juris accipe **1b i** *Ol. Chama. 3 i i i. Pulpa Cassia 3 i i F. Enema, quod tepidum recto intestino infundatur. Qui Clysteris usum non ferunt, eis exhiberi possunt 3 x Pulpa Cassia, lenit enim & clementer subducit Alvum.*

Alvi fluxio in Febribus quomodo supprimenda.

Alvi fluxio & perturbatio in febribus si critica est, id est die critico 7, aut 14, aut 20. ab initio Febris accidat, semper levamen morbi adferre solet, nisi modum excedat, idèd minimè supprimenda est. At verò si vires prostrernat, & extra crisin eveniat, continuè supprimatur: Supprimenda quoque erit, si excrementum alvi nigrum est, & vehementer foetidum, aut cruentum, aut fæci simile, quod perpetuò perniciem significat. Antequam autem fluxio sistatur, & excrementum sit biliosum aut nigrum, præstat ante suppressionem leni clystere elui Intestina, aut 3 x *Remedia. Pulpa Cass.* Quo facto commodius alvus astringi potest.

In fluxione alvi ægro alimenta offerantur constringentia & refrigerantia, in quibus optimum est *lac Amygdal.* quod cum *aq. Chalybeata* (vel in qua ferrum candens est extinctum) sit paratum, & pulmenta *ex far. hord. aut faba.* cum lacte in quo candens ferrum sit extinctum. Potus verò conveniens erit cerevisia clara & antiqua, in qua macerata est *lamina Panis tostæ cum Nuce Moschata* confricata. Remedium verò astringens tale exhibetur:

R *Sem. Sanguinaria Nucis Mosch. Caryoph. ana 35.* pulverisata misceantur cum unius oviluteo, & in ferventi foco ab igne & cineribus purgato infusa vel per *laminam ferri calefactam* posita, in *placenta* coquantur, quæ per duas vices ante

ante aliorum ciborum assumptionem exhibeatur. *Vel:*

R̄ Gum. Arab. Spodii prapar. Boli Arme. Acatie ana 3 ℔. pulverisata commisc. & ejus 3j. aut cum Syr. è Papav. aut cum vino rub. exhibeatur. Foris imponatur ventri Cataplasim, calef. ex limo ferri, qui reperitur in fabrorum ferrariorum vasis, in quo candentia ferra extinguuntur, cui & *far. fab.* commodè admisceri potest.

Sudoris crebra & immoderata eruptio in febribus quomodo curanda.

Sudor nimius. **S**udor est serosius excrementum massa sanguinea, quod per poros cutis excernitur. Contingit autem in febribus, ubi præternaturalis calor vitiosos humores in vapores resolvit & ad cutem propellit: Et quidem sudor in febribus hic tantum salutaris est, qui post Paroxysm. evanescente jam calore febrili provenire solet, aut qui ipso die Critico erumpit; alias si contingat semper caloris nativi imbecillitatem, & caloris præternaturalis violentiam, & humorum vitiosorum copiam, morbi que diuturnitatem significat. Est quoque salubris sudor, qui calidus per totum corpus profluit, ex certis autem tantum partibus, ut cervice, Thorace aliisque emanans, earum partium imbecillitatem, easque humoribus vitiosis gravatas ostendit. Frigidus verò sudor viribus debilitatis, & in acutis febribus mortem significat; sudores Critici, & qui fiunt in paroxysm. nunquam sunt cohibendi, sed potius promovendi. Promoveatur autem sudoris effusio, assumpto bono haustu *aq. hordei cal.* aut assumpto haustu sudorifico supra in institutione de Peste præscripto. Sed talis haustus exhibendus est, ubi Febres sunt venenatæ, qualis fuit Febris, quam *Sudorem Anglicum* vocant, quæ grassata est Anno Christi 1486. In sudoris excretionem, donec vires constant, & pulsus arteriarum validus est, non est cohibendus. Quibus in febribus crebri & superflui sudores erumpunt, materia Sudoris, id est, hu-

mores vitiosi leniter evacuandi sunt, & spontè cessabit sudor. Constat ex præmissis, non temere esse sedandum sudorem; at si necessitas urgeat, his remediis sine noxa uti poterimus Topicis:

R̄ Terra Sigill. 3 ℔. cort. granat 3 ℔. plum- bi ussi 35 Farina volatilis 9 ℔. Alum: 9 ℔. tum tenuiss. pulverisata commisc. & cum 3 ℔. Ol. Citon. in Liv. formam reducantur, quo universa corporis cutis inungatur. Aut:

R̄ Aq. Rosa. Plantag. Tormentilla ana 3 ℔. Albu. ovorum No. ij. Subigantur & concutiantur simul, & eo liquore cutis illiniatur. Aut:

R̄ Sulph. Citrini 3 ℔. Salis Nitri 3 ℔. Alum. 35. ol. Myrill. 3j. Misc. F. Linimentum. Aut:

R̄ Ol. Rosa. Myrill. ana 35. succ. Citon. 3 ℔. Succ. Granato. 3 ℔. Pul. Sang. Draconis, Acatia ana 3 ℔. Se. Citon. Ebulliant ad succi consumptionem, & colentur, F. Ltm. Intra corpus crebro assumantur frustula Citon. Sacch. condit. Aut rotula rosata novella, aut 3 ℔ Troch. è Carabe cum aq. Nymphaea.

Animi deliquium in Febribus quomodo reficiendum.

Animi deliquium hoc loco non omnium virium amissionem, qualis fit in Syncope morbo, sed summam imbecillitatem virium & cordis anxietatem intelligimus, nostrates *Ohnmacht* / oder *Krafftlosigkeit* vocant. Contingit hoc Symptoma ubi spiritus vitales in corde aut dissipantur, aut suffocantur impensius.

CVRATIO est, ut statim spiritus corroborentur, & calor nativus excitetur. In hanc rem facit *aq. Stillat. Cinamo.* si ejus cochlear. unum in ipsa anxietate exhibeatur, & naribus acetum rosa. odorandum admoveatur, si denique tempora & arteriæ in carpis manuum pulsantes cum *aq. Rosa. pauxillo aceto Rosa. commixta* confricentur. Cordis regioni sequens Epithema imponatur:

R̄ Aq. Rosa. 3 ℔. Meliss. Borag. ana 3 ℔. Aceti Rosa. Vini generosi ana 35 Pul. corall. rub. prapar. 3 ℔. Sp. Cordialium 3 ℔

K 3

Com-

Frigidus sudor.

Lipothymia.

Remedia.

Epith.

Commisc. F. Epith. duplicatis linteolis excipiendum atque imponendum. Refectis Spiritibus vitalibus, si absit calor febrilis, ad virium omnium corroboracionem exhibetur *lamina panis vel in vino Cretico, vel in suc. acido citri aut in suc. granat.* recens expresso macerata; aut crebro gustet æger *rot. manus Christi perlat.*

Tumor pedum in Febrium terminatione ut curandus.

Pedum tumor.

Circa terminationem Febrium, præsertim in pituitosis corporibus, propter pravam victus rationem & pituitosæ colluviei copiam, quæ ad pedes decumbit, intumescunt, & œdematosi efficiuntur pedes, ac tibiæ, præsertim vesperi. Etsi autem pedum tumor in febribus processu temporis spontè discurtiatur, modò æger bona & moderata utatur victus ratione, tamen si tumor diutius molester, convenit pituitosam materiam convenientibus remediis iterum atque iterum subducere atque evacuare. Ejusmodi remedium est *insusum Aga. Troch. ʒ iij. in haust. aq. Absynth.* aut in robustis, *Diaphan. ʒ x. in haust. aq. Absynth.* resolutæ. Pedes autem tumentes vapore aq. & aceti simul mixtorum, in quibus incocti sunt *flores Chama. & Anethi & fol. Sambuci* aut Ebuli, singulis diebus per horam macerentur, ac tandem inungantur *ol. Chama.* cui nonnihil *ol. vitr.* sit admixtum. Hæc si minus conferant, tumentes pedes in dolum sive tinnam ad genua usque imponantur, & siliginibus in ahenò sine liquore torrefactis ac ferventibus obruantur ac sepeliantur. Siligo enim per poros pituitosam colluviem elicit & provocat, aut plantis pedum tumentium sequens cataplasma imponatur:

R. Sapo. nigri, Mellis crudi, Salis ana p. æ.

Quæ commixta cum aceto sufficienti coquantur ad justam crassitiem *F. catapl.* Quod per duplicatum linteolum extensum ituro cubitum imponatur. Quod etiam ipsis pedibus tumentibus commodè circumponi & applicari potest. Cavendum

Cataplasma.

tamen sedulo, ne per crebras lotiones *per Cantio.* dum tumor vel materia tumoris, sursum in ventrem ac reliqua viscera ex pedibus propellatur:

Recidentia sive recidiva Febris quomodo curanda.

Febrem vocamus recidivam, ubi quis *Recidi-* per aliquod tempus liberatus, rursus *va.* post octiduum, aut citius, tardiusve denuò in eandem incidit.

Causæ recidivarum *ætiæ* sunt reliquæ vitiosorum humorum per corpus sparæ, & nondum satis evacuatæ.

ætiæ sunt vel in victus ratione, in temperantia, & alimentorum putrefactioni obnoxiorum, visceraque obstruentium assumptione; vel aëris tenuis & temperati consuetudine subita mutatio. Videmus enim *Causa.* qui paulò post in nubilosum crassumque aërem prodeant, aut flumina & aquas pertrans-eant, aut laquearia, aut templa ingrediantur, statim de novo in febrem recidere, eò quod per crassitiem aëris pori cutis obstruantur, & reliquæ humoris putrefacti in corpore adhuc fumigantis, accendantur, & novam febrem excitent.

Signa manifesta sunt.

Prognosticum autem id observatu dignum *Prognost.* est: In recidivis, si æger adhuc à priori febre valde sit debilis, & denuò recidat, vix mortem evasurus est. Præstat itaque Medicum honestâ excusatione prætensâ à recidivarum ejusmodi curatione abstinere. Si verò post priorem febrem vires constant, quiete & abstinentia, id est moderata & convenienti victus ratione faciliè curabitur; At si viscera pravis humoribus sunt infarcta, benignissimis remediis veluti sunt *ʒ X Pulpa Cassia,* aut *ʒ II Manna,* aut *ʒ III Syr. rosat. sol.* liberanda venient; à multis autem violentioribusque remediis omnino abstinendum est.

Finis libri de Febribus.

LIBER

LIBER SECUNDUS

De

CURATIONE MORBORUM
ET SYMPTOMATUM,*Ex rebus Venenatis, corporibus quoquo modo illatorum.*

SECTIO I.

Generalia circa venena continens.

PRÆLOQUIUM.



A Dedò misera est conditio vitæ mortalium, ut non tantum infinitis morborum in corpore genitorum generibus oppugnetur affligaturque quotidie, verum etiam foris mille subinde venenis petatur & periclitetur: non raro enim homines per propriam imprudentiam, sæpè & aliorum sceleratorum veneficiorum fraudulentam malitiam vitæ exitiosa devorant hauriuntque venena; quod homicidii genus ut in Germania nostra execrabile est, & rarissimè contingit, ita apud alias plebrasque nationes, Italos potissimum & Hispanos, usitatissimum est, & impunè ferè exercetur; aded etiam, ut eorum quidam doctiores artem perniciosam conficiendi venena, quæ vel confestim interimant, vel quæ homines in longum tempus torqueant & tabefaciant, ac deinde necem inferant, crudeli ausu docere, laudi ducant. In quibus est *Magus ille Neapolitanus Iohannes Baptista Porta*, & alii plerique. Quin sæpè etiam homines incauti per contactum, ictum morsumque venenatarum bestiarum, & rerum venenosarum applicationem, exitiosum virus attrahunt ac concipiunt, & vitam in præsens periculum concipiunt.

Ejus generis morbos & symptomata ad universales morbos nos referre volumus, eo nimirum nomine, quod omnia vene-

na universæ naturæ adversentur, & perniciem adferant, destruendo partium temperiem; corrumpendo humorem primigenium, extinguendo, aut suffocando calorem spiritumque vitalem: Ea enim est *Cur venenati inter universales morbos numerosi di.* proprietas omnium venenorum, ut etiam certo in loco, aut certa corporis particula internâ vel externâ hæreant, paulò post tamen suas virulentas qualitates in totam naturam, quæ ex *spiritibus, humoribus & solidis partibus* constat, diffundant, & per venas arteriasque citissimè ad cor ipsum vitæ fontem perreptent, & spiritum vitalem extinguant aut suffocent. Cum autem de venenato morbo ex aëre infecto generato, quam *Pestilentiam* vocamus, & ejusdem Symptomatibus, paulò ante tradiderimus, nunc de eorum curatione, qui vel *ex rerum venenatarum intra corpus assumptione*, vel foris per contactum inferuntur; obiter scitu utilia & necessaria docere decrevimus; brevissimè demonstraturi, communissimas venenorum proprietates & remedia; quibus quoque venenum profligari debeat; omissis venenis quæ in hisce Borealibus oris vix nomine nota sunt, sedulo Deum orantes ne unquam hominibus innotescant.

Venenum quid, & in quo differat à Medicamento, & quomodo corpora inficiat.

QUicquid intra corpus assumitur, aut *Alimentum quid?* est alimentum, aut medicamentum, aut venenum. Alimentum est quod assumptum à calore nativo alteratur, & per modum nutritionis in substantiam corporis nostri convertitur. Medicamentum est quod assumptum

Mortales infinita miseria innoxii.

Medica-
mentum
quid?

sumptum ipsum corpus alterat, & in substantiam corporis non convertitur. *Venenum* est, quod assumptum universæ naturæ adversatur, & congenitam temperiem labefactat, humores corrumpit; & solidas corporis partes putrefacit; totique naturæ necem infert. *Venenum* Græcis generali vocabulo *φάρμακον*, *medicamentum*, appellatur, forsan quia, præter exitiosam facultatem, adjunctam plerumque sibi habet vim medicamentosam; nullum enim

Venenum
quid?

Vbi virus,
ibi vir-
tus.

ferre venenum est, quod vel aliis venenis non sit Medicina, vel alios morbos persanet. Sed eruditi distinguunt à salutaribus remediis, & venena vocant *φάρμακον δηλητηριον*, *exitiosa remedia*. Inficiunt porro venena, sive res venenatæ, aut per assumptionem intra corpus, idque vel specie cibi, vel potionis; vel medicamenti, aut contactu & applicatione ad corpora nostra; ad quem modum referuntur & ictus & morsus venenatorum animantium.

Venenatarum rerum genera quot sunt?

Tria, quæ animantibus & intra corpus assumpta, & foris applicata, suumque virus per ictum morsumque jaculantia perniciem inferunt. *Primum* genus est earum, quæ à terra pronascuntur, veluti sunt stirpes, herbæ & fungi venenosi. *Alterum* est earum rerum, quæ ex cavernis montium terræque cuniculis effodiuntur, quales sunt metalla, mineræ & lapides. *Tertium* genus est eorum, quæ animantia sunt; & eorum quædam in terris, quædam in aquis degunt, ut sunt serpentes, scorpiones, hircundines, bufones, canis rabiosus, simia, & homines secundum partes. Earum venenatarum rerum omnium aliæ rursum sunt venenatæ, aut suâ naturâ & congenita proprietate, ut sunt Arsenicum, bufones, serpentes & similes; aliæ redduntur magis venenatæ arte ac præparatione, ut sunt Opium, Mercurius sublimatus ac præcipitatus, vitriolum, chalcantum & similia. Ad artificiosa venena referenda sunt omnia venenata pharmaca, & philtrea exitiosa, quorum

Venena
natura-
lia.

Artificia-
lia.

artifices Græcis *φάρμακον ὀνδρε*, id est, venefici nominantur.

Venenata res, quibus potentiis efficaces sint, perniciemque animantibus inferant.

Duplici ratione efficaces sunt res venenatæ, & Naturæ perniciem inferunt, aut excellenti qualitate Elementari, in quarto gradu constituta, caliditate, siccitate, frigiditate & humiditate; aut destruant naturam forma substantiali, sive specifica congenitaque venenata proprietate. *Extrema & ignea caliditas* rerum destruit Naturam, inflammando, exurendo & erodendo; talis est vis in Elleboro, Euphorbio, Arsenico & Mercurio sublimato. *Extrema frigiditas* rerum venenatarum naturæ, perniciem adfert, refrigerando, congelando, stupefaciendo, meatus spirituum & humorum constringendo spiritusque suffocando; ejus generis sunt hydrargyrium, Lithargyrium, Cerusa, opium & fungi venenati. Excellenter sicca res naturæ adversantur, humores cum primigenium tum alimentarem exiccando, absorbendo, partesque solidas rumpendo ac dividendo: ejusmodi sunt calx viva, chalcantum & similia; *Extremè humida* res per se nullam noxam naturæ inferunt, nisi ubi simul cum aliis perniciosis qualitatibus calidis, vel aliarum rerum venenata qualitate sunt imbutæ. Pestilentiores autem sunt naturæ, animantium res venenatæ, quæ formâ substantiali, sive congenita proprietate venenatæ sunt; ut sunt serpentes, bufones & similes.

Qua sint communiores venenatarum rerum species.

Ex genere Plantarum venenata sunt:

Aconitum.	Taxus.
Tithymalus.	Oleander.
Mesereum.	Veratrum.
Laureola.	Colocinthis.
Anacardus.	Ciclamen.
Staphisagria.	Cataputia.
Nux Vomica.	Juglans.

Sam-

Sambucus. Euphorbium.
 Agaricus. Hyoschyamus.
 Viscus arborum. Pylidium.
 Cicuta. Coriandrum.
 Turbith. Mandragora.
 Scammonium. Opium & papaver.
 Ranunculus.

Ex genere Fossilium sive metallorum ac mineralium venenata sunt:

Venena ex familia mineralium & metallorum.
 Arsenicum, Auripigmentum, Argentum vivum, Mercurius sublimatus, Mercurius præcipitatus, Cinabrium, minium, plumbum ustum, gypsum, lithargyrium, Vitriolum, Calx, Sulphur, Sal Ammoniacum, Borax, æs ustum, ærugo, stibium sive Antimonium, Lapis Armenius, lapis lazuli, lapis Magnes, arma veneno imbuta, halitus venenatus ex specubus.

Ex genere animatorum Venenata sunt:

Venena ex classe Animalium.
 Serpentum genera. Vespertilio.
 Hirudo. Aranea.
 Canis rabiosus. Apes.
 Equus. Rana palustris.
 Mustela. Lacertus.
 Cantharides. Lupus.
 Vespæ. Basiliscus.
 Bufo. Mus.
 Scorpio. Buprestis.
 Felis. Simia.
 Cervus. Lac in ventriculo
 Homo. coagulatum.

De quarum venenatarum rerum naturis & pernitiola proprietate, & per ea illatis Symptomatibus, eorundemque curationibus, quam possumus brevissimè differeamus.

Qua remedia in genere omnibus adversentur Venenis:

Eti singula venenorum genera, sua habeant peculiaria remedia, ut paulò post indicabimus; tamen in genere hæc sequentia, tum suis primis qualitatibus, tum sua substantiali forma suisque adveniens, omnibus in genere adversantur ve-

nenis, eaque validissimè propellunt, discutunt & extingunt, quorum, ut & venenorum, tria sunt genera; alia enim ex herbis herbarumque partibus, alia ex fossilibus, alia ex animalibus sumuntur.

Alexiteria ex herbis venenore-sistunt:

I. RADICES

Petasitidis. Aristolochiæ longæ.
 Asclepiadis. Raphani.
 Angelicæ. Agarici.
 Valerianæ. Pentaphylli.
 Allii. Dauci Cretici.
 Rhabarbari. Elenii.
 Pimpinellæ. Dictamni.
 Morfus Diaboli. Zedoariæ.
 Ostrutii.

Alexi-pharmaca ex herbis, fructibus & succis.

FOLIA

Scordii, Rutæ, Cardui bened. Hyperici, Calamenthæ, Veronicæ, Rorismarini, Centauri minor. Salviæ.

SEMINA

Citrii mali, Thlaspi. FRUCTVS.
 MALA Citria, Arantia, Limonia.
 Cassiæ pulpa, grana Juniperi, Baccæ Lauri.

SVCCI

Hederæ arboreæ, Millefolii, Myrrhæ.
 Sagapenum Vinum, Oleum.

Ex Fossilibus lapidibus que veneno adversantur:

Terra Lemnia, Bolus Armenus, Succinum Candidum, Corallium, Vnicornium, Hercinium.
Gemma. Sapphyrus, Hyacinthus, Præsius.

Alexiteria ex mineralibus & fossilibus.

Ex animalibus hæ partes veneno resistunt:

Vnicornu, Cornu Cervi, Caro viperæ, Castoreum, Coagulum leporis, Lac caprillum, Lac canis, Butyrum recens, stercus galinarum, Lachrymæ Cervi.

Alexiteria ex animalibus.

De gene-
ratione
lapidis
bezoar
recentio-
res cer-
tiora pro-
ferunt.

De lachrymis Cervi id observatione dig-
num est; Cervos in solitariis & aridis lo-
cis vagantes, & siticulosos, anxie fontes
aquarum inquirere, quos ubi reperire non
possunt, ad serpentum cavernas confugere,
serpentesque attractione violenta spiritus
ex cavernis prolicere, & refrigerandi cau-
sa deglutire, & ita infici veneno serpen-
tis. Verum naturæ beneficio discutitur
ac propellitur totum venenum ad ocu-
los cervorum, & in lachrymas resolvit-
tur, quarum magna pars in angulis ocu-
lorum in lapideam duritiem concrefcit,
& à venatoribus è cervis captis colligi-
tur: Tales lapides ab Arabibus *Bezoar*,
id est, veneni victrices nominantur, &
ad omnia venenorum genera tum in-
tra corpus assumpta, tum per conta-
ctum illata præsentissimo remedio usur-
pantur.

Composita
bezoar-
tica.

Qua ex commixtis compositisque antidotis,
veneni violentiam refringant, eique
potentissimè adveniantur?

Mithri-
datum
non adeo
magna-
rum vi-
rium.

Theriaca Andromachi, Mithridatica
confectio, & nostrum medicamentum è
scordio, cujus descriptionem paulò ante
in curatione Liberativa Pestis proposuimus.
Mirifice quoque prædicatur à Veteribus
illud paratu facile antidotum, quod in
thesauris Mithridatis repertum esse *Græci*
authores perhibent, quod constat ex *fol.*
ruta, *sicu*, *nucleis nucis juglandis* & *mo-*
mentosalis. Verum cum in eo præter *ru-*
tam reliqua magis sint alimenta, quam
medicamenta, non video quid eximii præ-
sidii & contra venena conferre possit; id-
eò præscriptis potiùs simplicibus & com-
positis antidotis, quàm eo uti suaderem:
sequens tamen pulvis, ex quo & *Electua-*
rium, addito *Syrupo de citro*, confici po-
test, ad reprimentum venena utilissimus
est:

℞ *Calamenthi*, *ruta*, *Scordii ana*
℥ 5. *Arist. long. bacca Lauri*, *gran. Lu-*
niper. ana ℥ j. *Gentiana ℥ ij*. *boli Armen.*
veri, *terra Lemnia ana ℥ j*. *F. pulvis tenuis-*
simus. Præscriptis alexiteriis pharmacis

& veneni violentiam vincentibus, quomo-
do & in qua mensura, cum quibusque li-
quoribus pro ratione ætatis, & veneni
qualitatibus cum ad præcautionem, tum
ad liberationem utendum sit, in sequenti-
bus passim indicabimus.

Venenorum Curatio quotuplex sit.

Duplicem curationem requirunt vene-
na, *σωφρονακήνη*, id est, præservativam
unam; ne videlicet noxam perniciemque
præsentis veneni quis sentiat, aut concipiat.
& *θεραπευτική*, id est, liberativam,
cujus præsidio à venenata infectione quis
liberari queat.

Veneno-
rum cura-
tio du-
plex:

Præcautio venenata infectionis quibus in rebus consistat.

Præservatio à venenata infectione sita
est in cujuslibet sedula providentia, absti-
nencia, atque in præscriptorum cum sim-
plicium tum compositorum alexiphar-
macorum debita usurpatione. Si cui ita-
que vel inter occultos inimicos, vel in
locis venenatis animalibus refertis, vel
apud veneficos conversandum est, vel in
regionibus veneficio infamibus, quales
sunt *Italia* & *Hispania*, ubi viris magnati-
bus & eruditione excellentibus, exteris
potissimum, à venenatis ferculis potioni-
busque metuendum est. Apud *Italos* enim
adeò familiare est hoc homicidii genus,
præsertim apud eos, qui pietatis & virtu-
tis exemplaria haberi volunt, ut sunt *Car-*
dinales, *Episcopi*, &c. ut suum magistratum
Pontificem Max. & inter se mutuo vene-
no extinguere minime piaculum sit. Præ-
tereo hic quod tanta sit *Italorum* invidia
erga exteras nationes, præsertim *Germa-*
nos, qui apud ipsos versantur, & aliqua
eruditione & autoritate excellunt, ut
nunquam sint tuti ab eorum insidiis &
veneficiis: id quod duorum præclaris-
simorum virorum nostrisæculi miserabi-
lis ex veneno interitus, *Sabini* videlicet,
illustris Poëtæ, & *Valerii Cordi*, Medici,
luculenter testatur; *Cordus* enim *Roma*
hausto veneno statim extinctus est; *Sa-*
co inter
binus erunt.

V. Cordus
& Sabi-
nus toxi-

binus autem ebibito vino ei per *Episcopum* magni nominis propinato, rediens in *Germaniam*, ex veneni virulentia contabescere cœpit, & tandem miserè interit. Prudentia itaque & circumsp̄ctione atque abstinentiâ in ejusmodi locis opus est illi, qui tutus à veneno manere velit. Cavendum tamen præterea studiosè est, ne quis in locis sylvestribus & venenatis animalibus refertis, videlicet serpentibus & scorpiis, qualis est *Italia*, somnum capiat, aut humi decumbat, humilique loco cubet, ne exitu morſuque venenato faucietur. Præstat quoque in ejusmodi locis, alexipharmacis antea recitatis præmunitum esse, & quotidie ventre jejuno existente, aliquid eorum assumere, inter quæ celebriora sunt 20. gr. juniperi comesta, aut 3 j. *Itheriaca Androm.* vel *confectionis Mithridatica* assumpta. Aut *malum citrum* comestum; aut tres nuclei *allii* devorati, aut tosti panis buccella, butyro recenti oblinita & esitata.

Venenatæ Infectionis signa quæ sint.

Tria signorum genera circa veneni & præcautionem & liberationem sunt observanda: *Signa videlicet præsentia veneni, signa assumpti vel concepti veneni, & signa naturæ qualitatisque veneni assumpti.* Præsentia veneni & imminentis periculi ex veneno duplici ratione deprehenditur.

Signa præsentia veneni.

1. Occulto naturæ horrore & exhorrentia aversioneque à cibis, potionibus propositis venenoque imbutis, quam anxietas sudorisque eruptio sine ulla evidenti causâ subsequitur. Vidimus nos virum Nobilem, qui naturali *asthma* præsentiam felis five carti in conclavi occultati, & nusquam visi, ferre non potuit, & ubi adesse cattum præsensit animo, statim in animi deliquium & sudoris frigidi eruptionem sine ulla evidenti causâ incidit, donec animal latitans eductum esset. Ita multi ad latitantis serpentis præsentiam sine manifesta causâ exhorrent.

2. Deprehenditur præsentia veneni per rerum quarundam venenis adversantium sensibilem immutationem, ut lingua serpentis & lapis Bufonius, in capite bufonis repertus, in mensa depositi, ubi venenum latitat, statim sudant atque madore perfunduntur. Gemma similiter, præsius vocata, & corallia rubra veno præsentente aut assumpto, statim colorem mutant.

Signa venenatæ infectionis, quæ pro natura & qualitate speciei veneni varia & multiplicia excitat symptomata, quæ simul & signa sunt: ex quibus & infectio & species veneni deprehendi potest: alia enim venena à forma substantiali, alia ab excellentia primarum qualitatum, extrema videlicet caliditate, frigiditate & siccitate, symptomata & perniciem inferunt. Humiditas verò extrema venenatam affectionem inducere nequit, nisi per accidens. In universum autem omnem venenatam infectionem, præsertim quæ à forma substantiali rei venenatæ excitatur, hæc symptomata, tanquam certissima indicia infectionis, subsequuntur: Subitanea totius naturæ humanæ immutatio, anxietas extrema, virium prostratio, animi deliquium, sudoris frigidi eruptio, faciei decoloratio, pulsus inæqualitas ac delirium. Venenatæ s. Calidæ autem infectionis à rebus venenatis extreme calidis hæc apparent signa: Inflammatio viscerum & totius corporis, sitis intolerabilis, exhalatio & respiratio fervens, viscerum erosio, foetida exspiratio, sudoris calidi ac tenuis eruptio. *Frigidæ veneno infectorum* communia signa hæc sunt: Capitis dolor, vertigo, extremarum partium, & nonnunquam totius corporis perfrigeratio, inconsueta somnolentia, stupor, tremor, sudoris frigidi ac foetidi eruptio, palliditas faciei & tremor laborum. *Siccæ venenatæ* s. Siccor. infectio, ut plurimum complicata est, aut cum caliditate & frigiditate, & earundem qualitatum signa secum habet. Siye autem

Signa assumpti veneni.

Signa communia.

Calidæ veneni.

Frigidæ veneni.

Siccor. veneni.

tem cum caliditate, siue frigiditate sit adjuncta siccitas venenata, semper linguæ ariditas & continua sitis siccum venenum arguit. Fit & infectio venenata ex halitibus venenosis atque putridis per respirationem, aut per spirationem attractis, aut ex iis rebus venenatis assumptis, quæ humores citò putrefaciunt, & status in corpore excitant: quarum venenatarum affectionum comites sunt difficultas respirationis, tensio hypochondriorum, tumor faciei, & sæpe tumor totius corporis. Signa enim symptomatum, ex quibus singulæ species rerum venenatarum, intra corpus assumptarum, aut applicatarum, internosci possunt, in curatione singulorum venenorum paulò post commemorabimus.

Curatio liberativa generalis venenatarum infectionum, qua methodo sit instituenda.

Methodus curandi infectos.

Cum omne venenum, siue sub cibi, potus vel remedii forma, siue per respirationem intra corpus sit assumptum, siue per contactum, ictum morsumque sit conceptum, celerrimè ad cor perreptet, nullæ sunt induciæ dandæ, sed statim sine mora, cognita infectione ex symptomatibus; vel etiam, si tantum suspicio venenatæ infectionis adsit, solers est adhibenda curatio, & ad alexipharmaca confugiendum. Curatio autem omnium venenorum in genere consistit in veneni evacuatione siue expulsiōe, in venenatæ qualitatis violentiæque veneni extinctione, in cordis spirituumque vitalium & virium corroboracione, & in læsa partium restauratione & persanacione.

Veneni assumpti aut concepti evacuatio & expulsio quorū modis tentanda.

Omne venenum expulsiōi aptum evacuari debet, statim in initio, antequam spiritus vitales prosternantur, aut per vomitum, aut per sudorem, aut per alvi subductionem. Cognita itaque natura ac proprietate concepti veneni, & quo in lo-

co corporis illud hæreat, statim si in ventriculo consistat, id quod ex dolore, tumore & erosione ventriculi deprehendere licebit, protinus vomitio iterum atque iterum est molienda, donec omnis materia veneni probè sit evacuata. Facilem autem vomitionem concitat, & omnibus venenis adversatur haustus 4. aut 5. 3. ag. lupineri per descensum cum pelvi destillata; aut haustus vini, in quo per noctem corrad. jugland. minutim concisæ sunt macerata, ebullitæ & expressæ; Item præstat & 3j. pul. ulorum siue catulorum Iuglandis arboris, qui non sunt aliud quàm flores glandium. juglandis.

Aut R. Raphani rad. recent. in quibus vomitorium ex Ellebori albi, qua per noctem in haustu vini aut cerevisiæ macerentur, ebullitæque exprimantur, qui li-

phano. quor tepidus assumatur. Omnem enim venenatam materiam validissimè evacuat.

Post evomitionem veneni commodissimè uti possumus ad ventriculi corroboracionem, in calida quidè qualitate veneni, 3ij. Syr. acetos. Citri aut Syr. granatorum cum 3ij. aqua acetosa. In frigida autem qualitate veneni 3ij. Syr. de Mentha, cum 3ij. ag. mentha aut scordii, prodest quoque post evomitum venenum, aut recens butyrum liquefactum, aut oleum dulce olivarum assumere. Vbi verò materia veneni concepti in intestinis hæreat, id quod ex torminibus, flatibus, erosionibus & ventris inferioris tumescencia deprehendere licebit, tunc non est vomitio tentanda, sed venenum acris clysteribus, præsertim si absit fluxio alvi, subtrahere oportet, habita semper ratione qualitatum veneni, utrum calida aut frigida sint. In calidis & erodentibus venenis: R. Violaria, malva, mercur. ana Ma. j. violarum sicc. rosarum ana M. f. Se. acetosa 3j. concisa & contrusa nonnihil concoquantur in q. f. ad medias. Deinde colentur, & colati juris accipe Ib. i. cui admisce pulpa Cass. 3ij. ol. violarum 3ij, album: ovorum No. ij. Salis 3j. F. Ene-

Roborans ventriculi à vomitu.

Enema & tepidum applicetur. Frigido vero existente veneno, quod ex obstructione alvi, flatibus, & colicis doloribus dignosci potest: *R Flor. Chamomil. anethi, ruta, Scordii, Centauri min. absinthii. Card. bened. ana M. f. Sem. Curi, Cimini ana ℥ s. Bacc. Lauri, luniperi ana ℥ iij contusa & concisa coquantur in q. s. aq. & in fine coctionis injiciatur nodulus ex ℥ j colocynth. in linteolo ligati, ac semel atque iterum cum reliquis ebullire permittatur.* Deinde colentur, colati juris accipe *℥ j cui admisce Hiera Simp: Diaphanic. ana ℥ ss. Ther. Andromachi ℥ s. ol. ruta ℥ j s. ol. Lauri ℥ s. salis ℥ j. F. Enema & applicetur tepidum.* At si veneni concepti virulenta qualitas jam commixta sit humoribus in venis contentis, tum si veneni qualitas calida est, vena est secanda mediana, & postea levibus cathartecis pharmacis prolicienda, & syrupis veneno adversantibus, venenatamque qualitatem alterantibus, crebro repetitis utendum erit. In aestuantibus itaque venenis, quod ex rubore faciei & totius corporis caliditate dignoscitur, putrescentes humores subtrahantur, aut *℥ j. pulpa cass. extr. cui Rhabarb. pul. ℥ ij sunt admixti;* quod instar boli devorari potest, unâ horâ ante prandium; aut resolvi in haustulo aq. Cichorei; sequentibus autem diebus manè ac vesperi exhibeantur *℥ ij. Syr. acetos. Citri cum ℥ iij aq. acetosa, & si vires ferant, tertio die rursus cum præscripta Cassia; aut ℥ ij. manna in jusclo pulli gallinacci dissolutis evacuetur.* Et quoniam calidis & aestuantibus venenis ut plurimum ardens febris cohæreat, ibidem iterum venæ sectione & syrupis præscriptis alterantibus diutius utendum erit. Si autem venenum humoribus mixtum frigida sit natura, id quod ex artuum gravitate, & totius corporis lassitudine dignosci potest, purgetur venenatus humor *℥ vj. diaphanic. & ℥ ij hiera picra cum aq. scordii, aut Card. bened. haustulo commixtis, & sex horis ante prandium ebi-*

bitis. Sequentibus autem diebus manè ac vesperi exhibeantur *℥ ij. Syr. & Card. Bened. aut de succo scordii facto cum ℥ iij aq. stillatiis earum herbarum.*

Porro si venenum conceptum spiritus vitales contaminavit, & jam in arterias irrepsit, id quod fit ubi veneni curatio negligentius tractetur, aut diutius protrahatur, aut ubi veneni qualitas subtilis, tenuis & aërea sit, tum quam celerimè venenatæ qualitates per sudorem discuti & propelli debent, assumpto haustu sudorifico hac ratione parato: *R Theriaca Androm. ℥ j s. Pul. Scordii, ruta, Card. Bened. Cornu cervi usti ana ℥ j. Unicornu veri si haberi potest ℥ s. Quæ omnia simul dissolvantur in haustulo aq. Scord. F. Haustus sudorificus.* cum quo pro virium ratione, aut per ij. aut sesquihoram probè sudet infectus. Hæc si præmanibus non sint, uti licebit pro sudorifica potione, *℥ ij aut boli Armeni veri, aut Terr. Lemnia, aut Pulv. Scordii aut ℥ ij diascordii nostri in Pestis curatione præscripti, aut ℥ ij aliorum alexipharmacorum remedium;* quæ paulò ante inter remedia veneno adversantia propòsita sunt, cum liquore Scordii, aut Card. Bened. Post sudorem Syrupis uti licebit in calidis venenis acetos. citri: In frigidis verò Syr. de Card. Bened. cum aq. acetosa, ruta aut scordii dissolutis, ut paulò ante dictum est. Nunc ad specialem venenorum conceptorum curationem accedemus.

Curatio Liberativa singularum specierum Veneni corporis, qualis esse debeat.

Paulò ante tradidimus venenatarum rerum alias esse stirpes, aut stirpium partes; alias esse fossilia, & è terra eruta, ut sunt mineralia & metalla; alia esse animalia, aut partes animantium; quibus singulis intra corpus conceptis, singularis adhibenda est curatio, pro natura & qualitate veneni ac symptomatum, quæ ab iis excitantur, qualitate & sævitia.

SECTIO II.

De Venenis ex vegetabilium familia oriundis.

De herbis venenatis & earum partibus.

Herbarum Venenatarum earundemque partium quæ sint natura, & quæ excitant symptomata, quibusque remediis & antidotis persananda.

Herbarum & stirpium aliarum partes alii magis sunt venenatæ, & intra corpus assumptæ majorem inferunt perniciem, vel extremis suis qualitatibus, vel forma substantiali.

Aconitum seu Napellus quid, quæ excitet symptomata, & quibus remediis succurrendum.

Aconitum.

*Ἀκονίτιον παρδαλικὸν ἢ λυγρὸν, id est, Aconitum, Pardos luposque enecans, Wolfeswurz. Aconiti plures sunt species, quarum una duntaxat nobis est cognita, in hisque locis à mulierculis in hortis scriatur, & ornamenti causa in fenestris collocatur, quæ folia habet artemisia, & flores ex nigro cæruleos, Monachorum cucullis similes. Vnde Monck oder Monnichskapen dicitur. Errant verò qui Aconiti speciem alteram esse putant eam herbam sylvestrem quam *uvam lupinam*, vel *uvam inversam* & herbam *Paridis* nominant, quæ ex unico caule rotunda est, 4. fol. *Betha* similia per ambitum caulis ita inter se disposita habens, ut crucis formam constituent, & in ejus summitate inter alia 4. angusta foliola niger acinus sive bacca succrescit, quæ herba aded non est venenata, ut semina ex illis baccis collecta & in pulverem redacta, crebroque exhibita, veneficiis omnis generis medeantur, & ejus fol. carbunculis pestilentibus utilissimè imponi, in curatione Pestis demonstravimus. Aconitum, quod & Napellus*

Error multorum.

Herba Paris, Cinbeer.

nominatur, habet naturam calefacientem, & formam substantialem venenatam & corruptentem, assumptum intra corpus perniciosè excitat symptomata: *Labia enim & lingua statim ab illa inflammantur, & vehementer intumescunt, oculi protuberant, & corpus universum intumescit, instar hydropicorum, & livido colore defædatur, deinde animi deliquium, & mors ipsa, nisi tempestivè succurratur, subsequitur.*

CVRATIO *napelli* sive *Aconiti* statim in initio tentanda est, & studendum diligenter ut exhausta porione vomitoria, cuius in superioribus fecimus mentionem, aut exhausto decocto anethi, in quo recens butyrum largius est liquefactum, veneni materia evomat ac projiciatur.

Antidota autem hujus perniciosi veneni sunt, si post vomitum exhibeantur *3 ij boli Armeni genuini*, aut terra *Lemnia*, aut *3 ij pul. seminis napi sive rape* cum haustulo vini; aut *Theriaca Andromachi 3 ij cum vino*. Estandum quoque crebè offeratur agro recens butyrum; foris autem inungatur tumidum corpus subinde *Ol. Scorpionum & Ol. hyperionis*, quibus *Theriaca Androm.* quippiam est admixtum.

Antid.

Topica.

Tithymalus seu *Esula* quid, quæ ejus natura, quæ excitet symptomata, & quibus succurrendum remediis.

Τίθυμαλ & Teuffels oder Wulffesmilch. Dioscorides septem ejus species enumerat, quæ vel lacteo succo refertæ sunt, ex quibus duo genera nobis tantum sunt cognita, quas communiter *Esulam* majorem & *Esulam* minorem vel rotundam, quia portulacæ folia habet, vocamus; totâ formâ substantiali venenatæ sunt herbæ, cum præternaturali caliditate: *succus, semen, & radices Tithymali*, nisi probè correctæ, si intra corpus assumantur, violentissima excitant symptomata. Ventriculi enim primum, deinde jecinoris temperiem destruant, & cordis anxietatem excitant, totum corpus inflamment, sitim & singultum inferunt.

Esula.

Symptomata ejus.

CVRATIO *Tithymalorum* seu *Esulæ* Curatio. Vomitus.

consistit in evomitione, oleum itaque anethi cum aq. tepida potandum præbeatur, ac post vomitum & clysteres ex ol. rosar. vel oleo Citon. & album: ovorum confectum, cui nonnihil mucag. Sem Psyllii sit admixtum, infundatur. Postea loco antidoti exhibeantur ʒij Theriaca Androm. cum aq. Card. Bened. aut ʒij seq. pulveris:

Antid. R. Boli Armeni ʒʒ. Terra Lemnia ʒij Tragacanthi ʒij Corall. rub. præp. Cornu Cervi ussi, Gum. Arabici ana ʒʒ. F. pulvis & exhibeatur cum vino.

Mezereon quid, quæ symptomata inferat; & quæ adhibenda curatio.

Mezereon. Μεζέρεον Arabum non est alia herba quam ea quæ Græcis χαμελαία, seu potius Ήμελαία nominatur. Sunt enim hæ duæ herbæ congeneres, cujus semen Dioscoridi granum gnidion, & officinis coccynidium vocatur, nostrates autem Kellershals nominant, quod fauces commaticatum acerrimè urat. Etsi autem Mezereonis folia correctæ remediis aquam hydropicam evacuantibus utiliter admisceantur: neque tamen folia, nec semen ejus ob extremam caliditatem & violentam purgatricem vim, veneno caret, & assumptum intra corpus sæva hæc infert Symptomata, vomitiones & alvi fluorem continuum, ventriculi tormina, angustias & sitim vehementem.

Curatio. Curatio consistit in evomitione assumpto oleo anethi cum aqua tepida, & in alvum Clysteris infusione ex ol. rosarum cum decocto Chamamel. Antidota Mezereonis sunt ʒij Theriaca Androm: aut ʒij pul. Scordii aut ʒij corall. rub. præp. & terra Lemnia, quæ cum vino exhiberi possunt. Deinde utile est lac crebrò bibere, in quo butyrum recens sit liquefactum.

Laureola. Laureola quid, quæ excitet symptomata, & quibus curanda remediis.

Laureola. Laureola, Græcis δαυροειδής vel χαμυδαίφν, id est, humilis Laurus, nominatur. Hic frutex in Germanicis myropoliis ignotus est. In montibus Tridientinis luxuriat, folia lauri foliis similia habet. Per ambi-

tum unius caulis disposita; Semen nigrum instar piperis profert; vomitoria & purgatoria facultate prædita, cum exurenti caliditate. Folia & semina venenata sunt, quæ sæva accidentia, ut mezereon, infert, & per superiora & inferiora violentius purgat, & acerbæ ventris excitat tormina.

CURATIO & antidota eadem sunt Superior adhibenda quæ in Mezereonis seu coccynidii Cura ad-
sciscenda. curatione commemoravimus. Prodest tamen præterea ægrum in balneum aq. frigida collocare, vel frigidam aquam linteolis exceptam ventri imponere, & lac subinde cum recenti butyro exhibere, & veri Armenii Boli ʒij propinare.

Veratrum quid, quæ concitet symptomata, & quibus remediis eisdem sit opitulandum.

Veratrum, Græcis ἐκείβορ. Duo sunt Hellebori genera à radicum colore sumpta, *rus.* album videlicet & nigrum. Album Græci Elleborum λευκόν, nostrates Nießwurgel oder Schaffnünne/ Nigrum verò elleborum nostrates Christwurz vocant. Etsi autem Ellebori utriusque non contemnenda sit utilitas in arte Medica, si probe correctæ & venenata qualitate exuta exhibeantur, per se tamen utrumque est perniciosum & venenatum qualitate imbutum, & horrenda excitat symptomata. Et albus *Hell. alb.* quidem Elleborus, ventriculi & alvi violentam commotionem & supra infraque furiosam dejectionem & ingentes ventris cruciatus, strangulationem, sive respirationis interceptionem, sudorem frigidum, convulsionem, & postremò mortem repentinam, nisi mature succurratur, infert. Eorum autem Symptomatum curatio ex albo Elleboro ortorum consistit in matura evacuatione Ellebori, & ab eo commotorum humorum & flatuum, per vomitionem, epoto prius ol. ruta, cum aq. tepida; quæ crebrius repeti debet, & per alvi subductionem cum acris clystere ex decocto centaur. *Curatio.* min. in quo ebullitus sit ʒj colocynthidis & ol. anethino, quibus peractis antidotum exhi-

Antid. exhibeatur, nempe *Theriaca Androm.* ℥ ij. aut *pul. rad. nymphae. vel flor. ejus alborum*, aut *seminis pastinaca* ℥ ij. cum vino assumptæ, postea subinde propinetur *butyrum recens liquefactum cum lacte* aut *hydromelite*. Ventri autem foris imponatur *sacculus confectus ex mentha, rosis rub. & Sem. Cimini*, qui in vino sit coctus & expressus. Ubi autem convulsio subsequatur, æger in solum sive *balneum calida* collocetur, & convulsi artus *ol. anethino* probè confricentur & inungantur.

*Vfus hel-
leb. nig.* Porro *veratrum nigrum*, sive *elleborus niger*, cujus dilutum vel succus per coctionem extractus, seu pulvis ejus, admixtis tamen ejus violentiam corrigentibus, utilissimus est in expurgando melancholico humore, in Quartana febre & in adultorum Epilepsia, si tamen certo pondere ac mensura cautissimè exhibeatur. Incorrectus verò & largiore pondere assumptus, gravissima inducit symptomata, alvi continuam fluxionem & ventriculi vomitionem, cordis palpitationem, ventris intumesceniam, angustiam & suffocationem, linguæ ariditatem, & totius corporis inflationem ac contrémisceniam.

Curatio. Curatio noxarum *Ellebori nigri* est, ut statim in initio materia *Ellebori* expellatur cum per vomitionem, tum per Clysteris injectionem; quemadmodum de curatione albi diximus. *Antidota* verò *Hellebori nigri* erunt ℥ ij. *Theriaca Androm.* aut ℥ ij. sequentis pulveris:

℞ *Sem. Absinthii fol. Scordii ana* ℥ ij. *sem. anisi, Cimini, Castorei ana* ℥ j. *nardi indicis, ruta, ana* ℥ s. pulverisata commisceantur, & cum vino exhibeantur; aut propinentur eidem *pul. rad. aut flor. nymphae alba cum vino*; Ventri verò imponatur *sacculus ex mentha, pulgionis, ruta, bacis lauri & cimino confectus*: & in vino aut *cerevisia ebullitus & expressus*. Prodest eidem & *lac cum butyro recenti liquefacto crebro bibitum*, vel *butyrum cum melle virgineo sæpè gustatum*.

Colocynthis quid, qua inferat symptomata, & quibus remediis eisdem succurrendum.

Colocynthidem, Græci καλοκύνθω, & *Colocynthis* in officinis satis barbarè *Coloquintida* nominant. Est autem *Colocynthis* fructus instar pilæ, sive ovi, nascens per samentosam herbam per terram expansam instar cucumeris. *Colocynthis* in multis remediis immiscetur per *Galenum* & alios Medicos; quæ sua extrema amaritudine omnia reddit ingrata; & si paulò largius exhibeatur, læva infert symptomata: Validissimè enim alvum cum torminibus turbat & subducit, & *ventriculum mirificè offendit*: cordi quoque & jecinori *Noxam* infert, & erodit intestina, ac dysenteriam generat, appetitum quoque prostermit, & nauseam infert; ejus verò exigua quantitas ut pondere ℥ j. tutissimè in clysteribus incoquitur.

CURATIO assumptæ *colocynthis* est Clyster ex lacte & *ol. rosarum* vel *anethi* confectus, aut recipiatur *succi plantag.* ℥ j. *Viella ovorum no. ij. boli Armen.* ℥ s. tenuissimè contriti *ol. Rosarum* ℥ iij. *mucag. Tragacanth.* ℥ s. commisceantur, *F. Clyster*, quod tepidum infundatur. Ventri autem, ut cruciatus & tormina sistantur, imponatur *sacculus ex mentha, absinthio, rosis, anetho & sem. Cimini, ana.* ad placitum confectus, & in vino ebullitus & expressus. Antidoti loco ℥ ij. *Theriaca Androm. cum vino* exhiberi possunt. aut *boli Armeni veri & Corall. rub.* prepar. ana ℥ ij. cum vino exhibeatur.

Cyclamen vel *panis porcinus* quid? qua inferat symptomata, quæ eorum remedia.

Cyclamen, vel *cyclamenos*, κυκλάμενος, *Cyclamen.* *Arthanita, Sambrot* / est radix rotunda & tuberosa, folia proferens *Asaris* similia. Hæc radix in Enematibus intestino injecta crassam pituitam potenter educit, & inde generatos dolores colicos sedat statim. In Errhinis verò, vel ut vocant *nasalibus*, si naribus inferatur, cerebri obstructions aperit,

aperit, & excrementa per nares prolicet. Cyclamen verò si intra corpus non correctus, vel non iusta mensura assumatur, sæva inducit symptomata, vomitum videlicet & alvi egestionem continuam, suffocationem, eaque omnia excitat, quæ de *Elleboro albo* dicta sunt, symptomata.

Noxa.

Cura.

CVRATIO symptomatum cyclaminis consistit in subita evacuatione per Clysterem ex lacte & ol. laurino confectum. Pro antidoto exhibeatur sequens pulvis:

℞ *Bacc. lauri piperis albi, fol. ruta ana* ℥ij. Fiat pulvis, & cum haustu vini exhibeatur; aut propinentur Theriacæ Andromachi ℥ij.

Cataputia quid, qua inferat symptomata, & qua remedia.

Cataputia.

Cataputia duæ sunt species, major & minor. Major Græcis *κρυτάν*, Latinis *Rhycinus*, inde quod semen ejus Rhicinis animalculis pecudum cuti adherentibus effigie persimile est; Arabibus autem *Cerba*; nostratibus *Wunderbaum*. Minor cataputia est Tithymali species, quia lacteo succo madet, Græcis *λάθεις*, cujus semina nostratibus *Spinnkörner* nominantur. Vtriusque autem Cataputia Sem. & Rhicini & Lathyridos eisdem facultatibus pollent, videlicet violenter & perinferiora & superiora purgantibus. Et eadem si inconsiderantius devorentur inferunt symptomata, ut sunt Dysenteria, appetitionis prostratio, ventris cruciatus, animi deliquium; & alia quæ Tithymalorum species inferre possunt.

Cura.

Vomit.

Curatio quoque eadem adhiberi debet, quæ in Tithymali venenis adhibenda docuimus; præstat autem statim exhausta vomitoria potio aqua luniperi per descensum destillata, & intestinorum elotione cum Clystere ex decocto anethi & ol. anethi parato. Antidoti loco conducunt ℥ij. Theriacæ Androm. Deinde ℥ij. Sp. liberantis. Confert quoque lac potitatum, in quo butyrum recens est liquefactum.

Turbith quid, qua ejus symptomata, quæve symptomatum curatio.

Turbith, vel Turbethum, ut quidam putant, est radix *Alypi* Græcorum: qualis autem ejus radices herba sit, nec Græci, nec Latini descripserunt. Hæc radix ritè præparata, vel aliis remediis admixta, pituitam potenter evacuat; ideoque est usitatissimum in myropolii ex præstantissimis remediis compositis, ut sunt *Diaturbith*, *Diaphoeniconis* pituitæ evacuationis causa admiscere. Verum Turbith non correctum & in majori mensura, quam decet propinatum, venenum est, & violentissimè alvum ducit, & turbat, & nauseam vomitionemque laboriosam excitat.

Turbith.

Noxa.

CVRATIO ejus est subita evacuatio alvi atque ventriculi, cum per vomitum, tum per Clysteres. In clysteribus autem seu elotionibus alvi plurimum confert *Hydromel*, vel aqua mellis cum ol. amygdalarum amar: præstat quoque portio *hydromel. cum ol. amygdal. amar*: Antidotum ℥ij. Theriacæ, vel ℥ij. species liberantis.

Scammonium quid, qua excitet in corpore symptomata, & quibus eisdem succurrendum remediis.

Σκαμμόνια, Latinis *Scammonia*, est *Scammonium*, herba in Mysia Asia & Syria nascens, Volubili minori similis, hederacea habens folia, sed longè pinguiora, nobis Europæis ignotissima. Ex ejus foliis succus lacteus exprimitur, ac deinceps condensatur, & inde Veneriis adportatur. Is succus in Myropolii *Scammonium* nominatur. Si verò idem succus præparatus, quod fit si succo Citoneorum incoquatur, tum Medicis *diagridion* appellatur; quod est usitatissimum in Officinis medicamentum. Pauca enim prostant Electuaria, & pillularum massæ laxantes, quibus *Diagridion* sive *Scammonium* præparatum, tum non immisceatur, propter ejus excellentem vim purgatricem. Laudatissimum autem censetur *Scammonium*, quod opt.

Diagridion.

nota Scamm.

quod leve est & nitidum, & linguæ admo-
tum, aut comestum, in succum lacteum
resolvitur. Scammonium per se, & ultra
modum assumptum, violenta purgatrice
facultate & insigni caliditate venenum est,
& excitat hæc Symptomata, alvi nimi-
rum immoderatum fluorem, ac dysen-
teriam, & noxam infert cordi, epati,
ventriculo & intestinis, & universum cor-
pus inflamat, febrem accendit, sitim
intolerabilem & animi deliquium in-
ducit.

Noxa.

Curatio.
Vomit.Hyperca-
tharsis
quomodo
sistenda.

Curatio Scammonii est evomitio sta-
tim in principio assumptionis, quæ de-
bet fieri cum aqua calida & ol. anethi-
no. Post vomitum Syrupus è succo Civi
aut rosarum cum aqua Tormentilla, aut
aqua hordei præstat exhiberi. Ut autem
fluxio alvi sistatur, confert agrum in aquam
frigida[m] usque ad umbilicum collocare.
Antidotum autem Scammonii, ut omnium
fere venenatarum rerum violentius pur-
gantium, est Theriaca Andromachi, si ejus
℥ ij. cum aq. rosarum, aut plantaginis ex-
hibeantur; aut sequens pulvis: ℞ Boli
Armeni veri ℥ j. corall. rub. præpar.
Cornu cervi usli ana. ℥ 5. Misce, & propi-
nentur cum aqua Rosarum, aut Tormentil-
la; plurimum quoque confert, si æger lac
recentis mulctum cum butyro recenti, aut cum
oleo amygdal. dulc. bibat: Confert & suc-
cum Ciconiorum condensatum sæpius gi-
stasse.

Ranunculus quid, & intra corpus assum-
ptus quæ concitet Symptomata,
& quomodo ea curanda.

Ranun-
culus.

Βάλεσμον, Ranunculus / Brentraut /
Flammula, & Apium risus nominatur, eo
quod per ejus usum, vel sua venenata quali-
tate, nervos potissimum cerebri & faciei
convellat, & musculos distendat, morien-
tibusque ridens effigiem inferat. Plures
sunt ranunculorum species, sed omni-
bus una est facultas, nimirum acris &
exulcerans. Radix ranunculi contusa &
cuti imposita vesicam excitat, & cutim
exulcerat; intra corpus assumptus ranun-

Sympt.

culus gravia infert Symptomata, exulce-
rando viscera & nervos, ut dictum est, fa-
ciei etiam ac maxillarum, lædit & memo-
riam.

CURATIO est cita ejus revomi-
tio, hausta prius aq. Juniperi per descensum
destillata: deinde somni conciliatio. An-
tidota ejus sunt succus Melissa, cum vi-
no rub. mixtus, & lac caprillum cum re-
centi butyro bibitum.

Euphorbium assumptum, quid, quæ in-
ferat Symptomata, & quæ ratione
ea curanda.

Ευφορίαν est succus cujusdam arboris
ferulaceæ in Mauritania & monte Atlantis
nascentis, ex cujus cortice inciso succus
prostillat, & instar gummiatis concrevit
in grumos, cujus qualitas & odore & sapo-
re omnium est ferventissima & acerrima.
Qui tamen ritè præparatus, & intra corpus
exhibitus, hydropicorum aquam validissi-
mè subducit: alias si intra corpus ultra
modum ingeratur, extremam infert per-
niciem: Ideo non nisi rectè præparatus, & vsus
in certa quantitate hydropicis frigidum
ventrem habentibus, & in colicis dolo-
ribus ex frigida pituita ortis exhibetur.
Paratur ex eo oleum ad frigidissimos
quosque morbos foris inunctum utilis-
simum. Euphorbium incorrectum assum-
ptum totius corporis veluti incendium,
intensissimum ardorem & sitim inducit.
Deinde animi deliquium frigidus su-
dores, dysenteriam & mortem in-
fert.

Euphor-
bium.qualitas
ejus.

Noxa.

CURATIO Symptomatum ex Eu-
phorbio est, ut materia Euphorbii statim
per vomitum deiciatur, quæ si ad intestina
descendit, ibidemque erosionem facit, per
clysterim subducenda erit, ac protinus
ignea ejus qualitas in visceribus extin-
guenda. Vomitio perfici potest commo-
dè cum aqua tepida, cui oleum viola-
rum est admixtum. Clyster paretur ex
aqua hordei, cui nonnihil mucaginis
sem: Psylli est admixtum, aut ex lacte in
quo ol. rosarum est resolutum. Antido-
tum

Cura.

Antid.

DE ANACARDO, STAPHISAGNA, NUCE VOMICA, ET EAR. CUR. 93

tum Euphorbii est Theriaca Andromachi 3ij. & speciez liberantis cum crebro lacte usurpata. Prodest & Syrupus de Citro cum aq. rosarum crebro potitatus. Similiter & butyrum recens in lacte resolutum. Quin & ol. violarum cum aq. hordei commixtum crebro exhiberi commode potest. Serum quoque lactis acidum unice probatur.

Anacardus quid, quæ inferat symptomata, & quibus remediis succurrendum.

descriptio
fructus
anacardi.
Eti Anacardi vocabulum Græcum esse videatur, Græcis tamen authoribus fructus Anacardi penitus fuit ignotus. Sunt autem Anacardi fructus magnitudine amygdalarum, cordis gallinæ, aut avium grandium effigiem & formam referentes, colore rubri, sub eorum cortice succus melleus & instar sanguinis ru-

Melana-
card. beus continetur, quod mel anacardinum in myropoliis dicitur. Arbores Anacardi in Sicilia ad Vesuvium montem,

Elect. A-
nacard.
Vfus. qui perpetuis ignibus flagrat, reperiuntur, ex eisque fructus Anacardi colliguntur, conficiturque in officinis ex Anacardis medicamentum, quod elect. Anacardinum vocant. Vtilissimum in paralyti linguæ, si in ore retineatur, & in omnibus frigidis cerebri morbis & ob-

Noxæ. structionibus nervorum, quod & memoriam, si cum ratione assumatur, amissam restaurat. Assumpti anacardi sanguinem exurunt, & fauces atque guttur, ventriculum quoque erodunt, nervos convellunt, & cerebri temperiem labefactant, rationemque turbant.

Cura. CURATIO symptomatum ex Anacardis est cita revomitio, & per clysterem subductio, atque larga lactis & recentis butyri potitatio. Confert quoque plurimum ol. amygd. dulc. & ol. è semine papaveris & medulla ex ossibus vel cruribus bovium cum ptisana hordei bibita. Pro antidoto erunt 3ij. boli Armeni cum sero lactis. Eger sæpe comedat nucleos pineos, & nucleos nuc. lugland. torrefactos.

Staphisagria quid, quæ inferat symptomata, & quibus remediis iisdem succurrendum.

Staphis. & yveia, Latinis herba pedicularis, eò quod pediculos enecet, nominatur. Ejus semen acri & urente facultate est præditum, & per omnia simile Anacardis. Vtimur seminis ejus decocto vsu. in gargarismatibus pro eliciendis ex cerebro excrementis pituitosis, quæ lenta & tenacia sunt. Intra corpus assumpta semina Staphisagriæ eadem excitant symptomata, quæ anacardi. Fauces enim & palatum adurunt, vomitiones movent, ventriculum erodunt, & dysenteriam inferunt, & nisi tempestivè succurratur, strangulant. Noxæ.

CURATIO Symptomatum ex Staphisagria est evomitio, hausto prius ol. amygdal. & si in alvum descenderit, præstat & Clyster ex ol. amygdalarum dulc. & lacte paratum. Antidotum ejus est 3ij. Boli Armeni & Butyrum recens. Reliqua remedia partim ex curatione Anacardorum petenda erunt, partim infra in curatione Cantharidum commemorabuntur. Antidos.

Nux vomica quid, quæ excitet Symptomata, & quibus remediis ea sint curanda.

Nuces Vomicae, & Græcis & Latinis Nux Vomica, per Arabes in officinas introductæ sunt. Sunt autem nuces vomicae fructus cujusdam arboris orbiculares & instar pastillorum compressi, tenuissime lanuginosa pellicula contecti, quæ abrasa subalbidi sunt & instar cornu duri. Venenatae sunt nuces vomicae, & pro-duplici-
prietate specificâ & extremâ caliditate, & non solum canes & aves, assumptæ, citissimè enecant, verum etiam hominibus lethales sunt quoquo modo assumptæ. Proinde detestanda est illa usitissima & Medicis & Myropoliis & certis familiis compositio, quæ tempore Pestis utuntur, quam Electuarium de ovo, vel

ovum aurum vocant, eò quod nucem vomicam recipiat; Noces vomica nostratibus *Kranseuglin*, id est, gruum oculi vocantur. Assumptæ excitant periculosa symptomata, vomitionem laboriosam, animi anxietatem, & omnium virium subitam prostrationem.

CVRATIO eorum symptomatum consistit in cita revomitione excitata aut cum aq. Iuniperi per descensum destillata, aut cum ol. anethi cum aq. calida commixto exhausta. Antidota ejus sunt

Antid.

3 ij. pul. Zedoaria cum vino exhibitæ, & succus citri acidi, corticesque ejus in pulverem redacti aut conditi, & succus Citoniorum condensatus.

Taxus.

Taxus quid, qua inferat symptomata, & quibus remediis succurrendum.

Ξυλάξ, *Eibenbaum* / arbor est baccifera, magnitudine & foliorum figura ac dispositione abieti & picea non multum dissimilis, quæ in Italia & Sylvis Hercinia ac Tridentinis plurimum luxuriat. Baccæ Taxi rubescentes sunt, & inter folia prona nascuntur, vinosæ & gustu non ingratae, quæ devoratae ardentem febrem excitant, totum corpus inflammant, & dysenteriam inferunt, sicuti & Foliorum pulvis comestus. Quin & sub ejus umbra sedentibus, aut paulò diutius degentibus pernitiem infert; & fumo foliorum taxi mures enecantur in ædibus.

baccæ ejusdem.

Noxa.

Curatio.

Curatio Taxi est ut assumpta quàm citissime evomantur. Antidotum ejus sunt *Iberiaca Andromachi* 3 ij. cum vino aut succo Citoniorum ebibitæ, & crebra usurpatio Syrupi de citro.

Oleander quid, qua in corpore excitet symptomata, & quibus remediis subveniendum.

Oleander, Mauritanorum est vocabulum, in officinis tamen cum aliis Barbaris vocabulis receptum, Græcis verò *ῥόδον ῥοδάκνιδον*, id est, arbor rosas ferens, & *ῥόδον ῥοδάκνιδον*, id est, laurus rosas ferens; sic dicta, quia folia habet fol. lauri similia: Arbuscula

ab extra salutaris,

est in Germania ignotissima. Nerei & folia intra leg. & rosæ sive flores venenatis morbis aut carbonibus pestiferis foris imposita venenum eliciunt & discutunt, sed intra corpus assumpta & hominibus & pecudibus omnibus non ruminantibus pernitiem præsentissimam inferunt. Excitant enim extremam angustiam, alvi intumescantiam, & totius corporis inflammationem: Quin & umbra ejus (sicuti de Taxo dictum est) sub ea quiescentibus periculum inducit.

CVRATIO oleandri & symptomatum ex eo excitatorum consistit in revomitione cum aq. Iuniperi per descensum destillata, & Clysteribus ex decocto ficuum & ol. Amygd. parato, & crebra potitatione decocti dactylorum & ficuum. Antid. tidorum ejus sunt 3 ij. diacastorei, aut 3 ij. pul. bacc. Iuniperi, aut 3 j 5. sem. ruta & sem. viticis sive agni casti; conferunt quoque ficuum & dactylorum & butyri recentis crebrae citationes.

Juglans & Sambucus Arbores, quid, quomodo suâ umbrâ ladant, & quibus remediis noxa depellenda.

Juglans arbor, Græcis *κρίνον βασιλικόν*, id est, nux regia seu communis, nostris etiam *Walnußbaum*. Sambucus Græcis *αἰξίς*, nostratibus *Holdersbaum* oder *Glederbaum* nominatur. Has duas arbores nos non alio nomine inter venenatas referimus, quam si quis sub earum umbra diutius versetur, aut quiescat, quemadmodum de Taxo & Nerio diximus, ob gravem earum odorem, gravia inducunt symptomata, nimirum capitis dolorem, vertiginem, sæpè Epilepsiam & Apoplexiam. Quare qui in viridariis vel hortis sub earum umbra menses ac sessiones collocant, suæ salutis minus rectè consulunt. Alioqui & partes Juglandis & ipsa nux suas habent utilitates: ex corticibus enim radicibus jugland: si in vino per noctem macerentur, & manè ebulliti exprimantur colenturque, hic liquor vomitum excitat pituitosorum in ventriculo

Juglans. Sambucus.

Cur juglans & Sambucus inter venenatas referenda.

Admonitio.

Vires juglandis.

Vomito- triculo humorum. Similiter si flores ejus, quos *julos* sive *catulos* nominant, in pulverem redigantur, & pondere 3j cum vino aut *hydromelle* exhibeantur, itidem præstat. Sambuci autem mediani cortices cum *centauri min.* aquali pondere decocti in aqua, & ebibiti, serosos humores ducunt, & epar ab obstructione & putrefactione ex nimia Venere concepta præclare liberant. Quin & semina sambuci ex baccis à pelliculis ablatis collecta & in pulverem redacta, & pondere 3j crebrò cum vino exhibita, hydropicam aquam egregie subducunt; Symptomata capitisque dolores ex odore & umbra utriusque arboris contacta, tollenda sunt capitis lotionem cum Lixivio, in quo vel frondes *Rorismarini*, vel *Majorana*, vel *Bethonica* vel *Serpilli* sunt incocta. Deinde irrigatione capitis cum *aq. Lavendula* & masticatione *sem.* earum. Antidotum eorum symptomatum est vinum meracius, ac devoratio trium aut quatuor rotular. *diamoschi.*

Agaricus quid, qua inducat symptomata, & ea quibus remediis medicanda.

Agaricus. *Agaricus, Danneischwamm* / est tuber seu fungus, vel excrecentia quædam ex caudice *laricis arboris in sylvis Sarmaticis, Trideninis, Italia* plerisque locis copiosè pronascens; probatissimus *Agaricus* recensetur, qui est albissimus, levis, laxus, & facillè friabilis, gustu primum dulcis & mox amarescens. *Extriosus autem & Venenatus est Agaricus niger, & cujuscunque alterius coloris, durus, gravis, lignosus, & longas habens venas; Optimus Agaricus nobilissimus & utilissimus est remedium, præsertim ubi ritè præparetur & in pastillos redigatur. Pituitam enim & putrescentes humores è corpore clementer subducit, & jecoris pulmonisque obstructionem aufert, & omnibus principibus membris, Cerebro, pulmone, Jecinori, ventriculo & articulis familiaris est medicina. Niger autem & vitiosus Agaricus, intra corpus as-*

sumptus, hæc excitat symptomata, nauseam, ventriculi subversionem, vomitum, alvi fluorem & anxietatem. Horum symptomatum curatio consistit in assumpti mali Agarici cita evomitione, assumpto prius haustulo vini in quo cort. radicem *lugland.* per noctem sunt macerati & incocti. Post vomitum confert butyrum recens cum lacte caprillo liberalius potum. Antidotum Agarici mali sunt 3ij Boli Armeni veri, aut terra Lemnia, aut pulv. cortic. Citri aut Arantiarum pond. 3j & Syriacus è succo Citri acidi, aut suc. Citon. Condensatus sæpeque gustatus.

Viscus arborum quid, qua inducat symptomata, & quibus ea profliganda remediis.

Viscus arborum.

Quercus, viscus, *Dogel Leim* / peculiaris & Natalitia sui generis frutex seu planta est, colore buceo inter frontes quarundam arborum, ut *Quercus*, *pyri*, mali, *berula* & similitum. Ex stercore avium visci fructibus vescendum, & per eas arbores pernoctantium, ex quarum genere sunt turdi, palumbes, cuculi & aliarum enata. Ex ejus baccis instat Margaritarum candidis viscus excoquitur, materia lenta & tenax ad aviculas capiendas utilis. Hunc fruticem nostri *flusser* vocitant; & visci quidem per quercum nascentis ligno, quod nobis *Quercus flusser* dicitur, in pulverem redacto, in profliganda Epilepsia commodissimè utimur. Fol. visci commasticata deglutitionem impediunt propter vehementem constrictionem. Acini verò visci & eorum succus intra corpus assumptus infert hæc symptomata; Vertiginem, rationis perturbationem ac continuos flatus ac rugitus alvi. Horum ex visco symptomatum curatio est evomitio, assumpto prius haustu *aq. Juniperi per descensum destillata* & alvi per Clysterem subductio, cum *ol. absinthii* & decocto ejusdem & lactis cum recenti butyro crebra potitatio, & lactis caprilli recentis esuratio. Pro antidoto optimum est crebrò bibere vinum absinthites & scordii decoctum, aut.

pulveris scordii ℥j. Laudatur & Theriaca Androm. ℥ij. assumpta, aut ℥ s coaguli leporis cum aceto exhibita.

Cicutā quid; & intra corpus assumpta, quā excitet Symptomata, & quibus remediis eisdem succurrendum.

Cicuta. *Kärlow; Bütterich / Botunck* oder *Schislunck* / est herba notissima, foedi & teterimi odoris, quā præter venenatam proprietatem extrema frigiditate est noxia. Narrat *Matthiolus* alinos cicutam depascentes, in profundissimum somnum resolvi; adeo, ut rustici putantes asinum esse mortuum, aliquando corium ei detraxerint, & inter excoriandum asinum discusso somno, evigilasse, & prostravisse, non sine risu spectantium. Succus cicutæ somnificis Epithematis commodè admisceri potest & applicari. *Cicuta herba, semen aut radix comesta, gravissima infert Symptomata, Vertiginem & oculorum caliginem, insaniam ac furorem, compressionem diaphr. vehementem cutis pruritus, & animi anxietatem.*

*N. Cata-
plasma ex
cicuta in
excremen-
tis singu-
lare:
Mala ex
huius af-
sumptio-
ne.*

Cura. CVRATIO horum symptomatum est revomitio subita, exhausto prius ol. irino cum aqua tepida & momento salis, aut hausto aq. Juniperi per descensum destillata ℥v. & subductio alvi injecto acri clystere. Deinde exhibeatur ægro vinum Absinth. affatum & crebro. Antidota Cicutæ sunt ℥ij Theriaca Androm. aut ℥j. pul. gentiana cum vino, aut gutt. viij ol. Angelic. cum vino.

Hyoschyamus quid, quā inferat Symptomata, & quibus remediis depellenda.

Hyoschyamus. *Yoschiamos, hyoschyamos vel Apollinaris, Willeren oder Willersamen* / est nota & vulgata herba, semen in calicibus profrens. Radices hyoschyami minutim concisæ & in aceto decoctæ, dentium doloribus ex calido fluxu ortis præclare medentur. Fumo sem. hyoschyami galli gallinacei concepto è tignis delabuntur; & semine devorato pisces in aquis supernatant, ut manibus rapi queant. Semen hyoschy-

mi, aut succus, aut radix, intra corpus assumpta mentem perturbant. & tam turbulentos furores inferunt, ut à cacodæmone agitati, aut instar ebriorum continue rixari ægri videantur, & vertiginem stragulationemque, & difficilem respirationem excitant. Idcirco intra corpus propinari non debet, quia malitia ejus vix corrigibilis.

CVRATIO perfici debet Vomitione & per Clysterem acrem alvi subductione. Ad vomitionem autem juvabitur assumpto prius haustu aq. Juniperi, Clysteri verò admisce ol. ruta, bibendumque offeratur lac, in quo castoreum & ruta sunt incocta, bibatque crebro Vinum Absinthie. Antidota sunt ℥ij. Ther. Androm. aut Mithridatica confectio, aut gutta viij ol. angelica, aut ℥ij coaguli hædini cum vino; & si hæc desint, exhibeantur ℥ij piperis longi cum vino.

Psyllium quid, quā excitet Symptomata, & quibus eisdem medicandum remediis.

Psyllium. Psyllion, Psyllentraut / Globfahmen / quia pulicibus similia sunt semina, nominantur. In myropoliis, seminibus tantum utimur, ex quibus in aq. Rosarum aut alio liquore maceratis mucago seu lentor conficitur, qui unguentis refrigerantibus & Epithematis in febribus & calidis affectionibus utilissimè commiscetur: quo si spina dorsi & hypochondria inungantur, febrilem calorem sensibilibus mitigant. Idem lentor sive mucago, si per se illiniatur, faucium linguæque ariditatem ac scabritiem lenit, & sitim compefcit. Quin & in febribus ardentissimis mucago psyllii cum tantundem syrupi violarum utiliter exhiberi potest: Calorem enim febrilem extinguit, alvum emollit, & bilem educit; præterea si mucago ex integris & non contusis seminibus parata exhibeatur, dysenteriae & alvi fluori ex assumptis calidis remediis & violenter purgantibus, ut sunt Scammonium, colocinthis, Euphorbium, excitato, probè medetur. Verum si pul-

*Cantela,
vis,*

NB.

vis, vel contusum semen intra corpus assumatur, sua substantiali venenata qualitate & summa caliditate, quæ est in medulla seminis, ventriculū & intestina exulcerat, jecur & universum sanguinem inflamat; caute autem & ipsa mucago, & cum certa mensura exhiberi debet intra corpus, aliàs totum corpus refrigerat, mœrorem infert, & alvi intumescētiā, Spiritus interceptionem, & cordis anxietatem, quam sudor frigidus cum gelida morte subsequitur.

CURATIO Symptomatum ex Psyllio in evomitione cum aq. Iuniperi assumpta & cum alvi subductione per Clysterem; cum ol. ruta & decocto absinthii & centaurii consistit. Deinde prodest Vini meracioris Antidota crebra potitio. Antidota sunt Theriaca Androm. 3ij aut 3j. pul. Vincetoxici cum vino assumpti.

Coriandrum quid, quas inferat noxas, & quibus eisdem succurrendum remediis.

Coriandrum venenatum. Κοριάνδρον, Coriander / herba foetida est; Cimicum enim animalium foedum odorem refert vel spirat, dum viridis est, & tota substantia venenata est, semen autem ejus maturum & exiccatum, adeo non est venenatum, ut & odoris suavitate, & saporis gratitudine ventriculo & cerebro esitatum proficit; ideo si saccharo incrustatum, post cibum assumatur, cerebrum corroborat, & evaporationes ex ventriculo prohibet. Herba autem & succus superficialis herba humiditate ac frigiditate, & foedo odore capiti est inimicissimus. Herba itaque & succus intra corpus assumptus vocem exasperat, & rationem perturbat.

CURATIO Symptomatum ex Coriandri succo est evomitio, assumpta prius aqua tepida cum oleo anethi. Antidotum vero ejus est Theriaca Androm. Sic ejus 3 duæ cum vino assumantur.

Mandragora quid, qua inferat symptomata & quomodo ea curanda.

Mandragora. Μανδράγη / est herba radice crassa & bifurcata, foliis Lactuæ simili-

bus, in Germania quidem ignota, sed Italia, præsertim circa Garganum montem, copiosè nascens; & quia radix ejus est bifida, & tanquam in duo crura divisa, hinc antiquorum quidam eam ἀμφωπομένην ^{Impositura ex hac radice.} appellarunt; & impositores quidam circumforanei credulæ plebeculæ persuaserunt, Mandragoræ radicem homunculi imaginem habere, pilis in capite & circa pudenda ornatam, & deinceps conformarunt hominis imagunculam ex radice brionæ, cujus capiti & circa pudenda semina mylii perforando inseruerunt, & eo usque terrâ cooperuerunt, donec germina mylii prodissent instar pilorum. Has imagunculas, mulierculis & aliis credulis pro Mandragora grandi pecuniâ vendiderunt, & juramento affirmarunt, hujus radicem possessores nunquam egere pecunia; sterilesque fecundas fieri; & in quibuscunque haberetur ædificiis, veneficia & dæmoniorum præstigias, & tempestatum noxam nihil nocere posse. Harum sceleratarum nugarum occasione sumserunt ex lib. 7. c. 25. Iosephi bellum Judaicum describentis, qui cujusdam radicis Βάρας vocatæ, & instar flammæ fulgentis meminit, ac asserit eam non posse sine vita periculo evelli, sed circumfossam canis vinculis alligari, & à cane tandem evelli, canemque statim interire, & ita tandem ab hominibus à canis collo recipi. Hæc audientes impositores suas nugas de mandragora mendaciis amplificaverunt, & radices suas Mandragoræ sub patibulis ex femine, aut urina, vel lotio furum in strangulatione perfusa nasci, & inde homunculi effigiem acquirere. Radices Mandragoræ ex monte Gargano vehementer refrigerant, & somnum conciliant; quæ intra corpus assumptæ, aut pomis ejus devoratis, Veterum & profundissimum somnum Lethargo similem inferunt, ac tristitiam & amentiam excitant, ita ut ager ex profundo somno excitatus vociferetur, ac statim iterum indormiscat, præterea facies intumescit, & oculi prominent, nisi maturè occurrat.

Noxa.

curratur, in vitæ discrimen æger conjicitur.

Curatio.

CURATIONIS Methodus est, ut primum vomitio excitetur, præsumpto haustu *aquæ luniperi per descensum destillata*, ac tandem alvus subducatur *Chystere acri ex hydromelle & oleo ruta* confecto; deinde ut excitetur *Sternutatio inserto Errhino, ex radice Gentiana formato*, naribus, aut inserto pulvere naribus *ex Castoreo, pyretro & Majorana* concinnato. Caput præterea circa suturam coronalem & tempora inungantur *Ol. rosarum & aceto Rosaceo simul mixtis*: Odor quoque aceti acerrimi subinde naribus applicetur, & bibat crebrò *vinum absinthii*. Antidota Symptomatum *Mandragoræ* sunt *Theriaca Androm.* *ʒij cum vino aut pulvere ex castoreo, & scordio, & ruta ana ʒj cum vino.*

Opium.
Papaver.

Opium & Papaver quid, quæ inferant symptomata, & quibus remediis curanda.

Nullum papaver veneno contaminatum.

Μακρόλευον, Opium, est succus papaveris. Papaver enim *μακρόν*, *Μακρόν* oder *Μακροσάδ* nominatur, cujus sunt duæ species, à seminum colore, alba & nigra; quæ etiam inter venenatas res numerantur, tamen nec semen albi nec nigri papaveris venena esse deprehenduntur, cum in *Austria & Styria* ejus semina & nigra & alba in cibis cum pane recenti ad *ʒijj*, aut *iiij*, à rusticis elitentur, & *ol. ex semine papaveris expressum* in cibis quotidie utantur, nec inde aliquid mali percipiant, aut somnolentiores efficiantur. Capita verò papaveris, præsertim cum nondum sunt exsiccata, vehementer refrigerant, & somnum conciliant, ideò in calidis morbis instar cataplasmatum cocta & contusa capiti applicamus, aut lavacra pedum ac manuum ex eis paramus. Opium autem est præsentissimum venenum, & sit ex incisis adhuc virescentibus capitibus papaveris, ex quorum casura succus emanat, qui collectus aut in sole, aut in loco calido in massas condensatur & odore & sapore hor-

Opium ut fiat.

ribili. Utimur Opio in unguentis somnum conciliantibus in exigua quantitate admixto, ut si recipiatur *Opii ʒß & in minutas partes concisum cum pauxillo aceto rosaceo* ad ignem dissolvatur, eidemque admisceatur *ung. populei ʒij*. fit præstantissimum Unguentum somno conciliando in contumacis vigiliis; sed quia hac ratione conciliatur somnus, laboriosus est, eo non temere est utendum, nisi extrema urgeat necessitas. Ego vero usus sum opio felicissime in *Dysenteria* & cruciatibus intestinorum hac ratione: Formavi ex opio glandem cum filo appenso, quam crebrò per vices posici inferui, & post quadrantem horæ extraxi ac iterum inferui, donec tormina colica, & fluor alvi conquiescerent. Per os autem intrà corpus exhibere nunquam sum ausus: In compositis verò medicinis, quas *Opiatas* vocant, exhibui, sed non nisi summa urgente necessitate; & ubi vigilæ vires debilitarunt, aut extremi dolores hominem cruciarunt. Sunt autem opiata remedia, quæ in Myropoliis prostant, *Elect. Philonii, Zazenea, Requies Nicolai, Triphera magna, & Triphera Saracenica*: Opiata in quæ sanè remedia non temere sunt exhibenda, nisi summa necessitas expostulet, adhibita prudenti circumspectione. Opium sive per se, sive in mixtis medicamentis imprudentius assumptum, hæc symptomata perniciosæ infert; statim sanguinem & spiritus vehementer refrigerat, & somnum profundum, ac ferè inexcitabilem inducit, quam unguum lividitas, anhelitus frigiditas, maxillæ inferioris laxatio & labiorum intumescencia subsequitur, ac tandem singultus, sudor frigidus & violenta mors.

Usus opii in dysenteria & colica.

Curatio.

CURATIO, ut fere in omnibus venenatis affectionibus, ita in symptomatibus ex opio, consistit in tempestiva evomitione, præhausto vino in quo cortices *radicum juglandum* sunt incocti, & in subductione alvi cum *Chysteribus ex hydromelle*, in quo cocta sunt *Centaurium minus, ruta, Scordium & Castoreum cum oleo Casto-*

Usus opii.

Unguentum somni-ferum.

Usus opii in dysenteria & colica.

Autopsia opii inter- no abstinuit.

Symptomata ab Opio.

Castorei. Tandem sudor proliciat, ut sumptis *antidoto Theriaca* ʒij. Sternutatio quoque cum pulvere exiguo *Euphorb. Majorana* naribus indito excitata plurimum confert. Tutura verò coronalis & tempora iungantur oleo *castorei* cum aq. *luniperi* per ascensum destillata, diluto, ægerque subinde exciretur è somno naribus admoto nodulo ex *castoreo* & paucillo *Euphorbii* in aceto acerrimo macerato. Antidota præter *Theriacam*, plurimum confert crebrò exhibere duo cochlearia aq. *luniperi* per ascensum destillata, aut gutt. vij olei *Angelica*, aut gutt. xij. ol. *Vitrioli* cum vino generoso.

Fungi. Fungi quid, quæ eorum symptomata, & quibus remediis curanda.

Mexales Boletum. Fungorum plura sunt genera: Alii enim ex terra, alii ex caudicibus arborum pronascuntur & extuberant, & eorum alii rursus sunt esui apti, alii vero venenati atque mortiferi. Esui apti sunt etiam quos nostrates *Prisschen* & *Psifferlinge* nominant; Venenatos autem generali vocabulo omnes *Poggenstiele* / Fungos *Dioscorides* inter plantas recenset, sed cum nec folia, nec radices, nec semina proferant, quæ ratione inter plantas recenscantur, nescio. Gulæ luxuries fungos quoque inter alimenta recipit, præsertim in Italia & Superiori Germania: præstaret

Fungis abstinnis. verò nunquam fungis vesci, cum vel inter salubres fungos venenati etiam reperiantur;

& omnes sunt mali & tenacis succi. Fungorum symptomata sunt vehemens capitis dolor, oris ventriculi coarctatio, respirationis difficultas, singultus, frigidus sudor, anxietas, ventris & faciei intumescencia, quandoque colici dolores, ac postremò suffocatio.

Noxa.

Curatio.

Curatio symptomatum ex fungis consistit in matura evomitione fungorum comestorum, præsumpto haustu vini, in quo cortices radicis *Sambuci* macerati & incocti sunt, & subductione alvi cum acriclystere ex decocto *Scordii*, ruta, *Valeriana*

addito ol. ruta & hyera simplici. Bibat quoque æger crebrò vinum absinthites, quod quovis tempore per macerationem facile parari poterit. Offerantur etiam crebrò radices *Raphani* & nuclei allii. Antidota fungorum sunt ʒij *Theriaca Androm.* cum haustu vini, aut ʒss. ol. absinthii destillati, cum vino; aut ol. *Cimini* ʒss. aut salis absinthii ʒss. aut ʒj pul. stercoris gallinarum. ʒj. cum vino assumpta.

Stercus gallinarum.

SECTIO III.

De venenis ex Metallorum & Mineralium familia oriundis.

Ex Fossilium genere quæ Venenata habeantur.

Inter res, quæ ex cavernis montium eruuntur, venenatae sunt omnes materiae, ex quibus metalla & mineralia excoquantur; & lapides plerique, sive metallorum lapideæ materiae, generali vocabulo, Græcis *πρωτες*, Germanis *Erz* oder *Stückstein* nominantur; & tot sunt Pyritum species, quot & Metallorum, quæ inter se colore tantum differunt: aliæ enim aurei coloris, aliæ argentei, aliæ ferrei, aliæ cinericei sunt. Pyritem auri *Voltgeiß* / *Volt Erz* / Chymici Arabico vocabulo *Marcasitum*, nostri *Gölden* oder *Volters* vocant. Ex hisce lapideis materiis coquantur omnia metallorum genera: nunquam enim in montibus purum & putum reperitur metallum, excepto auro, argento & Mercurio, quorum nonnunquam furculi puri effodiuntur. Sunt itaque metalla ex pyrite sive lapideis materiis ignis violentia excoctæ massæ, quæ in igne colliquantur fluidæque redduntur, ut malleis extendi ac formari possint. Metallorum species septem sunt, quæ à Chymicis septem Planetarum nominibus ornantur, qui quidem aurum Solem, argentum Lunam, æs sive cuprum Venerem, stannum Jovem, ferrum Martem, plumbum Saturnum, &

Marcasita.

Metalla quid? Metal-

& hydrargyron, sive argentum vivum, Mercurium vocitant. Ex quibus per præparationem venenatæ sunt materiæ sive res, ut ex auro & argento Lythargyrium & Lazurum; Ex ære, æsustum & ærugo sive æs viride; ex ferro fit crocus Martis; ex plumbo cerussa; ex argento vivo Mercurius sublimatus & præcipitatus, & per additionem Sulphuris fit cinabrium ac minium. Mineralia sunt etiam terrestres & lapideæ, materiæ è terra & montibus erutæ, quæ etiam si in igne dissoluant, diu tamen violentiam ignis sustinere nequeunt; sed vel aduruntur, vel in aliam formam convertuntur, & malleo extendi formarique minimè possunt. Mineralium primariæ species sunt Sulphur, Antimonium, Calchantum sive vitriolum, Arsenicum, Auripigmentum, alumen, gypsum, Nitrum, borax. Lapidès venenati, qui è visceribus terræ eruantur, sunt lapis Armenius, Lapis Lazuli, Lapis Magnes, Lapis calaminaris. Et si autem metalla & mineralia, excepto auro & argento purificato, omnia sunt venenata, tum proprietate sua, tum præparationis ac mitionis ratione, tamen sunt subjectæ materiæ artis nobilissimæ Chymicæ, cujus artificiosa operatione, & ignis moderatione ex iisdem rebus saluberrima remedia ad curandos morbos difficiliore eliciuntur, eaque aut sub forma oleosi liquoris, quem Spiritum artifices vocant, aut in formam aquei liquoris, quem illi quintam essentiam nominant, aut in formam calcis pulverisque, quem salem illi vocant, de quibus nos Deo auxiliante, eorumque præparandi & administrandi ratione in nostra latrochymia fusius tractaturi sumus. Sicuti autem omnium corporum mixtorum, ita & metallorum & mineralium principia, 4. Elementa esse statuimus, minimè obstante, quod veteres Philosophi ac Chymici principia omnium metallorum ac mineralium duo constituerunt, Sulphur & hydrargyrum, & ex horum varia commistione, puritate & impuritate, & coctionis ratione metalla cum perfe-

Venenata
ex metal-
lis,

Minera-
lia.

quot ?

Lapides
Venenati.

hæc omnia
cum gra-
uo salis
accipien-
da.
Enco-
mium Chi-
mie ab
effectu.

Morte
præventus
hanc non
absolvit
Antor.

Metallo-
rum origo
ex Ele-
mentis.

cta tum imperfecta, & mineralium species in montium visceribus generata asseruerunt; & hinc sumpta occasione, Paracelsus adversus omnes Medicos negat Elementa mundi esse corporum principia, sed tria alia commentus est: Sulphur, Salem & Mercurium sive argentum vivum. Quibus discipuli ejus addiderunt quartum, Spiritum videlicet; in hisce tribus contentum: & ex iis quatuor principis asserunt omnia componi, & omnia in eadem resolvi; & vocant quidem illi Sulphur, quicquid è rebus in igne in cinerem sive calcem convertitur. At sanè eà ratione Sulphur in corporibus non erit aliud, quàm ignis, nec Mercurius aliud quàm aqua: Sal verò, sive calx quid aliud erit quàm terra? Spiritus autem in hisce tribus æris rationem obtinet: & ita tota contentio Paracelsorum de principis rerum nil aliud erit, quàm fatuus dogmatizans. Nunc tempestivum est fossilia venenata ordine recensere.

Hæc pama-
lò acutius
perpen-
dunt Chy-
mici sa-
niores.

Tabella Venenatarum rerum fossilium.

METALLA sunt:

Aurum, Chymicis ☉	Argentum ☽
Æs sive cuprum ♀	Plumbum ♄
Ferrum ♂	Argentum vivum ♄
Stannum ♄	

Ex Metallis venenata res sunt:

Aurispuma vel Lithargyrium,
Lazurinus color ex argento,
Ærugo ex cupro,
Scorium ferri,
Plumbumustum,
Minium ex plumbo,
Mercurius præcipitat. ex argento vivo,
Argenti Spuma,
Æsustum ex cupro,
Crocus ♀ ex cupro,
Crocus ♂ ex ferro,
Cerussa usta ex plumbo.
Mercurius sublim. ex Argento vivo,
Cinabrium ex Argento vivo & Sulphure.

Mine-

Mineralia Venenata:

Sulphur,	Sal Armeniacum,
Arsenicum,	Vitriolum,
Nitrum, gypsum,	Alumen,
Antimonium,	Borax.
Auripigmentum,	

Lapides Venenati:

Lapis Armenius	Lapis Lazuli
Lapis Magnes	Lapis Calaminaris.

Aurum quid, quæ ejus facultates.

Aurum
Cor Me-
talorum.
Chymico-
rum opi-
nio.
Sympha-
zica Au-
ri cum
Mercurio.

Xp̄o & Chimicis O. Non solum inter reliqua metalla, verum etiam inter omnia corpora inanimata nobilissimum & pretiosissimum, teste Pindaro in Olympiis Hymno: 1. Est autem aurum metallum splendore ac nitore amabile, ex æquali pondere argenti vivi purissimi & sulphuris rubri defecatissimi constans, in montium visceribus calore cum nativo tum alieno per multa secula generatum. Aurum cum argento vivo insignem habet *symphezica*, omnia siquidem metalla quamvis ponderosa, in argentum vivum imposita supernant: aurum verò etiam quantitate grani milii impositum statim mergitur, & argenti vivi colorem induit. Duplex, ut paulò antè diximus, reperitur aurum, nativum & per se in montibus generatum, gedygen Golt/ quod in Orientalibus partibus & montibus Arabia, item ex rivulis inde effluentibus, fluminibusque inter arenas creberrimè reperitur. Aliud verò aurum ex lapidea materia sive pyrite fusoria vel Chimica arte excocatur. Mirum est Græcos autores de facultatibus auri nullam fecisse mentionem; Arabes autem frequentissimè. In auro igne excoccto ac defæcato adeò nulla inest venenata qualitas, ut etiam ex eo, cum à veteribus tum recentioribus *Chimie Magistris*, omnium nobilissima & saluberrima conficiantur remedia, ac potissimum liquor, quem *aurum potabile* vocant, cui tantas tribuunt vires, ut si vera esset eorum prædicatione de auro potabili, & posset facile parari, vel levi pretio comparari, nulla alia in curandis morbis mortale genus egeret medi-

Sympha-
zica Au-
ri cum
Mercurio.

Aurum
duplex;
nativum
& excoc-
ctum.

Aurum
potabile
quibus

cina: ajunt enim auri potabilis virtute o-sceat
omnia morborum genera facillè curari, vitam viribus.
hominum ad multa secula produci; decrepitis juvenilem formam & robur restitui posse; & deploratos quosque morbos, quales sunt lepra, carcinomata, Apoplexia, Epilepsia, paralyssis, hydrops & podagra, eodem solo tolli. Verum cum ego tale quid nunquam fuerim expertus, nec audiverim quempiam propriâ experientiâ comprobasse; nisi quod eorum scripta hujusmodi de auro gloriationibus sint referta; atque cum hunc liquorem propter ejus caritatem & precii magnitudinem non nisi Imperatoribus, Regibus & opulentissimis Principibus usurpare liceat; & præterea cum præsentî anno 1577, Romanum Imperatorem Maximilianum Secundum, & Fredericum Electorem Palatinum, & paucos ante annos Ioachimum Secundum Marchionem Electorem, qui omnes Chimie artifices magnis impensis aluerunt, & auro potabili abundarunt, & tamen nec industria artificum, nec virtus auri potabilis eorum vel morbos tollere, vel senii molestias mitigare potuit; quid de eo & artificum prædicatione mihi certi polliceri queam, non video: Nolim tamen prorsus ex auro parata remedia damnare, sed tantum detestor impostorum impiam & fraudulentam temeritatem, qui plus promittunt, quàm præstare possunt. Quæ autem ratione aurum in liquorem potabilem resolvi debeat, & quæ cæteroquin remedia utilia ex auro artificiosè confici queant, in nostra Introchimia fidelissimè docebimus.

*Argentum quid, quæ ejus vires,**& venena.**Argen-*
tum.

Aγγυρον, Chimicis D, est metallum, puritate & nobilitate proximum auro, cujus vena sive materia, sicuti aliorum metallorum omnium, est sulphur impurum & incocctum, & argentum vivum paulò purius. Argentum, veluti & aurum, aliud duplex, est nativum, quod per materiam lapideam nonnunquam instar capillorum vel te-

larum araneorum spargitur, vel instar cujusdam stirpis aut animalis expanditur, visuque percipitur. Tale argentum nostrates *Gediciusilber* nominant. Aliud ex Pyrite seu materia lapidea coquitur, quod *factitium* dicitur. Materia verò argenti vario conspici-
tur colore, alia enim rubeum colorem carbunculi, gemmæ similem habet, quod *Podterg* nominatur; alia cinericeum seu plumbeum, quod *Graverh* & *Bleyfarb* / ac *Silbererz* nominatur. Nec argentum nativum nec *factitium* (nisi fortè Venere prægnans sit) per se venenata qualitate est imbutum, & parvum habet in arte Medica usum: Præterquam quod ex eo instrumenta quædam parentur, & utensilia vasa: sed potest ex argento venenatum quid Chimica arte confici, veluti est *caruleus color*, quem *Lafurinum* vocant, *Blawfarb* de quo paulo post.

Cuprum quid, quæ ejus Venena, & quæ inferant, symptomata; quibusque remediis iisdem succurrendum.

Χάλκω, æs sive cuprum, *Chimici* ♀, *Germ.* *Kupffer*. *Æris* vocabulum sæpe pro pecunia & aliis metallis indifferenter usurpatur, sed propriè pro eo metallo, quod vulgus cuprum appellat, sumitur. Ejus vena sive materia lapidea constat ex æquali ferè portione Sulphuris & argenti vivi, sed purissimi, & non satis in terræ visceribus cocti; unde sumpta occasione *artifices Chimia Chrysopoietica* improbi & semper egeni, se gloriantur cuprum facillimè in aurum purum & argentum transmutare posse, quod tamen nunquam præstant. Materia sive vena *cupri* generali vocabulo pyrites, nostri *Schifferstein* & *Kupffererz* vocitant, ex qua æs coctum, etiam defæcatissimum, retinet tamen venenatam qualitatem, quæ & esculenta & potulenta, præsertim quæ accento aut vino condiuntur, aut cærevisia, si in vasis cupreis aut coquantur, aut diutius servantur, venenato sapore & qualitate tinguntur, & intra corpus assumpta, nauseam, vomitiones, ariditatem linguæ, & erosiones ventriculi excitant.

Usus ejus in affectionibus capitis insignis.

Cuprum. Scilicet impostores, qui alienam paupertatem agnoscunt, quam propriam de gemitu alius judicium. Noxa ex cupro.

Curanda autem hæc sunt symptomata, evomitione ciborum aut potuum infectorum, assumpta prius *aqua tepida cum oleo olivarum*: Deinde & alvus acri clystere eluatur, ac postea *lac crebrò* potandum ægro exhibeatur. Antidota ejus sunt *3 ij Theriaca Androm.* aut *3 ij Boli Armeni cum haustu hydromellis* exhibetæ. Ex cupro aliæ quoque res medicamentosæ & venenosæ arte *Chymica* conficiuntur, ut sunt *Crocus seu flos* ♀, *squama aris, æs usum*, de quibus paulò post tractaturi sumus.

Aurichalcum quid, quæ ejus venena. Quæ, ejus remedia.

Οερχάλλω, q. d. montanum æs, *La-Aurichal-* tinis Aurichalcum, *Messinc* / non est cum; aliud quam cuprum, sive æs per crebram liquefactionem subinde admiscendo, *lapid. calaminarem*, & ita defacando purissimo colore aurum mentiens. Aurichalcum autem eandem in se retinet virulentiam, & cibis potionibusque avidis in eo coctis communitur, quam cuprum habere dicitur; & iisdem remediis, Symptomatibus ab aurichalco conceptis, succurrendum est, quibus & veneno.

Stannum quid, & quæ symptomata stanni veneno excitentur, quibusque curanda remediis.

Κατίπερ, stannum & plumbum al-
bum, *Chimici* Jupiter, nostratibus *Stinn*. *sen plumbum album.* Plumbi species duæ sunt, Plumbum album quod stannum est, & plumbum nigrum, quod propriè plumbum dicitur. Ejus pyrites seu rudimentum lapideum constat ex argento vivo perparum purificato, & sulphure impuro & nondum cocto, quæ stanni materia Græcis *μολυβδία*, Latigo. nis *plumbago* vel *Galena*, metallorum fossoribus verò *Lenz* oder *Stinerz* nominatur. Stannum defæcatum minus est venenum, quàm plumbum, ideoque ejus usus frequens est ad conficienda vasa utensilia propter argenteum nitorem. Intra corpus assumptum eadem quæ plumbum infert symptomata, & eisdem remediis curanda sunt.

sunt. De plumbo autem & ejus virulentia, & quæ venena ex eo parentur, paulò post differemus.

Ferrum. *Ferrum quid, & quæ ex eo venena.*

Chalybs. Σιδηρος, *Chimicis* Mars, ferri purior duriorque species, Latinis *Chalybs* nominatur. Vix ullius metalli in rebus & actionibus hominum major est & amplior usus & abusus quam ferri. Vena seu lapidea materia constat argento vivo. Ferrum excoctum per se venenatum non est; parantur tamen ex eo & medicamenta salutaria, præsertim ex scoria ferri; & medicamenta venenata, qualis est *Crocus Martis*, sive *flos ferri*, de quibus paulò post.

Plumbum nigrum. *Plumbum quid, & quæ ejus vires.*

Μολυβδος, *Chimicis* Saturnus. Duplex est, ut paulò ante diximus, species plumbi: album & nigrum. Plumbum nigrum, metallum est, ex multo impuro & terrestri argento vivo, & paucò impuro & rudi sulphure in visceribus montium concretum. Plumbi vena sive materia Græcis *μολυβδίνη*, lapis plumbarius, *Bleyerz* nominatur, qui vario conspicitur colore; alius enim cinericeus, alius luteus, alius ceruleus, pro diversitate lapidis, in quo hæret, tinctus. Ex plumbo venenatum fit plumbum ustum, quo figuli ad illinenda & vitreanda sua fictilia utuntur. Conficitur arte ex plumbo & cerussa Chirurgicum remedium, de quo paulò post.

Linimentum. Linimentum conficitur ad ferventes & inflammatos tumores, qui vel in tibiis ut in igne sacro; aut in pudendis, aut in ano, ut in hæmorrhoidibus cæcis; aut in mammis, mulieribus, exoriuntur; quod hac ratione parari potest: Formetur mortariolum & pistillum ex plumbo nigro, in quod infundatur liquor aliquis refrigerans, quales sunt aut oleum Rosarum, aut violarum, aut albumina ovorum, aut succus plantaginis, aut mucago ex seminibus Psyllii cum aq. rosacea, facta, pro arbitrio utentis, quæ cum pistillo

plumbeo tantisper agitur, donec liquor nigrescat, & instar unguenti trassitium consequatur, quod linteolis excipiat & locis inflammatis applicetur, statim enim dolorem sedat & ardorem omnem extinguit. Quibus autem mortariolum tale ad manus non est, hi liquores prædictos super lapidem cum globo vel massa plumbi tamdiu conterant, donec unguenti nigri formam consequantur.

Argentum vivum quid, quæ excitet symptoma & quæ eorum curatio. *Argentum vivum.*

Υδργυρος, Latinis à colore *argentum*, & à continuo motu, *vivum*, *Chimicis* Mercurius, *Quætsilber*. Inter omnia metalla solum *argentum vivum* per se liquidum & fluidum est. Duplex autem reperitur *argentum vivum*, unum nativum, quod & in montium cavernis spontè confluit, ex sua vena seu materia lapidea ob gravitatem suam prostillans. Alterum factivum, quod ex materia lapidea, quæ instar terræ fragilis, & ex nigro rube-scent, atque instar plumbi ponderosa est, per descensum destillatur ex uno fictili vase in aliud, igne superposito in patenti area, ne videlicet noxam ejus fumus inferat. Materia argenti vivi, Græcis *ἀργυρος*. Lat. vena Minii sive Cinabarii, *Quætsilbererz* vocatur. *Argentum vivum* tota sua substantiâ & extrema frigiditate venenum est: quanquam plurimi Medicorum illud contra sensum & rationis judicium extremè calidum esse contendunt; quorum sententia si de argento vivo, violentiâ ignis densato, vel in aliam speciem ducto, veluti est *Mercurius præcipitatus* & *sublimatus*, intelligatur, tum verissima est: non autem de crudo argento vivo. *Argentum itaque vivum intra corpus assumptum, & foris corpori inunctum, aut fumo ejus membra imbuta, semper pernitiem & gravissima infert symptomata.* *Nota.* Intra corpus assumptum, si stando assumatur, suo pondere & spherica figurâ paulò post ex ventriculo per meatus intestino-rum in anum delabitur, & inde è corpo-

re profuit, nec multum noxæ præterquam refrigeratioem viscerum infert. Inter cubandum autem assumptum, si in aliqua cavitate partium diutius hæreat, calorem nativum & spiritum vivificum extinguit, & pernitiem mortemque inferre potest; similiter si per poros cutis cum aliis tinguentis mixtum & inunctum, (quemadmodum tonsiores hujus temporis *scabiem*

Cura luis Gallicæ per inunctionem hydragry periculo- sa.

Gallicam curare consueverunt) vel si ex ejus fumo ac vapore venenato partes corporis imbuantur, frigidâ suâ qualitate sævissima infert symptomata, imprimis oris exulcerationem, dentium mobilitatem, ossis palati putrefactionem, nervorum contractionem & artuum tremorem, paralyfin, sæpè & Epilepsiam, Apoplexiam, & omnium sensuum debilitatem; quemadmodum videre est in iis, qui argento vivo sunt inuncti, & in aurifabris qui crebrò tractant argentum vivum. Sunt tamen viri doctissimi, qui argenti vivi in aceto probe eloti & per tenue corium expressi 3 j intra corpus ad lumbricos enecandos, & mulierculis difficultate partus laborantibus exhibere docent sine ulla noxâ; sed id tentandum erit erecto corpore, ut suo pondere per anum rursus descendere queat; & semper argentum vivum, non autem salivâ extinctum, quod intestinis adhærescit, adhibendum est.

Curatio ex assumpto Mercurio.

CURATIO symptomatum argenti vivi per imprudentiam intra corpus assumpti est valida corporis commotio, qua argentum vivum per meatus intestinorum & anum profluere queat. Si autem alius ex duris facibus sit obstructa, ita ut argentum vivum sponte effluere nequeat, *clyster ex hydromelle*, cui admixtum sit *sal, nitrum & hyera picra*, intestinis infundendum erit, aut, si ita necessitas exposulet, devoranda præbeatur *pili aurearum 3 j cum Trochisci Albantali gr. ʒv*. Expurgatò argento vivo, ut ejus venenatæ qualitatæ vestigium sopiatur, utile erit agrotanti exhibere *The-riaca Androm. 3 ij*. & ad sudandum cogere. Symptomata autem quæ ex fumo ar-

genti vivi in corpore concitata, sunt tremor membrorum, debilitas articulorum, & paralyfis; Curabuntur crebra sudoris profusione in balneo sicco sudorifico, cui insu-

Curatio ex fumo ejusdem.

tæ sunt herbæ facultatem habentes poros cutis aperiendi & nervos corroborandi, quales sunt *Salvia, Chamæpithis, Betonica, & Lavendula cum baccis Juniperi*. Confert quoque plurimum si æger *hausu-*

lum vini ebibat, in quo *folia & frondes Rorismarini, stæchados Arabica, & centaureum minus incolla sunt*. Symptomata

verò quæ ex inuncto argento vivo à perfidis tonsoribus, præsertim in curatione *Gal-*

Curatio ab inunctione ejusdem.

lici morbi, introducta sunt, aut Cinobrii

venenati fumigatione excitata, ut sunt capitis continui cruciatus, languor & imbecillitas artuum, sensoriorum omnium labefactatio, & insanabilia ulcera. Nullum

est præsentius ac salutarius remedium, quam methodica curatio nostra cum duabus nobilissimis radicibus *China & Sarmienti In-*

dicæ decoctis, quæ curatio earumque radicum præparatio & usurpandi ratio, in curatione morbi Gallici à nobis fideliter est

proposita. Porro paulò ante quidem diximus principia sive elementa metallorum juxta *Chimicos, qui se solos Philosophos esse*

gaudent, esse argentum vivum & sulphur, verum minimè putandum est eos de argen-

to vivo & sulphure, quæ in myropolis habentur, loqui; sed de materia simplicissima Sulphuris & Argenti vivi, quæ sunt purissima, & instar vaporis in montium cuniculis elewantur, lapidibusque adhærent, commiscèntur & conrescunt. Quemad-

modum nec nos ubi de elementis differimus, illa elementa quæ sensibus nostris sunt objecta intelligimus, sed simplicissima illa, quæ non sensu, sed ratione tantum in mixtis corporibus comprehenduntur, & potentia singulis Elementis insunt. Talis autem vapor, sive principium argenti vivi & sulphuris veri, duplex est, alius *siccus*, qui materia est sulphuris; alius *idus*, a quo simplicissima similis, ex quo argen-

tum vivum per decoctionem multorum secu-

seculorum in montibus generatur. Ex his duobus principiis tandem pro ratione & qualitate, puritate & impuritate lapidum, quibus adhærescunt & insinuantur, generantur tum pura, tum impura metalla.

Ex metallis, ac primum ex auro, qua fiant res venenatae, præparatione.

Aurum per accidens venenatum redditur.

Ex auro nulla fit venenata materia, est enim per se purissimum metallorum, nisi forte per accensum ex ignorantia *Chimistarum, aurum potabile* venenatum reddatur; quod *aurum potabile*. Professores *Chimiae* miris modis prædicant, & præferunt omnibus in univèrsum remediis in morborum difficultium curatione; atqui paucissimi sunt artifices, qui sine venenatis liquoribus aurum fluidum reddere queant, sed necesse habent, ut primum cum aqua forti in pulverem resolvant, & ita in liquorem redigant. Manet autem in ipso auri liquore semper venenata aqua fortis qualitas, quæ nisi debito modo ab aureo liquore in totum separatur, quod nunquam, aut rarissime fit, impossibile est aurum illud liquidum intra corpus sine noxa assumi posse. Proinde cavebunt ipsi Principes & opulentiores, (nam pauperes tuti sunt ab eo veneno) vel hujusmodi *Chimicorum* impostura ac veneficio. Nos auri potabilis conficiendi rationem in nostra *Iatrochimia* describemus.

facile est sine venenato liquore aurum liquidum dare.

Ex argento qua fiant res venenatae.

Ex argento duæ utilissimæ res præparatione conficiuntur; utraq; tamen intra corpus assumptæ, venenatae & perniciosæ habentur; de quibus singulis seorsim brevissime dicam.

Caruleus color quid, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Color Lasurinus.

Præparatur color amœnissimus, pictoribusque gratissimus cœruleus ex argento, qui *Græcis* non est descriptus: Pictores enim *Lasurinum* colorem, Latini *cœruleum*, nostri *Läsubrblaw* vocant, qui hac ratione paratur: Argentum malleo extenditur in bractæas sive laminas, quæ obliniuntur Linimento ex argento vivo factò,

& exiccatae laminæ in ollam vitreata aceto vini acerrimò semiplenam, in quo aceto antea resoluta sunt *Sal Armeniacum* & *Tartarus* in calcem redactus, suspenduntur, ita tamen ne argenti lamina acetum attingat, sed tantum in oblecta olla vapore ejus maceretur, idque ad dies 14. Deinde excipiuntur argenti laminæ, in quarum superficie hæret color *Lasurinus*, qui colligitur abraditurque à laminis, & rursus argento vivo inunguntur, ac in vapore acetum macerantur, donec lamina argenti in colorem dictum vertatur. Fit quoque Cæruleus sive *Lasurinus* color ex lapide *Lasuli*, de quo paulò infra dicturi sumus. Materia hujus *Lasurini* coloris cum propter argentum vivum, tum propter vaporem acetum medicati, & cum *sale Armeniaco* mixtis venenum est, & si per imprudentiam intra corpus assumatur, erodit ventriculum & intestina, & nervos debilitat, respirationisque difficultatem infert. In horum Symptomatum curatione prodest primò evomere materiam coloris præsumto haustulo aqua *Juniperi per descensum destillata*. Deinde assatim crebrò edendum offeratur recens *butyrum*; bibendum vero *Vinum optimum*, in quo coctæ sunt frondes *Rorismarini*. Antidoti loco utile est *Theriace Androm.* 3 ij. assumere, & cum ea sudorem provocare.

Damna ex colore Lasurino assumpto.

Cura.

Spuma argenti quid, qua inducat symptomata, & quibus remediis curanda.

Spuma argenti.

Lythargyrium, cum adjectione auri vel argenti, cum tamen una & eadem res sit, & non nisi splendore coloris albo vel rubeo distinguatur, nostrates *Silbergliedt* nominant. Est autem *spuma argenti* lapidea materia in excoctione, separatione & purificatione argenti, in fornacibus ex plumbo nigro & pyrite liquefacto, simul mixtis constata. In separatione enim argenti, ut commodius liquefiat materia, & fluidum magis reddatur argentum, plumbum nigrum ut plurimum admiscetur: Magnus usus est *spumæ argenti* in *Chirurgicis* curationibus, refrigerat enim, exsiccat & con-

Origo ejus.

Usus.

& consolidat, ideoque emplastris miscetur, & Emplastrum in myropolii Triapharmacum sive Brutenicum, Brunschuch ex oleo & pul. lythargyri ex aceto conficitur. Intra corpus assumptum lithargyrium venenum est, & hæc infert symptomata: calorem nativum & spiritum vitalem extinguit, sanguinem in venis & arteriis condensat, respirationem intercipit, & facultatem motricem artuum opprimit, ventriculi concoctionem tollit, & corpus totum livido colore tingit.

Noxa.

Curatio.

CURATIO horum symptomatum consistit primum in valida alvi subductione per acre Clyisma ex decocto Centauri min. pauxillo colocynthidis, cui admixtum sit ol. ruta, & hyera picra factum; Per vomitum enim argenti spuma propter ejus ponderositatem per superiora expelli nequit. Ideo eò crebrius clysteribus est utendum. Deinde confert butyrum recens crebro & affatim esitatum. Item ol. amygdalarum cum tepida Cerevisia subinde bibitum. Utilissimum quoque est sæpè gustare aquam lupperi per ascensum destillatam, quæ vim habet Vini sublimati. Antidotum Lythargyrii est Theriaca Androm. 3 ij. cum vino generoso, aut ol. myrrhæ, aut angelicæ ʒ j. aut ol. vitrioli ʒ ss. cum vino.

Ex cupro sive are quæ res venenata præparentur.

Æs sive cuprum, ut paulò ante diximus, per se est perniciosum venenum, & suam virulentam qualitatem cibis & potionibus communicat, quæ in cupreis vasis vel coquantur, vel conservantur diutius, præsertim quæ sunt acida. Tres autem venenatæ res, si intra corpus sumantur, ex ære parantur; quæ tamen extra corpus suas habent præclaras utilitates in arte Medica. Æs ustum, squama aris, & arugo, sive viride as, de quibus singulatim breviter dicemus.

Æs ustum quid, quæ inferat symptomata, & quibus remediis curanda.

Æs ustum.

Χάλυξ καρυμίνος, Æs ustum, Chemicis Crocus Veneris, nostratibus gebrandt Kupfer/ quod ita conficitur: Sumuntur lami-

næ sive bractææ cupri, & obliniuntur Linimento ex sale & aceto facto. Quæ ubi exsiccatæ sunt, in tegula aurificum concremantur, & candentes eximuntur, & in aceto acerrimo extinguuntur, iterum atque iterum Unguento præscripto illiniuntur, urunturque, ita tamen ne in igne cupri laminæ liquefiant, donec in pulverem redigi queant; qui pulvis in calida aqua crebro eluitur, ut omnem acrimoniam erodentem deponat, & tum utilissimus est, ad ulcera putrida persananda, expurgat enim ulcera, astringit & exsiccat, & ad cicatricem ducit. Intra corpus autem assumptum, ventriculum subvertit, concoctionem extinguit, & cruciatus intestino-

Confectio Croci Veneris.

Vsu.

Noxa.

Curatio.

CURATIO aris consistit in evomitione assumpto prius ol. anethi cum aq. calida commixto, ubi in intestina delapsus est æs ustum: acris quoque clyster est adhibendus ex ol. rosarum & decocto centaurei min. Vtilis quoque est butyri recentis & lactis esitatio. Antidotum aris usi est Terra Lemnia ʒ j. aut corall. rub. præparat ʒ j. cum aqua hordei assumpta. Prodest foris simum ventrem subinde inungere ol. Rosarum calid.

Antid.

Squama aris quid, quæ ejus symptomata, & quibus remediis succurrendum.

Λέπις χαλκῆς, Squamæ cupri seu aris, Squama Rupferschlag / oder Kesslbren nostratibus.

aris.

Sunt autem squamæ aris tenuissimæ laminæ ex superficie cupri igniti malleis percussæ ac discussæ. Paucissimi hoc tempore eo utuntur remedio, & non nisi eloto & probè præparato. Easdem habent cum ære usto facultates in sanandis ulceribus: & intra corpus assumptæ eadem inferunt symptomata, quæ æs ustum: ideoque iisdem remediis antidotisque curari possunt. Arugo quid, quæ inferat symptomata, & quibus succurrendum remediis.

Squama aris rursus parata præsens in lumbicis remedium.

Viride æs, Spangrün/ est materia viridis coloris, ex cupri laminis collecta, pictoribus & in re Medica usitata, quæ intra corpus assumpta perniciosum est venenum,

Viride as.

*Confectio
ejus.*

*Alius
modus.*

*Vfus in
Chirurgia.*

*Incommo-
da ab as-
sumptis.*

Curatio.

num, & hac ratione paratur; Laminæ cupri illiniuntur Unguento ex sale & aceto confecto, ac tandem in aërem suspenduntur, & illita materia altera die per superficiem cupri convertitur in viride æs, quod abraditur ac colligitur, laminæque rursus illiniuntur. Est & alia ratio parandi æruginem excellentissima: Fit unguentum crassiusculum ex melle, sale, aceto probe inter se mixtis, quod bracteis sive laminis cupri inungitur, & in ollam nondum coctam imponuntur, & in figulina fornace exuruntur, donec fictilia vasa sunt decocta: quæ materia nigricans excipitur, & sub dio collocatur; per noctem enim mutatur color niger in æruginem & colorem viridem venustissimum. Magnus est usus æruginis in curationibus Chirurgicis: Vlcera enim sordida egregie mundificat, orisque ac gingivæ ulcera persanat, superfluas crescentias carnis in ulceribus tollit. Ideo & Emplastro & Gargarismo commiscetur. Intra corpus assumpta ærugo perniciofa infert symptomata. Statim enim guttur constringit, & arterias pulmonum obstruit, vias respirationis intercipit, violenter suffocat, & extinguit. In ventriculo autem existens continuas excitat vomitiones.

CURATIO est ut epoto recenti butyro statim revomatur: & in intestina si descendit, neque clyster ex lacte caprillo & ol: Chamamelino negligendus erit, & subinde lac calidum ebibendum. Antidotum æruginis est, Terra Lemnia aut corall: rubr. preparat. aut pulv: Zedoaria ʒj. aut ol: Anisi ʒss. cum vino assumpti.

Ex Ferro qua fiant res
venenata.

Paulò ante dictum est ferri species duas esse, unam ex materia crudi ac rubri coloris, excoctum ferrum, Eysen: Altera species est ferrum purius ac durius, quod Græcis σίδηρος, Latinis Chalybs, Staal/ nominatur. Quatuor autem res utilissimæ in medicationibus ex ferro conficiuntur,

quæ si non ritè præparentur, aut in largiori copia quàm decet assumantur, venenatae sunt, & varia inferunt symptomata. Sunt autem, Squamma ferri, excrementum ferri, Ferrugo, & Chemicis crocus Martis, de quibus nunc singillatim.

Squamma ferri, quid, qua ejus præparandi ratio, qua vires, & qua inferat symptomata.

Αέτης σίδηρος, Squamma ferri, Hammer Schlag/ est ex superficie candentis ferri malleo decussa lamina, quæ probe præparata, saluberrima præstat remedia & extra & intra corpus. Squammæ autem ferri præparatio ejusmodi est: Accipiantur squamma ferri ʒiiij. quæ in aqua calida abluantur, & vola manuum confricentur, donec nihil sordium in eis remaneat, deinde & tegula aurifabrorum in ignem collocentur, & candentes in aceto vini acerrimo extinguantur, iterumque exiccantur, siccataque denuò ter quaterque iterum urantur & in aceto extinguantur: Postremo in tenuissimum pulverem redigantur, & in aceto vini q: s. in vitrea cucurbita per tres septimanas macerentur, probe obturata. Postea vitro in ferventem arenam collocato & aperto, acetum omne evaporari permittatur, ut pulvis pro usu conservetur. Alii pro Squamma ferri scobem sive limituram chalybis eadem ratione præparant, ex eo pulvere pillulæ præparantur, quæ nomen habent pillularum scobis ferri, quibus utimur in dissolutione ventriculi. Pulvis autem exhibetur commodissime in dysenteria, in muliebribus fluxionibus, & in æstuanti colluvie humorum, in ventriculo & lienis obstructio-
ferrum
crudum
aperit
magis ob
Salsis vi-
trioli
præsen-
tiam; cel-
eratur
stringit
ob ejus-
dem ab-
butyr, sentiam.
recentis

CVRANTVR hæc mala acrioribus clysteribus, & crebra potitatione lactis caprilli recentis, & crebra elicatione butyr,

recentis & pinguioris jusculi: Capitis autem dolorem sedat crebra inunctio cum oleo Rosarum & aqua Rosarum simul mixtis. Corporis ariditatem tollunt crebra balnea in aqua dulci, in qua malva & althæa cum radicibus sunt incocta. Pro antidoto opportunè exhiberi possunt pul: terræ Lemniæ ʒij, aut corall: rub: præpar ʒj. cum jusculo galli gallinacei.

Recrementum ferri quid, quas habeat in Medicina utilitates, & quas inferat noxas, quibusque curandum remediis.

Scoria
ferri.

Scoria seu Excrementum ferri, σιδῆρ, Germanicè Schlacken oder Sünderslein / est materia lapidea in massam foraminibus instar spongiæ plenam, concretæ, in fornacibus fabrorum ferrariorum, quæ ab ipsis ut plurimum extra projicitur. Intra corpus assumptum ferri recrementum paulò antè commemorata squammæ ferri infert symptomata, & iisdem remediis curanda. Extra corpus autem utimur ejus vapore in balneis, pro exsiccatione vitiosorum humorum inter cutem & carnem collectorum, sudorem ac pruritum excitantium. Propria experientia didici excrementorum ferri candentium vapore serpignes & Lichenas, die Flechten / facillimè curari posse: & quidem hac ratione; massæ scorix ferri quatuor aut quinque in igne candescere permittantur, & una ex his primum, deinde & secunda & tertia, ubi extinctæ sunt in ollam capacem imponantur, & manus aut pes, aut alia quævis pars super illam ita disponatur, ut ne pars affecta, à calore excrementorum offenda-
tur, tandem pars affecta in olla & alio quovis vase culcitra contegatur, ut ne quid à vapore exire queat, & alia manu spongiolam vino rubro plenam patiens habeat, & sensim vinum in candentia excrementa exprimendo instillet, ut vapor inde excitatus locum affectum feriat, & ita per horam integram aut paulò ulterius calido vapore, singulis diebus bis foveatur per octiduum: Omne enim virus Li-

Virus topi-
cum in li-
chenis.

chenis per sudorem prodit, ulcus exsiccatur, & solida sanitas succedit.

Ferrugo sive Rubigo ferri quid, qua ejus utilitates, & qua inferat symptomata.

Ῥῆσσις, Flos sive Rubigo ferri, Eysenrust. Rubiginis hac tempestate in arte Medica nullus est usus, & tamen si ex optimè purgato ferro acetoque perfuso, rubigo colligatur, & contrita intra corpus adhibeatur, profluvia muliebria sistit ac restringit; & ejusdem pulvis cum melle rosaceo mixtus instar Unguenti putredinem gingivarum & ulcerationem perlanat. Non ritè præparata eadem symptomata infert, quæ in squamma ferri sunt commemorata, & iisdem remediis curari possunt. *Crocus Martis quid, quomodo parandus, & quas habeat in re Medica utilitates.*

Αἷον σιδῆρ, flos ferri, Chemicis Crocus Martis nominatur, Eysenblumen Germanis dici potest. Est autem crocus Martis ferrum resolutum & in pulverem rubeum redactum: Inter res obscurissimas & hætenus ignotas, quas Paracelsus in lucem produxit, est quoque Crocus Martis præparatus, qui etiam multa impia & absurda scripsit, hic tamen merita laude non defraudandus. Ita autem conficiendus est: Accipiat Chalybs, & in laminas sive bractæas tenues extendatur, quæ candentes iterum atque iterum in forti aceto vini eo usque donec acetum rubeo colore affatim tingatur, extinguantur, subinde chalybem renovando, & in aceto novo extinguendo, donec sufficiens mensura tincti aceti habeatur. Deinde omne acetum simul in vitream cucurbitam imponatur, ac destilletur, abstracto aceto remanebit pulvis rubeus in fundo vitri, qui diligenter colligatur, exiccetur, & in tenuiorem pulverem redigatur, & pro croco Martis nobilissimo remedio conservetur. Hic enim flos ferri tutò intra corpus exhiberi potest. Fit & alia ratione Crocus Martis; Laminæ Chalybis crassiusculo Unguento ex Sulphure & Tartaro part.

Ferrugo.
Ejus usus
maximus
quidem
in cache-
xia seu
febre vir-
ginum, &
viscerum
obstruc-
tionibus
pertinaci-
bus.

Crocus
Martis.

Alia
Croci
Martis
prepa-
randi
modus.

part. equal: cum aceto vini factò oblinian-
tur, & in tegulam aurificum siccatae pon-
nuntur, ac in furno reverberatorio adu-
rantur; ac simul tandem in aceto extin-
guantur, & contrita cum aceto in fer-
venti arena acetum destillando subtraha-
tur, pulvisque in fundo vitri rubeus collig-
gatur. Fit quoque crocus Martis cum a-

Tertius
modus.

qua forti, sed is sine perniciē & vitæ pe-
riculo intra corpus sumi non potest. Habet
Crocus Martis in restrictione admi-
randas vires, & assumptus statim omnes
tum externas tum internas fluxiones sistit;
Idè confert sanguinis ex ulceribus eru-
ptioni, si inspergatur; hæmorrhoidum flu-
xiones, gonorrhæam, muliebria proflu-
via, mensium immoderatam fluxionem,
diarrhœam, dysenteriam, & urinæ in-
continentiam mirabiliter sistit, & contra-
ria virtute lienis obstructions aperit, &
præterea sordida & perpetuè manantia
ulcera inspersus exsiccat, & persanat.

Usus.

Dosis.

Dosis exhibendi croci Martis intra cor-
pus est à ℥j usque ad ℥j. Exhibetur au-
tem cum aliquo astringente liquore, ut
aq. plantaginis, succ: Citoniorum aut vino
rubenti. Foris verò & siccus inspergi,
vel cum aliquo liquore instar unguenti
mixtus, illiniri, aut Emplastris admisceri
potest.

Ex stanno quæ parentur res venenata.

Sal ejus
in uteri
affectibus
mirapra-
bat.

Stannum, ut paulò ante diximus, *Iovem*
vocant *Chimici*, sed ex eo nulla sit vene-
nata materia, nec eo in medicamentis uti-
mur. Et cum stannum nil sit aliud, quam
plumbum album, nunc de plumbo nobis
dicendum erit.

Ex Plumbo quæ fiant mate-
ria venenata.

Plumbum & *Chimici* & *Astrologi Satur-*

non qui-
dem ritè
parata,
& cum
ratione
exhibita
venenata
sunt
plumbea, sed sæpè anrea sunt.

no consecrarunt, ex quo arte *Chimicà* uti-
lissima remedia & extra corpus adhibenda
parantur; quæ si intra corpus assumantur,
venena sunt. Ejus autem generis sunt plum-
bumustum, cerussa alba, minimum, ocre, de
quibus ordine sigillatim differemus.

Plumbumustum quid, quæ inferat sympto-
mata, & quibus remediis curanda.

Μόλυβδος κενερόν nil est aliud
quàm plumbum adurendo conversum in
cinerem. Fit autem *plumbumustum*, si ejus
laminæ in crudo fictili positæ, & in figuli-
nam fornacem collocatæ adurantur, do-
nec vasa fictilia exactè sunt cocta. Ejus in
Medicinis hodie nullus est usus; si ta-
men abluatur, & in sordida ulcera insper-
gatur, ea astringit & exsiccat. Figuli
utuntur ad obliniēda sive vitreanda sua
fictilia. Si plumbumustum per impru-
dentiam intra corpus sumatur, infert
symptomata lithargyrii; videlicet suffoca-
tionem, & iisdem remediis curantur: idè
ex lithargyrii symptomatibus remedia
sunt petenda. Ejus tamen antidotum est
*Theriaca Androm: ℥ij. cum vino gene-
roso.*

Cerussa quid, quomodo paranda, quæ ejus
vires, quæ inferat symptomata, & qui-
bus remediis curanda.

Cerussa foris applicata refrigerat, exci-
cat, & poros obstruit; ideo unguentis &
emplastris Chirurgicis admiscetur, & picto-
ribus familiaris est. Fit autem Cerussa ex
laminis plumbi super vaporem & exha-
lationem aceti acerrimi in olla ampla vi-
treata positis, ita ut acetum minimè attin-
gat, sed tantum à vapore aceti subinde
feriatur; olla verò cooperienda est ea la-
mina, ne ejus vapor exhalet, & depo-
nenda est in calidum cinerem, post 14.
dies adhærebit laminis à vapore aceti
candidissima materia, quæ leporino pede
detergatur ac colligatur. Laminæ autem
rursus vaporis aceti imponantur, donec
sufficiens quantitas Cerussæ sit colle-
cta. Intra corpus assumpta cerussa hæc
infert symptomata, singultum, faucium
& linguæ ariditatem, anhelitus diffi-
cultatem, præcordiorum tumorem, stran-
gulationem, artuum frigiditatem, to-
tius corporis torporem, mentis commo-
tionem.

CVRATIO tentanda est valida evo-
mitione

mitione & acribus clysteris, assumpta prius aqua calida, in qua ficus & malva radices sunt incocta, & ol. irinum sit admixtum; clysteri admisceantur scammonieata remedia; quale est Diaphanicon & ol: Costinum cum decocto Centaur. min: & card. Bened. Deinde offeratur lac potandum recens multum. Antidotum cerusæ erit ol. angelicæ 3 ℥. aut ol: Vitrioli gut. viij. & Theriaca Androm: 3 ij. cum vino generoso.

Minium. Minium ex Plumbo quid, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Minium ex plumbo est color rubeus ex plumbo usto confectus, Pictoribus familiaris, quem nostras Mennige vocant. Differt plurimum à veterum Minio, quod minerale est è montibus erutum, ex quo argentum vivum paratur; sed nobis hodie ignotum. Falluntur meo iudicio qui in Bucolicis Virgilii, ubi canit: Sponte sua sandix pascentes vestiet agnos: Sandicem pro minio usitato interpretantur; nunquam enim quispiam vel vellera, vel lanas ovium extinguere vidit: Ideo Sandicem aut flores, aut radices cuiusdam herbæ tempore Virgilii sic vocatæ, quales sunt radices rubee tinctorum, quibus pannifices purpureo colore suos pannos tingunt, esse crediderim. Minium nostrum ex plumbo cum sale calcinato aut ex cerussa adusta fit, quod in olla in validum ignem collocatur, & continua agitatione cum ferro bacillo uritur, donec rubeum assequatur colorem. Minium imprudenter intra corpus assumptum, eadem infert symptomata, quæ lithargyrium, aut cerusa, & iisdem remediis curantur; quæ ex superioribus peti debent. Peculiariter autem veneno minii adversatur tempestiva vomitio ex decocto sem: rapæ & butyro recenti confecto, aut ol. anethino & clystere ex decocto rad. malvæ & gran. Iuniperi cum oleo anethi confectum. Antidoti loco exhiberi possunt Theriaca Androm. 3 ij vel ol: Vitrioli 3 ℥. aut corall: rub: præparat: 3 j.

Locus Virgilii explicatur.

Minii tinctura cum aceto facta præsentem fert opem excre-scentiis gingivatum.

Minium Luteum ex plumbo usto quid, qua inferat symptomata, & quibus remediis curanda.

Minium flavum, Pictoribus nostris Bleiygelb nominatur. Fit autem ex plumbo in cinerem converso simili ratione, ut minium rubeum, sed paulò languidiori igne torretur in olla subinde agitando: donec flavum seu luteum consequatur colorem. Nam si ulterius & violentius uratur; Minii rubei colorem imbit. Assumptum, eadem quæ minium vel lithargyrium, infert symptomata, & iisdem remediis curatio est tentanda.

Ex Argento vivo per præparationem qua conficiantur venenata Pharmaca?

Argentum vivum, id est *Argentum vivum*, & Græcis, ab aqua & argento nomen habet: Colore enim argentum imitatur, & consistentia instar aquæ fluidum est, & non nisi in alienis terminis contineri potest: Quemadmodum & aqua, & quælibet ejus minima particula instar aquæ, sphaerica est & rotunda. Ideò quidam Chemicorum argentum vivum aquam siccam vocitant. Parantur ex argento vivo arte Chimica & utilissimæ & longè perniciosæ res, ex quibus tres sunt præcipuæ: argentum vivum sublimatum, argentum vivum præcipitatum vel Mercurius; & Cinnabrium; de quibus sigillatim nunc tractabimus.

Aqua Chemicorum sicca.

Argentum vivum sublimatum, sive Mercurius sublimatus quid; qua ejus symptomata, & quomodo eorum curatio tentanda.

Mercurius Sublimatus.

Argentum vivum sublimatum sursum delatum sive exaltatum, Chemicis Mercurius Sublimatus, Nottekrudt / & nihil est aliud, quàm argentum vivum, violentia ignis in vitrea cucurbita in sublime coactum, fixum & condensatum, quod hac ratione paratur: Argentum vivum cum sale in lapideo mortario diu multumque subigitur, subinde sale sordido & nigrescente permutato. Tandem ita purgatum argentum vivum sursum cum aliqua parte

Confectio ejus.

parte salis & Calchantis sive Vitrioli permiscetur, & in vitream cucurbitam luto Chimico incrustam imponitur, ejusque vitri osculum galea sive capitello vitreo rostro carente, quod Chimici *cucurbitum alembicum* vocant, imponitur, & clauditur, eaque in furno ascensorio inter candelas prunas collocatur, & valido igne urgetur, donec omne argentum vivum in sublime elevetur, in capitellum sive galeam deferatur, ejusque parieti instar crystalli niveique candoris adhæreat, atque condensatum accrescat. Hic *sublimatus Mercurius* causticæ & instar ignis adurentis est naturæ, adeo ut suo contactu, sive foris applicetur corpori; sive intra corpus sumatur, non tantum partes omnes usque ad ossa adurat, corrumpat, & putrefaciat, sed & ferro cum aliquo liquore illitus, ipsum erodat & absummat. Est itaque argentum vivum sublimatum omnium rerum venenatarum penetrantissimum, perniciosissimum & immedicabile: habet tamen & ipsum suam in Chirurgia utilitatem. Nam si ejus quantitate nucis avellanæ in aq. Rosarum ꝑj vel plantaginis, in qua semina Psylli sunt macerata, resolvatur, & foris serpigini, lichenibus & pustulis ex Gallica lue ortis, illiniatur, eas exsiccando, & pruriginem tollendo, faciliè persanat. Intra corpus autem vel tantillum ejus assumptum, statim ventriculi & intestinorum tunicas erodit, & corrumpit, inflammationem intumescientiamque linguæ & faucium infert, ac paulo post cruoris per alvum effusionem; post miseram mortem inducit. Hujus venenatæ rei symptomata immedicabilia ferè sunt, nisi post assumptionem (antequam materia veneni membranas penetravit) ejus substantia evomatur, hausto ol. rosarum, ac deinde ejus virulenta erosio lactis caprilli potione, in quo semina psylli sunt macerata, & multa butyri recentis effusione frænatur.

Natura Sublimati: Sublimatus toxicorum potentissimus. Usus in Chirurgia.

Curatio ab usu Sublimati.

Mercurius præcipitatus, quid, quomodo præparandus; quæ ejus vires; quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Argentum vivum, sive Mercurius præcipitatus, est pulvis crocei coloris ex argento vivo per aquam fortem mortificato, ac tandem calcinato confectus. Hujus pulveris sive Mercurii præcipitati usus introductus est longe ante tempora Paracelsi, circa annum Christi 1494. cum primum lues Gallica inter homines sævire cœpisset; tum enim ad ejus mali sævitiam proficugandam, quod novus esset morbus, nullum extabat remedium, excepto argento vivo, quod inunctionibus miscebatur, & in pulverem forti aqua redactum intra corpus exhibebatur; ejus venenata qualitate plurimi in discrimen vitæ, & ipsa morte acerbiora symptomata, præcipitabantur. Verum postea tandem, indu-

*striâ Medicorum, & alia magis salutaria remedia inventa fuere; & circa annum Incarnationis Dei 1532, commodior ratio Præparandi & præcipitandi Mercurii à Paracelso est inventa, qui etsi impius magus, & affectata obscuritatis homo fuerit, tamen constat ipsum in arte Chimica præstantissimum fuisse artificem, Possunt itaque ex ejus obscuritatibus quædam præclara remedia granis auri similia ex stercore colligi, si quis attentius ejus legat & observet scripta, & se in præparationibus Chimicis studiosè exerceat. Pulverem autem hunc præcipitatum Paracelsus ipse, ut hominibus celaret, suo modo ignoto vocabulo *Thurpetum minerale* nominavit, quem hac ratione parare docuit: Accipiat argentum vivi pro arbitrio q. s. quod ab omni sorde studiosè purgetur, cum sale communi, diu multumque in lapideo mortario subigendo & conterendo, sale impuro & nigricante subinde cum recenti ac puro permutando. Postea affusa aqua calida pluries colluatur, huic puro argento vivo singulis ejus ꝑj auri puri, aut foliorum ꝑj. admisceatur, & in vitream cucurbitam imponatur, superindaturque aqua fortis*

*Aurum
hoc si non
agros, ta-
men pra-
paranti
prodest.*

quantum sufficit, & in tepido loco collo-
cata cucurbita, simul macerentur, do-
nec argentum vivum omne in liquorem sit
resolutum. Tandem vitrea cucurbita ga-
lea rostrata vitrea imponatur, & aqua for-
tis omnis in ferventi arena destillando sub-
trahatur, & argentum vivum una cum
auro in tegula aurificum imponatur, & in
patenti loco inter prunas candentes collo-
cetur, tegula argentum vivum baculo fer-
reo continuè agitando ac calcinando; do-
nec in croceum convertatur Pulverem.
Postea idem pulvis iterum in vitream cu-
curbitam imponatur, denuò aq. fortis
affundatur, ac per noctem maceretur,
denuoque destillando aq. fortis subtraha-
tur, & adhuc tepido existente argento vi-
vo, in pateram vitream aqua frigida ple-
nam infundatur: Ita aurum subsidebit in
fundo pateræ; quod à reliqua massa ar-
genti vivi separetur, ac singula tam au-
rum quàm argentum vivum seorsim ite-
rum denuò calcinentur in tegula aurificum,
& pulvis rubens in cucurbitam novam in-
datur, & q. f. fortissimi vini sublimati sive
spiritus vini affundatur, & per noctem
maceretur, deinde destillando subtraha-
tur, pulvisque tam auri quàm argenti in
tegula denuò calcinetur; hæcque calcina-
tio & maceratio novies ad minimum reite-
retur: ea enim ratione cum ex auro, tam
ex Mercurio præcipitato per vinum sublima-
tum, omnis venenata qualitas extrahitur.
Postremò pulvis Mercurii præcipitatus cro-
cei coloris reservetur in usum, qui, ut dixi-
mus, Paracelso *Turbith minerale* vocatur;
aurum similiter seorsim conservetur, quod
Paracelsus *aurum* vocat *diaphoreticum*; do-
sis exhibendi utriusque est à gr. iij. ad ʒj.
Exhibentur autem commixta *pulpa cassia*
ʒj, aut ʒj *conserva rosarum*: Aurum dia-
phoreticum per sudorem, Mercurius au-
tem præcipitatus per supernam & infernam
evacuationem satis violentam; omnes pu-
tridos humores venenatamque colluviem
extirpat. Nobilissima est medicina in cu-
rationibus deploratorum morborum, ve-

*Vires &
laudes.*

luti sunt, lepra, Morbus Gallicus, con-
tinuus capitis dolor, epilepsia, cachexia,
Phagedenici tumores, ulcera sordida,
& omnis generis vulnera. Cavendum
tamen est Medico, ne viribus resolu-
tis hisce remediis; utatur, sed viribus
consistentibus, & in corporibus robustis.
Pulvis præcipitatus si non satis probe sit
præparatus, aut non iusta mensura exhi-
beat, symptomata infert argenti vivi;
potissimum autem putridæ salivæ ex ore
continuum effluxionem, & dentium va-
cillationem, membrorumque tremorem.

Cantela.

*Noxa
Hæc symptomata curari possunt decocto
rad. China aut Sarmenti Indici, cujus præ-
Curatio
parandi & utendi rationem ex curatione sympto-
matis.*

*Aqua fortis quid, qua parandi ratio, qua
inferat symptomata, & quomodo
curanda.*

*Aqua
fortis.*

*Idem sicut, Aqua fortis & violenta, quæ
à Chimicis aqua regia sive regalis, & aqua regia sic
separationis, nostris Scheidewasser inde
nominatur, quod per eam impura à puris
separentur, adeò violenta est, ut omne
metallum in eam coniectum in liquorem
resolvat; ideo Chimici sua remedia, me-
diante aqua forti & calcinatione præparant.
Parantur autem aqua fortis hac ratione: Ac-
cipiantur Calchanis vel Vitrioli in olla nova
cremati sive calcinati aluminis & salis nitri
non calcinati, omnium partibus equalibus,
ut ad minimum lb ij, quæ simul pulveri-
fata in vitream cucurbitam, aut densum
fictile cucurbitæ forma, cujus collum non-
nihil intortum sit, quod luto Chimico
probe incrustetur, in quod imponentur
pulveres, & in furnum reverberatorium
vocaturn transversim collocetur. Opor-
tet autem cucurbitæ dimidiam partem va-
cuam relinquere, ejus autem orificia ex-
trà fornacem prominenti capacissimum
vitrum*

*Præpara-
tio ejus.*

vitrum subijciatur, & luto Chimico am-
borum orificia conglutinentur, deinde
subijciatur initio lentus ignis; ipsum ma-
gis magisque augendo, eousque donec vi-
trum recipiens instar flammæ candescat,
semper ignem continuando, donec vas vel
vitrum recipiens per se iterum inclarescat,
perspicuumque reddatur, tandem subdu-
cto paulatim igne, & furnus & vasa destil-
latoria per se sensim refrigerari permittan-
tur, & ex recipiente, liquor omnis seu
aqua fortis in aliam vitream cucurbitam in-
fundatur, ac probe luto Chimico obturetur,
obligneturque; & ad usum reservetur. Hac
aqua forti, varia preparari possunt ex me-
tallis remedia, quæ sanè intra corpus non
temere sunt exhibenda, nisi prius per cre-
bras calcinationes & ablutiones omnis
venenata qualitas ab eis sit abstracta &
separata. Quemadmodum de Mercurio
præcipitato fieri docuimus. Si quis enim
non exactè à veneno separatum remedium
Chimicum, sive sit ex auro, sive ex ar-
gento, sive ex Mercurio, aut aquam for-
tem per se exhibuerit, infert corporibus
perniciosa & immedicabilia symptomata,
quæ de Mercurio sublimate commemorata
sunt. Statim enim violenta sua penetran-
di vi instar ignis, ventriculi, intestino-
rum, fauciumque & linguæ tunicas erodit,
corrumpit & putrefacit. Si quis curatio-
nem tentare voluerit, per ea remedia cura-
ri potest, quæ de Mercurio sublimate pro-
posuimus. Prædicta tamen remedia, &
ipsa quoque aqua fortis in externarum par-
tium vitis curandis, suum habent usum,
quem nos in nostra Iatrochimia docebi-
mus.

*Cinabrium quid, quæ ratione conficiatur,
quæ inferat symptomata, & quibus
curanda remediis.*

Cinabaris. Cinabaris, officinis Cinabrium. Lon-
gè autem diversa res est Cinabaris veterum,
quod fossile & nativum est, & nemini hoc
tempore notum. Nostrum verò Cina-
brium factitium est. Sunt tamen inter eru-
natis se ditos, qui arbitrantur Cinabrium vete-
aperit.

rum esse rubicundissimum succum, qui in
myropoliis sanguis Draconis nominatur. ^{Error}
Quam verò rectè, viderint ipsi. Cina- ^{gnorun-}
brium autem, usitatum hoc seculo & Me- ^{dam Pra-}
dicis & Pictoribus, hac ratione confici- ^{paratio}
tur: Argentum vivum mortificatur pri- ^{ejus.}
mo, sive dissolvitur in vitro cum aqua for-
ti, aut resolvitur etiam sine aqua forti
violentiâ ignis, addito Sulphuris & Salis
paribus aequalibus. Ex quibus calcinatis
niger pulvis producitur. Qui si cucurbitæ
vitrea imponatur, & huic galea sine rostro
vel aliud vitrum superponatur, & luto
Chimico conglutinetur, validoque igne
sublimetur in superius vitrum, sive cacum
alembicum, materia cinabarii & instar la-
pidis hæmatitis adhærescit & condensatur;
fitque cinobrium factivum, & Pictoribus
& Chirurgicis Medicis utile remedium.
Utuntur autem ejus suffitu in curandis ul-
ceribus certarum partium ex lue Gallica
contractis. Et si enim fumus acerbissimos
dolores partium sedat, atque ulcera con-
solidat, tamen deinde longè acerbiora
infert symptomata, quemadmodum de
argento vivo diximus. Utendi autem ejus
ratio hæc est: R. Cinabaris ℥i. Thuris, li-
gni aloës, myrrha, Ladani ana ℥ij. Baci. Lau-
ri ℥ss. Ex quibus omnibus pulverisatis
formentur pastilli, quorum unus & alter
injiciatur carbonibus ignitis in vase sive
dolio, in quo partes ulceratæ sunt collo-
catæ & probe contextæ, & eo usque fumo
horum macerentur donec probe sudare in-
cipiant.

*Mineralia quid sint, & quæ ex eis præ-
cipue venenata.*

Haftenus docuimus de Metallis, & ex
eis arte paratis venenatis rebus; nunc de
mineris sive mineralibus primariis, & ex
illis provenientibus venenatis rebus, di-
cendum est. Exceptis septem metallis, omnia
quæ ex visceribus terræ eruantur, inter mi-
neralia numerari debent; quæ juxta Chi-
micos ex iisdem principiis, Sals videlicet,
Sulphure & Mercurio, atque ex spiritibus Quatuor
in illis contentis generantur, quæ sanè 4
prin-

*Usus ex-
ternus.*

cum Chimicorum principia conveniunt.

Differentia inter metalla & mineralia.

principia, si *Chimici* non præstigiis ludent, juxta veterum *Philosophorum* sententiam, nihil aliud sunt quam 4. Elementa. *Sulphur* enim, quid aliud est quam ignis; & *Mercurius* quid aliud quam aqua; *Sal* autem terrestrior pars est omnium rerum; & *spiritus* aëri respondet. Mineralia itaque omnia ex *Sulphure* & argento vivo, sed impurissimis, neque probè mixtis, & à natura non satis concoctis, constant: Differunt à metallis, quod metalla in igne liquefunt, & malleorum percussione ductibilia sunt: Mineralia verò etiam si in igne liquefiant, tamen rursus concreta, non, ut metalla, condensantur, sed friabilia sunt, & ictu malleorum non possunt extendi, sed in pulverem rediguntur. Sunt autem præcipua mineralium genera, & ex eis parata Pharmaca, quæ intra corpus sumpta noxam inferre solent, hæc sequentia:

<i>Sulphur.</i>	<i>Sal Ammoniacum.</i>
<i>Arsenicum.</i>	<i>Antimonium.</i>
<i>Nitrum.</i>	<i>Gypsum.</i>
<i>Vitriolum.</i>	<i>Borax.</i>
<i>Auripigmentum.</i>	

Calx atque *vitrum*. Quibus nos ex terra venenatos halius annumeramus. De iis itaque singulatim necessaria tantum proponemus.

Sulphur quid, quæ ex eo parentur remedia, & quas noxas conferant, quibusque remediis curanda.

Sulphur Chimicis duplex. Principium & Principiatum.

Sulphuris vocabulum *Chimici* bifariam usurpant, primò pro materiâ primâ, ex cuius purissima portione cum argento vivo puro in visceribus terræ juxta & à natura per multas ætates concocta aurum generari tradunt. Ex ejus autem impuriore parte cum impuro argento vivo inæqualiterque commixta & non satis decocta, reliqua impura metalla & mineralia conficiari opinantur. Hoc verò sulphur nihil aliud esse ajunt, quam vaporem in visceribus montium excitatum, & in poris venisque terræ concretum, de quo hoc loco

non disputamus. Secundo usurpatur *Sulphuris* vocabulum pro fœtido illo *Sulphure*, quo & Medici & Chimici creberrimè utuntur, & sua parant Pharmaca; cuius fœtidi *Sulphuris* tres species, seu potius partes in Myropoliis prostant: *Sulphur nativum* sive vivum, & non est aliud quam minera *Sulphuris*, *Sulphur coctum* sive decoctum Citrini coloris, quod ex superiori arte excoctum est; & *Sulphur caballinum* sive nigrum, quod non est aliud quàm *Sulphuris* vivi, inter excoquendum *Sulphur* Citrinum, excrementum. Multas præclaras vires & Medicas facultates *Dioscorides* & *Galenus* *Sulphuri* attribuunt, & intra extraque corpus applicare docent. Et *Dioscorides* quidem dicit, *Sulphur* impensius calefacere & exsiccare, prodesseque tussientibus & difficultate respirationis laborantibus cum vino intra corpus sumptum: Foris autem persanare lepras, scabies & pruritus cutis, conferreque *Scorpionum* ictibus, & erumpentes sudores prohibere; atque suffitum ejus in aurem demissum, gravitatem auditus tollere. *Galenus* adjicit, se experientia comperisse, *Sulphur* venenatorum animalium moribus & punctationibus salutare esse remedium, si ejus pulvis cum saliva jejuna in unguenti formam redactus, aut cum urina maceratus, vulnusculis illiniatur infriceturque. Verum *Sulphur*, ut experientia docet, nisi probè arte *Chimica* præparetur, & etiam præparatum cum judicio intra corpus exhibeatur, facile noxam infert. Et vidimus nos hac tempestate, sententia *Dioscoridis* perperam intellecta, quosdam *Chimicos* pro *Sulphuris* & ol. *Sulphuris* phthificis vehementer tussientibus exhibuisse, eosque brevi tempore interemisse. *Dioscorides* enim de tussi & difficili respiratione loquitur, quæ ex frigida coluvie pulmones obstruente originem habet, & non phthysicorum tussi, qui una cum phthysi semper afficiantur hectica febre; *Physicis* itaque florem aut ol. exhibere, est

Tres Sulphuris species. Sulphur nativum, Coctum, Nigrum.

Vires Sulphuris.

Usus externus.

Intemperantia Sulphuris us. Sui nociva.

Quibus tussientibus Sulphur proprium.

ignem

ignem igni addere. Caute itaque & summa cum prudentia. & non nisi recte præparatum sulphur debet intra corpus administrari. Fiunt autem arte Chimica ex Sulphure tria remedium genera, *aqua sulph. flos Sulphuris & ol. Sulphuris.*

Aqua & flos Sulphuris quomodo paranda, & qua eorum utilitates.

Excorti Sulphuris citrini & arte excocti potissima in arte medica usurpatio; quod tamen citra præparationem & purificationem intra corpus tuto exhiberi nequit. Præparatio autem ejus fit per calcinationem & ablationem. Et aqua quidem ex Sulphure materia siccissima exigua elici potest. Idem pulvisculi sulphuris præparati crebrior est usus quam vel aquæ & olei ejus. Aqua autem & flores una operatione confici possunt. Accipiat itaque sulphuris Citrini, puri & in tenuissimum pulverem redacti pro arbitrio q. s. Imponaturque in vitream cucurbitam luto Chimico, quod *lutum sapientia* vocant, oblitam, cui galea rostrata imponatur, & in ferventi

Sicut utilisima aqua illa stillantia est in lumbis. arena furni ascensorii valido igne urgeatur; & in initio quidem profluet aquosus liquor, qui etsi exiguus sit, tamen in vitro recipiente colligendus erit & reservandus. Est enim utile remedium ad *αχῶπες*, i. e. ulcera madentia puerorum eo confricata, & ad quamlibet scabiem, cutisque pruritus. Morsus quoque & ictus venenatorum animantium illitus per sanat.

Aq. Usus. Tandem remoto vitro recipiente cum aq. Sulphuris obstruatur rostrum galeæ luto Chimico, ne quid vaporis exire queat, vel refrigeratorio vitro galea cæca imponatur; & validiori igne sublimetur Sulphur. Ascendit enim ex Sulphure vapor

Flos quomodo parandus. siccus, qui parietibus galeæ instar fuliginis adhæret; & condensatur in materiam citrini vel aurei coloris, quæ flos dicitur Sulphuris, vel sulphur *sublimatum* vocatur: Talis autem sublimatio sive destillatio *fl. sulphuris* ter quaterve repeti debet; eo enim redditur purior ac præstantior. Ut autem ejusmodi sublimatum

Sulphur omnem fetorem deponat; in pulverem redigendum, in vitrum novum reponendum, & in q. s. *vini destillati* sive ardentis, aut in aq. *juniperi per ascensum destillata* in loco tepido per triduum macerentur, ac rursus in arena destillandum, liquor omnis à flore subtrahendus, idque ter vel quater repetatur, ac postremo flos sulphuris tenuissimè pulverisandus, & in vitro ad usum conservandus. Vtilissimus autem est in arte Medica hic flos sulphuris ad colluviem pituitosam exiccandam & extenuandam in thorace collectam, & ex ea generatam tussim. Vlcera quoque in thorace excitata sanat, atque crassos vapores pulmonum arterias obstruentes, & difficultatem respirationis inducentes discutit & exiccat. Foris autem venenatorum ictuum ulcuscula per sanat, & unguentis ad scabiem commodissimè misceri potest. Dosis ejus intra corpus est à ʒj. ad ʒj. Cavendum tamen ne tabescens & marcore affectis, aut febre hectica laborantibus intra corpus exhibeatur.

Oleum ex Sulphure, qua ratione paratur, & qua ejus utilitas.

Oleum Sulphuris.

Chimici variis modis præparant *Ol. Sulphuris*, quorum nos tres tantum breviter subjiciemus. Primus est: Flos sulphuris præscripta ratione confectus, & ter quaterve sublimatus, si in pulverem redigatur, & in vesicam bovillam imponatur, & in tepida aqua sive balneo Mariæ per octiduum maceretur, sua sponte in pinguem liquorem resolvitur, qui *ol. Sulphuris* merito vocari potest: Et eisdem habet vires & utilitates, quas de flor. Sulphuris recensuimus. Dosis ejus est à ʒj. ad ʒj. *Secundus.* cum vino aut aqua *hyssopi*. Secundus modus est: Accipiat Sulphuris citrini puri & tenuissimè pulverisati q. s. cui tantum *ol. olivarum* admisceatur, ut inter se mixta pulvis formam acquirant, quæ deinde in cucurbitulam vitream conjiciantur, & imposita rostratâ galeâ in ferventi arena destillantur, & *ol. per destillationem*

Usus & vires.

Dosis.

Cautio.

extractum ad usum conservetur. Utile ad scabiei genera omnia & cum aq. plantaginis mixtum linteolisque duplicatis exceptum, & ulceribus sordidis impositum, ea præclare abstergit & per sanat. Intra corpus verò minimè exhibetur. Tertius modus ita habet; Accipiant pulveris Citrini \mathfrak{z} vj. & vitreæ cucurbitæ imponantur, eisdemque affundatur aqua fortis ea mensura ut supra, sulphur 4. digitorum latitudine superet, & innatet cum aqua; Sulphur probè commisceatur macereturque per diem & noctem sæpe commiscendo & agitando. Tandem destillentur in ferventi arena donec omnis aqua fortis à sulphure subtrahatur, subtractaque aqua rursus in ipsum sulphur in fundo vitri relictum affundatur, & denuo maceretur ac destilletur priori modo, idque ter quaterque reiteretur. Postremò calx sulphuris eximatur, pulverisata in vitream patellam reponatur, & in humido loco collocetur, ubi sensim in ol. resolvatur. Hoc oleum sulphuris tanquam perniciosum venenum, intra corpus minimè exhibendum erit. Utilitates ramen ejus sunt, si foris linteolis exceptum imponatur, verrucas tollit, hæmorrhoidum fluores compescit; Ficus, i. e. tumores in anu genitos per sanat, carnem in vulneribus succrescentem extirpat, & suo confictu dentes reddit candidos. Sulphur porrò non præparatum, aut ultra justam mensuram intra totum corpus sumptum, sua extrema siccitate epar & ventriculorum torrefacit, linguæ ariditatem infert, ac postremò totum corpus in marcorem conjicit.

Usus secundus.

Tertius.

Usus externus in verrucis & hæmorrhoidibus.

Noxa ab sinistro usu.

Curatio.

CURATIO horum symptomatum est continua sulphuris evomitio, oleo prius violaceo cum aqua tepida mixto assumpto, & crebra potitatio Syrupi de succo granatorum, aut citrorum acidorum cum aqua plantaginis mixti. Utile quoque est cremorem psisana hordeacea & lac acidum crebrò gustare. Antidotum Sulphuris est \mathfrak{z} j Crysalis præparati cum lacte exhibita,

aut \mathfrak{z} ij Lemnia terra, aut \mathfrak{z} s. mucag. sem. Citoniorum cum aq. rosarum facta.

Antimonium quid, & qua ex eo eliciantur remedia.

Stibium, Chemicis & Officinis Antimonium, Germanicè *Spiesglas*, est mineræ plumbi & colorem & ponderis gravitatem referens, & in igne ut plumbum liquecens; intus argenti splendoris venulis nitens. Fuliginosa fumosaque Philosophorum familia, (se enim solos Philosophos esse gloriantur Chيميци) reconditam suam sapientiam & medendi artem circa remedia arte Chimica ex 4. potissimis fossilibus elicit ostentant & prædicant, auro, argento vivo, antimonio, & chalcanto si-
Antimonium.
Præconia Paracelsi.
hæc quidem nulla injuria, si a peritis prædicantur. Vocabula artificum arbitrii subjecta:
ve vitriolo. Ea autem metallica remedia ex mera invidia impropiis & peregrinis nominibus celandi gratia ornant, & quas essentialias, tinturas, arcana, magisterias, balsamum, elixiria & spiritus vocant, quæ revera nihil aliud sunt, quàm corporum formæ substantiales, sive, ut saniores Philosophi vocant, humiditates radicales sive primogeniæ, spiritu & calore persusæ, & ipsa creatione, per omnium corporum substantias diffusa, in qua humiditate latentes rerum vires continentur, & ejus beneficio omnia corpora coherent, vivunt, vegetantur ac conservantur. Hanc ipsam cœlestem ac divinam humiditatem è corporibus violentia ignis elicere, & ab omnibus elementaribus partibus separare se posse, gloriantur Chيميци. Et esset sanè ejusmodi Medicina in per sanandis magnis ac difficillimis morbis tanquam Dei manus potentissima & efficacissima, si ejus præparatio tam esset facilis, ut est impudens jactatio Chemicorum, qui omnes quidem se artem eliciendi quintas essentialias nosse gloriantur, & tamen vix eorum millesimus vel liquores elementares producere, aut eos à venenatis qualitatibus separare novit, & longè etiam pauciores sunt, qui ea remedia habita ratione ætatis, temperamenti, virium, & morborum, ritè & tempestivè exhibere sine

Seculum quo vivit, antorem excusat.

sine noxa possint; id quod quotidiana contestatur experientia, metallicis rebus intra corpus exhibitis plures interire, quam sanitati restitui. Sedula itaque circumspeditione opus est omnibus sanitatis studiosis, ac potissimum Illustribus viris, ne Chimicorum auro potabili, aut pulvere argenti vivi precipitati, quem illi *Turbith minerale* atque *Mercurium Diaphoreticum* vocant, aut *vitro Stibii sive Antimonii*, aut *ol. Chalcanti* intra corpus utantur, nisi certo sciant ea à peritissimo artifice esse præparata, & à tali Medico exhibeantur, qui in Physiologia & omnibus partibus artis Medicæ Hippocraticæ sit exercitissimus. Stibio sive Antimonio tantam efficaciam tribuunt Paracelsi affectæ, quantam vix humana ratio explicare queat. Asserunt enim Antimonii facultates à primarum conditione usque ad hoc seculum integras incorruptasque mansisse, ideoque *Antimonium* arte Chimica in sui primam materiam reductum & exhibitum, cujuscunque morbi malitiam facile absorbere, & corpora impura pura reddere, ut ad summam perfectamque sanitatem nihil omnino desiderari possit. O generosum & planè divinum remedium si ita esset, ut illi prædicant. Quid enim amplius opus esset usu & experientia artem Medicam addiscere, si unico remedio *Antimonii* omnes morbi tolli possent? Sed ad institutum redeam. Ex stibio sive Antimonio tres remedii species formæ differentes arte Chimica præparantur: *Vitrum Antimonii*, *tinctura seu essentia Antimonii*, & *oleum Antimonii*.

Antimonium nemmo propinet, nisi qui didicit.

Vitrum Antimonii.
Paracelsi scripta cur avelenda.

Vitrum Antimonii quâ ratione consiciendum, & qui ejus effectus seu facultates.

Virgilius interrogatus cur obscura Ennii Poëtæ legeret Poëmata, respondit se ex illius scriptis aurum tanquam è stercore colligere. Ita Medici debent sedulo legere barbara & obscura scripta Paracelsi, sunt enim in eis tanquam flosculi inter spinas utilissimæ res dispersæ, ex quorum numero est, *Vitrum Antimonii*, quod so-

li Paracelso acceptum ferre debemus, qui etsi fuerit homo maledicentissimus, tamen iniquum, ipsum merita laude in eorum inventionem defraudare, qui Antimonii vitrum hac ratione parædocet: Accipiat *Stibii puri* & *oblongis linteolis micantibus, scintillantibus, lbj.* quod in pulverem reductum novo fictili non vitreato imponatur, & in furno calcinatorio super laterem collocetur in loco libero & perspirabili, admotis undique carbonibus incensis, & primo lento igne, deinde validiori liquefiat, & calcinetur Antimonium, & subinde (averfa facie, ne fumus in nares aut faciem irrepat Antimonii) ferrea & oblonga spatula liquefactum versetur ac subigatur, donec univsum in glebas concreseat, quod ubi factum est, ex igne exceptum Antimonium & refrigeratum, denuo in pulverem redigatur, priorique modo in aliam novam ollam sive fictile impositum calcinetur, priorique modo ferreo stylo agitetur, donec iterum in glebas coeat: & talis calcinatio & reiterata pulverisatio toties perficiatur, donec *antimonium* nullum fumum exhalet, nec tetrum odorem spiret, nec amplius in glebas concreseat, sed pulvis cinericei aut albi, aut crocei coloris remaneat. *Hujus calcinati Antimonii pulveris accipiantur*

3vj. Pul. Antimon. crudi & semel tantum, ut virosus ejus fumus exhalet liquefacti, & rursus in pulverem reducti 3j. & pul. Chrysocolle sive Boracis 3j. quæ simul contrita & commista in regulam fusoriam aurificum imponantur, & in furno calcinatorio liquefiant instar plumbi liquefacti, & eousque coquantur, donec

Hic præparandi modus ex oleis ob boracis virulentiam: parandum igitur per se sine addito mento.

extremitati ferreæ spatulâ liquefacto Antimonio immixtæ, Antimonium adhæreat; quod refrigeratum, & lapidi aut ferro illitum, instar vitri frangatur, & politissimi Rubini gemmæ colorem diaphanum consequatur: tum ex igne detractum super marmorè, aut lapide polito instar tesserarum aut pastillorum rotundorum adhuc tepens cum ferrea spatula projiciatur; idque

gemma aut vitrum Antimonii nominari potest. Quod ratione crudi Antimonii & Boracis, quod prius calcinato stibio admiscetur, multis Medicis subjectum est; alias sanè præclarissimas hoc Vitrum habet facultates, præcipuè purgatorias; & gratissimum est remedium propter ejus exiguum dosin: Ejus enim tria grana in mediocribus corporibus, & quinque in robustioribus, validissimè utramque bilem & pituitam, omnemque putridorum humorum colluviem & venenatas superfluitates primùm quidem per vomitum, ac deinde per alvum, & quidem spatio dimidiæ horæ expurgat, & efficacissimè educit. etsi non temere & viribus planè destitutis exhibendum hoc remedium suaderem: tamen experientia deprehensum est, nobilissimas vires habere in persanandis difficillimis & complicatis morbis, ex venenatis & putrescentibus humoribus & intemperie ortis. Persanat enim facillè, si prudenter habita ratione ætatis, virium, & naturæ morbi, exhibeatur, diuturnas febres, *non ægriar*, inveteratos capitis dolores, catharros & fluxiones continuas cerebri; præterea etiam pulmones, & ventriculi inflammationem extinguit: cordis palpitacione sedat, respirationis difficultati auxiliatur, sitim sedat, & faucium linguæque ariditatem lenit, appetentiam prostratam restituit, fuliginosas nidorosasque eructationes compescit, pestilentem contagionem, si tempestivè exiheat, expellit, & omnium venenorum malitiam frangit; sed imprimis præsidio est omnibus morbis atrabilaris, ut Melancholiæ hypochondriacæ, Melancholicæ infanæ, Epilepsiæ & virulentis ulceribus. Dosis hujus vitri, uti diximus, est à gr. iij. ad vij. quæ quantitas, non nisi in robustis corporibus cum aliquo liquore exhiberi debet, aut admiscenda drachmæ uni Pulpa Cassiæ aut Cons. rosarum.

Tinctura Antimonii quomodo paranda, & quas habeat facultates.

Tincturæ nomen inde sumptum est,

quod hoc remedium assumptum per substantiam partium penetret, easque tingat; dicitur *Et quinta essentia Antimonii*, quæ hac ratione arte Chimica confici potest. Accipiat Stibii puri & rutilantis in pulverem redacti pondus pro arbitrio, & in furno reverberatorio per integrum mensem continuo igne in vitrea cucurbita luto Chimico probè occlusa calcinetur. Deinde rubea massa vel calx è vitro eximatur, & in aliam vitream cucurbitam imponatur, eique adfundatur tantum spiritus vini liquoris, cujus parandi rationem in nostra Iatrochimia docebimus, ut liquor palmi latitudinem supra calcem Antimonii emineat: quæ simul obturata macerentur per mensem in loco tepido indies agitando, deinde in ferventi arena vini spiritus subtrahatur destillando, subtractusque liquor subinde feci Antimonii ter quaterque infundatur, ac destillando subtrahatur, postremò reservetur liquor, qui *tinctura Antimonii* dicitur: cujus tincturæ solius usus etiam in minima quantitate, ut guttæ unius, vix tutus est; ideoque ut sine noxa assumi & usurpari queat, consultum est, ut tempore vinetia recentis multæ & nondum per effervescientiam defecati pro arbitrio accepti singulis diebus sive ζ xvj. admisceatur, cujus tincturæ ζ j & permittatur simul cum musto fervere, donec mustum resideat, vinumque clarum evadat: quod *vinum Antimonii* nominari potest, cujus vires sunt excellentissimæ: Quemadmodum enim Antimonium aurum ab omni sorde purificat, sed solos & in eo aliena metalla absorbit; ita hujus vini sive tincturæ Antimonii, si per mensem omni die ζ iijj. bibantur, corpus universum ab omnibus vitiosis humoribus ac venenatis, omnique intemperie atque obstructionibus liberat ac purificat, & integram sanitatem efficacissimè restituit. Imprimis autem confert leprosis, morbo Gallico & scabie laborantibus; & fistulas, caneros, lichenas, omniaque vitiosa ulcera persanat.

Oleum

Infusum ejus ex vino tinctius propinatur.

Tinctura Antimonii.

Tinctura quidem appellacionem preparatio hac non meretur: nihil aliud est quam infusum. Vera Antimonii tinctura nullam caliditatem habet, sed solos sudores ciet. Vinum Antimonii.

Oleum Antimonii quomodo parandum, & ejus facultates.

Variis modis ac rationibus per calcinationem, macerationem, resolutionem, destillationem, aliasque laboriosas operationes elicitur *ol. ex Antimonio*. Præstantiss. remedium, cum ad externas tum internas affectiones, quas in nostra Iatrochymia docebimus. Hoc loco satis erit unum & alterum conficiendi modum breviter proposuisse: Primum itaque accipiat Antimonii puri & tenuissimè pulverisati q. s. pro arbitrio, quod toties diluatur ac maceretur in aceto destillato, semper acetum immutando, donec omnis color rubeus Antimonii in acetum transeat, nec acetum amplius ab eo tingatur; quo facto illud acetum coloratum simul commixtum, priusque colatum in vitream cucurbitam infundatur, cui galea rostrata imponatur, & in ferventi arena vel cinere destilletur, in qua destillatione primò profluet aquosior pars aceti, deinde exibat meli coloris liquor, qui pro *ol. Antimonii* conservetur: qui quidem liquor prius per circulationem in vitro pellicano, sive in duobus vitreis cucurbitis cum orificiis suis conglutinatorum corrigatur ac rectificetur. Hoc quidem oleum intra corpus

Hinc oleo si ulterior cultura accesserit, virtutibus suis etiam præstantissima remedia vincet.

exhibere minimè tutum est, cum propter aceti destillati erosivam vim, tum propter Antimonii non satis digesti venenatam naturam. Foris autem & vulnera & ulcera virulenta cum lana xilina exceptum, & eis impositum citissimè & facillimè persanat. Alius modus *Olei Antimonii* eliciendi est similis destillationi *ol. viatrioli*, de quo paulò post, si nimirum accipiantur lb 6. *Antimonii* in pulverem redacti, & toties calcinentur in furno calcinatorio, donec in pulverem rubrum redeat, qui in cucurbitam fictilem retortum collum habentem, & luto Chimico incrustatam ponatur, & transversim in reverberatorium furnum collocetur, colloque ejus amplissimo vitrum recipiens vocatum, extra fornacem applicetur & luto Chimi-

co adglutinetur. Deinde igne succenso initid quidem lente destilletur, donec aquosior pars Antimonii profluat. Tandem liquore aqueo remoto vitrum recipiens immutetur, ac valido fortissimoque igne destillatio urgeatur. Tum enim nihil humoris prodire conspicitur, sed vitrum crasso vapore instar flammæ replebitur, ac ignis quidem violentus tantopere conservetur, & destillatio urgeatur, donec omnis vapor per se in liquorem condensetur, in fundumque vitri recipientis subsideat, ac vitrum rursum inclarescat; quo facto & furnus & vasa omnia sensim per se refrigerari permittantur, refrigerata excipiantur, & liquor Antimonii in aliam vitream cucurbitam transfundatur, eademque rostrata galea imponatur, & in ferventi arena si quid aquosi humoris oleo insit, subtrahatur, idque quod in fundo remanet, *Ol. antimonii* erit; quod ante ejus usum ita rectificabitur: Si ter aut quater spiritus vini affundatur oleo, & per destillationem in ferventi arena semper iterum subtrahatur. Easdem hoc oleum habet vires & longè præstantiores, quàm quæ in vitro Antimonii sunt commemorata. *Dosis* autem ij. gutt. excedere minimè debet, quæ vel cum liquore aliquo, vino nimirum, cerevisia, aut cum *Theriaca Androm.* 3j. exhiberi potest.

Antimonium perperam intra corpus ingestum, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Antimonium intempestivè vel non ritè præparatum intra corpus assumptum, laboriosissimas & vomitiones & alvi dejectiones cum summa angustia infert. Hisce symptomatibus remedio sunt *vini potio*, in quo *Caryophylli contusi* & *masfix* sunt incocta. Similiter & *cortices Arantiarum conditi*, aut *Cidonia condita* sæpè estitata, conferunt quoque suavia odoramenta cerebrum corque corroborantia. Antidota sunt *gutta IV. ol. Caryophyll.* cum pauxillo vini assumpta, & 3ij. *Theriaca Androm.*

Noxa Antimonii perperam exhibit.

Remedia.

drom. aut sequens pulvis: *℞ Pull. Caryophyll. masticis, cornu cervi usti ana ℥j.* Fiat pulvis tenuissimus, qui cum *succo Citoniorum* exhibeatur. Extrinsecus verò plurimum confert applicuisse ventriculo *Emplast. de crusta panis*, cujus faciendi ratio in libris pharmaceuticis extat, aut *lamina panis siliginei tosta*, & cum vino Cretico, vel alio generoso conspersa.

Vitriolum.

Vitriolum quid, qua ex eo parentur
Chimica remedia.

Χάλας ἀνθρ., i. e. flos cupri. Quia ut plurimum materia vitrioli in fodinis cupriferis sive ærariis colligitur & effoditur. Latinis antiquis *atramentum futorium*, recentioribus *Vitriolum*, nostratibus *Rupfserwerck* vel *Rupfser* dicitur. Est autem vitriolum vapor humidus in cavernis & specubus montium excitatus, & cavernarum parietibus accretus.

Quid?

Duplex,
Album
&
Viride.

Duplex reperitur vitriolum in montibus, Nativum sive stillatitium, quod in cavernis montium instillantibus vaporibus instar stiracis concrescit, colore aluminis sive glaciæ, quod nostris *Weißkupferrauch* dicitur, eoque in ocularibus collyriis utimur. Alterum est factitium, quod ex terra è montibus erutum & in glebas congestum, instar salis nitri per macerationem & coctionem conficitur, quod colore aut viride est, veluti Vngaricum; aut cæruleum, quale est Hispanicum. Vitrioli quoque species, sed hoc seculo ignota est, quam Veteres *chalcutida* nominabant, & Theriacæ confectioni admiscebant; quam ego quidem salvo aliorum judicio nihil aliud esse arbitror, quam *Vitriolum factitium*, quod temporis diuturnitate ab æris ambientis & solis irradiatione ac calore in calcem albam convertitur, id enim minus est venenatum. Tempore *Dioscoridis* Vitriolum intra corpus exhibebatur adversus alvi lumbricos & fungorum venenatorum comestionem; & nos non semel vidimus à vetulis inter rusticos nucis avellanæ quantitate vitrioli viridis cum aqua tepida contra febrim non sine felici successu exhibi-

Vfus Empiricus vitrioli.

tam esse. Validissimè enim per vomitum pituitosam colluviem exturbat. Et ipse postea tenuioris fortunæ rusticis, pituitosam habentibus constitutionem, & quotidiana febris laborantibus feliciter exhibui, sed soleo prius hac ratione præparare; *℞ vitrioli ℥j. & in aqua rosacea* *Vfus rationali.* solvo, aquamque affusam in ferventi aqua rursum evaporare sino, & ubi necessitas exigit, ejus *℥j.* in pulv. redactam cum *aq. Experimentum.* exhibeo, quod me nunquam fefellit in pituitosis corporibus. Præparantur autem ex vitriolo arte Chimica, duo præstantissima utilissimaque in arte Medica remedia: *Oleum & Aqua*, quam Chimici ineptè *phlegma* vocant; utrumque autem una operatione ita conficitur: *Accipiat chalcant. sive vitrioli puri. at. si haberi potest, Vngar. ℥vj. quod pulveris.* in ollam novam nondum coctam imponatur, operculoque novo contegatur, & in fornacem figulinam, una cum coquendis ollis collocetur, & simul concoquatur, ut in calcem rubeam concreseat. Deinde excipiat, & rursum in pul. redigatur, & in cucurbitam fictilem oblongi & intorti colli, luto Chimico prius benè incrustatam reponatur: Ita tamen, ut cucurbitæ tertia pars vacua relinquantur, ac deinde in furnum reverberatorium transversum collocetur, ita ut ejus collum per foramen parietis furni promineat. Ejus deinde cucurbitæ collo vas vitreum subiciatur, ac cum eo luto Chimico coaptetur ac conglutinetur. Denique ignis ex carbonibus primum quidem lentus, deinde validior succendatur ac destilletur. Inter destillandum primum quidem prodibit aqueus humor, qui ubi in universum profluxit, subsequitur albus vapor, qui vitrum recipiens universum implet, tum removeatur vitrum recipiens cum aqua vitrioli, & novum idque amplissimum recipiens vitrum subiciatur, colloque cucurbitæ conglutinetur, ignisque magis augeatur, & tamdiu destilletur, donec vapores in vitro recipientis instar flammæ moveantur, & donec

DE VITRIOLO, OLEO ET AQUA VITRIOLI. 121

donec hi vapores in liquorem resoluti in fundum recipientis vitri subsideant, & vitrum iterum inclarescat; Tum tandem non amplius ignis urgeatur, sed sponte & per se, & furnus & vasa omnia refrigerari permittantur; quibus refrigeratis collectus in vitreo receptaculo humor in aliam vitream cucurbitam effundatur; & si quæ in eo aquosior pars remansisse suspicio sit, ea subtrahatur hac ratione: Cucurbita vitrea cum liquore Chalcanti in tepidum balneum Mariæ collocetur; & probe obturatus per triduum in eo maceretur ac digeratur. Exemptæ cucurbitulæ galea rostrata imponatur, & in ferventi arena destilletur, per eam siquidem destillationem omnis aquosi liquoris pars profluat, & *ol. vitr.* pingue in vitro remanebit. Hoc ipsum tandem *ol.* purificetur, ac corrigatur ab omni venenata qualitate, admixta illi dupla proportionem ad oleum vini sublimati; & cum eòter aut quater, ut dictum est, in ferventi arena destilletur, semper novum vinum sublimatum addendo. Ita enim ab illo subtrahitur vinum, & in eo omnis venenata qualitas, oleum enim purissimum & rectificatum in fundo cucurbitæ manebit. Admirandæ, & propè divinæ sunt hujus olei vires & efficaciæ, maximè in morbis ex frigida & putrida colluvie ortis. Vt multæ ita & nobilissimæ sunt vires & efficaciæ cum *aq.* tum *ol. vitr.* & aqua quidem, quæ in destillatione primum profluxit, commodissimè uti possimus, ad mundificationem & absterfionem sordidorum ulcerum & scabiei, & putrescentes gingivas in scorbuto; similiter & in Aphris ulcusculisque faucium & linguæ, si eo ulcera colluantur, aut linteooleo excepta eis imponatur. Oris autem ulcusculis si ea cum *melle Rosar.* mixta illiniatur. Olei verò admiranda vis est in plurimis morbis facile persanandis: Confert enim febribus omnibus ex putridis humoribus ortis. Confert præterea Cephalalgia, Hemicrania, Apopl. & Epileps. cum *aq. Lavend.* exhibitum. Auxiliatur

ventriculi affectionibus ex crudis & pituitosis humoribus generatis, ejusque imbecillitati & appetentiæ prostratione; Item Nauseæ, vomitioni & singultui, si cum *vin.* generoso aut *aqua Mentha* propinetur, deglutitionis difficultati ex refrigerata gula medetur: Epatis Lienis & Renum obstructions tollit, in eisque bilem flavam crassam, Melancholicum humorem & pituitosam colluviem extenuat, & expellit; & deinde Hydropi, Scorbuti, Ictericæ & Cachexiæ medetur, & tollit omnes febres (exceptis ardentibus & Hæctica) cum *aq. Card. Bened.* sumptum; Intestina refrigerata excalefacit, & Venas Mesar. ab obstructione liberat; ideoque colico & Ilii doloribus ex frigida & crassa pituita vaporibusque flatulentis ortis, confert, & lumbricos potenter expellit; Renum & vesicæ obstructions aperit, calculum comminuit, & urinam provocat; verum in calculo urinæque suppressione non ante est exhibendum, priusquam alvus vel leni Clystere aut cathartico subducta sit: Mensibus suppressis, purgato prius corpore, felici successu propinari potest: Vterum enim refrigeratum calefacit, & ad concipiendum idoneum reddit; Articularibus morbis, veluti sunt Arthritis, Podagra, Chiragra, coxendix & spasmus, ex frigidis defluxionibus excitatis, egregiè auxiliatur, tum intra corpus assumptum, tum foris illitum. Sigillatim autem extrinsecus corpori utilissimè illinitur, cum aliis lentis oleis, aut liquoribus commixtum & impositum; cervici quidem in Apopl. & Epileps. dorsi verò spinæ in paralyti: Articulis autem in morbis articularibus, suturæ coronali & temporibus in capitis & dentium doloribus, orificio Ventriculi, refrigerato Stomacho, Diaphragmati in viscerum obstructionibus, Hypogastrio in uteri refrigeratione: Et instar Epithematis feliciter imponi potest, Erysipelati, cum *aq. Sambuci* commixtum. In Aphris & exulceratione faucium, linguæ & tonsillarum, & putrefactione Gingivarum utilissimè

Ol. Vi-
triosi vi-
res.

Vires a-
qua.

lissimè illinitur cum *melle rosa.* mixtum. Dentium dolores cum lana xilina exceptum, & excavato denti insertum, statim omnem dolorem sedat: & si confricentur eo dentes, reddit eos candidissimos: sed crebra ejus illinitio, vitanda est; emollit enim, & instar cretæ frangibiles reddit dentes; pustulas faciei, si illiniatur, aufert, & Verrucas, dicitur *Wartsen* / & clavos, dicitur *lyctidorm* / si prius convulserentur, & gutta ejus olei instilletur, extirpat, & radicitus absumit. Porro verò in olei vitrioli usurpatione, præsertim intra corpus, tria sunt potissimum observanda: I. Ut sit ritè & probè paratum, destillatum, ac deinde rectificatum; aliàs enim facile interna viscera inflammare & perniciem inferre potest. II. Ut intra corpus nemo utatur, nisi ex consilio exercitissimæ Medici. III. Ut in convenienti mensura assumatur; quibus & IV. adjici potest, videlicet ut ante assumptionem corpus leniter expurgetur. Est autem Dosis siue exhibendi mensura olei Vitrioli, habita ratione ætatis, & virium, atque qualitatis morbi à gut. III. ad gutt. 9. cum tribus cochlearibus vel vini, vel stillatitii alicujus liquoris: Id quoque commune factionis causa addam, sedulo esse vitandam imposturam quorundam Chemicorum, qui *ol. vita* vel non ritè paratum vendunt, vel alias imposturas cum eo exercent. Narravit enim mihi quondam doctus Adolescens *Matthæus Swindius*, *Leonhardi Thurnhuseri Berolinensis*, indoctissimi & maledicentissimi Chimistæ, *Amanuensis*, ipsum *Thurnhuserum ol. vitrioli* aliquo colore tingere sole- re, ut aureo & pro auro potabili; aut ru- beo, & pro tinctura corallii; aut viridi, & pro tinctura smaragdi; aut cæruleo, & pro tinctura Hyacinthi; aut splendidis- simo, & pro essentia margaritarum Principibus viris magno precio vendere: quam ipsius imposturam mirabili ratione Deum puniturum, minimè est dubium.

Obser-
vanda
circa ol.
vitrioli
usum.

Dosis.

Fumo
perit, qui
fumum
vendidit.

Vitriolum qua inferat symptomata, & quibus ea curanda remediis.

Vitriolum crudum, aut perperam præparatum & assumptum, nausæam & vomitionem excitat, & si non statim per vomitum ejiciatur, tandem & ventriculumerodit & intestina excruciat, Dysenteriamque excitat, sitimque intolerabilem infert. C V R A T V R, si maturè quàm primum est assumptum, per vomitum ejiciatur, assumpta prius *aq. cum ol. Anethi*; sedato vomitu, confert plurimum recens *Butyrum* subinde largiùs gustare: & si erosio in intestinis sentiatur, proderit ex cremore *Pisana & ol. Rosar.* in intestina clysterem infundere, postea eidem *agua Ford. cum Syr. violar.* sæpe bibenda præbeatur. Pro *Antidoto Terra Lemniæ* ʒ 11. *Mucag. se- citon.* ʒ 5. cum *aq. Ford.* propinentur.

Arsenicum, Auripigmentum, Sandaraca, & Realgar, quid; qua inferant symptomata, & quibus ea remediis curanda.

Arsenicum, Auripigmentum; Oxy- Arseni- mentit oder Kottenfrucht. Arsenici tres sunt *can.* species, ejusdem naturæ, in iisdem fodinis re- pertæ, iisdemque venenatis & urentibus qualitatibus imbutæ, eademque inferunt symptomata, & iisdem curantur remediis. Sunt vero Arsenici species omnes lapidosæ *Cura.* substantiæ, quæ in squamas fidi pos- sunt, & solo colore inter se differunt. *al- bo, rufo & aureo.* Album officinæ vo- cant *Arsenicum album*: Rubrum verò Græci *Sandaracam*, officinæ *Arsenicum rubrum* vocant. Aureo verò colore splen- dens solum vocant, *Auripigmentum*, quo & pictores & librorum compactores in- tingendis librorum marginibus frequen- tissimè utuntur. *Realgar* quoque, venenata materia, non aliud est, quàm Arseni- cum cum pauculo sulphure & sale calcina- tum. Hæ omnes Auripigmenti species in- tra corpus assumptæ lævissimi excitant symptomata, ventriculorum enim & In- testina cum vehementi cruciatu ero- dunt,

Noxa Vi-
trioli.

Arse-
nici.

Cura.

Noxa.

dunt, quam erosionem ut plurimum sequitur Dysenteria, interdum etiam spasmus & paralytis; præterea fauces & linguam arefaciunt, & sitim intolerabilem inferunt, quibus accedit & difficultas meiendi, cum difficultate respirationis.

Curatio.

CVRATIO symptomatum ex assumpto Auripigmento sive Arsenico est ut initio æger arceatur à somno, donec venenata materia per vomitum sit evacuatâ, hausto prius decocto semin. Rapa & Atriplicis in quo Butyr. recens aut ol. Lini sit liquefactum; & deinde, si cruciatus intestina affligant, clyster ex decocto seminis lini Malv. & Violar. flor. confectum, cuiusque ol. violar. & pulpa Cass. sit admixta, applicetur, cui & Mucago psylli commode admisceri potest. Quo facto, confert plurimum subinde recenti butyro & lacte tepido, in quo semen lini sit incoctum uti. Conferunt quoque juscula pingua, cremor pisanae & oriza cum lacte cocta. Antidotum adversus venena Auripigmenti est pul. tenuiss. cristalli fossilis. ʒi. cum ol. Amygd. dule. exhibita. Ariditati linguæ ex Arsenico prodest Mucag. sem. Lini aut citon. cum Syr. Viola. mixtam subinde linguæ & faucibus illinire.

Alumen quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Στομαχικόν, Ἀλμῦν. Excoquitur alumen nostrum ex lapidea materia è montibus quibusdam effossa. Deinde comminuta, calcinata & macerata, quemadmodum sal nitri. Alumen vehementer astringit, & in igne in calcem aduritur. In aqua verò instar salis in liquorem resolvitur. Veteribus plura fuerunt aluminis genera, quæ nobis omnia nunc ignota sunt. Vimur alumine in medicamentis foris applicandis. Intra corpus autem nemo sine noxa eo uti potest, & utuntur eo tinctores pannorum: pulvis Aluminis uesti carnes excrecentes in vulneribus exstirpat & absumit: Intra corpus assumptum alumen hæc infert symptomata: Alvi meatus

obstruit, atque constringit, ventriculumque subvertit, & nauseam parit, anxietatemque inducit.

CVRATIO horum symptomatum ex Alumine est crebra cistatio *pulpa cass. fistularis & cremoris pisana lactique potitatio.* Antidotum ejus est ol. vitr. si Antid. gutt. 7. cum iij. cochl. vini exhibeantur.

Gypsum quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Γύψος, Gypsum, Gyps/ oder Marien Gypsum. Gyps/ fossilis est lapideum, quod in laminas scindi potest. Ex Gypso peculiari arte parato, candidissima & teratissima vasa utensilia quæ Alabastrina vocantur, conficiuntur. Gypsum sive crûdum, sive calcinatum in tenuiss. pulv. redactum, & media parte farinæ, quæ molendinarum parietibus insidet, commixtum, atque deinde cum albumine Ovi in Linimenti formam redactum pilisque leporinis exceptum, ac vulneribus aut naribus impositum, omnem sanguinis eruptionem compescit. Intra corpus sumptum venenata sua proprietate noxium est, & periculosa excitat symptomata: Tussis vehementes singultus, Rationis perturbationem, ac postremò, uti Dioscorides docet, strangulando jugular, constringendo meatus respirationis.

CVRATIO Symptomatum ex Gypso, in principio est Gypsi assumpti revomitio exhausta prius aqua tepida cum largo butyro liquefacto, aut ol. Amygd. dule. ei admixto. Deinde propinetur subinde potandum ægroto decoctum rad. & sem. Malva, Alib. Fanugraci. Vtaturque pinguioribus jusculis; Antidotum Veneni ex gypso est ol. vitr. si ejus ʒ. ʒ. post vomitum exhibeatur, aut gutt. 7. ol. Angel. aut Ther. Andro. ʒj. ʒ. cum ag. lunip. mixta. Solet assumptum Gypsum & alvi obstructionem inferre, quæ clysteribus ex decocto Malva & fl. chamam. cum Hyer. picr. & ol. Aneth. tollitur. Confert & purgatio cum pulpa cass.

Externus
usus.
Noxa.

Usus æconomus.

Topicus
usus in
hamorrhagiis.
Noxa.

Facultates. Aluminum species nobis incognite. Usus internus nullus; in quadratis tamen corporibus febrium fugum est.

cass. fist. Reliqua Remediorum genera ex cerussa & fungorum assumptorum curatione peti possunt.

Nitrum quid, qua inferat symptomata, & quibus remediis curanda.

Nitrum. *Nitron*, Nitrum, *Arabibus* Bauras, officinis sal nitri & Salpetrae, Germ. *Salpeter* nominatur. Differt autem plurimum Nitrum nostrum à Veterum nitro, quod hodie nusquam notum est. Nostrum autem

quid? *Salpetrum* est species salis ex terra multa urina Jumentorum imbuta & putrefacta, in locis solitariis inventa, macerata & excocta, instar aluminis concreta. *Aphronitron* verò, cujus Veteres mentionem faciunt, & hoc ipsum ignotum est. Latinis

Aphronitri succedaneum. spuma sive flos Nitri vocari potest, cui succellit sal candidum ex parietibus & muris antiquis cellariorum instar pruinæ efflorescens. Nitrum sive Salpetrae valde tenuis & aërea est substantia, ideoque admiscetur pulveri tormentario sive bombardico, citissime enim flammam concipit, & crepitum edit, in fumumque dissolvitur accensum; Utuntur Chimici Sale nitri ad destillationem *aq. fortis* vocata. Habet Salpetrum & hanc utilitatem, quod si æstivis mensibus vinum aut cerevisia in aquam frigidam in cantharis collocetur, & eidem aquæ nonnihil salpetrae aspergatur, cum calefieri non finit, sed reddit potum frigidissimum. Valet præterea sal nitri ad scabiem, si cum aliquo liquore vel ol. commixtum inun-

Vfus nitri. gatur. Pulvis tormentarius ex nitro & sulphure in pituitosis febribus exhibitus eas facile perfrangat. Symptomata excitat Sal nitrum, si intra corpus assumatur, ventriculi nimirum subversionem, Nauseam & contumacem instar Aluminis expuitionem.

pul. Tormentarius in febribus, præsertim Vngaricus, prodest. Symptomata. CVRATIO SYMPTOMATVM Assumpti Nitri, in principio evomitio tentanda est, assumpta *aq. tepida cum Butyr. aut ol. olivarum mixta*. Deinde vinum potandum exhibeatur, in quo *Carioph.* ebullierunt. Pro antidoto exhibeantur *gutt. 7. ol. carioph. cum haust. vini.*

Antid.

Sal Hammoniacum quid, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Sal Hammoniacum q. d. Arenaceum, *Sal Ammoniacum.* seu *Ἀμμωνιακόν* Græcis Arenam significat, est quo Chimici & aurifices frequentissime utuntur, idque corrupte salem Armeniacum nostri *Salgmad* vocant. Est quid? species salis colore Alumen imitans, nisi quod nigriores sordes in fundo ejus subsedisse conspiciantur: unde constat *Sal Ammon.* *Vfus.*

nostrum factitium esse, & arte Chimica excoctum forsan ex calcis & aluminis cum urina commistione; (ejus enim materia scripto quod sciam nondum est prodita) Differt autem *Sal Ammoniac.* à Veterum *Sale Hammonico*, quo hæc ætas destituta est: Nostrum *Sal. Ammon.* astringit & exiccat vehementer, & metalla erodit. Ejus itaque pulvisculo tubercula dura in lingua ex morbo Gallico exorta, si crebro confricentur, eradicari possunt, & ulcera faucium *cum aq. rosar.* illitum facillime abstergit & sanat; Symptomata si intra corpus ingeratur, excitat *Sal Ammo.* similia Mercurio sublimato aut Arsenico. Ventriculum enim, & intestina exurit, linguam arefacit, & fauces exulcerat, sitimque vehementem inducit.

CVRATIO Veneni ex Sale Ammoniaco eadem est cum curatione symptomatum ex Mercurio sublimato aut Arsenico ortorum, ex quibus locis remedia peti possunt.

Borax quid, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Βουραξ q. d. Gluten auri, eo quod *Borax.* Aurifices Borace ferruminant & conglutinant aurum, officinis *Borax*, nostris *Borax*. Verum Borax aurifabrorum plurimum differt à Chrysocollo Veterum, quæ Prassini seu porracei viridisque est coloris, nec ejus usus amplius est in arte medica. Noster autem Borax, nitri factitii colorem refert, & ipse factitius est. Est autem ejus natura ob invidiam artificum nondum est patefacta, tamen procul dubio conficitur ex Alumine, Vitri Spuma quam *fel. vitri* vocant, Nitro & Sacha. candidi cum urina macera-

Noster borax factitius.

Prepara- maderatis, & tandem instar salis nitri exco-
tiis. ctis. Borax parvum habet in arte medica u-
 sum; & intra corpus assumptus venenum
 reputatur. Foris autem Vnguentis admisce-
 tur cosmeticis, ad venustandam faciem. Ego
 verò semper felici successu ejus pulv. in mu-
 lieribus difficulter parturientibus sum usus.
 Pulvis autem hac ratione conficitur: R.
Boracis ʒij. succin. albiss. ʒ j. croci ʒ ʒ.
tenuiss. contrita misceantur, & cum haustu
vini parturientibus exhibeatur, facile enim
 liberat, & foetum educit sine noxa. Sym-
 ptomata infert Borax, si ultra justam men-
 suram intra corpus ingeratur, qualia sal ni-
 trum infert. Ex curatione itaque salis ni-
 tri & ejus Symptomatum curatio est
 petenda.

Noxa.

*Calx quid, qua ejus symptomata, & quo-
 modo curanda.*

"Ασβης, Calx, quo nomine Græci non
 extinctam calcem potissimum ornant.
 Calces ex calcario lapide albicante & è
 scopulis divulso, qui passim ad hæc Bo-
 realia loca ex Norvegia navibus adportan-
 tur, aut ex terra calcinosa, qualis est Panno-
 nicâ; Vrendi & conficiendi ratio omnibus

Viva.

est nota. Calx non extincta, viva dici-
 tur, quæ cuti crustas infert exurendo.
 Calx autem aquâ conspersa & extincta,
 non tantum ad extruenda ædificia, sed
 ad plurima externa remedia, utilissima
 est. Nam pulvis tenuissimus ex calce cum

Vfus.

aq. rosar. ter quaterve elotus, & rursus
 in pulv. redactus, magno præsidio est
 ulceribus pudendi ex Venerea lue contra-
 ctis, si eo inspergatur: abstergit enim &
 absumit omnes in eo impuritates, & ci-
 catricem citò inducit. Paratur & liquor

Liquor
C. V.

è calce viva utilissimus ad omnia ulce-
 ra sordida perfananda, si eo ulcera col-
 luantur, & instar Epithem. linteolis ex-
 ceptus eisdem imponatur, qui hac ra-
 tione confici debet: Accipiatur calcis vi-
 va pro arbitrio q. l. & in ollam novam
 conjiciatur, eidemque aqua fervens pura
 affundatur, & simul subigantur, spu-
 mam subinde auferendo, sicque per tri-

duum simul macerentur quotidie bis
 tervè movendo spumamque auferendo.
 Tandem ubi calx subsederit in ipsam ol-
 lam, margo panni aut pannus mundus
 duorum digitorum latitudinis liquori im-
 ponatur, ita ut ejus mediâ pars in liquo-
 re mergatur; altera verò pars ex olla
 propendeat, & propendulæ parti panni
 vitreum vas subjiciatur: ita enim per
 pannum sensim omnis liquor limpidus &
 clarus à calce extillabit. Quo collecto
 & tepefacto singulis diebus eluantur ul-
 cera, & linteolis exceptus imponatur.
 Sanat enim sine dolore & molestia, &
 omnem inflammationem aufert, ulcus-

que carne sana compler. Hæc ipsa aqua
 ambustis partibus imposita præsentiss.
 est remedium. sicuti & falsugo ex Butyro
 salito sudoris instar profluens. Nunquam
 enim ambustis partibus, ut imprudentes
 Chirurghi faciunt, refrigerantia & repercu-
 tentia sunt imponenda. Efficacius est re-
 medium ad ambusta, si calx viva in deco-
 cto raparum extingatur, & ipsa aqua
 Epithematis modo, inflammatis partibus
 imponatur, dolorem enim citissimè au-
 fert, & brevi tempore perfanat. Ex calcis Psyllo-
 viva & auripigmenti ana ʒ. s. simul con-
 tritis & in acri lixivio decoctis, donec
 pulvis crassitiem consequantur, & si pen-
 na immergatur, ac plumæ decedant, si
 loco aliquo piloso quem glabrum esse
 cupimus, inungatur, pilos omnes radicitus
 evellit. Sed cavendum est statim ubi pi-
 li deciderunt, ne amplius eo in loco re-
 linquatur Pharmacum, quia cutem ex-
 ulcerat, sed abluatur calx aqua, & in-
 ungatur locus ol. rosar. Intra corpus as-
 sumpta calx perniciose infert symptoma-
 ta, similia symptomatibus ex Arsenico as-
 sumpto, aut Mercurio sublimato & can-
 tharid. ut sunt ventr. & intest. ex ero-
 sione cruciatus, faucium & linguæ ari-
 ditas, inexplebilis sitis, Tussis, Respi-
 rationis difficultas, urinæ suppressio, &
 Dysenteria; Non autem ex assumptio-
 ne calcis duntaxat talia excitantur sym-
 ptomata perniciose.

Vfus ejus
 præsentiss.
 in ambu-
 stis, ta-
 xantur
 Chirurghi
 impru-
 dentes.
 Aliud in
 ambustis.

Psyllo-
 tron.

Cautio.

Noxa
 calcis
 assumpta.

Inspiratio
 ex calcis
 vaporibus

ptomata; verum etiam ex calceis vapore nidoreque per inspirationem intra corpus hausto. Quare sedulo cavendum est, ne diutius quis in conclavibus calce noviter illitis commoretur: ea ratione vaporis extinctus est nobiliss. & prudentiss. vir Georgius à Platen Rugiæ Præfectus, qui cum Wolgasti in nuptiis Ducis Ernesti Ludov. clementiss. nostri Principis, in conclavi pridie calce oblinito, commorari cogeretur propter hospitiorum penuriam, & in Peripneumoniam, Catharrum, Tussum, & inextinguibilem sitim incidit, & paulo post interit. Pari ratione cavendum est à largiori potu vinorum, quæ in loco calce scaturiente nata sunt, qualia sunt: Hungarica, Gallica & Misnicorum pars bene magna, ex quorum largiori potu non tantum præscripta symptomata, sed & ardentes febres, nervorum contractiones, & paralysis excitantur.

Cnratio.

CVRATIO SYMPTOMATUM ex calce perficitur potionibus lenientibus & lubricantibus, calcisque acrimoniam refringentibus; Conveniunt itaque per os crebra potatio decocti rad. & se. Mal. Alb. se. Lini & Syr. Violar. & pulp. cass. Per intestina autem conducunt Clysteria ex decocto Malva Pulpa Cass. & Mucag. sem: Psylli confecta. In cibo verò prosunt Butyrum rec. Lac tepidum, cremor prisanæ, Avenacea & eriza cum lacte cocta. Antidotum veneni calcis est 3 1 1. Terra Lemnia cum aq. rosar. aut lacte assumpta. Plura quæ ad curationem attinent ex curatione Arsenici & cantharidum peti debent.

Vitrum quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Vitrum. Consideratio vitri Theologica.

Υἱαδὸς seu υἱὸς Vitrum: pulcherrima in Vitri conficiendi ratione imago nobis proponitur resurrectionis corporum nostrorum in novissimo die. Vt enim artificis manus ex cinere constat splendidissima corpora vitrea, ita Filius Dei ex cinere corporum nostrorum excitabit pulcherrima & quovis cristallo splendidiora animalibus nostris organa, in quibus æterna

lætitia Conditorem nostrum celebrare queamus. Constat vitrum ex cinere & arena combusta. Plinius lib. 36. cap. 26. *Preparatio.* dicit vitri conficiendi rationem primum à nautis in litore repertam esse, qui cum ad arenosum litus appulissent, in navibus nitri glebas ferentes, & lapidibus destituti, fornaces ad coquenda edulia extruere volentes, nitri glebas in arena pro lapidibus disposuerunt, quæ Nitri gleba ex succenso igne liquefacta, arenæque candenti mixta, in vitream substantiam confluit, ac concrevit, & inde tandem artificium excogitatum esse, ut ex violentia ignis ex cineribus nitidissima vitrea vasa conficerentur. Idem Plinius scribit atate Tiberii Imperatoris eam fuisse excogitam vitri temperiem & conficiendi rationem, ut vitra æquæ ac metalla malleo extendi & ductilia reddi potuerint. Quod Tiberius, Caesar agnoscens, totam officinam artificis abolevit, & destruxit, ne auri & argenti pretio deraheretur. Nobilissima vitra sunt ex cineribus & fragmentis cristalli lapidis combustis & liquefactis, quæ vitra cristallina vocantur. Et si autem vitrum ex cineribus conficitur, non tamen ipse cinis naturæ & substantiæ est vitri, sed ipsa humiditas radicalis purissima, quæ per substantiam corporum incineratorum sparsa erat, & ex violentia ignis in operatione vitri confluit. Extat in officinis salis cujusdam fusi species, quam Fel vitri vocant, nostri Glassgall / quo aurifices quandoque in penuria boracis utuntur. Ejus naturæ mentionem nemo hactenus, quod quidem sciam, fecit: Existimo tamen fel vitri non esse aliud, quam spumam ex liquefactis vitris. Veterinarii jumentorum Medici pulv. hujus fellis vitri in equorum oculos sufflant, ubi equi ungue, id est, pellicula in oculis pronata, laborant & excæcantur, eam enim hic pulvis erodit, abstergit & extirpat. Symptomata vitri assumpti similia sunt symptomatibus Arsenici & calcis vivæ; erodit enim cum cruciatu internam

Inventio.

Cristallina vitra. Materia vitri. Spiritus Salinis Chymicorum hoc opus peragunt. Fel vitri. quid?

Symptomata vitri assumpti.

internam tunicam ventriculi intestinorum & Dyſenteriam adfert.

Curatio. CVRATIO assumpto vitri matura revomitio est assumpto haustu *aq. calid.* cum copioso recenti Butyro. Conducunt quoque Butyri recentis & pinguiorum jusculorum crebra esitationes, & potationes decocti radic. seminumque lubricantium, ut sunt rad. & sem. Malva, Alib. Lini & fenugraci. Prodest & alvum crebro subducere pulpa cass. devorata. Antidoti loco exhibeantur terra Lemnia aut Boli Arme. 3. i. i. cum lacte tepido. Reliqua ex curatione Arsenici & calcis peti possunt.

Antid. Qui Lapidem venenatam sua proprietate noxii sint hominibus.

Lapides quoque non immerito inter Mineras numerari possunt. Ex lapidibus autem Venenata qualitate maximè imbuti sunt, Lapis Lazuli, Lap. Armenius & Lapis Magnes. Lapis lazuli quid, quæ inferat symptomata, & quibus ea curanda remediis.

Lapis Lazuli. Αἰδὸς νῦν αἰῶνος, Lapis Cæruleus & officinis Lapis Lazuli, nostris Lasurstein / ex quo non secus ac ex argento, ut supra ostendimus, cæruleus color pictorum quem Lasurinum vocant, conficitur. Optimus autem est Lapis cæruleus, qui aureis maculis scintillat, qui tamen rarò apud nos reperitur: Invenitur autem copiose in Germaniæ fodinis, qui probè & multum elotus ac præparatus, in officinis aliis medicamentis ac potissimum pillulis è lap. Lazuli vocatis commiscetur, cujus vires sunt atram bilem evacuare, & inde natam insaniam tollere possunt. Crudus autem non elotus lapis cæruleus, si intra corpus assumatur, symptomata infert, cruciatum & subversionem ventriculi & tormina intestinorum, anxietatem & vomitionem, & sinistri hypochondrii dolorem; Erodit enim, & putrefacit sua proprietate. Horum symptomatum ex lap. Lazuli curationem præcedat vomitio cum haustu *aq. tepida*, aut cum *aq. Juniperi* per descensum destill. Deinde subducatur alvus per clysterem ex decocto Malva, Hord. & viola.

Nota opt. lazuli.

Extr. lap. lazuli inſigne in mania & melancho. affectionibus.

Nota. Curatio.

cui pulpa cass. & ol. rosa, est commixtum. Conſert & crebra potatio lactis caprilli tepidi, & esitatio recentis butyri & cremoris pitana hord. Antidotum ejus est pul. ex succ. Antidota cino albiss. & coral. rub. præp. ana. 3. 5. cum vino assumptus.

Lapis Armenius quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Lapis Lazuli & Lap. Armenius in eis Lapidem fodinis non tantum in Armenia, sed Armeniæ, in Germania, & in eadem gleba eruta, promiscue reperiuntur, & nec viribus aut efficacia admodum inter se differunt, nisi colore & substantiæ densitate; colore enim Lapis Lazuli cæruleus est; Armenius autem æruginis colorem ex cæruleo vireſcentem habet, & mollior friabiliorque, i. e. frangibilior est, quam Lapis Lazuli.

Lapis Armenius per crebras ablutiones præparatur, ut de Lap. Lazuli est dictum, inter Lap. & pondere à 3. j. ad 3. j. cum aliquo liquore exhibitus, teste Alexandro Tralliano, Melancholicam colluviem & infra expurgat, & Melancholicos morbos, dementiam, lepram & similes tollit. Non præparatus autem si intra corpus ingeratur, eadem infert symptomata, quæ Lap. Lazuli, & eisdem curari potest remediis.

Lapis Magnes quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Αἰδὸς μαγνήτης, ἢ σιδηρεὺς, i. e. Lapis Magnes. Magnes aut ferreus, qui & Lapis Herculeus dicitur, nostratibus ein Magnet oder Siegelstein. Eruitur Lapis Magnes in montibus Hercinia circa Goslariam, ut plurimum colore ferreo vel ex nigro rufescens. Duo memorabilia miracula conspiciuntur in Magnete, quorum causas nullus Philosophorum hæctenus reddere potuit. I. Quod Magnes sua substantiali forma & sympathia latenteque proprietate ferrum validissimè ad se alliciat, ac trahat non tantum proximum, sed & per aliud ferrum Magneti adhærens, ita ut acus adhærens magneti aliam acum, & ea rursum aliam atque aliam, usque ad septenarium numerum ad se trahat, & alia

*Acus
nautica.*

ab alia dependeat. II. Est ferreus index in nauticis & horariis pixidibus, quas Plinius *Verfonas*, nostri autem *clin Compas* vocant: is, inquam, index sua alterâ extremitate, perpetuò in Boream versus polum Arcticum se convertit. Ejus itaque beneficio nautæ omnes suos cursus dirigunt, & perficiunt; Magnetum tamen ejusmodi *ἐνέπρεσα* attrahendiferri hebetatur & extinguitur; si Magneti apponatur gemma Adamantis aut sapphyrialbi, aut si obliniatur succo Allii, aut oleo aliavè pinguedine; Magnes intra corpus assumptus id tantum symptoma infert, ut rationem perturbet, & Melancholicam insaniam excitet.

*Noxa as-
sumpti.*

CURATIO ejusdem symptomatis est matura evomitio assumpti Magnetis, exhaustis prius ζ V. aq. Iunip. per descensum destillat. Aut assumptis gr. iij. Vitri Antimon. cum ζ j. conserv. Rorism. ac deinde confert alvum quoque Clystere ex decocto Malva, Aliba. Beton. Scordii & Melilot. parato, cui Hyera simplex & ol. Amygd. dulc. sit admixtum, subducere; aut intestina evacuare ζ X. pulpa cass. Antidotum veneni Magnetis sunt, ζ 11. Ther. Andr. aut seq. pul. ζ 1. R. Auri puriss. deasf ζ 1. Unicornu, aut ejus loco cornu cervi: circa calend. Septemb. capti. coral. rub. prap. ana ζ j. Misc. f. pul. qui cum vino exhibetur.

Antid.

Vapores venenati in montium cavernis & specubus qua inferunt symptomata, & quibus eadem curanda remediis.

*Vapores
& halitus
venenati,
diversi-
modè ex-
citantur.*

Ἄλμς, vapor, vel ἀναπνοή, halitus, est quælibet exhalatio à calore in visceribus terræ contento excitatus, sive is sit humidus, sive siccus, squalidusque. In fodinis & cuniculis montium sæpe venenati vapores excitantur, qui tanquam densæ nubes elevantur adeò perniciosi, ut nisi fossiles metallorum in montibus existentes proni in terram se prosternant, & respirationem contineant, eos omnes suffocari necesse sit; & tamen ex tali vapore, ut plurimum

respirationis difficultatem & nervorum convulsionem concipiunt. Simile quid accidit quoque ab aëre in cellariis & specubus longo tempore occlusis corrupto & putrefacto, si quis temerè eos ingreditur; is enim per respirationem aëris corrupti intra corpus hausti in subitam incidit vel Epilepsiam, vel Apoplexiam atque strangulationem. Fit quoque exhalatio & evaporatio venenosa è poris terræ initio Veris, ubi primum per calorem Solis terra se aperit, quæ & ipsa corpora facile inficere potest, si ea aut per inspirationem & perspirationem in poros cutis trahatur: attracta enim statim excitat aut catharrum, aut paulò post febres, scabiem & totius corporis intumescantiam. Ad id genus veneni referri quoque debet fumus virulentus carbonum diuturnitate in terra putrefactorum, is enim quoque facile meatus cerebri obstruit, & epilepsiam, Apoplex. suffocationesque excitat. Symptomata itaque venenatæ evaporationis & putrefacti aëris in montium cavernis sunt, subita strangulatio & respirationum difficultas, & nervorum convulsio. Aëris autem corrupti in cellariis & specubus occlusis sunt, Epilepsia & Apoplexia, similiter & fumi putrefactorum carbonum, aëris verò crassi ac densi è poris terræ Vere evaporantis symptomata sunt: Catharrus, scabies, febres & corporis intumescantia.

*Noxa ha-
rum ex-
halatio-
num.*

CURATIO præservativa à venenatis vaporibus, est studiosè cavere, ne quis temere se in cavernas montium aut specus, cellariaque diu occlusa intromittat, aut nidorem fumorumque putridorum carbonum aut putrefactorum lignorum respirando attrahat: ubi verò quispiam vel necessitate coactus, vel per imprudentiam à venenata exhalatione putrefactoque aëre in numerata symptomata incidat, singulorum symptomatum Curatio ex suis locis in superioribus descriptis peti debet. In genere autem, conveniunt, in ejusmodi symptomatibus, suffitu & suavis odor-

*Prophyla-
xis.*

odoribus spiritus refocillare, & meatus obstructos per vomitionem haustu prius *aq. Iuniperi* referare, & nervos contractos per confricationes linteorum calidorum partium affectarum corroborare, ac deinde partes affectas, item cervicem, & tempora cum *aqua Lavend.* & momento *ol. ex gra. Iuniperi* confricare. Antidoti loco conveniunt aut *z. i. Ther. Andr. aut gut. 7. ol. Angel. cum vino generoso exhibere.*

Enses sagittaque Veneno imbuta qua inferant symptomata, & quibus curanda remedijs.

Arma venenata.

Oportune hoc loco & symptomata per arma venenata corporibus illata inferi posse, nobis visum est, cum & armorum materia ex montibus eruatur, quæ per se satis cum sint noxia generi humano, per abusum & veneni infectionem longè efficiuntur perniciosiora; talia siquidem venena gladijs & jaculis illita, si cum eis vulnera inferantur, citissimè illud virus ad partes principales repit, & exitium infert, aut ipsam læsam partem adeò corrumpit & putrefacit, ut vel nullam, vel difficillimam admittat curationem, nisi maturè venenum è vulneribus extirpetur, ejusque violentia infringatur. Non hominum sed caecodæmonum est inventum, arma veneno imbueret: ideo et si *Dioscorides* venenum, quo *barbari* suas sagittas illiniebant, generali vocabulo *trigov* vocet, quid tamen per *trigov* intelligi velit, minimè explicat: non est enim boni viri, rem universo generi humano exitiosam patefacere aut edocere. Vbi itaque vel certo constet, vel ex quibusdam indubitatis signis deprehendatur vulnus per arma toxicata esse illatum, confestim curatio est auspicanda, & ante omnia oportet prudentem Chirurgum è vulnere venenum prolicere, & venenatum infringere; Elicitur autem venenum sanguinem infectum exprimendò, & vulnus diligentissimè eluendo cum *vino rubeo tepido* in quo incocta sint *scordium*, *centaur.* *Agrimo.* & *Veronica*, & statim vul-

nus obliniendum & confricandum erit *Linim. ex Linimento ex flore Sulphuris & Saliva jejuni ac sani hominis confecti.* Si verò suspicio sit, venenum ex vulnere jam ad partes principales & viscera sepiisse, statim vomitu expurgandum venit, assumpto prius haustulo *aqua Iuniperi per descensum quomodo destill.* aut haustu *aq. tepida*, cui *ol. olivæ* abunde sit admixtum. Post vomitum subinde ea exhibeantur remedia, quæ veneno adversantur, & partes principales corroborant, qualis est sequens haustus: *R. Vini rubei in quo candens aurum sit ex-Sudorific-tinctum. z. III. succ. agrimo. desp. z. i. Bo-li Arme. veri, coral. rub. præp. ana z. ss. fiat haustus diaphoreticus, cum quo sudet æger ad unam aut sesquihoram.* Inter sudandum verò corroborentur spiritus vitales sequenti Epithemate, cordi imposito linteolis duplicatis excepto, *ex z. VI. Aq. Rosar. Aq. Melis. z. III. Vini generosi z. ij. Aceti rosa. z. i. simul confusis admisceantur Sp. cordialium z. iij. fiat Epithema.* Antidoti loco quotidie exhibeatur *z. i. sequentis pul. cum haustu vini: R. sem. citri ex-corticati z. i. Aristol. rot. Asa foetida, Myrrha ana z. 5. cort. Arant. Rhab. el. ana D. 11. Coral. rub. præp. gr. III. commisce-* Venenum antur, fiat pul. tenuiss. Vulneri autem statim post primam ablutionem & mundificationem imponatur frustum pro vulneris magnitudine, aut pulli gallinarum, aut cæ-telli, aut ovis viventis & recens descripti. Aut si vulnus tantillum fuerit, ut cucurbitula medica contegi queat, eidem imponatur cucurbita, & venenum eliciatur, quo facto vulnus quotidie bis cum *vino præscri-pro* eluatur & abstergetur. Sequensque *Empl. Consoli-* ad consolidationem usque imponatur. *Ca-dan.* vendum autem ne vulnus ad cicatricem *Cantio:* deducatur, donec omne venenum sit extractum ac devictum. *R. Galbani. Asa foetida ana. z. i. quæ simul in aceti rosac. q. s. liquefiant ad lentum ignem, & liquefacta per rarum linteolum colentur, ac ad mellis crassitiem lento igne deducantur, quibus tandem admisceantur z. ij. Empl. Basilico-nis, quæ*

*Venenum
us ex
vulneri-
bus elici-
endum.*

nis, quæ simul in massam coacta extendantur per linteolum, & vulneri instar aliorum Emplastrorum imponantur.

SECTIO. IV.

De venenis ex animalium familiâ proficiscentibus.

Qua sint venenatorum animalium præcipua genera hominibus perniciem inferentia, & quot modis perniciem inferant?

GRACÊ *ῥῥῥῥῥῥ* *Discorides* vocat omnia animantia, quæ venenum ciaculantur, & sua virulentia perniciem inferunt, quorum quæ in nostris hisce Borealibus regionibus communiora sunt, hoc loco breviter recitabimus, & hac in tabella complectemur.

Ex genere Insectorum	{ <i>Cantharides</i> , <i>Buprestes</i> , <i>Papiliones</i> , <i>Eruca</i> , <i>Araucus</i> , <i>Vespa</i> , <i>Apes</i> .
Ex genere Reptilium	{ <i>Serpens</i> , <i>Vipera</i> , <i>Hydrus</i> , <i>Scorpio</i> , <i>Bufo</i> , <i>Rana</i> , <i>Basiliscus</i> .
Ex genere Aquatiliū	{ <i>Torpedo</i> , <i>Pastinaca</i> .
Ex genere Quadrupedum	{ <i>Canis</i> , <i>Felis</i> , <i>Lupus</i> , <i>Glires</i> , <i>Vespertilio</i> , <i>Cervus</i> .

Hominis virus, præsertim lingue, reliquor. nocentissimum.

His addi debet *Homo*, ut animalium nobilissimum & divinum, ita per morsum ac depravationem *Sathanæ* virulentissimum. Ex his autem alia inficiunt homines, aut sui assumptione intra corpus, aut ictu, aut morsu, aut contactu sui virulenti madoris, aut spiritus venenati ejaculatione. Assumptione nocent *Cantharides*, Ictu *Scorpiones*, & *serpentes*, Morsu *canes rabiosi*, contactu *Bufones*, spiritu *Basiliscus*. *Cantharides* quid, quis eorum Medicus usus, & qua inferant symptomata, quibus item remediis curanda.

Cantharides.

Kantharides Græcis, scarabaum significat, est *Asfer* Quorum plura sunt genera, ex stercore boum & Equorum generata. Ex

scarabæorum familiâ sunt & cantharides; per diminutionem sic dictæ, q. parvi scarabæi. *Cantharides* itaque Germanicè *Goltwurme* oder *Hispanische Fliegen* sunt infecta, seu vermes volitantes magnitudine vesparum, pulcherrimo colore ex viridi in aureum splendentes. *Cantharidum* pulvis si cum fermento acido commixtus, instar Emplastri cuti imponatur, per unam & alteram horam vesicam excitat serosi humoris plenam: ac si diutius imponatur, carnem & cutim erodit, ideo in dentium doloribus ponere aures impingere solemus, & excitatam vesicam perforare, serosumque humorem exprimere, quo expresso dolor cessat dentium, sublata ejus causa. Tumorū quoque aperientorum gratia eadem ratione imponimus. Symptomata cantharidum assumptionis præcipuum est, Exulceratio vesicæ & meatus urinæ; sua enim forma substantiali & occulta proprietate cantharides assumptionis statim deferuntur; ideo earum assumptionem sequitur stranguria, siue urinæ stillicidium, & cruentæ urinæ proflatio, & virgæ exulceratio, Deinde paulatim inflammatur & epar, & eroduntur intestina & immensi dolores in Hypogastrio excitantur, quos dolores, mentis alienatio & mors subsequitur, nisi propere venenum expellatur, ejusque vis infringatur.

CURATIO cantharidum consistit in cita evacuatione. i. per vomitionem, assumpta prius aqua tepida cum ol. violar. mixta, quæ aliquoties reiterari debent. Deinde per alvi subductionem cum acri clystere ex decocto *Malva*, *Alib.* *Viola*. centaur. mi. cum quibus 3. s. pulpa colocynth. in peria ligata sit concocta, cujus colatura admisceatur. ol. Rosar. & Elect. Diaphor. Deinde crebè euseteger *Orizani* cum lacte caprillo, cremorem *Pisana*, *Butyrum recens* cum mucag. ex so. cito. mixtum. Præterea lac caprillum, juncula pinguis & carnes pingues, quales sunt *Porcinæ*: in potu vero

vero usurpet lac Amygdal. aut lac ex nucleis pineæ & sem. papa. albi & Alkek. cum. aq. hord. paratum, vel lac ex 4. se. frig. cum aq. lactis. factum. Conferunt quoque Syr. Nymph. & violarum: Astum enim & inflammationem viscerum sitimque restinguunt. Deinde si dolor in intestinis perseveret, optimum erit alium chlysterem lenium ex decocto rad. Alib. se. Lini & Malva factum ac cum ol. viol. mixtum intestinis infundere: Foris verò profunt Epith. ex suc. semper virvi, portula. & Lactu. simul mixtis lineolisque duplicatis exceptis Hypogastrio imponere & ol. viol. inungere. Virgæ meatui exulcerato mucago ex se. Citonior. cum. aq. Rosac. facta immittatur ad doloris lenitionem; Antidotum est sequens pul. ad omnia symptomata utilissimum:

Antid.
cus.
R. Troch. de Alkek. Terra Lemnia ana 31. exhibeatur cum vino dulci aut lacte Muliebri, Sunt, qui ex Galeni decreto utantur pul. cantharidum contra cantharides tanquam antidoto, præsertim ad urinæ suppressionem. Sed cum ea Galeni sententia mihi sit suspecta, non suaderem quemquam in alieno corpore illud experiri.

Buprestes quid, qua inferant symptomata, & quibus ea curanda remediis.

Buprestes. Buprestes, nomen à Bobus obtinuit. Nam boves & jumenta Bupreste verme devorato, paulo post intumescences disrumpuntur, nostrates eñ Knolster oder Qualster vocant. Est autem Buprestis vermis duriusculum corticem præ aliis habens, quemadmodum scarabæus, quem nostri eñ Kefer vocitant. Duæ sunt Buprestis species, una nigra altis pedibus per pascua incedens; alia est quæ in sylvis pineis, per arborum cacumina reptat ac volitat, & inde pinorum Eruca nominatur, quæ

Eruca pinorum.
appropinquante hyeme in arboribus se carioso velleri implicat, in coque immoritur, & in semen resolvitur, ex quo rursus adventante vere reviviscit, ac regeneratur. Hoc lanugosum involucrium pineæ erucæ sanguinem erumpentem ci-

tissimè sistit, si loco affecto imponatur; sed pineæ Eruca sive buprestis pini non reperitur facilè. Symptomata ex assumptis intra corpus buprestibus hæc subsequuntur: Ventriculi & Intestinorum erosio, dolor & totius ventris instar Hydrosumptarum. Noxa asumptarum. pis intumescencia, & urinæ suppressio, reliquæ cantharidum assumptarum accidentia.

CURATIO assumptarum Buprestis. Curatio. stium per omnia ferè similis est curationi cantharidum, videlicet evacuatio per vomitionem & alvi subductionem cum clystere. Sed peculiari antipathia plurimum confert crebra positatio decocti ficum aridarum, cum musto aut vino, & crebra esitatio dactylorum. Antidotum ejus est lac muliebri indies ex uberibus factum.

Eruca & Papiliones quid, qua excident symptomata, & quibus eadem curanda remediis.

Käpuz, Erucæ, nostratibus Rupen. Eruca papilionæ. Erucæ vocabulum & oleri tribuitur à Medicis, nostrates weissen Gemp nominant, de quo hic nobis non est sermo. Sunt porò Erucæ vermes oblongiusculi, arboribus & oleribus perniciosi, una enim nocte & folia olerum & flores ac novos fructus arborum pomiferarum & quercuum absumere & depopulare possunt, fructuumque caritatem totius anni inducere. Erucarum tres sunt species cognitæ. Una, quæ arborum pomiferarum & quercuum frondes depascitur, quæ in lanuginosis instar telis aranearum involucriis per frondes arborum verno tempore generatur, ex semine milii granis similibus; primum oblongiusculi efficiuntur vermes, & deinde alas crustaceas acquirunt, & per arbores volitant. Altera species generatur in olerum, ac præcipuè Brassicarum foliis ex stercore papilionum, quod simile est granis milii. Tertia Erucarum species, sunt vermiculi illi admiratione digni, quos vermes sericeos, die Seidenwurmer nominant, qui per ætatem serica fila texunt, adveniente autem Autumno & perfecto opere,

opere, involucrium lanosum tenui pelliculæ simile, tanquam sepulchrum sibi parant, in eaque capsula emoriuntur, & in semina milii granis similia resolvuntur; quæ adveniente Vere, si in Solis radiis ponantur, reviviscunt, ac paulo post in vermes transformantur, priorem formam recipiunt: in quibus etiam venusta Resurrectionis imago nobis proposita est.

*Bombyx
imago
Resurre-
ctionis.*

PAPILIONES sunt vermes alati & circumvolitantia animalcula, omnium levissima & imbecillima, quæ ut generantur ab exiguis vermiculis, sic etiam ex limo & excrementis maris in putredine terræ à calore Solis productis, ex quorum stercore generantur Erucæ in oleribus. Plures sunt Papilionum species, colore, figura & magnitudine differentes, quæ omnes ut Erucæ, venenatæ sunt. Cum Erucæ, ut dictum est, infestissimi sint vermes hortis, eos extirpare docet *Plinius* hac ratione; ut si caput equæ demortuæ palo suffigatur in hortoque collocetur; aut si in horto suspendantur cancri fluviatiles, Erucæ ab eo loco abigi & extirpari. Aut si in horto inter olera, vervecis recenter mactati ventriculus, unâ cum excrementis, terra leniter cooperiatur, post biduum, ad eum confluere omnes Erucæ pedibus conterendas; sed certius remedium judico, quod *Columella* tradit nimirum ut post pluvias ex arboribus manu colligantur Erucæ; aut ut manè concussis frondibus arborum, quibus insident, conculcentur, torpentes enim frigore noctis semel delapsi nunquam amplius sursum repere queunt: sed his omnibus magis certum esse puto, ut arbores suffitu styracis, aut etiam picis per aliquot dies fumigentur. Symptomata Erucarum ac papilionum intra corpus assumptorum sunt ventriculi, oris, linguæ, & gulæ inflammatio, & dolor pruriginosus, ac tandem totius corporis exæstuatio.

*Suffitus
pro arbo-
ribus.
Noxa as-
sumpta-
rum.*

*Curatio.
Antidoto-
rum. T.
pica.*

CURATIO similis est instituenda, qualem in Cantharidum curatione proposuimus. Antidotum est terra Lemnia &

coralli rubei præp. pul. cum Mucag. se. citon. Foris optimum est corpus inungere ol. citon.

Araneus, Phalangia, & Tarantula quid, qua inferant symptomata, & quomodo curanda?

Aegærus, Araneus, cine Spinne, est Araneus, vermiculus, tuguriis pauperum familiaris; qui tenuissima retia & tela ad capiendas muscas in domorum angulis textit, quæ tela Spinnenwebbe nominantur. Plures sunt Araneorum species, quantitate & colore differentes. Et si autem Araneus venenato madore turgat, habet tamen non contemnendas utilitates. Quicquid enim veneni in domestico aëre continetur, id in se allicit & absorbet. In medicatione quoque si Araneus vivus inter duo nucis juglandis putamina inclusus, collo appendatur, & donec moriatur, gestetur, Quartanæ febris & Ictericæ mederi, multorum experientia probatum esse fertur. Quia & telæ araneorum in vulneribus recentibus impositæ, sanguinis eruptionem subito sistunt, & vulnus ab intumescencia præservant. Domestici itaque aranei per se nemini sunt noxii, nisi per imprudentiam compressi, cuti inhæreant, & madore suo cutim imbuant. Aut nisi casu in esculenta & potulenta delabantur, & cum eis intra corpus ingerantur; tum enim sequentia inferunt Symptomata; Ap-
Noxa.

petentiæ prostrationem, Epatis debilitatem, corporis intumescenciam, & Ictericam; quæ tamen mala in principio facile curari possunt, si ebibito haustulo aq. lunip. per descens. destill. aut assumpta Curatio. 3. 1. pul. catulorum seu flo. juglandis arbo. aranei vomitu rejiciantur; ac postea loco Antid. 3. 11. Theriac. Andro. cum haust. aq. Card. Bened. aut vini exhibeantur, sudorque proluciat, atque corpus cum ol. Hypericonis, cui Theriaca nonnihil sit adjectum, illiniatur. Sunt & ex araneorum genere animalcula, quæ & Græcis & Latinis Phalangia nominantur, nobis cine Welsche Spinne, in hisce tamen regionibus Bore-
*Phalan-
gia seu
Phalan-
gia.*

*Aranea-
rum Spe-
cies.*

*Usus &
utilitas.*

*Periap-
ton.*

alibus ignotæ; quæ araneorum grandiorum formam obtinent, sed domesticis longè majores, & veneno perniciosiores, morſu icſtuque hæc ſequentia inferentes *Nona ex illis.* Vulnus inſigunt adedò exi-
le, ut viſu deprehendi nequeat, ſed ex dolore & livida intumeſcentia loci demorſi dignoſci poteſt, quod tamen paulò poſt ſubſequitur faciei pallor, artuum tremor, & totius corporis intumeſcentia, ac deinceps ſudoris frigidi eruptio, continuum emingendi ſterile deſiderium, lachrymæ involuntariæ, ac poſtremò, neglecta curatione, mors.

Curatio. Maturataque CURATIO à Phalangiis icſtis adhibenda eſt, & initio exhibeantur *3. 11. Theriac. Andro. cum vino optimo, aut aq. Scord. & ſudor provocetur, deinde mane ac vesp̄i tepidus haustus vini in quo rad. Asparagi. scord. & herba aut ſemen Aparinis ſint incocta*, qui quotidie propinetur, donec corpus detumefcat. Foris verò, ut dolor mitigetur, *Balneum.* collocetur æger in balneum aq. cal. & vulneri imponatur *catapl. ex cinere Fraxini arboris, ſale, nitro, ſulph. ſimul cum vino mixtum.* Tumor quoque tum vulneris, tum totius corporis poſt ſudoris proſuſionem probè abſtergatur *lixivio tepido ex cinere Fraxini & aceto facto, ſpongiaque excepto.* Prodeſt denique corpus tumidum obvolvete *catapl. ex far. hordei, ſtercore capril. p. a. & q. ſ. vini & mellis, ſimulque in Cataplaſmatis formam redactis.*

Tarantula. TARANTULA Italorum quoque eſt vermis, magno araneo ſimilis, utrinque ternis pedibus & cauda aculeata & venenata præditus, qui in arborum ſegetumque cavernulis ac rimis latitat, & in æſtate progrediens, meſſores incautos pernicioſo vulnere pungit. In plerisque Italia locis, maxime in *Apulia*, familiaris eſt hic vermis; in noſtris autem Borealiſibus regionibus nomine ſolo notus eſt, ideo illum ſilentio præteriſſem, niſi admiranda ſymptomata, quæ ex ejus morſu contingunt, & eorum æquè mirabilis curatio, commemoratione

digna mihi viſa fuiſſent. Quemadmodum vinum meracius, largius potum, varios animorum affectus concitat, pro diverſitate temperamenti bibentium: Ita icſti ab *araneo Tarantula*, pro diverſitate temperamenti corporis, variis afficiuntur animi paſſionibus. Sanguinei enim exilarantur, rident, ſaltant & indefinenter tripudiant: Pituitoſi à *Tarantula* icſti torpent & continuè dormiunt, & ſudore frigido madent; Bilioſi crebè vomunt, irascuntur, rixantur & Phrenetici redduntur: Melancholici verò, mœrore afficiuntur, contriſtantur, & variis phantaſmaris terri-
Curatio. tantur, & in maniam incidunt. Ex iis ſanguinei facilius curantur ſolis Muſicis inſtrumentis, ad quorum ſonum avidiſſimè tripudiare & ſaltare geſtiunt; ac ſi ſine intermiſſione Muſices, edò uſque ſal-
Curatio. tarent, donec venenum per ſudorem & inſenſibiles evaporationes diſcutiatur, ſtatim liberantur ac ſanantur. Initio itaque in omnibus temperamentiſus *Theriac. Androm. 3. 11. cum vino* exhiberi debent; & ad ſudoris propulſionem cogi. Deinde pro temperamenti cujuſlibet ratione, prædominans humor jam veneno inſectus ſubducendus eſt; ac tandem ea ipſa remedia, quæ paulò ante de phalangiarum icſtu commemorata ſunt, & intra & extra corpus exhiberi & applicari poſſunt.

Apes, Vepſæ & Crabrones quid, & qua icſtu ſuo inferant ſymptomata; & qualis eiſdem debeat adhiberi curatio.

Meliden, Apes, die Immen / σφίγες, Apes. Vepſæ die Bromſen / Ἀνθρῶναι, Crabrones Vepſæ. die Hummelen / ſunt congenera inſecta, mellificantiæ, aculeata, volitantiaque; icſtu morſuque ſuo noxam inferentia. Ex iis Apes ſunt nobiliſſima animalcula, & humanæ vitæ utiliſſima, ut quæ hominibus mel, & Commoda ceram, præſtantiſſimis medicamentis, ex apibus, gratis, magno cum quæſtu ſubminiſtrant. Propoſuit nobis Deus in apiculis pulcherrimam imaginem juſtæ & optimè conſtitutæ Reipublicæ, & illuſtria exempla multarum virtutum; pietatis, beneficentiæ, caſti-

tatis, justitiæ, providentiæ, sedulitatis; parsimonix & reverentiæ, ac obedientix erga Magistratum; quæ omnia à nobis in *peculiari oratione de Regia Apum Republica in hac Academia publicè declarata sunt*: quæ hoc loco *prope* esse judicamus. Admiratione dignum est Apes in alios homines tam esse benignas ac propensas, ut etiam laceffitæ & catervatim ei insidentes, tamen minimè pungant, aut noxam inferant; in alios verò adeò infestos, ut eos extremo prosequantur odio, si propius astiterint, & suos aculeos omnes cum suo intercidio jaculentur; moriuntur enim ubi aculeum amiserunt, disruptis interioribus. Non aliud symptoma inferunt apes suo ictu, præter acerbissimum & pungentem dolorem, & aliquam loci puncti rubedinem. *Apum ictus CVRATIO facilis est*, si statim aculeus in vulnere hærens artificiosè vel unguibus, vel acu extrahatur: & si fieri non queat, locus punctus fomentetur & irrigetur *aq. calida marina*; deinde vulnuscule imponatur *folium Malva aceto imbutum*, aut *catapl. ex farina hordei*, & *pul. fol. Malva cum aceto simul mixtum*; aut imponatur herba *Melissa viridis* contusa. Verum hæc omnia superat in dolore sedando, si apes captæ & contusæ, cataplasmatibus modo ictu loco imponentur.

Vespæ ex genere sunt Apum, sed nonnihil majores & longiores, quæ nullam hominibus præstant utilitatem, sed longè acrius & violentius pungunt, quam Apes, nec inter pungendum aculeos amittunt ut Apes. Symptoma excitant vespæ præter acerbum dolorem, etiam loci puncti tumorem cum rubore; sed & hæc symptomata iisdem pharmacis, maderi possunt, quibus Apum ictus. In genere autem præstat loco affecto hæc sequentia imponere: *Catapl. ex stercore bubulo, cum aceto temperatum*; Aut *Catapl. ex campho. & ol. Rosæ. contritis paratum*. Leniunt dolorem & lenticula palustres cum aceto contrita & loco puncto impositæ. Simili-

ter & *aq. rosar. linteolis excepta & applicata*. Similiter *fol. Sissimbrii aut Melissophylli* contusa & imposita. Crabrones quoque sunt ex Apum genere, sed Apibus Vespisque majores, rotundæ, nigræ, hirsutæ, & circulo luteo intersectæ, quæ cum bombo seu murmure volitant. Crabrones ictu suo similia Vespis symptomata inferunt, quibus eisdem remediis succurrendum est.

Serpens quid, & qua serpentum species.

**Opis, Anguis, sive Serpens, eime Schlan-Serpens.* ge / nomen habet à *serpendo*, quod videlicet *citra pedum adminiculum*, quibus caret, per terram serpat, & convolvatur. Omnes serpentes venenati sunt, & suo morsu animantibus exitum adferunt. Hominibus verò non tantum morsu sunt perniciosi, sed sæpe intra corpus per os & gulum oscitantibus & dormitantibus ingrediuntur, & molestissimis torminibus excruciant. Quin & suo aspectu ex quadam antipathia homines perterrefaciunt: proculdubio vi & efficacia Maledictionis Divinæ in Antiquum Serpentem, ubi scriptum est: *Inimicitias ponam inter te & Semem. Mulieris*. Serpentes verno tempore pellem exuunt, inter duos lapides; & novam acquirunt pelliculam, quas *serpentum exuvias*, Græci *ῥῆγες ὄφιο*, id est *senectam serpentis*, Plinius *vernationem serpentum*, nostri, eime *Schlangen Haut* oder *Schlangen Bauch* nominant. Earum exuviarum utilitas est, teste *Dioscoride*, quod si in vino aut aceto decoquantur, & dolentibus auribus aliquid instilletur, aut eo decocto, dolentes colluantur, statim cessat dolor. Plures serpentum species enumerant Veteres, quæ maxima ex parte in hisce Borealibus regionibus incognitæ sunt, ut sunt *Vipera*, *Ammodita*, *Acontia*, *Αυφιστέρα* sive *Cæcillia*, *Druynus*, *Hæmorrhous*, *Dipsas*, *Ὀφιογενatrix*, *Cerastes*, *Aspis*. Ex his serpentum speciebus Italia familiares sunt *Vipera*, *Dipsas* & *Hæmorrhous*; *Germania* serpentum autem *Species*.

Noxa ex ictu apum.

Curatio.

Cataplasmata ex apibus.

Noxa vespæ.

Curatio.

Crabrones.

Serpens homini multis modis noxius.

Exuvias serpentum.

Multa serpenta.

autem familiares sunt Coluber & Hydrus. De eorum itaque duntaxat moribus, & inde excitatis symptomatibus, eorundemque curationis ratione, breviter ordine tractabimus.

Vipera quid, qua inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Vipera; *Exidia, Vipera*, eineadder/serpens est ferus & virulentissimus, *Italia* familiaris, *Germania* ignotus. Sola vipera inter serpentes intra se semen concipit, & foetum in utero gerit. Non tamen vera est opinio

Vsu Car-
nium
ojm.

Plinii, qui scribit, foetus Viperarum maternos uteros erodere, matrique necem inferre. Sed id verum est, viperas diu parturire, & numerosos foetus parere, singulis diebus unum usque ad 23. Carnem viperinam miris modis celebrat *Galenus* in propullione impuritatum sanguinis ad cutem externam. Ideo Theriaca nobilissima antidotorum genuina parari non potest, nisi caro viperina in pastillos redacta, eidem admisceatur. Narrat præterea *Galenus* 11. *simplicium* duas venustas historias, de efficacia & virtute Viperarum; Unam quam in *Asia* contigisse, & se vidisse testatur, ubi cum quidam Elephantia laborans, à reliqua consuetudine hominum separatus, extra pagum in tuguriolo miserrimè viveret: Messorum ejusdem loci vesperi domum redeuntes, vinumque secum referentes, in quo fortè fortuna *vipera* erat illapsa, & extincta, quod ipsi bibere, tanquam perniciosum venenum, abhorrent, ex quadam commiseratione Elephantiaco bibendum obtulerunt, sperantes ea ratione hominem miserum moriturum, suæque miseræ finem consequuturum. Elephantiacus vino exhausto præter messorum expectationem, adeo non est mortuus, ut altero die omnis lepræ crusta è corpore decideret, & integræ sanitati restitueretur. Altera historia huic non est dissimilis; Erat in *Misia Asia* prædives quidam Elephantiacus, qui ad thermas profectus, habebat secum administram scortum, quæ pertaxa consuetudi-

nis tam sædi heri, ut ab eo liberaretur non inveniebat occasionem, nisi quod viderat in dolio vini, ex quo herus ipsius bibebat, viperas esse illapsas, & in eo extinctas; (mirificè enim delectantur viperae vino) ipsa hac occasione lata, simulans se ignaram esse vino mersas esse viperas, & ipsa quidem ab eo abstinebat, sed domino etiam solito crebrius & largius propinabat; sperans herum brevi à venenato vino interitum; sed quando herus vinum assumebat largius, tanto quotidie à lepra purgabatur magis; & brevi sanitati est restitutus. Unde tandem facta diligenti inquisitione à muliercula, quid novi sibi remedii in esculentis aut potentis exhibuisset, ipsa tandem confessa est viperas in vino quod bibisset extinctas fuisse; & ea ratione tandem caro viperina in usum medicum translata est; & usque in hodiernum diem, Theriaca contra omne venenum, præparata, & in pastillos conformata admisceetur. Pastilli vero ex carne viperina ea ratione conficiuntur: circa initium æstatis capiuntur viperae, eis caput & cauda abscinduntur, ut partes venenosiores; reliqua verò corporis pars à pelle extrahitur, & cum intestinis abjicitur, & aqua salita probè abluatur, caroque in partes concisa cum aqua coquitur, adjecto viridi *Anetho*. Tandem caro à spina separatur, & in mortario diligentissimè contunditur, & singulis uncis carnis viperinae admisceantur *medulla panis ex puriss. farina cocta, epiccata & in pul. redacta 3 ij.* Quæ simul subiguntur in mortario, & in tenues pastillos conformantur, inque radiis solaribus exactissimè siccantur; quotidie verò ne marcescant pastilli invertuntur, & ad usum reservantur. Ex morfu viperarum dira & lethalia oboriuntur symptomata: statim enim post ictum universum intumescit corpus, & faucium vehemens siccitas, & capitis dolor subsequitur: Ex vulnere autem cruenta sanies manat, & circum tumens vulnus pustulae adustæ & nigricantes excitantur; intra corpus epar sensibiliter inflammatur,

Mala ex
vipera
ictu.

quam paulò post biliosæ evomitiones comitantur, in quibusdam accedit sopor & sudor frigidus cum cruenta urina, nisi etiam citissimè veneno occurratur, alios intra 7. horas, alios tertio, alios septimo die interimit.

*Curatio
acceleranda.*

CURATIO itaque celeriter est adhibenda, & violentia veneni infringenda. Ubi itaque quis à vipera demorsus fuerit, vulnus & tumor circa vulnus scarificentur, & cucurbitula imponatur; virusque eliciatur, aut vulneri statim imponatur gallina vivens discerpta, interioribus suis adhuc tepens, idque assiduè repetatur: Interim & vomitio excitetur, assumpto haustulo aq.

Vomit.

Juniperi per desc. destillat. aut multa rad. Raphani comesta, & iterum evomita. Post evomitionem exhibeantur ʒ. ii. Ther.

Antidotus.

Andro. cum vino, quo assumpto sudor eliciatur, ac denuo vomitus procuretur. Postea multum allii devorandum, aut cum vino contusum bibendum propinetur. His peractis succus fol. Fraxini arboris fol. Melissæ cum baccis Junip. contusis parumque vino addito, exhibeantur. Præstat quoque alternatim potandum offerre vinum, in quo cort. rad. fraxini sint incoctæ, commodiss. & pul. Nigella sive Melanthii ʒij. cum eodem vino exhiberi possunt. Itidem præstat & vinum subinde bibitum in quo scord. rad. verbasci rad. Ebuli & bacca Juniperi sunt incoctæ. Similiter utilissimè exhiberi possunt cancri fluviales cum lacte caprillo. contusi & expressi, subindeque bibiti. Foris verò prodest vulnus diu multumque fovere decocto Scordii & Cort. fraxini cum vino. Fraxinus enim arbor eam habet cum omnibus serpentibus antipathiam, ut ejus arboris umbram ferre nequeant. Deinde vulneri Theriaca cum succo fol. fraxini temperata instar Epithematis imponatur, aut ex stercore caprino cum pauxillo vini Empl. paretur, aut imponatur catapl. ex fol. Fraxi. & baccis Junip. simul contulis, aut catapl. ex surf. tritici cum succo ruta confectum. Oportet autem studiose cavere, ne vulnus ex Vipera mor-

Fraxinus arbor serpentis fuga.

Cautela in consolidatione vulneris.

su illatum citò consolidetur, sed diu apertum retineatur, inserta rad. Gentiana vulneri. Ex genere Viperarum quoque sunt hæc tria serpentum, Italiae cognitorum: *Aspis, Amotida, & Dipsas*, viperis non dissimilia, ex quibus Aspis reliquis pestilentior est. Aspidum applicatione Cleopatra Regina subitam sibi necem conscivit; & ex Aspidum quidem morsu vulnus acceptum, aut nunquam, aut rarissimè curatur. Referunt tamen si morsus ab Aspidibus

Aspidis lethales morsus.

centaurium minus cum vino contritum bibendum propinetur, & illud pharmacum vulneratus evomat, nullam restare amplius restituendæ sanitatis spem. Si verò non evomuerit, adhibita diligenti curatione servari posse hominem, applicatis iisdem remediis, quæ in morsu viperæ commemorata sunt. Et propria quidem Aspidum remedia sunt ʒ. i. ol. de Myrrha, aut ʒ. ii. Ther. Andro. cum vino propinata, aut ʒ. i. oppopanacis cum vino diluta

& ebibita, rursusque evomita. Foris autem Aspidum ictibus commodè applicari potest centau. min. cum Myrrha, & pauxillo opio in catapl. formam redactum: similiter & Amotidæ & Dipsades, quæ ab inextinguibili sibi, quam inferunt, nomen habent, tam sunt virulentæ, ut trium horarum spatio homines enecent; in his eadem remedia tentanda erunt, quæ in morsu viperæ sunt prolata. Peculiare autem Antidorum est pulv. Castor. & Menthæ Antidota ʒ. cum Ther. Andro. ʒ. in vino exhibita.

Coluber quid, qua inferat symptomata, & quibus ejus mordicatio curanda remediis.

Opis, Serpens, Anguis, Coluber, Sine Coluber. Schlange oder Schnake synonyma sunt, quæ omnibus serpentibus toti Germaniæ familiaribus tribuuntur, qui verno tempore inter gramina in vepretis, in sylvis cænois, & circa urbium muros, aggeres, circaque loca palustria passim conspiciuntur. Quamquam sint qui Angues in aquis, colubros verò in sylvis degere existimant;

ment; & angues natrices & *idpes* appellant; sed & apud probatos autores hæc omnia confunduntur. Omnes homines inopinato serpentum conspectu perterrefiunt, & ipsi serpentes similiter conspecto homine contremiscunt, & ad cuniculos suos fugiunt; sed tamen si per imprudentiam vel pedibus concutiantur, vel alia corporis parte attingantur, morsum inferunt, & venenum in vulnus injectum ejaculantur, sævaque excitant symptomata. Nos itaque omisiss reliquis serpentum generibus à *Græcis* autoribus recitatis, nobisque incognitis, de communibus hisce & omnibus cognitis serpentibus breviter disseremus. Ut autem supra dictum est, omnium serpentum genera venenata esse, & suo morsu venenata inferre symptomata; ita & nostri serpentes, sive hi in sylvis aut vepretis, sive in aggeribus, sive in locis stagnantibus degant, morsu suo hæc potissimum inferunt symptomata: dolorem tumoremque loci demorsu, deinde virulentæ saniei è vulnere profluvium; nauseam, capitis dolorem, & tandem neglecta curatione subsequitur totius corporis intumescencia, & ipsa denique mors.

Noxæ.

Curatio.

CURATIO Methodus iisdem pharmacis est instituenda, quæ paulò ante in morsu viperæ à nobis est propolita; peculiariter autem ab omni genere serpentum demorsus symptomatibus plurimum prodest *Fragaria herba cum rad. in vino cocta* & bibita: Itidem præstat & herba *Veronica*, quam *Teucrium* esse certum est; aut exhibeatur sequens pul. *R. rad. Gentia. ʒi. Ruta, Scordii, piperis ana ʒi. commisceantur & cum vino exhibeantur.* Aut *R. Herbam frag. cum rad. & sarmentorum mori bati oder Bramberen. M. i. concisa commisceantur, & in vini albi lb ʒi. in duplici vase concoquantur, colato vino admisceatur ʒ. i. Ther. Andro. de eo singulis diebus ʒ. i. calidè mane ac vespere ebibantur.* Aut *R. Ther. Andro. ʒi. pul. cornu cervi in Autumno capiti, Terra Lemnia ana ʒi. qua simul cum ʒ. 4. aceti*

Rosa. mixta ebibantur. Porro foris vulnus *Topica.* ex ictu serpentum scarificetur, & venenata sanies, vel cum cucurbitula applicata eliciatur, aut pullus galliano deplumato vulnere applicetur; & ubi emoritur pullus, novus vivus applicetur, ejusque applicatio eo usque reiteretur, donec pullus vivus remaneat. Reliqua ex curatione morsus viperini petere licebit. Contingit autem, quamvis rarissimè, ut vel pueris, jumentis sua in vepretis & sylvis pascentibus, vel hominibus lassitudine defessis, & hiantes ore dormientibus, serpens intra corpus irreat, qui ventriculi continuam frigiditatem & acerbissimos colicos cruciatus excitat; præsertim ubi diutius à cibo abtineat ager; aut si cibi potionesque & pharmaca, palato serpentis minus grata ingerantur; in ejusmodi casu medicamentis vel extinguere serpentem, vel propelli extra corpus, valde difficile est, & summo cum dolore tentari potest; & tamen experientiâ compertum est, si lac dulce, fervens & vaporans, corpore toto antrosum incurvato, capiteque versus terram inclinato, aperto ori in aliquo vase subji-
Curatio à serpente vivo deglutito. ciatur, ita ut lactis dulcis vapor in guttam elevetur, serpens in ventriculo contentus nidore lactis allicitur, & per os progreditur, & in ipsum lac insilit. Si autem serpens in intestinis delitescat, quod ex frigiditate ventris infra umbilicum agnoscitur; multum proderit, prius vinum bibere, in quo cort. cum rad. fraxini sunt incosti; deinde fumum veterum calceorum, aut fumum serpentum adustorum, aut fumum fol. frax. per fistulam infundibuli intra os assumere ac deglutire: Hac quomodo enim ratione per alvum egreditur vivus serpens. Cavendum autem ne decipiatur Medicus, & sibi persuaderi patiatur quendam serpentem in corpore gerere, nisi ex certis indiciis, ac potissimum frigiditate continua ventris, & torminibus ex fame deprehenderit: Sæpè enim homines Melancholia detenti sibi imaginantur & persuasum habent serpentem & ranas in ventre

*Antidoto-
zans con-
tra
omnium
serpen-
tum pla-
gâs.*

ventre delitescere: id quod & *Galeno* contigit, qui cum ægroto persuadere nullis rationibus posset, eum non habere in corpore serpentem, tandem consensit ægroto, & ipsius opinionem confirmavit, salutaremque ei curationem promisit; obtulit autem Melancholico potionem valide per vomitum purgantem, iussitque ut clausis oculis in pelvim evomeret, ipse verò vivum serpentem, cui virus erat detractum, inter vomendum pelvi injecit, ac ægrotantem inspicere jubet, gratulabundus

Lapis in capite colubri hydropicorum a quas fortis.

in quod à tanto hoste esset liberatus. Nec id silentio prætereundum puto, in capite colubri lapillum contineri, qui hac ratione eximi potest; captus vivus coluber circa caudam funiculo constringatur, & demisso capite deorsum versus terram suspendatur, capitiq; pelvis aqua pura plena subijciatur, ita tamen ne aquam serpentis caput attingat, & ita suspensus anguis altero vel tertio die moriturus in pelvim lapidem eromit; à quo omnis aqua in pelvi contenta, brevi temporis spatio exsiccabitur. Hic lapis si ventri tumenti Hydropicorum alligetur, latenti facultate & substantiali forma aquam Hydropicorum exsiccabit.

Scorpio quid, qua inferat symptomata, & ut ea curanda.

Scorpio.

Enigmatas, Scorpium. Sunt autem Scorpii, vermes subnigri exiguis cancris nonnihil cum suis chelis similes, caudam habentes senis aut septenis internodiis distinctam: In cujus caudæ extremitate hamum habent incurvum, quo pungunt & inficiunt. In hisce frigidis nostris regionibus ignoti sunt Scorpiones; In Italia autem cubacula, cellaria & alia loca Scorpionibus referti sunt. Adferuntur ad nos Scorpiones in ol. extincti, quod *ol. Scorpionum* dicitur, & ritè præparatum, copiosisq; Scorpionibus in illis extinctis, utilissimum est remedium. Nam præterquam quod vulneribus à Scorpionibus illatis illinitur, & dolorem sistit, citissimeque vulnus per sanat; etiam in calculi doloribus illitum

Ol. Scorpionum usus.

renibus & inguinibus, statim eos mitigat; Quin & in omni veneno intra corpus assumpto, si non est corrosivum, temporibus & corporum arteriis cordique illinitum, violentiam veneni frangit, pestilentibus quoque bubonibus utilissime affricatur. Ipsi autem Scorpiones si vivi concrementur, & cinis eorum in vino exhibeatur, calculum tum renum, tum vesicæ potenter expellunt. Ex ictu autem Scorpionum satis læva excitantur symptomata, & nonnunquam etiam lethalia; locus enim punctus primum inflammatur cum rubore & acerbō dolore: Deinde inæqualis subsequitur intemperies corporis, quod nunc æstuat, nunc rursus frigore infestatur. Tandem & sudor frigidus subsequitur, & horror cum tremore; ac si quis in pede à Scorpione ictus sit, ei bubo circa inguina, si verò in manus, bubo circa axillas excitatur.

Vnus Scorpionum.

Noxa.

CURATIO autem morsus Scorpionum facillima est, si vulnus confricetur oleo, in quo Scorpiones sunt extincti, aut capto Scorpione vivo ac contrito, vulneri imposito; intra corpus ictus à Scorpionibus utilissimum erit exhibere 3 i. pul. *Aristol.* longa & *salvia* cum vino.

Curatio.

Antid.

Rana terrestris, sive bufo, quid; qua ranarum species? Qua utilitas; item qua inferant symptomata, & quibus inde subveniendum remediis.

Batrachos, Rana, est animal quatuor pedibus proreptans & omnibus notum. Sunt autem plures Ranarum species, ex quibus innoxie sunt Ranulæ virides, per stirpium & arborum folia reptantes & braxantes, *Germanicè* Laubfrosch / quarum utilitas est, si inopinatæ inventæ syndone includantur, & in febris tertiana collo appendantur, febrim citissime auferunt. Secunda species ranarum est *Rana palustris*, quæ in rivis degunt, & aut viridis aut cinerici sunt coloris, & in Vere manè ac vespere coaxant, *Germanicè* etiam *Wasserfrosch* / & minus sunt venenatæ; siquidem in Italia gulam irritarunt,

Rana.

Laub-

frosch

fortasse

curatio à

frigore

subinde

corpus al-

terante.

Harum

Epata

admiran-

dam an-

xilium

ferant

& pro

Epileptici & pro cibo usurpantur; escitæ autem serpentum venenatis ictibus medentur. *adulti- bus.*

Bufones. Armata illa po-
tius in-
ter palu-
stres cen-
senda.

ex terræ putredine generantur, & in ve-
pribus aut in hortis circa sepes aut cel-
lis humidis degunt, crassæ & venenatis-
simæ. Turgent enim venenato humore,
& Græcis βάρεγγι γαιώδες aut γερωνί-
vel φῶροι, Latine Rubetæ & Bufones,
nostratibus Kröten nominantur. Ex qua-
rum genere sunt illæ, quæ durissimâ tes-
tâ sunt armatæ, adeo ut nec perfodi, nec
gravi onere frangi lædive possint, nostris
etiam Schiltpogge. Etiam autem bufones to-
tâ substantiâ exitioso imbuti sunt vene-
no, & non tantum suo contactu, vel in-
tra corpus assumptione perniciem afferunt,
verum etiam suo madore, saliva & urina
venenata, quam longè lateque spargunt,
& herbas, radices & fructus terrestres vene-
no imbuunt, & homines inficiunt, ta-
men suas quoque habent utilitates. Io-

Historia. hannes Bocatius venustam historiam de
tristi casu duorum amantium adolescentis
& puellæ recitat, qui cum ut se mutuis collo-
quiis oblectarent, ingressi essent amœnum
viridarium, & confedissent ad *salvia her-
ba fruticem*, ac inter confabulandum de-
cerpissent *fol. Salvia*, eisque dentes & gingi-
vas confricassent, subito extincti sunt. Nam
primum adolescens gustans *Salviam* sta-
tim procumbendo vitam exhalavit; quo
miserabili spectaculo consternata puella,
ex viridario profugit ad parentes adoles-
centis, eisque interitum filii denuntiavit;
parentes rati ipsam puellam filium suum
jugulasse, captam ad Prætorem deducunt,
& ut torturæ eam subiciat, orant: Prætor
prudens, ut veritatem rei certiùs explo-
rare posset, effecit ut puella cum ipso in
viridarium descenderet, eique locum, ubi
Adolescens erat extinctus, ostenderet; &
quid Adolescens ante interitum egisset,
enarraret. Ipsa cum Prætore in hortum
descendens, eodem loco, ubi federat an-
tea ad radicem *Salvia* confedit, decer-
ptaque *folia Salvia* ut prius Adolescens

fecerat, gingivas confricat, & in con-
spectu Prætoris statim & ipsa concidit &
extinguitur. Id videns Prætor *Salvia fru-
ticem* evellere jubet, sub cujus radice hor-
ribilem stabulari conspicit bufonem, unde
facile conicere potuit, *Salviam* à bufone
virulento madore fuisse contamina-
tam. Hæc ob eam causam recito, ut ho-
mines, fruges, herbarumque folia & radi-
ces & fructus terrestres, quales sunt *fraga*,
non temerè gustent, antequam probè sint
abluta. Ad utilitates quod attinet, Bufo
palo acuto confossus, & in libero aëre
exiccatus, si tempore pestis in aceto made-
fiat, & carbunculis pestilentibus impona-
tur, omne venenum pestiferum è corpore
elicit. Gestant in corpore Bufones la-
pillum, quem nostri Ein Kroten Stein/
oder Poggen Stein nominant, excel-
lentis efficaciz adversus omnia veneno-
rum genera, qui tamen non in omnibus
locis reperitur, nec facile ab eis eximitur;
potest tamen commodissimè hac ratione
acquiri: Bufo vivens quam maximus in fi-
ctili multis foraminibus pervio ex abrupto
captus imponatur, & cooperculo contega-
tur, ac in myrmecion sive formicarum aceri-
oni & vum defodiatur ac contegatur, post men-
sisque cursum eximatur: tunc enim in
fictili omni carne à formicis exesa sola
officula, & in capite Bufonis lapis re-
peritur, qui auro inclusus & in digito
gestatus, omnis veneni præsentiam sta-
tim ostendit; sudore enim madescit, & rhagias
ejus lapidis D 1. contritus, & cum vino
assumptus venena tum serpentum, tum
quoque ipsius Bufonis extinguit. Sym-
ptomata perniciosissima sunt, quæ ex cine-
re combusti Bufonis intra corpus assumpti,
aut ejus carne degustata, aut sanguine hau-
sto, aut ex herbis, radicibus aut fructi-
bus saliva urinae Bufonis infectis, & in-
tra corpus ingestis excitantur, quorum
præcipua hæc sunt: Totius corporis sub-
bita intumescencia cum buxio, id est, ex
flavo in viridem vergente colore, faucium
& gutturis inflammatio, & respirationis

*Virilitas
bufonum.*

*Lapis bu-
fonum.*

*hac ma-
gis ramo-
ri vulgi,
quam ra-
tionis &
experien-
tia con-
venit.
qui pro
veris ha-
bentur,
magis
hemor-
tim sistant,
quam
venena
tollunt.
Sympto-
mata ex
bufonibus
assump-
tis.*

interceptio, gravis & foetidus halitus, fastidium, vomitio, vertigo, delirium, convulsio, animi deliquium, & postremo misera mors; & si qui per tempestivam medicationem liberantur, tamen ut plurimum edentuli redduntur.

Curatio. CVRATIO veneni Bufonis statim initio maturanda est, & ita procedendum: Initio assumpto haustulo *aq. lunip. per descens. destill.* excitetur vomitio, post vomitum statim exhibeantur per triduum singulis diebus *3 ij. Ther. Andro. cum vino*, quo assumpto in calido clibano, aut in vaporario balneo calido sudor proliciatur, post sudorem *gutt. V. ol. viir. aut ol. Angel. cum trib. cochlea. vini* exhibeantur, & subinde vinum meracius, in quo *ruta fol.* sunt macerata, bibendum propineatur. Antidotum adversus venena Bufonis est *3. lb. Gemma Smaragdi aut 3 lb. Láp. Bufonis, aut gr. V. Unicornu in vino exhibita.* Foris autem manè ac vesperti utilissimum erit universum corpus tumens *ol. Scorp. cui ol. viir. nonnihil sit admixtum*, inungere.

Hirudo quid, qua ejus utilitas, qua exciet symptomata, & quomodo ea curanda.

Hirudo. *Bdella, Sanguisuga, ein Etigel* est vermis lumbrico terrestri non dissimilis, niger, in aquis palustribus stagnantibus, & limosis ac cœnosis natans, qui nudis pedibus hominum in aquis ambulantium adhærescit, sanguinemque tam diu sugit, donec repletus spontè decedat.

Vfus in Medici- na. Hirudinum insignis est utilitas in arte Medica, quibus utimur, vice cucurbitularum, aut venæ sectionis in evacuatione impuri & putridi sanguinis, in quibusdam morbis particularibus, veluti sunt Hæmorrhoidum tumor, varices sive venæ tumentes: Bubones pestilentes, Anthracis, Serpignes, & alia maligna ulcera; ex iis enim applicatæ hirudines cucurbitularum modo putridum & adustum sanguinem eliciunt. Applicandæ autem sunt Hirudines, ita ut primum toto corpo-

re includantur calamo arundinaceo, ca-
pitibus tantum ex calamo prominenti-
bus: Locus verò affectus primò fo-
vendus erit *aq. cal.* donec rubeat, &
mox loco affecto capitibus admovean-
tur, quæ eo usque sanguinem sugere
permittantur, donec sponte decedant;
quibus delapsis, si necessitas efflagitat, aliæ
atque aliæ applicari possunt. Vbi verò post
suctum sanguinis ultrà modum erumpat,
ejus eruptio cohiberi debet imposita vulne-
ri *tela araneorum*, aut inperso pul. tenuiss.
cineris. Si quis autem suctum Hirudinis
non amplius ferre velit, revellique eam
cupiat, capiti ejus modicum salis insper-
gat aut calcis, & statim sine noxa deci-
dunt; aliàs si violenter revellantur, rostra
sua in vulnere relinquunt, & dolorem,
vulnerisque difficiliorem curationem pa-
riunt; possunt tamen ea quoque vulnera
facile sanari, si eis *cera viridis sigillatoria*
instar emplastri imponatur. Contingit cre-
bro ut iter facientes defessi & siticulosi
aquam quamlibet obviam ex lacubus &
stagnis avidissimè potitent, & accidit cre-
bro, ut per imprudentiam unà cum aqua
limosa hirudinem hauriant, quæ statim ad-
hærescit aut faucibus ipsis, quod ex sangui-
nis expuitione dignoscere licebit; aut ad-
hærescit orificio ventriculi, aut capacitati
ejus; id quod ex suctionis sensu percipi
potest, ac ita molestissima nec periculo ca-
rentia, si negligatur curatio, excitat sym-
ptomata, ut prostrationem appetentiæ, &
varias ac melancholicas imagines; Ma-
tura itaque iisdem curatio est adhi-
benda.

Curatio CVRATIO itaque Hirudinum epo-
tarum, est carum revulsio & expulsio, aut
mortificatio. Si itaque Hirudo in faucibus
aut gutture hæreat, tum universum corpus
aqua calida immergatur, capite eminente,
assumatque æger os plenum aq. frigida, &
subinde ea mutetur; ea enim ratione toto
corpore calefacto ad aq. frigiditatem in os
prorepat hirudo, & cum aqua expui po-
test; aut subinde gargarisentur fauces
cum

quomodo
applican-
da.

*Elegans
antido-
tus plan-
taginis
deco-
ctum.*

*hirudi-
num san-
guis ad-
hærescen-
tium.*

cum aq. in qua nonnihil *aluminis* & *calchantis* seu *vitrioli* est incoctum. Si verò in ipso ventriculo aut ejus orificio hæreat hirus, crebro, sed leniter, bibatur *muria*, aut bibatur *acetum* in quo *Asa foetida* sit dissoluta, aut bibatur *inc. radic. Rapha. cum aceto mixtus*. Sed his præstantius remedium *3. s. ol. vitr. cum tribus cochlearibus vini* ebibitus. Quin & *ol. olivarum* si crebrò propinetur, extinguitur hirus, quæ cum *Hiera piera simpliciter* expurgari poterit.

Basiliscus quid, & qualem inferat perniciem, & quibus succurrendum remediis.

Βασιλις & *Regulus*, cū *Basilisch*, *Basilisci* nomenclatura duobus venenosis & ferocissimis animalibus tribuitur. Serpenti, & monstroso gressili animali. *Basiliscus* serpens coronatus, non tantum suo morfu, sed solo intuitu & sibilo cuncta animalia interimit, quem *Ælianus* & *Plinius* in *Cyrenaica* regione reperiri scribunt. *Basilisci* verò sævisi. feræ meminit *Galenus* in *lib. de Ther. ad Pison. eumque βασιλις θηρον vocat*, dicens, quod sit belua substativa, triplici frontis apice munita, quæ & ipsa quidem serpens. *Basiliscus* solo intuitu & sibilo videntes & audientes necat; & si quod prætereat aliud animal illum etiam mortuum attingat, statim extinguitur. De hujus *Basilisci* historia & ejus procreatione vulgus multa fabulatur, & aniles nugæ profert; ait enim vulgus, gallum annosum ac decrepitum, circa nonum suū annum, æstivo tempore ovum parere ex putrefacto semine genitum, forma orbiculari & colore vario, ex quo ex incubatu *Bufonis* generatur *Basiliscus* monstrosum animal, caudam serpentis, corpus autem gallinæ habens, quod obvios quosque solis radiis visivis interimat, & *bufonem* hunc suum virulentum fœtum statim genitum in subterranea antra, in fontium margines & cellaria deserta deportare; quæ loca quicunque accesserit, statim interire; & quamquam experientia testetur, ex annosi galli ovo, vel proprio fœtu, vel alius animalis vermem, aut aliud animal mon-

strosum & venenatum generari: tamen illud esse *Basiliscum*, & intuitu suo posse occidere animalia, rationi consentaneum non videtur; nec illius temporis historiarum contestantur. Nam quod quidam in subterraneis cuniculis, aut ad fontes & in solitariis cellariis subito extinguantur, id non arguit ibidem esse *Basiliscum*, qui solo intuitu interficiat, sed potius venenatum halitum, qui ex specubus exhalet. Symptoma *Basilisci* est mors subita atque citissima. At mortuis frustra adhibentur Antidota; de ejus itaque curatione quicquam dicere, supervacaneum esse judico; veruntamen, modò non sit fabula, ajunt, inter omnia animalia solam mustelam esu pastuque *ruta* armatam, cum *Basilisco* serpente congregi audere, & illum extra suas latebras protrahere, fortiter interimere. Laudatur à Medicis ad *Basilisci* morsum. *3. 1. castor. cum vino epota*; quæ *Erasistrati* Medici est sententia.

Torpedo quid, quæ inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Ναῦα est piscis marinus in *Germania* *Torpedo*. ignotus, validissimo veneno imbutus, ex genere planorum & cartilaginosorum piscium, quales apud nos sunt *solea*, dicit *Schullen* & *Salpa* dicit *Witten*. Dorsum habent rubicundum nigris quibusdam maculis, tanquam oculis, insignitum, suprema verò earum pars albicans est; *Oceano Germanico* ignotus, sed mari Mediterraneo familiaris. Nomen habet à torpore, quia non tantum suo contactu, sed mediante reti aut hamo hastaque manus stupefacit, & tremulas reddit. Veteres Medici applicabant in capitis doloribus, ubi stupefactione opus erat: & nunc quoque in *Italia* in ardentibus capitis doloribus, qualis est *oppevins*, torpedinem mortuam applicare solent. *Torpedo* itaque capta & adhuc vivens per interventum retis, etiam antequam manu attingatur, hæc infert symptomata, rarò quidem lethalia, sed tamen formidabilia, manuum videlicet ac pedum musculorumque stuporem ac totius

tius corporis tremorem; mortuis autem nihil tale inest, sed comeduntur in uribus *Italicis*.

CYRATVR stupor ac tremor à Torpedine illatus crebra confricatione membrorum stupefcentium, cum jejuni hominis saliva, & illinitione olei *Rusæ* aut *Scorpionum*, quibus adjectum sit nonnihil *aq. Iunip.* Intra corpus autem *Ther. Androm.* ʒ ij. cum vino hausta discutiunt torporem partium.

Pastinaca marina quid, qua suo punctu inferat symptomata, & quibus curanda remediis.

Pastinaca marina.

Τρυγών θαλασσία. Pastinacæ vocabulum tribuitur etiam hortulanæ herbæ, quæ nostratibus *Ψατερνά* nominatur, cujus radice in cibis, feminibus verò in medicina creberrimè utimur. Pastinaca verò cum appendice, marina, piscis est ex genere planorum & cartilaginorum piscium, caudam habens incurvis & aculeis acutissimis, sive radiis armatam. Hic piscis Sole exsiccatus ex Oceano Septentrionali ad hæc maritima loca adfertur, usurpaturque in cibis, qui nostratibus etiam *Νοττὴ* nominatur. Sæpe autem piscatores dentata iua cauda pungit & vulnerat; quod vulnus valde difficilis est curationis; & si altius figat radices, nervosque in corpore lædat, perniciofa infert symptomata, acerbum & continuum dolorem, vulneris ab ictu denigrationem, quod ubi digitis comprimitur, atra profluit sanies, quæ omnia comitantur crebræ convulsiones, totiusque corporis stupor, ac tandem mors.

Symptomata ex harum punctione.

Curatio eadem instituenda est, quæ supra de viperarum morsu curando est demonstrata; peculiariter autem conferunt in principio ictus *Theriaca Androm.* ʒ ij. cum vino exhibita, aut ʒ i. pulv. *Scordii*, aut ʒ ʒ. ol. *Angel.* cum vino meraciori. Bibat præterea æger quotidie vinum, in quo *Scordion. fol.* *Roris marini* & *Salvia* sunt incocta. Foris autem statim in initio cucurbitulas, cum scarificatione figere oportet,

& sanguinem venenatum elicere. Deinde cataplasma ex *furfure* & aceto confectum, aut aliud Emplastrum attractivum vulneri imponere, & crebrò instillare ol. *Sulphur.* & cum eo adjacentes partes inungere. Porro etsi venenati sunt radii illi in cauda pastinacæ, tamen habent in medicatione non contemnendas utilitates: si enim his radiis gingivæ scarificentur, aut vulnerentur, dentium dolores statim tollunt, ac si radii illi cum *Elleboro albo* simul conterantur, & denti illinantur, sine dolore dentes extrahunt. Equos quoque qui subcutaneis vermibus exeduntur, si eo ulcera scarificentur, aut purgentur, statim persanat.

Canis rabiosus quid, qua causa rabiei, & ex quibus signis eorum rabies dignoscenda.

Κύων λυσσώδης, cui toller oder vultend *Canis rabiosus.* *hundt* / Canis omnium animantium hominibus familiarissimus est, fidelissimus domino suo, rerumque domesticarum custos, comes & excubitor, beneficiorum etiam post longum tempus memor, & injuriæ ab *Vsus Canum in medicina.* *hero* acceptæ citissimè obliviscens. Habet canis in medicatione quoque suas utilitates; pinguedo siquidem canis, quæ impensè calefacit, humectat & extenuat, utilissimè inungitur in nervorum refrigeratione & luxatis articulis; similiter & stercus canis candidum, & per gramina excretum, exsiccatumque, quod vulgò *album Græcum* appellatur, in pulverem redactum, melleque rosac. mixtum, faucium tumoribus & exulcerationibus illitum, egregie medetur. Sed canes inter omnia animantia, quæ rabie agitantur, veluti sunt lupi, sues & simiæ, creberrimè rabie corripiuntur, & cum hominibus, tum pecudibus, non tantum suo morsu, verum etiam contactu suo venenatæ salivæ perniciem inferunt.

Causæ porro rabiei in capibus *Canis rabiei causa* *ῥάβις* sunt calida & sicca canum intemperies, quæ sanguis eorum torretur & in adustam melancholiam convertitur, aut nervosæ illius congeriei vermibus simili, quæ sub

quomodo
canes à
rabie
prefer-
wandi.

sub linguis canum conspicitur, & Græcis *λυδα*, id est, vermis nominatur, putrefactio & inflammatio. Hæc enim vermi-formis congeries si canibus catulis existentibus secundo eximatur; aut si eorum caudæ extremitas abscindatur, perpetuò immunes erunt à rabie, teste *Columella*. Vbi verò hic vermis inflammatur & putrescit, linguam simul inflamat, in tumorem elevat, & totum os contagiosa spuma & pituita replet. Causa *αεχνη* sunt ardor Solis, vigente enim Canicula in medio æstatis sanguis torretur, item vulnus sive morsus ab alio cane aut rabido animali, aut spuma rabidorum animalium canibus inspersa, quæ etiam citra morsus eis perniciem infert.

Signa-
bici.

Signa & indicia, ex quibus canem rabidum esse cognosci potest, præcipua hæc sunt: Cibum & potum averfantur, auribus & cauda demissis ingrediuntur, vocem amittunt, aut raucamedunt, linguam ex ore propendentem gerunt, ex ore & naribus quotidie larga spuma & pituita colluvies profluit, oculis torvis & rutilantibus homines intuentur, in omnes etiam homines & bestias, ac ignotos & familiares irruunt, & sine latratu mordent: Contingit verò nonnumquam, ut antequam hæc enumerata in cane appareant signa, ipsum jam rabie teneri, & suo morsu posse & hominibus & pecudibus perniciosum morsum inferre; id quod accidisse scribitur, longè *Clariss. & Excellentiss. Iurisconsulto Baldo*, qui cum *Tridenti* cum catulo luderet, quem in delitiis habebat, morsus est levissimo vulnuscule in inferius labium, quod *Baldus* ignorans catulum rabiem concepisse, vulnuscule contempsit; hoc verò altero die spontè persanatum fuit, sed quadragesimo à morsu die in hydrophobiam sive pavorem aquæ incidit, ac deinde miserabili morte extinctus est. Proinde morsus à canibus explorare debent, utrum canis fuerit rabie infectus, vel non: Præsertim qui æstate vigente Canicula com-

mordentur. Vbi autem in ipso cane commemorata signa non appareant, tum hac ratione eorum infectio explorari potest: Sanguis è vulnere morsus manans frustulo panis illiniatur, & alii cani famelico objiciantur. Nam si vulnus à cane rabido est illatum, canis alius panem illum ne olfacere quidem sustinebit, quem alius avide statim devoraret. Aut vulnere à cane illato per integram noctem imponatur *Catapl. ex nucleis nucum jugland. confusis confectum*, & illud ipsum manè pulvis gallinaceis objiciatur; qui ubi comederint, paulò post moriuntur, si canis fuerit rabiosus; sin secus, non moriuntur.

Rabidi Canis morsus quæ excitet symptomata? & Hydrophobia, quales sit symptomata, & quando consequatur morsum canis rabiosi.

Rabidi canis morsum præter dolorem *Symptomata à rabido cane.* loci demorssi, alia quoque perniciofa commitantur symptomata; verum non continuè post illatum morsum, sed primum post 40. aut etiam plures dies, ubi vulnus jam est consolidatum, & nihil periculi metuitur; tunc enim sine ulla evidente causa solito subtristior efficitur morsum passus, & paulò post in fixas & melancholicas cogitationes incidit; ac nocturno etiam tempore de canum ferocium invasione somniat, pavoribus infestatur, & cum clamore evigilat, tandem augecente Melancholica colluvie, lucem & conversationem hominum averfatur, & secum solus emurmurat, alloquentesque torvè intuetur. His interdum accedit febris, faciei & oculorum rubor, nunc intensus, nunc remittens, & tandem extremarum partium convulsio. Hisce symptomatibus, tanquam certis indicibus veneni rabiei, nisi tempestivè succurratur, adhibitis convenientibus remediis, æger in vehementissimam sitim collabatur, in qua tamen omni potu cujusvis liquoris abhorret, expavescit, abstinere, donec miserabili morte, & siti intereat. Nam ubi veneni

*Hydrophobia
curam
non ad-
mittit.*

violentia Spiritus animales in cerebro contaminavit, & rationem omnem perturbavit, in hydrophobiam, id est pavorem ac metum aquæ, omniumque liquorum potabilium, incidit, quod symptoma in morfu rabidi canis est perniciosum, & spem omnem salutis adimit; quis enim hunc sanabit, qui aquam, cujus potu potissimum sanitatem consequi poterat, aded exhorrescit, atque averfatur, ut si paulò diutius in conspectu ipsius aquæ detineatur, ingentissimis clamoribus, canum latratu & ejulatu similibus, omnes adstantes ad tremorem usque perterrefaciat, & ipse præ anxietate animi per universum corpus defudet, deliret, & in animi deliquium, ac si in ignem & flammam positus, incidat. Idè etsi ipse æger extremè sitiatur, ac humidi teneatur desiderio, tamen ab omni potu abstinere, quando etiam & ipse aliquando more canis rabiosus efficitur, ut morfu violento administratos lædat. *Avicenna* dicit, quod admiratione dignum est, quandam post hydrophobiam sanguinis grumos, seu carnis frustula, formam exiguum catulorum habentes, ingenti cruciatu eminxisse. Statim itaque ubi à morfu rabidi canis melancholica apparent symptomata, & antequam hydrophobia confirmetur, turbeturque ratio, sedula & tempestiva curatio est adhibenda, & ubi jam aquæ formido infestat demorsum, statim speculum tersum ei offeratur, in ipsumque tueri jubeatur, in quo æger seipsum agnoscat; si denique balneum intrare non expavescat, & aquam bibere non recuset, pristinae sanitati restitui facile posse, sperandum est: Quemadmodum evenisse *Ælius* cuidam Philosopho scribit, qui post rabidi canis morsum aquæ pavescencia tentatus, melancholicas imaginationes de canibus in aquam versantibus forti animo excussit, & balneum ingressus, id proverbii exclamavit: *Quid cani cum balneo?* ac tandem frigidam aquam largiter bibit, ac paulo post sanitati est restitutus.

*Nota an
æger pos-
sit resti-
tui.*

Rabidi canis morsus, & ejus symptomata, quo ordine & quibus remediis curanda.

Curatio morsus rabidi canis minimè in longum tempus est protrahenda; sed statim cognito cane fuisse rabie affectum, à quo illatum est vulnus, confestim & ante omnia si mare salsum propinquum est; aut si id absit, in proximum fluvium aut lacum deducatur morsus, & ex improviso in aquam conjiciatur, ac ter quaterve submergatur; ejusmodi equidem baptismus præsentissimum est remedium adversus futuram hydrophobiam; postea cogatur ut patiens aquam bibat, usque ad nauseam & cognitionem. Quibus peractis vulnus à cane inflictum aut candenti auro inuratur, aut urendo amplificetur. Atque ubi exustione vulnus crusta obductum est, eidem unguentum imponatur *ex Vernice pictorum, butyro recenti & vitello ovi confectum*: id enim vulnus à crusta brevi tempore liberat. At si tam sit delicatus æger, ut ustionem perferre nolit, tunc scalpello incidatur & dilatetur vulnus, caroque adjacentes scarificetur, sanguisque ex vulnere digitis exprimatur, aut affixa cucurbitula cum multa flamma eliciatur. Quia verò vix aliud genus vulneris sua sponte citius coërit ac consolidatur, quàm quod à rabioso cane est inflictum, accurate cavendum est, ne vulnus ante tres vel plures menses coalescat. Ne autem conglutinetur, hac ratione præcaveri potest, si vulnere frustulum *rad. Gentiana* adaptatum quotidie recens imponatur, aut si vulnere quotidie pulveris *argenti vivi calcinati*, quem Chymici & *precipitatum* vocant, superemplastrum attractivum, quod & *Bruihenicum* dicitur, sparsum imponatur, ac indies renovetur, non permittat, & virus omne à centro ad superficiem eliciat. Ejusmodi autem emplastrum quotidie bis renovandum erit, & vulnus cum pueri urina semper eluendum. Præter emplastrum attractivum, utilissimè quoque vulnere quotidie imponi possunt, si superiora non ad sint, hæc sequentia cataplasmata.

R. Allii,

Cataplasmata venenorum elicientia. *R. Allii, cepa, porri, scordii, centauri min. ana pro libitu, quibus virescentibus confusus admisceatur pulvis sem. Erucæ & cum q. s. butyri. salis & mellis F. cataplasma:* Aut, quod magis virus elicit, *R. Gum. Opopanacis in aceto liquefacti 3 j. ficuum Norv. fol. ruta & teneriora folia brassica rubra ana M. 5. simul contundantur, & cum q. s. butyri & mellis. F. cataplasma.* Quod si nec hæc ad manus sint, eadem ratione quotidie imponatur cataplasma ex cinere fraxini cum urina pueri aut cum aceto confectum; aut tenuioris fortunæ homines continue foveant vulnus, (radicem Gentiana insigendam esse, ne coalescat, paulo ante diximus,) urinâ pueri, aut aletius sani hominis, duplicatis linteolis excepta, quæ ubi exaruerint, rursus madesiant. Porro ubi canis rabidus circa morsum, sola contagiosa saliva nudam cutem contaminavit, (cujus est tanta venenata violentia, & penetrandi facultas, ut per poros cutis citissime & sanguinem & spiritus vitales inficiat) & ipsa prædicta inferat symptomata, his statim occurrentum est, ac ita symptomata præcaveri possunt: Si locus saliva rabiosa contaminatus sanguine ex sale marino & aqua confecta, diu multumque fricetur & abluatur, atque si loci natura patitur, cucurbitulæ cum scarificatione applicentur, sanguisque infectus eliciatur. Porro interim dum hæc externè aguntur, minimè & interna remedia veneni rabiei adversantia, negligenda erunt. Protinus itaque ubi quem canis rabiosus momordit, & æger, ut diximus, in aquas præcipitatus ac baptisatus est, aquamque largiter bibit, tandem exhibeantur Theriaca Andromachi 3 ij. cui olei Angelica ʒ. ʒ. sic admixtus cum haustu aqua scordii, aut Centauri min. quo exhausto probè contactus, aut in balneum vaporarium ductus, sudet per unam atque alteram horam, aut loco Theriaca sumatur hic pulvis: *R. Scordii ruta, flor. Centauri min. Roris marini ana ʒ. j. rad. Ostrutii, Angelica, Zedoaria ana ʒ. s. co-*

Saliva rabidi canis violentia.

Interna.

Sudoriferum.

Pulvis contra rabiem.

*rall. rub. præp. 35. Unicornis, vel ejus loco cornu cervi tempestivè capti ʒ. j. pulveris ista commisceantur, sudorque in balneo excitetur. His peractis per totum deinceps Tempus curationis tempus, quod per novem septimanas, aut etiam amplius, protrahendum est, quotidie jejuno ventriculo dum. medicamentum veneno rabiei adversum, cum Scordii aut Centaurii aqua exhibeantur, inter quæ Galenus lib. 11. de simpl. medic. mirificè exollit cinerem cancrorum fluviatilium solum tantum, aut cum admixtione rad. Gentiana & thuris, quod medicamentum se ex Aescrao sene Empirico præceptore suo accepisse refert; & dicit cancrorum fluviatilium cinerem totius substantiæ proprietate adversari veneno rabiei. Ita autem conficere docet: Sumantur cancri fluviatiles recenter capti, & adhuc vivi pro arbitrio, & in cinerem comburantur, & in ærea patella (id quod ego in olla vitreata & cooperta perficere soleo) hujus capiantur 3. X. Gentiana 3 v. thuris ʒ. j. Misceantur F. pulvis. Ego verò ita paratio commisceo: *R. Cineris cancrorum fluviar. & con-* in olla ustorum 3 j. pul. Gentiana 3 5. thuris, myrrha ana 3 ij. Roris marini, Centauri min. Scordii ana ʒ. j. misceantur. F. pulvis, cujus 3 j. aut 3 s. cum aq. Centauri aut Scordii quotidie exhaurienda præbeatur. Interim verò & diætæ, id est, alimenti, ratio est habenda, in qua æquè ut satietas, ita & longa inedia vitanda est, & cibus atque potus tales sint, qui & veneno rabiei resistant, & per urinam, impuritatem sanguinis propellant. Conducunt autem in genere cibi faciles concoctionis & purum sanguinem generantes; vitanda autem sunt dura & crassa, omniaque sale sumoque durata, adeoque omnia quæ melancholicum generant sanguinem. Prodest autem in esculentis concoquere rad. Petroselinii & feniculi, & condire fercula semine feniculi, cimini, carvi, anisi, cepa similiter & porrum cum eis concoqui possunt, sed caro cancrorum fluviat: in morsu rabidi canis omnium præstantissimus cibus habetur.*

Diuretica non negligenda. Cibi sine urinis.

Potus. tur. In potu *vinum tenue & album, hydromel etiam & cerevisia absynthiaca latisque serum conveniunt.* Venæsectio aut purgans medicamentum in morfu canis rabidi ante 40. dies minimè molienda sunt.

At postea si æger bene se habet, & corpus sit plethoricum, vena tali sinistri pedis secari potest; & humor melancholicus prius decocto rad. polypodii. cetrab. Thymi. & hel-lebori nigri concoctus, cum Extracti Elle-bori nigri 3. ss. commodè expurgari potest, aut cum confect. hamech. 3. vj. ubi verò post dies 40. aut post menses 7. aut etiam revoluto anno (his enim potissimum temporibus reliquæ veneni rabiosi morsus exacerbari consueverunt) melancholicæ speculationes, & præter morem tristitia, & initia hydrophobiæ appareant, antequam mens prorsus turbetur, & pavor aquæ invalescat, venenata melancholica colluvies statim præscriptis remediis concoquatur & evacuetur, ac post evacuationem aut bituminis Iudaici 3. i. quod Asphaltum dicitur, & ex mari mortuo advehitur, in pul-

*Præfer-
vantia
ab hydro-
phobia.*

*Admoni-
tio.*

verem redactum cum aq. centaur. min. exhibeatur, aut 3. j. coaguli catuli cum eadem aqua, quod etiam si in initio morsus exhibeatur, præservat hominem ab hydrophobia. Deinde aquam bibere, & crebrò balnea intrare cogatur æger, & sic processit venenum, ut æger limpidam aquam bibere exhorrescat, vel alium potum, tum atro colore est imbuendus, cum pulvere nitrato sive bombardico, qui per se ratione salis nutriti & sulphuris veneno resistit. Præstat autem potum ægrotanti porrigere per oblongam fistulam, si liquoris aspectum ferre non potest.

Felis sive Cattus, qua & quomodo inferat symptomata, & quibus curandaremediis.

Felis.

*Fel*λν, Latinis felis, Germ. ein Raße / est animal domesticum, quod ad murium injurias propulandas in domibus alimus: inter quadrupedia agile & facile, levissimum, adeò ut ex altissima turri deturbatum semper pedibus in terram incidat,

statimque tamen tanquam nihil mali passum fuerit, aufugiat. Felium duo sunt genera, domesticum, & sylvestre, cui & tertium addi potest Zibeti catus, cujus excrementum est *Moschus*, res odoratissima atque preciosa, sed apud nos ignota. Felis scæmella *Arist. lib. 5. de historia animalium*, teste, & salacissima & libidinossima, quæ cum Venere turget, ut mense Februario ac Martio, ploratu suo marem ad coitum invitat & allicit, qui si parere non vult, ipsum horribili garritu & clamore morsuque cogit & pungit. Non tantum verò morsu, sed & saliva ac halitu unguium, quæ laceratione dolorem & tumorem, vulnusque non facile curabile, infert. Reperiuntur nonnulli homines qui præsentiam felium antipatheia quadam perferre non possunt, sed statim in sudorem & deliquium animi incidunt. Verum longè perniciosiora excitat Symptomata felis cerebrum, execrabili fraude vel in cibo aut potu intra corpus exhibitum; id enim statim cerebri temperiem perturbat, crebras infert vertigines, & in amentiam conjicit, in qua æger diu noctuque oberrare & alia loca scandere, nisi vinculis cohibeatur, cogitur; & nisi tempestivè huic malo succurratur, in ea amentia vitam misere finit.

Curatio vulnerum ex morsu & laceratione unguium felis ita institui oportet, vulnus subinde abluitur vino, in quo radix *Valeriana* & herba *Veronica* coctæ. Deinde vulnere imponatur cataplasma ex fabis, jejunis dentibus masticatis; tumidæ verò & adjacentes partes inunguntur oleo scorpionum, aut imponatur cataplasma ex stercore columbino cum pueri urina, aut acetate confectum, aut ex cepis contusis paratum, ac tandem apparente suppuratione, consolidetur Chirurgicâ industriâ emplastro attractivo impositio.

Curatio autem maleficiæ & amentia ex Symptoma cerebro felium assumpto, hac methodo est instituenda: Statim ubi suspensio assumpti hujus cerebri, vomitio molliatur cum haustu

*Tria Cat-
torum ge-
nera.*

*Libido
felium.*

*quomodo
nocent.*

*Cerebrum
comesum.*

*Curatio
morsus.*

Vomitio.

haustu aq. juniperi per descensum destillata, idque antequam venenata materia in corpus est digesta, & vis veneni in cerebrum delata. At si venenum jamdudum turbavit rationem, tum ad veneni expurgationem exhibeatur ℞. *extracti belleb. nigri, aut grana vj. vitri antimonii.* Deinde sedata evacuatione, & collectis nonnihil viribus, exhibeatur haustulus diaphoreticus ex 3 j Theriaci Andromachi, & pulv. terra Lemnia ac corall. rub. præp. ana 3 ℔. cum aq. scordii commixtis, quibus ebibitis, vel in lecto, vel balneo, per unam atque alteram horam sudare cogatur æger. Postremo quotidie manè ac vespri corroboretur cerebrum & spiritus animales, exhibita semper semijuglandis nucis quantitate, sequentis electuarii: ℞. *Conser. v. Rorismarini 3ij pul. carui, cubeb. sem. pœonia ana 3 ℔ sp. diamoschi dulcis, diambra ana 3 j Serapii de Betonica, q. s. ac parum aq. juniperi, per ascensum destillata, misceantur.* Fiat *Electuarium*: aut exhibeantur manè ac vespri duæ rotulæ *Diamoschi dulcis.* Præsentissimum remedium putatur esse ℞. *B. Moschi cum vino contriti & exhibiti.*

Historia. His remediis anno Christi 1570, feliciter curavimus adolescentem rusticum *Danilem Temel* in pago *Glasbagen*, qui per insidias aliorum rusticorum cati sylvestris cerebrum assumpserat; hic diu noctuque in agro vagabatur amens, & quicquid cernebat, id omne illi sylvæ & nemora esse videbantur; sed beneficio Dei restitutus adhuc hodie vivit & valet.

Lupus quid, qua morfu suo inferat symptomata, & quomodo ea curanda?

Lupus. *Lupus*, est *Wolff* / est animal sylvestre rapax, & grandi ore cani non ab simile; Lupi ferociore & tum hominibus tum pecudibus magis infesti sunt circa brumam mense *Januario*. Id admiratione dignum est in lupis, quod ubi hominem prius viderint, quam ipsi ab homine videantur, statim illi vociferandi facultatem adimant, & vocis raucedinem inferant. Ru-

gia nostra, insula nobilissima, hoc memorabile habet, quod nec lupos ferat, nec glires patiatur; & si in eam importentur, in proximum mare præcipientes ruant. Insignem utilitatem in arte Medica præstant lupi suis dentibus, epate, excrementis & intestinis. Dentes lupi argento inclusi, profunt ad infantium dentitionem: si enim gingivæ illis confricentur, sine cruciatu dentes eliciunt. Epar lupi in vino ablutum, in frustula concisum & exsiccatum, posteaque in pulverem redactum, & cum vino pondere 3 j. exhibitum, corruptioni epatis ex nimia Venere contractæ opitulatur. Lupi excrementum, præsertim ex ossibus constans, in vepres & spinas oblongaque gramina excretum, siccatum, & in pulv. redactum, 3 j. pondere in vino exhibeatur, colicos cruciatus sistere, docet *Galenus*. Lupi intestina exsiccata & in pulverem redacta, non tantum *Avicenna* testimonio, sed attestante quotidiana experientia, præsentissimum auxilium adferunt in colicis doloribus, si ejus 3 j. cum vino propinetur. Morfu suo lupo dolores acres & tumorem permorsæ particulæ, difficilio-remque sanationem infert; iis verò longè perniciosiora infert symptomata morsus lupi, qui est rabie percitus, nam & ipsi nonnunquam more canum rabie corripiuntur.

Curatio vulneris Chirurgicâ industriâ perficienda est, prius adhibendo, si naturalis loci patitur, cucurbitulas cum scarificatione; deinde eluendo vulnus cum vino, in quo radix *Valeriana* & herba *Veronica* seu *Teverion* sunt incocta, imponendoque quotidie bis novum Emplastrum attractivum. Si exhibeatur potandum vinum cui incoxerunt rad. *Vincetoxici* & *Valeriana* cum fol. *calamintha*, & in ejus 3 v. commisceatur pul. *Gentiana* & lapillorum cancri ana 3 ℔. plurimum confert, & curationem facilem reddit. Vbi verò lupum mordentem rabie correptum suspicio adsit, omnia ea accuratè usurpanda sunt, quæ paulò ante in canis rabiosi morfu scripta fuere. Peculiariter autem ol. è myrrha pondere 3 ℔. aut succi allii 3 j. cum vino mixta utilissimè propinari possunt.

T

Cervus

Usus Medicus par-tium la-pinarum.

NB.

Intestina.

Sympt. a morfu.

Lupi rabiosi.

Antid.

Cervus quid, quæ partes ex cervo in Medicina usurpentur, quæ venenata; quæve excipient symptomata, & quibus curanda remediis.

Cervus.

"*Eluro*, est *Hirsch* / est animal sylvestre, adultum mediocris equi proceritatem habens, duobus grandioribus cornibus ramosis armatum, quæ ipsi bimulo primum nascuntur, & singulis annis, usque ad sex uno ramo augentur, ac postea ea crebro deponit ac nova recipit. Animal est velocissimi cursus, & circa *Calendas Septemb.* omnium salacissimum, & ad insaniam

Salax & vivax.

usque libidinosum. Etsi autem libidinosæ animantia natura ut plurimum brevioris sint vitæ, cervi tamen vivacissimi sunt. Nam *Plinius lib. 8. c. 32.* scribit post annos centum cervum captum esse cum torque aureo, quem *Alexander Magnus* addiderat; alioquin simplex animal est, quod ad omnium rerum miracula obstupescat, & ita crebro à

Partes rei medicæ utiles.

venatoribus facillè interimatur. Sumuntur ex cervis ad hominum salutem in Medicationibus varix particulae, veluti sunt cornu, lapis in oculis cervorum concretus, ossiculum ex corde cervi, Genitale cervi, fevum & medulla. Cornu cervi tempestivè, id est, circa *Cal. Septemb.* capti in scobem seu pulverem redactum, & cum *aq. Apparine aut vino* exhibitum, salutare est remedium adversus cardialgiam sive orificii ventriculi tumorem, quem nostri *das Hertzgespan* vocant, quo in-

Vires C.C.

fantès creberrimè laborare solent. Idem cornu cervi non secus ac unicornu omnibus venenis assumptis præclarè medetur. Præstat itaque ramenta cornu cervi pro adulterino unicornu in expellendo per sudorem veneno, & in pestilenti contagione uti. Idem cornu cervinum ad candorem calcis in olla exustum, & in pulv. redactum pondere ʒ j. addita exigua *Tragacanthi* portione, singultum compescit. Dysenterix & omni alvi fluiori & Gonorrhææ, albisque mulierum mensibus medetur, quin & alvi lumbricos cum melle mixtus enecat, regisque morbo opitulatur. Si autem *piperis & myrrhe* nonnihil admisceatur, colicos

dolores sedat. Lapis in angulis oculorum annoforum cervorum post absorptionem serpentum concrevit, quem *Arabes Bexahar*; id est, venenum vincentem, vocant, qui tamen inventu difficilis: Hunc tantum omnium præstantissimum antidotum contra omnia venenorum genera prædicant, si ʒ ss cum vino generoso exhibeantur: Per sudorem enim omne virus propellit. In corde cervorum annoforum, caput arteriarum cartilaginolum in os degenerat, quod Principes viri prothelauto colligunt ac conservant; nam quod in myropoliis ostenditur os de corde cervi, est fœda impostura; non enim aliud est, quam cartilago ex cordibus mactatorum boum exenta exsiccata. Os verò genuinum è corde cervi exemptum, & in pul. redactum, omnibus venenis mirifice adversatur, & cor à violentia veneni munit ac corroborat, ideoque meritò antidotis pretiosis corroborantibus, venenoque adversantibus salutariter admiscetur. Genitale verò cervi, circa *Cal. Sept.* capti exsiccatum, & in scobem redactum, ac cum vino pondere ʒ j assumptum, sopitam Venerem excitat; moribus viperarum auxiliatur, & colicos dolores aufert, ac dysenteriam per-

Bexahar verum non ex angulis oculi cervi, sed ventriculo caprarum Indicarum, salutaris plantas depascentium eximitur: Os cordis cervi.

sanat. Sevo & pinguedine, medullaque cervina magno successu utuntur Chirurgi, & emolliendis tumoribus in humectandis nervis & consolidandis ulceribus, vulneribusque ea Emplastris & unguentis commiscencia, veluti in sequenti tractatione indicabimus. Porro bilis vesicula, quam reliqua animantia sub epate habent, carent cervi, ideoque omnem bilem dispersam habent per venas melaicaas in intestinis sparsas, cujus tamen major & perniciosior pars ad caudam est collecta, viridi porraceæque bili similis; hinc cauda cervorum pro veneno præsentissimo habetur, quæ comesta, vel ejus bilis intra corpus assumpta, sævissima excitat symptomata, intolerabiles angustias, crebra animi deliquia, ac brevi tempore nisi succurratur, interitum infert.

Sevum. Medulla.

Cauda cervina venenata, per sumum ejus con-vocantur serpentes. Cura sympt. quæ assumpta infert.

CURATIO symptomatum ex Veneno caudæ cervinæ est subita post assumptio-

nem evacuatio, vel revomitio, assumpto haustulo *aq. lunip. per descensum destillata*, aut largiore butyro liquefacto epoto, post vomitum confert exhibitio Theriaca 3 j. & Corall. rub. præp. terræ Lemnia ana ʒ j. aut ʒ ʒ gemma smaragdi. Foris verò prodest totum corpus inungere oleo rutaceo, & crebrò vesci nucleis pinearum.

Sorex quid, & qua inferat symptomata.

Sorex.
Glis.

Μουσάλη, Sorex, Glis, Germ. Eine Nase oder grosse Maus / & in nostra Pomerania, à longa cauda, quam habet acuminatam, Lanjestart nominatur. Murium & agrestium & sylvestrium, ut & montanorum plura sunt genera, inter quæ & mustelas, dicitur Wiesel / & talpas dicitur Maulwurf / autores numerant. Domesticorum autem murium tantum duo sunt genera: Mures parvi & domestici, dicitur kleine Meuse / & mures majores sive sorices, dicitur Ragen / quos ideo *μουσάλης* à Græcis dictas fuisse arbitror, quod cum felibus congenitam hostilitatem & inimicitiam habeant. Utrumque murium domesticorum genus, sed soricum imprimis, patribus familias plurima incommoda damnaque infert. Non enim frumentum tantum in ædibus, sed & quævis alimenta, & vestimenta vastat, corrodit & exedit. Mures majores sive sorices magis sunt venenati, adeo etiam ut feles, etiam si eos interimant, tamen non gustent; quod si verò præ nimia fame devorant, Elephantiali sive lepra corripuntur: suo itaque morsu & urinæ conspersione, valde periculosa inferunt symptomata: vulnus siquidem ex eorum morsu ut plurimum inflammatur, & putrescit, & circa vulnus nigricantes pustulæ sanique atra turgentes excitantur, ac tandem in ulcus depascens & serpens degenerat. Simili ratione etiam urina eorum venenata per cutem sparsa, instar serpiginis exulcerat, nisi subitò locus contaminatus sanguine abluitur, Theriaca Androm. confricetur, & oleum scorpionum linteolis exceptum imponatur.

Curatio. Sympt. Curantur hæc symptomata primò cucurbitulis cum scarificatione impositis, san-

guinisque venenati extractione: Post cucurbitulas ulceri imponatur cataplasma ex solo Galbano. cum pauxillo aceti liquefacto: Id enim potenter virus elicit. Tandem utilissimè imponi potest cataplasma ex alio & cepis simul confectum. Intra corpus ne veneni vis penetret, prodest singulis diebus haustum vini ebibere, in quo Abrotanum, bacca Lauri, Ciminum & folia scordii sunt incocta. Quod si contaminatione urinæ soricis cutis exulceretur, ulcus subinde vino lavetur ac foveatur, in quo cortices mali granati fol. veronica, Lyfimachia sunt incocta: post lotionem ulceri inspergatur pul. tenuissimus hordei tosti.

Vespertilio quid, qua inferat symptomata, & quibus remediis curanda.

Μύς ἀεράων, sive vespertilio, mus vo. Vespertilans, Eine Fledermaus. Admiratio.

dignum est, quod veteres Græci volantis hujus & venenati muris (quod ego quidem sciam) nullam fecerint mentionem. Dioscorides quidem meminit muris aranei, quem morsum suum, si illi discerptus imponatur, curare, & veneficii sui poenam luere, dicit, sed qualis sit, non describit. Ego vero vespertilionem ideo murem araneum appellatam esse judico, (salvo tamen cujusvis judicio) quod si ejus alæ sive pinnæ membranae utrinque extendantur, telis araneorum similes conspiciantur. *Νυκτερίς* vocabulum non tantum vespertilionibus, sed etiam papilionibus vesperi ad lucernam volitantibus tribuitur. Dicitur autem vespertilio, quod vesperi duntaxat & intenebris volitet; & si accensus lumen, aut gladius splendens in aëre vibretur, in ipsum volitando ruat, & seipsum conficiat. *Plin. lib. 10. c. 37. & 38.* de vespertilionibus differens, Volucrum, inquit, vespertilio tantum animal parit, dentes habet & lacte nutrit. Adferunt quoque vespertiliones quædam ad medicationem; nam, ut itidem *Plin. lib. 29. cap. 4. & 7.* testatur, sanguinem Vespertilionum cum carduo contritum, morsibus viperarum auxiliari; & eundem sanguinem ventri illitum, acerbissimos

Derivatio
nominis.

Usus in
Medici-
na.

bissimos ilei dolores tollere, asserit. *Lib. 30. cap. 14. scribit* sanguinem vespertilionis pilos extirpandi vim habere, si loco piloso, quem glabrum esse cupimus, inungatur; ac efficacior reddi, si post inunctionem cataplasma *ex semine cruce aut cicuta* imponatur: pilos enim eo loco in totum tollit; aut ultra lanuginem excrecere non permittit. Idem præstat etiam oleum, cui vespertilioes sunt incoctæ usque ad ossium separationem, si illo locus inungatur; Oportet tamen prius pilos evellere, & ita ol. inungere. Vespertilioes tota sua substantia venenatæ sunt, & tum morsu, tum aliqua suæ partis assumptione perniciofa excitant symptomata, per omnia similia iis, quæ ex morsu rabiosi canis concitata sunt; & si intra corpus assumantur, statim hydrophobiam inferunt. Habent enim vespertilioes quodammodo canis naturam, capitisque canini formam & dentes caninos; quin etiam exili voce canum latratum æmulantur.

*Psyllotron
ex vespertilionibus*

*Symptomata canis rabidi
symptomatibus conveniunt.*

Curatio itaque tum vulneris ex morsu accepti, tum hydrophobias ex assumptione acquisitæ, eadem ratione iisdemque remediis est tentanda, quæ paulò ante in curatione rabiei canis enumerata sunt. *Rhases Arabs* ita de vespertilionibus scribit: *Qui comederit linguam, aut cor, aut sanguinem vespertilionis, fugiet potum aqua & si morietur, nisi confestim præveniat vomitu cum butyro liquido & aceto, caputque ejus subinde perfundatur lacte recentem multo.* Erit itaque symptomatum vespertilionum præcipuum antidotum *pul. ex cinere cancerum fluviatilium & gentiana*, supra allegatus.

Antid.

Homo quid, qua hominis partes, remedia, quæ venena, & quas inferant noxas, & quomodo curanda.

Homo.

A' ὁ ἄνθρωπος, qui tum propter externum & internum ornatum, tum ob amplissima ejus dona, *μικρόν ὄνομα* Veteribus nominatus est; in ipso enim in prima creatione expresserat Deus imaginem suam, & cunctarum rerum naturas solius hominis cau-

sa, ipsum verò propter se condiderat. Verum quemadmodum animantia à cane rabioso demorsa per totam Naturam rabiei veneno imbuuntur, suasque amittunt proprias operationes: ita homines antiqui serpentis morsu vulnerati, adeo ejus veneno imbuti sunt, ut inditam illis divinam naturam penitus amisisse videantur. Nullum enim genus animantium, generis sui individuum magis hostiliter persequitur, præter hominem, nisi renatus antidoto Spiritus Sancti, à serpentis veneno liberetur: alias ceu rabie correptus, proximum & clam & insidiosè, armis & dolo malo virulentissime calumniis atrocissimè persequitur, lædit & interimit. Cum tamen juxta normam divinitatis illi attributæ, debebat esse humanus & beneficus:

Conveniens homini est hominem servare voluptas:

Et melius nullâ queritur arte favor.

Ex humani corporis partibus ejusque contentis in usum medicum veniunt *cranium hominis, lac muliebri, particula umbilici post colligationem infantibus delapsa, pinguedo humana, saliva hominis, & excrementum.* Mumia, *Arabum* est inventum, estque cadaver hominis *pissasphalto h. e. pice maris mortui repletum*, quod diuturnitate temporis colliquantur cum cadavere & induratum ad nos deferitur. Opulentiores non tantum pissasphalto cadavera sua condiunt, sed admiscunt quoque *crocum, myrrham, aloën & balsamum.*

Nalla ferè pars hominis in usum medicum trahi non potest.

Verum quia peregrina res est Mumia ex *Arabia* delata, neque de ea inter Doctos convenit, rarò ea utimur, nisi quod vulgò receptum sit ejus *drachmam unam cum aceto exhibere* iis qui è sublimi sunt delapsi, aut sub gravi pondere vena aliqua intra corpus rupta sanguinem concretum fundit; hunc enim resolvere creditur. Cranium hominis (præsertim circa verticem) suspensi, aut palo affixi arefactum, in pulverem redactum, si ejus *3 j. cum aqua Lavendula* exhibeatur, comitiali morbo laborantes sublevar; oportet autem cranium ejusdem sexus esse, cujus est epilepticus. Lac mu-

Usum Mumia.

Usum Crania.

Lactis. muliebre, dulcissimum & omnium præstantissimum remedium, tabe laborantibus aut erosionem in stomacho sentientibus, si id crebrò ex mamminis ipsi exugant. Quin & oculis cruore perfusus & scabie laborantibus illitum, præclare medetur. Itidem præstat butyrum ex lacte muliebri confectum; omnem enim oculorum asperitatem tollit. Umbilici infantium particula, quæ post ligaturam putrescendo decidit, in pulverem redacta, & cum vino bibita, cruciatus tollit. Pinguedo humana nervis contractis & membris affectis tabescentibusque utilissimè illinitur; fovet enim nativum calorem, & humidum radicale conservat. Salivæ hominis valida vis est, præsertim jejuni ac sientis, quæ illita lichenas ac serpiginis, antequam radices egerunt, abstergit & persanat. Similiter dolorificos tumores ex venenatarum bestiarum contactu, si ea confricentur, adimit. *Pisa* aut *tritium* in ore jejuni hominis masticata & saliva temperata, crustosæque scabiei in capitibus puerorum imposita, mirificè illam tollit. Saliva jejuni hominis argento vivo commista, ejus mobilitatem adimit & extinguit, adeò ut in pulverem redigi, & commodius unguentis admisceri queat; & bestiolas omnes virulentas suo contactu enecat. Nihil verò pestilentius est & magis contagiosum homini, quam saliva leprosi aut morbo gallico, scorbutovè laborantis; proinde cum ejusmodi morbis affectis, ex eodem poculo bibere, periculosum est. Urina hominis, ut *Dioscorides* scribit, confert morsui viperarum aliorumque virulentorum animalium; si bibatur, aut cum ea vulnus foveatur. Propria urina pota incipientem aquam intercutaneam discutit, & addita *nuce moscata* à contagione pestis liberat, febresque curat: Capitis ulcera & furfures, si cum urina colluantur, caput persanant. Urina hominis cum paucò melle in aëreo vase cocta, & oculis illita, visum clarificat; & oculorum cicatrices tollit. Ex urina hominis arte Chimica sal saluber-

rimum excoquitur, quod pestilenti veneno resistit, & sanguinem purificat, veluti in nostra Iatrochimia latius declarabimus. *Galenus* pro certo experimento didicisse periculumque fecisse scribit, quod stercois pueri arefactum & in pulverem redactum, ac cum optimo melle instar unguenti commixtum, si tumoribus faucium ac gutturis inflammationis, & suffocationis metum minitantibus illinatur, statim antipatheia quadam & dolorem lenire, & perrumpere tumorem. Ego verò non antipatheia, sed stercois acrimonia illud fieri existimo, ideoque stercois sani hominis, & bile affatim tinctum croceique coloris sumendum judico. Idem stercois adustum & in pulv. redactum, vulncrique ex morfu accepto inspersum, magnum adfert auxilium. *Paracelsus* ex stercore humano se Balsamum elicere arte Chimica posse, nativo balsamo nobiliorrem, gloriatur: quem quidem ego ipsius asseclis usurpandum permitto. Virulentæ ac venenosæ partes in homine hæc sunt; *Carbon. Paracel. halius, saliva, sanguis impurus, dentes, & sanguis menstruus.* Halitu inficiunt homines secum conversantes, qui vel peste vel *phlogoe*, id est, pulmonis exulceratione sunt correpti, ex quorum respiratione intra corpus attracta simili modo afficiuntur. Quorum morborum curationem in superioribus tradidimus. Saliva venenata inficiunt qui lepra, aut morbo Gallico, aut scorbuto sunt infecti, si alii ex eodem poculo cum ipsis bibant, & poculi labro non nihil salivæ adhæreat. Quorum quoque morborum curationem in superioribus demonstravimus. Sanguis similiter impurus & venenatus lepra & morbo gallico laborantium, si intra corpus sumatur, similes generat morbos. Dentibus verò mordendo periculoso inferunt symptomata *struus* homines, tum maximè ubi jejuni sunt, aut furore perciti, sive etiam crapula & ebrietate gravati: tum enim dentes venenato lentore imbuuntur. Morsum itaque hominis hæc symptomata comitantur, dolor ac tumor vulneris, inflam-

Sal illud Epileptici & hydropicis mirè confert.

Carbon. Paracel.

Halitu sani hominis nihil in tota Medicina præstantius.

nec sanguis, dentes & sanguis menstruus eximè utilitate carent.

Sympt. ex morfu hominis.

matio, nonnunquam etiam & putrida fanies, atque Gangræna.

Curatio. Curatio vulnerum ex hominis jejuni morsu acceptorum hac methodo instituitur, ut primum sanguis statim ex vulnere exprimatur, aut ore exugatur, aut cucurbita eliciatur, deinde *vino in quo radix sive sarmentum Indicum*, quam Hispani *sarsam parigliam* vocant, cum *herba Veronica & agrimonie* sunt incocta, quotidie fomentetur ac abluatur, ac deinceps cataplasma, aut ex *tritico masticato solo*, aut *nucibus juglandium, cepa, sale & melle* confectum imponatur. Tumenti verò vulnere, donec tumor resideat, imponatur *cataplasma ex farina fabarum cum aq. rosarum & ol. confectum*; Sedato tumore, curatio perficiatur emplastris attractivis & consolidantibus, quale est illud, quod conficitur ex *aquali parte cera, sevi hircini, picis nigra, & Galbani*. Ubi verò vulnus ex hominis morsu putrefieri incipiat, tum eloto & probe absterfo vulnere inspergatur *pulvis stercoris humani adusti*, qui mirabili ratione vulnus à putredine vindicat ac persanat, cui etiam *ol. vitrioli cum pauxillo mellis rosarum* mixtum purificandi gratia illiniri potest, aut etiam *fel taurinum*. Anno Christi 1574. ascitus fui Sundium ad curationem venustæ virginis, quæ filia civis *Iohannis Hoppii* erat; Hæc cum adolescenti temulento osculum perenti illud denegaret, morsu ab ipso in superius labrum fuit, quod statim intumescens, adhibitis tamen Chirurgicis remediis variis, tandem computruit, & gangrænosum est factum, hinc indies parte adjacentes ab ulcere depascebantur; itaque consului ut emortua caro præscinderetur, atque sic totum superius labrum sine dolore est abscissum, tandem iussu ut vulnus *vino, in quo Veronica & Agrimonia* essent incocta, singulis diebus ablueretur, statimque *unguentum ex elota Terrebithina & melle*, quibus exiguum *ol. vitrioli* sit admixtum, imponeretur. Hisce remediis tantum brevi integram sanitatem est consecuta, retenta tamen deformitate ex nudatione superiorum dentium, quam

postea juvenis ille Chirurgus, qui medicamenta administravit, in uxorem duxit, qui adhuc feliciter valet.

Sanguis menstruus mulierum in utero *Sanguis* gerentium & lactantium non est venenatus, *men-* liquidem eo & in utero & post partum *struus.* infantes nutriuntur; nec tam venenatus est hic sanguis in mulieribus temperatis ac sanis, ut *Plinius*, & alii scribunt; & nostro etiam tempore *Paracelsus* asserit: qui menstruum sanguinem tam perniciosum virus esse dicit, ut cælum & terram inficere possit: Mulierculas item menstruo laborantes, solâ imaginatione aëre mediante, homines per multa miliaria inficere posse. Minimè tamen negandum est menstrui materiam, in intemperatis & morbosis fœmellis præsertim, diu retentam, tum suo contactu noxiam, tum intra corpus assumptam, perniciem adferre posse; ideoque non sine ratione Deus prohibuit *Levit. 10.* ne vir cum muliere tali colluvie inquinata congregiatur; nam experientia testatur, menstruum suo contactu infecta enecare, gramina arefacere, & specula cruentis maculis inficere. Itaque non est dubium, quin suo contactu, noxam, & ab execrabilium veneficarum intra corpus exhibitione, maniam & mentis alienationem, totiusque naturæ corruptionem inferre possit. Hujus detestabilis veneficii curatio est repentina evomitio, assumpto haustulo *aq. jugland. per descensum destillata*. Postea commodè exhiberi possunt *3. ij. Theriacæ Andromachi cum aq. melissa, aut 3. j. pul. Antid. margaritarum*. Antidoti loco fertur *sperma hominis* exhibitum, aut *trochisci de vipera*, bibatque æger subinde vinum, in quo *melissa sit decocta*. Utatur lavacro sive balneo dulcis aquæ, ac indulgeat crebrius Veneri. Aliarum rerum tum stirpium, tum animalium venenatorum symptomata, & noxæ faciliè hisce remediis enumeratis curari possunt, si prudenti consideratione venenatæ rei natura cum hisce conferatur.

DEO SAPIENTI ET POTENTI
GLORIA.

Finis libri de Venenis.

FRAN-

FRANCISCI JOELIS OPERUM MEDICORUM

TOMUS SEXTUS.

De

CHIRURGIA.

PRÆLOQUIUM.

Chirurgia
ne-
cessitas.



Chirurgica Morborum ac
Symptomatum curatio, ut est
vetustissima, ita in huma-
na vita utilissima & cog-
nitum maxime necessaria; mul-
ti enim morbi praesertim inter

plebeios sine arte Medica, solius Naturae bene-
ficio persanandi relinquuntur: paucissimi
autem ex morbis Chirurgia subjectis exi-
stunt, qui sine ope Chirurgica prosperè tolli-
queant; Quod autem ea praeclarissima Medica
artis pars non ab ipsis Medicis, sed ab
aliis certis hominibus, qui se falso Chirur-
gos nominant, hodie administratur, id ne-
mini mirum videri debet, cum ipsa se tam
late extendat, ut sola integrum hominem, &
quidem minime desidiosum desideret, & si-
cuti olim, ita & nunc certas Chirurgia par-
tes, ut sunt oculorum medicationes, Rami-
cum & calculorum per sectionem curationes,
dentium dolentium evulsiones & lumbrico-
rum extirpationes ceteri homines exercebant,
ac profitebantur; Cur autem non integra
Chirurgia certis artificibus demandetur non
video; Verum id non tantum admiratione
dignum est, quod hac tempestate optima &
nobiliss. Chirurgia tanquam spuria filia artis
Medica à sua genetrice avulsa, & ab omni-
bus ferè Medicis neglecta ac spreta, in servi-
tium, indoctissimorum hominum omnisque
disciplina ac literarum rudium tonsorum de-
trusa & ablegata sit; Quoruscunque enim
quaso ex Medicis huius seculi reperitur, qui
exemplo divini Hippo. & Galeni Sapientiss.
aliquid studii in ea vel impendat, aut pro-
priis manibus eam exercent, aut errata enor-

mia lanionum hominum tonsorum imperito-
rum demonstrare, corrigere, & certam Me-
thodum curandi illis praescribere possit. Sunt
sane plurimi Medici, qui ex aliorum pra-
scriptis & libris de Chirurgia multa blate-
rare sciunt, sed sua iudicia rationibus fir-
mis & experientia confirmare paucissimi qui
possint, inveniuntur. Fallitur enim qui
Chirurgiam perfectam ex libris se perficere
posse confidat, nisi eisdem accedat & expe-
rientia & manuale exercitium. Cum au-
tem ars Medica circa Chirurgia cognitionem
manca & imperfecta sit, sequitur neminem
bono jure Medici nomen mereri, qui Chirur-
gia prorsus rudis, de morbis Chirurgia sub-
jectis nil recte judicare possit: perpaucas enim
nobis affectiones occurrunt, quarum Sym-
ptomata manuariam curationem non requi-
rant. Quomodo verò manus feliciter appli-
cabit Medicus, aut tonsori ministro modum
operandi monstrabit, Chirurgia ignarus?
Decet itaque Medicina tyrones non levem
operam ac studium in addiscenda Chirurgia
impendere, qui excellentes cupiunt fieri Me-
dici. Ut itaque nos in tradenda Curativa
Medicina parte nil prateriisse videamur, bre-
vissima quam possumus methodo, omnia, qua
ad Chirurgicam curationem spectant, ultimo
hoc loco fideliter tractare, ac proponere pra-
esente Deo conabimur. Porro cum morbi Chi-
rurgiae subjecti certas Corporis partes ut plu-
rimum affligant, non immerito quis mirabi-
tur, cur nos inter Universales morbos refer-
re voluerimus? cui id respondemus, nostrum
factum non habere alias rationes, quam quia
morbos Chirurgicos inter affectiones particu-
lares sine ingenti confusione reponere mini-

Chirurgia ex li-
bris per-
fecte
disci
nequit.

Quam
late pa-
teat.

Quod
non sit
relin-
quenda
impen-
ditis
Chirur-
gis.

Morbi
Chirur-
giae sub-
jecti cur-
inter V-
niversa-
les cen-
seantur.

me potuerimus, & propterea omnes eruditi in Therapeutices descriptione ultimo loco Chirurgiam collocarunt, quia hi morbi universis partibus ejusdem generis & nominis accidere possunt, ut Tumores, Ulcera & Vulnera omnibus carnis & subcutaneis partibus. Fractura omnibus ossibus, luxationes omnibus articulis contingere possunt: non tamen pugnamus cum ipsis qui alium sequuntur in collatione morborum Chirurgicorum ordinem & locum.

Chirurgia quid est?

Chirurgia, quid?

Chirurgia, si τερψον vocabuli spectas, idem est quod χειρουργία i. e. manuum operatio in curandis morbis, nostratibus Wundargney/ & Chirurgus idem quod χειρουργός i. e. manu operans, ein Wundargte. Est itaque χειρουργία ultima pars ἰατρικῆς; sive Curativa medicina, qua docet modum & qualitatem manualium operationum qua in morbis exercentur, praesertim in conglutinando initiatum soluta, & dividendo incidendoque continuitatis male affecta, & aliarum operationum qua ad sanitatis restorationem desiderantur, quas paulo infra enumerabimus.

Qui morbi sunt Chirurgiae subiecti?

Morborum Chirurgiae subiectorum sex genera. Tumor quid?

Sex sunt morborum Chirurgiae subiectorum genera, Tumor, ulcus, vulnus, Fractura ossium, luxatio articulorum & Ruptura membranarum.

Tumor praeternaturalis Gracis ἀπόσπυς Lat. abscessus, & exitura, ein Swulst / est extuberantia sive incrementum in aliqua corporis parte, in quo vel colluvies humorum vel flatuum copia collecta replet, distendit & partis continuitatem solvit, in molemque non-naturalem attollit: Et omnis tumor praeternaturalis in se omnia tria morborum genera continet, videlicet intemperiem, pravam Compositionem & continuitatis divisionem. Tumorum species in sequentibus declarabimus. Ulcus, ἔλκος, ein alter oder fauler schade / est continuitatis in partibus mollioribus carnosisque, veluti sunt cutis & musculi solutio & cavitas, ex quo

non sanguis ut ex vulnere, sed purulenta sanies manat. Ulcera ut plurimum tumorum praeternaturalium sunt comites, & semper excitantur à materia erodente, qualis est humor acris internus, aut materia erodens foris parti imposita. Ulcera species suis in locis enumerabimus. Vulnus vel plaga Gracis τραύμα sive πληγή, eine frische Wunde / est continuitatis solutio, qua cadit in quamlibet corporis partem, ab extrinseco instrumento casum facta; Graci perperam confundunt in suis definitionibus ulceris & vulneris vocabula, cum tamen multis nominibus inter se differant; Vulnus enim semper fit à causis extrinsecis: Ulcus vero à causis intrinsecis; ut erosione humorum ac plurimum, & per accidens ab extrinsecis, venenatis phar macis. Item vulnus semper sanguine madet; ulcus vero purulentiam saniem excernit. Vulnerum species plures sunt, pro partis vulnerata natura, quas suo loco explicabimus.

Fractura ἰσχυρῶς, ein Beinbruch / est continuitatis ossium vel cartilaginum solutio, vulnus seu contritio, qua à violenta externa causa irruente accidit, & os aut incidit aut contundit, comminuitque; franguntur autem ossa aut transversaliter aut per longitudinem.

Luxatio Gracis ἐξάρθρωσις, Verrenkung der Glieder / est articuli alicujus à propria & nativa cavitate ac loco in alienum & insolitum prolapsus, quo motus voluntarius partium luxatarum aut tollitur aut impeditur, cujus plures sunt differentia suo loco explicanda.

Ruptura Gracis ἰσχυρῶς τῶν σπέρων, ein Bruch der välle / est vulnus & laceraatio ac continui solutio, qua accidit in ipsis tunis sive membranis.

Quae Symptomata morbos Chirurgiae subiectos potissimum comitantur?

Varia & periculosa saepe Symptomata morbos comitantur, quibus nisi confestim succurratur, ipsos morbos perniciosiores reddunt & curatu difficiliores. Sunt autem praecipua sympto-

Chirurgiæ sub-
jecto-
rum.

*Symptomata Tumorum quidem sive Aposte-
matum dolor, inflammatio, induratio, pruri-
tus & lividitas.*

Ulcera comitantur quoque eadem Sym-
ptomata, Dolor, Inflammatio, Intumescencia,
Siccitas, Putredo, Sordities, Fætor, carnis su-
perflua incretio, Gangrana, Verminatio, Pru-
ritus.

Vulneri accidunt sanguinis implacabilis
eruptio, hæmorrhæia sive aquosa humiditas ex vul-
nere profluens, quam nostri das Gliedwasser
vocant, sapies putida, dolor, tumor, inflam-
matio, carnis superflua incrementa, puris
frustratio, pruritus, Febris, alvi obstructio,
vomitus, convulsio, animi deliquium, vigilia,
gangrana, & macilentia seu tabes partis vul-
neratæ.

Fracturarum ossium Symptomata sunt, do-
lor, inflammatio, inepta ossium coaptatio, ossis
à toto liberati intra cutem reliquia, vulnus,
tumor, ossis mortificatio, ac denigratio, caries
sive erosio, pruritus.

Luxatorum articularum Symptomata
sunt, inepta & imperfecta repositio semotorum
ossium, crassi & lenti humoris inter conjun-
genda ossa collectio, dolor, tumor, inflamma-
tio, & ossis luxati fractio.

Ruptarum membranarum Symptomata
sunt dolor, & carnis aut alterius partis per
rimam ruptam prolapsio, qualis fit in hernia,
id est in ruptura membrana peritonæi, ubi
vel intestinum vel musculosa caro prolabi-
tur. De his omnibus Symptomatibus in sin-
gulorum morborum enumeratorum curatio-
nibus fusius docebimus.

Chirurgum bonum & inculpatum, qua-
lem virum esse decet?

Quæ
Chirurgi
go co-
gnosce-
nda.

Chirurgum præstantem, oportet esse pru-
dentem, acris iudicii, & in artis Medica par-
tibus singulis mediocriter doctum. Ex physio-
logia enim debet addiscere humorum natu-
ras, corporum & partium temperamenta. Ex
ἀντολογία addiscet morborum & Symptoma-
tum Chirurgia subjectorum causas & quali-
tates. Ex σημειολογία signa cum salutaria, tum
perniciosa, & qua facilitatem & difficulta-
tem curationis ostendunt, percipere studebit.

Ex φαρμακευτικῇ remediorum tum sim-
plicium tum compositorum ad curationem
Chirurgicam necessariorum facultates co-
gnoscere studebit; oportet præterea Chirurgum
inculpatum esse, animo pium, modestum,
misericordem, & affabilem; non avarum,
non garrula iactantia tumentem, vanaque
spe & falsis promissis egrotantes alentem; in
sectionibus & ustionibus oportet ipsum esse for-
tem & imperterritum, corpore agilem, acie
visus & sensu tactus excellentem; manibus ac
digitis promptum, minimeque tremulum; &
in artis operibus multum diuque exercitatum:
& in summa is excellentissimus Chirurgus ha-
bebitur, qui curationem Chirurgicam citò, tutò
facile & sine magno cruciatu perficere potest.
Quarum rerum potissimum notitia Chirurgum
instructum esse decet?

Quatuor potissimum rerum noticia & u-
surpandi ratione Chirurgum inculpatum in-
structum esse oportet, Anatomies, Operatio-
num Chirurgicarum, remediorum & instru-
mentorum Chirurgicorum.

Ex anatome quæ sunt cognoscenda
Chirurgo?

Ex Anatome sedulo cognoscere debet Chi-
rurgus partium omnium corporis, aut saltem
partium principalium & similiarum voca-
tarum substantiam, situm, officia & actio-
nes, ac si quæ earum vulnerentur, sintne le-
thales, periculosa, & facilis vel difficilis cu-
rationis.

Quæ sunt partes principales, postprinci-
pales & quæ similes?

Principales partes sunt quæ primarias edunt
actiones in corpore humano. & sunt 4. Cere-
brum, Cor, Epar, testiculi.

Partes
princi-
pales.

Postprincipales sive maioris momenti
sunt Spinalis medulla, Aspera arteria, pul-
mones, gula, ventriculus, intestina, septum
transversum, Renes, Vesicula bilis, Vesica
urinaria, & Matrix.

Similares partes sunt, quarum singula par-
tes à toto dissecta, totius substantiam & nomen
retinent; sunt autem similes partes, Nervi,
Arteria, Vena, Membrana, Musculo-
rum Caro, Ligamenta, Tendones, Cartila-
gines,

gines, Ossa, quibus & articularum constitutio addi potest.

Quæ est natura & constitutio enumeratarum partium?

Brevis
descrip-
tio par-
tium
quæ ad
cere-
brum.

Εγκεφαλον, Cerebrum, Das **O E** S **I** N oder **B R E C E N** est medulla capitis, substantiam habens concreto lacti similem, quod duabus membranis involutum est, quarum anteriorem tenuem Meningem & piam Matrem vocant. Exterior autem dura Meninx sive dura Mater nominatur. Cerebrum 4. in se continet cavitates, quæ officina sunt Spirituum animalium; Cerebri posterior pars Cerebellum, ex quo derivatur Spinalis medulla; ex cerebro 7. paria nervorum oriuntur ad instrumenta sensoria deducta, exinde eorum surculi in subiectas quasdam partes.

Officium & Utilitas Cerebri est cum Spiritu animali potentias animæ locomotivam & sensitivam universis corporis partibus per nervos communicare.

Ejus
vulnera.

Cerebrum vulneratum ut plurimum lethale est, etsi nonnullos cerebro vulneratos sanitati restitutos fuisse, quidam magni auctores testificantur.

Cor.

Καρδια, Cor, est fons Vita; substantia cordis est caro dura & compacta, situm habens sub osse pectoris, non quidem perpendiculari sed obliquum, ita ut ejus mucro ad lævam papillam tendat: binas habet Cor in se cavitates, quæ officina sunt Spiritus Vitalis. Ex Cordis sinistra cavitate oritur Aorta, omnium arteriarum truncus; Officium & usus cordis est vitalem spiritum & calorem nativum per arterias universis corporis partibus distribuere. Corde vulnerato necessario subita mors subsequitur.

Iecur.

Ήπαρ, Iecur. Substantia Epatis mollis est & concreto sanguini similis; situm habet Iecur sub infimis costis dextri lateris, latum digiti dependens infra septum transversum. Ex Epatis gibba & suprema parte omnium exoritur magna & cava vena, quæ truncus est totius corporis venarum; cava autem sua parte ventriculo incumbit. Officium

& actiones jecinoris sunt, Chylum assumptum in sanguinem convertere, eumque purificare, & purificatum, universi corporis partibus nutriendo per venas distribuere. Vul-

Ejus
vulnera.

neratum Epar circa venam cavam lethale est, circa vero reliquas partes per accidens est lethale: quandoque enim persanatur: & quidem cum difficultate. Ὀρχεις, Testiculi, Testiculæ substantiam habent glandulosam atque spongiosam, situm inter inguina; in maribus è corpore prominent, in femellis autem intra corpus circa inguina latitant. Usus & Officium testiculorum est materiam seminis in vasis seminariis, quæ testiculi sunt annexa, elaborare, & sæcundam reddere. Vulnera testicul. difficillime curari possunt, sed tot artificiosè exacti curari quidem possunt, sed perit facultas prolificandi: sæpe autem contusi testiculi per accidens propter symptomata mortem inferunt.

Eorum
vulnera.

Post principales maximiquè momenti partes sunt:

Μυελὸς ὀπίσθιος Græcis, Latinis Medulla spinalis, der Nuckegradt / Oder Das rucken March. Est rivulus per dorsum Spinalis fluens, substantia ejus substantia cerebri persimilis est, sed paulo duriore cerebro, quia, ut cerebrum, duabus tunicis est vestita, situm habet in cavitate vertebrarum. Officium & usus spinalis medulla est, 30 paria nervorum utrinque per dorsum pro ducere, & eorum surculos per totum corpus dispergere, & per eodem motum voluntarium & sensum ex cerebro acceptum, universis partibus distribuere.

Medulla
Spinalis.

Vulnerata spinalis Medulla lethalis est, statim enim convulsionem infert, statimque ubi præcidiuntur, omnes inferiores partes incisione resolvuntur, i. e. motu ac sensu privantur, intercipiuntur enim spiritus animalis ex cerebro per eam defluens.

Ejus
vulnera.

Τραχηὶς ἀσπέρια, Aspera arteria, Das Aspera Luftrhor/ cujus caput sub collo eminens, Larynx sive guttur nominatur, substantia consistat ex circulis cartilagineis inter se foris, & intro membranis convestitis, situm habet in antica colli parte, faucibus enim per collum & initium

arteria.

initium thoracis in pulmones implantatur. Officium & utilitas Aspera arteria est, aërem per inspirationem ex ore & naribus attractum intra pulmones deferre, & fuliginosos cordis vapores per respirationem provehere, atque voci sonora inservire. Vulnerata aspera arteria usque in ejus cavitatem, lethalis est. intercipitur enim respiratio, sine qua homo vivere nequit.

Ejus
vulnus.

Pulmo-
nes.

Πνεύμονες, Pulmones, die Lungen/ substantiam habent mollem & raram, Spuma sanguinis similem, sium habent utrimque in thoracis antica partes, officium & utilitas pulmonum precipua, est respiratio & cordis ventilatio: vulnerati pulmones ut plurimum lethales sunt, tum quia intercipitur respiratio, tum etiam quia pulmo vulneratus propter continuum motum, coalescere nequit; ideo etiam aliquando mors diutius protrahatur, attamen in tabem delabuntur pulmone vulnerati, ac tandem intereunt.

Eorum
vulnus.

Gula.

Ὠισοφάγος, Gula, Der Stunck/ est canalus cibi ac potus, substantia constat duabus tunicis sive membranis, sium habet in colli & thoracis postica parte; orta enim à faucibus, vertebrae colli membranis quibusdam alligata est, inde deorsum protensa transit per septum transversum, cui undique connascitur, ac sub septo transverso ventriculo implantatur, qui locus orificium ventriculi nominatur. Vulnerata gula lethalis est ratione Symptomatum; intumescit enim, & alimenti ingestionem intercipit.

Ejus
vulnus.

Diaphra-
gma.

Διαφράγμα, Septum Transversum, vel praecordium, Das Scheidellfell oder Hutelein/ substantia constat duabus validissimis & musculosis membranis, & Thoracem ab infimo ventre, tanquam tabulatum per transversum intercipit ac distinguit, sium ejus est sub pulmonibus & supra ventriculum; in antica enim corporis parte Cartilagini ensiformi, Dem Herbiggröbelin/ in postica parte duodecima vertebra dorsi, circumquaque autem & per latera thoracis costis inferioribus adnascitur, per illud transit gula, Cava Vena ac Arteria magna; Cujus foramina ejusdem partibus artissime connata sunt. Utilitas ejus est

separare organa vitae ab organis Nutritionis, ac inservire respirationi, atque per ejusdem voluntariam extensionem juvare expulsiōem excrementorum alvi: vulnerato Septo transverso statim perit respiratio, & extinguitur vita; semper itaque lethale est.

Ejus vul-
nus.

Κοιλία, γαστήρ, Gracis, Latinis Ventriculus, sed minus propriè, nominatur & stomachus, cum stomachus propriè sit orificium ventriculi, ubi nimirum implantatur gula ventriculo; nostris das Herbiggröbelin/ ventriculi substantia constat ex duabus crassis tunicis sive membranis, sium habet sub septo transverso inter cavitatem Cartilaginis ensiformis, ac inter Umbilicum. Officium ventriculi est alimentum assumptum conficere, alterare, & in Chylum convertere. Vulneratus ventriculus, praesertim circa ejus orificium, lethalis est, quanquam Fallopius dicat se quosdam curasse, quibus ventriculus usque ad cavitatem ejus erat vulneratus, & ex quo chylus profluxerat, id quod miraculum potius, quam medica curatio censendum est.

Ventri-
culus.

Ejus vul-
nus.

Ἔντερος, intestina, die Darment/ coninum corpus sunt, ejusdemque substantia gula, ventriculus & intestina; figura tamen, situ & officiis variant. Intestinorum substantia est duplicata membrana sive tunica. Etsi autem intestina unicum sint corpus, tamen quia alia ejus partes sunt tennes, alia crassa, ideo in plures species distinguuntur, quae in Spiras convoluta, sium habent in infimo ventre, infra umbilicum; progenerantur ex inferiore orificio ventriculi, & in spiras convoluta in anum desinunt. officium & utilitas intestinorum est benigniorem partem alimenti per venas Mesaraicas, quibus sunt referta, ad Epar distribuere, feculentiorē verò partem foras propellere & excernere.

Intestina.

Vulnerata intestina praesertim tenuia, lethalia sunt; crassiora quoque si vulnerentur, nisi imposita intestinis argentea fistula, serico filo obligentur, ut plurimum lethalia sunt. Si vero non sint laesa intestina, & tamen ex vulnere Abdomina prolabantur, sine omni periculo iterum reponi possunt.

Eorum
vulnera.

Abdo-
men.

Περιοταῖον, Abdomen, das Kinstervetd/est capsula sive pera, in qua omnia viscera sub septo transverso, veluti sunt Renes, Epar, Lien, Ventriculus, intestina, Vesica & Matrix, continentur, & tanquam colligata suis in locis harent. Substantia peritonai constat ex simplici & pellucida membrana, multa pinguedine confersa; situm habet sub Diaphragmate, & totum inferiorem ventrem complet usque ad pubem. Vtus ejus est omnia viscera infimi ventris in proprio loco continere; Raro vulneratur Abdomen, quia simul

Ejus vul-
nus.

vulnerentur quadam in eo contentarum partium, & tum non caret periculo, sed ut plurimum lethale est; at si solum Abdomen sit vulneratum, & partes in eo contenta foras prolabantur, si artificiosè reposita fuerint, & abdomen consutum, facillimè sanari potest.

Renes.

Νεφροί, Renes, die Nieren/ Renum substantia carnea est & densa, situm habet ad internas partes Vertebrarum dorsi sub Diaphragmate. Ren tamen dexter elatior est sinistro; officium & utilitas Renum est in purificatione sanguinis, qua fit in Epate, aquosiorrem sanguinis partem per venas emulgentes attrahere, & deinde in vesicam percolando destillare. Vulnerati Renes usque ad eorum cavitates, lethales sunt; si vero vulnus non penetret ad eorum thalamos, curari possunt, nisi accedat inflammatio.

Eorum
vulnera.

Lien.

Splen, Lien, substantia constat carnea, sed peculiari, livida, & rara, situm habet sub septo Transverso, ac sub infimis costis sinistri lateris, è regione Epatis. Officium & utilitas Lienis est in purificatione sanguinea massa terrestriorem & feculentiorrem partem sanguinis in se attrahere. Vulnerato Liene non necessarîo sequitur mors, nisi vulnus penetret ad magnum canalem, per quem excernitur melancholica colluvies, & accedat tumor & inflammatio.

Ejus vul-
nus.Vesica
fellis.

Κύστις χολεδωδης, vesicula vel capsula bilis flavæ, die Galle/ substantiam habet membranæ simplicem, sita vero est sub cava parte Epatis. Officium & utilitas ejus est, ex massa sanguinea, qua in Epate confecta est, igneam partem, quam fel seu bilem vocant,

attrahere, & in se colligere, ac deinde in intestina exonerare. Vulnerata hac vesicula Ejus vul-
fellis semper necessario mortem infert, sed raro ladiatur sine læsione Epatis. nus.

Κύστις, vel cum adjectione ὑποδὲξ & Vesica urinaria, die Blâse/ substantiam habet contextam ex tribus tenuissimis tunicis, situm vero in termino infimi ventris inter ossa pubis, cujus fundus amplius est, & sursum erectus versus Umbilicum; Cervix vero sive collum constrictum in pudenda desinit.

Vesica
urinaria.

Ejus postica pars in viris recto intestino incumbit, in famellis vero Matrîci. Matrîx enim inter intestinum rectum & vesicam collocata est. Officium vesica est urinam excipere à renibus, & in se eousque colligere, donec aut mole ejus gravata vesica, aut acrimonia irritata; urinam per pudendum, cui ejus collum est insertum, foras expellat. Vulnerata vesica circa fundum aut capacitatem ejus lethalis est; circa cervicem periculosa & difficilis curationis.

Ejus vul-
neca.

Μήτρα, Matrîx, sive ὤστρον die Moder/ Matrîx. est nostra procreationis hortulus, substantia constat unica & simplici membranâ, & crassa ac robusta. Collum deorsum versus sicuti vesica habet. Sita est inter utraque ossa pubis, postica sua parte incumbit intestino recto, antica vero parte incumbentem sibi habet vesicam. In cavitate sua plena est exiguis foraminibus sive oculis quæ cotyledones Græcis, i. e. acetabula, nominantur, per quæ singulis mensibus mulieribus sanis inter decimum septimum & quinquagesimum annum constitutis (alii à duodecimo incipere statuunt; & post 50. annum concepisse mulieres certum est) impurus & menstruus sanguis expurgatur, nisi sint gravida, (utero enim gentibus cessat sanguinis fluxio). Vitilitas matrîcis est ex concepto semine factum producere. Vulnerata Matrîx ut plurimum lethalis est Ejus vul-
tum per se, tum ratione Symptomatum. nus.

Cotyle-
dones
quid.

Similares partes omnium maximè Chirurgo sunt cognoscenda propter incisionem, vel praciisionem vasorum: Sunt autem praciipue partes similes hæ:

Similares
partes
cur cog-
nosce-
dæ.

Νεῦροι, Nervi, die Sehnader/ Nervos, Nervi.
arte-

arterias, & venas Medici vasa nominant, idè quod per ea tanquam canales potentia anima una cum materia distribuuntur. Per nervos enim Spiritus animalis cum potentia Locomotiva & sensitiva; per arterias spiritus vitalis & calor vivificus; per venas Spiritus naturalis & sanguis in omnes corporis partes defluit ac distribuitur. Substantia nervorum similis est cerebro indurato, alba & instar Corrigiola, teres & oblonga. Omnes nervi originem habent aut ex cerebro, aut ex spinali medulla; & ex cerebro quidem septem paria molliora; ex Spinali Medulla 30. paria duriora producuntur, duabus tenuissimis tunicis à membranis cerebri ortis vestita. Hi nervi suos ramos in omnes corporis partes distribuunt. Officium sive utilitas est, ut dixi, Spiritum animale cum potentia sensitiva & locomotiva deferre & communicare. Nervorum vulnera sive casim, sive punctim contingant, eorumque à carne denudatio difficillime curantur, & ut plurimum vulnera nervorum convulsionem, aut resolutionem secum afferant. At si pracidantur nervi iis partibus quibus sunt implantati infra prae-cisionem situs seu constituti, omnem statim sensum ac motum auferunt, aut notabiliter viciant.

Arteriae. Αρτηρίαι, Die Pulsaderen / Canales sunt venis similes, quarum substantia ex duabus constituta est membranis. Arteria magna ex sinistro cordis ventriculo tanquam caudex omnium arteriarum exoritur, & in infinitos ramos tanquam arbor inversa divaricatur, qui venarum ramis adjuncti, in totum corpus disperguntur. Nulla siquidem vena, excepta unica, in corpore reperitur, qua sibi arteriam conjugem non habeat. Arteriarum officia sunt Vitalem spiritum & calorem vivificum, ex corde in universum corpus deferre, & omnes partes corporis vivificare, suoque motu continuo, quem ex corde habent, fuliginosos vapores sese dilatando per poros cutis expellere, & sua constrictione aërem ambientem attrahere, & totum corpus ventilare atque perspirare. Vulnera arteria magna sive Aorta prope cor, semper lethalia sunt,

sed in reliquis ramis arteriarum sanari possunt. Quamquam eruptionem sanguinis ex Arteriis non facile compescimus.

Φλέβες, Vena, Die Blutaderen / Venae. sunt canales, per quos sanguis ex Epate in universum corpus singulasque ejus partes distribuitur. Substantia venarum unica & simplex est Membrana; Originem ducunt vena ex gibba parte Epatis, ex qua vena cava tanquam truncus producitur, sursumque repit usque ad cor: Deinde in ramos infinitos divaricatur, qui arteriis juncti in omnes corporis partes distribuuntur. Officium Venarum est sanguinem in Epate elaboratum & purificatum nutriendi causa in omnes corporis partes deferre. Cava Vena si-
Earum vulnera.
ve truncus reliquarum Venarum vulneratus, necessario mortem infert, & ejus rami qui sunt in collo, & jugulares nominantur; item quae in temporibus habentur, vulnerata, periculosa sunt, & difficillime curantur.

Μεμβράνη, Membrana, & pellicula, quae
Earum vulnera.
& Χιτών, i. e. tunica nominatur, nobis ein Hutlin / Tunicarum substantia constant simplici, tenui ac lata membrana, nullum enim viscus in corpore est, quod non aliqua tenui pellicula sit vestitum, cujus beneficio & Epar, & pulmo, & cerebrum, & ossa nonnihil sentire videntur; inter membranas nobilissima sunt cerebri Meninges, & oculorum tunicae.

Officium Membranarum est, vestire viscera, iisque sensum contribuere. Vulnerata membrana ossium & Musculorum curari possunt facile; sed membrana cerebri, Epatis & pulmonis vulnerata, periculum, & curandi difficultatem, ac saepe mortem ratione inflammationis inferunt: Membranarum vulnera à Medicis rupturæ dicuntur.

Σὰρξ, Caro, est pars simplex in Musculis; Caro sive Musculus.
nulla enim caro simplex in universo corpore reperitur, qua non sit nervis & arteriis & venis intertexta; qualis constitutio carnis Græcis Μῦς i. e. musculus, nostris ein Muskelin nominatur. Sunt itaque Musculi car-
nosa

noſa partes noſtri corporis oſſibus univerſis adnatæ, & membranis propriis cute veſtitæ; ſubſtantia muſculorum, ut diximus, eſt Caro, venis, Arteriis & Nervis intertextæ, & tenuiſſima membrana conteſta. Omnis autem Muſculus dividitur in Caput, Ventrem & Caudam; Caput eſt ubi ligamenti oſſium adnaſcuntur; Venter dicitur eorum pars latior; Cauda verò, ubi iterum in ligamenta nervoſa deſinunt, & articulis alligantur. Omnes enim articuli caudis muſculorum contracti, motum edunt voluntarium. Officium itaque muſculorum eſt oſſa corporis contegere, & oſſium articulos per inferas illis nerveas caudas pro arbitrio movere. Nulla corporis pars vulnerata tam ſanatur facile quam muſculus; Sed ſi ejus caput præcidatur tranſverſaliter, aut cauda eorum amputetur, tum articuli quibus cauda eſt implantata, motum amittunt, aut ſenſibiliter laduntur. Et ſi temporum muſculi vulnerentur, difficilime & periculòſe curantur, propter Venas & arterias qua ibidem in cerebrum repunt.

Ejus vulnus.

Oſſa.

Oſſa, Oſſa, ſunt partes corporis noſtri ſimplices ex craſſiore & terreſtriore parte ſeminis in generatione concreta; Oſſium ſubſtantia terreſtris eſt, omniumque partium ſicciffima & duriffima. Numerus oſſium corporis noſtri hoc diſticho comprehenditur;

hoc eſt, 246.

Adde quater denis, bis centum ſenaque; habebis,

Quam ſis multiplici conditus oſſe ſemel.

Eorum fracturæ.

Officium ſeu utilitas oſſium eſt fulcire & geſtare totum corpus humanum; Sicut enim ſunt, ut Galenus ait, pali in tentoriis, ita oſſa in humano corpore. Oſſium vulnera, fracturæ Medicis appellantur. Oſſa temporum graviter vulnerata & juguli oſſa contraſta; Item oſſa vertebrarum uſque ad medullam vulnerata, ut plurimum lethalia ſunt. Reliquorum oſſium fracturæ ſi accedat artiſcioſa repoſitio, ruruſum callo conglutinantur, ſananturque.

Cartilagineſ.

Χόνδρι, Cartilagineſ, Das Knoſpricht und weſte theil an den knaken / Oſſeam habent ſubſtantiam, ſed minus quam oſſa

dura ſunt; Utilitas & officium cartilaginum in capitibus ſive tuberculis oſſium & acetabulorum, i. e. cavitatum in quas inferuntur oſſium capita, eſt, ne ex continuo motu articulorum dura oſſa ſe mutuo atterant. Fractura Cartilaginum lethales non ſunt, niſi forſan interiores prima Vertebrarum, qua Cartilagineſ ſunt, conſringantur, qua ſerviſſima inferunt Symptomata.

Ligamenta.

Οὐδοί, Ligamenta, Glider ſebnen oder Glide Bende / ſubſtantiam herveam habent, ſed nervis longe durioſiorem, pronascentur ligamenta ex coarticulatorum oſſium Cartilaginibus, eorumque utilitas eſt oſſa firmiter colligare inter ſe, & capita muſculorum articulis connectere; utilitas & officium ligamentorum eſt prohibere, ne oſſa coarticulata, in validioribus motibus luxentur, aut loco dimoveantur; Grandiora & magis conſpicua ligamenta conſpiciuntur in Cervice, qua caput cum vertebris connectunt. & ligamenta, qua humerum cum brachio, & crus cum ſcemore, & ſcemur cum tibia colligant; Deinde & vertebrarum ſpina ligamenta nobis maximè obvia ſunt; vulnerata ligamenta, & maximè ſi præcidantur, auferunt motum omnem articuli, cujuſ ſunt ligamenta, & difficilis ſunt curationis.

Eorum vulnera.

Τένονες, Tendines, ſeu ἀποσπαστικοί, Tendines. e. enervationes, De Harſtranc oder Harſchnen / ſunt cauda muſculorum ex confluxu fibrarum nervoſarum per muſculos ſparſarum progenerata, ac nervea ſubſtantia. Officium & utilitas tendinum eſt connectere articulis muſculos, & ſua dilatatione ac conſtrictione articulos & muſculos ad motum voluntarium cogere. Ligamenta nervos ſexiuplo craſſitie ſuperant, qua in quibusdam locis lata, in aliis verò rotunda, ac teretia conſpiciuntur. Vulnera eorum tendone aut diſſectio, ſemper ejus articuli motus auferitur, & notabiliter viſiatur, & difficilime, veluti & nervi, curari poſſeſt.

Eorum vulnus.

Αἰσθρον, articulus, ein Glide oder Lencke / Articuli eſt qualibet oſſium commiſſura, ad motum voluntarium comparata: præſertim verò duorum

duorum ossum coaptatio, in qua alterius caput sive extremitas rotunda in alterius acetabulum sive cavitatem commissum est. Officium articulorum est pro voluntatis arbitrio motui servire, & quanquam non sit una forma coarticulationum omnium, finis tamen unus est, videlicet motus voluntarius. Vulnerati articuli motum ladunt, & difficilimè curari possunt, propterea quod nervorum, ligamentorum & Tendinum propagines in iis concurrunt: ut plurimum in vulneribus articulorum *ixāpes*, sive aquosi humores colliguntur, quos nostri *ton-fiores das Blutwasser* vocant; quin si statim exsiccantur, vulnera curari non possunt.

Curationes Chirurgicæ per quas operationes perficiuntur?

Tres sunt efficientes causæ omnium curationum; in primis autem curationum Chirurgicarum. Prima ac principalis causa est ipsa Natura: vocamus autem hoc loco naturam, calorem nativum in humido radicali consistentem; & per omnes corporis partes diffusum; Secunda, sunt remedia; Tertia est ipse Chirurgus. Quæ dua posteriores administra sunt Natura; remedia enim adjuvant operationes Naturæ; & Chirurgus tollit ac removet impedimenta Naturæ, eamque studiose conservat; donec enim impedita est Natura, operationes suas minimè perficere potest. Natura itaque solius operationes sunt digestio, concoctio, alteratio & expulsio. Natura autem & remedium simul operationes sunt discussio, attractio, puris generatio, agglutinatio, carnis bona generatio, & cicatricis obductio.

Remedium solum operationes sunt, Refrigeratio, humectatio, calefactio, exsiccatio, percussio, condensatio, extenuatio, rarefactio, mollificatio, doloris mitigatio, & stupefactio. Chirurgi solius operationes sunt continuitatis solutio, quæ perficitur per incisionem, præcisionem, punctiorem, venæ sectionem, scarificationem, armorum extractionem, & per unctionem, & soluta continuitatis initio, quæ perficitur per coaptationem,

distantium partium, per consuitionem, & luxatarum partium à sua sede in alienum locum delapsarum restitutionem, & deligationem, & convenientium remedium applicationem.

Quibus addi debet puris remotio & detersio, vulneris ablutio & emundatio. Chirurgi & remedium simul operationes sunt, sanguinis ex vulnere erumpentis inhibitiio, seu suppressio, & ichorum sive aquosa colluviei in vulneribus collectorum absorptio & exsiccatio; porro omnis tum Chirurgi, tum remedium operatio perpetuè debet esse affectioni contraria, & natura analoga.

Quibus potissimum remediis instructus esse debet Chirurgus?

Instructus esse debet Chirurgus & notitiam habere omnium selectiorum cum simplicium tum compositorum remedium, quæ facultates habent enumeratas operationes perficiendi, quæ in has classes distribui possunt, ut alia sint percussiva, stupefacientia, dolorem mitigantia alia attractiva, alia resolventia, alia emollientia, alia maturantia, alia ruptoria & aperientia, alia mundificantia, alia sanguinis eruptionem cohibentia, carnem generantia, alia conglutinantia, alia cicatricem inducentia, & alia parvum restitutum corroborantia; & hæc quidem remedium genera omnia, in curationibus Chirurgicis foris & extra corpus usurpantur; nam quæ ad singula Symptomata arcenda tollendaque intra corpus exhibentur, ea in superioribus abunde sunt proposita.

Repellentia sive repulsiva remedia utiliora quæ sunt?

Απορροια & obstruentia, & stupefacientia, atque somnifera, cognata sunt remedia, & non nisi extensione & remissione frigiditatis differunt; omnia siquidem ea frigida sunt & facultatem habent refrigerandi, obstruendi, condensandi & fluxionem humorum ferventium cohibendi; Vimus autem repellentibus remediis, ubi ex adfluxione ferventium humorum tumor fervens, aut inflammatio in aliqua corporis parte

Eorum
vulnera.

Blut-
wasser.

Incura-
tione
Chirur-
gica tres
causæ
concur-
runt.

Solius
Naturæ
opera-
tiones:
Naturæ
& reme-
diorum:
Solorum
remedio-
rum.

Chirurgi
solius.

Chirurgi
& reme-
diorum.

Remedio-
rum Chi-
rurgico-
rum fa-
cultates.

Repel-
lentia
quæ.

Eorum
usus.

parte excitatur. Verum in usurpatione repellentium sedulo observandum est, primum ne ea imponantur tumoribus ex venenatorum humorum colluvie ortis, quales sunt Bubones pestilenciales; neque imponenda sunt tumoribus ex adfluxu frigidorum humorum excitatis, veluti sunt Oedematosi tumores. Secundo, ubi ferventis humoris adfluxio copiosa est, & corpus sit κακόν, semper vitiosus humor ante applicationem repellentium convenientibus remediis evacuari debet. Tertio in usurpatione repellentium materia medicamentorum subinde renovanda erit, ne videlicet diutius parte inherens, incalcescat nimium, & duplicet inflammationem partis. Remedia repellentia usitata hanc sunt:

Repellentium materia.

Chimici commentant lapidem Medicamentum Croci faccharum sal x spir. x Magisterium Solani, Sempervivi Lactuc. Psyllii. Plantag. Emplastici quid? & quis usus.

Rosa, plantago, polygonum, sempervivum, quercifol. teneriora, Rubifol. & immaturi ejus fructus, lentes palustres, hyoscyamus, papaver, sem. citon. sem. psyllii, vinum rub. aust. acetum rosa. ol. rosa. ol. myrti. Cort. gran. Balaustia, Nuces cupressi.

Ex compositis, Vng. popul. & cerusa. Qua ratione autem ex enumeratis remediis confici debeant aq. stillatis. succi. Mucilag. decocta. Vnguenta. Empl. Catapl. & Epithemata, quomodo ve omnibus sit utendum, in processu curationis explicabimus.

Obturatoria remedia quæ sunt?

Εμψυκτικά, i. e. infarciencia & poros cutis obstruentia remedia, quæ, ut diximus, affinia sunt repellentibus, eisque utimur in tumoribus ex affluxione humorum viciosorum aliqua parte excitatis, ut eos condensemus, & meatus obstruamus, quæ ut plurimum repellentibus miscentur, quorum usitata sunt:

Eorum materia. Chimici commentant Balsam. ex Galbano, Coralli. Bolus Armen. Terra Lemnia, Gipsum, & Lithargy. Eorum quoque componendi & utendi rationem in curationibus ostensurum sumus.

Ovi cand. farina triticea, far. fabarum, pul. gland. Amylum, Cerusa, Plumbumustum, Antimon. Thus, Mastix, Tutia, Coralli. Bolus Armen. Terra Lemnia, Gipsum, & Lithargy. Eorum quoque componendi & utendi rationem in curationibus ostensurum sumus.

Stupefacientia Remedia usitata quæ sunt?

Narcotica, i. e. stuporem & insensibilitatem partibus inducentia, dolorisque sensum auferentia, omnia ea Natura, non tantum ratione sua extrema frigiditatis, verum etiam ob suam venenatam formam substantialem, adversissima sunt; non itaque eis nisi summa exigente necessitate temere utendum est, ac diligenter cavendum, ne illis regionibus corporis, in quibus principes partes continentur, ut cerebrum, cor, epa & testiculi, admoveantur. Sunt autem remedia stupefacientia:

Opium i. e. succus de capitibus papaveris adhuc virentibus incisis collectus; item hyoscyama rad. & se. & succus, similiter cicutæ rad. fol. & suc. Mandragora, Ol. de Papa. & ol. de Mandragora.

Soporifera Remedia quæ sunt?

ὕπνιον, i. e. somnifera, remedia congenera sunt cum stupefacientibus: omnia enim quæ stupefaciunt, eadem & somnum conciliant, si temporibus imponantur; sed magna opus est circumspectione, ne temere temporibus imponantur, nisi mitiora; turbant enim rationem & somnum laboriosum efficiunt. Mitiora autem sunt succus ex contusi sem. Papa. & nucl. Persicorum cum aq. Rosa. & Solani & pauxillo aceti rosa. commixta.

Dolorem mitigantia Remedia quæ sunt?

Anodyna dolorem partium affectarum mitigantia remedia hoc loco ea vocamus, quæ non per stupefactionem, sensum doloris obdunt, nec quæ contraria sua qualitate dolorem mitigant, sed quæ specifica proprietate & temperamento partium Naturæ famulari, affectioni vero adversante cruciatu leniunt, & quæ pro affectionis Naturæ tam calidis quam frigidis morbis applicari possunt; Ejus classis sunt Althea, Malva, Rad. li. fl. Melilo. Medulla panis similari in lacte macerata, lac, ovorum luteum, Buty. recens, se. Lini, fœ. graci. Adeps suillus, gallinæ, humanus, Medulla ex ossibus Cervinis.

Narcotica quæ. Eorum usus. Cautio. Materia. Chimici laud. opiat. solutio opii, cujus facta Magister. Mandra. Hiochi. am. cicut. Item facta liorum.

Soporifera quæ. Eorum usus. Materia. Anodyna quæ.

Eorum materia. Chimici commentant. Empl. stiptic. Crolii. Extract. sangilum. nitri. O. Ammoni. cum m. stat. O. Ovorum. Magister. Croci.

vinis & Vitulinis, Ol. Carna. oll. li. alb. Quia ratione autem ex enumeratis remediis mucagines, fomenta, Emplastrum, Catapl. & Vng. confici & applicari debeant, suis in locis in curationibus exemplis declarabuntur.

Attractiva remedia præcipue quæ sunt?

Attrahentia Ελκυστή, sive ἰσχυρὰ remedia contraria sunt repellentibus; omnia enim attractiva sua proprietate calida sunt & tenuis substantia, & specifica sua forma ex alio corporis & humores viciosos & flatulentos sine medicamine habuit & venenatas qualitates, tela, aculeosque corpori infixos extrahunt & eliciunt. Fiant etiam artificiosa humorum & flatuum extractions per cucurb. Hirudines, sumæus, Vincula & frictions, de quibus hoc loco sermo nobis non est, sed tantum de attractionibus per remedia; Sunt verò mitura attractentia Annagallis, cum flo. purp. Rad. Aristo. utriusque Rad. Narcissi, Hermodact. Lac Thyimalorum, Rad. Arundinis, sterqus columbarum, sterqus anserinum, Gummi Ammon. Sagapenum. Opopanacum, & Galbanum; Validiora sunt quæ humores in superficiem cutis attrahunt, & vesiculas excitant ut Euphorb. Tapus. Et ex compositis, Empl. Oxycroceum & Meliloto, & baccis lauri. Quomodo verò ex superioribus succi, unguenta Empl. & Catapl. confici & applicari debeant, in processu curationum indicabitur; Attrahentibus remediis affinia sunt remedia Caustica, & crustas corpori inferentia, quæ paulo infra enumerabimus.

Emollientia sive Mollificantia medicamentum usitatoria quæ sunt?

Emollientia Μαλακτικὰ sunt, quæ duros tumores & crassos humores in aliqua parte condensatos, & membra frigore indurata, moderata sua caliditate emolliunt ac relaxant. Eorum si quidem proprietas est mitissime calefacere & præcipua sunt, Alibea, Malva, Parieta. Branca Vrsina, Viola sicca, Violaria fl. Chamom. Ebulus, lib. alb. flo. rad. Brion. se. lini. Se. spir.

foenugraci, far. Tritici, adeps suillus, Medulla cervi & Vitul. Ovorum lutea, stirax liquida, Terebinthina, Ammoniacum, Bdelium, Galba. Ol. Chama. Lill. alb. Vng. Dialib. & Empl. Diachyl. Ex præscriptis pluribus aut paucioribus formari possunt fomenta, sive decocta, Mucag. Catapl. Empl. & Vnguenta, ut in curationibus, exemplis, declarabuntur.

Discutientia sive Resolventia remedia usitatoria quæ sunt?

Δισφoετικὰ i. e. per evaporationem humores resolventia, & elicientia remedia sunt, quæ sua proprietate cutis poros dilatant & humores extenuant, ac sensim per halitus extrahunt, ita ut tumor subsideat. Affinia autem sunt emollientibus; & ejus classis usitatoria sunt, Chama. Aneib. Melilot. Malva, Parieta. Fuma. Ebulus, Sambucus, Hypericon, Brassica, Majoran. Rosina. Se. Lini, fenugraci. Cimini, Carvi, Dauci, Rad. Aristo. Gentia. Cepa. Rad. lill. Medulla panis Fermentum & Ovi luteum: ex quibus quæ ratione fomenta, decocta, Catapl. Empl. Cerota & Vng. confici debeant, suis in locis declarabimus.

Maturantia sive Suppurantia remedia potiora quæ sunt?

Πεπτικὰ sive ἐκπονητικὰ, maturantia, seu humores in tumoribus contentos in pus convertentia, affinia quoque sunt emollientibus. Vimur autem maturativis in tumoribus quibus putridus humor solvi ac discuti nequit. Maturatio sive suppuratio quidem est Naturæ operatio; sed remedia in suppuratione adhibentur ut conservent Naturam, & adjuvant ejus operationem, ut nimirum celerius fiat colluviei concoctio, & in pus conversio. Sunt autem suppurantia præcipua hac, Fotus ag. cal. Ol. dulce, Bury. Oesypus, adeps suillus, pinguedo anserina, Medulla cervi Medulla vitulina, Medulla panis triticea, far. triticea, & ericicum ipsum jejuna saliva, præmansum fol. Tussilag. sub cinerib. cocta. Rad. alib. lill. cepa sub cineribus cocta. Ovi luteum, Stirax liquida, Ammon. Galbanum, ex compositis Vnguentum Basilicum, Vnguentum de Alibea,

Therebint. & Ol. sulph. oleum & Ol. adip. human.

Discutientia quæ.

Eorum materia. Chimici laudant Magisterium lithargyrii Minii, Cerussæ. Marcastæ lapid. Cal. Sal. Verb. bals. hyper.

Maturantia quæ.

Eorum usus.

Materia. Chimicis in usu est Empl. stipt. Croll. ex Meliorta Paracelsi.

Althea, Agrippina & Empl. Diathylon. Ex horum pluribus aut paucioribus conficiuntur fomenta, Catapl. Empl. & Unguenta: quorum exempla in curationibus nobis obvia erunt.

Cutem rumpentia quæ & quoruplicia.

Cutem rumpentia, erodentiaque remedia præcipua quæ sunt?

Kaustica i.e. adurentia, & *exagantia* crustam inducentia, & *corruptiva* i.e. corrumpentia remedia, inter se cognata sunt, & ignei caloris extensione & remissione tantum differunt, quæ cuti imposita primum vesicam excitant; deinde cutem erodunt, & subjectam carnem exedunt, atque corrumpunt. Vimur hisce remediis ubi tumor maturus & suppuratus sua sponte non dirumpitur, & pus in eo contentum sibi viam facere nequit; aut ubi pus crassius factum tumorem durum effecit. *exagantia* itaque siue aperientia remedia mitiora hæc sunt; Ther.

Esfcharat. materia Septicorum materia.

Andro. Sem. Vrtica, Adeps ranarum viridium per arborem reptantium, adeps leporinus, Lac Tuimali, Rad. Ranunculi, Canthar. cum fermento, Stercus Caninum, Columbinum, Mel siue succus melleus ex Anacardo. Validiora autem hæc sunt, & *exagantia*, quæ fere instar ignis urunt, & crustas inducunt; Tapsia, Calx viva, fex vini cremata, Cinis cort. fraxini arboris cum saliva jejuata temperata. Validissima verd & vitr. Au- *exagantia*, quæ & cutem, & carnem usque ad rip. \varnothing ossa exedunt, & corrumpunt, ut sunt Arsenicum, Merc. Sublima. Aq. fortis, Troch. de Arsenico. Hæc quidem venenata sunt & violenta remedia, proinde eis minime utendum est nisi prius probè correctis admixtisque talibus remediis, quæ venenatam qualitatem refringant; nec patiendum est ut diutius corpori inhaereant, sed statim ut cruciatus est

Chimici adhibeat Ol. \varnothing Ol. vitr. Au- rip. \varnothing sulph. A- qua fort. spir. cal- eis, spir. sapon.

Cautificis exciatus, & inflammatio exardescit, removenda sunt à corpore, & inflammatio refrigerantibus mitiganda. Quomodo autem *exagantia* cum aliis sint temperanda, & in formam linimenti aut Empl. redigenda, suis locis in curationibus ostendemus.

Detergentia siue Mundificantia remedia præcipua quæ sunt?

Kathartica, expurgantia, *putrida* abstergentia remedia sunt quæ sua quadam acrimonia saniem, & sordes in ulceribus & vulneribus extergunt & purgant; & quamquam ulcerum & vulnerum mundificatio sit operatio propria Chirurgi; ejus enim prima cura esse debet, ut vulnera & ulcera subinde ab omni impuritate pro qualitate ulceris aut sero lactis, aut vino austero, aut Hydromelle abluiat, mollique linteo aut spongiola abstergat; & remedia indita purificant emundantque egregiè, ut deinceps Chirurgus eò facilites ac commodius sordes auferre queat. Sunt autem usitata abortientia remedia, vinum austerrum, Hydromeli, mel rosa. chelido. macenta. Hy. Hypericon, Persicaria, Sabinà, Agrimo. Beton. Apium, Cynogloss. earumque omnium & singulorum succus, decoctum & pulvis. Item far. fabarum, cicerum, hordei, lupinorum & pul. Aristol. utriusque; validiora etiam sunt, ut quæ non tantum saniem, sed & carnem superfluum ulceribus inresecantem extirpare queant; Hellebo. niger, Fistulosi ulceribus insertus, pul. vitr. usti & probe eloti, quæ omnia excellit Mercur. præcipitat. Chimicorum. prostant in officinis unguenta mundificantia Ægyptia. & Apostol. Ex præscriptis commodè confici possunt ad mundificationem vulnerum & ulcerum succi, decocta, pul. Catapl. Empl. Unguenta, quorum conficiendi rationes in processu curationis docebimus.

Sanguis justo uberius ex vulneribus aut ulceribus erumpens, & ichor siue serosa humiditas in iisdem collecta, quibus remediis sistatur & exicetur.

A'isop'ia, Sanguinis fluxio, Symptoma est & vulnerum & ulcerum, & *aisop'ia* remedia sunt, quæ sanguinem justo largius profluentem sistunt. Sanguis è vulneribus profluens in corporibus robustis, carnosus & plethoricus & etiam macilentis non statim ac prope- rè est restinguendus, sed pro virium ratione effluere permittendus, & digitis etiam expri-
mendus:

Detergentia quæ. Eorum usus.

Materia.

Chimici sacch. h. Essentia Apii, spir. mellis Essentia theriac. Spir. alumin.

Eorum *mendus*: alioquin aut recidivam facit, aut materia. alia infert incommoda, si justo citius cohibeatur fluxus; ubi autem quod satis est profluxit, aut animi deliquium metuamus, tum vulnus cum leni spongia aut linteculis in aq. frig. cui quarta pars aceti sit admixta, imbutis, sanguis abstergetur, ac linamenta orbi albumine & vitello simul conquassatis imbuta, vulnere imponantur; aut succi aut pul. unguenta catapl. ex sequentibus pharmacis concinnata superponantur, & ante tertium diem non removeantur. Sanguinem autem supprimentia pharmaca usitiora hæc sunt; Ovorum album. & lutea, poligo. crassula major, fol. Pimpi. Rad. Pentaphyl. R. urtica lanugo ex salicis floribus resoluta, lanugo per mala cidon. harena, fragaria herba, fol. isatis. Rad. Symph. major Aloës, Succinum Tragantum, pix sicca, Coloph. Gypsum Galla, Lap. hæma, cor. rub. Mumia, thus, Sanguis Draconis, Bolus Arme. Terra Lemnia, pili leporini, Tela aranea, præscriptim ex molendinis, Balaustia, Cort. granat. Acatia, Hypocistis. Inter quæ facile primum locum obtinet Chemicorum illud egregium remedium Crocus Martis. Quomodo vero ex præscriptis pharmacis, succi, pul. Catapl. & Epithe. confici debeant, & simul utendi modum, in curatione sympto. vulnere edocebimus. Verum ad remedia sanguinem sistentia, ubi necessitas exigit, adhiberi debent & operationes industria ipsius Chirurgi, per quas sanguis averti queat, veluti sunt venæ sectio, Curcubitularum & Hirudinum h. e. sanguisugarum applicatio, vinculorum restrictio & frictio; sed hæc operationes omnes molienda sunt in adversa parte vulnere; quandoque adeo sava est irruptio & implacabilis, ut ad caustica remedia, quæ paulo ante sunt commemorata, confugere cogatur Chirurgus. Porro *ichor* h. e. corruptus & tenuis sanguis, aqua vel sero persimilis, aut multa aqua diluto sanguini, qui in vulnerebus apparens curationem impedit, nostri Das wasser. Gliedwasser vocant; Theophrastus autem Paracelsus novo & ineptissimo vocabulo liobiam vocat: Magna cura est adhibenda, ut & ejus adfluxus sistatur, & absorbeatur;

Ichor in vulnere quid.

Gliedwasser. Gliedwasser vocant; Theophrastus autem Paracelsus novo & ineptissimo vocabulo liobiam vocat: Magna cura est adhibenda, ut & ejus adfluxus sistatur, & absorbeatur;

ejus itaque ichoris curatio consistit in sanguinis purificatione & alteratione, tum per boni succi alimenta, tum per convenientiæ remedia; exiccant autem venenosam colluviem eadem remedia quæ sanguinis cohibitioni sunt dicata, inter quæ nobilissimum est pharmacum chemicum crocus Martis, & Muscus per capita mortuorum in cimiteriis generatus, si tenuissimus pulvis inspergatur vulnere aut ulcere: Sed confert plurimum circumjacentes partes vulnere subinde Epithemate ex aceto rosarum facto imbueri.

Glutinantia remedia usitiora quæ sunt?

Κολλητικὰ & συσφικτικὰ, h. e. conjungentia remedia sunt quæ vulnere & ulcerum labra partesque disjunctas contrahunt & conglutinant; & quidem in levioribus vulnerebus ulceribusque conglutinantibus duntaxat in Medicinis feliciter uti possumus; sed in vulnerebus amplis carnosarum partium operationes quoque Chirurgi accedere debent, nimirum labiorum & carnosarum partium in vulnere coaptatio; artificiosa sutio, fibularum h. e. vinculorum injectio; remedia autem conglutinantia omnia debent habere proprietatem astringentem & siccantem; quorum usitiora & experientia magis comprobata hæc sunt; plantago, Arnoglossa, lingua arvis Cynoglossa, Consol. major. Hippuris. Auricula muris, Anagallis, Hypericon, Millefolium, Carduus benedictus, isatis, fol. pentaphylli, centaurea min. flo. & fol. atque cortex salicis, sanicula herba, & fol. atque cortex ulmi arboris; omnium autem præstantissimè conglutinat liquor melleus in vesiculis foliorum ulmi adnatis contentus. Similiter aqua ex vitibus abscessis emanans, sempervivum nauticum quod Aloës est, & ad nos ex Vlysiadibus adportatur, & propter perpetuam viriditatem, quam in æstuantibus hypocaustis per hyemem retinet, ad laquearia suspenditur, sarcocolla, pix arida, Aloës, Sang. Draconis, Thus, Bolus Arme. & vinum austerum. Ex compositis sunt nobiliora Empl. Barbarum à Celso descriptum, & Empl. Basilicum. Ex his succi, decocta,

Medicamenta quæ sanem exiccant.

Usus insignis.

Optimum est Galbanum acetolutum, & vulnere instillatum.

Glutinantia quæ.

Eorum usus.

Glutinantium materia.

Chimici utuntur unguento stellato.

Paracelsus aqua Aluminosimp. vel comp.

pul. & Empl. conficienda sunt, quorum exempla suis in locis inter curationes proponemus.

Carnem bonam in vulneribus & ulceribus generantia remedia quæ sunt?

Sarcotica quæ? *Σαρκοτικά*, incarnativa remedia sunt qua adjuvant naturam operationem in generanda carne. Solius enim natura operatio est, ex sanguine puro bonam carnem generare, & carne vulnerum & ulcerum cavitates complere. Remedia autem carnem bonam generantia, & naturam adjuvantia, semper debent esse natura carnis ἀνάλογα, ita ut semper mollioribus partibus carnosius mitiora, durioribus validiora applicentur remedia. Ex mitioribus pharmacis sunt farina fœnugræci & lupini, Ovi luteum, Mel, Thebentina, pul. Thuris, & Ol. ex plumbo arte Chimica distillato; His validiora sunt *σπέρμα* in lacte soluta, Ol. ex strobillis piceæ, aloes cum aq. rosa soluta, Aristot. utraque. Ex compositis prostant in myropoliis Empl. carnem generantia, Basilicum magnum Empl. Gratia Dei & Vngt. aureum. Ex præscriptis Sarcoticis remediis Empl. Vnguenta, Linimenta & pulveres sunt conficiendi, quæ in curationibus edocentur.

Cicatricem inducentia remedia quæ sunt?

Epulotica quæ? *ἐπωλωτικά* sunt, quæ vulnera & ulcera jam carne bona oppleta obsignant & cute vestiunt; Cicatricis obductio est, ut videmus in brutis vulneratis, quæ nullis utuntur remediis, & tamen cicatricem acquirunt; juvatur tamen Natura impositis remediis, ut citius cicatricem nanciscatur. Remedia cicatricem inducentia omnia oportet esse frigida & omnis mordicationis expertia. Hæc autem generis sunt Bolus Armenus, Terra sigillata, litharg. Cerusa, Cortex & flor. malorum granat. Lapis Calaminaris ustus & elotus, Spodium, plumbum in tenuiss. laminas redigatur, deinde concidatur minutissimè, & in aceto rosa. per triduum maceretur, singulis diebus acetum renovando, deinde exiccetur in loco tepido, & in mortario in te-

nuss. conteratur pul. qui ulcerib. sordidis & malignis inspersus dolorem sedat, carnem bonam generat, & Cicatricem inducit. Est & remedium præstans Calx virva, septies in aq. rosa. elota, & as. ustum probe elotum; composita *ἐπωλωτικά* habentur in officinis, Vnguentum è Cerusa, Vnguentum Diacalcitis; ex præscriptis simplicibus Empl. Vnguenta, Pulveres concinnari possunt, quorum exempla in curationibus trademus. Observatu autem necessarium est in cute vulneri obducenda, ne ea remedia ante usum pentur quam ubi carne repleta sit. vulneris cavitas, aut si in ea luxuriet caro superflua, ea extirpetur remediis causticis, alias enim vel carum, vel extuberans *σάρμα* in loco vulnerato aut ulcerato remanebit.

Corroborantia seu Confortantia remedia partium læsarum quæ sunt?

Confortantia sunt quæ artus & lasas partes, ex vulnere aut ulcere debilitatas, corroborant, & facultates naturales restitunt, sæpe siquidem ex magnis vulneribus, ossium fracturis, & luxationibus Musculorum, nervorum, venarum & Arteriarum naturales potentia labefactantur, & debilitatur calor nativus in hisce partibus; post restitutam itaque illis sanitatem, aliquandiu remedia corroborantia imponenda erunt, Vnguenta Empl. & Epithemata; Ex quibus nobiliora sunt Epithemata ex vino generoso, in quo fl. Rosar. Absinth. & Muscus quercinus sunt incocta; Aut eadem cum vino in Catapl. redacta. Item sol. Mastich. Ol. Rosa. & ol. Hyper. Empl. Oxyroc. quæ prostant in Myropoliis; Corroborantia autem remedia semper sunt varianda, pro diversitate Symptomatum, quæ in particulis post curationem sunt relicta; de quibus in suis locis tractaturi sumus.

Quibus communissimis Compositis, live unguentis Empl. Ol. & pulv. commixtis instructus esse debet Chirurgus?

Ex unguentis in promptu habere debet omnis Chirurgus hæc sequentia:

giff. li-
targ. Tu-
tie, Ceruf.
Empl. ex
Antim.
Paracels.

Epuloti-
corum
usuf.

Corro-
borantia
quæ?

Eorum
materia.

Vfus.

*Com-
muniora
compo-
sita quæ
Chirurg-
gis in
promptu
habere
debet.

Eorum
materia.
Modus
con-
ficiendi
pulv.
elumb.
Chimici
com-
mendant
Essent.
gall.
myrti.
gerf. serp.
fab. ma.

Vnguen-
ta.Vnguentum popul. ad repellendum & do-
lorem mitigandum.V. de Althea, ad emolliendum & discu-
tiendum.V. Basilicum ad maturandum & suppu-
randum.V. Apost. & Ægypt. ad abstergend. &
mundificandum.

V. aureum, ad carnem generandam.

V. album è cerusa ad cicatricem indu-
cendam.

Ex Emplastris:

Empla-
stra.

Empl. Diachylon ad emolliendum.

De meliloto ad maturandum.

Oxyroceum ad emoll. attrahend. & discu-
tiendum.E. Brutenicum sive Tetrachar. ad conglu-
tinandum & Cicatricem obducendam.

Ex Oleis:

Olea.

Ol. Rosa. ad Mitigationem ferventium dolo-
rum.Ol. Chamom. ad emolliationem durarum par-
tium.

Ol. lip. alb. ad maturationem.

Ol. Hyperic. ad. discussionem & nervorum
corroboracionem.Balsamum artificiale ad glutinationem &
carnis generationem.

Ex Pulv. Compositis:

Pulveres.

Pul. Sarcoticum ad carnis generationem.

Pulv. rubeum restringentem ad sanguinis
fluorem sistendum.

Pulv. Cephalicum ad vulnera capitis.

Hac omnia in promptu habentur in Miropoliis.

Sed præter hac communia remedia, quili-
bet ferè Chirurgus sua habet experimenta;
qua pro secreto habet; nos verò nostra ex-
perimenta inter curationes Chirurgicas li-
beraliter Studiofis communicabimus.Quibus Instrumentis instructus esse
debet Chirurgus?Extant in Chirurgorum libris, & ab
ingeniosis artificibus varia excogitari pos-
sunt, pro partium affectarum figura &
constitutione, instrumentorum Chirurgi-
corum genera; verum hac qua enume-
rabimus cum apud Chirurgos, tum apudtonsores hac tempestate maximè usitata
sunt:I. Acus sutoria mediocris, ad vulnera
consuenda necessaria.II. Filum lineum duplicatum tenue, ro-
bustum tamen ad eundem usum.III. Novacula seu culter rasorius, cui
Echermesser / ad incidendos tumores, &
præcidenda in corpore corrupta vel super-
flua.IV. Hamus nonnihil obtusus, ad tollen-
dam cutem, & separandas rimas vulne-
rum, ad sublevandasque venas, nervos &
arterias in vulneribus.V. Scalpellum $\phi\lambda\beta\alpha\tau\acute{o}\mu\epsilon\nu$, ad scarifi-
cationem, venæsectionem, & maturorum
tumorum apertionem.VI. Scalprum inflexum ad ossa corrupta
aut cariola abrasenda.

VII. Serrula ad præcidenda ossa.

VIII. Forfex sive tenaculum, cuius Zan-
ge / ad duras materias corpori infixas extra-
hendas.IX Forfex, quibus crines abscinduntur
ad præcindenda superflua.X. Terebra, ad ossis capitis contusi, &
intra calviam impressi extractionem.XI. Vossella, ad globos & alias materias
è corpore evellendas.XII. Ossagra, forcipis genus, ad extra-
henda ossa confracta.XIII. Specillum, ad investigandam pro-
funditatem vulnere & ulcerum.XIV. Speculum oris, ad os aperiendum
dilatandumque.

XV. Spatula, ad depressendam linguam.

XVI. Cochlear, ad sublevandum in
faucibus Gurgulionem.XVII. Spongia, ad abstergendum san-
guinem, & pus in vulneribus & Uceribus.XVIII. Penicillus ex filamentis linteo-
rum detritorum factus, & bacillo alliga-
tus, ad remedia in ulcera & vulnera, &
fauces affectas illinenda.XIX. Linamenta, Ropen nostris tonso-
ribus, sunt abrasa filamenta, instar la-
ne mollis ex attritis linteis decerpta, ad

extergenda ulcera, & excipienda remedia liquidiora, & ulceribus vulneribusque imponenda.

XX. Licinium est convolutum Linamentum, ulcerum aut vulnerum profunditati, exsiccandi gratia, & ne coalescant vulnera, infigenda, Germanis Etue Weste.

XXI. Plumaceolum seu pulvillum, est Pulsterlein / sit ex convolutis mundissimis lintcolis, pro cavitationis ulcerum & vulnerum figura concinnatum; aut quadrata, aut triangulari, quo remedium tutius habeat.

XXII. Fascia seu vinculum, quod debet esse ex linteolo mundissimo, & molli, pro ratione loci affecti, ad deligationes ulcerum & vulnorum, fracturaram, luxationum, affectarumque partium.

Curationes Chirurgicæ quotuplices sunt?

Quadruplices sunt Chirurgicæ curationes. Prima $\chi\epsilon\rho\alpha\iota\ \gamma\epsilon\nu\eta$, sive generalis, qua generalem singulorum morborum Chirurgia subjeclorum curationem docet.

Curationes
Chirurgicæ
quadrupli-
ces.

II. $\chi\epsilon\rho\alpha\iota\ \epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$, specialis, qua circa species singulorum morborum curandas occupata est.

III. $\chi\epsilon\rho\alpha\iota\ \tau\omicron\pi\omicron\nu$, secundum loca, h. e. particularis, qua partium certarum morbos, eorumque species curare docet; alia enim remedia in eodem morbo debentur cerebro, alia thoraci, alia denique peritonæo: & alia nervis.

IV. $\chi\epsilon\rho\alpha\iota\ \sigma\upsilon\mu\pi\lambda\omicron\mu\acute{\epsilon}\tau\alpha\nu$, qua morborum accidentia tollit.

Chirurgicæ curationes de Tumouribus.

SECTIO I.

Tumor præter naturam quid, & quæ tumorum præcipua genera?

De Tu-
moribus.
Tumor
quid.

Απόστημα , Abscessus, exitura, & tumor præter naturam, Synonyma sunt; etiamsi quidam scrupulosas inter ea nomina quarant differentias; nostratibus ein Swulst oder ein Geschwulst / Est autem tumor præter naturam, ex sententia Galeni, incrementum

alicujus partis corporis, naturalem ejus constitutionem cum in quantitate tum in qualitate excedens. Hanc Galeni definitionem Hali Abbas, Arabica familia Medicus, ita declarat: Apostema est tumor præternaturalis, in quo aliqua materia superflua, humor videlicet, aut flatuosus Spiritus, locum affectum replens, ac distendens, est collecta & aggregata, Dicitur itaque Aposthema, h. e. abscessus talis alicujus partis dispositio, in qua abscedunt ab invicem corpora; quæ prius erant continua.

Materia enim vel humoralis, vel flatu-
lenta, vel simul ex his mista, tumorem ex-
citatur, ac divellit ab invicem, Musculorum
& suis partes, & cavitationem inter eas affi-
cit, quæ materia nisi tempestivè discutitur,
in varias tumorum species convertitur. Quan-
doque enim illa materia, & quidem frequen-
tissimè in pus convertitur, nonnunquam
instar lapidis indurefcit, quandoque in cal-
cem arenosamque materiem cogitur, &
nonnunquam in cænosam, oleosam, mel-
leam, aut feculentam materiam transmigrat;
constat itaque in tumoribus omnia tria
morborum genera concurrere, nempe $\delta\upsilon\sigma\kappa\epsilon\rho\sigma\iota\alpha\nu$,
h. e. intemperiem, $\alpha\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha\nu$, h. e.
vitiosam conformationem seu quantita-
tem, & $\sigma\upsilon\nu\epsilon\chi\iota\alpha\varsigma\ \lambda\upsilon\sigma\iota\nu$ i. e. continui solutio-
nem. Hac enim tria, nec plura, sunt morbo-
rum genera, ad quæ omnes reliquæ species æ-
gritudinum referri possunt. Loquimur autem
nos hoc loco de majoribus & extrinsecis dun-
taxat tumoribus: siquidem de minoribus cu-
tis extuberantiis, ut sunt pustule, scabiei, &
his similes, supra in curatione affectionum cu-
tis abunde diximus. Porro tumorum in uni-
versum genera nos sex constituimus, sumpta
differentia à materia in tumoribus collecta;
excitatur enim omnis tumor aut ex confluxu
& collectione humorum in aliquam partem;
sunt autem 4. humores, sanguis, flava bilis,
pituita, & atra bilis, Quæ humorum species
pro redundantia sua in sanguinea massa
quatuor species constituunt tumorum. Quin-
ta generatur ex flatibus in aliqua parte colle-
ctis: Et sexta à venenata infectione.

Materia
tumori-
um.

In tumo-
ribus in-
tunc
omnia
tria mor-
borum
genera.

Tumo-
rum sex
genera,
ratione
materie.

Prima

Prima itaque species tumorum est quæ ex fervore redundantis sanguinis generatur, quæ Græcis φλεγμὴ, Latinis inflammatio, vel tumor inflammatus, nominatur.

Secunda, tumor, qui ex colluvie in qua bilis flava excedit reliquos humores, generatur, qui Græcis Erysipelas, Latinis biliosus tumor dici potest.

Tertia species, ex redundantia pituitæ in massa sanguinea excitatur, Græcis οἰδημα, h. e. tumor laxis aquosus, seu pituitosus, & doloris expers nominatur.

Quarta est tumor ex colluvie sanguineæ massæ, in qua redundat melancholicus humor, Græcis σκῆψος, Lat. tumor Melancholicus vel induratus nominatur.

Quinta est tumor ex flatulentis spiritibus generatus, Græcis πνευματώδης, Lat. flatuosus tumor dicitur.

Sexta est tumor ex colluvie venenata in aliquam partem collecta excitatus, qualis est Bubo pestilens, & qualis ex morfu ictuæ venenatorum animalium est generatus. Alii cum Græci tum Latini Chirurgia Scriptores tradunt & alias ex humoribus excitatorum tumorum subdivisiones; primò enim tumores dividunt in veros, & veros quidem esse dicunt, qui ex unico & simplici humore generantur. Verum quia solus & sincerus humor sine admixtione aliorum in corpore non reperiatur præterquam in fellis capsula, non potest ex simplici humore ullus tumor externus excitari; idèd nos eam divisionem consulto præcidimus. Secundo dividunt tumorum genera, sumpta differentiâ ab humorum mixtorum ratione ac redundantia; in phlegmones; si in sanguine redundet bilis flava, in Erysipelatidem; si melancholicus, in scyrrhodem. Ita quoque subdividunt reliqua tumorum genera; quæ subdiviso, quia parum facit ad curationem tumorum; qui enim genera tumorum curare novit, is species eorum facile curabit; nos subtiles tales distinctiones, tyronum ingenia turbantes, consulèd omittimus.

Recitata hæc sex Tumorum genera, quas habent species?

I. Tumorum ex sanguine ortorum genus

φλεγμὴ dicitur, cujus species sunt carbunculus non venenatus, Bubo non venenatus, Gangrana, & Sphacelus.

II. Tumorum ex biliosa colluvie genus est Erysipelas, cujus species sunt herpes, Formica &c.

III. Ex pituita ortorum tumorum genus est Oedema, cujus species sunt struma, Scrophula, sive glandula & Hydrops.

IV. Tumorum ex Melancholica colluvie excitatorum genus est Scyrrhus, cujus species sunt lepra, Phagedæna, varix, & cancer oculi.

V. Tumorum, qui ex flatulentis spiritibus originem ducunt, genus est inflatio, qua non habet species nisi flatulentus Spiritus pituitosæ colluviei sit admixtus, & tum Oedema flatuosum appellari potest.

VI. Tumorum venenatorum ex venenata infectione humorum in venis, ac spirituum in arteriis, aut venenatorum animalium ictibus moribusque illatorum species, sunt bubo pestilens, Carbunculus pestilens, & inflatio venenata. Hac tumorum præternaturalium genera cum suis præcipuis speciebus sequens tabella ob oculos ponit:

Tabula
tumorum
rem
genera
&
species
contine
ns.

- | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------------------|----------------------------|
| Tumorum genera & species sunt | 1. | φλεγμὴ ex sanguine, ein Blut-swer/ cujus species sunt: | { | Bubo non venenatus. |
| | | | | Carbunculus non venenatus. |
| | 2. | σφαιρικός, tumor biliosus, das H. Dinct/ cujus species sunt: | { | Gangrana, Sphacelus. |
| | | | | Herpes. |
| | 3. | οἰδημα, Pituitosus tumor, ein Quetsch-swer/ cujus species sunt: | { | Formica. |
| | | | | Phlegma. |
| 4. | σκληρὸς, tumor durus & Melancholicus. Ein verhardtet Swell/ cujus species sunt: | { | Hydrocele. | |
| | | | Hydrops. | |
| 5. | Tumor flatuosus, ein windig Swer/ cujus species sunt: | { | Scrophula. | |
| | | | Struma. | |
| 6. | Tumor venenatus, ein giftig Swell/ cujus species sunt: | { | Priapismus. | |
| | | | Tympanites. | |
| 7. | Tumor venenatus, ein giftig Swell/ cujus species sunt: | { | Bubo pestilens. | |
| | | | Carbunculus pestilens. | |

Quæ

Reliquæ
tumorum
distinctiones
non
necessariæ.

Quæ potissimum Symptomata sequuntur tumores præternaturales?

Communissima omnium tumorum præternaturalium Symptomata sunt Dolor, inflammatio, Laxitas vel mollities, induratio & Febris.

Tumores præternaturales quomodo generantur, & quæ eorum generales causæ; quæve universalia signa?

Tumorum generatio.

Omnis Tumor ex vitiosis humoribus excitatus, generatur per fluxionem ex aliqua parte corporis, & collectionem in aliquam partem, sive per dimissionem ex aliqua parte, & receptionem materiei in aliquam partem; Et pars quidem à qua fit demissio, seu defluxio, nominatur Medicis pars mandans, sive demittens, seu propellens. Pars autem ad quam fit collectio, nominatur pars excipiens, vel pars affecta.

Causæ fluxionum.

Causa porro fluxionis ex una in aliam partem sunt humorum copia, tenuitas & acrimonia, item partis propellentis robur, & meatuum pororumque, atque potissimum venarum & Arteriarum, per quas fit defluxio, laxitas & amplitudo.

Causæ congregationis.

Causa autem collectionis vitiosorum humorum in aliquem locum est ejusdem partis imbecillitas, & ignobilitas atque dolor. Regulare siquidem est, quod natura ex crementosos vitiososque humores semper ab internis ad exteriora, & à nobilioribus partibus ad ignobiliores propellat. Dolor præterea in aliqua corporis parte semper allicit ad se defluxionem humorum; alioquin sicuti omnium ferè aliorum morborum, ita & tumorum omnium triplices sunt causæ.

Causæ tumorum procatartice.

Præterea, sive evidentes & foris incidentes, quas primitivas vulgus vocat; ut sunt casus, sive præcipitatio, violentia percussio, veneni assumptio, & venenatus morsus, ictus; deinde sunt & interni & abditæ, quas Antecedentes nominant, ut sunt humorum fluidorum copia, qui aut qualitate aut pondere membra ad propulsionem irritant, ut paulo post in singulis specibus tumorum ostensuri sumus; 3. dicuntur

Antecedentes. Continentes.

conventus h. e. conjunctæ, quas nos consulto negligimus, ejusmodi sunt humores in aliquam partem decumbentes, qui nondum sunt in parte recipiente collecti, & impacti, sed sunt tantum in fluxu.

Signa universalia sive generalia tumorum manifesta sunt, nimirum insolitum incrementum partis affectæ, eam distendens, ejusque actiones ladens; & in cute ea parte extuberantia. Signa tumorum morum periodica.

Periodica tumorum tempora quot, & quæ sunt, & quomodo terminantur aut finiuntur tumores?

Quemadmodum & alii morbi antequam finiantur, quatuor retinent tempora, ita & tumores ante suam terminationem, quatuor habent periodica tempora, Principium, Augmentum, Statum, Declinationem. Tempora tumorum periodica.

Initium tumorum est, cum primum incipit fluxio & insensibilis collectio humorum in aliqua parte.

Augmentum est, cum particula excipiens jam evidenter est distensa, & in insolitam molem elevata, tumorumque Symptomata adsunt manifesta.

Status est, ubi jam materia in tumente parte collecta non amplius augetur, sed alterari incipit, & Symptomata in summo vigore consistant.

Declinatio est, ubi tumor præternaturalis subsidere & de tumescere incipit, Symptomataque remittere, & mitiora fieri usque ad terminationem incipiunt.

Ha periodica mutationes tumorum scitu & consideratione summe necessariae sunt Chirurgo; alia enim remedia in principio, alia in augmento, alia in statu, & alia in declinatione sunt adhibenda; ut in particulis tumorum curationibus ostendimus.

Ad finem seu terminationem tumorum quod attinet, omnis tumor terminatur ac finitur quatuor potissimum modis; alii enim tumores terminantur beneficio naturæ, per insensiles evaporationes sive resolutiones, quæ optima est terminatio. Alii per suppurationem tum Natura, tum per Terminatio tumorum quintuplex.

suppurantia remedia adhibita. Suppurationis autem signa sunt in tumoribus; dolor pulsatilis & caloris incrementum; ita enim inquit Hippocrates 2. Apho. 7. dum pus in tumore conficitur, dolores accidunt, & febres; aliaque Symptomata: & hac quoque terminatio laudabilis est. Alii per indurationem sive in scyrrhum conversionem, qua mala est terminatio; alii per corruptionem partis affecta, & ulcerationem, qua tumoris terminatio omnium pessima habenda est; cujus signa hac sunt; ulcera sordida, partis affecta lividitas, nigrities & indolentia; his addunt & quintam terminandi rationem, per subitam tumoris evanescentiam, & ad interiora regressionem, que in virulentis tumoribus perniciofa est; nisi enim venenata materia statim evacuetur, recidivam facit, & alia periculosa Symptomata excitat.

In tumorum curatione, quæ generales regulæ Chirurgæ sunt observandæ?

Regulæ generales curationibus sequentes regulae studiose sunt observandæ;

I. Partis cum mandantis sive expellentis à qua sit defluxio, tum partis excipientis sive tumentis substantia, natura, & constitutio: Item per quas vias fiat defluxio.

II. Materia fluentis tumoremque excitantis qualitas, & copia, utrum videlicet vitiosus humor defluens sit sanguineus, pituitosus ac melancholicus; aut utrum sit flatulentus spiritus, & utrum humor tenuis sit, an crassus.

III. Tumoris jam excitati ætas periodica; Virum videlicet tumor sit in principio, augmento, statu aut decrefcentia; secundum enim ea tempora varianda sunt remedia.

IIII. Conandum est ut defluens humor in parte mandante cohibeatur & intercipiatur, ex parte autem excipiente aut divertatur, aut discutatur, aut evacuetur.

V. In incremento tumoris, ubi vitiosus humor jam radices egit, nec discuti nec

averti possit, tum Symptomata, dolor praesertim & inflammatio, mitigentur, & tumoris methodica curatio instituatur.

VI. In Methodica curatione ita procedendum erit, ut materia in tumore maturetur, & ad suppurationem deducatur, aperta que cute pus evacuetur, ulcusque mundificetur, & postremo cicatrice obducatur.

VII. Cavendum est in puris evacuatione, praesertim in majoribus Aposthematibus, ne simul & semel totum pus evacuetur, sed pedetentim. Repentina enim totius Materia evacuatio, partis tumentis temperiem destruit, & imbecillitatem infert.

VIII. Puris ex tumoribus profluentis puris optimi conditiones. qualitatem probè consideret Chirurgus; inde enim facilitas & difficultas curationis dijudicari potest, juxta praclaram Hipp. sententiam, qua 1. praesagiorum sectione ultima, sic inquit; Pus illud optimum censetur quod album est, æquale, sibi que undique simile, & leve ac minime foetidum: quod verò huic maxime contrarium appareret, pessimum; Tumor enim in ulcus difficilis curationis, aut in corruptionem terminatur.

IX. In curatione tumorum methodica, juxta temporum periodos variari debent remedia, & quidem in ferventium tumorum principio, commodissimè repercutientia remedia applicari possunt, exceptis hisce 4. Casibus in quibus repercussio perniciofa est. Primo ubi tumoris Materia venenata est, ut in Bubonibus & Carbunculis pestilentibus, & in tumoribus ex ictu morsuque animantium venenatorum excitatis. 2. Ubi Tumor in eunctoriis, h. e. ignobilioribus partibus, videlicet in Inguinibus, in collo sub axillis hæret, aut ubi tumor regiones partium principalium, nempe tempora, pectus & Hypochondria obsidet; ibi enim sine noxa partium principalium materia repelli nequit. 3. Si tumori impacta materia adeò crassa ac lenta est, ut frustra repulsio tentetur.

In quibus tumoribus repellentia non sunt ex usu.

retur. 4. ubi tumor à $\alpha\epsilon\kappa\alpha\lambda$. causis, videlicet plaga, ictu, aut lapsu est excitatus.

Cautio- **X.** In apertione tumorum diligenter sunt **nes in a-** observanda primo ut non nisi post maturati-
periendis onem aperiantur. 2. Ut tumoris incisio
tumori- semper fiat in molliori tumoris parte, ac
bis. in decliviori, quo pus commodius effluere queat. 3. præstat semper tumorem aut novaculâ, aut scalpello incidere, quàm causticis remediis. 4. Cavendum est in tumoris sectione, ne sectio peragatur secundum latitudinem musculorum, sed secundum processum fibrarum. 5. Diligenter cavendum in sectione tumoris, ne nervi aut arteria, aut etiam, si fieri queat, Vena ladanur ac convulnerentur. Restat nunc singulorum tumorum eorumque Symptomatum curationem prosequi.

Tumor ex inflammatione Sanguinis quid, quæ ejus causæ, signa, & quæ ratione curandus?

Phlegmo- $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon\eta$. Phlegmones vocabulum bifa-
nes voca- riam à Medicis usurpatur, pro omni in-
bulum flammatione; $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon$ enim inflammari
duobus & aduri, & inde $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$ inflammatio-
modis nem significat 2. quemadmodum hoc loco
accipitur pro tumore ex inflammato impuro sangui-
Phlegmo- ne excitato sumitur, qui nostratibus $\epsilon\tau\eta\iota$
ne quid? $\eta\eta\iota\gamma\iota\gamma\epsilon\varsigma$ Blodtsiwer oder swulst nominatur:
Est itaque Phlegmone tumor ex incensa fer-
ventique massa sanguinea in aliquam parti-
culam collecta, & impacta progeneratus, non obstante, quo potissimum humore sanguinea massa sit diluta; Sincerus enim sanguis nunquam in corpore deprehenditur, modo talis sit ut reliquos humores sua copia sanguis vincat. Hujusmodi itaque sanguis impurus si in alicujus partis cavitatibus collectus hæreat, & affetur, corrumpitur, & primum quidem rubeum & dolorificum tumorem excitat, qui $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon\eta$ nominatur.

species **Phlegmo-** **nes ex** **sanguine** **adulto.** Vbi vero diutius affetur, in naturam Melancholici humoris degenerat, & colorem floridum in lividum aut subnigrum permutat, & tum non amplius $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon\eta$, sed vel Carbunculus, vel Gangrana, vel Spha-

celus, qui sunt species phlegmones, nominatur.

CAUSÆ $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\epsilon\upsilon\eta\varsigma$ $\alpha\epsilon\kappa\alpha\lambda$. sive evidentes, sunt omnes res corpori foris accidentes; quæ sanguineam massam in venis & arteriis inflammare, & ad fluxionem concitare possunt; & tales quidem sunt alimenta, & medicamenta, impenitus calefacientia & extenuantia, item dolor vehemens in aliqua parte, qui sanguinem concitat & fluxionem in se allicit: item contusio & vulnus; aut luxatio, aut osium comminutio. $\alpha\epsilon\kappa\alpha\lambda$. Interna & antecedentes causa phlegmones sunt $\pi\lambda\eta\theta\omega\varsigma$ h. e. plenitudo vel sanguinea constitutio corporis, tenuitas sanguinis, & calida intemperies Epatis.

SIGNA Phlegmones evidentia sunt corporis totius rubedo, præsertim in ætate virili ac florida, venarum eminentia, & tumor rubeus in parte affecta, & in tumore fervens ac pulsatilis dolor.

CURATIO Phlegmones ejusque Symptomatum, doloris videlicet & inflammationis consistit, omnium primum in doloris & inflammationis mitigatione. 2. in venasectione. 3. In convenienti victus ratione. 4. In sanguinis affluentis condensatione & interceptione. 5. In materia sanguinea jam tumori impacta suppurati apertione, mundificatione & cicatricis inductione. Vi itaque in aliis omnibus tumoribus, ita & in phlegmones initio considerandum est tempus periodicum, utrum tumor sit in sui principio, incremento, statu aut declinatione.

Et juxta hæc tempora variare oportet remedia; Deinde ubi tumor hac tempora superavit, considerare oportet ad quem modum terminationis inclinet tumor; utrum videlicet finiat per $\lambda\epsilon\gamma\sigma\iota\sigma\iota\varsigma$ h. e. per exhalationem, vel per suppurationem, seu maturationem, vel indurationem, vel putrefactionem. Præterea diligenter observandum est, quæ sit in tumoribus pars mandans; & quæ sit pars recipiens, & per quas vias fiat materia defluxio; quibus cognitis talis in phlegmone insituitur methodica curatio:

Causæ
phlegmo-
nes.

Signa.

Curatio.

**Vena-
tio.** In phlegmone initio antequam acerbata

excipitur Symptomata, statim venasectio
molienda erit hac ratione, ut semper ea in-
cidatur vena quæ directo tumoris posita est,
quam sectionem Græci καὶ ἐν ἡ. e. secun-
dum directum vocant. Dicuntur autem lo-
ca directa, quæ ejusdem lateris sunt cum
tumore; ut si tumor est in dextro latere, ex
eodem detrahendus est sanguis; si in sinistro,
ex sinistro, ea tamen servata lege, ut si phle-
gmone est in partibus sub Diaphragmate si-
tis, tum semper talaris, aut sub malleolis,
aut sub poplite, vena ejusdem lateris incida-
tur; si verò phlegmone sit supra Diaphragma,

Purgatio.

tum vena incidenda erit Epatica; ejusdem
humeri in quo latere tumor hæret. Id quoque
circa venasectionem in phlegmone curatione
observare oportet, quod si corpus aliquo vi-
tioso humore sit infectum, bile videlicet fla-
va cum pituita, ut is ante venasectionem,
convenientibus remediis, quorum copiam in
superioribus proposuimus, evacuetur, ac
potissimum si alvus sit dura & obstructa, ea
aperiatur ac leniatur leni Clystere injecto;
interea statim in initio, agro conveniens vi-
ctus ratio præscribitur, & si cum phlegmone
sit inflammatio sanguinis, victus ratio debet
constare ex alimentis & potionibus refrige-
rantibus, & humectantibus: convenientia
itaque alimenta erunt, cremor ptisana,
Caro & juncula pullorum cum uvis imma-
turi cocta, pisces & cancri fluviales, pru-
na Ungarica & Lactuca in acetariis. Ad se-
cundam mensam possunt gustari & Arantia,
& mala acida, & cerasa cocta; in potu
convenient aq. hordei cum cinamo. tempe-
rata, & cerevisia clara non adeo plena,
qualis est Brunsvicensis, & huic similes.
His in initio curationis probe ordinatis, sta-
tim si Symptomatum acerbitas molestet,
præsertim dolor & inflammatio, iis succur-
rendum, & ante omnia statim opituland-
um, quia vires prosterunt, fluxionem
ad partem affectam concitant, & methodi-
cam curationem impediunt. Dolor itaque
in phlegmone sequentibus remediis anodynis,
h. e. sensum doloris compescentibus, tumori

**Topica.
Anodina.**

impositis facili sedari possunt: R. Lul. ovo.
No. ij. Ol. Rosa. ℥ j. Medulla pan. similac.
& in aq. cal. per horam macerata & ab aq.
express. ℥ ij. Hac simul commisceantur in
mortario, instar pulvis fiat catapl. quod hye-
me tepidum, æstate verò frigidum applicetur.
Aut R. Ol. Rosa. ℥ ij. albu. ovo. No. 4. Aq.
Rosa. ℥ ij. simul concutiantur, & com-
mixta duplicatis linteolis excipiantur & in-
star Epithem. tumori imponatur. Aut impo-
natur sequens catapl. Narcoticum, quod sta-
tim dolorem extinguit: R. rad. & fol. tener.
recent. Hyosch. aut cicuta aut utriusque si-
mul, quæ contunde in mortario eisque ad-
misc. ung. popul. cujus ℥ ij. admixtus sit ℥ s.
opii Thebaici in aceto rosa. dissoluti. Idem
præstant Sola rad. Hyosch. contusa & impo-
sita, aut ejus fol. sub cineribus ferventibus
cocta, & cum suilla pinguedine in mortario
contusa tumoriq. imposita, quæ non modo
calorem sopiunt & dolorem mitigant, verum
etiam materiam in tumore contentam ad
suppurationem deducunt; Mitigatis Sympto-
matibus statim pro temporis periodici ratione
hac sequentia pharmaca tumori applicanda
erunt, & quidem in principio phlegmone,
h. e. quando adfluens fervens sanguis par-
ticulam recipientem sensibilibiter distendere
cum levi dolore incipit, tum refrigerantia
& constringentia pharmaca, quæ repercu-
tentia dicuntur, imponenda erunt, inter
quæ plurimum extollit Gal. poscam, quam
oxycraton nominat, quod constat ex aq.
& aceto simul mixtis atque vinum rub. au-
ster. instar Epith. impositum. verba Galeni
Latine ita sonant: In particulis quæ circa
artus sunt, sat fuerit per initia phlegmone
spongiam frigida aq. cui aceti non nihil est
admixtum, aut vino aliquo austero im-
buere & tumori imponere; Ego verò pro
frig. Aq. ros. & plantag. & pro aceto simpli-
ci acet. ros. ana. commiscerem, & non Spon-
gia, sed duplicatis linteis excepta ferventi
tumori imponerem, siccataque linteola sub-
inde madefacerem; præstans quoque catapl.
est Avicenna in hanc formam paratum:
R. succi sempervivi major. lbj. vini rub.

Chimicis
in usu est
lap. medi-
camento,
Crollii;
Magister.
Lithargi-
rii. Ol.
Camph.
Destilla-
tum sper-
matis ra-
narum.

Repellen-
tia in ini-
tio.

acerbi ℞ s. farina hord. ℥iij. Cent. mal. gra. & fruct. sumach. pul. ana ℥s. concoquantur ad formam catapl. & phlegmoni imponatur. Quin & sequens Epith. utiliss. imponi potest: ℞ Albu. ov. No. ij. Aq. rosa. mucaginosa in qua sem. citon. sunt per noctem macerata ℥iij. concussa linteolis excipiantur, & phlegmoni; praesertim ex acceptis vulneribus, & contusionibus acquisita imponantur, saepeque madefacta linteola renouentur: plura remediorum repercutientium genera ex tabella remediorum supra proposita peti, & huc accommodari possunt. Verum in remediorum refrigerantium & constringentium impositione circumspiciendum esse decet Chirurgum. Ex intempestiva enim & inconsiderata immodicaque Repellen-
tia pariter & dige-
rentia in aug-
mento.
eorum impositione materia in tumoribus facile condensabitur, indurabitur, & curandi difficultatem inducet. Porro in augmento phlegmones, cum videlicet tumor jam evidentem molem cum acerbo dolore extra cutem prominet, tum talia sunt remedia imponenda, quae simul & refrigerent, & digerant materiam in tumore. Tale autem est Ol. Rosa. tepidum, aut sequens catapl. ℞ pul. fol. Mal. ℥j. fl. absinth. rosa. purp. ana ℥s. far. hord. ℥j. Ol. cham. ℥iij. Aq. rosa. ℥ij. coquantur leniter, continuè subigendo, donec formam catapl. acquirant; aut imponatur sequens Epithema: ℞ vini rub. ℥iij. Aq. ros. ℥ij. acetirosa. ℥j. croci ℥ij. ebulliant simul & fiat Epith. quod linteolis dupl. exceptum in augmento phlegmones imponatur. In statu vero siue vigore phlegmonis, h. e. ubi tumor jam in auxilium constitutus, augmentum non amplius recipit, & Symptomata, praesertim dolor pulsatilis omnium maxime exacerbat, tum ea praesidia quae adhibentur, debent esse digerentia diaphoretica, seu per halitum dissolventia, & maturantia, qualia sunt in Miropoliis Vng. Bas. & Empl. Diachyl. quae discutiunt, emolliunt & dolorem mitigant.

Digeren-
tia & ma-
turantia
in statu.

Aut juxta Gal. ℞ Medulla pan. filig. ℞j. maceretur spacio unius hora in aq. ferventi & post exprimatur eidemque admisc.

mellis optim. crudus ℥iij. & redigatur informam catapl. & phlegmoni imponatur. Id enim discutienti tumorem & dolorem mitigandi facultatem habet. Aut ℞ Medulla panis praescripto modo macerata ℞ s. pul. rad. aur. fol. Malva, Melilot. parietaria. fen. graci fl. Anethi, farina volatilis ana ℥s. Ol. Rosa. Chama. ana ℥iij. vini tenuioris q. s. coquantur in formam catapl. Porro ubi jam commemoratis remediis dolores nonnihil sunt consopiti, & tensio tumoris subsidereprehendatur, tunc phlegmonem in declinatione esse judicato. In declinatione autem sola discutientia remedia applicasse, satis erit. Inter quae hac sequentia magis sunt laudata: Vinum tepidum duplicatis linteolis vel panno novo exceptum, instar Epith. imponatur. Aut ℞ Medulla panis in fervid. aq. macerata ℞ s. Vvar. pass. ex quibus semina sunt excepta ℥ij. conterantur simul diutiss. & admisc. pul. Alib. farin. hord. ana. ℥j. Concoquantur simul in q. s. aq. ad pultis formam; quibus deinde mellis q. s. admisceatur; fiat catapl. At si materia tumori impacta ob crassitatem recitatis remediis digeri, aut discuti in totum nequeat, confestim ad maturationem, & materia in pus conversionem accedendum est: sunt autem praecipua suppurantia remedia hac quae sequuntur: ℞ Far. Triti. q. s. commisce cum aq. & Ol. chama. a. p. & decoque ad catapl. formam cui croci nonnihil, donec flavum acquirat colorem, admisceatur. Aut ℞ ficuum ping. ℞ s. Rad. Alib. rec. & contus. ℥ij. concoquantur in q. s. aq. ad molitum, deinde in mortario minutissime conterantur, eidemque admisc. far. triti. q. s. fiat catapl. Aut ℞ Rad. Alib. lill. alb. ℞j. senecionis, fol. Malva omnium viridum, & recent. ana M. j. concoquantur simul in q. s. aq. & in pultis formam redigantur, eisque admisc. far. tritic. ℥ij. semin. lini. ℥j.

Digeren-
tia in de-
clinatio-
ne.

Suppu-
rantia.

Axungia porcina ℞ s. iterum concoquantur & in formam Catapl. redigantur. Postea ubi materia in tumore jam maturata, & in pus conversa videatur, ejus Tumo-
rem ape-
ricentia.

Reliqua
curatio.

declivore parte ubi mollior esse deprehenditur, si sua sponte non rumpatur, fiat aut scapello aut novacula incisio, quo pus effluere & exprimi queat; Aut in delatula, qui incisionem ferre nequeunt, si in tumore jam sopita sit inflammatio caustica, admoventur qua tumorem aperiant, quale est hoc sequens Empl. R^z pul. Camihar. ʒ i. Fermenti acerr. ʒ 3. Mucag. sem. psylli cum aq. rosa. facta. q. s. fiat Empl. cuius particula pro mensura tumoris imponatur, donec tumor rumpatur. Ex aperto jam tumore pus sensim & per vices exprimatur, ulcusque mundificetur; & ne tumoris vulnus statim coalescat, linicinium Unguento Apostol. imbutum, quotidie inferatur, donec universum pus emundatum fuerit; & Empl. Brutenico aut alio quovis consolidativo carnemque bonam generante ad Cicatricem deducatur. Emplastra autem Sarcotica & conglutinantia supra in tabella remedium sunt commemorata; & paulo inferius in ulcerum curatione plura proponuntur.

Quae sunt Symptomata praecipua
Phlegmones, & quomodo ea
profliganda?

Symptomata phlegmonum, quae curatione. Praecipua symptomata Tumoris ex accensa sanguinea massa progenita, sunt Dolor, inflammatio, febricula, Tumoris durities, & corruptio subiecta carnis in tumore; quibus autem remediis Dolor & inflammatio in Phlegmone sint sopienda, paulo ante tradidimus; quibus denique praesidiis febris phlegmoni incidens profliganda sit, pro idea & natura cujuscunque febris, ea petenda sunt ex prima tractatione morborum Universalium nostra de Febribus.

Curatio phlegmonum in scyrrhum versa. Vbi vero phlegmone in scyrrhum est conversa, id quod ex praepostera ut diximus & intempestiva remed. refriger. ac repell. ac diuturna applicatione, vel ex inepta per vehementius discutientia & exsiccantia remedia, qua in tumore humidiores ac tenuiores partes contentas absument, & crassiores inducant, accidere consuevit.

Id ubi contingit, statim ad emollientia praesidia confugiendum erit; Ejusmodi autem sunt haec sequentia: R^z Rad. Brion. ʒ i. Ficuum ping. ʒ s. Rad. Asari ʒ ij. simul concoquantur cum q. s. aq. ad molliem usque, ac tandem contundantur in mortario, & per setaceum cribrum exprimantur instar crassioris pulvis; quibus admisc. far. tritic. & ping. anser. utriusque q. s. fiat Catapl. quod singulis diebus indurato tumori imponatur bis tepidum. Aut R^z Rad. Alth. recent. pro arbitrio, qua concisa coquantur ad molliem, & instar pulvis contundantur, iisque admisc. medulla panis triticea in aq. Cal. macerati, & ping. suilla ana q. s. fiat Catapl.

Alia emollientia pharmaca ex tabella Curatio carnis remedi. Chirurg. & paulo infra ex scyrrhi corruptione curantur in phlegmone. Contingit quoque non raro ut caro sana in phlegmone corrumpatur & putrefieri incipiat; quod Symptoma maturam requirit curationem, ne neglecto, tota pars affecta Gangraena aut sphacelo afficiatur: protinus itaque ubi vel materia in tumore jam aperto, aut aliqua particula carnis aut cutis in tumore computrescere coepit, materia quidem eximatur, & caro cutisque excindatur putrefacta; aut multis profundis scarificationibus convulnereur, & sanguis corruptus vulnusque aq. salsa calefacta probe abluatur ac tandem sequens Cataplas. imponatur. R^z Far. Orobi, Faba. ana ʒ ij. Oxymellis simpl. q. s. qua in Catapl. formam leniter concoquantur ac subigantur, fiat catapl. Reliqua putrefactioni dicata remedia paulo post in Gangraenae curatione enumerabimus.

Phlegmones sive Tumorum ex inflammatione Sanguinis ortorum species quae sunt?

Quatuor sunt praecipua, & inter phlegmones Symptomata non inepte numerari possunt, cum eas praecedat perpetuo phlegmone. Bubo, Carbunculus, Gangraena & Sphacelus; de quibus ordine brevissime dicam.

Emollientia. Chimici utuntur Ol ping. taxi. Ol. adip. human.

Curatio carnis corruptae in phlegmone.

Species phlegmones.

De Bubo-
ne.

Quid sit.

Bubo-
num 4.
genera.

Bubo quid, quæ ejus causæ, signa,
& quomodo curandus?

BéBav, proprie inguen significat; sed apud Medicos pro tumore adænarum, non tantum qui in inguinibus; verum etiam qui in aliis emunctoriis, ut collo, axillis & inguinibus excitantur, usurpatur. Bubonum verò sive Tumorum in emunctoriis pro causarum varietate quatuor sunt genera.

Primum Bubonum genus est, quod in puerili ætate & corporis incremento circa inguina creberrimè sine singulari dolore excitatur, quod ad compressionem digitorum è loco cedit; unde & fugile nomen accepit, nostratibus ein Hagedros / qui aut sponte, aut ex confricatione cum jejuna saliva, aut cum Ol. Scorp. paulo post resolvitur & evanescit.

Secundum genus est Bubo Pestilens, qui tempore pestis ex venenatis tumoribus à natura ad emunctoria propulsis generatur, qui semper febrem sibi habet conjunctam pestilentem. nostris ein Pestilengien swell / de ejus curandi ratione supra, in institutione nostra de profliganda Peste, prolixè docuimus.

Tertium genus Bubonum est quod adulescentibus salacioribus, cum impurissimis sortis commercium habentibus, in inguinibus duntaxat erumpit, & Bubo Venerens dici potest, à nostris tonforibus ein Klapholz dicitur; qui ut plurimum nuncius, & præcursor est morbi Gallici; cujus curatio peti debet ex curatione Symptomatum morbi Gallici, quam in Superioribus tradidimus.

Quartum Bubonum genus est quod ex tuberculis, pustulis, aut ulceribus extremarum partium vel articularum, in emunctoriis producit; semper enim ubi dolorificum tuberculum, aut ulcus in capite exoritur, statim sub collo aut pone aures: Si verò in manuum digitis, aut articulis tale quid contingat, sub Axillis; Si in pedum digitis, aut articulis eveniat, in inguinibus glandula intumescunt, & bubonem excitant; cujus rei causa ea est: Dolor perpe-

tuo sanguinem à reliquis partibus ad se alligit & trahit, qui ubi per adenas sive glandulas emuncteriorum defluit, glandulosa corpora, quia sunt rara & spongiosa, sanguinem præterfluentem in se trahunt & absorbent, atque ita intumescunt glandula.

Hic tumor sublata causa h. e. mitigato dolore & persanatis tuberculis, facile & ipse evanescit.

Ad hoc autem quartum genus Bubonum referri debent omnes adænarum tumores, exceptis superioribus, qui ex adfluxu sanguinis inflammati in quocunque emunctorio excitari possunt: de quibus hoc loco agitur.

Si itaque Bubo adænarum, h. e. tumor inflammatus in emunctoriis ex affluxu sanguinis excitatur, signa ejus sunt dolor, & rubedo loci: tum curatio à venesectione est auspicianda, præscribenda victus ratio refrigerans & humectans; Consideranda periodica tempora, dolor & inflammatio mitiganda, ac tandem maturatio ac suppuratio molienda, postremoque tumor aperiendus, mundificandus; Carne bona replendus, & ad cicatricem deducendus erit iisdem prædiis qua in phlegmones curatione commemorata sunt, & nunc in curatione carbunculi descripturi sumus.

Carbunculus quid, quæ ejus causæ, signa, & qua ratione curandus?

A'vbeçç, ein Brandich oder Pestilenzien blebder / est tumor phlegmonosus, sive ardens, ex confluxu crassi & retorridi nigrique sanguinis in aliquam partem collecti, progenitus, qui tumor niger quandoque est cum pustulis, quandoque sine pustulis, cinericeis eis similibus, qui ex ambustione oriuntur; carbunculi colore sunt aut lividi, aut instar carbonis nigri, & picis splendentis, cui circumjacens cutis inflammatur, cum acerbò dolore, & ut plurimum in crustosum ulcus degenerat, atque perpetuo sibi adjunctam habet febrem ardentem cum symptomatibus perniciosi.

CAVSA αἰσχαλ. est aer pestilens, mas- Ejus causam sanguineam inficiens & accendens, ex se. quo

Curatio
bubo-
num ex
sanguinis
affluxu.

Carbun-
culus
quid sit.

quo natura propellente carbunculus generatur. & n. y. p. est ipse sanguis venenatus & accensus, cujus tenuior pars in superficie carbunculi pustulas excitat, & erodendo ulcus efficit, ac tandem in crustam degenerat.

Signa. **SIGNA** carbunculi ex recitatis manifestata sunt, tumor enim in carbunculo aut ruber est, aut lividus, cum, aut sine pustulis, & acerbo cum dolore, qui nisi hominem oculus extinguat, in ulcus crustosum transit, & febrim pestilentem cum prostratione appetentia, nausea, vomitu, cordis palpitatione, anxietate & animi deliquio comitem habet. **Prognostica** carbunculi sunt; Omnis carbunculus acutus & perniciosus est tumor, minus tamen qui vel rubeo vel flavo colore conspicitur, & non habet adjuncta tam sevea symptomata; maxime lethalis est carbunculus qui in emunctoria, aut circa cor, aut circa orificium ventriculi excitatur; perniciofa siquidem sua imitura spiritus vitales inficit, & vitam ipsam elidit.

Curatio. Curationem Anthracis supra in institutione de Peste inter Pestis symptomata abunde tradidimus, hoc loco satis erit, curandae ejus rationem breviter perstrinxisse; praesertim qui extra contagionem pestilentem in corpore excitatur. Univerfa autem Anthracis curatio consistit in venesectione, victus ratione, Spirituum vitalium corroboratione, & Symptomatum sublevatione ac mitigatione. Statim itaque Anthrace apparente si neque atas, nec virium imbecillitas obset, venam nata l. e. h. e. per directum ex eodem latere in quo haret Carbunculus, vel humeraria, vel tali est incidenda. Humeraria quidem, si Anthrax sit supra Diaphragma; tali vero, si infra Diaphragma sit constitutus; & sanguis, si vires ferant, largius est detrahendus; sed non, ut nonnulli arbitrantur, usque ad animi deliquium; anima enim semel discedens, facile aberrare potest, ut nusquam in corpus redeat, & ita Medicus consulens non effugiet infamiam. Sanguine detracto statim ex ipso in-

more adustus & virulentus sanguis per profundas scarificationes detrahatur applicata cucurbitula, si dolor patiatur; aut applicatis Hirudinibus, & quatenus fieri potest, digitis exprimatur, fomentando tamen prius carbunculo jam per scarificationem vulnerato aqua marina, aut salsa calefacta; Eo enim modo crassus dissolvitur sanguis. Interim & victus ratio refrigerans & humectans, spiritusque vitales corroborans praescribatur, qualem in curatione phlegmones instituentiam docuimus. Cibus omnium convenientissimus erit jusculum, & caro pullorum, cum urvis immaturis coctum, & cremor pisana. In potu vero convenit aq. herd. in qua cinamo. nonnihil, & ibamarindi sunt infecti; cui & Syr. acetos. citri admisceri potest, post extractum ex carbunculo virulentum sanguinem, tumori non, ut in phlegmone, refrigerantia & impensius repellentia remedia sunt imponenda: sed talia quae cum commoderata repulsione simul etiam digerendi & dissipandi crassam & compactam materiam facultatem habent, quale sequens cataplasma; ex Arnoglossae cum rad. lentium palustr. Medullae panis filigi. in cal. aq. macerata & expressa, ana p. æ. simul contundantur in mortario eisque admisce. pul. cort. maligranati pro arbitrio, commisce. & concocta tepide imponantur; aut ubi haberi possunt duo mala granata, vel in eorum penuria mala communia acida, coquantur ad mollitiem, & exemptis arillis ac seminibus, medulla ipsa pomorum cum aceto rosar. conspergatur, & contusa in pultis formam redigatur, ac carbunculo imponatur, saepiusque immutetur. Ego felici successu in carbunculorum pestilentium curatione crebro usus sum Catapl. ex rad. Raphani cum pauxillo aceti rosa. conspersis, & contusis per cribrumque trajectis & impositis. Laudatur plurimum ad anthracis maturationem & perruptionem Catapl. ex nucleus nucum avellanarum contusarum impositum; praestantissimum quoque remedium est ad virus cohibendum, & ne flamma Anthracis circum-

Viſus ratio.

Moderate reprimentia & simul divergentia.

Defensivum.

jacentes

jacentes partes depopuletur atque inficiat, si adjacentes & sana partes illinantur linimento ex bolo Arme. cum q. s. Ol. Rosa. & pauxillo aceto rosar. in plumbeo mortario exacte commixtis, & instar Linimenti formæ redactis.

Remedia
ad cru-
stam.

Porro ubi carbunculus crusta obductus fuerit, tum validioribus presidis qua crustam extirpare possunt, curatio est molienda, & ejusmodi medicamenta adhibenda, qua sordes & virosam colluviem in ulcere absumere & exiccare queant; non enim tum suppurantia conveniunt; Tali itaque Anthracis ulcere primum illiniatur Unguent. Egypt. & Catapl. ex far. Orobi cum q. s. Oxy mel. simpl. confectum: ac si in Anthracis ulcere sordida colluvies redundet, caustica etiam magis imponenda sunt pharmaca, quale est unguentum ex calce virva & pul. Aristol. rot. cum oxy m. commixtum, aut Aristol. pul. cum aceto mixtus; hac enim corruptas ulceris partes à sana & virva parte segregant ac separant; omnium enim maximum in sordidis & putrefactis, crustosisque ulceribus id observandum est, ut quicquid putrefacti in ulcere deprehenditur, id omne quam primum à sana parte tollatur & excindatur; ac si patientis natura adeo robusta sit, ut caustica actu alia ferre queat, tum statim confert auro vel argento candenti ulcus usque ad sanam carnem inurere, eoque donec circa omnes partes ulceris, sensus doloris oboritur, tum enim corruptionem sublatam esse statuendum est; ubi vero ex hujusmodi unctione carbunculi dolor aut inflammatio excitetur; remediis supra commemoratis statim mitigentur hac Symptomata, ac tandem ulcus accurato abstergatur, ac mundificetur, atque aliorum ulcerum modo, de quibus in sequentibus disseremus, per convenientia Emplastrum ad cicatricem & perfectam sanitatem perducatur.

Cauteria.

Contingit etiam ut ulcus Carbunculi ejusmodi unctione duriusculam crustam acquirat, ea quoque statim à subjectis partibus resolvenda erit. Resolvunt autem in ul-

Quæ cru-
stas à cau-
terio in-
ductas re-
solvant.

bus resolvenda erit. Resolvunt autem in ul-

cere crustas ac cortices, recens & salis expers butyrum, aut axungia porcina recens illita; aut sequens Catapl. impositum, quod non modo crustas resolvit, sed & dolorem ex unctione conceptum auferit:

R. Rad. Alib. fl. violar. Vvarum pass. ma. prius acinis exemptis, ana ℥iij. decoquantur simul cum q. s. aq. usque ad mollietatem, & exempta ex jure simul contundantur minutissime, & per cribrum instar pulvis transcolentur, eisdemque admisce. farina triticea aut hordei ad mensuram dimidia partibus pulvis, ac addito Buty. rec. vel pingued. porcina q. s. fiat Catapl. quibus refrigeratis admisceri possunt commode lutea duorum Ovorum. At verò si Carbunculus non sit adeo pestilens ac ferus, quod tamen ut plurimum est; (id quod ex colore dignosci potest) minus autem periculosus est Carbunculus, qui primum instar phlegmones rubet ac deinde flavescit: talis enim curationi inducias concedit. Huic carbunculo statim in initio imponatur Empl. emolliens, cuiusque periculum, quod ex fribus & fermento acri ac sale conficitur, quo ter bisve imposito, tumor aperitur. Vbi verò apertus Carbunculus niger intus & dehiscens conspiciatur, statim Catapl. ex far. triticea ovorum luteis concinatum imponantur, ac tandem abstergatur mundificetur & consolidetur imposito Catapl. ex rad. Symplici major. inter duos lapides contusus, quod crebro immutetur; id enim per unum aut alterum diem ulcus Carbunculi facile persanabit. Per totum autem curationis Carbunculi tempus intra corpus ea exhibeantur qua veneni semina exstirpent: qualia sunt, Ther. Andro. Bolus Arme. verus. Pul. Scordii, Card. Bened. & Scabiosa aut earum herbarum aq. stillatis. cum Syr. acetos. Citri commixta; Cor quoque & spiritus vitales subinde corroborentur ac refocillentur rot. Liberantis & Diamarga. frig. exhibitis & Epithe. ex aq. & aceto rosar. aq. Borag. & Melissa simul commixtis, additis speciebus cordialibus. Quibus addi possunt etiam remedia qua supra in curatione Pestis sunt commemorata.

Ad cas-
buncu-
lum mi-
torem
topica re-
media.

Chimici
commen-
dant Ol.
Antimo.
& subli-
mati, spi-
rit. Mer-
cur. ru-
beum, Ol.
busonum
Elix. pe-
stilent.
Crollii.
magist. &
extra&
Theriac.
Empl.
magneti-
cum.

Gangræna & Syderatio ex inflammatione quid, quæ earum causæ, signa, & quæ curandi ratio?

De Gangræna & Sphacelo. Quid differant.

Gangræna quid? Sphacelus quid?

Γαγγραινή & σφαισλος, intentione & remissione diuaxat ab invicem differunt; Gangræna via est & transitus ad Sphacelum; & Sphacelus finis est Gangrænae. Est itaque Gangræna ubi in aliqua parte corporis ex phlegmone siue magna inflammatione partis, calor naturalis exstinguitur, & substantia partis adeo exurit, ut & sensum & motum amittere incipiat, vulgus Ignem Sancti Antonii, & tonsfores, Dat Kolde Buhr vocant; quod malum perniciosum, ubi in initio per incuriam neglectum eo perveniat, ut pars affecta nec unctionem amplius sentiat; sed tanquam mortuum cadaver corpori hareat, tum non amplius Gangræna, sed Sphacelus, vel νεκρωσις Græcis, Latinis Syderatio, vel partis mortificatio, & Barbaris Græco Vocabulo ἐστιάειρος, nostratibus etiam Gestorben oder Dodes gelidt nominatur; quam constitutionem partis subsequitur corruptio & putrefactio: & Sphacelus quidem non tantum in carnosiss accidit partibus, verum etiam ipsa ossa sæpe depopulatur & corrumpit. Vidi ego Saroa militem apud Luise Wolgan / cui omnis calva synipitis Sphacelo corrupta & absumpta erat, illis tamen membranis & Cerebro, quod cute tantum continebatur, & ad digitum impressionem nullum os inesse percipiebatur.

Causa Gangrænae & Sphaceli.

CAUSÆ & Gangrænae & Sphaceli siue Syderationis sunt omnia, qua spiritum vitalem in aliqua corporis particula excludere & intercipere possunt. Ex iis æqual. sunt partis alicujus ex vehementi frigore diuturna congelatio, vel ex intempestiva remedium refrigerantium & repellentium applicatione vehemens particula alicujus refrigeratio, & caloris nativi extinctio, vitalisque spiritus interceptio: id quod in inconsiderata phlegmones alicujus curatione ab imperitis Chirurgis sæpiissime accidit: item partis alicujus corporis fortis & diuturna vinculis restrictio; qua & ipsa vitalem spiritum per arterias adfluentem, particulamque vivificantem, &

alimentum per venas affluens excludit. His & mori & vulnera venæ. ita color in vitalem extinguere, & sanguinem corruptum adijci possunt. πρῶτον. Causa sunt vehemens & diuturna inflammatio, sanguinem exurens, & vitalem calorem extinguens.

SIGNA Gangrænae siue ignis sancti Signa. Antonii, & Sphaceli, siue mortificationis membri, tali ordine se habent: Præcedente magna inflammatione alicujus partis, aut una ex superioribus causis, exstinguitur calor nativus cutis: deinde cessat in ea parte articularum pulsatio. Tandem & sensus doloris torpescit, & movendi facultas perit; paulo post tota particula nigrescere, & flaccescere incipit; ita ut digiti impressi vestigium stabile relinquatur. Postremo ubi jam putrescere pars, & olere instar cadaveris incipiat, atque si præcidatur pungaturve, nihil sentiat, tum non amplius Gangræna; sed sphacelus, siue Syderatio, aut potius membri mortificatio nominatur.

Signa prognostica. siue notabiles Aphorismi in Gangræna & Sphacelo hæc sunt observanda: Gangræna, nisi statim in initio, donec sanabilis, nondumque omni sensu privata est, mature succurratur, in Sphacelum degenerat, & insanabilis evadit; Sphacelum siue emortuum membrum nisi à sanis partibus tempestive præcidatur & amputetur, primum proximas partes, deinde totum corpus, tingit, & putrescere cogit, ac hominem sub frigidore sudore extinguit.

CVRATIO Gangrænae, per industriam Chirurgicam antequam pars est Syderata, curationem admittit, quæ pro causarum varietate ita perficienda erit: Si Gangræna ex phlegmone siue ingenti inflammatione in aliqua parte corporis sit genita, statim in principio sanguis adustus & retorridus, aut ex congelatione concretus, ex affecta particula per profundas incisiones aut scarificationes usque ad partes sanas infectas impositis cucurbitulis accuratè eliciendus, & evacuandus erit. Id vero ut commodius perfici queat, locus affectus primum

aut aqua marina, aut salsa calefacta diu mulumque est forenda, donec grumi sanguinis resolvantur & liquefiant: & sanguine expresso & vacuatoque vulnus aceto rosa. cal. probe abluatur, interim minimè neglecta victus ratione, qua supra in curatione Phlegmones est commemorata, nec praterita spirituum vitalium, adeoque cordis per convenientia remedia corroborazione. Repurgato tandem vulnere à corrupto sanguine, imponatur Catapl. ex far. hord. aut Orobi cum q. s. Oxym. confectum. Postea mundificationis ergo indatur vulneri Unguentum Egypt. ex a. p. mellis, aceti, aruginis & dimidia parte aluminis simul artificiosè concoctis paratum, eoque utendum, donec pura & incorrupta in vulnere caro conspiciatur.

Vulneris
mundifi-
catio.

Quæ
corru-
ptam car-
nem au-
ferunt.
Chimicis
in usu est
Magister.

Tatæ,
Essentia
Theriac.
Butyr.
Anti-
mon. in
circuitu
pennæ
allitum.

Sal che-
lidon
spir. vi-
triol. fu-
liginis,
Ol. Arse-
nic. quin-
ta Essent.
Antim.
Ol. fuc-
cin. Dia-
sulphur.
Rulandi.

At vero si alius hæreat putrefacta caro, conandum erit, ut quicquid in vulnere corruptum, id omne à sanis partibus dirimi queat, habita semper ratione Naturæ partis, ne nimium incalcescat. Auferunt autem partes corruptas & à sanis dirimunt, Arsen. sublim. & Empl. ex calce virva & alia, qua in medicamentorum classe supra proposita sunt. Porro ubi Gangrana in Sphacelum est commutata, h. e. ubi infecta pars est emortua, tum unicum & miserabile restat remedium, nempe partis emortua amputatio & à toto corpore avulsio, & nisi id fiat, necessario contigua & adjacentes partes corrumpuntur & emoriuntur. Sublata & præcisa parte corrupta, sana adjacentes particula statim aut auro, aut argento, aut ferro candenti inurantur; ita enim & sanguinis fluxio sistitur facile, & sanatio subsequitur felicior. Post tale cauterium imponatur præstis particulis catapl. ex porris cum suilla pingued. confusis, vel aliud remedium constringendi vel desiccandi facultate præditum; qualia supra proposuimus; & cum exustione plerumque crusta suboriatur, laborandum est ut ea emolliatur & auferatur; id quod commodè fieri potest, si particulis imponatur catapl. ex far. tritici vel hordei cum aq. & buty. rec. q. s. continuatum. Aut catapl. ex medulla panis cum suc. Apii palu-

stris subactum, cui recent butyri q. s. admiscendum erit. Sublata ex ustione crusta, ipsum ulcus rursus aceto rosa. tepido abluitur, & sequenti catapl. mundificetur;

Caute-
rium.

R Mellis ℥ s. vitell. ovorum ℥ iij. far. hord. ℥ s. subigantur, fiat Catapl. postremo ulcus emundificatum Empl. carnem bonam generantibus & ulcus cicatrice claudentibus, quorum copiam supra in classibus remedium adnotavimus, instar aliorum ulcerum vulnerymque perfectè persanetur.

Reliqua
curatio.

Biliofi tumores qui, quales & quæ eorum species?

Vbi sanguinea massa, biliosa colluvie, ultra naturam modum est abluta, si in aliquam corporis partem confluat & collecta effervescat, tumorem biliosum per cutem expansum excitat ad tactum ferventem; & colore ex rubeo ad flavedinem declinantem. Tumorum biliosorum genus est, Erysipelas. cuius species sunt, Erysipelas sine pustulis; Erysipelas cum pustulis, sive exulcerans: Herpes-miliaris; Morbilli & varicella. Sed quia de posteriorum specierum curatione supra inter affectiones cutis abunde egimus, hoc loco satis erit de Erysipelate & herpete tractasse.

Biliofo-
rum tu-
morum
genera &
species.

Erysipelas quid, quæ ejus causæ, signa & curandi ratio?

Ερυσίπelas, Latinis ignis sacer. das hüllige De Erysi-
Dunst oder Rose/ nominatur. Est species pelate: tumoris biliosi, ubi videlicet biliosus san- quid sit.
guis in aliquam partem subcutaneam confluxit, ibidemque accensus est, & quia hac colluvies biliosa valde est tenuis, partem affectam in latum occupat, sed non ita in molem exuberat, quemadmodum tumores reliquorum humorum, cum fervore & rubedine ad flavedinem declinante per cutem erumpens: & si biliosa colluvies adusta & retorrida sit, tum per cutis superficiem pustulas excitat, & cutem erodit, tumque Erysipelas exulcerans nominatur.

CAUSÆ ignis sacri πρσγερ. sunt immoderata alicujus partis constructio, compressio & diuturna insolatio, vehementerque calefacientium remedium applicatio.

Pregno-
stica.

Cura.

Signa
causæ.

no. $\pi\epsilon\gamma\gamma\mu\epsilon$ sunt humores biliosi in sanguinea massa redundantes.

Signa. Signa sunt, alicujus partis dolor pungens & acris, quemadmodum paulo post subsequitur febris ut plurimum unius paroxysmi, quam comitatur loci affecti rubedo ad flavedinem vergens, qua ad digiti impressionem immutatur, sed mox refluit, item dolor mordicans cum fervore; cutis vero non ita intumescit ut in aliis tumoribus. Occupat autem Erysipelas ut plurimum aut crura, aut manus, aut faciem, caputque. Accidit nonnunquam & internis visceribus, Epate & utero. Prasagitionis signa sive Aphorismi in igne sacro hi sunt diligenter observandi: Erysipelas ossium denudationi aut fracturis superveniens, malum est indicium, teste Hippo. 7. Aph. 19. Ignis sacer rarissime per suppurationem terminatur, sed paulo post per insensilem evaporationem ut plurimum discutitur. Ignem sacrum in exterioribus apparentem ad interiora repellere, non caret periculo: sed ab interioribus ad exteriora propellere, salutare est. Perniciosior est ignis sacer in facie, aut capite obortus, quam in aliis externis partibus: ex levi enim occasione tumore adauso in Anginam, strangulantem hominem, convertitur. Perniciosus quoque est ignis sacer in epate & utero gravidarum excitatus: foetum enim interimit, & periculosam febrim excitat. Erysipelatis proprium est saepe recurrere quod semel invasis, nisi prophylactica curatione praeveniat.

Curatio. Curatio duplex itaque adhibenda est igni sacro; Liberativa una, & ne iterum redeat, praeservativa altera. Qui itaque Erysipelate corripitur, tali liberativa cura utatur: Statim in initio alvus, si est obstructa, glande subducatur, & haustulus ex 3. 5. Ther. Andro. cum haustu. aq. stillati. florum sambuci bibenda praebeatur, & sudor per unam aut sesqui horam bene obfecto corpore proliciatur. Locus autem affectus mundissimis & mollissimis linteolis contegatur, nullo alio imposito pharmaco repellente. Ita enim per sudorem materia biliosa facillime discutitur; intra

corpus tamen uti poterit patiens singulis diebus bis haustu aq. samb. aut hord. In simplici & sine pustulis efflorescente Erysipelate, affecta parti sunt minimè adhibenda temere Topica remedia, praesertim vehementius refrigerantia & repellentia; per ea siquidem pars affecta indurari, & livido colore infici potest. Praestat itaque discussionem ejus per insensilem exhalationem natura relinquere, & solis mundissimis linteolis affectam partem contegere. Qui vero doloris & inflammationis molestias in Erysipelate tolerare non possunt, sat erit aquam stillatit. ex flor. sambuc. linteolis exceptam parti affecta imponere; aut dolorem fervoremque remediis in phlegmatum Symptomatibus curandis commemoratis mitigare; inter qua primas obtinent Catapl. ex fol. & rad. Hyosch. stupis canabinis involutis, & sub fermentibus cineribus coctis, cum unguentoque popul. vocato contusis confectum. At si ex acrimonia & urenti qualitate retorrida bilis, non tantum rubor, sed & pustula & cutis aliqua exulceratio in aliqua parte affecta contingat, cum sanè non incommode remedia moderatè refrigerantia ac repellentia imponi possunt, cujus impositionis terminus erit coloris cutis alteratio, quo alterato statim à repellentib. abstinendum, & loco eorum discutientia & resolventia sunt adhibenda. Inter repellentia & refrigerantia remedia praecipua sunt lentes palustres, Ol Rosa. Vnguentum infrigidans Galeni, & unguentum cerusa lota, aut aliud simile sic concinnari potest: R Succi Hyoschi. Solani ana \mathfrak{z} j. aut succi loco aq. stillat. earundem herbarum Mucag. se. Psylli cum aq. rosa facta \mathfrak{z} ij. Commisc. fiat Epithe. Aut R Ol. Rosa. \mathfrak{z} iij. Suc. semper vivi major. Suc. plantag. ana \mathfrak{z} j. pul. Cerusa cum aq. rosa prius elota, Lithargy tenuiss. contriti ana \mathfrak{z} s. Lactis mul. \mathfrak{z} j. Omnia simul in plumbeo mortario multum diuque conterantur, donec liquidi Linimenti formam acquirant, & loco affecto illinantur.

Observandum in Erysip. omnia remedia topica debere esse tenuia & liquida, & altu

Refrigerantia intra corpus.

Topica in simplicis erysipelate.

Chimicis in usu est Lapis medicamentosus Crocilli. sacch. saturni, spernio-lae compositum Anodyna.

Topica ad erysipelas ulcerosum. à Chimicis sedata inflammatione commendatur Calx putaminum Ovorum, Magisterium Lithargyrii, Lac Lunæ seu A-garicum petrosolum

Repel-
lentia.

frigida semper esse imponenda, crebroque, ne
nimum incalcant, renovanda. Mutato
jam nonnihil cutis colore, & sedato dolo-
re ac inflammatione, Catapl. discutientia &
resolventia tumores, quæ supra in Phlegmo-
nes curatione descripta sunt, imponenda
erunt. Inter quæ convenientissimum hoc
habetur: R Rad. Alib. teneriorum lb j.
Concisa coquantur ad mollitiem, & contun-
dantur in mortario, pulpæque ejus per cri-
brum transernatur, cujus libræ dimidia ad-
misc. Medulla panis in aq. macerata & rur-
sum expressa ℥ iij. pul. lithargy. cerusa abluta
ana ℥ ij. suc. plantag. ℥ ij. Aceti ros. ℥ s.
contusa & subacta concoquantur, fiat Ca-
topl. Porro ex prava curatione Erysipelatos

Ad duri-
tatem &
livorem
remedia.

& vehementer frigidantium diuturna ap-
plicatione, si particula affecta indurescat, &
livido colore imbuatur, tum ut in phlegmo-
nes curatione ostensum est, affecta particu-
la, aqua marina, aut salsa, calefacta diu
multumque perfundatur foveaturque, ac
tandem cutis incidatur, & sanguis omnis,
quatenus fieri potest, accuratè exprimatur,
ac deinde abstergetur, & conglutinantibus
remediis aliorum ulcerum modo (ut antea in
phlegmones curatione judicavimus) cicatrice
vulnus obsignetur. Cum vero Erysipelas cre-
bro recurrere soleat, prophylactica curatio siue
preservatio ejusmodi est instituenda:

Præser-
vatio ne
recurrat
erysipe-
las.

Restituta sanitate partis affecta, & depul-
sis Symptomatibus quæ igne sacro laboranti-
bus contingere consueverunt, si corpus ple-
thoricum, singulis annis ad minimum bis
vena secanda erit; In Vere quidem Epa-
tica dextri humeri, in Autumno autem, si
pedes laborent, Talaris, ejusdem lateris.
Deinde per totum anni curriculum declinet
victus ratio ad refriger. & humectationem,
qualem in Phlegmones & in Febris curationi-
bus præscripsimus. Vitetque sedulo omnia quæ
bilem commovere, sanguinemque inflamma-
re possunt, ut sunt ira, excandescencia, aro-
matum creber usus, Solis æstus, Balnea æstua-
lia, & laboriosa commotiones corporis, atque
alvi suppressio. Tandem post detractionem
è Venis sanguinis, biliosa colluvies tam in

Vitius
ratio.

Vere quàm Autumno convenientibus re-
mediis subducatur, qualia supra in ta-
bellis remedium purgantium proposuimus.
Hoc loco unicum adijcisse satis, quod ta-
le est: R Rhab. el. ℥ ij. fol. Sena. ℥ j.
se Anisi ℥ i. Contusa in linteo Sydoni
colliguntur, & fiat nodulus laxus qui in
haust. aq. flo. Sambuci aut Centau. mi.
per noctem maceretur, & mane in duplici
vase siue ferventi aq. usque ad ovi elixatio-
nem coquatur, & nodulo expresso, liquori
admisceatur, aut Syr: rosa. soluti. ℥ ij. aut
Cassia pulpa ℥ vi. fiat haustus, qui sumatur
sex horis ante prandium, aut exhibeatur
℥ j. Elect. leniti. cum haust. aq. Sambuci
resoluti.

Purgatio
Cholago-
gum.

Herpes miliaris quid, quæ ejus cau-
sa, signa, & quomodo
curandus;

Εἶπας, Serpens, est species Erysipelatos, Chimiei
videlicet in aliqua corporis parte biliosa in hoc af-
colluvies fervens, & venenata per super-
ficiem cutis cum rubore instar granorum mi-
lii, aut ovorum piscium effusa, & inde Gra-
cis ἑρπητις nominatur.

Accidit ut plurimum in venenatis mor-
bis. Ejusdem speciei sunt & morbilli & va-
riola, pustula in pueritia omnibus ferè ho-
minibus familiares, quas Hippocrates Exan-
themata nominat. Est & Herpetis species
quæ, Græcis ἑρπητις ἰσχυρὸς, Barbari
Serpiginem, quæ serpendo cutis superficiem
excedat ac defendat. in latumque exulceret,
Latini lichænes, Dte Flechten / nominant.
Familiare symptoma Gallico morbo infectis.
Verum cum nos omnium harum affectionum
causas, signa, & curandi rationem in supe-
rioribus de curatione vitiorum cutis abunde
tradiderimus, supervacaneum esse censemus
eamdem rursus repetere, cum hoc loco de gran-
dioribus tantum tumoribus nobis sermo sit
institutus.

in hoc af-
fectu mire
re com-
mendant
Lap. me-
dicam.
Croll.
sacch. sa-
turnau-
rum præ-
cipita-
tum, Ol.
salis, tar-
tari Es-
sent.
plantag.
falicis
rubi,
scrophu-
laria.
Exan-
themata.
serpigo.

Pituitosus tumor quid, & quæ
ejus species?

pituitæ
triplex
consi-
stentia.
Vnde tri-
plex tue-
mor.

Ex pituitosa colluvie, quæ naturâ fri-
gida est & humida, in aliquam partem de-
cumbente, pro ratione sua substantia cras-
sa

sa aut tenuis, tumores excitantur, quorum genus Oedema nominatur, cujus tres sunt species, Vna qua ex moderata pituita generatur, communissimum Oedema; Altera, qua ex tenui & aquosa producitur pituita, qualis est Hydrops, & Hydrocele; Tertia ex crassa & duriori generatur pituita, ejusmodi sunt Strumæ, Scrophulæ & Glandulæ. At si pituita admixtus sit crassus halitus sive spiritus flatulentus, quartam speciem producit, videlicet flatuosum tumorem.

Oedema quid, quæ ejus causæ, signa, & qua ratione curandum?

De oede- Oedema est tumor laxus & indolens, sive mate. raris & doloris expers praternaturalis moles, Quid sit. ex pituitosa colluvie in aliqua subcutanea particula collecta excitata. Omne autem

Oedema aut mor- Oedema aut est morbus, ut qui ex collectione bus, aut sympto- ne pituitosi humoris, nulla antecedente alia ma. affectione, genitus est; aut est Symptoma, ut ubi post diuturnam febrem aut ægriam, aut tabem curva pedesque sine singulari dolore intumescent.

Causa CAUSÆ Oedematum sexal. sunt Oedema- Cibus & Potus refrigerans & pituitosum tis. sanguinem generans; Somnus & Vigilia modum excedentes; crapula & quicquid naturæ calorem in corpore extinguere potest. Cæcæ sunt caloris naturalis, præsertim Ventriculi & Epatis, & alterativa potentia imbecillitas; ex quibus est & materialis causa interna, nimirum pituitosa colluvies. Omnis autem pituita secundum substantiam aut moderata, aut tenuis, & serosa, aut crassa, & indurata: pro cuius pituita constitutione, variæ, ut diximus, generantur species Oedematum.

Signa. SIGNA Oedematum sunt, Tumoris laxitas & mollities, indolentia, vel certe exiguus dolor; Coloris cutis nulla immutatio, ac si tumor digitis imprimatur, cavitatem relinquit, & vestigium digiti diu perseverat. Ut plurimum autem Oedema per noctem augetur, & de die remittit; præsertim si Oedema sit in pede, & hyeme, ac in senum potius corporibus quàm aliis excitatur.

Prognostica signa observanda sunt, ubi prognostica. Oedema in pedibus incipit, & paulatim sursum ascendit, & Hypogastrium ac totum ventrem tandem occupat, & nisi tempestive succurratur, in Hydropem terminatur, pernitiemque adfert. Ut autem cætera tumorum genera, ita & oedemata quatuor habent periodica tempora, initium, augmentum, statum, & declinationem, quam subsequitur terminatio. Terminatur autem omne Oedema aut per resolutionem, sive exhalationem, aut per suppurationem, si crassa & putrida est tumoris materia, aut per conversionem in nodos sive indurationem.

CURATIO generalis omnium Oedematum consistit in quatuor intentionibus, quarum prima est victus ratio. 2. humoris pituitosi ad evacuationem preparatio, ejusdemque evacuatio. 3. pituitosa colluvie sive puris in tumore collecti discussio & resolutio. 4. ac postremo Symptomatum, quæ Oedematibus accidere solent, sublatio, sive remotio. Ad victus rationem quod attinet, & esculenta, potulenta, aëris constitutio & corporis exercitium debent talia esse, qua calefacere & exsiccare queant. Refrigerantia autem & humectantia studiosè fugere convenit. Itaque edulia omnia arommatibus condienda sunt, & potiones calefacientes, ut sunt Vinum Rhena. Aromatite, & Hydromeli, in pituitosis tumoribus conveniunt. Contrapiscium, lactis, casei & fructuum horariorum usus diligenter est vitandus. Et inter alimenta, assa semper sunt præferenda elixis. Balnea similiter humectantia, & somni longi fugiendi sunt.

Ad secundam intentionem quod attinet, si corpus redundet pituitoso lento humore, si corpus redundet pituitoso lento humore, primum convenientibus remediis humor est concoquendus, incidendus & extenuandus: eorum autem medicamentorum sylvam, quibus hoc perfici queat, in tabellis remedium, humorum coctioni dicatorum, supra tradidimus, qualia sunt Syr. de s. rad. de hyssop. oximel. diureticum & oxim. scylliticum, quorum 3 ij. cum convenientium herbarum, rad. sem. decoctio trium un-

ciarum mixta mane ac vespere calefacta ad tres pluresve dies, donec signum concoctionis in urina appareat, exhibenda sunt. Concocto & extenuato sufficienter humore pituitoso pharmacis phlegmagogis, ut sunt Elect. Diaphoe. Diaturb. & Hyer. simp. quarum vel singul. vel simul mixtorum ℥x. aut ℥j. s. cum haust. aq. stillati. Absyn. aut Centau. mi. aut card. Bened. aut earundem similiumque decocto commixta, sex horis ante prandium exhibeantur. Interim & ventriculi ratio est habenda, singulisque diebus paulo ante assumptionem alimenti rotulis una aut duab. Diambre, Diagalanga, devoratis, corroborare convenit.

Topica in initio. Iuxta tertiam intentionem, tumori secundum tempora varia sunt & distincta topica remedia imponenda, quae materiam in tumore contentam vel discutere, vel repellere, vel exsiccare queant. In initio itaque tumoris satis erit spongiam novam beneque ablutam & aq. acetoque simul mixtis imbutam calentemque imponere duplicatis linteolis mundissimis, eundem liquorem admove-
In statu. re loco affecto, arctiusque illigare: Debet autem ligatio à parte tumoris inferiore ad superiorem convolvi, semper ab inferiore incipiendo, & in superiore finiendo. Efficacius est eo liquore lixivium ex cinere fagi, cui nonnihil aceti sit mixtum, si duplicatis linteolis imponatur & alligetur; discutit enim & absunt tumori materiam. Aut
In declinatione. R. aloes, Myrrha, Acatia, licii, croci, Bol. Arme. ana ℥s. qua pulverisata cum succo brassicae & aceto rosa, conterantur, misceanturque, & in formam Empl. redacta Oedemati imponantur; & his quidem praescriptis remediis ab initio tumoris, & in augmento uti licebit; in statu vero eisdem remediis plus aceti, & nonnihil aluminis adjici potest.

Chimicis in usu est Gypsum calcinatum cum lixivio applicatum, & sumunt vero & exsiccant lixivium ex cinere falcis fit. Porro in declinatione, ubi tumor ad resolutionem terminare videatur, & paulatim detumescere, tunc magis absumentibus & exsiccantibus utendum erit, & arctiori constrictione, & fasciarum illigatione. Absument vero & exsiccant lixivium ex cinere

ligatum. *Magisterium.* *Ammoniaki.* *Bdellii.* *Opopanax.* *Myrrha.* *Salis ana.* *Concocto.* *Extenuato.* *Sufficienter.* *Humore.* *Pituitoso.* *Pharmacis.* *Phlegmagogis.* *Elect.* *Diaphoe.* *Diaturb.* *Hyer.* *Simp.* *Quarum.* *Vel singul.* *Vel simul.* *Mixtorum.* *℥x.* *Aut ℥j.* *S.* *Cum haust.* *Aq. stillati.* *Absyn.* *Centau. mi.* *Aut card.* *Bened.* *Aut earundem.* *Similiumque.* *Decocto.* *Commixta.* *Sex horis.* *Ante prandium.* *Exhibeantur.* *Interim.* *Ventriculi ratio.* *Est habenda.* *Singulisque diebus.* *Paulo ante assumptionem.* *Alimenti.* *Rotulis una.* *Aut duab.* *Diambre.* *Diagalanga.* *Devoratis.* *Corroborare.* *Convenit.* *Topica in initio.* *Iuxta tertiam intentionem.* *Tumori secundum tempora.* *Varia sunt.* *Distincta topica remedia.* *Imponenda.* *Quae materiam in tumore contentam.* *Vel discutere.* *Vel repellere.* *Vel exsiccare queant.* *In initio itaque tumoris.* *Satis erit spongiam novam beneque ablutam.* *Et aq. acetoque simul mixtis imbutam calentemque imponere duplicatis linteolis mundissimis.* *Eundem liquorem admove-
re loco affecto.* *Arctiusque illigare.* *Debet autem ligatio à parte tumoris inferiore ad superiorem convolvi.* *Semper ab inferiore incipiendo.* *Et in superiore finiendo.* *Efficacius est eo liquore lixivium ex cinere fagi.* *Cui nonnihil aceti sit mixtum.* *Si duplicatis linteolis imponatur.* *Et alligetur.* *Discutit enim.* *Et absunt tumori materiam.* *Aut
In statu.* *R. aloes.* *Myrrha.* *Acatia.* *licii.* *croci.* *Bol.* *Arme.* *ana ℥s.* *qua pulverisata cum succo brassicae.* *Et aceto rosa.* *conterantur.* *misceanturque.* *Et in formam Empl. redacta Oedemati imponantur.* *Et his quidem praescriptis remediis ab initio tumoris.* *Et in augmento uti licebit.* *In statu vero eisdem remediis plus aceti.* *Et nonnihil aluminis adjici potest.* *Chimicis in usu est Gypsum calcinatum cum lixivio applicatum.* *Et sumunt vero.* *Et exsiccant lixivium ex cinere*

farmentorum vitis aut quercinis confectum. *miter al-* *ligatum.* *Aut R. Alumi. Sulph. Myrrha, Salis ana.* *tenuissimè pulverisata commisc.* *Et cum Ol.* *rosa. pauxilloque aceti rosa. fiat Unguentum.* *quod duplicatis linteolis exceptum imponatur tumori.* *Aut R. stercoris porcini aridi ℥b. s. Olibani styracis calam. Musci quercini flo. Absinth. spica Indica ana ℥s. s. pulverisata concoquantur cum aceto rosa. Et succo Bras-* *sica ana.* *Et in Catapl. formam redigantur.* *Oedematique imponantur.* *At vero si discuti digerique Oedematum materia nequeat.* *Et à praescriptis remediis tumor non immi-* *nuatur, sed ad suppurationem transilire vi-* *deatur, tum consultum est ad maturantia* *Et suppurantia accedere, eaque tumori im-* *ponere; maturat autem Et ad suppurationem deducit facile Empl. Diachyl. Oede-* *mati impositum, aut imponatur sequens* *Catapl.* *R. pul. Malva, Acanti, Rad. Altheae,* *lill. albo. recent. caparum sub cineribus assa-* *tarum, simulque diligentissimè contusarum,* *sem. lini pulverisati, Et fermenti aeris ana.* *M. 1. confusa Et concocta probeque subacta cum q. s. Axungia porcina aut butyri, redi-* *gantur in formam Catapl. Aut R. succ. Ebuli. Sambuci, Lapatii acuti, Ligustici,* *Foeniculi ana q. s. quibus admisce Unguenti* *Dialthe. Mellis Et buty. rec. ana q. s. simul* *concoquantur. Et addita farina triticea q. s. fiat Catapl. Maturato tumore, Et nonnihil* *mollito, cum Oedemata rardè instar aliorum* *tumorum per se Et sponte rumpantur, pra-* *stat aut auro candente, aut caustico reme-* *dio imposito inurere ac rumpere. Causticum* *id egregium habetur: R. pul. cantba. ℥ ij.* *fermenti acerr. ℥s. s. Mucag. se lini q. s. fiat* *Empl. Et suppurato Oedemati imponatur do-* *nec aperiat. Aperto tandem tumore pu-* *rulenta colluvies exprimatur, ulcusque ab-* *stergatur, ac mundificetur, apertumque re-* *tineatur, donec pus omne detractum sit; ea* *autem ratione apertum ulcus permanebit,* *si quotidie licium Unguento Apostolico imbu-* *tum imponatur; aut si crassum est pus, Et ex-* *primi nequeat, sequenti Empl. eliciendum erit:* *R. Gal-*

Suppurantia.

Aperica-
tia tumo-
rem.Reliqua
curatio
vulneris.

Re Galbani, Ammo, utriusque in aceto rosa. soluti, Terebintina, picis, olei vetustioris ana q. s. liquefacta ad lentum ignem redigantur in Empl. formam. Emundata purulenta colluvie, tandem aliorum ulcerum instar, carne repleatur, ulcusque conglutinetur & cicatrice obducatur, ut paulo post in curatione ulcerum docebimus, & convenientia huic rei remedia enumerabimus.

Symptomatum curatio.

Doloris. Durities.

Curatio oedematis quando est symptoma.

Postremo si inter curationem Oedematum aliqua incidant Symptomata, ut dolor & tumoris durities; dolor quidem mitigetur Ol. chama. cheirino aliisque anodynis inunctis. Durities autem emollientibus remediis impressis adimatur; emolliunt autem, medulla cervina, bubula; aut alio emolliente supra in ordine remedium emollientium propositio. Porro si Oedema non morbus sit, sed symptoma, ut antea quoque monuimus, morbus semper prius est curandus, deinde Oedema; ejus symptoma, sponte sublato morbo, per se evanescet; sed ubi persistat diutius, satis erit apposuisse loco tumenti quæ discutiant & sine molestia exciscant, quales sunt Ol. rosa. cum aceto & sale commixtum, aut oxymel simplex inunctum.

Oedema aquosum, sive tumor ex tenui & aquosa pituita generatus, qualis, quæ ejus causæ, signa & curandi modus?

De oedemate aquoso.

Oidmæz vda wdes, tumor aquosus, vel Apostema aquosum, cui Wässerich geswulst dicitur. Ex triplici pituita constitutione tres species tumorum pituitosorum excitantur. Ex pituita crassa, si in subcutaneis partibus per totum corpus diffundatur, excitatur tumor, qui Græcis Δευροφλεγματία nominatur. Si vero ea in aliquam corporis particulam solum confluat, & tumorem exciet, Oedema nominatur, de quo jam disseruimus. Aquosa verò, tenuis ac serosa pituita, ubi subcutaneas partes occupat, Ascitem, hydropis speciem, producit. Eadem si in aliquam particulam confluat, aquosum Apostema producit, de quo hoc loco nobis sermo habebitur. Contingit quoque ut pitui-

ta crassa in aliqua parte collecta concresecat, & in lapideam duritiem degeneret; Talem pituitam Paracelsista tartarum vocant, de quo tumore & ejus speciebus paulo post dicturi sumus. Est autem aquosus tumor qui ex tenui & serosa pituita in aliquam corporis partem confluent, sine singulari dolore, & coloris cutis immutatione, excitatur. Colligitur autem ejusmodi aquosa pituita potissimum in pedibus & cruribus, in scroto, articulis, & nonnunquam in capitibus puerorum, qui tumor ὁδρωίφαιδος nominatur, de quo in curatione morborum infantium abunde diximus. Ejusmodi autem aquosus tumor nonnunquam morbus est, quandoque vero Symptoma. Morbus dicitur ubi ex affluxu serosi humoris excitatur; Symptoma est, ubi vel hydropem, vel leucophlegmatiam, aut cachexiam comitatur.

CAVSÆ αἰνυμ. aquosi tumoris sunt frigida intemperies & obstructio Epatis, & Lienis, ac facultatis sanguificatricis in Epate prostratio. αἰνυμ. sunt alimenta impenitus refrigerantia & humectantia, aut venenum frigidum assumptum, continua heluatio, & proluxa pedibus statio, continua vigilia, & quicquid cachexiam excitare potest.

SIGNA aquosi Tumoris per se manifesta sunt; Tumor enim ut plurimum laxior & spongiosior est quàm in Oedemate, doloris omnis expers; atque si tumori ex opposito lumen collocetur, pellucet & transparet. Prognostica hac in tumore aquoso sunt observanda: Vbi tumor aquosus Symptoma est, morbus ejus primum curandus, quo sublato, particularis tumor sponte evanescet. Aquosus tumor, negligentius curatus, in Hydropem degenerare potest. Aquosus tumor ut plurimum admixtum sibi habet flatulentum Spiritum; sed de flatuosis tumoribus paulo post differemus.

CVRATIO aquosi tumoris consistit in serosi humoris in aliquam particulam confluentis evacuatione, fluxionisque inhibitione, & jam collecti in particula tumenti provocatione, & exiccatione; qua per quatuor media.

Aquosus tumor quid? Quaspartes occupet.

Ejus causæ.

signa.

prognostica.

Curatio.

media siue vias perfici possunt. 1. Per victus rationem. 2. per viscerum siue Epatis & Lienis refrigerantium alteracionem, concoctionisque emendationem. 3. per aquosi humoris in corpore redundantis, & per aluum ac per meatus Vrina & per sudorem expulsionem. 4. per aquosi humoris in tumore contenti auxilio topicorum remedium evaporatione, & exiccatione; aut, si id fieri nequeat, aperta cute humoris expressione. **Victus ratio.** Victus ratio debet esse calefaciens & desiccatoria, qualem in curatione Hydropis, & paulo ante in Oedemate praescripsimus, qua omnia huc accommodari possunt. Et vitentur omnia qua refrigerant & humectant; imprimis autem nimia potus ingurgitatio. Frigida intemperies Epatis & Lienis emendetur, & adiuvetur concoctio remediis calefacientibus intra & extra corpus adhibitis. Plurimum autem ad hanc rem faciunt, decocta sfo. Rorisma. Cardui. Bened. Beton. & rad. Fœnic. Petroseli. & sem. Anisi ac carvi, & ex aromatibus Galanga & Cinamo. & similib. confecta & Elect. ex zinzib. condito, Cort. Arant. condit. & spe. Dialacca, Diathamarum & similib. confecta; Nec abs re esset in tali casu 7. gutt. ol. vitr. probe rectificati, cum iiii Vini Cochlear. exhibere; Idem viscera refrigerata calefacit, & per urinam serosos humores egregie propellit. Per aluum aquosus humor è corpore propellatur decocto rad. Iridis nostrat. Centaus. min. Cortic. inter. Sambuci, Herba graciola & fol. sena, quarum rerum decoctum non semel, sed crebro ter quaterque per septimanam usurpetur. Ex compositis idem praestant 3 x. Diaphoen. aut Bened. laxati. in aq. sambuci resoluta & jejuno Ventr. exhausta, aut aliis Hydragogis remediis supra in curatione Hydropis descriptis. Per urinam verò aquosos humores è corpore propellit 3 j. aq. j unip. chimica arte destill. aut gutt. 8. Ol. vitr. cum vini cochleari mane ac vespere assumpta. Per sudorem aquosus humor potenter propellitur; assumpta 3 j. pul. rad. Petisitidis cum vino exhausta, aut Ther. Andro. 3 s. cum haustu. aq. scord. assumpta, & in

Medicamentaria:

Purgantia:

Diuretica:

Topica exiccantia, & diuergentia.

balneo vaporario ab ambiente calore sudorem eliciendo. Serosus porro humor in tumore contentus exiccantibus & resolventibus iopicis remediis tumori applicatis provocari & exiccari debet, qualia sunt hac sequentia: R. Acetum Rosa. Ol. Rosa. & salu. ana. qua inter se mixta instar Epithe. duplicatis linteolis excepta, applicentur, aut alligetur tumori aquoso spongia nova probe elota, & acri lixivio ex cinere lignorum quercuum confecto, cui nonnihil salis, nitri, sulph. & alum. sit admixtum, imbuta; aut imponatur sequens Catapl. R. pul. se. sinapis se. urtica, sulph. spuma maris, Aristol. rot. ana 3 j. concoquantur in aceto rosa. ad pulvis formam, cui tandem admisc. Bdellii Gum. Anima in aceto rosa. soluti an 3 vj. Ol. Chamamel. 3 s. fiat Catapl. His si tumor aquosus discuti exiccarique nequeat, consultum erit ut tumor ipse in declivore sui parte, candenti auro inuratur, aut scalpello aperiat, & aquosa colluvies ex tumore sensim detrahatur, exprimaturque, & ulcus probe abstersum, & ab humiditate exiccatum, aliorum ulcerum modo convenientibus remediis, qualia in ulcerum curatione praescripturi sumus, conglutinatur, & ad cicatricem deducatur.

Ex concreta in aliqua corporis parte pituitosa colluvie, quæ tumorum species progenerantur?

Ex lenta crassaque & mucosa pituita, Tumores ex crassa pituita. inter carnem & cutem collecta & indurata, pro natura & varietate concreti humoris, plures species Tumorum excitantur, mole nunc exigua, nunc magna, nunc mediocri, quas omnes Chirurghi pituitosas excrecentias vocant, Germanis gewechse / quarum species precipue sunt Græcis χροάδες, Latinis strumæ, eīne wehne / & γάγγλια, Glandula à figura glandium, vel scrophula, qua potissimum sucs afficiuntur; & si sub collo excitentur, βρογχήλη, Hernia gutturis. eīu Kropf dicitur; quarum curationem nos, cum ab iisdem causis excitentur, ad curationem strumæ referre volumus. Qui enim unam earum speciem curare novit, is & alias facile curabit.

Strumæ

Strumæ quid, quæ earum causæ, signa, & quomodo curandæ?

De strum-
mis quid
sint.

Κοιγές, ἢ Ἰν Θήνη / sunt pituitosa ex-
crecentia & tumores, qui ut plurimum in
emundtoris, videlicet, sub collo, alis &
inguinibus excitantur, & procreantur, quam-
quam sæpè & in cervice & humero, ac ge-
nu aliisque carnosiss partibus exoriri con-
spiciantur. quarum minores, ut jam diximus,
aut scrophulæ, aut glandulæ nominantur:
maiores autem, strumæ, & sub collo exci-
tata, *Πορκαλῶν* i. e. hernia gutturis dicitur:
ex his pituitosis excrementis quadam sunt
molliores, & à loco mobiles, duriores: &
quadam in lapideam duritiem concreta, ad
Luna motum crescunt & decrescunt.

estrum
Causæ.
Signa.

CAUSÆ *ἡ ἀρχὴ*. strumarum, cum
majorum, tum minorum, sunt violenta pla-
ga, casus, percussiones, compressionesque
praesertim partium adanofarum, vita in-
temperies; excitantur quoque struma à pro-
prietate quarundam aquarum. Est enim
in Styria inter Alpes regiuncula, quæ à
fluvio nomen habet *Πύθισον* / per quam
iter sit ex Austria Venetias, ex quo fluvio si
quis biberit, aut edulia in ejus aq. concocta
comederit, *Πεγερκαλῶν* statim afficitur, *ἢ Ἰν*
Κροπφ. Ideo omnes incola istius regionis sub
guttire strumas ingentes pondere trium qua-
tuorve librarum gestant, & omnes rauci sunt;
& grandes habere strumas laudi sibi du-
cunt, quanquam peregrini eam peragrantes
sine strumis, eos per ludibrium *Βανσέλσε*
vocitent. Non tantum autem hominibus,
sed & pecudibus ea aqua strumas excitat;
& quod majus est, si baculus corylaceus
in fluvium conjiciatur, per paucos dies in
strumas extumescit. *ἡ ἀρχὴ*. sunt crassa
& lenta pituita ex capite in adanofas mem-
branosasque subcutaneas partes defluens; cui
nonnunquam terrestris & crassa melancholia
admiscetur, & scyrrhosas strumas excitat.

Signa.

SIGNA strumarum cum majorum
tum minorum h. e. glandularum & scrophu-
larum, evidentia sunt; ut plurimum enim
dolore carent, nisi fortè per malam cura-
tionem exacerbata doleant: omnes fere

strumarum species infra cutem peculiari tu-
nica membranea vestita sunt, in quibus ma-
teria contenta multiplex & varia habetur;
in aliis enim melleus liquor, in aliis serum,
in aliis pulvis similis materia, & nonnun-
quam ossa comminuta, in aliis pili convolu-
ti, in aliis arena, in aliis carbones & similes
materia reperiuntur; alia denique molles, &
tractabiles sunt, alia in lapideam duritiem
concreverunt. Prognostica strumarum hac
sunt observanda; recentes & nuper proge-
nita struma, siue sint majores, siue minores, ac
molles, & adhuc mobiles existentes, facilius
resolvi, digeri, discuti & extirpari possunt;
inveterata vero & indurata, difficilime cu-
rantur. Strumarum in collo & cervice
progenitarum curatio, per incisionem peri-
culosa est, propter nervorum, arteriarum, &
venarum nobilissimarum lésiones. Si stru-
mis dolor, & cutis rubedo accedat, suppuratio
& exulceratio succedit, & struma ut
plurimum in Vlcus malignum, fistulam, aut
cancrum transmutatur.

Progn-
ostica.

CURATIO strumarum perfici debet
per quinque vias; Primo per victus rationem.
2. per pituitosi humoris in corpore evacua-
tionem, quæ per alvi expurgationem, per vo-
mitum, per meatus urina & per sudorem
propellitur. 3. per topicorum remedium
digerentium, discutientium, & emollien-
tium applicationem. 4. Per tumoris matu-
rationem & suppurationem 5. per praci-
sionem tumorisque ablationem. Victus ra-
tio debet esse extenuans, exiccans & qui-
dem parcissima, qualem paulo ante in cu-
ratione Oedematis præscripsimus. Pluri-
mum facit ad curandas strumas absten-
tia atque inedia, in potu vinum concedi po-
test; sed nulla potio, ad discutiendas strumas
utilior atque salubrior est quam potus aqua-
rum mineralium, quales sunt quæ in thermis
ex sulph. & Alumi. constant, & quales esse
novimus in Bohemia Carolinas thermas, cu-
jus solius potus & foris collutione struma in-
durata sunt discussa. Interim si corpus plu-
rimo redundet sanguine, & vena Epa-
tica dextra sectio non erit negligenda. sectio.

Curatio.

Vi&us
ratio.

AA

Pur-

**Vomi-
tus.** Purgationes & pituitose colluviei evacua-
tiones hac ratione & hisce remediis perficien-
da erunt; Per vomitum bis terve pituita ex-
turbetur, assumpto haustulo vini in quo ma-
cerata per noctem & incocta sunt cort. rad.
Iugl. sine enim difficultate vomitum excitant.
Per alvum fit pituita evacuatio decimo
quarto quolibet die curationis assumpto pul.
Avicennæ, qui sic habet: R turbit. ℥ s. zin-
zib. semin. anis. saccha. candi. ana ℥ j. te-
nuissimè pulverisata commisc. dosis est ℥ j. s.
aut ad summum ℥ ij. aut subducatur pituita
remediis laxantib. in Oedematis curatione
prescriptis. Per vias urinarias pituitam e-
gregiè expurgant, & materiam pituitosam ab-
sumunt gutta 7. Ol. vitri. cum iij. vini co-
chlea. exhibita. Per poros autem cutis cum
halitu & sudore propellunt strumarum ma-
terias resolvendo, digerendo, extenuando
potiones preparata ex nobiliss. rad. China-
rum & Sarmen. Indici, si per mensem de-
cocto earum singulis dieb. utatur, & ad su-
dorem se disponat, quarum decoquendi ra-
tione utendique modum nos supra in cura-
tione morbi Gallici luculenter docuimus.
Præstat interdum in discutiendis per sudorem
strumis assumere ℥ j. s. Ther. Andr. cum
haust. vini generosi, & sudorem procurare.
Tertio præmissis hisce scopis, tandem ad to-
pica remedia statim in initio strumarum
accedendum erit, quæ talia esse debent, ut
strumarum materiam emollire, digerere, &
discutere, vel quæ maturare, & ad suppu-
rationem producere possint. Minoribus ita-
que strumis imponatur Bdellium molle in-
star Empl. & ubi nonnihil molliores reddun-
tur struma, digitis comprehensa violenter con-
terantur, ita ut membrana vel capsula earum
disrumpatur. Deinde sequenti Linimento quo-
tidie inungatur: R plumbiusti ℥ s. Fulgi.
ex incensis sambuci lignis collecta ℥ ij. Aceti
rosa. parum hac simul conterantur in plumbeo
mortario, fiat Linimentum. Post inunctionem
plumbeus orbiculus satis crassus pro magni-
tudine tumoris adaptatus, imponatur, fa-
scisque artificiose alligetur. Aut imponatur
sequens Catapl. R Aloes, Acatia, Myrrha,

Thuris, sarcocolla, ana ℥ ij. quæ tenuiss. pul-
verisata cum ovi albumine in plumbeo mor-
tariolo diutissimè conterantur, addito momen-
to acetirosa. & in pulvis aut unguenti for-
mam redacta, stupisque mundissimis aut li-
niciniis sive ramentis abrasorum Linteolorum
excepta, tumori sive struma imponantur. Aut
R Salis, Aluminis saccharini ana p. a. & q. s.
conterantur simul cum albumine Ovi, fiat
puls. & prædicto modo strumæ imponatur.
Grandiores vero strumas simili ratione, dum
adhuc molliores sunt, tractari decet, adhibitis
tamen validius discutientibus remediis, qua-
lia sunt hac sequentia: R Ol. antiqui ℥ iij.
in quo concoquantur ℥ iij. cerusa pulveri-
sata, deinde admisc. Resina picea ℥ iij. ce-
ra ℥ j. ad lentum ignem liquefacta gum-
mi Ammo. & Galbani in aceto lique-
facti Myrrha exactè pulverisata ℥ s. fiat s.
a. Empl. cujus portio per alutam extensa quo-
tidie imponatur. Aut R stercoris bubuli
pulverisati ℥ ij. rad. brassica capitata. rad.
cappa. scylla. ficuum ping. ana ℥ s. fari-
na lupinorum Bdellii ana ℥ iij. confusa co-
quantur in aceto ad crassitiem, quibus ad-
misc. mellis & ol. veteris ana q. s. fiat ca-
ta. Aut R rad. filicis, ebuli, asphodeli, vel
ejus loco lib. alb. ana p. a. confusa coquantur
in vino ad absorptionem vini, ac rursus
contundantur in mortario ad pulvis formam,
quibus admisc. pul. sulph. viri quartam
partem ponderis, totius compositionis fiat
Catapl. Aut R ol. antiqua ℥ vj. picis sicca
ad lentum ignem dissoluta. ℥ iij. Galbani in
aceto resoluti ℥ j. s. Laudani pulverisa-
ti ℥ j. Lithargy. ℥ v. Ærug. pulverisata
℥ j. fiat Empl. s. a. Egregiè quoque discuti-
tæ strumas stercus Caprill. antiquum
cum melle & aceto subactum, & in for-
mam Catapl. redactum. At vero si stru-
ma induruit, ut discuti tollique præscriptis re-
mediis nequeat, tum emollientia remedia ap-
plicanda sunt; qualia sunt Empl. Diachyl. Emol-
magnum aut seq. Catapl. R fari. faba. hordet. Emol-
ana ℥ x. Rad. Althea. Glycyrix. ana ℥ vj. strumas.
picis ℥ iij. cera alba, adipis asnerina ana ℥ iij.
ol. veteris q. s. fiat Catapl. post. qualem-
cumque

purgan-
tia.

Diureti-
ca.

China &
sarsapa-
rilla.

Theria-
ca.

Topica
pro mi-
noribus
strumis.

Chimici
com-
mendant
Empl.
stipti-
cum, cal-
cem un-
gularum
capra-
rum cum
melle.

Aperio
tumoris
freligun-
curatio.

Emol-
magnum
ad duras
strumas.

in verum & spurium, ut ineptam nos consilio rejiciamus.

Scyrrhus quid sit. Scyrrhus quid, quæ ejus causæ, signa, & quomodo curandus?

Oedippos est prædurus tumor doloris expers, non tamen, præsertim in initio, prorsus insensibilis, ex melancholia terrestriori parte in aliquam particulam collecta excitatus.

Ejus
causæ.

CAUSÆ. sunt alimenta crassa, dura & melancholicum succum in corpore generantia: Item ictus aut contactus venenatorum animalium, sanguinem in melancholicum humorem commutantes. *περὶ* sunt redundantia humoris melancholici, & affluxio in aliquam particulam, & lienis Epatisque imbecillitas in expulsiua & segregatrice facultate.

SIGNA scyrrhi sunt excitati tumoris indolentia, sensusque stupidus, & durities cum livido aut fusco colore, in quo ut plurimum & Vena adjacentes crasso sanguine turgent, & livida conspiciuntur.

prognostica.

Prognostica hæc sunt observanda: Scyrrhi ut plurimum in initio exigui fabæ aut pisit magnitudine apparent, qui processu temporis crescunt & majores efficiuntur. Scyrrhus nisi maturè curetur, in cancerosum tumorem degenerat, aut in lapideam duritiem concrevit, nec amplius per medicamentâ resolvî disciturve potest, sed incurabilis permanet.

Curatio.

CURATIO. Scyrrhi per triplicem viam perficienda erit. 1. per victus rationem, 2. per melancholici humoris à corpore expurgationem. 3. per materia melancholica in tumore contenta discussionem & evacuationem. Victus ratio universa sobria & temperata esse debet, ut ad calefactionem & humectationem declinet. Alimenta itaque sint boni succi, & ex quibus sincerus sanguis generatur, inter quæ panis triticeus & Vinum generosum moderate usurpatum, & caro caponum vitulorumque, & vique recentia primas habet. Ex aleribus Spinachia, & Borrago concedi pos-

victus
ratio.

sunt. Condiri quoque alimenta cinamo. & fructibus Capparorum non insalubriter possunt. Contra vitanda sunt quæ crassum & melanchol. sanguinem generant, inter quæ carnes & pisces fumo durata, aut sale macerata Brassica, faba & lenties, habentur. Vi-ctus ratione ita constituta corpus univ. Venæ se-à melancholica colluvie evacuetur, ac si Etio.

corpus plenum sit sanguine, primum sectione vena melancholicus sanguis evacuetur: Deinde crassa Melancholia convenientibus decoctis concognatur, & attenuetur. Melancholiam autem concoquentia & ad evacuationem preparantia supra in morborum melancholicorum curatione & tabellis remedium præscripsimus unde huc transferri possunt. Post usum decoctorum ubi nota con-Melan-coctionis ex Urina apparuerint humor melan- cholicus per alvum subducatur, aut extractio Ellebori nigri pondere ʒ s. cum ʒ j. Conf. Melissæ devorato aut ʒ. X Diacathol. aut ʒ. vii confect. Hamech. aut gr. iij. Antimo. rise præp. & ʒ j. Confer. Borag. admixtis & devoratis. Evacuato corpore.

Topica remedia Scyrrhoso tumori imponan-Topica. tur: in quibus tamen applicandis circum-spectum decet esse Chirurgum, ne ab impositis vehementius digerentibus, & exiccantibus remediis materia Scyrrhi tenuior pars exicceetur, & crassior in lapideam duritiem incurabilemque tumorem convertatur, aut nimium emolliendo tumor in cancerum convertatur. Cavenda itaque in scyrrhi curatione remedia impensius exiccantia & calefacientia, sed talia remedia eligenda, quæ moderate per halitum digerant, & simul nonnihil emollientis facultatis habeant. Aut alternatim nunc emollientia, & post rursus digerentia, & tamen moderate omnia, apponantur. Conferunt itaque & sine noxa imponi possunt hæc sequentia remedia. R. Cort. rad. Althea minutissime contusa & cum q. s. ping. Anserina subigantur & in formam Catapl. redigantur. Aut R. Gummatum Bdellii, Ammo. Galbani ana p. 2. Conterantur in calido mortario cui admisc. Ol. Samabucini q. s. & Mucag. etc. se-
lin.

Curatio
scyrri
per sup-
purantia.

lini Foenugraci & scub. contusis & simul maderatis confecta ad pondus descriptorum gummatum contundantur, & redigantur in pulvis formam, fiat Catapl. post praescripta remedia, si Scyrhus in suppurationem terminari animadvertatur, sedulo est cavendum, ne amplius calefacientia remedia eidem imponantur, aut etiam sectione per ferrum irritetur, & scyrhus in Cancrosum tumorem convertatur: Sed ubi tumor sponte sua aperitur, pus ex tumore diligenter abstergatur, & solo Empl. Diachylo pus elicitur & persanetur. At vero si scyrhus in lapideam duritiem jam degeneravit, iisdem remediis procedendum erit, quae à nobis in curatione phlegmones, quae per imprudentiam Chirurghi ex frigidorum applicatione in duritiem conversa est, dicta sunt, nimirum quae simul moderate emolliant & digerant, quae inde huc accommodari & transponi possunt. Quamquam scyrhus in lapideam duritiem conversus, omnique sensu privatus, curationem aut nunquam aut rarissime recipiat. Emollientibus tamen & leviter humectantibus, digerentibusque curatio tentari potest. Emolliunt autem & simul digerunt medulla cervina & vitulina, serum hircinum, pinguedo anserina, & ex gummatibus, Galbanum, ut Ammoniaccum, & radix Alob. ex quibus Empl. & Catapl. addito Ol. irino & pauvillo aceti confici possunt. unice autem commendatur ad duritiem scyrthorum, frequentissime tumorem fovere & imbuiere vapore aceti acerr. in candentem lapidem molare infusi.

De Cancro. Cancr vel Cancrofus Tumor quid, quae ejus causae, signa, & quae ratione curandus?

Cancr vocabulum dupliciter accipitur. Cancr mus. Est autem cancrofus tumor virulentus, rotunda, inaequalis, & semper dolens intumescencia, quae ex se tanquam animal cancer pedes, ita venas livido sanguine tur-

gentes in adjacentes partes projicit & extendit. Excitatur autem talis tumor nonnunquam in subcutaneis extraneisque partibus frequentissime in mammis mulierum, quandoque verò in abditiis & occultis corporis partibus ut in palato, ano, & osculo pudendi muliebris, & circa obscena loca. Nomen huic malo inditum est à Cancro aquatico, quia instar pedum cancrosum venas atra bile turgidas, extensas habet, & quia cancrosum fluoriatilium colore imbutus est.

CAUSAE & signa. sunt omnes res quae in corpore atram bilem generare possunt, & virulenti contactus. sunt atra bilis, maligna, fecique vini similis in aliquam particulam defluens; & mensium in mulieribus diutina retentio, & consuetarum hamorrhoidum suppressio.

SIGNA Canceri tumoris, si non in oculis partibus delitescat, manifesta sunt; tumoris nimirum durities, rotunditas & inaequalitas, colorisque ejus lividitas, aut fuscedo, & circa tumorem assidui punctivi dolores, vena in circuitu tumoris turgida ad adjacentes partes protensa. Praelagia de Cancro hac sunt: Omnis cancrofus tumor gravis & perniciosus est morbus, qui in initio ut plurimum aded est exilis; ut vix pisi aut faba magnitudinem aequet; ideoque saepe negligitur, subitò increfcit, & in magnam molem attollitur, & vix unquam propter humoris in eo contenti & imbibiti crassitiem, venenatamque qualitatem concrefcit; nec enim repulsivus, nec digerentibus remediis cedit; tantaque est ejus malitia, ut admota ei leniora remedia prorsus contemnat, validioribus autem magis irruetur, & exacerbetur. Cancer itaque in partibus excitatus nihil aliud est quam particularis Elephantiasis. Cancer confirmatus & inveteratus nunquam admittit curationem, nisi miserabilem & crudelem radicitus evulsione, & una cum venis adjacentibus, & toto sanguine in parte contento, extirpationem; una siquidem guttula sanguinis relicta in parte, novum Cancrum in particula excitat.

CURATIO. In recenter progenito Cancro eadem methodo procedi debet, quam

in curatione Scyrrhi præscripsimus: 1. vitæ ratione, ad humectationem & refrigerationem declinante; in cibis itaque conveniunt Pisana hordei, Pisces squammosi, Ova forbilia, ex eisque juscula parata.

2. Per vena sectionem, præsertim si patientis natura sit sanguinea. 3. Per humoris Melancholici crebram & sensim cum convenientibus remediis concoctionem, & evacuationem; qualia remedia in curatione & remedium tabellis præscripsimus, inter qua laudatissima sunt Epithymus, Fumaria, fol. senæ, & Ellebo. niger, in sero lactis concocta; validissime autem Melancholicum humorem expurgat, extractum Ellebo. nig. pond. ꝯ. S. cum Conser. Melis. exhibitum. Plurimum quoque confert venenati

Vacuatio. Menfes & hæmorrhoides.

Topica ad Cancrum.

& Melancholici sanguinis per apertionem venarum, Hæmorrhoidum aut hyrudinum applicatione. Et si patiens sit mulier, & menses habeat retentos, per incisionem venarum talarium subtractione. 4. Venenata atra bilis in tumore collecta & impacta, aut repellentibus, aut digerentibus medicamentis impositis, qualia in superioribus præscripsimus, retundatur aut digeratur. Hac omnia in principio tumoris tentari debent. Medicamenta verò qua Cancro imponuntur, debent esse temperata, & minime acra, aut validius discutientia, aut materiam incassantia; his itaque sequentibus commodissime uti possumus, videlicet suc. solatri instar Epithematis imposito, aut seq. Empl.

Chimici commendant sperniolæ compositionem, bals. Antimo. Aurum diaphoreticum, Magisterium testarum canceri.

Efficacius fiet illud ipsum unguentum, si pul. Lithargyrii & Cerussa lota ana ꝯ s. admisc. Aut ꝯ cineris cancerorum flu. Lap. calami. ana ꝯ s. tenuiss. pulverisata cum

suc. solani in plumbeo mortariolo diu agitata, in unguenti formam redigantur, cancroloque tumori imponantur. Porro ubi cancer jam in majorem molem excrevit, & inveteratus est, præstabit Chirurgum ab ejus curatione penitus abstinere, quod nimirum, ut antea diximus, inveteratus cancer incurabilis sit, & remedia mitiora contemnat; validioribus autem exasperetur. Si verò Chirurgus urgeatur, necesse est eum ad crudele genus curationum, h. e. incisionem ustionemque accedere; debet autem dare operam, ut cancer radicitus una cum venis adjacentibus evellatur, & omnis impurus sanguis ex affecta parte diligenter exprimatur; ex una enim infecti guttula sanguinis, etiamsi tumor persanetur, novus cancer succrescere potest, novumque vita periculum inferre. Idèò consultius est, præscriptis mitigantibus & blandientibus remediis miseram vitam diu producere, quam carnis curacione, videlicet excisione, agrum in citam mortem conjicere.

Tumor Flatusus quid, quæ ejus causæ, signa, & quomodo curandus?

Απόρρυς πνευματική, Tumor flatuosus, vel inflatio, ein Aufblasung oder windich gewülst: Absolutis nunc 4. generibus tumorum, ex 4. humoribus genitorum, curandum quinto loco se nobis offert ejus species? tumor qui ex halitibus, seu vaporibus, aut flatulentis spiritibus, subcutaneis partibus, aut inter muscutorum membranas collectis excitatur; qua collectio flatuum vaporumque si per totum abdomen, aut inter peritoneum & Intestina sit facta, eam Hydrops speciem qua Tympanites dicitur, procreat. Similiter ubi se tales vapores scroto insinuant, idque in tumorem flatuosum extendunt, inflatio testiculorum nominatur. Si verò in Virga meatibus colliguntur, Priapismum, turpem & crudelem affectionem, progenerant; de quarum affectionum curatione in superioribus abunde à nobis dictum est. Etsi autem talium halitum subjectum sit piuitosus humor,

Inveteratus cancer non curatur, nisi excisione.

De Tumor flatulento quid sit, & quæ ejus species?

mor, tamen differt ab Oedemate, & diversam requirit curationem.

Ejus
causæ.

CAUSÆ tumorum flatulentiorum & exal. sunt vitii ratio flatus generans, & meatus obstruens, nonnunquam & venenatus contactus. ægonyæ. sive interna præcipua causa sunt hæ tres; redundantiæ materiæ humida, caloris nativi imbecillitas, & pororum meatuumque in corpore obstructio. Calor enim nativus imbecillior in pituitosam materiam agit & vapores crassos excitat, unde flatus generari necesse est. Præterea nec concoctionem perficere, nec vapores resolvere, & per halitum discutere potest. Quemadmodum enim mediæ constitutio aeris, quæ neque extensè calida neque frigida est, in aëre nebulas generat & ventos; ita calor, ubi in corpore imbecillior est, crassos vapores flatusque generat, quos neque discutere per poros, nec resolvere potest.

Signa.

SIGNA inflationis sive flatuosi tumoris sunt; Tumor in aliqua parte sine ulla cutis mutatione ad tactum renitens, & si digitis comprimatur, non relinquit vestigium, quemadmodum tumor Oedematosus. Præterea splendere ac pellucere videtur, si ex opposito tumoris lumen collocetur.

prognostica.

Prognosticum de flatuoso spiritu illud est observandum, ubi corpus flatuosum aut vaporosis spiritibus redundat, & non tempestive carminantibus remediis, h. e. quæ discutunt flatum, discutitur, aut flatuosum tumorem excitat, aut huc atque illuc per corpus discurrens dolores tensionis gignit, quos nostri den gicht vocant; Si præterea vapores venenati aliqua qualitate sunt imbuti, & deferantur ad principes partes, anxietatem & alia plurimā incommoda corpori inferunt. Accidit nonnunquam ut ejusmodi flatulenti spiritus inter juncturas sive articulos corporis se insinuent, qui acerbissimos excitant dolores, & articulos ab invicem dirvellunt nervosque resolvunt.

Curatio.

CURATIO inflationis sive tumoris sufflati per quatuor ut plurimum scopos perficitur. 1. Per caloris nativi corroboratio-

nem 2. per materiæ pituitosæ, ex qua exhalationes excitantur, extenuationem & evacuationem. 3. per pororum meatuumque in corpore & cute dilatationem, ac. 4. per vaporum in aliqua parte collectorum dissipationem; quibus adjici potest per Symptomatum correctionem; quæ Chirurgicæ actiones perfici commodè possunt, vitii convenienti ratione, remedium calefacientium, extenuantium, discutientiumque, tum intra corpus exhibitione, tum foris applicatione.

Ad vivendi rationem quod attinet, vitii ratio. tabit ager sæculo tum in cibo tum in potu omnia quæ crassos, viscidos, pituitosos & flatuosos in corpore generare possunt humores. Sunt autem talia ut plurimum omnia dulcia, præsertim fructus, legumina, rapa, pisa & similia, & quicquid melle conditum est; proderit itaque his contrariis uti, ut aromaticis & flatum discutientibus. Vile itaque erit & panem & alia alimenta condire Cinamomo, Cimino, pipere, sem. Carui, Saturejæ, Majoranæ & Croco; & inter edulia magis conveniunt assa quam elixa. Potus debet esse vinum generosum; Vinum aromaticum cum Saccharo & Vinum Gracum, Corroboratione uti oportet. Præterea calor nativus remediis corroborantibus ad probam concoctionem perficiendam excitari debet; & hujusmodi remedia duabus tribusve horis ante prandium & coenam, & tribus horis à coena assumi debent. Ejus generis sunt; Rotula Diacimini, Diacalamintha, Dyanthi & Aromat. rosati. Præstantissimum quoque est pro rotulis, sequentis Trageæ sive pulmensuræ unius Cochleæ cum vino prædictis temporibus assumere. R. Se. Anisi, Fœniculi, Carui, Cimini præp. Ligustici ana ʒij. Rad. Dauci Creti. Pimpinellæ ana ʒj. Bacc. Lauri ʒj. s. Garioph. Cubebæ ana ʒij. Pulverisata omnia commisc. fiat Tragea. In eundem usum quoque exhiberi possunt prædictis temporibus Ol. Anisi, vel cumin. gutt. iij. cum vini generosi ʒij. Plurimum

rimum quoque crassos halitus extenuat, si per osiduum ʒj. s. Ther. Andro. exhibeatur.

Topica
pro ven-
triculo.

Inter curandum, Ventriculi quoque habenda est ratio, & adjuvanda concoctio; id quod perficitur si Ventr. mane ac Vespere inungatur Ol. Nardi. aut Ol. d. Mentha aut Ruta. aut per se aut simul mixtis. Empl. quoque stomachicum; cujus descriptio in antidotariis libris extat, post inunctionem supra Ventr. gestari potest.

Præpa-
rantia
pituitam
& pur-
gantia.

Post ordinatam victus rationem, quoniam, ut dictum est, pituitosa colluvies subiectum est vaporum halituumque; ea itaque primum per quatrimum remediis concoquentibus & evacuantibus ad evacuationem præparetur, ac tandem phlegmagogis remediis expurgetur. Remediorum verò tum concoquentium tum evacuantium formulas paulo ante in curatione Oedematis, & ex tabellis remediorum pituitam purgantium, supra proposuimus; perpurcato corpore Topiciis remediis, flatulenti crassique spiritus in tumore collecti, digeri ac resolvi debent.

Chimicis
frequens
est ol. Ca-
momill.
sapphyri-
rium,
Ol. Anif.
bac. laur.
Ovorum,
cera.

Inter ea laudatur à Galeno acre lixivium nova Spongia exceptum & tumori subinde impostum; Ego verò lixivio præfero Vinum tepidum, in cuius lb. i. commixta sunt ʒ ij. Ol. vitr. linteolis duplicatis exceptum, si tumori imponatur. Aut Oesypum humidum instar Catapl. applicatum. Vel si tumori non sit adjuncta caliditas insignis inungatur tumor sequenti Linimento; R. Ol. Anethi. Ruta, Lill. alb. ana ʒ s. Ol. Laurini ʒ ij. Cera alba q. s. fiat Linimentum. Post Tumoris inunctionem sequens Epithe. aut spongia, aut duplicatis linteolis exceptum tumori utilissime applicari potest:

R. Flo. Chamom. Melilo. Anethi ana M. i. se Fœniculi, Anisi ana ʒ s. Cimini, Bac. Lauri ana ʒ ij. Faba. contusar. ʒ j. Milii ʒ j. s. Concoquantur aut in vino aut in acri lixivio ad tertias; Colentur, fiat Epithema. Vbi verò flatulentus tumor in articulis sive juncturis hæreat, sequentia Catapl. utilissime imponi possunt: R. Medulla panis furfuracei. lb. s. qua in præscripto Epi-

the. sive decocto maceretur & exprimatur, atque in mortario contundatur, atque subigatur cum farina fabar, & Orobi ana ʒ j. pul. Chama. Melilo. Fursu. filiginei ana ʒ j. s. que simul commista, irrorentur præscripto Epithe. cujus admisc. Ol. Chama. Ol. lill. alb. ana ʒ ij. fiat Catapl. quod subinde moderatè calidum applicetur. aut R. Stercor. Capril. pul. ʒ iiij. fl. Chama. Melilo. Anethi ana ʒ j. s. Fursu. filigi. farin. faba. lentium. Orobi ana ʒ j. commixta omnia coquantur in vino ad pulvis formam, quibus admisc. Ol. Chama. Anethi. ana ʒ ij. fiat Catapl. Porro si crassior sit flatuosa materia in tumore, quam ut remediis elici, aut dissipari queat, & ab impostis præscriptis remediis maturationis signum appareat, tumor scapello incidatur, aut acu perforetur, omnisque materia flatuosa ac vaporosa evacuetur, ulcusque ipsum aliorum ulcerum modo rursus perfundatur, ut in sequentibus docebitur. Habenda autem est in flatuosis tumoribus ratio symptomatum, doloris videlicet & inflammationis, qua ante omnia mitiganda & extinguenda erunt; alioquin plurimum impeditur curatio. Et inflammationem quidem extinguunt, si præscriptis Catapl. pro oleis commemoratis admisc. Ol. Rosa. Viola. & Nymph. dolorem verò mitigat Catapl. ex pul. rad. Althe. se. Lini & fœnugraci atque far. fab. in pulvis formam cocta, & in Ol. Chama. q. s. temperatum.

Tumores venenati qui, quæ eorum causæ, signa, & quomodo curandi?

Sextum tumoris genus est, quod ex causis venenatis excitatur; cujus species sunt Bubones pestilentes, Anthraces sive Carbunculi pestilentes, & quacunque ex ictu, morsu contactuque venenatorum animalium venenatarumque rerum per imprudentiam assumptarum excitantur. Verum cum nos de pestilentibus bubonibus & carbunculis eorumque curandi ratione in nostro tractatu de Peste, de aliis verò venenatis tumoribus in tractatione nostra de rebus venena-

Tumoris
incisio.

Sympto-
matum
cura.

Dolor &
inflam-
matio.

De tumo-
ribus ve-
nenatis.

tis abunde differuerimus, supervacaneum esse judicamus, eadem hic rursus repetere; ideoque ex superioribus petant Studiosi.

Quarum partium corporis tumores sint curatu difficiliores, periculosiores, & quæ peculiaria remedia iisdem sint abhibenda?

De partium tum moribus. Doctus atque peritus Chirurgus, qui tumorum genera & causas ex propriis signis cognitas habet, facile poterit omnes tumores singularum partium per præscripta remedia feliciter curare; negari tamen minime potest aliarum partium tumores aliis esse perniciosiores, & curatu difficiliores; ideoque peculiaria requirere remedia. Ejus autem generis tumores sunt aurium, narium, faucium, mammarum, ani, testiculorum, pudendi virilis, ostiique matricis. In harum itaque partium tumoribus præter observationem, ad quod genus tumoris quilibet referatur, & quæ sit cujusque causa, signa, & curandi ratio, peculiaria quoque remedia requiruntur, quæ hoc loco brevissimè subjungam.

Tumori Aurium quæ topica remedia sunt adhibenda?

De parotide. Παρῶν, tumor est ponè aures in glandibus aurium excitatus, eim geswulst hinter den Ohren, cui ut plurimum adjuncta est inflammatio, & acerbus dolor; curationem Parotidos methodicam, supra in affectionibus aurium proposuimus; hoc loco satis erit Topica tantum pauca adjecisse. Initio itaque Symptomata, dolor & inflammatio mitiganda sunt, superius recitatis remediis; deinde hac sequentia commodissimè tumori imponuntur. R. pul. Rad. Alb. ʒ. iiij. fl. Chama. Melilo. fœnugraci. ana ʒ. ij. Concoquantur simul in q. s. aq. ad medias; In ejus decocti portione maceretur medulla palmi siligi. lb. s. Reliqua vero in pulvis formam concoquantur, ac simul cum pane macerato contundantur, per cribrumque trahantur. Huic pul. admisc. far. hordea. faba. ana ʒ. j. croci ʒ. j. vitello. ovo. No. ij, Ol. Chama. Anethi. aut si adsit præternaturalis calor in tumore, Ol. Rosa. & Viola. ana ʒ. ij.

fiat Catapl. Aut R. Rad. lil. alb. Rad. Alb. recen. ana ʒ. iiij. cum q. s. aq. concisa ad mollitiem concoquantur, & per cribrum percernantur, cui pulpa admisc. fari. fœnugraci, se. Lini ana ʒ. j. Ping. porcina ʒ. iiij. vitell. ovorum No. ij. subacta redigantur in Catapl. formam. sine tamen igne, & tumori imponantur, quem maturat, & ad suppurationem deducit. Aperto tandem tumore purificetur, & aliorum ulcerum more ad cicatricem deducatur.

Tumori Narium quæ Topica remedia conferunt?

Πόλυπος, est carnosus in naribus excrecentia, respirationem interceptans, & suffocationem inter dormiendum minitans, ein Gewächs in dem nüstern. Polypi curationem supra inter affectiones narium proposuimus; hoc loco satis erit pauca tantum topica auxilia demonstrasse. duplex est autem Polypus, sive tumor in naribus. Cancrosum & simplex. Cancroso Polypop præstat manum non admove, sed blandientibus tantum remediis miseram vitam prorogare. Blandientia verò remedia sunt, serum lactis Caprini, in quo lentes & se. plantag. & Bac. solatri sunt incocta, quo creberrimè ablundus est polypus. Deinde post lotionem sequenti Linimento obliniatur. R. Ol. è vitellis ovorum ʒ. s. suc. plantag. solatri. ana ʒ. iiij. pul. Lythargy. ʒ. j. quæ simul in plumbeo mortariolo per horas tres cum pistillo plumbeo subigantur, donec crassitiem Linimenti acquirant. Vel R. Ol. Ros. ʒ. j. s. suc. solatri ʒ. j. Ebulliant leniter ad succi evaporationem, deinde addatur parum cera alba, fiat Linimentum, quod eluatur ter cum aq. Rosa. deindeque admisc. tenuiss. pul. Lithargy. ʒ. s. Tutia præp. ʒ. iiij. cerusa abluta ʒ. s. Camphora dissoluta ʒ. j. quæ omnia simul mixta in plumbeo mortariolo diu multumque terantur donec nigrescant. Recens vero Polypus, album adhuc aut rubrum retinens colorem, & ruius radix, tenuis adhuc existat, è naribus propendat, auferendus est vel per præcisionem apertis pinnis narium, in ea parte cui inhaeret polypus:

Bb

Vel

Da polypoi.
Quid sit.
Polypus duplex.
Curatio.
Topica pro cancroso polypo.
Chimici commendant trochisc. Paracel. ex calc. vivæ & arseni. citrin. ag. arseni. & Nitri destillat.

Curatio polypi simplicis.
Chimici hic in usu est Magister. Nafsturt. Unguent. Saturni.

cam-
phorat.
Mercur.
Præcipi-
tat. Mer-
cur. vitæ.
Arca-
num Co-
ralli-
num.

Vel valida subligatione filo serico, in quibus curationibus observari ubique debet methodus curandorum vulnerum. Potest quoque eradicari, sed non sine periculo cum causticis remediis, argenteo canali pro narium capacitae & figura polypi adaptato impositis. Cavendum est autem in ejusmodi curatione, ne meatus cerebri, & nervi optici, per respirationem, virulentiam causticorum in se recipiant: qua autem caustica remedia sunt adhibenda, supra in tabellis nostris remedia. Chirur. qua superfluum carnem erodunt, & absumunt, enumeravimus.

Faucium tumori quæ topica remedia conferunt?

De Angina.
Quid sit.

Κνάρη. Angina tumor est in faucibus, & deglutitionem & respirationem intercipiens, & intra paucas horas agrum strangulans. Peracuta est & perniciose affectio tumor faucium, præsertim si tumoris vestigium foris in collo nullum appareat, sed tota materia intro ad fauces confluat. Angina methodicam curationem supra inter affectiones faucium tradidimus, qui locus relegendus erit: nunc satis est pauca topica adjecisse: si igitur Angina adjuncta sit inflammatio, & vehemens dolor, quod ut plurimum accidere consuevit seq. Gargaris. mitigari

Topica
Gargaris-
mata.
Chimici
adhibent
sal pru-
nell. spi-
rit. Nitri
vitrioli,
folutio-
nem Mer-
cur. sub-
limati.
Aq. ai-
rid. ex
Auspig-
mento,
Magister.
Tabaci
cum aq.
Prunell.
spirit. fa-
lis Am-
moniaci.
Remedia

potest: R. Aq. Ros. ℥ iij. vini sive suc. malo. granat. antidotum ℥ vj. Aq. Solani, Plantag. ana ℥ ij. quibus commisc. Cidonia siccata & concisa corticumque granat. Summah, Rosar. rubear. ana ℥ iij. Coquantur simul ad tertias, deinde colentur, colatoque juscule admisc. Diamori ℥ ij. fiat Gargarisma. Quod si talia remedia præsto non sint, gargarizetur tumor, colluaturque subinde tepido lacte Caprillo. Foris porro applicetur collo sequens Catapl. R. Rad. Alib. lb s. Malva, Viola. ana M. j. Marrab. M. s. Rad. lil. alb. ℥ ij. ficuum siccarum, Daſtyl. ana ℥ j. Nidi hirund. contusi No. j. far. se. Lini. fœnugrac. ana ℥ j. Concoquantur in q. s. aq. donec ad pulvis formam redeant, conſtantur diligenter, & per cribrum trajiciantur. Hujus pulpa expressa admisc. Ol. Viola. Ping. Gallina ana ℥ ij. fiat Catapl.

Vbi ager superavit quantum diem, tum salua res est, & vel ferreo, vel argenteo instrumeto intra fauces aperitur tumor, mundificetur & consolidetur. ut in superioribus dictum est.

Mammarum tumoribus quæ Topica conferunt auxilia?

Mamma mulierum, cum sint partes glandulosa atque laxæ Spongiæ instar, humorum colluviem in se recipiunt, unde varii tumores excitantur. Idem fit ubi lac superfluum ab infantibus non esuctum, aut expressum, in mammis concrevit, ex quo Mamma aut totaliter, aut in aliqua sui parte intumescunt; quorum tumorum curatio nisi prudenter tractetur, vel in Cancrum, vel in ulcus immedicabile degenerat. Accidunt ejusmodi tumoribus ut plurimum Symptomata, dolor, inflammatio, & induratio; quæ Symptomata omnium primum sunt mitiganda remediis anodynis refriger. & emoll. quorum formulas paulo ante in tabellis remedia. Chirur. Item in phlegmonis & scyrrhi curatione proposuimus; & cum de tumoribus Mammarum curandis supra inter affectiones Mammarum disseruerimus, hoc loco pro tumoris qualitate, unum & alterum Topicum Curatio.

remedium adjecisse satis erit. Initio itaque si adeſt inflammatio, dolor, aut durities seq. Catapl. mitiganda, emollienda, & maturanda erunt. R. furfur. triti. contusi pul. chama. Meliloti, Viola. ana ℥ j. Fari. faba. Topica ℥ ij. Ol. Rosa. Viola. Chama. ana ℥ j. quæ quadam. omnia commixta addita q. s. decocti aut mucag. rad. Alib. concoquantur, & in Catapl. redigantur. Porro si Mamma tumentes immunes sunt ab inflammatione, sequens Catapl. tuto imponi potest: R. far. fœnugrac. se. Lini ana ℥ ij. Rad. Arh. ℥ j. s. Mellis q. s. fiat ad ignem Catapl. At vero si Mammarum tumor ex concreto lacte sit excitatus, Chimicil imponatur sequens catapl. R. pul. sterco. eom- Caprilli ℥ ij. far. faba. Lentium ana ℥ ij. lapidem pul. Melilo. ℥ j. Medulla panis in decocto Medica- Althe. macerata ℥ iij. subigantur, eisdem- mento- que admisc. vitell. ovo. No. iij. Ol. Chama. Crollii, q. s. fiat Catapl. Maturato jam tumore, saccharum Saturni. prudenter

externa.
Tumoris
apertio.

De Mam-
marum
tumori-
bus.
Ex qui-
bus cau-
sis mam-
mæ intum-
escant.
Earum
Sympto-
mata.

De Ani-
mæ
tumori-
bus.
Curatio.
Sympto-
mata.
Curatio.
Sympto-
mata.

Topica
quadam.
Chimicil
eom-
mendant
lapidem
Medica-
mento-
sum
Crollii,
saccharum
Saturni.

prudenter aperiatur, ubi commodissimum esse videbitur, instrumento falcato, ita ut vulnus unguis formam nanciscatur, expreso pure mundificetur; sed cavendum ne citius quam par sit, vulnus consolidetur, donec pus omne expurgatum sit; ne vero cito coalescat vulnus, eidem imponenda est aut rad. Gentia. aut dicta. albi, & expurgato toto pure instar aliorum ulc. remediis carnem generantibus, & cicatricem inducentibus, consolidetur.

Ani Tumoribus quæ topica sunt applicanda?

In plerisque corporibus, potissimum Melancholicis, per venas Mafaraicas confluit crassus sanguis ad anum, ibidemque si natura vena hemorrhoides non aperiantur, lividos excitant tumores, cum inflammatione & acerbis doloribus, ut supra quoque à nobis dictum est. In ejusmodi mali curatione omnium primum cause morbi per vena sectionem & Melancholici humoris evacuationem auferenda sunt. Deinde & ejus Symptomata, dolor videlicet & inflammatio, remediis in superioribus adnotatis mitiganda erunt, ac tum demum ad tumoris maturationem ac suppurationem accedendum. Cavendum tamen ne vehementer repellentibus & refrigerantibus materia per se crassa magis induretur, aut ne nimium emollientibus per se molliores partes putrescant; proinde in initio inungatur locus, seu tumor ani Ol. rosa. & Cama. commixtis, ac tandem imponatur ex ovorum simul & album. & lutei cum a. p. ol. Rosa. simul concussis, Epithem. confectum, cui & Dj. Campho. sit adjectus, duplicatis linteolis exceptum; Mitigato tandem dolore, & sedata inflammatione, sequens Catapl. imponatur. R. fol. Malva. Viola. ana M. ij. Rad. Alb. Ellebo. albi an. ʒ. iv. Contusa coquantur in aq. fluviatili aut fontana, ad mollitiem, deinde conterantur in mortario, eisdemque admisce far. tritici. ʒ. ij. Ol. Viol. Butyri salis expertis an. ʒ. ij. Viell. Ovo. No. ij. fiat Catapl. quod probè maturat, & dolorem mitigat;

Maturatus tandem tumor scalpello incidatur, pus omne exprimatur, & aliorum ulcerum modo, prudenter, ne in fistulam degeneret, ulcus persanetur.

Testiculorum Tumori quæ Topica conferunt remedia.

Tumor testiculorum ut plurimum calorem praternaturalem, vel frigiditatem sibi habet adjunctam, nonnunquam & inductionem; quæ Symptomata primum mitiganda erunt, & juxta eorum constitutionem, tota curatio & Topica remedia applicanda sunt. Methodus autem curandi eorum Symptomatum ex superioribus peti debet, ac imprimis calido testium tumori sequentia remedia commodè applicari possunt. R. Ovo. simul & lutea & albu. quæ cum tantundem Ol. Rosa. conquassentur addito pau. suc. vel. Plantag. vel semperviva, quæ simul commixta & linteolis excepta, instar Epithem. imponantur. Aut sequens Catapl. R. Rosa. rub. flo. Chama. Melilo. Se. Malva. ana M. j. Concisa coquantur in q. s. aq. usque ad medias, deinde ipsa herba & flo. concocta contendantur diligenter, eisdemque admisc. far. faba. ʒ. iij. Ol. Chama. Rosa. Anethi. ana ʒ. j. coquatur simul donec in pulvis formam redeant, & fiat Catapl. Aut R. fol. Hyosch. cum rad. M. ij. Se. Malva. M. j. decoquantur cum q. s. aq. ad mollitiem, deinde conterendo in pulvis formam redigantur, eisdemque admisc. far. hord. faba. an. ʒ. j. Ol. Rosa. Chama. ana ʒ. s. fiat Catapl. quod & inflammationem & dolorem sedat, & duriem emollit. Postea si ad suppurationem tendere videatur, tumori sequens maturativum applicetur: R. Rad. Alb. Lil. alb. an. ʒ. ij. fol. Malva. Viola. ana M. j. Contusa coquantur in q. s. aq. ad mollitiem & in formam pulvis redigantur, quibus admisc. far. hord. se. lini ana ʒ. j. Buty. salis expertis ʒ. ij. Ol. Chama ʒ. j. Viell. Ovo. No. ij. Commisc. subiganturque & fiat Catapl. Tumor maturatus scalpello aperiatur, incidatur, que secundum scroti longitudinem, & ex-

Incisio
tumoris.

De Testi-
culorum
tumore.

Curatio
phlegmo-
nes te-
stium.

Topica
Refrige-
rantia &
anodyna.

Matu-
rantia.

Aperien-
tia.

presso pure mundificetur, aliorumque ulcerum modo persanetur.

Curatio
Oedematis.

Ubi vero tumor testiculorum ex frigida sit causa excitatus, praemissa methodica curatione in Oedematis curatione commemorata, tumidum scrotum, aut Ol. Chamae aut unguento Dialth. ungatur, ac statim

Topica
digerentia.

sequens Catapl. imponatur: R. far. fab. ℥. iij. Medulla panis in vino macerata & expressa ℥. ij. qua simul subacta & confusa cum q. s. liquoris in quo decoct. sunt rad. Alth. Meli. Anethi & Chamae. & sem. Cymini, fiat Catapl. cui admisc. Ol. Chamae. Aneth. ping. anatis an. ℥. j. cimini ℥. ij. & tepida applicetur. Quod si tumor testium resolvi & discuti nequeat, sequens

Maturantia.

maturativum & suppurativum Catapl. imponatur: R. Rad. lil. alb. Rad. Alth. ana ℥. iij. fol. Brassicae rub. Mal. an. M. j. Concissa coquantur in q. s. aq. ad mollitiem, qua excepta minutissime contendantur, eisdemque admisc. far. tritic. foenugrac. lini ana ℥. j. Buty. rec. sine sale ℥. iij. Redigantur ad ignem in Catapl. formam & imponantur. Maturatus tumor aperiatur, purificetur & consolidetur ulcerum aliorum instar. Ubi vero Scrotum, vel ipsi testiculi induruerunt, in scyrrhumque degenerarunt, emollientia & discutientia sunt admovenda, qua supra in Scyrrhi tumoris, & in mammarum duritiei curatione sunt commemorata. Contin- git praeterea ut alterutri testiculorum carno- sa quaedam materia adnascatur, indeque Scrotum intumescat, quam affectionem Graci σαρκοκήλην, i. e. carnosam Herniam

Curatio
Scyrrhi.
DeRami-
ce ejus-
que spe-
ciebus.
Sarcocele.
Hydroce-
le.
Epiplo-
cele, &
Entero-
cele.

sive Ramicem dicunt; contingit quoque ut infarciatur, & tum Gracis ὄδρακήλη, h. e. aquosa seu flatuosa hernia nominatur. Con- tingit denique ut ex perrupto aut laxato peri- tonao particula vel omenti, vel intestini, in scrotum delabatur, qua affectio Gracis ἐντεροκήλη, i. e. Hernia omenti & ἐντεροκήλη, intestinalis hernia, nominatur; qua hisce signis internoscenda sunt: Sarcocele &

plotele, resupinato corpore digitis leniter com- primendo, rursus intra Peritoneum reponi possunt; quarum affectionum omnium metho- dicam curationem in superioribus tradidi- mus; hoc loco satis erit singulis hernia specie- bus unum aut aliud topicum remedium pra- scripsisse.

TUMOR testium, quem carnosam herniam vocant, nullis ut puto remediis, sed sola illa crudeli per incisionem & testis af- fecti praecisionem, non tamen sine vita dis- crimine persanari potest. Inciso vero scroti vel capsula testium fieri debet novacula usque ad testis, cui adnata est caro, substantiam, quo facto si nondum est corrupta testiculi sub- stantia, ex scroto protrahatur, & caro ad- nata, vel digitis vel alio instrumento quam potest lenissime avellatur, carneque ablata testiculus iterum in proprium locum repona- tur, atque scroti vulnus consueatur, aliorum- que vulnere modo, quorum curationem paulo infra in tertia sectione morborum Chi- rurgicorum tractaturi sumus, consolidetur.

At si corruptus & putrefactus sit testicu- lus, praestat ipsum omnino praecidere; Pra- ciso autem ejusmodi erit; primum arctiori vinculo radix testium constringatur, & forcipe amputetur, & radices pars supra vin- culum auro candenti, aut ferro inuratur, ac demum aliorum ulcerum modo persanetur. In hujusmodi autem secura curatione, ut in alia ulla, opus erit Chirurgus singulari pru- dentia & dexteritate, prius praemonitis dili- genter amicis agri, de discrimine vita.

Hydroce-
les cura-
tio.

Hydrocele vero sive aquosa collectio in scroto Hydropis curationem desiderat. Inter Topica autem hoc sequens Catapl. utilissime imponi potest: R. far. lentium fabarum, h. e. Orobi ana ℥. iij. concoquantur cum vini aut lixivii q. s. ad pulvis formam, fiat Ca- tapl. Hisce remediis si aqua non exsicce- tur, scrotum in latere paulo infra ejus me- dietatem scalpello aperiatur, & aquosa colluvies exprimatur, sed in tali curatio- ne solet in scroto rursus aqua colligi. Id- eo singulis mensibus perforandum scro- tum, & aqua evacuada erit, habita in- te-

Curatio
Σαρκοκή-
λης.
per Chi-
rurgiam.
Com-
mendant
Chimici
Ol. falis,
Tartari,
Bals. sulph.
Empl.
Diaulph.
Ruland.
Testiculi
praecisio
ut mo-
lienda.

rim

Chimici *rim ratione* Epatis, à quo aqua in scrotum adhibent demittitur, ut ejus intemperies corrigatur. Ol. Anif. Vbi verò scrotum intumuerit, à flatuosis bacc. spiritibus, quod ex levitate testiculorum & laur. tumoris renitentia, ac diaphonia, si ex op- Magister. posito lumen opponatur, facile cognosci potest, Tapf. tum methodica curatio Tympanitidis erit in- Barbat.stituenda, & sequentia Topica applicanda:

Curatio
Epiplo-
cel. & En-
terocel.
De Om-
phalo-
cele.

Primum inauguratur Tumor scroti Ol. Chama. Anethi, Ruta simul commixtis. Deinde imponatur sequens Catapl. R. Pul. Cimini 3. j. s. Bac. lauri. 3. vj. far. faba. Orobi, cicerum furfu. triti. probè contriti ana 3. j. commixta vel cum vino vel cum acri lxi- vio decoquantur ad pulvis formam, eisdem- que admisc. Ol. Chama. Anethi ana 3. ij. Cheirini 3. s. fiat Catapl. Aut R. Pul. Ru- ta, Chamom: Melilo. Anethi furfu. triti. ana 3. j. Se. Foenic. Coriand. ana 3. vj. stercoris Caprilli 3. j. s. concoquantur in vi- no ad pulvis formam, quibus admisc. Ol. Unguent. Chama. Aneth. Ruta ana 3. j. Ol. Lauri 3. s. fiat Catapl. Porrò ubi per rupturam aut relaxationem peritonæi, Omenti, vel Inte- stini particula in scrotum est devoluta, hu- jusmodi tumoris curationem in superioribus tradidimus. In curatione Hernia, & paulo infra in postrema sectione morborum Chi- rurg. de rupturis curandis fusius docebimus. Est & Hernia species tumor Vmbilici, & ul- tra modum prominentia, quam Græci ομφα- λοκήλη, i. e. extumescientiam umbilici si- ve Herniam Vmbilicalem nominant, qua ut plurimum excitatur in puerulis quidem à ni- mio ploratu, in adultis à flatuosis spiritibus circa Vmbil. collectis, cujus quoque curatio- nem in superioribus docuimus, unde reme- dia sunt petenda.

Pudendi seu virgæ virilis Tumor
quæ Topica remedia ef-
flagitat?

Intumescit non semel & virga virilis, & quidem aut tota, aut ejus pars: ubi tota intumescit, & extenditur sine Venerea ap- petentia; hanc sædam affectionem & Gra-

ci & Latini Priapismum nominant. Vnicum ea affectione laborantem per totam meam vi- tam vidi, Virum Nobilem, Casparum Mel- lentin, qui cum à quodam sacrificulo, quem Den Paven van der Putten nominant, per impositionem cicuta & Hyosch. curatus fuit, ita tamen tota virga propter frigidita- tem herbarum enervata usque ad mortem permansit, ut nunquam amplius conjuge uti potuerit, & paulo post scyrrhum circa Hypo- chondria contraxit, & ab eodem curatus, miserè est extinctus. Hujus quoque mali cu- rationem methodicam in superioribus tra- didimus: Aut, ut dixi, excitatur tumor in Virga, in aliqua ejus parte, ac præcipuè in glande, aut præputio, atque ut plurimum cum inflammatione, cujus curatio ex Phlegmone curatione sumenda est. Hoc loco satis erit To- pica exquisitiore adnotasse. In initio itaque ovi unius albumen una cum luteo & Ol. Rosa. 3. j. & suc. Plantag. ac Solani ana 3. s. concussum instar Epithem. imponatur; sedato dolore, & mitigata inflammatione, Virga, si ad suppurationem tendere videatur tumor, maturans Catapl. tale imponatur: R. Se. Malva, viola. ana M. ij. concisa con- coquantur ad mollitiem, ac contundantur in pulvis formam, eisque admisc. far. hord. 3. ij. Ol. Viola. Butyr. rec. sine sale ana 3. j. Lutei Ovorum. No. ii. Subigantur; fiat Catapl. Maturato tumore secundum longitud. Virga scalpello incidatur vel novacula pus exima- tur, mundificetur. & aliorum ulcerum modo consolidatur. Si verò Oedematosus erit tumor, ex frigida materia, ejus curationem ex Oedematis curatione petere licebit. Re- liqua ex ulcerationes virgæ, & alia pustula, qua ratione sint curanda, paulo post in proxi- ma sectione explicabimus.

Tumor Vteri quæ topica
requirit?

Plura genera Tumorum excitantur in De Tu- Vtero; quandoque enim tota matrix, & una more cum ipsa totum Abdomen intumescit, Uteri. Multiplici- veluti fit in mola in utero generata, ces Uteri tumores. cujus curationem in superioribus absol- vimus.

Curatio.
Modus
applicandi reme-
dia.

vimus. Aut ubi capacitas uteri, vel aquo-
sa colluvie, vel crassis flatibus referta, di-
stenditur; cuius quoque affectionis curatio-
nem ex Hydropis curatione petere licet: De
hisc tumoribus hic nobis sermo non est. Ex-
citatur præterea nonnunquam & tumor in
uteri Cervice, phlegmonosus, i. e. inflam-
matus tumor ex adfluxu ferventis & putre-
facti sanguinis in substantiam uteri defluens.
Oritur ibidem & scyrrhus ex Melancholico
sanguine excitatus; Phlegmone ex calida
intemperie & dolore acri; scyrrhus autem
ex duritie & subobscuri colore dijudicari po-
test. Variusque autem tumoris, & phleg-
mones & scyrrhi, methodicam curationem
paulo ante proposuimus; ubi & remedia enu-
meravimus convenientia, quæ & in uteri
tumoribus usurpari possunt, nisi quod appli-
candi modus & remedium substantia est
immutanda; Refrigerantia itaque remedia
in phlegmone, & emollientia in scyrrho Ma-
tricis, foris quidem Hypogastrio instar Ca-
tapl. & Emplastri applicanda sunt. Intra
vero uterum in forma liquoris per siphonem,
sive Clysterem infundenda sunt; aut per bal-
nea & infusiones, aut per pessos injicienda
erunt; Inter ea autem quæ inflammationes
uteri restinguunt, duritiemque emolliunt,
& dolores mitigant, prodest si agra in deco-
cto rad. Althe. Herb. Malva, Chama. Me-
liloti Viola, se. Lini & scænuigræ, insideat;
aut subjectum vaporem intra uterum reci-
piat. Tandem plurimum conducit & ad do-
lorem sedandum & inflammationem restin-
guendam, & duritiem emolliendam, sequens
pessus utero inditus; R. Ping. Anatis, Me-
dulle crurum cervi, vel bovis (si cervi ha-
beri nequit) Bdellii liquefacti ana ʒss. Lutei
unius Ovi assati atque probe contriti, Ol.
lil. alb. Lini ana ʒ. vi. Croci ʒ. viij. Ex his
omnibus commixtis simul fiat Linimentum,
quo infarciatur sacculus ex syndone instar
pessi, vel pudendi virilis, & situm appenda-
tur, ut ubi necessitas exigit, protrahi & rur-
sum indi queat. Catapl. vero & Empl. imo
Vetri applicanda, ex Scyrrhi & phlegmones
curatione huc transponi possunt.

Topica.

Potè reliquarum partium tumores qui
non sunt tam difficilis curationis, quàm
prescriptarum, facile ex superioribus tumo-
rum curationibus, remediis ibidem enume-
ratis, à perito Chirurgo feliciter curari pos-
sunt.

Chirurgicarum Curationum, de Ulceribus.

SECTIO II.

Esti vulnerum curandarum doctrina, ut De Ulce-
simplicior, tractationem de Ulceribus or-
ribus.

dine naturæ præcedere debebat; tamen eam
nobis vulnerum curationi præmittere pla-
cuit, eam nimirum ob causam, quod ulce-
ra ut plurimum soboles sint tumorum, quæ
ex iisdem causis intrinsecis generantur. Ut
enim tumores ex collectione humorum, ita
ulcera ex eorundem erosione & malignitate
excitantur: & quanquam utraque affectio,
& vulnus & ulcus, continuitatis in aliqua
parte sit solutio & divisio; differunt tamen,
quod continui solutio in vulnere ab externis
causis casim illatis cum sanguinis eruptione
inferatur; ulcus verò, ut plurimum ab in-
terna causa, erodentibusque humoribus pro-
ducitur; ex quo non sanguis, ut ex vulnere,
sed vel sanies, vel pus, vel putrida collu-
vies emanat. Quanquam ab externis quo-
que causis, ut applicatione causticorum re-
mediorum, aut morsu ictuque virulentor-
um animalium, paulatim ulcera excitari
possunt.

Vulnus
& Ulcus
ur diffi-
ciant.

Vlcus quid, & quæ excrementa ex
ulceribus promanant?

Ελκος, ein Ectericch swehr oder ein alter
schade / est continuitatis divisio in aliqua
mollis & carnosæ parte corporis, in qua ut-
plurimum colligitur, ex eaque profluunt
excrementitii humores, aut saniosi, aut
purulenti, aut putrilaginosi sordities cum
variis affecta partis dispositionibus præter-
naturalibus. Quia verò excrementorum
ulcerum saniei, puris & sordium in tota
tractatione de ulceribus, crebra futura sit
mentio; & ex eorum qualitatibus de sana-
tionis

Excre-
menta
Ulceris
tria.

tionis facilitate, ac difficultate non obscura sumi possunt indicia, signaque prognostica, eorum differentias breviter subijcere placuit.

Sanies.

SANIES, Græcis ἰχθῆρ, Das Elidtwasser; Quamquam autem saniei vocabulum vulgus pro omni impura humiditate ex ulceribus & vulneribus profluente usurpet, propriè tamen & Græcis & Latinis excrementum est tenuis & aquosum, quod ut plurimum ex vulneribus crudis in principio curationis, præsertim si nervi aut ligamenta in vulnere sunt lassa, profluere consuevit; quemadmodum etiam ex plerisque ulceribus imprimis malignis: Colore vel albo aqua, vel fero simili; aut colore rubeo tanquam aqua sanguine paucò diluto, quod ut plurimum acre est & erodens, & cum in Vlcerebus tum in vulneribus dolores acerbos excitat. Illud ipsum excrementum in malignis ulceribus propriè non sanies, sed latè patenti vocabulo virus seu virulentia nominatur, & nisi sanies omnis primum in ulceribus exsicceetur, & absorbeat, impossibile est ulcus aut vulnus ad sanitatem perducì. Sanies itaque per se semper mala est, & quando ab aquea qualitate magis discessit, ut colore livida, odore foetida, & substantia serosa, tanto pejor est.

Pus.

PUS, Πῦς, Etter / est excrementum in Vlcerebus & Vulneribus sanie quidem crassius, sordè vero mollius; Optimum & exoptatissimum pus est in vulnere ac ulcere, Hippocrate testante, & experientia comprobante, quod est albidum aquale, h. e. sibi undique simile, lave & quàm minimè foetidum; tale enim pus ex sanescente jam ulcere vulnereque profluit, & curationis felicem successum promittit. Econtra ab hoc dissidens pus, ut iusto liquidius, feculentum, colore cinericeo, livido, aut nigro, & foetidum, pessimum censetur.

Sordes.

SORDES, πύλινος, ein wöf / fauler ond stinkender etter / est ulcerum vulnerumque excrementum præternaturale, crassum, glutinosum & tenacissimè ulceribus inhaerens, ac plerumque foetidum, aut nigro; aut livido, aut vario colore. Tale excrementum ex malignis putridis difficulterque curationem ad-

mittentibus ulceribus prodit. Horum malorum excrementorum, saniei & sorditiei causæ, sunt pravitas tertia concoctionis, & partium affectarum intemperies. Boni vero excrementi, quale est pus laudabile, causa est bonitas tertia concoctionis, & partis affecta exoptata.

Vlcerum differentia & species, quæ?

Plurima Vlcerum differentia, earumque species à Galeno & aliis Chirurgiæ Professoribus, qui Galeni placita pro euangelio habent, & ab ejus verbis ne latum pili decedere volunt, ad nauseam usque enumerantur. Nos verò brevitati studentes, omnes Vlcerum ^{Ulcus aut simplex,} præcipuas species in tres tantum differentias, cum singularum speciebus redigere conabimur, singulis speciebus brevem definitionem subjicientes. Prima divisione sumpta differentia ab ulcerum Natura; omne ulcus dicimus esse aut simplex aut complicatum. Simplicia ulcera sunt quibus nullus alius morbus, aut causa morbifica, aut aliud Symptoma est adjunctum. Complicata ulcera ^{Aut complicatum:} sunt quibus vel morbus aliquis, vel causa morbifica, vel Symptomata aliqua sunt admixta. Complicatorum ulcerum per subdivisionem species sunt;

Vlcus dyscratum h. e. intemperatum, cui Cum in nimirum aliqua intemperies calida, frig. hum. temperie, vel sicca, vel etiam ex secundis qualitatibus durities aut molliities copulata.

Vlcus Rheumaticum, h. e. fluxioni obnoxium, cui videlicet alicujus vitiosi humoris ^{Cum fluxione,} affluxio, molesta est, & sanationem impedit: Ad hoc genus ulcerum referuntur ulcera saniosa, sive virulenta & sordida.

Vlcus Aposthematosum est cui aliqua ^{Cum tumore;} species tumoris est adjuncta, cujus species sunt ulcus phlegmonosum, Oedematosum, Erysipelatosum & scyrrhosum.

Vlcus putridum est quod cum subjecta ^{Cum putredine,} partis putrefactione ac corruptione est copulatum, & ex quo ut plurimum foetor exhalat. Ejus species sunt Vlcerata Gangranosa, Das Ralte Feuer / seu cædaverosa. In his enim extinguatur calor nativus; item cariosum ulcus,

ulcus, in quo subjectum Os corrumpitur, nigrescit, & in cariem resolvitur, & Vlcus verminosum dictum, quia vermibus scatet.

Cum dolore.

Vlcus dolorificum, sive crucians, Græcis ἔλκος ὀδυνηρόν, cui videlicet copulatus est αἱματός & continuus dolor.

Cum malignitate.

Vlcus malignum, quod κακός h. e. contumax & malignum; Ejus species sunt, ulcus sordidum, & ulcus depascens, quod Græcis ῥῶγν dicitur, quod nimirum non modo subjectam carnem affecta partis, sed & sanas adjacentes partes circumquaque depopulatur. Item ulcus phagedæna Græcis dictum, sive ambulativum, quod serpendo per cutem circumjacentes partes depascitur & erodit: Hoc si ad summam malitiam pervenerit, ulcus χειρόνιον & τελέφιον nominatur; item ulcus virulentum & sordidum. Eorundem malignorum ulcerum species sunt Vlcus cancriforme, quod ex Cancro tumore exulcerato progignitur, & fistula, seu ulcus fistulosum, de quo paulo post.

Differentia ulcerum à figura.

Secunda differentia ulcerum sumitur à figura ulcerum, quorum aliud est sinuosum sive cuniculosum, quod sinus inde in subjectam carnem extendit; Vlcus fistulosum vel fistula, quod unicum habet constrictum & rotundum orificium, instar rimarum fistula, & recta in carnem descendens magis magisque amplior evadit; Item ulcus Cancrosum, quod visu horridum est & foetidum; Labra hujus tumida ac prædura nonnunquam inversa, colore livido, seu instar cancri aquatici fusco, venas lividas venenato sanguine turgidas ex se, in partes adjacentes protendens, instar pedum Cancrorum. Vlcus circulare seu rotundum, quod dysepuloticum est, & difficillime curatur.

Vlcus supercrescens, in quo ferina caro succrescit & luxuriat. Vlcus varicosum est in quo vena quadam sanguine turgentes protuberant, & curationem impediunt.

Ulcera alia curatu facilia, alia difficilia.

Tertia differentia ulcerum sumta à curationis facilitate & difficultate. Vlcera alia sunt curatu facilia, alia difficilia, alia nunquam, aut raro sanabilia.

Vlcera curatu facilia sunt simplicia re-

centia, in superficie hærentia, & qua cum minutissimis symptomatibus sunt complicata, ac in quibus laudabile pus conspicitur.

Curatu difficilia sunt ulcera omnia quæ graviores morbos, aut causas morbificas, aut Symptomata secum habent copulata, ut sunt ulcera cum insigni intemperie, ulcera cum maligno humore affluente, ulcera saniosa sive virulenta, ulcera sordida, ulcera putrida, ulcera cum labiorum duritie: ulcera verminosæ, ulcera cavernosa, ulcera erodentia & cancriformia, & quæcunque ad has species referri possunt, & κακός nominantur.

Nunquam aut raro perfectè sanabilia, sunt fraudulenta & venenata qualitate complicata ulcera, qualia sunt ῥῶγν & φαγεδῆνα, Gangranosa & Cancrofa.

Causæ ulcerum generales quæ?

Causæ Ulcerum generalia. Continentes.

Vlcum in universum duo sunt causarum genera, πρῶτον, unum, & δεύτερον, alterum, les. Tertium enim genus quod συνέχον h. e. causam continentem, vocant, nos consulto præterimus, cum à πρῶτον, non nisi loco & materiei alteratione differat; nisi forsitan quis inter continentes causas recensere velit & Symptomata quæ ulceribus sunt complicata, & sanationem ulcerum impediunt, ut sunt dyscrasia, Os corruptum, Labiorum durities, aut molities in Vlcibus; Caro succrescens, figura ulceris rotunda, & similes.

πρῶτον, ulcerum causa sunt vitiosorum Antecedentes humorum aut copia, aut qualitate erodente & humorem corruptente carnemque exulcerante confusio, & collectio, Tales autem vitiosi humores confluunt in aliquam particulam aut ex universo corpore, aut ex Iecinore lieneque vitiatas. δεύτερον, sunt vulnus perperam curatum, aut tumor, aut pustula in superficie cutis excitata, semper enim ulcus recens præcedit aut vulnus, aut tumor, aut virosa pustula. His adjici possunt vitiosa alimenta, ex quibus humores acres & erodentes generantur; contusio alicujus partis; Causitica remedia, morsusque & contactus venenatorum animalium.

Vlce-

Ulcera signa universalia quæ?

Signa
universalia.

Signa ulcerum manifesta sunt; cutis enim & carnis continui solutio & visu & tactu deprehendi potest, ex quo ut plurimum non sanguis, sed aut sanies, sive *ixor*, aut pus, aut sordes profluunt. Per quæ autem indicia singula species ulcerum dignosci debeant, partim in earum descriptionibus paulo ante ostendimus, partim in earum curationibus commemorabimus. Hoc loco satis erit signa prognostica præcipua observasse.

Quæ prognostica sive Aphorismi iudicatorii in ulcerum curatione sunt observandi?

Prognostica.

Vlcus carne completum citò sanescit; sed si paulo post subito renovetur, ut plurimum in fistulam degenerat.

Vlcera omnia viridi, livido aut nigro colore imbuta duraque labra habentia, mala sunt; calor enim nativi in affecta parte extinctionem significant, corruptionemque minuantur.

Vlcera Frigida, albedine & mollitie dignoscuntur, quæ ut plurimum calidis juvantur; contra,

Calida ulcera ex rubore, loci affecti caliditate agnoscuntur, & frigidis remediis gaudent.

Sicca vero ulcera similiter & humida visu tactuque dijudicari possunt.

Color niger Melancholici humoris, Flavus Citrinus bilis flava, Albus pituita ex lecinore ad ulcus profluentis est indicium.

Vlcera aliis morbis succedenia, vel in ipsis morbis excitata, difficilis sunt curationis.

Vlcus omne, sive in ipsis morbis sit excitatum, sive ante morbum, si in ipso morbo aridum, aut lividum, aut flavum reddatur, in ipso morbo moriturum agrum portendit.

Si in pilosis partibus ulcus excitetur, & pili circum ulcus desuunt, materiam ulceris venenatam esse ostendunt.

Si vero pili novi regenerentur, bonum significat.

In ulcere ubi post saniem aut sordem pus laudabile appareat, bonum; sanationem enim significat.

Vlcera rotunda tardissime ad cicatricem deduci possunt, nisi cauterio, b. e. candenti auro in triquetram aut linearem figuram deducantur.

Extremitatum ulcera, pedum videlicet aut manuum, aut capitis tumorem glandularum concitant. Pedum quidem circa inguina, manuum sub alis, capitis circa collum aut pone aures.

Cum in ulcerum curatione medicamenta applicata conferunt, aut saltem nullam noxam inferunt, indicium est remedium conveniens, & recte applicatum esse.

Vbi vero ulcus ipsum aut humidius, aut siccus, aut calidius, aut frigidius reddiderunt, aut dolorem excitarunt, eadem remedia non esse idonea, nec rite applicata significat, & statim mutanda innuunt.

Curatio ulcerum generalis qua methodo perficienda?

Curatio generalis.

In curatione omnium ulcerum Chirurgus statim in primo intuitu ulceris, tria accurate considerare debet. I. Quale nimirum sit excrementum in ulcere hærens, num sanies, sordes, aut pus. Sanies enim omnis ad sui curationem, exiccationem; sordes absterfionem, pus vero sui remotionem exigit. Quibus vero remediis resiccantibus saniem & absorbentibus utendum sit, partim inter medicamenta Chirurgica, partim sequentibus in ulcerum complicatorum curatione, simul & in vulnorum curationibus aperiemus.

Excrementa ut removenda.

Similiter qua medicamenta sordes abstergant in iisdem locis commemorabimus, ita & pus generantia remedia in superioribus commemorata sunt, cujus remotio non aliud remedium nisi manuum industriam desiderat. II. Studiosè observandum est, utrum ulcus sit simplex, aut cum aliquo Symptomate aliæque affectione complicatum. Simplex siquidem ulcus & ab omni morbo gravioreque Symptomate liberum, facile per sola Topica remedia moderate exiccantia, & carnem

Simplex ulcus curatio.

gene.

generatio cicatricemque inducentia persanari potest. Ejusmodi autem remedia sunt à nobis supra commemorata, & qualia sunt ea quibus hoc tempore tonsores utuntur in curandis vulneribus & ulceribus, ut sunt Empl. Brutenicum, ex oleo lithargyr. & paux.

aruginis confectum, Braunnuch dicitur, vel Empl. ceraneum seu citrinum, ex Ol. cera, & Terebinth. concinnatum, Germanis Geelzuch dicitur, vel Empl. ex Lap. Cala. Ol. & seruo cervino aut caprino coctum, quod in officinis dicitur Emplast. Gryseum, & Germ. grawzuch oder graw plaster. At si ulcus sit complicatum cum aliquo vel morbo vel Symptomate, ut cum acerbo dolore, cum aliqua excellenti intemperie, cum affluxu alicujus vitiosi humoris, cum tumore, cum carnis subiecta contusione, cum carnis in ulcere succrescentia, cum varicibus turgentibus, cum ossis subiecti ulceri corruptione, cum virositate & cum venenata aliqua abdita qualitate, cum corrosione exesioneque affecta partis, aliisque pravis dispositionibus, ibi sanè varianda est curatio, cum impossibile sit ulcus ullum quatenus est simplex, curari posse, nisi prius morbus aut Symptoma ulceri conjunctum removeatur, aut mitigetur saltem. Semper itaque prima curatio in complicatis ulceribus debetur Symptomati aut morbo adiuncto, quo sublato ulcus ipsum non difficulter moderate siccantibus, carnem generantibus & cicatricem inducentibus remediis, ut diximus, persanari potest.

Quibus autem remediis singula enumerata Symptomata ulceribus complicata corrigi aut profligari debeant, paulo post in ulcerum speciebus curandis recensebimus. III. In ulcerum curatione studiosè observandum est utrum corpus ulcere laborans sit plethoricum, aut $\chi\alpha\lambda\alpha\chi\upsilon\mu\epsilon\nu\gamma$, & quis vitiosorum humorum in corpore redundet. Plethora enim sanguinis missionem, $\chi\alpha\lambda\alpha\chi\upsilon\mu\epsilon\nu\alpha$ evacuationem expostulat. Humores autem vitiosi sanationem impediunt ut plurimum ad ulcus confluent, aut ex toto corpore, aut ex lecinore, aut ex liene vitiat. Proinde vitiosus humor crebro inter curandum expurgari debet, si

copia peccet; si verò acri & praternaturali qualitate impedit sanationem, alteratione opus habet. Quin & visceribus vitiat de-bilitatisque subinde emendatio & corroboratio debetur.

Quibus autem remediis qualibet species vitiosi humoris evacuanda sit, quibus item qualitas praternaturalis eorum humorum corrigenda, & quibus vitiosa viscera corrigenda corroborandaque sint, supra in tabellis remedium singulos humores concoquentium & evacuantium dicatis abunde proposita sunt, & in sequentibus à nobis proponuntur. Hisce tribus dictis regulis probe cognitis, curatio generalis omnium ulcerum methodo per hæc vias, feliciter perfici potest. Per vitium rationem, ulcerum natura contrariam: per humoris redundantis præparationem, & evacuationem, eorumque alterationem, ad quam & sanguinis missio, si necessitas postulet, & hyrudinum applicatio referri potest: & per topicorum remedium impositionem. Topica autem remedia, ut sunt Empl. & Ung. in omnibus ulceribus (ut iterum atque iterum jam diximus) debent esse pro temperamento ulcerata particula, medicocriter exiccantia, cum moderata vel calefactione vel refrigeratione. Refrigerantia enim calidiusculis ulceribus, calefacientia frigidioribus magis sunt apta. Ejusmodi remedium genera supra inter medicamenta Chirurg. abunde sunt enumerata, & in sequentibus latius ostenduntur. Excipienda tamen sunt ulcera cum siccitate, duritie, cum tumoribus & ex contusione excitata, quæ sibi semper contraria media expostulant, ut siccitas ulceris humectationem, durities emolliutionem, tumores & contusiones suppurationem, ut in sequentibus adnotabimus.

Vlcus cum vehementi dolore complicatum quid, quæ causæ doloris, & quomodo curandum?

$\acute{\epsilon}\lambda\gamma\sigma$ $\acute{\alpha}\delta\upsilon\mu\pi\acute{o}\nu$ est quod dolore affectam partem excruciat, & sanationem impedit; doloris autem acerbitas tam in ulceribus quam vulneribus unum est ex iis quæ non tantum

In topicis remediis quis delectus habendus.

Deulcere doloroso.

Doloris effectus.

Topica
sarcotica
& epu-
lorica
quibus
tonsores
utuntur.

Complicati ulceris curatio.

Curatio
universa
per vi-
tiosam
rationem,
venæ
sectio-
nem, &
purga-
tionem.

tantum curationem inuertunt, sed & vitiosos humores è toto corpore ad ulcus alliciunt, inflammationem inferunt, & vires brevi prosternunt; Quare in omni dolorifico ulcere quam fieri potest citissime dolor est auferendus, aut saltem mitigandus ac demulcendus; cavendumque diligenter ne Chirurgus ulceri remedia imponat qua atroces & diuturniores dolores excitare queant.

Causa Doloris porro causa in ulceribus sunt aut
doloris in
ulceribus.
excellens & insignis intemperies calida vel frigida, aut vitioforum humorum erodens exurensque qualitas; saepe & deligationis violenta & inepta constrictio, aut remedium acrium impositio dolorem excitat.

Curatio.

Cognita causa doloris in ulcere ita instituitur curatio: Si ex intemperie extensa calida excitatus sit dolor, ea remedia adhibeantur, qua supra in curatione phlegmones sunt proposita. Si vero frigida excellat intemperies, calida moderatè remedia imponenda sunt, quae in tumorum frigidorum curatione descripsimus. Vbi verò acres humores & erodentes excitantur dolorem, ibi ipsi statim sunt evacuandi aut \mathfrak{z} . j. s. Cassia, aut El. Lenit. aut Diacathol \mathfrak{z} . x. exhibitis, statimque applicanda ulceri Anodyna remedia doloremque mitigantia, quorum copiam paulo ante in tabellis remedi. Chirurg. & in curatione proposuimus. Si vero ex prava ulceris deligatione, aut acredine remedium dolor sit exortus, ea removeantur, & anodyna ut diximus imponantur. Hoc loco unam & alteram remedium formulam dolorem in ulceribus mitigantium subiecisse satis erit. Porro diximus ante

Eorum formula. omnia remedia dolorem mitigantia efficacia esse, operarique aut intemperiem corrigendo, aut materiam erodentem resolvendo, aut dolentes partes stupefaciendo, dolorisque sensum extinguendo: Dolorem itaque ulceris hac sequentia refrigerando mitigant: \mathfrak{R} . Ol. Ros. \mathfrak{z} . ij. Ovor. alb. No. ij. suc. plantag. \mathfrak{z} . j. Conuulsa & linteolis excepta instar Epith. ulcers imponantur; aut \mathfrak{R} . Rad. Hyosch. q. s. conterantur cum axung. porc. q. s. fiat Catapl. Dolorem vero

Chimici utuntur
Empl.
stiptic.
Crollii,
Extra&
sang.
hum. Cl.

mitigant moderatè calefacientia. \mathfrak{R} . Fol. vitriol. Mal. cum rad. aut Alb. cum rad. concisa nitri, Alumin. Ammoniac. salis cum spir. vini mista, Ol. ovor. Magister. Croci. coquantur ad mollitiem, conterantur & per setaceum cribrum instar pulvis trahantur, eique admisc. Ol. Chama q. s. & tepida dolenti ulcers imponantur. Dolorem in ulceribus mitigant resolvendo & acrimoniam excrementorum retundendo: \mathfrak{R} . Medul. pan. si milagi. q. s. quae in ferventi aq. vel lacte maceretur, & expressa dolenti ulcers Catapl. instar imponatur. Aut pulmentum Raporum decoctorum cum Ol. Chama. aut Aneth. commixtum, applicetur. Stupefaciendo autem doloris sensum inhibent Unguentum Popul. illitum, cui nonnihil Opii Theba. cum aq. Rosa. soluti est admixtum. Quae autem dolorem leniant, ex erosione in ulcere collectum humorem excitatum, paulo post suo in loco commemorabimus. Reliqua anodyna ex tabulis Chirurgicorum remedium supra propositis peti possunt. Sublato aut saltem mitigato dolore in ulcere tum tandem ipsius ulceris curatio auspicari debet, & quidem Topicis remediis ac maximè Empl. paulo ante in simpl. ulc. curatione descriptis, quae omnia moderatè exsiccano, ulcus mundificando, & carnem bonam generando in cavitate ejus, cicatricemque inducendo, omne ulcus liberum à Symptomatibus persanant. Quin & subsequenter Empl. non vulnera tantum omnia, sed & ulcera non prorsus maligna, virulenta & contumacia, ex voto persanare possunt, quorum tres tantum formulas exquisiores, hoc loco subiecisse satis erit, quae quia sunt salutaria & usitatissima, eorum in sequentibus saepe mentionem faciemus, ad eaque studiose Chirurgia ablegabimus, ne nobis identidem subinde repetere sit necessum; ex his autem primum vocabimus Empl. de Erug. secundum Emp. aureum Mes. tertium Empl. de vernice.

Reliqua
ulcers
curatio.

Emplastrum de Etugine in hunc modum Emplastrum de concinnari potest: \mathfrak{R} . Cera nova Terebinth. an. \mathfrak{z} . 4. quae simul sensim liqueant ad lentum ignem, eisdemque admisc. arug. tenuiss. pul. ac per noctem in aceto rosa. macerata, rursusque pulverisata \mathfrak{z} . j. Cc 2 & ubi

Et ubi color rerum liquefactarum remisit, tandem admisc. & seq. tenuiss. pul. Thuris & Mastich. ana ℥. s. Quibus omnibus probe commixtis, in aquam frigidiss. imponantur, & ambabus manibus diu multumque subigantur, donec elegantem acquirat & tractabilem substantia aequalitatem.

Aureum
Mellue.

Empl. Aureum Mellue sic confici potest: R. Tereb. lb. s. Mellis virgi. ℥. ij. cera pura ℥. ij. s. Resina pini ℥. j. s. liquefactis simul & non admodum calentibus admisc. tenuiss. pul. Thur. Myrrha, Aloes, Croci ana ℥. j. s. fiat s. a. Empl.

De ver-
nice.

Emplastrum de vernice pictorum ita confici potest, hoc prius de vernice observato, quod nos per vernicem hoc loco minimè intelligimus vernicem Græcorum authorum, quam sandaracam esse putant, sed illum tenacem liquorem ex succino & Ol. lini confectum, quem nostrates fernis nominant, & quo Pictores in illustrandis nitoremque inducendis suis tabellis utuntur. R. Ol. veteris, cera nova ana ℥. vj. quibus simul ad lentum ignem resolutis admisc. tenuiss. pul. Litharg. aurei ℥. vj. Lapi. Cala. ℥. ij. concoquantur simul perpetuo agitando, donec justam duritiem Emp. acquirat, & contrectata inter digitos, à digitis sine commaculatione detrabi queant, deinde remisso ejus calore, admisc. quoque Tereb. ℥. j. vernicis pictorum ℥. ij. & pul. tenuiss. thuris, Mastich. myrrha ana ℥. ij. Camphora ℥. j. subigantur manibus Ol. Chama. illitis, donec tractabilem & aequalabilem substantiam consequatur; His ut diximus & ulcera & vulnera omnia facile per sanari possunt, si Symptomata curationem impediencia prius removeantur.

Vlcus, cum aliqua excellenti intemperie complicatum, quid, quæ signa intemperiei in ulcere, ac quomodo per sanandum?

De ulce-
re cum
intem-
perie.

Εἰς αὐτὸν δύο γενέται, distemperatum, cum hîgis oder verfallter & chade / est ulcus in quo caro exulcerata, & nonnunquam tota particula ulcere affecta excellenti aliqua qualitate vel calida, vel frigida, vel sicca, vel humida, aut cum duritie aut scabritie

imbuta est; à qua sanatio ulcers præpeditur. Excellens ulcers & partis caliditas, ulcus phlegmonosum, Frigiditas ut plurimum Intemperiei effectus. Oedematosum, siccitas febriliosum, Humiditas sordidum vel saniosum, nisi natura succurratur, efficit; & calor quidem atque frigiditas extensa in ulcere dolorem excitant; sicca autem duritiem: quorum Symptomatum removendi rationem paulo post suis in locis ostendemus. Hoc loco satis erit excellentium qualitatum emendationis alterationisque rationem ostendisse. Dignoscitur vero excellens aliqua ulcers qualitas, & visu & tactu, & laborantis sensu; caliditas enim fervoris sensum infert, & caro cutisque in ulcere rubedinem præ se fert, frigiditas vero excellens ad tactum frigidi sentitur, & alba colore conspicitur. Omnis autem intemperies sua contraria qualitate, caliditas frigiditate, frigiditas caliditate, siccitas humiditate, humiditas siccitate, corrigi debet.

Si itaque calida intemperies vel inflammatio ulcers est copulata, & corpus sit plethoricum, vena sectione præmissa, & refrigerante victus ratione imperata, ulcers totique parti inflammata ea imponantur Topica qua supra in curatione phlegmones, & in curatione ulcers cum dolore à nobis sunt proposita, quale est Epith. ex Ol. Rosa. & suc. plantag. commixta. Imponenda autem ea sunt eo usque, donec caro ulcers subiecta idoneæ naturæ namque temperiem recipiat. Extincta præternaturali qualitate ulcers curetur ulcus, & ad cicatricem deducatur aut Empl. Gryssive de lap. calam. aut Empl. de vernice pictorum.

At si frigida intemperies ulcus ipsum infestet, quod ex frigiditate ad tactum, & ex albedine cutis carnisque ulcers adjacentis dignoscere licebit, moderate calidis remediis est corrigenda; affectaque pars ad temperiem naturam reducenda. Post ordinatam itaque calefacientem victus rationem, ulcus si aut pingui, aut acria remedia tolerare nequeat, ut plerumque non fert, locus affectus, vel ulcus ipsum Ceroto simpl. contegatur, & affecta pars vino generoso calefacto foveatur, & instar

Intempe-
rii di-
gnotio.

Curatio
calida in-
tempe-
rii.

Frigida.

star Epith. linteolis imponatur, in quo inco-
qui utiliss. possunt flo. Chama. & Anethi &
fol. Agrimo. Aut inungatur affecta pars Ol.
Cham. aut Vng. Dialib. cum gummat. aut
Balsamo vulnerario, cujus conficiendi ratio-
nem suo loco descripturi sumus, ac restituta
tandem nativa temperie ulcus ipsum persane-
tur Empl. aureo Mesu. aut Empl. de Ærug.
paulo ante descripto.

Sicca.

Sicca intemperies ulceris complicata di-
gnoscitur ex carnis. cutisque adjacentis squa-
lore & ariditate, siccitas itaque in ulcere hu-
mectantibus corrigenda est, in quibus non pos-
sibile est locum obtinet focus, & multa per-
fusio aqua moderatè calida. Talis autem focus
ac perfusionis terminus esse debet, ubi locus
circa ulcus rubescere, & attolli incipit, tunc
enim statim à fori est cessandum, aut applice-
tur Epith. ex decocto Mal. & Alib. confect.
aut ex cremo. prif. vel Avena linteolisque ex-
cepto; Cavendum autem est in humectatio-
ne, ne modus excedatur, & putrefactio ex ni-
mia humefactione subsequatur; Remota sic-
citate ulcus facile persanari potest Empl. vel
aureo Mes. vel de vernice.

Humida.

Humidiore existente temperie carnis in
ulcere, paulo validiora siccantia pharmaca
ulceri sunt imponenda; hoc autem loco per
humidam intemperiem non humores affluen-
tes, de quibus paulo post in sequentibus disse-
remus, nec saniei aut sordium redundantiam
intelligimus, sed talem humiditatem ubi caro
in ulcere madidior, laxior, mollior, & flacci-
dior existat; quemadmodum chorda in fidi-
bus etiam si non madeant, tamen ab humidi-
tate aëris ambientis, flaccidiores redduntur;
Talis mador ulceris exiccantibus lotionibus
pulveribus inspersis & Empl. ad nativam
temperiem reducendus erit. Prodest itaque
ut ulcus madidum flaccidumque subinde
eluaturs vino austero calefacto, in quo Vero-
nica herba, aut Agrimon. aut Rad. Asclep.
seu vincetox. & parum Alum. sunt incocta;
Sic & conjugata intemperies per sua contra-
ria, inter se mixta, revellenda ac tollenda
erunt, ac post ablutionem inspergatur tenuiss.
pulvis Coral. albi adusti, aut terra candi-

da, quam vulgus cretam vocat; aut Aloë.
Epat. ac tandem sublata flacciditate carnis
in ulcere Empl. aut Bruten. aut uno ex
tribus paulo ante descriptis, quod omnium
aptissimum & ulceri convenientissimum
videbitur; ulcus persanetur ac consolide-
tur.

Ulcus cum affluxu alicujus vitiosi humoris,
quid, quæ humoris speciei signa, &
qua ratione curandum?

E'λκος εὐμυγετὸν, ein fliesender Schade/
est tale ulcus ad quod aut ex Epate, aut Lie-
ne, aut cerebro, aut ex toto corpore præsertim
humor impurus sanationem im-
pediens confluit; Id autem hoc loco notan-
dum est, nos non differere de ulcere sano ad
quod ἰχόρες profluunt, aut sordida humiditas
colligitur; sed de eo duntaxat ad quod vitio-
si in corpore redundantes humores continè
adfluunt. Humor autem ad ulcus fluentis
species dignoscenda est aut ex totius corporis
constitutione & colore, aut ex imbecillitate
viscerum.

De ulcere
cum flu-
xione.De qua
fluxione
hic aga-
tur.

Prognosticum signum in ulcere cum ad-
fluxione; id studiò observandum est, ulcus
εὐμυγετὸν curari non posse nisi adfluens hu-
mor ex corpore & visceribus expurgetur exic-
ceturque. Nam etiam si remediis tale ulcus
persanetur & conglutinetur, processu tamen
temporis, & paulo post aut denuo disrumpi-
tur ulcus, aut regurgitans vitiosus humor in
viscera & principales partes, agro certissi-
mum interitum adfert. Ideo ubi fluens ulcus
diuturnum in senibus, vel sua sponte, vel re-
mediis consolidetur, paulo post exitium pa-
rit.

Progno-
stica.

CURATIO consistit in crebra humo-
ris adfluentis à corpore evacuatione & exic-
catione, quibus autem remediis qua-
libet vitiosi humoris species sit evacuanda,
supra in tabulis remed. purgantium propo-
suimus. Post evacuationem humoris vi-
tiosi reliquia nullo magis salutaris remedio
purificari & exiccare possum, quam usur-
patione decocti Rad. China vel sarmenti
Indici, cujus decocti preparandi, &
utendi

China &
sarzaparilla.

utendi rationem supra in curatione Morbi Gallici, & in peculiari libello luculenter proposuimus; Exiccata adfluente in ulcere colluvie, facilis sanatio, & consolidatio in ulcere subsequitur, si ulceri adhuc nonnihil madenti inspergatur tenuiss. pul. vel sol. Aristo. long. vel crocus Martis, cujus parandi rationem paulo post tradituri sumus, & imposito ulceri communi Empl. aut Brutenico, aut de Lapid. Calam. aut Aureo Mes. aut quod ulceri maxime conducere videbitur.

Vlcus cum tumore partis affectæ quid, & qua ratione curandum?

De ulcere
cum
tumore.

Vlcus aposthematicum est tale cum quo adjacentes partes vel phlegmone, vel erysipellate, vel oedemate; vel scyrrho duritieque infestantur, & tales quidem cum ulcere tumores excitantur ex adfluxu alicujus vitiosi humoris: phlegmone quidem ex impuro & accenso sanguine; Erysipelas ex biliosa colluvie: Oedema ex pituitoso; scyrrhus ex Melancholico sanguine. Quomodo autem singula Tumorum genera dignoscantur, & quibus remediis curanda sint, paulo ante in tumorum tractatione declaravimus, unde & remedia & curandi methodus peti, & ad ulceris humores accommodari debent, ac possunt; hoc enim loco ea repetere nimis foret tediosum: inter curationem autem tumorum simul & curatio ulceris est adhibenda. Sublato itaque convenientibus præsidiis tumore, ulcus ipsum facile curari potest remediis paulo ante descriptis; Empl. Bruten. E. Lapid. calam. Empl. de Ærug. de vernice, vel quod natura ulceris omnium videbitur commodiss. In specie autem ulcus Oedematofum, quod ex collectione pituitosa colluviei excitatur, & quidem in tibia sub genu, cum uno aut pluribus perforationibus, quod cū Bruch oder ein dusepen tel dicitur, talis Curatio est instituenda: Post humoris pituitosi crebram evacuationem exulcerata & tumida Tibia subinde fomentetur vapore calido & sudorem proliciente vini, ip quo decocta sunt rad. Aselep. Sanicula herba & flor. sambuc. & Chamemeliana M. ij. Fini aut

Curatio
Oedema-
tosi tu-
moris in
tibiis.

stercor. columbi. & Gallin. ana M. j. Fomentatio vero debet fieri mane ac vespere; Post fomentationem ad tumorem auferendum tibia tumenti circumquaque sequens Catapl. imponatur. R. Flor. Tappi Hyperic. ana M. ij. Flor. Sambuci M. iij. simul contrita coquantur in vini & aceti p. a. & fortiter expressa & contusa quàm ferre potest ager calidissima, tumenti tibia imponantur: sublato tumore, ulceri imponatur mundificationis causa cum liniciniis aut Vng. Apostol. aut Ægypt. aut inspergatur crocus Martis, & mundificatis ulceribus applicetur. Empl. aut de Ærug. aut de vernice pictorum, quibus ulcus consolidetur, & ad cicatricem deducatur. His si potio ex Rad. Chin. addatur, ejusque decocto ulcus indies abluitur, brevi pro voto felix sanatio consequetur.

Vlcus cum labiorum duritie quid, quæ ejus causæ, & quomodo curandum?

Σκίρρωμα τῶν χειλέων ἐλκὺς, Durities De ulcere cum labiorum duritie. labiorum in ulcere, cui batter randt in den offenen Schaben / est ubi caro & cutis circum ulcus exaruit, squallidoque colore, nigro, vel livido, infecta est, consolidationem remorans; Talis ariditas in circumferentia ulceris contingit, ex adfluxu & impactione feculentis sanguinis; admiratione dignum est sapientissimi Hippocratis in curatione labiorum duriorum ulceribus, spongiam siccam, & desiccantia pharmaca imponenda esse precipere, cum durities siccitatis sit soboles, & ad curationem sui moderatam humectationem postulet; nisi forsitan verba sua de remediis causticis duritiemque exedentibus intelligi velit. Ego vero in curatione duritiei labiorum ulceris, initio humectantia, qualia sunt aqua cal. spongia excepta, & subinde ulceri applicata, aut cremor pulque avenaceus, aut decoctum Cham. Mal. Alib. & sem. Lini, imponenda & emollienda esse consulerem, ac tandem si cutis arefacta color vel subniger, vel lividus conspiceretur, malignum sanguinem vel per scarificationem cucurbitularumque appositionem, si loci sitas admitteret, aut hirudinibus applicatis subrahendum

Curatio.

Humectantia
& emollientia.

Chimici
utuntur
Ol. ping.
taxi, Gal-
baneto.
Ol. adip.
human.

Scarificatio & hirudo. *bendum suaderem, ac si ea ratione nec durities emolliretur, nec pravus color remitteret, juxta sententiam Galeni, callum omnem & induratas labiorum circumferentias usque ad sanam carnem excidere juberem, aut violento caustico remedio ulceri imposito duras ulceris partes auferendas conferem, in quem usum prastantiss. sunt Troch. de calce viva, quorum preparatio ita habet:*

Calli praecisio aut exustio. Caustica. *℞ calc. viva ℥. ij. redigantur in tenuiss. pul. & cum q. s. Mellis in Troch. conformentur, ac in furno calido exiccantur, ac ubi necessitas expostulat, cum aq. rosa. aut plantag. in qua nonnihil Mercurii subl. sit solutum, resolvantur, & labiis induratis illinantur; sed in ejusmodi curatione adjacentes ulceri partes, ne inflammatione infestentur, oblinenda, & munienda erunt Linimento ex ol. rosa. & bolo germa. simul commixtis confecto. Remota duritie & sublati crustis ex ulc. aliorum ulcerum more remediis moderate exiccantibus, mundificantibus, & carnem generantibus, & Empl. ad cicatricem deducatur. Ejusmodi autem remedia esse diximus Empl. de Lith. & de lap. Calam. & de Aërug. Quia vero jam crebro Empl. de Lith. & lap. calam. facta est mentio, & deinceps eorum crebra fiet usurpatio, eorum preparandi rationem brevissimè subjiciam.*

Reliqua ulceris curatio. *Empl. de Litharg. quod & Brutenicum dicitur, in hunc modum habet: ℞ Litharg. tenuiss. pulv. lb. j. aceti vini ℥ viij. ol. vet. lb. ij. quae simul commixta ad lentum ignem perpetuo agitando leniter concoquantur, donec justam crassitiem consequantur, & digitis contrectatum non adhaereat.*

Empl. de Lap. cala. quod & Griseum dicitur, sic concinnari potest: ℞ lap. cala. ℥. j. Lithar. ℥. ij. cerusa ℥. s. Tutia ℥. v. Thur. masc. ℥. vj. Masti. ℥. iij. Myrr. ℥. ij. Camph. ℥. j. s. cera alba ℥. j. s. sevi cervini ℥. ij. tereb. ℥. vj. cera & Tereb. & sebum cervinum ad ignem lentum liquefiant, & liquefactis reliqua omnia tenuissimè pulverisatis admisceantur, quod in frig. aquam injectum manibus diu multumque subigatur, & in formam Empl. reducat.

De lapide calami. nari seu Griseo.

Vlcus cum contusione carnis subjectae ulceri quid, & quomodo curandum?

Ulcus ex contusione vel contritione carnis in aliqua parte, etiam offener Schade vom Stossen oder zerkuirschung des Gliedsches. Nisi in ulcere ex contusione caro contusa, & cruor suffusus per putrefactionem in pus convertatur, ulcus per sanari nequit; quam primum itaque contusio seu contritio carnis in aliqua particula intumescit, & ulcerationem minatur, statim loco affecto remedia suppurantia & putrefacientia, quae temperamento calida & humida esse debent, sunt imponenda; qualia remedium genera supra in tabulis remed. Chirurg. & in curatione tumorum passim supra à nobis proposita. Et primum itaque contusus locus aq. vel spongia diu multumque foveatur; deinde sequentia Catapl. imponantur: ℞ far. hord. ℥. iij. aq. q. s. quae subacta concoquantur in pultis formam, ac deinde Ol. Cham. q. s. admisc. fiat Catapl. & singulis diebus bis calide imponatur. Aut ℞ Medul. pan. tritic. q. s. quae subacta concoquantur in pultis formam, & deinde Ol. Chama. q. s. admisc. fiat Catapl. & singulis diebus bis calidum imponatur. Aut ℞ Medull. pan. tritic. q. s. & in ferventi aq. in qua rad. Alib. & Malv. sunt incocta, maceretur & exprimatur, cui admisc. Ol. Chamom. q. s. fiat Catapl. Aut ℞ herb. Malv. viola. ana M. j. Rad. Alib. lb. s. concisa coquantur in jure carniū bovillarum sine sale, ad molliem, quae expressa conterantur in mortario, & per cribrum instar pultis excernantur; cui admisc. far. hord. ℥. ij. Ol. Chama. & Buty. sine sale ana ℥. j. s. vitell. ovo. No. ij. fiat Catapl. Hisce remediis contusa carne in pus conversa, mundificetur ulcus; aut Ung. Apost. aut Aegypt. limimentis excepto, & ulceri imposito. Deinde exiccetur in perso pulv. croci Martis, & nova caro producatur per sarcotica remedia, & ulcus ad cicatricem deducatur Empl. de Lithar. aut de vernice pictorum imposito.

De ulcere cum contusione.

Curatio.

Suppurantia.

Chimici utuntur Emplast. stipt. Croli, ex Meliloro Paracelsi.

Reliqua curatio.

Vlcus

Vlcus cum carnis superflue excreſcentia
quid, quæ cauſa, & quomodo
curandum?

De ulcere
cum Hy-
perſarco-
ſi.

Cauſa
hyperſar-
coſis.

Curatio.

Cauſtica.
Chimicis
in uſu eſt
Mercur.
ſublima-
tus & Ol.
ejuſdem,
Ol. Vitr.
Auripi-
gment.
Antimo-
Nitri, ſa-
lis, ſul-
phuris,
ſpir. ſapo-
nis, cal-
cis.

*ἡ ἀπερίμετρος ἐν τῷ ἔλκει, Immoderata ex-
creſcentia carnis in ulcere. Wild Fleiſch in
dem offenen Schaden / eſt tale ulcus, in
quo caro luxurians & ſupra modum excre-
ſcens, conſolidationem impedit, & ſæpè ni-
ſi tempeſtivè removeatur, deformem emi-
nentiam & veſtigium extuberantis carnis,
poſt inductam cicatricem relinquit; luxu-
rians autem ejusmodi caro in ulcere produci-
tur aut ob largiorem affluxum inculpati ſan-
guinis, aut ob ſarcoticorum remediiorum
validiorum attractionem, præſertim in pa-
rum bene emundatis ulceribus; ſtatim ita-
que ubi vel in ulcere, vel vulnere caro ex-
tuberans conſpicitur, remediis moderate
cauſticis & erodentibus caro luxurians li-
queſcat, & abſumatur, antequam ulcus
ad cicatricem deveniat. Exedunt autem
carnem ſuperfluam Ung. Egypt. aut Apoſt.
cum liniicis exceptum & impoſ. aut ablutio-
ne cum Muria, aut alum. uſti, quibus ſi
domari eradicarique luxurians caro ne-
queat, præſtat ipſam auro candenti, ſi
eger tolerare velit, inurere. Obſervan-
dum autem in cauſticorum remediiorum im-
poſitione, ne eorum uſurpatione adjacentes
partes inflammantur, doloresque excitentur,
ideo adjacentes partes ante impoſitionem
Cauſticorum utiliſſime inunguntur Ung. ex
ceruſa, aut ung. ex bolo vulgato cum Ol.
Roſa. temperato. Exſirpata carne ſupervu-
cana ulcus ipſum mundificetur, & exicce-
tur præſcriptis remediis, impoſitoque aut
Empl. de Arug. aut de Litharg. aut alio
aliquo, quod ulcus ipſum familiariter tolera-
re queat, conſolidetur, & ad cicatricem
deducatur.*

Vlcus varicoſum quid, & qua ratione
curandum?

De Ulcere
varicoſo.

*ἑλκος μετὰ κιρῶν, ulcus cum varice co-
pulatam, eluſſener ſchade daß in de-
dèren geſchwollen heraus ſtehet. Varices,
κιρῶν, ſunt vena dilatata impuro melan-*

*cholicò ſanguine reſerta, extra cutem, præ-
ſertim in cruribus, protuberantes, inde ul-
cus varicoſum nominatur, in quo vena ſan-
guine turgida extuberant, ex quibus ſemper
tenuior & aquoſior ſanguinis pars in ipſum
ulcus perſudat, ulceris que curationem remo-
ratur; in quocumque ulcere ejusmodi tumi-
da vena conſpicitur, niſi maturè excinda-
tur, ulceris ſanatio ſequi minimè poteſt: in
curatione itaque varicoſi ulceris neceſſum eſt
ut ipſum ulcus juxta extuberantem venam,
ablutaque parte novacula ſimplici incisione
incidatur, & vena turgens utraque pars
à carne connexa ſcalpello artiſicioſè liberetur,
& hamo obtuſo, vel voſſella instrumento
ſurſum ex ulcere trahatur, & binis funiculis
ex ſerico filo contextis ſubligetur, atque ex
intercepta vinculis parte ſcalpello inciſa ſan-
guis ſubtrahatur; atque tota tandem pars
inter utrumque vinculum, quod ulceri in-
cumbebat, excindatur, ac poſtea ulcus
ipſum vino tepido, cui Ol. Hyper. eſt com-
mixtum, & ſanguine & omni impuritate
eluat, & ſpongia molli abſtergatur, &
convenientibus Empl. conſolidetur. At vero
ubi vena pars ex ulcere extuberans, propter
agri impatientiam præcidi nequeat, tum ul-
ceri ſuppurantia & putrefacientia remedia,
qualia inter Chirurgic. pharm. & paulo ante
in ulcerum ex conuſione carnis curatione
 præſcriptimus, imponantur, donec ſubliga-
ta illa pars vena una cum funiculis putrefa-
cta ſpontè procidat, id quod per dies aliquot
fieri conſuevit; quo peracto tandem ulcus
mundificetur Unguento Egyptiaco, & ſar-
coticis remediis Emplaſtrisque, aut de Li-
tharg. aut de Arugi. aut de vernice, aut
quod ulceri accommodatiſſimum eſſe videbi-
tur, conſolidetur, & ad cicatricem dedu-
catur.*

Vlcus denuo diſruptum quid, quæ,
diſruptionis cauſa, & quomo-
do curandum?

*ἑλκος ἐξ ὑπαρχῆς παλίου, ulcus renova-
tum, aut denuo diſruptum, ein alter Scha-
de von neu auffgebrochen / eſt ulcus quod
antea*

Varices
quid.

Curatio
varicis.

De ulcere
denuo
diſrupto.

antea per sanatum, & ad cicatricem deductum, processu temporis, sine ulla evidenti causa, iterum disruptum & excoriatum est. Duae sunt potissimum causa renovationis persanatorum ulcerum; una est, alicujus vitiosi ac virulenti humoris irruptio & collectio in locum affectum, & ulceris in priori curatione à virulentis humoribus parum bona & sufficiens mundificatio. Quibus autem remediis virulenti humores in ulcere expurgandi absorbendique sint; paulo post in virulentorum curatione docebimus. Secunda causa denno disrupti ulceris, est ossis ulceris subjecti corruptio, & in cariem conversio. Quemadmodum enim in vulnere, si ossis particula à suo toto disrupta, & resoluta, etiam minutissima contineatur, eo usque remoratur vulnere consolidatio, donec ossiculum vulnere inhaerens, vel à natura protrudatur, vel arte eximatur. Ita in ulcere, si os, ulcere subjectum, sit corruptum, aut cariosum effectum, ejus curationem remoratur; vel etiam si ad tempus cicatricem admittit, & ante sit contentum; paulo tamen post denno disruptitur, ulcusque renovatur. In ejusmodi itaque ulceribus persanandis prima cura esse debet ossis corrupti remotis, quo sublato ulcus ipsum praescriptis remediis facilem consequitur sanationem. Ex quibus autem causis os in ulcere corrumpatur, cariosumque efficiatur, & qua ratione removeri, ulcusque curari debeat, nunc breviter declarabitur.

Curatio.

De Ossis corruptione in ulcere.

Os ulcere subjectum quibus ex causis corrumpitur, quibus notis deprehenditur, & qua ratione & os corruptum & ulcus inde renovatum curari debet?

Corruptio ossis in ulcere, Verolmung oder Verbrennung der Knochen in dem offenen Schaden. Est autem ossis corruptio, ubi ossis, cui ulcus incumbit, pori, h. e. exilia foramina foeda & virulenta colluvie, maxime in malignis & diuturnis ulceribus, infarciuntur & imbuuntur, quae sua maligna & venenata qualitate os ipsum instar cariei in lignis exedunt & resolvunt atque exu-

runt. Tale enim corruptum os suo tandem virulento madore; quem subinde in carnem incumbentem persudat, ac profundit, carnem ipsam inficit, & cutem ulcri obductam exedit & dirumpit. Porro ossis corrupti in profundis ulceribus constitutio non prius dignosci potest, quam ubi ulcus per artificiosam incisionem dilatetur, & ab incumbente carne denudetur; vel ubi ulcus amplum sit, & os ipsum visui conspicuum, tum hac signa ossis corrupti se offerunt, ossis nigrities & pinguedo apparet quasi oleo esset oblinita, item mollities ac caries, ita ut quovis acuto instrumento tanquam creta facillime abradi & in pulverem redigi queat. In curatione ulceris, cui os corruptum, & cariosum subjacet, omnium primum quicquid in osse corrupto & carioso conspicitur, id omne à carne & adjacentibus partibus artis industria liberandum & denudandam erit, moxque adaptato ferreo instrumento, omnis putredo & caries usque ad duras albasque ossis partes deradenda erit, vel donec sanguinolenta quaedam rubedo in abrafo osse appareat, & ita tandem ut omnis virulentus humor ossi imbutus radicitus absorbeat, ad ulceris amplitudinem ferrum foramine amplo pervium corrupto ossi imponatur; quod ulceris labia invicem distendere, & undique vallare queat, carnemque adjacentem ab unctione communire, in cuius foramen aliud ferrum densum, & ad amplitudinem ossis corrupti adaptatum candens imponatur, ossique ipse semel atque iterum imprimatur, osque corruptum inuratur; ita enim omnis virulentus humor ex osse à candenti ferro absorbetur. At ubi ossis vitium & caries altius in os penetret, quam ut abradi queat, ferreo terebello perforando usque ad sanum & durum os, corrupti ossis altitudo exploretur, & ipsum vitiatum os multis foraminibus terebello perforetur, & quasi excavetur, ac demum candenti ferro eum suo ferreo vallatorio inuratur; si vero totum & integrum os, cui ulcus incumbit, jam sphacelum patitur, non antea est speranda ulceris sanatio, donec illud totum os corruptum sit praeisum exemptumque. Sunt

*Dignotio
offis cor-
rupti.*

*Curatio
per Chi-
rurgiam.*

D d

tamen

tamen qui corruptum os exstirpare conentur remediis; quæ sane mihi videntur imbecilliora esse, quam ut aliquid stabilis sanationis ulceri adferre queant, (nisi fortè in superficiali ossis corruptione) eorum nos hoc loco paucarecitantur:

Caratio per medicamenta. Chimicis præter Oleum Vitrioli lapis corrosivus aq. inferorum, seu spiritus vini Mercur. sublimat. mistus in usu est. Oleum vitrioli ossa reddit friabilia. Osse corrupto remoto quid faciendum. Emplastrum Avicennæ ad ulcera ex ossis corruptione.

De ulcere vermiformi.

R. Pul. sem. Hysch. Atramenti Sutorii, Pul. Peuced. ana a. p. commixta ulceri, & ossi corrupto imponantur. Ego efficacius remedium esse judico Ol. Vitr. ossi corrupto & carioso eo usque illitum, donec os corruptum exedatur, & album durumque appareat, & tum quidem ab illimitatione olei statim est abstinendum; quod non modo corruptum, sed & sanum os resolvit, & instar calcis friabile efficit; ideo parum bene consuevit qui Ol. Vitr. crebrius dentibus illinere docent. Etsi enim eos candidissimos efficiat, tamen crebrior usus eos calcinat, & friabiles reddit. Osse corrupto in ulcere remoto, & per candens ferrum inusto & exiccato, ossis cavitati per triduum Ol. Rosa. & albu. ovi simul concussa infundantur, ac iterum sequentibus tribus diebus Ol. Rosa cum luteo ovi commixtum eidem imponatur, ac postea Linimento ex buty. rec. & melle rosa. temperatis irrigetur & illinatur. His probe peractis securè tandem ad curationem ulcers animus convertitur, mundificando, carnem bonam generando, ulcus conglutinando, & cicatricem inducendo, remediis jam toties commemoratis ad sanitatem perfectam facillè deduci potest. Hoc loco satis erit Empl. Avicennæ ad ulcera ex ossis corruptione excitata adiecisse, quod is mirabile Empl. nominat, cujus formula sic habet: R. Aristol. long. Ireos, Myrrha, Aloes, Oppopo. Thuris. Terra ex fornacibus pistorum, scoria aris, cortic. pini, vel earum loco nucum pini ana 3. ij. Tenuissimè pulverisata subigantur cum q. s. mellis; fiat Empl. vel imponatur Empl. de Ærug. vel de vernice pictorum.

Ulcus verminosum quid, quæ causæ generationis vermium in ulcere, & quomodo vermes extirpandi, ulcusque curandum?

Ελγος σκαληνός, εἴη ὀφεινὴ ὀφεινὴ ὀφεινὴ

linne Würme gewachsen sein / est ulcus in quo vermiculi, similes iis qui in carne putrefacta generantur, scatent, & curationem ulceris impediunt.

CAUSÆ generationis vermiculorum Causæ sunt humores crassi & putridi in loco calido generationis conclusi; sic pediculi in poris cutis ex sorde; sic vermium; Sirones vocata animalcula sub cuticula, die Suren / sic Lumbrici in intestinis; & ita omnis generis vermes in canosis & humidis locis pronascuntur, teste Aristotele; De putrido vero ulcere ejusque causis, & curatione, paulo post in malignorum ulcerum tractatione, fusius differemus. Satis hoc loco fuerit verminum ulceribus exterminationem duntaxat per convenientia remedia indicasse: ubi itaque in ulcere aliquo vermes scatere conspiciuntur, excrementum humorem corruptum & putrefactum, eo in ulcere redundare statuendum est; qui in curatione vermiculorum, tanquam eorum materia, omnium primum abstergendus & evacuandus erit.

Absterfo ulcere instillanda sunt remedia quæ vermiculos interimere & ex ulc. protrahere queant; inter quæ non modo vermes interficiunt, verum & putrefactam colluviem abstergunt & emundant, succo. & decocta Centau. Min. Absinth. Eupat. sive Agrimo. Marrubii & Sabina, si hac vel singula vel simul mixta ulceri infundantur, mellis & subindeque instillantur, & cum iis abluitur.

Efficaciora tamen hæc efficientur, si decocto aut succo nonnihil Ol. Vitr. admixta. & Empl. aliquod attractivum, quale est do Lithargir. aut simile imponatur. Exstirpatis verminibus ulcus ipsum, ut jam in putridorum ulcerum curatione docebimus, persanari potest.

De ulceribus Malignis & curatu difficilibus.

Malignorum ulcerum nomenclaturæ, causæ generales, & differentiz, sive species, atque curatio generalis quæ?

Omnia maligna ulcera curatu sunt difficilia,

De ulceribus malignis & curatu difficilibus. Malignorum ulcerum appellationes.

cilia, & omnia qua difficulter curationem recipiunt, inter maligna referri debent. Maligna verò ulcera generali vocabulo Græcis ὀγκώδη & δυσεύλωτα, i. e. difficulter cicatricem admittentia nominantur. Ne autem varietate synonymorum, qua malignis ulceribus cum à Græcis tum à Latinis attribuantur, animi Chirurgia studiosorum distrabantur, ea hoc loco breviter enumerabo. Ulcera ὀγκώδη nominantur & ulcera ferocia, rebellia, dolosa & curatu difficilia, ac ubi ad summam malignitatem pervenerunt, & vel raro, vel nunquam humanā industriā curari possunt, nominantur ulcera Chironia & Telephia.

Causa
corundem.

Porro malignorum ulcerum generales causa sunt aut sordidi, aut virulenti, acresque & erodentes humores, vel ex toto corpore cacochymico, vel ex viscere vitiatō, cerebro, Iecinore, Liene, matrice, & ad locum siue particulam aliquam defluentes & collecti; non obstante quod Paracelsus hanc veram opinionem deideat, & alia quadam falsa mentia fingat ulcerum causas esse, & ridiculam quæstionem contra nostram opinionem opponat, inquit; Si vitiosi humores ex Epate aut Liene profluente sint causa ulcerum, cur ipsi humores non potius in Iecinore aut Liene, quam in pedibus aut aliis externis partibus ulcus ipsum effodiunt? quam ridiculam quæstionem ut responsione indignam, pueris solvendam committimus. Item est quoque ulcerum causa imbecillitas ac vitiosa constitutio affectæ partis, vel pars aliqua venenata qualitate imbuta. Augent autem malignitatem humorum, & remorantur sanationem ulceris, ut in superioribus diximus, prava illa symptomata cum ulcere copulata, ut est dolor, inflammatio labiorum, ulcerum callositas, ac durities, rotunditasque, varix, os corruptum in ulcere, totius corporis plethora & cacochymia; de quorum symptomatum sublatione paulo ante tradidimus. Differentias autem siue species ulcerum malignorum, ut perspicuitati serviamus, nos in tria genera cum suis speciebus distribuemus; videlicet in ulcus simpliciter

Differentia.

malignum, putridum sordidum, & in ulcus profundum; cuius species sunt ulcera fistulosa & cuniculosa 3. in ulcus virulentum, cuius species sunt ulcera depascentia, exedentia, & Cancrofa; quarum specierum curationem sigillatim in sequentibus tradituri sumus: nunc generalem curationem subjungere satis esse arbitramur.

In generali curatione omnium malignorum. Ulcerum initio diligenter consideranda sunt causa singulorum malignorum ulcerum, & si qua sunt copulata symptomata, statimque victus ratio causis ulcerum contraria instituenda, ac medicatio tali methodo molienda: Si corpus agri sit phletoricum, per vena sectionem; si cacochymicum, per convenientia humoribus vitiosis remedia evacuandum, praemissis vitiosorum humorum concoctionibus, & extenuationibus. Si verò defluxio ad ulcera maligna ex uno duntaxat viscere imbecilli incumbat, illud ipsum viscus obstructum quidem aperire, & colluvie humorum gravatum abstergere ac corroborare oportet; per qua autem remedium genera hac sint peragenda, in superioribus abundè demonstravimus.

Curatio
generalis
& uni-
versalis.

Tandem si ulceri maligno symptomata sunt connexa, ea quam primum auferenda, aut saltem mitiganda veniunt: ac ita tandem ad Topica remedia accedendum erit: Eorum autem remedium habendus est delectus, non enim omnia remedia quibusvis ulceribus convenientia sunt; sed alia aliis magis sunt salutaria, aliis vero noxia. In genere autem omnia maligna Ulcera ad sui curationem valde exiccantia & abstergentia, omnis tamen acrimonia & mordicationis expertia postulant, qua aut in forma liquoris lavamenti, aut pulveri aut Emplastris applicari possunt, ac debent. Qua porro Topica remedia, quibus ulceribus magis sint salutaria, id Medicus siue Chirurgus experiundo dignoscet; & ex iis ea tantum usurpabit, qua juvant plurimum, aut saltem nullam inferunt noxam. Ex quibus autem ulcus vel sordidius, vel malignius, & quasi à Cancerosum reddi conspiciatur, ea protinus removebit, abjiciet.

Topica
corum-
que de-
lectus.

que. Conveniētiſſima autem cuilibet ulcēri maligno remedia ſunt, qua, ut diximus, probē exiccant & abſtergunt, carnemque bonam generant, ulceris labia contrahunt, conglutinant, & cicatricem inducunt.

Topico-
rum ma-
teria.

Inter hæc ex ſimplicioribus nobiliora habentur Pul. tenuiſſ. Antimon. præp. Sarco. Plumbi uſi, Squamma aris, & ferri; Vocamus autem ſquammas, qua ex metallis durioribus violenta percuffione ſive malleatione decidunt; hæ autem præparanda ſunt prius & extinguendo candentes in aceto roſar.

Simpli-
cia:

ejus quoque generis ſunt pulvis Cort. granator. combuſtor. & rad. Ariſto. utr. & fol. Centau. min. Veron. & Millefol. Ex quibus & decocta ſive lavamenta, & pul. confici poſſunt, ulceribusque inſtillari atque inſpergi. Ex remediis compoſitis malignis ulc. nobiliora ſunt qua nunc ſubjiciemus: in primis autem aq. ſtillat. ſequens: R̄ Therebin.

Compo-
ſita:

decies elota ℞. j. s. Vernicis pictorum ℞. j. Pul. Olibani ℞. ij. aq. Iunip. ℞. j. Commiſc. ſubiganturque, & in vitrea cucurbita in arenam aut cinerem collocata lento igne, Chimico artificio deſtillantur, cujus ſtillatitii liquoris malignis ulc. crebro q. s. inſtillatur, vel linteolis exceptus, inſtar Epithematis imponatur. Aut R̄ pul. nitrati pro arbitrio & in Vini q. s. reſolvatur, linteolisque exceptum ulceribus malignis imponatur; abſtergit enim & mundificat, atque conſolidat ulcera maligna, curatuque difficilia, cum ratione Niri, tum ratione Sulph. Aut in menſe Majo, ſudo calo, & ante ortum Solis mundiffimis linteolis ros matutinus colligatur in locis trifolio luxuriantibus. Sit autem roris ſatis magna copia, in quo decoquantur in duplici vaſe pul. thuris Maſſich. ana in ſingulis roris libris Camph. ℞. ij. Alum. ℞. j. atque eo liquore indies biſ terve abluatur, abſtergatur, & linteolis excepto imbuatur ulcerus malignum.

Laudatiſſimum quoque habetur ſequens Empl. R̄ Cadmia, Chryſocolle ana ℞. ſ. Ærug. uſi. ℞. j. Nucis Cupreſſi ℞. ij. Ol. roſa. & Cera ana q. s. fiat Empl. Aut. R̄ Vit. ℞. j. Alum. plumoſi, Calcis viva,

malo. granat. ana ℞s s. Thuris, Gallarum ana ℞. j. ℞. j. Cera & Servi vitulini ana q. s. Fiat s. a. Empl. Aut R̄ Plumb. uſi ℞. s. Cera pura ℞. j. Ol. veteris ℞. ij. Servi. Taur. Terebinth. ana ℞. s. fiat Empl. Aut juxta Galen. R̄ ol. roſa. Cera nova ana ℞. ij. Cernſa lota ℞. ij. Pul. ſalis Ammo. ℞. j. Squama aris præp. ℞. s. Thur. Alum. Calc. viv. Ærug. Cort. granat. Cadmia ana ℞. ij. fiat Empl. Cum autem in malignis ulceribus omnibus curandis nihil magis ſit neceſſarium purificatione ſanguinis, non poteſt ſalutarius cum ad purif. tum ad perſanationem ulcerum remedium excogitari, quam decoctum rad. vel Chyna vel ſarmenti Indici, ſi agro indies potandum exhibeatur, ſudorque excutetur. Quorum parandi & utendi rationes in ſuperioribus præſcripſimus; plura remedium Topicorum genera in ſpeciebus ulcerum malignorum commemorabimus.

Vlcus fœtidum quid, & quæ ejus ſpecies?

Ἐλγος δυνώδες, graveolens, ein ſtinkender Wöſter / offener fauler ſchade / eſt in fœtido. De ulcere quo ſordida excrementa per negligentiam compuſuerunt, & putrefacta ſua venenata qualitate, ambientem quoque carnem putrefcere coëgerunt; qua ulcera tetrum exhalant odorem. Fœtidi ulceris dua ſunt ſpecies, ſordidum, & putridum; Cum Fœtidi ulceris dua ſpecies, ſordidum, & putridum; Cum verò omne ulcus ſordidum neglectum degeneret in putridum, & utrumque ex iisdem proveniat cauſis, eandemque ſubordinatam habeat curandi rationem, nobis utriusque curationem conjungere placuit.

Vlcus ſordidum & putridum quid; quæ putrefactionis ulceris cauſæ, & quæ utriusque curandi ratio?

Ἐλγος πυρραγός ἢ σαπρὸν, eſt, ubi ulcus De ulcere ſordido excremento imbutum & inſarctum, ſordido diutiusque neglectum eſt: tumque primum ipſæ ſordes putrefcunt; & ulceri circumpoſitas carnes ſecum putrefaciunt, ac tandem qualitas putrefcens latius ſerpens, niſi tempeſtivè ſuccurratur, totam partem affectam in Gangrenam, tandemque in Sphacelum conjicit.

Sordidum ulcus quid. Sordes quid.

conjicit. Sordidum itaque ulcus in specie dicitur cavitatis sorde, h. e. crasso, tenaci & foedo excremento infarsita. Est enim sordes, ut in superioribus adnotavimus, nutritiens humoris in assimilatione in crassam & lentam tenacem, adeoque foedam materiam in partibus exulceratis conversio, qua colore nonnuncquam tetro, livido aut nigro conspicitur; ejusmodi in ulceribus sordes si tempestive non eluatur, abstergeturque, processu temporis venenatam concipit qualitatem, & suo contactu carnem propinquam una putrefacit, & rursum Caro putrefacta propinquam, donec tota pars corrumpatur & emoriatur; veluti enim pomum putrescens suo contactu propinqua poma inficit ac putrefacit; ita putrida pars corporis semper prope adjacentes partes per consecutionem putrefacit & mortificat. Est itaque putridum ulcus in quo non tantum excrementa sordida, sed & caro partis affecta putrescere & emori incipit, atque in Gangranam & cadaver terminatur.

Putridum Ulcus quid.

Causae putrefactionis.

Causae putrefactionis in ulceribus est 1. sordium crassities & ad putrefactionem aptitudo. 2. Loci sive cavitatis ulcers humiditas, cum imbecilli caliditate; carnis autem exulcerata putrefactionis causa sunt contactus sordium putridarum & venenata qualitate imbutarum. 3. Obstructio articularum in partibus affectis per crassitiam sordium, qua spiritus & calorem innatum, ne ad partes exulceratas profluere queant, intercipit. Intercepto enim vel extincto nativo calore, in aliqua substantia partis; necessariò subsequitur ejusdem partis corruptio, putrefactio & mortificatio.

Sordidi ulceris curatio.

Curatio itaque sordidi ulceris nondum putrefacti magna ex parte consistit in sordium remotione, & accurata deterfione: Quamprimum itaque sordes in aliquo ulcere compaeruerit, statim diligenter abstergi & emundari debet. Quibus autem remediis deterfendis sordidum ulcus emundandum sit, jam antea non semel in superioribus tradidimus; ex quibus hoc loco probatiora tantum recensebimus. Initid crebro eluatur ulcus sordidum aut aq. mar. aut saluginosa, aut Hydromel.

decocto Veron. cujus decocti singulis libris ꝑ ꝑ. j. Ol. vitrioli admisc. magis abstergit & mundificat; post ablutionem illinatur ulceris sequens linimentum: R. lixiv. acerr. ꝑ. iij. Mercur. precip. ꝑ. j. Mellis rosa. ꝑ. ij. leniter concoquantur ad Linimenti formam, aut sordido ulceri imponantur unguenta Aegypt. & Apost. lineamentis carptis excepta. Ea ratione sorde absterfa imponatur sequens Catapl. R. far. hard. ꝑ. iij. Pul. Myrrha ꝑ. j. s. Succ. Centau. mi. Absinth. ana ꝑ. ij. Mellis rosa. q. s. Coquantur ad succ. absorptionem, fiat Catapl.

Quae sordes eluunt & abstergunt.

Sed omnium praestantiss. post ulc. ablutionem sordes mundificat & expurgat, ipsumque ulcus persanat, pul. Merc. precip. inspersus; Est autem Mercur. precip. argentum Vivum cum aq. forti Chimicorum in calcem adustam calcinatum. Sorde probe absterfa carnis generatio, ulceris conglutatio & cicatricis inductio per impositionem Empl. de Aërgia. aut de Vernice, aut de Litarg. molienda est. Porro ubi jam sordes ad malignitatis pervenit ut in Vlc. non ipsa tantum sordes, sed una & circumjacens caro corrumpi & putrescere incipiat, (id quod ex foedo ulceris colore & fetore facile dignosci potest,) tum ulcus putridum nominatur; cujus curatio tali methodo institui debet: Primum praescribatur agro victus ratio pro natura & temperamento corporis humori in corpore redundanti adversans, probumque generans sanguinem, parca autem & tenuis; inter qua laudabilia sunt alimonia caro pull. gall. Caro vitulina, Orvilla, Ova sorbil. & juscula ex praescriptis desumpta: potus esto aut vinum aut Hydromel.

Curatio ulceris putridi Universalis.

2. Corpore plethorico existente ex Vena Epatica dextra sanguis detrahatur; Cacochemico verò existente corpore, redundans & vitiosus humor convenientibus remediis subducatur, quorum sylvam in superioribus tradidimus. 3. Praclare facit ad universam malignorum ulcerum curationem usurpatio decocti rad. Chyna vel sarmenti Indici, cujus & praeparandi & utendi rationem supra in curatione morbi Gallici proposuimus. 4. His omnibus ita peractis, ad Topica sordes putridae

Topica.

Utile
etiam in
hoc affe-
ctu est
Magister.
Perfica-
ria, Ef-
fent. Ly-
thargyri
solutio.

Mercur.
sublimat.
cum aq.
Plantag.
attempe-
rata,
Mundi-
ficativ.

Paracels.
cum vel
sine Præ-
cipitato.
Opodel-
doch.

das ex ulc. detergentia, & putrefactam car-
nem à sanis partibus resolventia, & exstir-
pantia accedendum erit. Resolvunt autem
& abstergunt sordes putridas ex ulc. quæ sub-
ficiemus remedia. Initio itaque crebro elua-
tur ulcus sordidum acri lixivio ex sarmento
vitis confecto, aut salugine piscium, abluto-
que ulceri imponatur sequens catapl. R. Car-
nium halecum salitorum probe contus. Scylla
aut ejus loco Ceparum contusarum ana ℥ ij.
Pul. Ariso. long. farina Orobi ana ℥ j. Mel-
lis ℥ j. s. Vini austeri q. s. Concoquantur in
formam pultis, fiat catapl. Reliqua deterforia
remedia ex tabel. remed. Chirurg. peti pos-
sunt.

Porro ubi jam non solum sordes in Vlc. sed
& caro circumjacens computruit, tum vali-
diora, & qua carnem putridam à sana se-
parare queant, qualia in Gangrena cura-
tione proposuimus, applicari debent. Inter
qua celebriora adnotabimus: In putrido ita-
que ulcere curando, primum abluatur de-
tergaturque sæda sordes, & ut ex carne
jam putrefacta circum ulcus omnis sanguis
infectus malignusque elici & extrahi queat,
applicare debemus vel Hirud. vel Cucurb.
cum scarificatione, moxque per ulceris ambi-
tum sana pars & nondum corrupta caro
inungatur defensorio Linimento ex Ol. Rosa.
vel Nymph. & Bolo Germa. confecto, ac tan-
dem ut putrefacta caro sine noxa à viva se-
paretur exstirpeturque, unum ex seq. caust.
remediis quod convenientissimum videbitur
corrupta carni imponatur. R. Pul. Calcis
vivæ, Alum. Cort. granat. ana ℥ vj. Thur.
Gallarum ana ℥ s. Tragac. ℥ j. Ol. Veteris
& Cera q. ad excipiendum sufficiat. fiat
Empl. Aut R. Virriol ℥ j. S. Calc. vivæ
℥ j. ℥ j. Trag. ℥ j. ℥ j. Aceti vinacei q. s.
Commisc. & in Linimenti formam reducan-
tur, Linamenti carptis excepta putrefactis
partibus imponatur; quibus si putrefacta
carnes exstirpari separarique à sanis ne-
queant, sed putredo virulenta latius latiusque
serpat, validiora imponi debent Caustica, qua
in Gangrena curatione proposuimus. 3. qua-
lia sunt Arsen. sublim. aut Mercur. sublim.

vel potius sublevatum. Sublevatur an-
tem Arsenicum arte Chym. per violentiam
ignis.

Pul. Arse. in Cucurb. vitream imposto
& supra Cucurb. Galea sine rostro, quam
Alembicum Cæcæ artifices vocant, in
ignemque collocata; vapor enim Arsenici
ascendens in galea instar fuliginis colligitur,
& adhærescit, quod Arsen. sublevatum dici-
tur; eadem ratione & Mercurius, h. e. ar-
gentum vivum, & sulphur sublevatur pra-
paraturque. Virumque autem & Mercur.
& Arsen. tenuissime pulverisatum, aut cum
aceto in Linimenti formam redactum, &
carni putrida impositum, emortuam carnem
à viva potentissime revellit, & funditus ex-
stirpat, sed non sine ingenti cruciatu. Sub-
lata carne putrida, omnique deterfa sorditie,
dolor in ulcere mitigari debet anodynus reme-
diis; qua supra in Chirurgicis remediis &
curatione Tumorum proposita sunt; tandem
ulcus subinde mundificetur imposito seq. Li-
nimento: R. Mellis rosa. ℥ j. Terebin-
thina lota cum aq. Plantag. ℥ ij. Succ. Apii,
Plantag. Absinth. ana ℥ ij. lento igne resolu-
ta coquantur ad succorum evaporationem,
& percolentur, hisque admisc. far. hord.
Orobi ana ℥ iij. Sarcocol. ℥ j. fiat linimen-
tum: postremo imponantur ulceri carnem ge-
nerantia simul conglutinantia, & cicatricem
inducientia, qualia sunt Empl. de Litharg. de
Ærug. de Vernice &c. quibus perfecte per-
sanabitur ulcus. Verum ubi tota pars affecta
computruit, nec restauratio sperari potest, tum
ad extremum carnicum sævum remedium
descendendum erit, & emortua pars juxta
prescriptum Poëtæ; Ense rescindenda est
ne pars sincera trahatur. Rescissa parte pu-
trefacta, reliqua sana pars instar ulcerum,
debito modo, persanetur.

Vlcus profundum quid, & quæ ejus
species?

Ελκος βάθειον, εἰν τῆσσι ὁ χρίχ/ offener De Ulcere
schade. Profunda ulcera dicuntur in quibus profun-
sordida excrementa generata & collecta, sua do, seu
maligna qualitate carnem ulceris altius ef- fistuloso,
& sublim. & c. unu-
fodiunt, oso.

Arsenici
& Mer-
curii Sub-
limatio.

fodiunt, & dilatant, & inter $\kappa\alpha\tau\alpha\gamma\eta\theta\eta$ & $\delta\upsilon\sigma\epsilon\pi\acute{\alpha}\lambda\omicron\alpha$ h. e. maligna & difficilis curationis referuntur. Duas constituunt Chirurgi profundorum ulcerum species, ulcus fistulosum & sinuosum, siue cuniculosum; qua quia eandem habent causas, & similem curandi rationem, nos nullam inter ea ponimus differentiam, nisi quod fistulam simplicem & cuniculosam, & utriusque tractationem simul coniungemus.

De sinu & Fistula & Cavernosum ulcus quid est, quæ causæ, quæ differentia, quæ prognostica, ac qua ratione curandum?

$\Sigma\delta\epsilon\alpha\gamma\epsilon\ \eta\ \kappa\alpha\lambda\pi\omicron\tau\epsilon\delta\epsilon\varsigma\ \acute{\epsilon}\lambda\alpha$ & c. eine fistel oder röhrlöchertiger schade. Hac duo, fistulosum & cuniculosum ulcus, ut diximus, non differunt, etiamsi ex alterius, videlicet fistula, duritie & callositate differentiam ponant; ex iisdem enim causis generantur, & iisdem remediis curari possunt. Est autem Fistula vel fistulosum ulcus ex malignorum & non facile curationem admittentium genere, quod orificium habet angustum, confriatum, callosum, & ut plurimum rotundum. In fundo autem sese expandit atque dilatatur, ex quo aut sordida, aut saniosa colluvies sine dolore emanat ac profluit. Cuniculosum itaque ulcus à fistula non differt, nisi quod fistula unum ac profundum habet sinum; cuniculosum vero plures habet cavernulas, & ex singulis meatus ad orificium ulceris procedit.

Fistulosum ulcus plures habet differentias à sinu & protensione Vlcis sumptas; aliud enim sub cute per transversum producit; aliud recta introrsum in subjectam carnem effoditur, quod nonnunquam usque ad ossa vel usque ad nervos, vel usque ad ligamenta, membranas, & quandoque usque ad interna viscera penetrat. Item aliud sursum, aliud deorsum, aliud ad latera vergit.

CAUSÆ tum simplicium, tum cuniculosarum fistularum sunt aut sordida, aut saniosa colluvies, in aliqua corporis parte collecta, vel in tumoribus non tempestive apertis diutius retenta, aut aperto tumore & cicatr

trice obducto prius, quam probe ab excrementis abstersus & expurgatus est. Iidem contingit & in vulneribus perperam & male curatis.

SIGNA fistularum cum Simpl. tum sinuosarum manifesta sunt, videlicet ulcus angustum, & ut plurimum, rotundi orificii cum duritie siue callo, simile fistulis arundinaceis, ut Aegineta refert. ex quo aut sordes aut sanies tetra, nunc spicea, nunc livida, nunc nigra, nunc crassa, crudaque, nunc tenuis ac serosa, rubicunda, aut alba, aut feci similis profluit. Virum autem fistula sit simplex, aut cuniculosa, exploratione indiget; exploratur autem immisso specillo, aut immissa candelula cerea, qua facile & sine impedimento ad cuniculos ulceris protrudi potest, & investigari ad quam partem, & ubi finiatur ulcus, & quam multas habeat cavernas; quin & ex compressione partis affecta, partiumque ulceri circumjacentium facile deprehendi potest, ubi lateant sinus; compressa enim parte cuniculosa, statim per osculum fistula erumpit excrementum; qualitatem vero excrementi ex ulceris profluentis visu deprehendere possumus; crassum enim, sorditatem denotat; tenue vero saniei in ulcere harentis est signum; quod si autem foetidum simul sit profluens excrementum, putrefactionem ostendit.

Signa prognostica in curatione fistularum hac sunt observanda; Fistulosa ulcera in omnibus corporis partibus mollioribus excitari possunt, sed omnium maxime familiaria sunt partibus adanosis & articulis, ut sunt guttur, mamma, axilla, inguina; perniciose & curatu difficilia sunt ulcera fistulosa, qua externas partes perforantes usque ad viscera interna penetrant, ut thoracis fistula ad pulmones, vel ad membranas costas succingentes, vel ad Epur aut Lienem, vel qua in ventre & iliis excitata ad intestina, & ad matricem pertingit; similiter & periculosa est in gutture excitata fistula, iis enim neque sectio, neque adustio, nec caustica remedia tui adhiberi possunt. In senili imbecilli & cacochymico corpore fistulosa ulcera ut plurimum incurabilia esse solent. Vlcus fistulosum sua sponte nunquam persa-

Causa fistularum

Signa fistularum prognostica.

perfanatur, & nisi callus destruat, & maligna excrementa ex ulcere penitus emundentur, frustra tentatur curatio. Pus laudabile in fistuloso ulcere generatum, ubi sine dolore profluere coepit, ulceris conglutinationem & felicem perfanationem promittit.

Curatio.

CURATIO fistulorum ulcerum perficitur per victus rationem, redundantis in corpore humoris evacuationem, per potiones, vitiosos humores exsiccentes, per manualementem operationem. & per Topica remedia ulcerum mundificationi, conglutinationi, & cicatricis inductioni convenientia, de quibus ordine breviter differendum nobis est.

Victus ratio.

Victus ratio, praesertim in esculentis & potulentis, in fistulosis ulceribus ejusmodi instituenda erit, qua redundant in corpore humori quod ex habitu corporis deprehendi potest, causisque ulcerum adversetur, & contraria sit, & qua quam purissimum generet Chylum, qualem supra in morbi Gallici curatione, & alibi passim abunde praescripsimus, & talia quidem sunt ova sorbilia, carnes pulorum, galli, perdicum, vitulorum & juscula carniū bovillarum & juscula ex ovīs. In potu conducit vinum Rhenan. Hydromel & cerevisia clara perfectēque concocta; ira, Venus, moeror animi, & crapula studiosē sunt fugienda. Quod ad vitiosorum humorum evacuationem attinet, si corpus sit plethoricum, vena est secunda; si fistula sit supra diaphragma, Epatica; si infra, vena talaris affecti lateris: sanguisque largiter detrahendus. Si vero corpus cacochimum esse deprehenditur, redundans vitiosus humor ante evacuationem preparari & extenuari debet convenientibus remediis, supra in tabellis remedium, singulis humoribus concoquendis dicatur, enumeratis; ac tandem non semel tantum, sed iterum atque iterum interjectis tantum paucis diebus evacuetur. Corpore probe evacuato tandem reliquia vitiosorum humorum in visceribus venisque capillaribus contenta, sequentibus potionibus per totum curationis tempus exsiccentur ac purificentur; ex iis autem & colluviem in ipso ulcere exsiccant, & carnem bonam generant, ulcusque

Vena sectio & purgatio.

ipsum conglutinant hae sequentia: **R. Agrimon.** cum rad. qua Diosc. est Eupator. Plantag. ma. cum rad. fl. Centau. min. Cardui benedicti, fol. Oliva ubi haberi possunt, sin minus, ejus loco herba Veronic. ana M. s. Rad. Gentia. Asclep. Filicis. Herbis simul concisis & rad. crassiuscule contusis macerentur per noctem cum vini Rhena. lb. iij. & altero die in cantharo concoquantur per duas horas, fiat potio, cujus ℥. v. mane & vespere tepida exhibeantur.

Paracelsus in sua parva Chirurgia gloriatur se fistulas quasque feliciter curasse sequenti decocto, ejus haustum mane, vespere & meridie propinato: **R. Ciclamini**, M. ij. Sannicula M. j. Sophia herb. (qua qualis sit, per invidiam, non explicavit Paracelsus, sed dicit tantum flores proferre caeruleos, & in illis nasci. Ego autem cum nesciam quid sit Sophia, ejus loco Veronicam herbam substituendam esse judicavi) M. s. Concisa decoquantur cum vini Rhena. lb. ij. in duplici vase, fiat potio. Quibus admiscere jubet Paracelsus singulis libris Ol. Garioph. stillat. ℥. lb. At ego his omnibus praefero usurpationem decocti rad. China vel sarmenti Indici, cujus parandi & utendi rationem in curatione morbi Gallici liberalissimē Studiosis communicavi. His itaque provisus ordinatisque, mox ad Chirurgiam h. e. manualementem operationem, qua circa ulcus fistulosum peragenda est, accedendum erit; omnium primum inspecta fistula si ulcus sit in parte libera & aperta, specillum aut candela cerea ulceri inferatur, & accuratē exploretur sinus ulceris & amplitudo, cavernarumque numerus & constitutio, ac utrum fistula sursum, deorsum, introrsum, vel ad latera se protendat, quin & excrementi in ulcere contenti consistentia, color & qualitas observanda erit, utrum videlicet sordidum sit, aut saniosum, aut ex his simul mixtum; deinde qua symptomata fistula sint copulata, plerumque enim conjunctam habent aut duritiem, aut praternaturalem calorem, qua nisi prius removeantur, frustra tentatur curatio: Quibus autem remediis singula symptomata sint removenda, supra in curationibus

Potiones exsiccentes.

Chirurgia.

zione ulc. cum Symptom. copulatorum abunde proposuimus. Vbi itaque fistulosum ulcus in aliqua parte ita sit dispositum, ut ejus orificium deorsum, fundus autem sursum vergat, tantum os fistula, si angustius & justo strictius est, scalpello aperiatur dilateturque, ut omnis colluvies ex ulc. liberè profluere queat, & retineatur apertum inserto orificio frustulo rad. Gentiana fistula adaptato, aut rad. Brion. aut inseratur orificio fistula frustum Spongia cui filum est appensum, ita enim dilatatur orificium fistula ut commodius collyria aliaque remedia fistula convenientia injici possint; pars autem affecta, si ulla ratione fieri potest, ita disponatur & configuretur, ut Orific. fistula deorsum spectet. Verum si id ulceris situs & partis affecta constitutio non permittat, aut si fundus fistula deorsum vel introrsum vel ad latera vergat, tum industria manuum operatione ex opposita parte caro & cutis usque ad sinum perfodiatur, ut colluvies profluere queat, vel, quod nobis magis arridet, ulcus ipsum ab ejus orificio usque ad fundum & terminos sinuum novacula incidatur, aut auro, vel ferro candenti usque ad sinus incurvetur, & omnis in ulcere callus exstirpetur; nec alia ratione callus exstirpari potest quam vel per incisionem, vel per adustionem, vel per causticorum remedium violentam erosionem. At vero si fistulosum ulcus in aliqua nobili parte corporis, aut ubi venarum & arteriarum est concursus, ab alio loco sit constitutum, ut sine periculo nec incidi, nec inuri, nec causticis remediis callus tolli queat, & praescriptis vulnerariis potionibus non persanetur; tum satis fuerit orificium ejus, quatenus fieri potest, dilatare, & rebus jam dictis insertis apertum retinere, ut sordida colluvies liberè profluere, atque collyria & liquores instillari queant, & tamen in ejusmodi fistulis calli exstirpatio molenda est, inserta, si fieri potest, post elutionem ulc. quotidie nova radice Ellebori nigri.

Symptomatum cura. Cum autem ex ejusmodi manuali operatione incidendo, adurendo, & caustica remedia imponendo, ut plurimum hæc Symptomata excitari consueverint, sanguinis eruptio,

dolor, & inflammatio, statim sanguinis fluxor compescendus erit ovi albuminibus concussis & stupis mundissimis exceptis, fluentique ulceri impositis, aut aliis remediis sanguinis eruptionem sistentibus, qua supra inter remedia Chirur. & paulo post in curatione Ulc. commemorabuntur. Dolor similiter anodynus remediis dolorem mitigantibus, qua supra in tumorum curatione proposita sunt, compescendus erit. Ita & inflammatio refrigerantibus sedari mitigarique debet, ex quibus utilissimum est ut ulcus inflammatum eluatur decocto hordei aut hydromel. in quo concocti sunt flo. Rosa. & fl. granatorum; his omnibus rite & artificiosè peractis, ad Topica remedia deveniendum erit; ac primum quidem in expurgando ulcere & abstergenda omni colluvie, siue ea sit sordida, siue saniosa, hæc semper regula est observanda, quod omnibus ulceribus sordities absterforia, sanies vero ad sui sanationem exiccantia desideret: Sordes quidem probè abstergit inter cetera Ol. Vitrioli; Sanies egregiè exiccant inter alia, Ol. Stillavit. ex Sulphure. Quotidie itaque eluatur ulcus fistulos. aut Hydro. aut Vino rubeo in quo concocti sunt rad. Asclep. Aristol. longa, Herb. Veronica, Agrimo. Thus & Myrrha pro libitu artificis, aut Decocto solius sarmenti Indici; Verum si sordes in ulcere tenacius inhæreant, acrioribus lavamentis est utendum, ut sunt acre lixivium, cui mel rosa. est admixtum, aut ulceri imponantur linamenta inuncta Unguento Ægyptiaco, aut Apostol. quibus si admisc. Ol. Vitr. efficacius fiet medicamentum; Quin & ipsum solum Ol. Vitrioli illitum, omnem sorditiem egregiè abstergit.

Aut R. Terebinth. lota ℥. iij. Mel. ros. ℥. j. s. Pul. Aristol. rot. ℥. ij. Farina lupin. ℥. s. Succ. Apii, Cynogl. ana ℥. vj. coquantur fiatque Unguentum. Aut imponatur ulceri sequens liquor siue collyr. R. Vini sublimati siue destillati ℥. ij. Vini Malvati. ℥. j. Mel. ros. ℥. s. Myrrh. ℥. ij. Sarcoc. Aloës ana ℥. j. s. Decoquantur leniter, fiat Collyr. Et hæc quidem omnia aut per Syringam infundi, aut linamentiis carptis ulceri imponi possunt;

Elo

Confert hic Magister. Minii. Essent. hederæ. faniculæ. folior. Rubi. consolid. regal.

Eloto probèque ab omni impuritate fistuloso ulcere mundificato, si adhuc sanationem Ulceris impediatur Callus, is, ut diximus, vel novacula excindatur, vel adurendo destruat, vel impositis causticis remediis mortificetur. Verum antequam Caustica remedia indantur, pars ulceri circumjacens illiniatur inungaturque Unguento defensorio ex bolo German. & ol. rosa. parato, ac tandem hac sequentia remedia callos tollentia inserantur; ut sunt rad. Ellebo. nig. aut glans, sive tenta hac ratione parata; R. Ærug. Gum. Ammon. ana ʒ. ij. cum acerrimo aceto vini, conterantur in calido mortario, & formetur glans. Aut repleatur ulcus cinere rad. li. alb. His validiora sunt ad exstirpandum callum, pulv. Troch. de Asphodel. aut Troch. de Arseni. subli. cum aceto resolutus & instar Collyrii, aut Linimenti cum penicillo illitus, vel per siphonem impulsus. Eiusdem efficacia sunt & trochisci de Minio à Vigone descripti, qui hac ratione concinnari possunt: R. Mercu. sublimati tenuiss. contriti ʒ. j. Fermenti acerr. ʒ. iij. Minii pictorum ʒ. x. Mucag. sc. Lini q. s. Contundantur exactiss. & conformentur trochisci ac in furno Cal. exsiccentur, & necessitate postulante drachma ejus cum aq. rosa. & plantag. ana ʒ. ij. resolvantur, & per siphonem instar Collyrii ulceri imponantur. Aut R. Unguent. Ægypti. ʒ. j. s. Mercu. & Arse. sublimatorum ana ʒ. ij. aq. Plantag. Rosa. ana ʒ. ij. resoluta ebulliant ad tertias, fiat Collyr. & per Siphonem ulceri imponatur. Ulcus autem si non sit incisum, ejus orificium imposito Linimento obstruatur, ne ex eo liquor impulsus effluere queat. Idem præstat & aq. fortis aurificum per siphonem ulceri impulsus: Sed ego in iis callosis ulc. ol. Vit. illitum, aut ol. è sulph. Chimica arte destillatum longe præfero.

Callo omni ex ulcere eradicato, si per caustica remedia dolor denuo in ulcere est excitatus, Catapl. imponatur ex ovorum luteis & ol. rosa. confectum. Si denique rursus sordida colluvies in ulc. sit collecta, post ablutionem cum prescriptis lavamentis seq. Catapl. imponatur. R. Terebinth. cum Vino stilla-

tit. elota ʒ. iij. Mell. rosa. ʒ. j. Myrrh. rad. Peuced. ana ʒ. ij. Sarcocolla, Aloës, ana ʒ. j. s. Absterge ex ulc. fistuloso omni sordida colluvie, ubi jam pus laudabile in ulcere generari incipit, remedia imponantur carnem generantia, conglutinantia & cicatricem inducentia. Carnem autem generant inculpatam in ulcere hac sequentia: R. Terebinth. Mell. rosa. ʒ. j. Sarco. ʒ. iij. Ichtiocolle, Tragacanth. ana ʒ. iij. Antimon. præp. Plumbi usi ana ʒ. ij. Suc. Centaur. mi. ʒ. iij. Croci ʒ. j. fiat Empl. Aut imponantur prescripta Empl. de Ærug. aut de vernice pictorum, aut de Litharg. aut de Cadmia.

Vlcus virulentum quid, & quæ ejus species?

Εἰς ἄρξιν ἱκανότες, ulcus saniosum, et infressender offener schade / est ulcus ferocissimum, à tenui ac erodente & venenato excremento sanguineæ massæ in aliqua corporis particula collecto, excavatum, & exulceratum. Ἰχὼς enim sive sanies, sive virus, ut in superioribus diximus, nihil aliud est quam tenuis, acris & erodens humor, vel ex corrupto bilioso sanguine, vel ex sanguine pituita in massa sanguinea, vel ex corrupto melancholico sanguine collectus & effusus; tale virus & tenuis sanies sæpe in concreto sanguine è secta vena detracta conspici potest: qualis autem sit sanguinea massa, ex qua virus generatur, ex colore saniei facile dignosci potest; nam si sanguis simplex corruptus est, lotura carnis recenter mactata sanies similis est; flavus vero ejus color biliosum sanguinem, sed instar aqua vel seri. tenuis sanies sanguinem pituita ostendit.

Melancholici vero sanguinis sanies fusca aut subnigra aptaret, inter has malignissima est sanies atrabilaria; omnes autem hæ saniei species naturam proprietatemque obtinent erodendi, & venenata sua qualitate corrumpendi exulcerandique, & ex iis omnes ferè scabiei pruritus & exulcerationis species in corpore excitantur. Sunt autem ulcerum virulentorum tres species ferociores. Vlcus depascens, ulcus erodens sive devorans, & ulcus cancrum: Paracellus Chimista excel-

De Ulcere virulento.

Virus quid?

lenz,

Ulcere *lens, qui se monarcham in arte Medica esse gloriat, magister obscuritatis, tris nova principes contra Aristotelem, Platonem & omnes Medicos finxit & excogitavit, Sulphur, Mercurium sive argentum vivum, & Sa-*

Principia
Paracel-
sitarum,
sulphur,
Mercuri-
us &
sal.

lem; ex iisque, & non ex elementis omnia corpora consistere, asseverat, & horum trium symmetriam & inculpatam commistionem sanitatem esse; & non ex temperamenti aut humorum puritate & aquabilitate sanitatem, ut Medici putant, pendere; & ex eorundem condensatione & resolutione in corpore, omnia morborum genera excitari: Et hac magna contentione contra evidentissimam rationem & demonstrationes defendere conatur. Quid autem per sulphur, Mercurium & salem in corpore intelligi velit, in suo monstroso Paramiro explicat, inquit: Quicquid in corporibus igneum est & apertum, promptumque ad celerem inflammationem, id omne sulphur est; & quicquid aqueum à calore agitarum in fumum vaporemque resolvitur, Mercurius; & quicquid ab igne in cinerem, aut calcem convertitur, id omne sal erit. Iam quaso quantum reipsa à Galeno Paracelsus discendat! nimirum sola vocabulorum commutatione; certum enim est, in humano corpore nec sulphur, nec Hydrargyrum, nec salem materialem contineri aut reperiri, etiamsi negari nequeat inesse corporibus quiddam naturam sulphuris potentia habens, & Salis & Mercurii; cum autem nil sit in corpore quod promptius inflammetur quam bilis flava, quid aliud erit sulphur Paracelsi quam bilis flava Galeni? Et cum nihil in corpore citius effumet atque evaporet à calore quam pituita, ipsa pituita erit Mercurius Paracelsi; nihil autem in cinerem calcemve celerius ac promptius atra bile convertitur, idem sal erit Paracelsi: & tamen Paracelsus hisce prestigiis & Philosophorum & Medicorum principia tollere, & universam artem Medicam evertere conatur. Sed nunc redeo unde digressus sum, & dico sava illa ulcera Græcè Nomodem & Phagedænam & Carcinodem, ex virulentis & tenuibus excrementis vel biliosis, vel pituitosis, vel Melancholici sanguinis

corrupti generari; sive quis ea saniem, sive virus, sive sulphur, sive salem, sive cinerem calcemve appellet; etiamsi Paracelsus omnia ulcera ex salium varietate generari dicat. Haec verò dua ulc. ferocium species Depascens & erodens, non nisi malignitatis ac ferocitatis extensione & remissione inter se differunt; utriusque itaque curationem nobis conjungere placuit.

Depascens & exedens ulcus quid, quæ utriusque causæ, signa, & quomodo curandum?

De ulcere
exedente
& depa-
scente.

Nomen sive vocat; ulcus depascens, vel Lupus, Ein tieffer fressender schade / oder Wulff. Quamquam Lupi vocabulum à quibusdam Cancroso ulcere tribuatur, tamen non ineptè omnibus tribus virulenti ulceris speciebus attribui potest, cum omnia instar lupi famelici exedant, erodant, & depopulentur; Est igitur Lupus ulcus quod sua virulenta, maligna & venenata qualitate non solum affectam carnem excavat & erodit, sed & vicinas & circumjacentes partes exedendo depopulatur. Phagedena erodens & exulcerans ulcus, Ein umbsich fressender schade in der Haut, Phagedena paulo mitior est nomode, & est ulcus quod serpendo & obambulando cutem erodit, & aucta ejus malignitate tandem in Nomodem degenerat, & non modo cutem erodit, sed & carnem subjectam excavat. Phagedena species sunt impetigo & serpigio, cutis exulceratio, de quibus in curatione affectuum cutis differuimus.

Nomen
sive lu-
pus quid.
Phagede-
na à No-
me ut
differat.

CAUSA & depascens & exedens ulceris est, ut paulo ante diximus, virus sive sanies venenata à corrupta massa sanguinea, cui vel bilis retorrida, vel falgugo pituita, aut cinis atra bilis adusta est admixta, & quidem postrema causarum omnium savissima, & ut plurimum cancrosa ulcera excitat.

Causa
Nomæ
& pha-
gedenæ.

SIGNA tum exedentis tum erodentis ulceris evidentia sunt; in Nomode enim non tantum caro ulceris subjecta, sed & circumjacentes sana pars excavat, & absimitur; in Phagedena verò initio quidem sola cutis, veluti in herpete, sive serpigrine, eroditur & exulceratur, serpendoque se magis atque magis

Signa.

dilatatur ac expanditur, cujus venenata qualitas processu temporis adaucta, & carnem tum subiectam, tum ambientem exedit, & in Nomodem degenerat.

Curatio.

CURATIO virulentorum ulcerum Nomodes & phagedena quatuor adminiculis peragenda est. 1. victus ratione, 2. redundantis vitiosi humoris in sanguinea massa expurgatione. 3. reliquiarum saniei in venis exilibus partium affectarum exiccatione.

Victus ratio.

4. ipsius ulceris per topica remedia persanatione. **Victus ratio**, quantum ad alimenta atinet, talis esse debet, ex cuius usurpatione inculpatus generetur Chymus, & qui corporis intemperiei & vitiosorum humorum in corpore redundantia per omnia aversetur, siue vitiosus humor sit bilis retorrida, siue pituita salsa, siue atra bilis adusta. Qua autem esculentia & potulenta singulis intemperiei speciebus & vitiatibus humoribus conferant, passim in particularibus, & in tractatione de alimentorum temperamenti supra proposuimus. Post ordinatam victus rationem diligenter consideretur affecti corporis intemperies, & humoris in corpore redundantis species, ac mox cum per venasectionem, si necessitas expostulet, tum per convenientia pharmaca cathartica semel atque iterum ac etiam sapius vitiatius humor subducatur & evacuetur.

Venae sectio & purgatio.

Si itaque corpus sit plethoricum, vena secetur, & si quidem ulcus sit supra Diaph. situm, vena cubiti; si infra, vena talaris, & semper affecti lateris. In evacuatione autem corrupti ac vitiosi humoris ea remedia deligenda sunt, quae singulis humoribus evacuandis sunt dicata, & longa experientia comprobata. Quorum copiam & formulas passim in particularibus curationibus, partim etiam in tabellis remediorum purgantium abunde commemoravimus; hac tamen observata regula, quod si vitiosus humor crassus sit, lentus aut concretus, qualis esse solet pituita salsa & atra bilis, ut is ante evacuationem per convenientes potiones & decocta concoquentia extenuetur, & ad eductionem aptus habilisque reddatur; quibus autem remediis singuli crassi & crudi humores sint concoquendi, &

fluidi efficiendi, ex tabellis concoquentium remediorum peti debent. Reliquias à purgatione vitiosorum humorum, & saniei ad ulcus fluentes, & in ipsis parvis venis partis affecta harentes potentissimè exiccat, & ipsa virulenta ulcera abdita proprietate mirificè conglutinat, & persanat decoctum rad. Chyna aut sarmenti Indici, si per tres septimanas singulis diebus mane una libra exhaustiatur, cum eoque sudor ad spatium sesqui hora aut amplius propellatur. Ejus medicamenti parandi utendique rationem in superioribus liberalissimè docuimus. Verum si per decocti huius usurpationem ulcus sua sponte non coalescat, ad topica remedia, quae astringentia & refrigerantia, sine mordicatione tamen esse debent, confugiendum erit, inter quae omnia virulenta ulcera egregiè desiccant, constringit & conglutinat, sanieique reliquias proicit, vapor vini rubei in candentia ferri excrementa instillati & conspersi, debet autem vapor fervens, quantum fieri potest, in ipsum vulnus recipi, partem affectam & exulceratam in vas aptum collocando, in quo reposita sunt candentia excrementa ferri, ac diligenter pulverinibus obtegendum vas, quod commodius ulcus ipsum vapore imbui queat. Hoc unico duntaxat remedio creberrimè ego Herpetes, Lichenas & alia erodentia ulcera felicissimè persanavi: Talis autem vaporatio per plures dies ad spatium unius hora continuari debet, excremento ferri refrigerato subinde mutato, exiccato tandem sua sponte ulcus abluitur aut liquore qui initio in destillatione Ol. vitrioli profluxit, aut liquore qui in preparatione florum Sulph. emanavit: quae autem ratio & Ol. Vitr. & flos Sulph. sunt conficienda, in nostra Iatrochimia, Deo volente, sine anigmatibus edocebimus. Quae remedia si in promptu non sunt, utilissimum erit omnium primum Nomodam aut phagedanam abluere aq. stillat. Plantag. aut rosa. in quibus non nihil aluminis sit resolutum, aut abluere vino styptico in quo decocta sunt Cort. & flor. granator. & rad. plantag. fol. veronic. aut decocta sarmenti Indici. Abluto ulcere si adsint Symptomata, videlicet dolor,

Sarsa & China.

Optimè hic facit Ol. Petrol. Balf. indic. Ol. Camph. Magister. Ocul. cancri.

dolor, inflammatio, durities, aut varix, ea sunt diligenter amovenda & sedanda, ejusmodi remediis quæ partim in tabellis remed. Chirurg. partim in Symptomatibus tumorum sunt enumerata. Ne autem virulentus humor latius serpat, ambientemque carnem sanam devastet, per circuitum ulceris prodest cutem incrustare, & inungere unguento ex bolo Arme. ovi album. & pauxillo Ol. rosa. confecto. Cavitati autem ulceris excicanda virulencia causa imponatur tenuis pul. aut Croci Maris. aut pul. Antimon. vitrificati, aut Merc. præcip. aut flo. Sulph. aut Plumbi usti: quæ Chimica remedia quæ ratione sint paranda, in Iatrochimia descripturi sumus. Hæc si in promptu non sint, cavitati ulceris imponere licebit linamentum carptum, sive ramos floccos ex linteolis mundis convolutos & imbutos, aut unguento albo Rhasis, aut ung. Diapompholigos à Gal. descripto, aut ung. refrigerante Galeni; aut imponatur sequens unguentum: R. Ol. rosa. viola. ana ʒ. j. s. Medulla crurum vitulinorum ʒ. j. Succ. Plantag. Solani ana ʒ. concoquantur leniter ad absorptionem succi & colentur, eisque admisce. Cerussa ʒ. vj. Litharg. ʒ. j. & Cera alba dissoluta ʒ. s. quæ simul commixta in mortario plumbeo diutissime subigantur. ut plumbeum acquirant colorem, deinde admisce Camphora ʒ. s. fiat unguentum: præscriptis remediis repleto ulcere superimponatur pulvinar ex complicatis linteolis ulceri adaptatum, ac deinde fasciis convenientibus leniter constringatur; aut loco pulvinaris ulceri commodissime imponi potest lamina plumbea foraminibus exiguis pervia, ut virus evaporare queat. De deligatione ulceris, quæ diligenter in ulceribus & vulneribus curandis est observanda, paulo post in curatione vulnerum edocebimus. Porro si virulenta ulcera inflammatione tenentur, quod nonnunquam contingere consuevit, refrigerantia supra in curatione phlegmones commemorata, imponenda erunt; similiter si adsit ulcerum durities emollientibus remediis, paulo ante in ulc. cum duritie curatione commemoratis, durities tollatur;

ita si varix insit ulceri, abscindenda erit, ut superioribus docuimus. Hisce remediis si ulcus non conquiescat ab erosione & exesione, sed pergat instar Lapi famelici sanas partes absumere, ad miserabile & ultimum præsidium est confugiendum, & pars affecta erit excindenda, aut penitus amputanda, vel remediis causticis caro ulceri caustica. subjecta penitus exurenda; id quod in superioribus præstare diximus pul. troch. ex Arsen. Calcinato aut Mercur. sublim. ulceri inspersis, ac ita exstirpata carne infecta facilius ulcus cum Empl. de litharg. aut lap. Calam. ad sanitatem deduci potest.

Cancer exulceratus, sive ulcus cancerosum quid, quæ ejus causæ, signa, & quomodo curandum?

De cancro exulcerato.

Καρκινωμα, ulcus cancerosum, eum offender Krebscher Schade / est inter ulcera virulenta omnium malignissimum, ex cinere atra bilis sive adusto Melancholico sanguine proveniens. Canceri nomenclatura duplici affectioni tribuitur; Cancro tumori, cujus curationem inter tumores tradidimus; & ulcri cancroso, sive tumori cancro exulcerato, cujus causas, signa & curationem hoc loco quam brevissime perstringemus.

CAUSÆ exulcerati Canceri sive ulceris cancerosi, ut diximus, est cinericea colluvies atra bilis sanguinea massa admixta, sive sanguis Melancholicus retorridus ad aliquam particulam confluens, tumoremque excitans primum, ac tandem virulento suo excremento erodens & exulcerans.

Causæ ulceris cancerosi.

SIGNA canceri exulcerati evidentia signa sunt; nam inter omnia ulcera acerbissimos excitat dolores, & ut plurimum tumor canceri exulcerationem præcedit; in exulcerato autem cancro caro erosa inæqualis & subnigra sorde madescit, & horrida apparet; ex qua continuè subnigrum aut fulvum virus, h. e. tenuis & erodens humiditas emanat, quæ ut plurimum gravi odore adstantium nares ferit, & labra habet pratumida.

CURATIO exulcerati canceri eadem Curatione ferè

Symptomatum cura.

ferè est, quam supra in Cancritumoris descriptione proposuimus. Tota autem curatio cancerosi ulceris consistit in victus ordinatione, in Melancholia adusta preparatione, & evacuatione, ac reliquorum seminariorum ejus per sudorificas potiones exstirpatione, postremo tandem in Topicorum remediorum applicatione.

Victus ratio.

Victus ratio melancholici humoris adusti qualitati contraria esse debet, & totius corporis intemperiei, quæ ex superioribus Melancholicorum morborum curationibus, & potissimum ex curatione tumoris canceri, peti, & huc transponi potest, hoc tamen observato,

Alterantia epatis intemperiem.

Purgatio.

quod si Epar agrotantis astuet, refrigerantia alimenta, quale est cremor ptisana & jusculeum Vis immaturis cocta, & serum lactis offerenda erunt, additis inunctionibus refrigerantibus dextri Hypochondrii, qualia supra in inflammatione Epatis sunt proposita. Similiter & remedia, quibus Melancholica impuritas in sanguine extenuatur & expurgatur, ex superioribus curationibus Cancritumoris & insania Melancholica huc transferenda erunt: & expurgationes quidem reterrida Melancholia non semel duntaxat, sed crebrius etiam reiteranda erunt; inter ea autem remedia qua Melancholicum humorem exactè evacuant, ego primum locum tribuo succo Ellebo. nigri, quem extractum Ellebori vocant, quod nihil aliud est quam maceratarum rad. Ellebo. in aliquo liquore decoctum expressum, quod tandem percolatum, leniter tantisper decoquitur, donec condensatur; qua ratione & succus Glyzir. confici solet; ejus condensati succi si ʒ. s. aut integer in forma pillularum trium aut quatuor exhibeatur, Melanchol. humorem & reterridam bilem valide expurgat. Idem quoque prestat, ac cinerosum sanguinem purificat, gemma Antimon. quam vitrum Antimon. vocant, si ejus tria grana cum conf. Rosa. commixta exhibeantur. Ad evacuationem Melancholici sanguinis, si corpus sit plethoricum, plurimum facit & vena Epatica sectio, ulcere supra diaph. existente, infra vero, vena talaris ejusdem lateris, in quo

Vena sectio.

cancer haret. Ita quoque magnoperè confert, si in mulieribus consueti menses suppressi promoveantur, & in viris consuetæ hamorrhoides suppressæ aperiantur. Reliquias à purgatione melancholici cineris absumit mirisicè & ulcus ipsum per sanat, si per tres septimanas sudorifica potione ex rad. China aut Sarfa & menti Indici ager quotidie utatur, & eodem decocto cancerosum ulcus indies bis abluatur.

Preparandi autem & utendi hujus decoctionem in superioribus tradidimus. Quod ad topica & chirurgica remedia attinet, diximus in superioribus, nempe in curatione Cancritumoris, Cancritumorem & incisionem parum presidii ejus curationi adferre; nisi enim cancer venenosus una cum adjacentibus venis penitus radicitusque extirpetur, & omnis sanguis melancholicus exprimatur, & emulgeatur, id quod vix sine vita dispendio peragi potest, Cancerosus tumor & ulcus sanari non potest. Nam ex una gutta infecti sanguinis, in venis relicta, facile rursum Cancer suppullulat & recrudescit; tam immanis belua est Cancer, ut leviora quoque Topica remedia, prorsus contemnat; validioribus autem ferocior magis reddatur. Præstiterit itaque in Cancritumore, præsertim si inveteratus est Cancer, blandientibus & dolorem mitigantibus virosaque colluviei acrimoniam confringentibus ulceri impositis miseram vitam prorogare, quam veram ac integram curationem sperare, nisi summi Medici Christi manus & presidium accedat, miraculosaque sanatio fiat. In initio tamen exulcerati Cancritumoris, ubi doloris acerbitas est sopita, ad ejus curationem, antequam radices agat, accedi, & Cautisticis remediis seminarium ejus destrui, & exstirpari potest, quamvis non sine acerbulo dolore. In hunc usum valde celebratur arsenicum sublimatum, si tenuiss. pulverisatum ulceri unius diei spacio inspergatur, quemadmodum & in superioribus semel atque iterum docuimus. Verum qui causticis remediis ad Cancritumorem extirpationem uti volet, necesse habet ut circumjacentes ulceri sanas partes, quod ab inflammatione immunes sint, prius Li-

Sarfa & China.

Excisio canceri.

Incipientis Cancritumoris curatio.

Arse. nicum sublimatum.

nimento

nimento ex bolo Germa. Mucag. Psyllii & panx. Ol. rosa. confecto probè obliniat, & incrustet; exesa autem omni virulenta carne in Cancro statim dolor & tumor in loco affecto anodynus remediis mitigandus erit, ac postremò ulcus curabitur abstergentibus & cicatricem inducentibus; & Empl. qualia sunt de Lithargyrio, vel lap. Calam. vel de vernice, qua in superioribus sunt descripta, non neglecta interim ablutione cum decocto Sarmenti Indici, aut Veronica herba; & per talem quidem curationem recentis Cancrosi ulceris benè sperandum est, si in ulcere caro inculcata appareat, & nulla virosa colluvies, sed laudabile pus in eo generetur, &

Inveterati cancri curatio. omnis gravolentia in ulcere sit sopita. In inveteratis verò cancriosis ulceribus, & virulenta qualitate altius imbutis, aut etiam recente Cancro, qui in loco abdito, aut nervosis partibus est exortus, (ut superius quoque monuimus) nec igne, nec causticis remediis, nec praefusione malum curari potest; sed magis per ea exacerbat. Satis itaque erit ulcus ipsum in mitiori suâ constitutione vel cunctis remediis blandientibus, & sanici acrimoniam infringentibus, doloremque mitigantibus conservare, non interim neglecta victus convenienti ratione, & crebrioribus

Topica cancro mitigando. adusta Melancholia expurgationibus, ut paulò ante dictum. Inter cetera autem cancro mitigando convenientia remedia nobiliora & salutaria habentur hac subsequencia: Cancrosa ulcera recentia non tantum mitigare, sed & persanare creditur aq. stillati ex humano sanguine, comparatur in balneo Mariae Chimico instrumento ter quaterve aquam elicitam in faeces iterum infundendo, si ea plūs indies eluatur, vel instar Epith. imponatur: potentissimè & Cancrum ipsum persanat plumbum mortificatum, cuius mortificatio hac ratione fit: Plumbum ustum in cucurbitam vitream reponatur, & in aq. fortis aurificum superinfusa resolvatur, resolutum plumbo omnis aqua fortis iterum effundatur, & pulvis plumbi in fundo Viri relictus, cum aq. tepida vel rosa. vel Solani abluatur, & ulcri inpergatur, aut ex eo

cum q. s. ol. rosa. Linimentum concinetur, & Linimentis exceptum ulcri imponatur. Accebitatem doloris in Vlc. Cancroso egregiè mitigant succ. Solani, plantag. & Veronica, aut sigillatim, aut simul mixti instar Epith. impositi. Efficacissimum quoque est mitigando dolori in Cancro sequens Linimentum: R. Suc. Solani, Poligo. Plantag. ana ʒ. j. Ol. rosa. Viola. ana ʒ. j. s. Coquantur lento igne ad succi evaporationem, & ol. colato admisc. plumbi usti eloti, Tutia preparata ana ʒ. j. s. & in plumbeo mortariolo cum pila plumbea tantisper conterantur, subiganturque, donec Linimenti crassitiem, & plumbeum colorem consequantur, quod Linimentis exceptum ulcri imponatur. Mirificè quoque ex stirpibus commendatur herba Roberti, qua & rostrum Ciconiæ, Gracis autem Geranion dicitur, cum caulibus rubentibus, si contusa, aut ejus succus expressus ulcri imponatur. Plumbi quoque lamina tenuissima foraminulis pervia Cancri furem compescit ulcri alligata: Quidam Cancro exulcerato, sicuti & Nomadibus, & Phagedenis, qua & Lupi nomine appellantur, singulis diebus frustulum Carnis gallinaceæ, aut vitulina imponunt, qua voracitatem ulcri saturant, ne carnem ulcri amplius erodat; sed cancrorum aquatiliū crudorum carnosam pulpam exceptam, & contusam ulcerique impositam, prescriptis carnibus convenientiorem esse judico.

Herba Roberti.

Plumbi lamina.

Quibus in partibus corporis potissimum & frequentius excitantur ulcera?

In omnibus ferè corporis partibus qua sanguine nutriuntur, omnia genera ulcerum pro varietate sanguinis saniosque excrementi, in massa sanguinea contenti, & in aliqua parte collecti viam sibi facientis, & particulam exulcerantis, existunt, ut in capite, naribus, oculis, collo, faucibus, axillis, humeris, Thorace, pectore, mammis, ventre, Matrice, Virga, inguinibus, cruribus, Tibiis & pedibus. Sed omnium frequentissime ulcera diuturniora excitantur

Qua partes exulcerari solent.

Ulcera in tibiis, cum propter vitiosorum humorum
tibiarym gravitatem deorsum delabentium, tum pro-
cur diu- pter crebriores motus pedum, crebrioresque
turna. stationes, in quibus totam molem corporis
bajulant; cum autem reliquorum particu-
larium ulcerum curationes in singularum
partium vitis curandis antea explicaveri-
mus, supervacaneum esse arbitramur eo-
rum ulcerum curationes repetere, sed Stu-
diosos ad superiora ablegamus. In omnibus
autem curationibus ulcerum id pramonere
Chirurgia Studiosos satis erit: In particula-
ribus ulceribus omnibus diligentissime obser-
vandum esse, ad quod genus ulceris, quod-
libet ulcus particulare referri queat, &
utrum sit simplex aut complicatum, for-
didum, putridum, saniosum, malignum
& virulentum; quo cognito semper ejus cu-
ratio ex eodem genere peti & applicari debet.
In fine itaque satis fuerit generalia remedia
omnibus ulceribus convenientia duo adsigna-
re; unum quidem omnibus, alterum tibiæ
conveniens.

Liquor generalis per sanando omnium
ulcerum generi.

Aqua R. Terebinthi. sapius abluta lb. j. s. Ver-
stillaticia nicis Piclorum lb. j. Thuris, Masti. pulv.
ad omnia ana 3. j. s. vini sublimati, sive cremabilis
ulcera & 3. ij. commixta, & vitrea cucurbita impo-
vulnera. sita, in tepido loco per triduum macerentur,
subinde commovendo, deinde in ferventi
arena Chimico artificio destillantur, qui li-
quor linteolis exceptus omnia ulcera & vul-
nera per sanat.

Decoctum ad Tibiarum Ulcera.

Deco- R. Aluminis, Vitri ana 3. ij. Ærug.
ctum ad 3. j. Rosa. rub. veron. ana M. j. contusa in
tibiarym 3. j. Rosæ. rub. veron. ana M. j. contusa in
ulcera. stiptici vini lb. ij. in duplici vase coquantur
& colentur, quo liquore ulcera tibiarym
si abluantur, ac Empl. vel de Litharg. vel
de lap. cala. vel de vernice piclorum, quod
convenientissimum videbitur ulceri impona-
tur; quod eo feliciter per sanatur.

Chirurgicarum curationum
de vulneribus.

De vul-
neribus.

SECTIO III.

Continui solutio quid, quot modis accidit,
quibus instrumentis, & quæ solutæ
continuitatis species?

Continuitatis solutio in vulneris definitio- Continui
ne generis locum obtinet; citra cujus decla- solutio
rationem tractatio de vulneribus minus re- quid?
ctè intelligi potest. Est autem continui sive
continuitatis partium humani corporis solu-
tio sive unionis divisio, unum ex morborum
generibus, ut in superioribus tradidimus;
nimirum tria duntaxat morborum genera
esse, intemperiem, malam configurationem,
sive compositionem, & unitatis solutionem
alicujus particula. Cum itaque aliqua par-
ticula, sive ea sit similis, sive instrumen-
taria, quæ antea naturâ unita & con-
tinuata erat, quoquo modo dividitur, jam
continui solutio ejusdem partis dicitur.
Modi autem per quos continuas partium
dividitur, solviturque, sunt erosio, inci-
sio sive sectio, & præcisio, punctio sive
perforatio, morsus, impulsio, contusio, Quot
fractio, ruptio, distensio, convulsio, col- modis
lisio & apertio orificiorum. Instrumenta fiat.
externa per quæ fiunt Continuitatis solutio- Arma
nes, sunt omnia armorum genera, corpora- cætera-
que dura, & renitentia, violentius inci- que id
dentia. Armorum autem genera alia sine genus
acie, alia acuitate prædita, alia vero sunt quæ Con-
obtrusa. Acie prædita sunt gladius, ensis, tinuita-
securis, culter & dentes animantium. tem sol-
vunt.

Acutie sive acumine prædita sunt mucro,
cuspis, pugio, telum, sagitta, ignis sive
res ignita, caustica remedia & animantium
cornua & jacula sive aculei. Obtrusa sunt,
globus sclopeticus, lapis, malleus, fustis,
baculus, pugnus. Ponderosa quoque partibus
incidentia, & gravis corporis collapsio.
Sunt & interna instrumenta continuitatem
solventia, ut flatus, & humorum copia eo-
rumque acrimonia.

Internæ
causæ
continui-
tatem
solventes

Species

Species soluta *Species soluta sive divisa* *continuitatis in*
varius partibus varias *fortiuntur* *appellatio-*
nes; continuitatis namque solutio in sola cu-
te per erosionem, aduersionem aut attritio-
nem, effecta, Græcis διαβρωσις h. e. exco-
riatio dicitur. In cute simul & carne per ero-
siorem humorum facta divisio, ἔλκος h. e.
ulcus dicitur. In cute, carne, & reliquis
mollioribus partibus casim illata divisio
τεῦχος, h. e. Vulnus appellatur. In easdem
partes, per armorum acuitatem inflata di-
visio, punctura & confossio. Eius gestochene
wunde dicitur, propriissime tamen nervorum
vulnus punctura vocabulum sibi vendicat.
Punctio. *Continuitatis solutio in ossibus & Cartilagi-*
Fractura. *nibus τελαρμυξ h. e. fractura, ein Bein-*
bruch/ & in membranis πύγμυξ, ruptura, ein
Ruptura. *riß oder bruch der Vellen / dicitur. Si verò*
venarum aut arteriarum ob plenitudinem,
aut sanguinis acrimoniam oscula aperiantur,
ut sit in eruptione sanguinis è naribus, venis
Hæmorrhoidum, & venis Matricis, in men-
sum profusio, ἀνασφύρασις i. e. apertio oscu-
lorum, ein Eröffnung der Ader / dicitur.
A'νασφύ-
ρασις. *Fit quoque solutio continuitatis per pororum*
in venis, arteriis, & cute extenuatis disten-
sisque dilatatione, ut sanguinem in se reti-
nere nequeant, sed instar sudoris per poros
percoletur. Ejusmodi solutio continuitatis
Græcis διαπύδνσις, Durchswigung des
Bluts / dicitur. Per cutis porro sanguinis
profusionem unicum exemplum Redemptoris
nostri Jesu Christi in agone suo habemus.
Internorum viscerum vel vasorum continui-
tatis solutio fit aut per gravem lapsum, aut
per violentam corporis commotionem, aut
gravis ponderis gestationem, qua divisio
Collisio. *Græcis θάλασμος h. e. collisio, Wehe vom*
schwerem Falle oder Håbunge / dicitur. Ad
continui quoque solutionem refertur nervo-
rum musculationumque distractio præmatura-
Convul-
sio. *lis, Græcis σπασμὸς i. e. convulsio, Der*
Divulsio. *Krampf/ & ligamentorum contractio præter-*
naturalis ἀποκαταμυξ h. e. divulsio, ein
Berrückung der Sehnaderen / nomina-
tur.

Vulnus quid est, & in quo differt
ab Ulcere?

Τραῦμα, Vulnus, quibusdam etiam pla-
ga, quam tamen vocem nos non cruentis, sed
siccis & sine cutis apertione illis vulneribus
propriam esse judicamus, eine Wunde. Vul-
neris vocabulum à Medicis bifariam usurpa-
tur, generaliter & specialiter. Vulnus ge-
neraliter sumptum, est continuitatis cujusque
particula solutio sive divisio, & ita usur-
pata non modo cruentis continuitatis solutio-
nibus, sed & ulceribus & fracturis ossium,
& rupturis & contusionibus convenit; spe-
cialim autem & propriissime sumptum vul-
nus & solutio continuitatis recens, cruenta
sive sanguinolenta sine putredine, in particu-
las molliores, veluti sunt Cutis, Caro, Mus-
culi, Vena, Arteria, Nervi &c; armis cu-
juscunque generis exterius inflata. In hac
definitione excluduntur Vlcera qua ab inter-
nis, ut in superioribus diximus, causis exci-
tantur, ex quibus ulceribus non sanguis, ut
ex Vulneribus, aut pus, aut sordes, aut sanies
profuit. Differt itaque Vulnus ab Ulcere pri-
mum causa Efficiente. 2. Excrementi va-
rietate; Causa enim vulneris est extrinseca;
Vlcis verò interna, erodens videlicet humor.
Et ex vulnere sanguis profuit, ex ulcere sor-
des aut simile quid; Vulnus præterea recens
infligitur: Vlcus inveterata est continui so-
lutio.

Vulnus
quid? &
quot
modis
accipitur
hoc vo-
cabulum:

ἀποκαταμυξ

Vulnus
& Ulcus
differunt:

Vulnerum præcipuæ differentię quot,
& quæ earum species?

Plures enumerantur Vulnerum differen-
tia; nos primas ac præcipuas sex constitui-
mus. I. Vulneris differentia sumitur à lo-
co vulnerato; Vulnerum itaque alia sunt
externa, alia interna. Externum Vulnus est
quod foris per arma in Cutem & subjectas
cuti partes, vel cadendo, vel perfodiendo, vel
impellendo, vel contundendo infligitur, quod
visui tactuique est subiectum, eine Offene
Blutige Wunde / sic s. y Gestochen / Ge-
bawen / Geschossen oder Geschlagen. In-
ternum Vulnus est, quod per cutem carnem-
que

Vulnera
externa.

Ff

que

que vulneratam, ad subcutaneas & internas partes visque abditas, & in viscera penetrauit, veluti sunt vulnera cerebri, Pulmonis, cordis, jecinoris, lienis, Ventriculi, intestinorum, Matricis, vesicae, & similia, eine

Internaz
etiam
Partes
citra in-
cisionem
vulne-
rantur.

Wunde der Innerlichen glieder; Vulnerantur tamen interna partes etiam citra incisionem cutis carnisque, ut sit in Venis & arteriis per ἀνατομῶν. h. e. apertionem orificiorum earum, & per διαπύον h. e. per pororum dilatationem, & per θλάσιν h. e. collisionem, ut sit in lapsu graviore, ut paulo ante in solutionis continui differentiis ostendimus.

Vulnera
simplicia.

Secunda Vulnerum differentia accipitur ab accidentibus, & ita Vulnerus aliud est simplex, aliud complicatum; Simplex est cui nec morbus aliquis, nec ullum symptoma est adjunctum.

Copula-
ta.

Copulatum vulnus est cui ex morborum genere vel intemperies, vel partis vulnerata vitiosa conformatio, & compositio est connexa, aut cui unum pluraque symptomata, ut sunt ἰχῆρες, in Vulnerum generatione, vel sordities, vel venenata qualitas est conjuncta, aut cui aliquid ex infectis fixum haret.

Vulnera
secura &
facilia.

Tertia differentia sumitur ab effectu sive eventu, juxta quam Vulnera alia sunt secura & facile curabilia, qualia sunt qua cuti & carni ense infliguntur; alia sunt maligna curatuque difficilia, ut sunt qua in nervos, ligamenta, ossa & pleraque viscera infliguntur; nam ea qua in nervis & ligamenti incidunt,

Maligna
& curatu
difficilia.

praterquam quod difficulter curentur, & sensum & motum in parte affecta vitiant, aut prorsus auferunt: alia denique sunt prorsus lethalia, qualia sunt Vulnera Cerebri, Cordis, pulmonis, jecinoris, Diaphragm. Ventriculi intestinorum gracilium, Matricis & vesicae, & omnia fere vulnera venenata, qualia sunt infecta ab armis intoxicatis, aut morsu istiusque venenatorum animantium.

Lethalia.

Vulne-
rum dif-
ferentia
à modo
infectio-
nis,
& armo-
rum va-
rietate.

Quarta differentia vulnerum sumitur à modo infectionis, & armorum varietate, secundum quam vulnus aliud est casum illatum, eine geböwede wunde; aliud punctum infectum, quod vulnus confossum, eine gestochene wunde dicitur; aliud per globum bombardicum illisum; eine Geschossene

Wunde, aliud dentibus aut aculeis infectum, quod vulnus commorsum, eine gebissene wunde dicitur; aliud per concussionem, vel armorum obtusorum incisionem inductum, eine geschlagene oder gestoffene Wunde; in quibus si cutis integra est, & sanguis sub cutem suffusus, vulnus cœcum, & nostris Braun und Blawe dicitur; aliud est inustum à rebus ignitis, & vulnus amustum, eine wunde von Brande; aliud à medicamentis causticis inustum, eine geetete Wunde.

Quinta differentia vulneris sumitur à parte affecta, unde aliud vulnus est Capitis, aliud oculorum, aliud nasi, aliud brachiorum, aliud dorsi, aliud ventris, aliud Thoracis, aliud jecinoris, aliud vesicae, aliud nervorum, aliud ligamentorum.

Sexta differentia sumitur à situ vulneris, A situ. unde aliud rectum secundum longitudinem partis, aliud transversum secundum latitudinem partis, aliud obliquum vulnus est. Reliquas differentias à quantitate & figura desumptas, ut qua parum faciunt ad curationem, nos consilio intermitimus.

Quæ symptomata comitantur vulnera?

Pro varietate & natura partium vulnerarum varia subsequuntur Symptomata, quorum in curatione non minor habenda est ratio quam ipsius Vulneris. Nam, ut in superioribus docuimus, nullus fere morbus, nullus tumor praternaturalis, nullumque ulcus, aut vulnus feliciter curari potest, nisi prius Symptoma connexum, curationem impediens, tollatur aut mitigetur. Sunt autem vulnera principia & generalia Symptomata, Sanguinis implacabilis eruptio, Ichoris sive serose humiditatis in vulnere generatio, quod nihil aliud est quam bonus sanguis, per ineptam deligationem, aut non convenientium remedium applicationem, corruptus, & in aqueam humiditatem conversus, dolor, tumor, inflammatio, putrefactio, partis affecta extenuatio & marcor, motus sensusque amissio, convulsio, vomitio & appetentia destructio, alvi suppressio, Gangrana, Sphacelus, Febris, vigiliae atque delirium.

Vulne-

Vulnerum causæ quæ sunt?

Causæ Vulnerum. **CAUSÆ** omnium Vulnerum præcognoscuntur sunt, & si quæ interna sunt, id contingit per accidens, & non nisi in vasis, sive venis & arteriis per ἀναισθησίαν & διαμηνον. Nam viscerum vulnera ex collisione ut plurimum externam habent causam, gravem videlicet collapsum, aut violentam commotionem & compressionem corporis. præcognoscuntur & causa sunt omnia armorum genera, quæ paulo ante enumeravimus.

Signa vulnerum quæ sunt, & quæ Prognostica Signa in Vulnere sunt observanda?

Signa diagnostica Sine ulla subtili investigatione Vulnera præsertim foris influcta cum ex continuitatis curis divisione, tum ex sanguinis in initio vulnorum profluxione, & visu & tactu facile cognosci possunt. Interiorum autem partium & additorum viscerum vulnera hisce potissimum notis deprehenduntur. Vbi in aliquo

Vena-rum. Vulnere venæ majores sunt incisa, sanguis rubens & crassiusculus confertim & continenter erumpit ac profluit.

Arteria-rum. Ex arteria autem vulnerata sanguis tenuis, subflavus, & ad pulsus arteria subsistendo prodit.

Nervo-rum. Nervo vulnerato in vulnere torpor partis vulnerata subsequitur, & motus sensusque debilitas, quin & jam nervo puncto inferitur ingens dolor vulnere, & subsequuntur frequentes convulsiones; ac si accedat inflammatio vulnere, propter Sympathiam quam nervi habent cum cerebro, febris & delirium comitantur.

Tendinum, Ligamentorum, Membrarum. Tendinibus, Ligamentis membranisque ossa vestientibus, ac præcipuè Calviam contentibus vulneratis, eadem signa, sed paulo obscuriora subsequuntur.

Ossium. Os denudatum vulneratumque dignoscitur ex ejusdem scabritie, & inaequalitate, qua specilla immisso investigari debet.

Menyngum. Menynges vulneratae acerbissimos dolo-

res, præsertim ad commotionem maxillarum, & crebras vomitiones ac singultum excitant.

Ac si ex Capitis vulnere sanguis profusus intra vulnera Menyngum illabatur, ibidemque concreseat, attonitus sit ager, & paulo post sanguis, aut per nares, aut per oculos profluit; sed paulo post febris correptus ager delirat & moritur: Quin ubi

Substantia quoque Cerebri est convulsa, rata, præsertim in Plenilunio, (tum enim Cerebrum se dilatat & extendit, omnesque partes Calva complet,) statim mortem infert, maxime si vulnus ad ventriculum usque penetret, aut quibus oculi perfolli, & nervi visorii laesi.

Pectore ad cavitatem perfollo, flatus per Pectoris & Pulmonis respirationem erumpit.

Pulmone autem simul convulso, sanguinis spumosi exspuitio, difficilis & sonora respiratione comitantur, & nisi repente moriatur ager, phlores conficitur.

Corde etiam levissimo Vulnere affecto repentina mors consequitur necessario.

Diaphragmate perfollo statim cessat respiratio, & vita extinguitur.

Gula, vel Aspera Arteria vulnerata; Gula quidem nec cibum nec potum in ventriculum delabi sinit, sed per vulnus prodit, aut per vomitum rejicitur; similiter per Asperam Arteriam respiratio exhalat.

Ex Intestinis dissectis vel feces alba, vel Intestinorum foetida exhalatio prodit.

Jecinoris & Lienis Vulnera ex cruenta dejectione & vomitionibus deprehenduntur. Jecinoris & Lienis. Quibus accedunt dolores & punctiones laterum, ac postea ætæphia subsequitur, & cum febre interit ager.

Renum Vulnera profunda urina cruenta, Renum. & dolor circa inguina & testes comitantur.

Vesica in capatitatem usque discissa, ex necessitate lethalis est, & ex tali vulnere urina profluit.

Postea accedit Febris & Delirium, quæ mors comitatur.

Cervix verò vesica convulnerata facile sanitati restituitur.

Cistis fellis, Vesicula bilis sub Epate vulnerata ex necessitate est lethalis.

Spinalis medulla, Spinae medulla dissecta, sive vulnerata, omnibus partibus corporis infra sectionem constitutis, metum sensumque adimit.

Musculorum. Vulnera Musculorum capitibus inflicta, praesertim in locis multa carne carentibus, & ubi nervi, tendines, & ligamenta, conspicua sunt; item trium digitorum juncturis vulnus inflictum, ubi plerumque ligamenta & nervi concurrunt, motui & sensui ejusdem partis noxam inferunt; & si accedat inflammatio, convulsio, vigilia, & tandem mors subsequitur; sicut & vulnera temporum propter concursum vasorum magna ex parte lethalia sunt.

Signa prognostica de vulneribus.

Pulmonum Vulnera cum propter continuum motum, tum propter promptam inflammationem insanabilia sunt, quia & continua tussis infestata vulnera magis atque magis distrumpuntur.

Thoracis perforatio vulneratioque illa interioribus difficilime persanatur; ut plurimum enim in fistulosum ulcus terminatur.

Articulorum vulnera perpetuo in motu noxam adferunt, & si aquosus humor (ixue, Das Gildwasser / qui non est aliud quam corruptio humoris, quo nervi, ligamenta & tendines nutriuntur) supra modum ex vulnerere profluat, Articuli exarescunt, & omnis movendi facultas perit.

Vulnera magna & profunda in musculis per transversum inflicta, dolores & morus, sensusque amissionem ut plurimum adferunt.

Vulnera quae in Gangranam vel Sphaeculum degenerarunt, non nisi precisa parte affecta curari possunt.

Qua vulnere ut plurimum lethalia sunt. Porro vulnere cum malignorum tum lethaliu praesagia sumi possunt aut a partis vulnerate nobilitate, actionumque ejus necessitate, vulneris magnitudine & symptomatum sevitia; ut plurimum enim magna

vulnera aliusque penetrantia in partibus principalibus, aut inflammatione, aut acerbodolore copulata, lethalia sunt; in specie autem sequentium partium Vulnera pro lethali habentur; Cerebri, Cordis, Gulae, Aspera arteria, Pulmonis, Diaphragmatis, Iecinoris, Vesicula bilis, Lienis, Renum, Ventriculi, Intestinorum, maxime gracilium, Vesica, Matricis, Vena Cava, Arteria aorta, ac spinalis medulla, & quaecunque vulnera per arma intoxicata, aut ictu venenatorum animantium sunt inflicta. Rationem verò, Quamotum sensumque turbantia, & vitiantia vulnera sunt incisiones punctionesque Nervorum & Capitum musculorum, ligamentorum, tendinum, & articularum, quibus si acris dolor & inflammatio convulsioque accedant, lethalia quoque sunt. Lethalia vulnera, nostratibus Edeltliche Wunden / motum & sensum vitiantia, Lehmuessen. Ex lethaliibus tamen vulneribus sunt quadam, quae non ex necessitate & per se mortem inferunt, sed ratione vel sua magnitudinis, aut symptomatum sevitia, ut vulnus jecinoris, & renum, per se mortalia non sunt; saepe enim parva vulnera & in ipsis, & in intestinis, & in ventriculo & cerebro persanata esse & legimus, & vidimus.

Vulnera sanabilia & ab omni periculo tutata sunt, quae in carnosos partibus & corporibus puris, & boni succi incidunt; & quae nec in latitudinem; nec in profundum, magnas habent divisiones. Vulnera in carnosos partibus facillime sanantur, in ossibus difficilior, in nervosis omnium difficilime.

Vulnera etiam leviora & securiora in corporibus cacochymis, & impuris morbosisque, periculosa, & saepe etiam lethalia evadunt. Quin & expetilentis aeris constitutione, ex venenato intuitu vetularum, aut mensibus laborantium muliercularum, & ex immoderata Venere, levia Vulnera, curatu difficilia redduntur. Haec signa praesagientia in vulneratis studiosè observanda sunt, prudenti Chirurgo, ut dextre dijudicare praedicareque queat, tum naturas vulnere, curandi facilitatem difficultatemque, & quae noxae quod-

Vulnera Ex lethalibus vulneribus quaedam per accidens talia sunt.

Quibus de causis etiam levia vulnera curatus difficilia evadunt.

Signa *Inconsiderata enim temeritatis est (ut Celsus inquit) lethalius vulneribus manus admove-
re, nisi ab amicis rogatus, cum multa pro-
testatione de periculo vite & vulnere: Est
enim utrumque impostorum ac nebulonum,
levia & facile curabilia vulnera attollere;
utque uberius lucrum inde acquirant, pernicio-
sa esse pronunciare, ut dici solet, ex musca
Elephantem facere, & in perniciosis vulneri-
bus salutem promittere, quam nec ars, nec
natura prestare queat.*

Quatuor *Quæ sunt causæ curatrices
prognos-
tica Chi-
rurgus
scitu ne-
cessaria.* **causæ cu-
ratrices
Vulne-
rum.**

*In felici vulnerum curatione, quatuor cau-
sæ efficientes concurrere debent, Natura, Me-
dicus vel Chirurgus, Remedia, & proba vi-
ctus ratio.*

Natura. *Natura est præcipua & immediata causa
in persanando & conglutinando vulnere; idè
Naturam Paracelsus obscuritatis Magister,
ubique in suis barbaris scriptis Archæum vo-
cat, quæ suo Balsamo h. e. humido radicali,
quod calore & spiritu nativo est perfusum,
vulnera imbuat, & validissime connectit eo-
rum divortium, & ad sanitatem reducit.*

Chirurgus *Medicus vel Chirurgus minister Naturæ
naturæ mi-
nister.* *est, & in curatione vulnerum adjuvat Na-
turam, & sæpè ea præstat quæ Natura præ-
stare nequit; ut, Medicus vel Chirurgus
labia vulnerum distantia, & ossa in vulnere
confracta coaptare & consuere potest, atque
arma vulnere infixæ, & in hærentia corpu-
scula extrahere removereque potest; quod
Natura efficere nequit. Adjuvat autem
Medicus Naturam, impedimenta ejus è vul-
nere removendo, apta remedia applicando, &
convenientem vivendi rationem ægroto im-
perando.*

Remedia. *Remedia vulneraria juvant Naturam,
ejusque & Chirurgi operationes efficaces red-
dunt; ut enim Chirurgus, ita & medica-
menta vulnere in hærentia extrahunt, Natu-
ræ operationes in conglutinando, carnem
generando & cicatricem inducendo ju-
vant.*

Victus ratio *conveniens in curatione vul-
nerum idem præstat, quod medicamenta; ad-
juvat enim Natura operationem; bona qui-
dem victus ratio per salutaris corroborat na-
turam, mala autem destruit.*

**Quæ res impediunt actiones Naturæ in
Vulnere curatione?**

*In vulnerum curatione præcipua actio Na-
tura est conglutinatio, quam impediunt &
turbant arma vulnere infixæ, & res alienæ
vulnere in hærentes, si hæc intrinsecus inci-
derint, ut sunt grumi sanguinis, & ossicula
confracta; si hæc foris extrinsecusque sint illa-
psæ, ut sunt aër præter modum intemperatus,
Radii visivi venenati, armorum fragmen-
ta, tela, spicula, surculi, spina, fragmenta
lapidum, vitri, calx, arena, pulv. &c. quæ
omnia donec vulneribus in hærent, impediunt
operationes & Naturæ & medicamentorum,
ideoque Chirurgicam manum ad sui remotio-
nem desiderant.*

**Quibus rebus instructus esse debet Chirur-
gus in vulnerum curatione?**

*Quatuor potissimum rebus instructus esse
debet bonus Chirurgus in vulnerum curatio-
ne. 1. Instrumentis. 2. Vulnerariis medi-
camentis. 3. artificiosa Vitæ ægroti guber-
nanda peritia, 4. & artificiosa agilitate ma-
nuum & totius corporis, in peragendis opera-
tionibus Chirurgicis.*

**Quæ instrumenta vulneraria in promptu
debet habere Chirurgus?**

*Chirurgum oportet varia & multa in-
strumenta in promptu habere, quod commodius
operationes manuales peragere queat; &
proinde prudens Chirurgus pro præsentis Vul-
neris constitutione, & ipse nova instrumenta
excogitare potest, & usitationibus uti, quæ
paulo ante in hac Chirurgica tractatione
enumeravimus. Hoc loco pauca tamen que-
dam quæ ad vulnerum manuales curatio-
nem necessaria sunt, commemorabimus.*

*Primum Genus instrumentorum est abscis-
soria, qualia sunt Spongia mollis, &
Ff 3 & mun-*

& mundiff. & linteola mundissima & ramenta linteolorum; quorum usus est ad sanguinis & purulentia minutissimarumque rerum vulneribus illapsarum absterisionem & mundificationem, exiccationemque.

alia extrahunt;

Secundum genus est extractorium sive evulsorium, talia sunt forcipes & majores & minores, alia rostrata, alia dentata, alia cochlearis formam habentes, qua & tenacula communiter nominantur, nostris Zengelein / Scherichen / quarum usus est ad extrahenda avellendaque tela, & alia arma corpori vulnerato infixa.

alia sublevant;

Tertium genus est sublevatorium, ejus generis sunt Volfellæ, hami, unci obtusi, quibus molliores partes, ut sunt Nervi, Vena, Arteria, Cutis, sublevari in vulnere possunt; ejusdem quoque generis sunt varia terebrarum species, quibus ossa impressa sublevantur, & corrupta ossa comminuantur, quò commodius infixa tela eximi queant, nostratibus hac Angel / borer oder Schruben dicuntur.

Alia dilatant, & præcipiunt;

Quartum genus Vulnerariorum Instrumentorum est dilatatorium sive abscissorium; talia sunt simplex & duplicata novacula; Die auf beiden seiten schneiden / Cultri incisorii & scalpelli, Schermesser / snitzigen ond Lapeysen / quibus Vulnerum ora contricta inciduntur & dilatantur, & superflua præciuntur, ut commodius subjectarum partium lesiones contrectari, & evulsoria instrumenta inferi, & infixa arma è Vulnere protrahi queant.

Alia ad explorandum adhibentur;

Quintum genus Instrumentorum est exploratorium, ejusmodi sunt specilli ex argento vel ferro, vel cerea candela confecti, ein Spillichen oder Sucherlein / iis profunditas Vulnerum, ossium lesio, & materia in Vulnere contenta qualitas exploratur.

Alia vulnus explent, eique induntur;

Sextum est expletivum, qualia sunt Græcis πολύνια, Latine Linamenta & penicilli, Barbaris autem Tentæ & Turundæ & hastulæ, nostratibus eine Wete dictæ; conformatur autem talia linamenta vel licinia pro magnitudine & vulnere figura, ex stu-

pa pexa, aut ex lana xylina, aut ex linamentis h. e. filamentis floccisque linteolorum detritorum carptis, tonsoribus nostris Ropcy / oder Schaueis von tûchern dicitur, eorum usus est in explendis vulnerum cavitatibus, aut in dilatandis & mundificandis Vulneribus, quæ ut plurimum Unguento aut mundificativo, aut carnem generante imbuta Vulneribus inseruntur, ut per ea colluvies collecta effluere queat, similiter ex rad. Gentiana, quæ citam & præproperam Vulnerum conglutinationem prohibet.

Septimum Vulneris instrumenti genus est consutorium, ad hoc referuntur acus & filum; Acum autem debet Chirurgus habere cum mollem & flexibilem, tum duram & ex Chalybe factam. Filum verò quo vulnera consui debent, omnium aptissimum & optimum censetur sericum rubeum æquale ac validum.

Alia consuunt vulnus;

Octavum Instrumentum est compressorium & defensorium, cujus generis sunt pulvini, qui & plumacci nominantur, qui supra medicamenta Vulneribus imposta imponuntur, cum ut Emplastra tenacius Vulnere inhaereant, tum ut à duritie ligamenti & dolorifica compressione vulneratas partes tueantur. Fiunt autem tales pulvini ex convolutis, triplicatis, quadruplicatisque mollissimis linteolis, aut sacculis lana Xylina infarctis; eorum autem forma pro vulnerum figura & magnitudine est disponenda.

Alia emplastris superimponuntur.

Nonum genus est deligatorium, ejus generis sunt fasciæ & mundissima molliæque & oblonga linteamina, trium quatuorve digitorum latitudinem habentia, Ein bandt oder Winde. Quorum usus est in deligandis convinciendisque omnibus vulneribus.

Alia adhibentur ad deligandum & constringendum vulnus.

Porro ubi vulnus, vel loci vulnerati constitutio neque deligationem admittit, ut contingit in facie, tum vinculis sive laqueis utendum erit, quod ad Decimum instrumentorum genus refertur, & fit hac ratione: Duobus linteolis vincula sive fila robusta appenduntur, & glutine illita utrinque sanis partibus vulnere agglutinantur, & vinculis

Gluten. *lis appensis vulneris labra contrahuntur. Gluten autem hac ratione fit: R. Farina triticea, Mastich. Boli Arme. Traganth. Aloës, Bitumi. Indai ana ℥. ij. tenuiss. pulverisata cum album. Ororum excipiantur; fiat Gluten.*

Vndecimum Instrumentum propulsorium dicitur, quod aut est solidum, aut incavatum, quibus globi aut sagitta telaeque propelluntur, & è vulnere excutuntur.

Duodecimum Instrumentum, & omnium instrumentorum organum nobilissimum, sunt Manus periti Chirugi promptæ & agiles, quibus reliqua instrumenta gubernantur, & Chirurgica operationes perficiuntur.

Remedia Vulneraria quotuplicia, & quibus potissimum formis administrantur?

Remedia Vulneribus dicata omnia aut sunt simplicia, aut ex simplicibus concinnata atque composita; & in vulnerum curatione administrari quinque potissimum formis solent. In forma potionum, Pulverum, Olei si-ve balsami, Unguenti & Empl. Eaque aut intra corpus exhibentur, aut foris vulnere applicantur.

Remedia simplicia præcipua Vulneribus dicata quæ, & quæ eorum facultates?

Simplicia vulneraria remedia nobiliora & longa experientia comprobata, qua vel foris applicantur, vel intra corpus exhibentur, hac sequentia magis in usu habentur:

Sanicula est quinq. folii species, **Carneefel.** Pirola, est Sylvestris beta species, **Wintergrün.**

Ophyoglosson, **Adder Zungelein.** Consolida **Sarracenicæ, Hefenschwundt** **fraudt.**

Consolida major, **Walwurß.** Calcitrappa, **Riddersporcin, est consolida** **species.**

Perficaria, **Blöfraudt.**

Agrimonia, **Odermeining.**

Hypericon, **S. Johans fraudt.**

Centaur. minus, **Murthn.**

Herba Roberti, est species Geranii si-ve rostri Ciconiæ, à rubedine bluttkraut dicta.

Plantago utraque, brede ond spitze wegbleter.

Brassica rubra, **Rodtkol.**

Cynoglossum, **Hundeszung.**

Pilosella, **Meißörlein.**

Cariophyllata, **Benedicten würfel.**

Matrisylva, **Wolmeister oder Mösch.**

Pervinca, **Singron.**

Ex radicibus sunt Rhabarb. Rhaponticum, Angelica, Aristol. rotund. Ciclamen seu panis porcinus, Mumia, Sperma Ceti. **Walradt.** Paracelsus valde extollit in vulneribus curandis Specula illa nitida pennarum ex caudis pavonum, & Glandes, quibus ego parum tribuo. Experientia verò edoctus, inter herbas vulnerarias salutare esse deprehendi Herbam Veronicam, quam, ni fallor, Paracelsus Sophiam vocat; quamvis ipsius affecta Sophiam ambiguo vocabulo Consoladaginem interpretentur.

Huic quoque addo fol. Rorismar. Rad. Asclepiados & rad. China, Sarmeni Indici & grana juniperi. Sunt præter hæc alia simpliciorum remediorum genera vulneribus sanandis utilissima, ut sunt succi, Gummata, resina, & pingued. quorum mentio fiet & in compositis vulnerariis remediis, & in curationis processu. Inest autem hisce commemoratis rebus facultas & vis, aliis quidem sanguinis fluxum suppressendi, aliis vulnera mundificandi, aliis labia vulneris contrahendi, & conglutinandi, aliis carnem in vulneribus generandi, aliis cicatricem inducendi.

Compositorum remediorum Vulnerariorum quot sunt præcipua genera?

Ex remediis simplicibus jam enumeratis secundum varias formas, quinque potissimum genera compositorum exstrui solent, nimirum potiones vulnerariæ, pulveres vulnerarii, Balsama si-ve olea vulneraria, Unguenta & Emplastra; Quorum in curandis Vulneribus nobiliora & usu comprobata hoc loco subijcere placuit, rationemque conficiendi breviter indicare.

Potio-

Potiones Vulnerariæ quibus modis
sunt præparandæ?

potiones
vulnera-
riæ non
sunt reji-
ciendæ.

Potio vulneraria. *Ein wundtrauck:* Et-
si Johannes Tagaultius, Gallus, & Gabriel
Fallopianus, Italus, Medici Clarissimi & Chi-
rurgi Excellentissimi, in vulnerum curatio-
ne potiones Vulnerarias damment & explo-
dere conentur, asserentes eas suo calore san-
guinem in corpore inflammare, extenuare,
ejusque eruptionem ex vulnere excitare; ta-
men cum simplicia vulneraria non omnia sint
calida, sed magna ex parte constringentia,
occultaque ac symphyta conglutinandique
facultate sint prædita; & Veterum expe-
rientia comprobatum sit, solis vulnerariis po-
tionibus & quotidiana vulnerum mundifica-
tione sub fol. Brass. rubea gravia vulnera
curari posse; nos potiones vulnerarias in cu-
ratione vulnerum merito retinebimus, & u-
surpabimus, quarum paucas formulas nobi-
liores subiciemus; Cum autem multum sit
situm in vulnerariis potionibus rectè con-
ficiendis, id quoque breviter indicabimus.
Semper mihi vehementer displicuit plerorum-
que Medicorum & Pharmacopæorum co-
quendi ratio in potionibus & Syrupis; Hi
enim assumptis remediis aridis & conscindendis
concisis, conterendisque contusis, in olla aut
ampla pelvi affuso aliquo liquore ad tertias
aut medias eos decoquere solent, in qua co-
quendi ratione tenuiores partes rerum deco-
ctarum viresque præstantiores cum vapore
exhalant, & nil nisi insipidus & inefficax
relinquitur liquor. Alios autem longè præ-
stantiores coquendi modos nobis præscripsit
Paracelsus, quem merito quilibet cordatus
imitari debet. Etsi enim Paracelsus in aliis
omnibus suis scriptis, propter affectatam &
invidia plenam obscuritatem, immensasque
nugas & anilia mendacia, odio & execra-
tione dignus sit; in Chirurgico tamen suo
opere merita laude minimè est defraudan-
dus, qui nobis longe utilissimum modum de-
coquendi medicatas potiones perspicuè propo-
suit ac reliquit; jubet autem Paracelsus ex
superioribus enumeratis vulnerariis simplici-

Ratio
coquendi
potiones
usitata
repre-
henditur.

Ratio
nova
Paracelsi
laudatur.

bus plura aut pauciora, & quæ cuilibet Me-
dico maximè utilia esse judicantur, recipere,
herbasque ac flores conscindere; Radices au-
tem & res folioides contundere, & in stan-
neum cantharum conjicere, atque eisdem vi-
ni, cerevisiæ, Hydrom. aut aq. q. s. pro artifi-
ciosa Medici conjectura adfundere, canthari-
que operculum molli massa farinacea charta
illita oblinire, ut ne quid vaporis exspiret, &
cantharum cum rebus medicatis in ferven-
tem aquam collocare, ac per duas tresve horas
simul concoquere. Ita enim nihil potest evapo-
rare, & potio limpidissima verum viribus im-
buta, & salutaris evadit. Ejus autem me-
dicata potio, vulneratis mane ac vespere
℥. iij. aut iv. exhibere jubet; exhaustam
vulnerariam potionem si æger retineat, & illa
ipsa potio per vulnus instar sudoris conspiciat-
ur, salutare esse indicium; si verò revoma-
tur, infustum & infelix judicatur.

Vulnerariorum potionum concoquendi & Potiones
conficiendi formulas quatuor subiciemus; ac vulnera-
rias con-
ficiendi
quatuor
formulas.
primus quidem modus est qui fit per decoctio-
nem in duplici vase, cujus formula talis esse
poterit: R. Sanicula. pirola. fl. Centaur. min.
Veronica, ana M. ij. Calcitrappa M. s. A-
grimo. M. j. Concidentur, & cum ℔b. jv. Vini
decoquantur in cantharo per duas horas;
Aut R. Ophyogloss. M. ij. Matris syl. pyrola
ana M. iij. Rhab. ℥. ij. Rhapont. ℥. j. s. Con-
scindendis conscissis, & contundendis contusis
cum ℔b. v. Hydrom. aut cerevis. aut aq. in
duplici vase ad horas tres concoquantur.

Secundo modo conficiendæ sunt Vulnera- Altera ex
riæ potiones ex herbis, & rad. paulo ante simplici-
enumeratis adhuc recentibus & virescentibus viridibus
bus, quæ pro Chirurgi prudentis arbitrio ac- ablique
cipiantur, contundantur & in cantharum liquo-
reponantur, nullo addito liquore, ac cantharo re
tandem oblinito, in ferventi aqua per qua-
tuor horas coquantur; ea enim ratione clara
& non ingrata potio ex illis elicitur, & prod-
est talis potio vulneratis, qui vini gustum
ferre nequeunt, aut capite sunt vulne-
rati.

Exemplum; R. Agrimon. Sanic. pyro-
la, Veronic. Beton. Consol. ma. Cariophyl-
late

lata cum rad. Matrisfyl. Herb. Roberti ana M. j. Gran. Iunip. lb. f. contusa in cantbaro oblinito, ut dixi, elixentur, iusculumque elixum percoletur, fiat potio vulneraria. Simili ratione optime parari possunt vulneraria potiones ex earundem herbarum expressis succis in duplici vase diu multumque decoctis.

Tertia
per deco-
tio-
nem cum
aquis
stillati-
ciis vul-
neraria-
rum her-
barum.

Tertius modus parandarum vulnerarium potionum est, qui fit ex herbis & rad. vulnerariis in aquis stillaticis herbarum vulnerarium in duplici vase, ut primo modo diximus, decoctis. Exemplum; R. Aq. stillati. Agrimo. Centaur. mi. ana lb. iij. cum quibus macerentur herba sicca & concisa Sanicula, pyrola, Veronica, Pervinca ana M. ij. Rhab. select. 3. j. Consol. ma. 3. ij. Coquantur, ut dictum est, in dupl. vase ad horas quatuor.

Quarta
per de-
stillationem.

Quartus modus est celeberrimus, qui fit per destillationem Chemicam, per organa defensoria sive per incurvatos canales in aq. frig. adaptatos; quemadmodum destillantur Ol. ex sem. Anisi vel Angel. quem modum in nostra Iatrochimia describemus. Exemplum; R. Baccarum Iuniperi lb. iv. Sanicula, Pyrola, Matrisfylva, Symphyti major. Veron. ana M. iij. Ophyogi. perspicar. Calcitrap. ana M. j. s. Rad. Aristol. rot. 3. iij. Conscidentis concisis & contundendis contusis macerentur in q. s. aq. & in aneum vas simul perfundantur ac artificiose destillantur, aut disponantur in vitream cucurbitam, & vel per balneum Maria, aut in arena ferventi destillantur, & liquor bis terve siccis fecibus infundatur, ac denuo destilletur.

Pulveres vulnerarii qui, & quas habent facultates?

Secundum genus Vulnerariorum remedium sunt Pulveres medicati, Bunde pulver / Chirurgis dicti. Fiunt autem pulveres vulnerarii ex variis & aridis simplicibus tenuissime contritis & inter se commixtis, quorum facultas & virtus in vulnere curatione varia est; alii enim sanguinem erum-

pentem supprimunt, alii labia vulnere dehiscentia contrahunt, & conglutinant, alii carnem in carvis vulneribus generant, alii cicatricem inducunt, ex quibus nobiliores hi sunt:

Pulvis vulnerarius sanguinem sistens?

Simplices pulveres sunt Crocus Martis à Paracelso excogitatus, cuius parandi rationem in Iatrochimia nostra indicabimus.

Cinis Ranarum vulnere inpersus, pulvis calcis viva & pul. Arsen. sublimati.

Compositus est R. Boli Arme. Sang. Drac. Thur. Aloes ana 3. ij. tenuissime contrita misceantur, & Vulnere inpersantur, aut cum album. ovi commisc. in Linimenti formam, & cum pilis leporinis, qui inter inguina harent, excipiantur, & vulnere sanguine fluenti imponantur.

Pulvis labia dehiscentia vulnere contrahens, ein Haftpulver.

Simplices Pulveres contrahentes sunt pul. Boli Arme. pul. Acatia.

Compos. R. Olibani, Myrrha, Mastich. ana 3. i. Corall. rub. præp. 3. s. Aloes Epatici. Mumia ana 3. ij. Acat. 3. s. Boli Armen. 3. ij. Tenuiss. pulverisata commisc. Aut R. Suc. Prunor. sylv. immaturorum, succi Corrigiola, ana 3. ij. Suc. Bistorta, 3. j. Succ. Gallarum immaturarum 3. j. s. Commisc. in eisque dissolvantur Gummi Ammoniac. 3. ij. & commixta in Solis fervore exsiccentur, & in tenuissimum pulverem redigantur.

Pulvis Vulnerarius Conglutinans, ein Heftpulver?

Fiunt Pulvisculi ex simplicibus Bolo Arme. Symphito, Mumia, Mastich. Olibano, Millefolio, qui vulneribus inpersi illud conglutinant.

Compositus est R. Rad. Symphitima. Boli Arme. Colopho. ana 3. ij. Mastich. Olibani ana 3. j. Sang. Draconis, Mumia ana 3. s. Misc. fiat tenuiss. pulvis.

Pulveres
vulne-
rarii.

Pulvis Sarcoticus, h. e. carnem in
Vulneribus generans:

Alii
Cicatri-
cem in-
ducunt.

Ex simplicibus sunt tenuiss. pul. Thuris.
Mastich. Sarcocolla, Aristol. rot. & Colo-
phonia.

Compositus est: R. Olibani, Aloës,
Sarcocolla, Sang. Draconis, Irid. Illyri-
ce ana ʒ. s. tenuissime pulverisata com-
misc.

Pulvis Epuloticus, h. e. Vulnera
cicatrice claudens:

Ejus generis sunt ex simplicib. Pul. Li-
tharg. Cerussa, cinis Plumbi, Tutia, Calcei
multum elota:

Compositus est: R. Balauft. Sang. Dra-
co. Cerussa, Litharg. Rad. utriusque Plan-
tag. ana ʒ. j. tenuiss. pulverisata commi-
sceantur.

Hac de pulveribus medicatis, quæ in cu-
ratione vulnorum utilissime usurpari possunt,
dixisse satis est. Observandum tamen in
vulneribus quibus Symptomata seuiora co-
pulata sunt, ut Tumor, Durities &c. non
prius his pulveribus utendum, donec hæc sint
remota.

Balsama, sive olea vulneraria quæ,
& quas habent facultates sive
effectus?

Pingua
vulneri-
bus ini-
mica.

Tertium genus remedium vulnerario-
rum sunt olea medicata, quæ per excellen-
tiam, à Chirurgis Balsama nomi-
nantur; Cum autem omnia pingua Vulne-
ribus ipsis instillata inimica sint, & destruant
impediantque actiones Naturæ, nec olea cru-
da atque simplicia, nec alia pinguedines nisi
medicata Vulneri illiniri aut instillari debent:
Nam quod Filius Dei, vulnere humani ge-
neris perfectissimus Medicus, Vulneribus Sa-
maritani Oleum & Vinum instillavit, non de
oleo communi, sed de precioso Balsamo, quo
tum Horti Hierochontei abundabant, intelli-
gitur; Verum cum Balsamo genuino hoc se-
culum destitutum sit, Veteres Sapientes Vice
Balsami Olea medicata, & per distillationem

Balsa-
mum
nativum
non ha-
bemus.

insolationemque preparata prudenter excogi-
tarunt, quibus loco Balsami commodissime
utuntur, quæ ubi rite preparata sunt, excel-
lentissimas habent facultates in vulnorum
conglutinatione, & bona carnis generatione,
partisque læsæ corroboracione. Porro subje-
ctum vel materia omnium vulnerariorum
precipuorum Balsamorum, est aut Ol. de-
stillatum, aut Terebinth. destill. aut Vernix
Pictorum, aut Medulla, aut Ol. de strobillis
destillatum. Olea vero & Terebinth. ad ma-
teriam Balsami semel tantum & leniter, sine
coloris & odoris amissione, arte Chimica (ut
in nostra Iatrochimia edocemus) destillan-
da erunt. Recipiuntur autem in preparatio-
ne Balsamorum liquores præscripti, ex eisque
aut unus aut plures pro Medici arbitrio, &
vitro constricti officii imponuntur, eisque ad-
misceantur flores & herba vulneraria, & per
astatem Solis radiis exponuntur, subindeque
commoventur, ut exempli causa: R. Flor.
Chamom. Rosar. Hyperico. Centaur. min.
Chelido. ma. ana M. ij. confectis affundan-
tur ping. aut Ol. præscripti destillati q. s. &
probe obstructa per astatem in ferventi Sole
macerentur, & fiat Balsamum, quod vulne-
ra mirifice sine dolore conglutinat, & omnia
Symptomata arcet; Fiet autem preciosius
Balsamum si in eodem pingui liquore singulis
annis recentes flores prioribus infundantur.
Aut R. Ophioglossi. Pirolæ, Sanicula ana
M. j. fl. Agrimo. Hyperic. ana M. ij. Rad.
Symphiti ma. contusi M. s. Lumbricorum ter-
restr. generoso vino elotorum numero centum;
commistis in vitro adfundatur Ol. destill. Te-
rebinthin. aut Gl. de strobilis destillatum, q. s.
& per astatis fervorem Soli exponatur, & fiat
Balsamum. Preciosum quoque balsamum
fiet, si præscripta libra vulneraria vernici Pi-
ctorum admisceantur, aut si in vernici una
libra resolvantur lento igne pul. Mastich. ʒ. ij.
Olibani, Myrrha ana ʒ. j. Mumie ʒ. s. Ad
Balsami quoque vulnerarii speciem referri
potest Oleum Hyperic. cujus varia descriptio-
nes tum apud Chirurgos, tum in libellis
Pharmacopæorum, qui Dispensatoria vo-
cantur, habentur, quas consulo præterimus,
& uni-

Eorum
materia
& præ-
paratio.

Balsama
facticia.

Oleura
Hyperic-
onis.

Et unicam ejus ad nervorum vulnera praestantissimam duntaxat subjiciemus: R. Terebint. cruda 3. ij. Ol. Tereb. 3. vj. ol. rosa. 3. j. Vermium terra in vino Malvatico elotorum 3. j. s. Rubra tinctorum 3. ij. fol. Rorisma. Millefolii. Flor. Cent. min. ana M. s. Sulph. 3. j. Conterantur crassiusculè & admisc. Vini Cretici 3. j. & simul in Sole ferventi dierum Canicularium per 14. dies macerentur; deinde ebulliant ad vini evaporationem & fortiter expressa colentur; ejusque pinguis liquor in vitro reponatur, & iterum repleatur floribus Hypericonis & seminibus simul confusis, & per astatem Solis radiis exponatur, & fiet oleum vulnerarium ad vulnera Nervorum Balsamo preciosius.

Unguenta vulneraria, Eorum materia.

Unguenta vulneraria præcipua quæ, & quomodo paranda?

Facultates.

Quartum genus sunt Unguenta quæ Veteribus ex Melle & Butyro concinnabantur. Cum enim mel & Butyrum ex saluberrimis herbarum floribus proveniant, & in melle insit mundificandi facultas; in Butyro verò emolliendi & dolores mitigandi; ex iis solis ad ulcera & vulnera curanda unguenta parabantur. Recentiores autem Medici iis addiderunt Olea, Pingued. Medullas, gummatas, resinas & ovorum lutea. Unguentorum vulnerariorum autem alia mundificant, alia conglutinant, alia carnem generant, & cicatricem inducunt. h. e. vulnus nova cute obsignant: Ex oleo itaque, butyro, melle, & medullis, & per se sigillatim & inter se mixtis salutaria unguenta confici possunt. si illis herba vulneraria superius commemorata, & flores adhuc virentes commisceantur, & vel in Sole, ut de Balsamo diximus, macerentur, aut leni igne decoquantur, expressaque percolentur.

Formula.

Exemplum Consolidativi Unguenti. R. Terebintin. lb. s. lutei ovorum N. x. multum inter se subigantur, & eisque admisc. pul. tenuiss. rad. consol. ma. 3. s. Arist. rot. 3. ij. Farina triticea puriss. 3. vj. Commisceantur exactissime, fiat Unguentum.

Porro aliorum Unguentorum vulnerarium descriptiones extant in libellis Pharmacopæorum, ex quibus

Vulnera egregiè mundificant Unguentum Apostol.

Carnem generant & consolidant Unguentum Balsycon.

Cicatricem inducunt Unguent. à Cerasa, aut illud sequens, quod simul & conglutinas: R. Colopho. Sulph. Olibani ana p. a. tenuiss. pul. verisata ovorum albuminibus in Unguenti formam redigantur, & vulneribus applicentur.

Emplastra vulneraria præcipua quæ?

Quintum genus sunt Empl. Cùm Bunde oder Stich-plaster. Omnium ferè vulnerum commodissima curatio perficitur per Empl. convenientia, quæ nobis magna ex parte in Ulcerum curatione proposita sunt. Hoc loco satis esse arbitramur nobiliorum Empl. pauca exempla subicere, præparandique rationem breviter ostendere.

Emplastra vulneraria.

Emplast. de Succino ad Vulnera conglutinanda?

R. Cera novæ lb. s. Colopho. 3. iij. Therieb. 3. j. s. & simul ad lentum ignem liquefiant, & eisque adhuc tepentib. admisce tenuiss. pul. Mastich. 3. vj. Succini flavi 3. vj. Subigantur, liquefiantque supra lentum ignem, postea ab igne depositis, iterum admisc. tenuiss. pul. Mumia, Olibani, Myrrha, ana 3. j. s. Aloës Epatica 3. iij; probe commisceantur, ubi nonnihil sunt refrigerata, in pelvim aut aliud vas frigida aqua plenum perfundantur, atque manibus oleo aliquo vulnerario aut pinguedine inunctis, diu multumque subigantur, & eo usque contrectentur, donec nihil asperitatis in eo remaneat, fiat Empl.

Emplast. de succino.

Emplast. extractivum ad elicienda arma, & vulneribus inhaerentia corpuscula?

R. Cera novæ lb. s. Colopho. Picis lariceæ sive sutoria ana 3. iij. Liquefiant simul & te- extrahit

& tepidis admisc. sequentia Gummata in aceto vini resoluta, & à sordibus excreta. Gum. Ammo. \mathfrak{z} . j. Bdellii \mathfrak{z} . s. commixtis simul admisceantur, & tenuiss. pul. Lap. Magnetis \mathfrak{z} . ij. s. Succini flavi \mathfrak{z} . j. s. probè commisceantur diu multumque subigantur, & manibus oleo Hypericon. inunctis, eo usque contrectentur, donec omnem asperitatem exuat: fiat Empl. quo omnia recentia Vulnera & per Chirurgicorum imperitiam vitata, facile & feliciter persanari, quovè è vuln. globi plumbei, armorum fragmenta & alia corpora inhaerentia elici possunt.

Emplast. mirabilis efficaciae in conglutinandis Vulneribus.

Emplastrum mirabiliter conglutinans.

R. Cera nova, Ol. vulnerarii sive levis ter destillati, quemadmodum in superioribus docuimus, ana \mathfrak{z} . xij. Resolvantur lento igne, eisque admisc. Lytharg. tenuiss. pulveris \mathfrak{z} . viij. Lap. Calamin. tenuiss. contriti \mathfrak{z} . iij. Decoquantur lento igne continuè, vel ferrea, vel lignea spatula agitando, donec Ceroi formam acquirat, h. e. donec ejus gutta per stanneum orbem refrigerata, & digitis conrectata, eis non adhaereant, tandem admisce quoque vernicis medicata, h. e. in qua medicamenta sunt macerata \mathfrak{z} . iij. Terebinth. destillata sive Ol. Terebint. \mathfrak{z} . ij. rursum commixta tenuiss. concoquantur, donec justam formam nanciscatur, cui postremo adhuc tepido commisceantur sequentia gummata macerata, & percolata Gum. Ammon. Bdellii ana \mathfrak{z} . ij. Oppopa. Galbani ana \mathfrak{z} . iij. ac tandem seq. pul. tenuiss. eidem admisc. Coral. rub. & alb. Lapidis magnetis ana \mathfrak{z} . vj. Olibani, Mastich. ana \mathfrak{z} . s. Subigantur in aq. frig. fiat Empl.

Empl. Barbarum, quod à Galeno in conglutinationibus vulnere magnopere laudatur.

Emplastrum Barbarum Galeni.

R. Picis sicca \mathfrak{z} . viij. Cera nova \mathfrak{z} . vij. Resina pini \mathfrak{z} . v. Asphalti \mathfrak{z} . iij. Ol. Olivarum \mathfrak{z} . viij. Terebinth. \mathfrak{z} . ij. Aceti vini \mathfrak{z} . v. Resolvantur simul ad lentum ignem, & leniter coquantur ad acetii evaporationem,

quibus tandem admisc. Succ. Mandragora, sive loco ejus, Solani \mathfrak{z} . ij. Pul. tenuiss. Lytharg. Cerussa ana \mathfrak{z} . j. Ærug. \mathfrak{z} . s. Thuris, Myrrha, & Squamma aris, quam Paracellus Crocum Martis nominat, ana \mathfrak{z} . j. s. Gum. Oppopa. Galbani cum aceto resoluti & percolati \mathfrak{z} . ij. Probè commisc. & artificiosè in frig. aq. subigantur, fiat Empl. quod arceat Symptomata à vulnere, mitigat dolores, sedat inflammationes, & conglutinat omnia vulnere genera.

Quam victus rationem vulneratis impedire debet Chirurgus?

In vulnere curatione necessariò observanda est victus ratio: Naturam enim corroborat, corporis intemperiem corrigit & sanguinem conglutinandis vulneribus necessarium suggerit. Per victus porro rationem non tantum alimentorum bonitas, & malitia intelligenda erit; sed earum omnium quæ corporis naturam sustentare & alterare possunt, & idè Gal. eas causas naturam conservatrices nominat, quæ numero sex sunt, recentioribus Res non naturales dicuntur, videlicet Aër, Cibus, Potus, Somnus & Vigilia, Exercitium sive motus & Quies, Retentio & expulsio, & animi commotio. Quomodo itaque in hisce sex rebus se gerere debeat vulneratus, ne curatio impediatur, studiose providere debet Chirurgus.

Aër itaque in quo vulneratus versatur ac decumbit, debet esse temperatus, & nec in frigiditate nec caliditate excellens. Virumque enim & caliditas & frigiditas extensa vulnere est inimica. In æstate tamen magis ad frigiditatem, in hyeme ad caliditatem declinare debet.

Cibus & Potus Vulneratorum talis esse debet, ex quo optimus generatur sanguis. Verum cum non sit penes Chirurgum, ut ager exoptatis fruatur alimentis, sed fortuna vulnerati & conditioni sæpè inserviendum sit, ea tamen semper eligat alimenta, quæ omnium minimè actiones natura in curatione vulnere impediunt. Talia sunt juscula ex Cerevisia & Butyro; ex Cerevisia &

ocorum

Aër.

Cibus & Potus.

ovorum luteis confecta. Iuscula denique & carnes Gallinarum, vitulorum, Boum juvenecorum, quibus adnumerari possunt & ova sorbilia. Rad. Cariota, Pruna Vngarica, pulmenta è pomis, Pisana hordeacea, Lac amygd. & ex Piscibus Perca aculeata, & Lucei.

Potus verd in initio curationis aq. Cinnamo. Cerevisia clara, non aded plena, h. e. fortis, deinde & Vinum tenue, & Hydromeli concedi possunt, nisi qui capite sunt Vulnerati, aut qui corpore plethorici, aut inflammationes vulnere adjunctas habent, iis à vino & hydromelite abstinendum est. In universum autem fugienda sunt carnes qualibet fumo indurata, aut sale macerata; item caro fusilla, caro anserina, anathina, pisces facile putrescibiles, quales sunt Anguilla & Tinche. Vitandi quoque sunt casei, fructus crudi, nuces, cape, sinapi & omnia acris aromata.

Somnus
& Vigilia.

Somnus & Vigilia Vulneratis moderata esse debet, utrumque enim si modum excedat, attestante Hippocrate & experientia, malum est; inprimis autem diurnus somnus cavendus, nisi nocte antecedente vigilia molestarunt vulneratum, ubi metuitur defluxio, & dolor partem vulneratam infestat.

Motus &
Quies.

Motus & Quies. Sine quiete vulnus sanari nequit, si tamen vulnus in partibus est inflictum, citra quarum noxam reliqua partes moveri & exerceri possunt, moderatum exercitium eis concedi poterit, ut, vulnere existente in superioribus, statio, sessio & inambulatio conferunt. Vulnere autem sub Diaph. existente, quies & decubitus eligendus est. Laboriosa verd commotiones corporis, ac in primis Venerea actio, ut ipsa pestis, vitanda est. In quiete autem à decubitu vulnerata pars ita collocanda & configuranda est, ut sine dolore & molestia flecti & extendi queat, & ut humores vitiosi ad vulnus minimè conflueri queant.

Retentio
& excretio.

Retentio & excretio. Nisi assumpta alimenta retineantur, & superflua excrementitiaque humiditates iusto tempore excernantur, vehementer vulnere curationem impediunt; cum autem & retentio & excretio

Natura sint operationes, si ipsa natura assumpta retinere nequeat, sed vel per alvum, vel per vomitum rejiciat, aut si superflua excrementa intrà corpus retineat, natura, arte & medicamentis adiuvanda erit. Quibus autem remediis id conandum sit, paulo infra in removendis Symptomatibus, vomitu videlicet & alvi suppressione, declarabimus. Id tamen præter Symptomatum remotionem observandum est; ubi opus sit artificiosa evacuatione; vulneratorum natura primum est contemplanda, & si corpus sit plethoricum, debet fieri evacuatio per Vena sectionem; si corpus sit *κατὰ χυμῶν*, tum per medicamenta subducentia; habita semper ratione virium, humores sunt evacuandi. Et cum nullus humorum in vulneribus plus negotii faciat quam bilis flavia, ided ea maxime in vulneratis evacuanda erit.

In bilis autem evacuatione laudatissima sunt remedia Pulpa Cassia, Syr. rosatus solutiv. infusum Rhab. & Electua. Rosatum Mesue. Reliquorum humorum purgandorum remedia ex tabellis nostris in superioribus petenda erunt. Oportunissimum autem est purgationis tempus in vulneratis, ubi fluxio & inflammatio metuitur.

Animi commotio, sive affectus. Præter moderatam latitiam, & bonam spem, omnes animi commotiones, inprimis autem ira, metus, tristitia & sollicitudo, quantum fieri potest, procul abesse à vulneratis debet. Mirum enim in modum animi commotiones vulnerum per sanationem turbant, & impediunt. Quare imperandum est amicis & ministris agri, ne occasionem alicujus commotionis prabeant, vel tristi narratione, vel alia offensione.

Animi
commotiones &
affectus.

Curatio vulnere per quot, & quas operationes perficitur?

Demonstratum nobis est quatuor causas effectrices in per sanatione vulnere concurrere. Naturam, Remedia, Alimenta, & manus Chirurgi; Ita sane quatuor erunt operationum genera, per qua vulnera omnia sananda sunt; Natura nimirum,

medicamentorum, alimentorum & manuum Chirurghi.

Naturæ proprietates, vel propriæ operationes in curatione vulnorum sunt conglutinationo, nova carnis generatio, & cicatricis inductio.

Naturæ opera in curatione vulnorum quæ sunt, utque natura juvetur.

Has Naturæ operationes adjuvant medicamenta vulneribus imposita, superfluum humiditatem exsiccando, vulnus constringendo, partis affectæ temperiem conservando, & Symptomata prohibendo.

Victus ratione adjuvantur operationes Natura, intemperiem partis affectæ corrigendo, totumque corpus corroborando, & inculpatum sanguinem ad conglutinationem & carnis generationem Natura suggerendo.

Chirurgus vero Natura operationes adjuvat, impedimenta sanationis è vulneribus removendo, arma & aliena corpora vulnere inhaerentia evellendo, sanguinem erumpentem abstergendo, concretum in vulneribus eximendo, labia vulnorum hiantia ab invicem distantia coaptando, & consuendo, purulentosque humores è vulneribus detergendo, vulnus artificiosè deligando, & vulneratam partem debito modo conformando & collocando, convenientiaque Pharmaca usque ad finem curationis applicando, & Symptomata, si qua incidunt, auferendo.

De Remediorum & alimentorum facultatibus atque operationibus antea satis dictum est; nunc tempestivum est de operationibus manuum Chirurghi necessariis, & quæ circa singulas operationes manuales in Vulnerum curatione observanda sunt, breviter differere.

Operationes manuales Chirurghi quot, & quæ circa singulas sunt observanda?

Chirurgus peritus non tantum minister, sed sæpè etiam magister est Natura. Natura enim etiam si sola sanitatem adferat, tamen per se nec arma extrahere, nec vulnorum labia distantia coaptare consueque, nec pus abstergere, nec partes distortas dirigere, in

locumque proprium restituere potest, quæ omnia præstat Chirurgus; & ideo hæc pars Medicina ab operationibus manualibus Chirurghi, Chirurgiâs nomen adeptæ est, quæ nostris rectè ein Kunstreich der handgriff vnd wundartzney dicitur. Consistit autem omnis operatio Chirurghi in artificiosa manuum promptitudine, quæ non nisi exercitatione à præstantibus Magistris addisci & comparari potest. Sunt autem præcipua manuum operationes ad vulnerum curationem necessario numero octo.

1. Extractio armorum vulnere infixorum, & rerum alienarum vulnere inhaerentium.
2. Sanguinis è Vulnere fluentis abstersio, erumpentis suppressio, & concreti cruoris emundatio.
3. Labiorum Vulnerum delibescientium coaptatio, & conjunctio.
4. Artificiosa Vulnerum consuetio.
5. Remediorum convenientium Vulneri applicatio.
6. Aptæ & naturæ conveniens vulnere deligatio.
7. Excrementorum in Vulnere generatorem remotio & emundatio.
8. Symptomatum, si qua vulnere incidere possunt, præcautio & præsentium sublatio.

In hisce octo manualibus operationibus generalis omnium vulnerum curatio consistit; quæ itaque Methodo singulæ sint peragenda, & quæ regula circa quaslibet sint observanda, nunc breviter explicabimus.

Extractio armorum vulnere infixorum, & rerum alienarum inhaerentium evulsio, quomodo perficienda, & quæ circa eam observanda?

Eorum quæ vulnere infixæ sunt extractio.

Prima Chirurghi operatio est armorum & rerum Vulneri inhaerentium extractio, & evulsio: varia porro armorum genera, ut sunt Gladius, Cuspis, Pugio, Sagitta, Tela, Spicula, glandes sive globi plumbei (qua nostris geschos / pfeile) stralen

strafen vnd Kugelen / in dem leibe ge-
hoben / gestoßen / oder geschossen dicuntur)
violenter infliguntur, incutuntur, & implo-
duntur, qua propter violentam incussionem
sæpè perniciem adferunt. Quin etiam sæpè
vulneribus inhaerent aliena corpuscula, ut
sunt lapidum, vitri, surculorum & ossium
fragmenta; item arena, calx & vestimen-
torum particula, pili &c. qua nisi tempesti-
vè excimantur, natura operationes in conglu-
tinando, carnem generando, & cicatricem in-
ducendo, remorantur & impediunt. Et quan-
quam grandiora arma, ut sunt gladius, cu-
spis, & pugio, & quorum manubria è Vul-
nere prominent, vel sponte prolabantur, vel
antequam Chirurgus accersatur à proximis
& amicis præsentibus extrahantur, tamen
quando alius infixus & tenacius hærent, aut
profundius in Vulneri delitefcunt, aut mem-
bris principalibus, Chirurgi industriam &
dexteritatem, manuumque promptitudinem
ad sui extractionem desiderant; qua sanè
aut manibus, aut Chirurgicis instrumentis,
aut medicamentis, aut magicis incantationi-
bus pro natura vulnerata partis artificiosè
eximi, & evelli debent. Chirurgus itaque
industrius, ad curationem vulneris, in quo
adhuc arma infixæ hærent accessurus, instru-
ctus esse debet;

Primo instrumentis evulsoriis ac in primis
forcipibus omnis generis, Volsella, Terebris
incisoriis, & propulsoriis, quorum in superio-
ribus meminimus.

In extra-
hendis
armis
quæ con-
sideranda.
Secundo Remediis ad animi deliquium
facientibus, tum quæ intra corpus adhibe-
ri, & extra applicari possunt, quorum for-
mulas infra in Symptomatum vulnerario-
rum curatione de Syncope proposituri su-
mus.

Tertiò accurata diligentia considerare
debet naturam, situmque partis in qua ar-
ma sunt infixa; hærent autem arma fixa
aut in carnosiss partibus, aut ossis, aut
nervosis, aut in visceribus, aut in ipsis
articulis.

Quarto observabit studiosè formam fi-
guramque armorum, utrum sint lata, ro-

tunda, ancipitia, & antrorsum retrorsumque
acuminata.

Quinto, Vtrum arma alius profundius-
que vulnere inhaereant, aut partem vulnera-
tam penetrent, transeantque, quibus probè
cognitis in extractione armorum sequentes re-
gula sunt observanda:

Primo si arma in lethalibus vulneribus
fixa hæreant, qualia sunt vulnera Cerebri,
Cordis, Diaphragmatis, Ventriculi, intestino-
rum gracilium, Matricis, Vesica, vena cava
& arteria magna, Chirurgus prudens non
nisi rogatus cum protestatione predictioneque
de vitæ periculo, manus vulnere admoveat,
& arma extrahat.

Canones
in ex-
tractione
armorum
tenendi.

Secundo in armorum extractione accu-
ratè prospiciat Chirurgus, ne vel suis instru-
mentis, vel acie armorum extractione in vul-
neribus existentes, nervos venasque & arte-
rias majusculas sauciet ac ladat, ex eorum
enim vasorum latione sæpè majores noxa ex-
citabuntur, quam ex ipso vulnere.

Quare ubi talia vasa in vulneribus in
conspicuum veniunt, ea obtuso hamo suble-
vanda, vel ligneo specillo ad latera removen-
da erunt, donec arma sint extracta.

Tertio Arma infixæ vulnere præstat sta-
tim in initio, donec vulnus recens est, & libe-
rum à Symptomatibus, extrahere, præsertim
si conspicua sint, & commodè sineque difficul-
tate eximi queant; verum ubi arma pro-
fundius in carnosiss partibus fixæ delitefcant,
& nec facilè, nec sine gravi noxa evelli
queant, ea spacio novem dierum aut circiter
in vulnerata parte relinquenda sunt, donec
caro armis circumjacens putrescat, & sup-
puretur: tum enim laxata arma facilius
protrahi possunt, interim tamen singularis
cura est adhibenda, ne graviora Sympto-
mata in vulneribus excitentur, & vulnere
subinde extractoria remedia applicanda
erunt.

Quarto, Arma quæ carnosiss partibus
fixæ hærent, facilius & minori cum pericu-
lo extrahi possunt, quam quæ in nervosis
aut in ligamentis. Ea enim ut plurimum
motui ac sensui noxam adferunt, & ichores
in

in vulneribus prognerant, & ingentes dolores excitant; sic in ossibus harentia difficiliter evelluntur; in visceribus raro sine vita periculo.

Quinto, Etsi autem omnes modi extrahendorum armorum scriptis tradi minime possunt, sed Chirurghi prudentia pleraque committi debeant; tamen pro natura vulnerata partis, & figura armorum magna ex parte duobus potissimum modis evellenda & extrahenda sunt, retractione videlicet per eandem viam per quam ingressa & impulsasunt, & per propulsionem ex adversa sana parte, novo facto vulnere; qui modi extractionis aut manuum, aut Instrumentorum, aut remedium protraherentium, praesidio debent perfici.

Sexto, Retractione arma evelluntur, quae in vulnere apparent, & in superficie vulneris harent; minora vero arma in vulnere latentia, & profundius harentia, & quae ultra mediam crassitiem vulnerata partis penetraverunt, in primis globi plumbei, tela & sagittarum spicula, & maxime quae utrinque acuminatas & retro vergentes pinnas habent, quas ideo nos anchoriformes appellamus, & nostratibus strahlen dicuntur, si loci affecti natura permittat, propulsione, protrusioneque securius quam retractione eximi possunt.

Septimo, In Retractione armorum si vulnus angustius sit, quam ut corpus inharens extrahi queat, Vulneris os aut scalpello, aut novacula, aut cultro incisore dilasandum erit.

Octavo, Arma, ac imprimis sagitta, ac globi, in vulnere delitescunt, quam profunde impulsasunt, & utrum in carne, osse, visceribus aut coarticulationibus harent, immisso vulnere argenteo aut ferro specillo, facile explorari potest.

Nono, Si itaque tela & ejus generis arma in musculis sive carnosissimis partibus fixa harent, ac delitescant, apprehendique manibus nequeant, instrumentis convenientibus retrahantur; aut si maximam partem laesa partis penetraverunt, per instrumen-

ta propulsoria in adversam partem discutiantur.

Decimo, Glandes sive globi plumbei si ex propinquo, corpori sunt impositi, sua violentia cum ossa, tum viscera perfrangunt, & citam mortem inferunt: Ex longinquo autem impulsasunt, aut si alio quovis modo eorum violentia frangatur, ut corpus penetrare nequeant, sed in carnosa tantum aliqua parte subsistant & harent, nihil inferunt periculi, & vulneris consolidationem admittunt, cicatricemque recipiunt, etiamsi in corpore remaneant; sed temporis processu, ac post plures annos, ab ipsa natura, cum abscessu propelluntur.

XI. Tela, sagitta & similia arma ossi infixasemper per eandem viam retrahendo, ac huc atque illuc leniter commovendo, donec ab osse liberentur, evellenda sunt: cavendum tamen ne inter agendum confringantur, & eorum particula in osse relinquantur; at vero si in osse firmiter harent, quam ut ulla retractione evelli queant, os ipsum circa telum sive spiculum terebello accommodato circumquaque multis foraminibus excavetur, donec telum liberè protrahi queat.

XII. Tela & alia arma in coarticulatione ossium harentia, retrahendo eximi debent; verum ante extractionem utraque pars coarticulata robustis fasciis circumvolvatur, & ab invicem forti tractione distrahatur, ut articulus dilatetur ac laxetur, & ita arma commodius sine laesione nervorum & ligamentorum, quorum vulneratio periculosa est, retrahi queant. Hac de extractione armorum à vulneribus Chirurgia Studiofis observasse satis erit.

Porro ubi in vulnere corpora minutiora, qualia paulo ante recensuimus, inharent, naturae operationes remorentur, & neque manibus, neque instrumentis eximi queant, ea ut plurimum processu temporis à natura ad vulneris superficiem propelluntur, ante quam propulsionem nulla potest vulneris fieri conglutinatio.

Vt autem citius ea protrudantur, natura remediis extrahendi facultate praeditis, & vulnere impositis, adjuvanda erit, quorum reme-

remediorum in superioribus meminimus. Hoc loco satis erit pauca tantum subijcere.

Ex quibus simpliciora sunt radix arundinum confusa, & cum melle in formam Catapl. redacta, qua sine dolore, & arma & aliena corpuscula à vulnere proliciat. Idem prestat & plantago aquatica, cum radice eodem modo imposita. Item cinis ranarum aquatiliū cum melle temperatus & impositus.

Composita verò extrahentia remedia celebriora hac habentur: Empl. extractivum Avicenna, quod sic habet:

R. Propolis i. e. sordium alvearibus apum adhaerentium, aut, si ea ad manus non sunt, Mellis Virgi. 3. ij. Visci querci. aut cujuscunque alterius arboris 3. j. Ammoni. liq. 3. s. ol. veter. q. s. fiat in mortario Catapl.

Aliud Fallopii: R. Propolis, Aristol. Sagapen. ana 3. j. s. Fermenti acris, stercor. Columb. putresc. & nondum arefacti ana 3. j. Bulborum sive rad. Narcif. No. ij. Picis navalis liq. Mellis crudi ana q. s. ex omnibus in mortario confusis & probè subactis fiat Empl.

Aliud: R. Rad. Diptami albi qua Fraxinella est, dictam. Creti. quo cervi sagittas infixas excutere creduntur, Sagapeni, Asa foetida. Gumm. Elemi ana 3. j. visci quercini vel alterius arboris 3. j. Resina liq. 3. j. s. Euphorb. 3. s. Sulph. viri 3. ij. Picis liquid. Mellis crudi ana q. s. fiat Empl. Suprà quoque inter Empl. vulneraria proposuimus Empl. attractivum efficacissimum.

Sunt etiam qui magica superstitione & incantationibus arma à vulnere se evellere posse profiteantur, inter quos primas tenet Magorum monarcha Paracelsus, qui dicit in Magnete & in verbis quibusdam certo tempore certisque stellarum dispositionibus pronuntiatis, & characteribus insculptis vim caelestem influere, quibus non tantum à vulnere, sed etiam ex numero & parietibus infixata tela & ferreus clavus excuti, & serra clausa aperiri possint. Verum cum nos hac

prestigias Diaboli esse arbitremur, tales armorum extractionses gregi Paracelsitarum relinquimus. Evulsis extractisque armis vulnus ipsum Chirurgica methodo (ut deinceps docebimus) convenientibus remediis facile per sanari potest.

Sanguinis è Vulnere erumpentis absterfio, & fluxionis cohibitio, quomodo peragenda, & quæ circa suppressionem sanguinis sint observanda?

Sanguinis è vulnere profluentis absterfio & suppressio.

Post armorum è vulnere evulsionem secunda manualis Chirurgi operatio est Sanguinis è Vulnere profluentis absterfio & suppressio. Cum enim omnis vulneris recentis comes sit sanguinis eruptio, nisi profluens sanguis sistatur, omnes reliquas Chirurgi operationes turbantur atque impediuntur. Necessario itaque omnis cura & cogitatio Chirurgi post armorum extractionem, ad sanguinis absterfionem, concreti cruoris emundationem, & fluxionis cohibitionem converti debet.

CAUSA effluxionis sanguinis è vulnere est vel incisio, vel praevisio alicujus vena aut Arteria. In his enim duobus vasis duntaxat continetur omnis sanguis, & per eorum ramulos, per totum corpus & omnes ejus partes, maxime verò in carnosas & cutem dispergitur. Virum autem in vulnere laesa aut incisa sit vena, vel Arteria, ex sanguinis effluentis vena, aut substantia & colore facile internosci potest. Si enim sanguis cum impetu & saliendo erumpat, & substantia sit tenuis, coloreque subflavus, arteriam in vulnere incisam atque praecisam esse ostendit. At verò ubi sanguis uniformiter sine saltu & sensim effluit, & substantia crassa coloreque subnigra conspicitur, Venam laesam, aut praecisam esse arguit. Quantum autem largius sanguis erumpit profluitque, eò majores rami venarum vel arteriarum sunt vulnerati. Porro cum sanguis in corpore sit thesaurus Vita, si is è vulnere præter modum profluat, nisi tempestivè cohibeatur ac suppressatur, in Syncopen, & tandem in vita periculum conjicit. Quantum ad curationem sive fluxionis sanguinis cohibitionem attinet,

Causa hæmorrhagiæ è vulnere, Utrum arteria laesa sit, quomodo dignoscendum.

Sistendi
sanguinem tres
modi.

Sanguis
ut abs-
tergen-
dus à
vulnere.

Sit ne
statim
suppri-
mendus
sanguis.

Galenus & Avicenna sapientissimi Medici, tribus modis fieri oportere docent. 1. Per a-
versionem, sive revulsionem in aliumque lo-
cum derivationem, quæ peraguntur aut vena
sectione, aut cucurbitulis affixis, aut partis
adverse frictione, & fortis deligatione. 2. Per
interceptionem, ubi Vena vel Arteria præcisa
vinculis constringuntur. 3. Per remediorum
constringentium exiccationem & obstructio-
nem, quorum modorum priores locum habere
possunt in effusione sanguinis è naribus: sed
in vulneribus majoribus eos usurpare ridicu-
lum esse arbitramur. Initio itaque in vulnere
sanguis omnis mollissima spongia, aut tenui-
bus linteolis complicatis aquaque calida im-
butis, abstergendus erit. Deinde vulnus &
sanguine contaminata particula, Vino rubeo
tepidò & astringente ablunda erunt; præ-
stantius sit hoc vinum si in eo concoquantur
Agrimon. Cariophyll. & Mastix. Deinde
cruriosè emundandus, vulnerisque to-
tius magnitudo & constitutio, & utrum in
eo vena aliqua aut arteria majuscula sint in-
cisa aut præcisa, accuratè considerandum erit;
& ita observatis sequentibus regulis, sanguis
artificiosè suppressatur.

1. In suppressione sanguinis cavendum
est ne citius aut tardius quam par est, & na-
tura vulnerata partis patitur, effluxio sistat-
ur cohibeaturque. Utrumque enim noxam
infert; cita quippe sanguinis suppressio in-
flammationem & Erysipelata; tarda verò
cohibitio, & intempestiva profusio sanguinis
virium collapsionem, & animi deliquium in-
fert; in corporibus itaque imbecillioribus
vulneribusque magnis, atque in quibus ma-
jora vasa sunt præcisa, item ubi metuitur a-
nimi deliquium, statim ac sine mora sanguinis
profluvium est sistendum. In robustis verò &
plethoricis corporibus, ubi vires constant, &
in vulnere minora tantum vasa sunt læsa,
atque etiam in quibus corporibus ex ira, aut
temulentia, aut nimia calefactione corporis
sanguis est commotus, in illis largior fluxio
concedenda erit, & justa profluvio etiam ex-
primendo adjuvanda, & eo usque fluere sinen-
da, donec color sanguinis & faciei mutetur.

2. Ex vena magna vulnerata sanguis Quo-
modò sistitur; ex arteria verò magna vix, do sup-
& cum summa difficultate cohiberi potest, primen-
Ubi itaque in vulneribus majora vasa sunt, dus san-
incisa, non autem præcisa, statim præcidendæ
erunt, & utraque eorum pars à carne libe-
randa, & hamo obtuso sublevanda, filoque ro-
busto ex serico intercipienda, vincienda &
colliganda erit.

3. Vulnus nec consuendum est, nec con-
glutinantia remedia eidem imponenda, donec
concretus sanguis ex vulnere penitus sit ex-
purgatus, vel digitis expressus; vel si pro-
fundum sit vulnus, specillo exemptus, cujus
apici mollis spongia, aut linteolum est alliga-
tum, & vino tepenti imbutum.

4. Expurgato è vulnere ὀρεῖσθαι, partes
vulnere adjacentes refrigerentur imposita
spongia in gelida aqua, cui quarta pars aceti
est admixta, sit imbuta. Concrevit enim
sanguis, ut ad vulnus fluere nequeant, &
tum vulneris cavitas repleatur linamentis
sive penicillis ex linteis detritis apparatus;
quæ si pulvere sanguinem comprimente con-
spargantur, imbuanturque, citius sanguis
supprimitur. Tandem supra ea Linamenta
supra mundissima & pectinata ovi candido
conquassato imbuta imponatur, vulnusque
deligetur.

5. In vulneribus minoribus, si necessitas
urgeat, & natura partis concedat, antequam
vulnere præscripta remedia imponantur, labia
vulneris artificiosè consuantur; de qua sutu-
ra paulo post differemus; & ita Topica san-
guinem sistencia imponantur, & vulnus de-
ligetur.

6. In eruptione sanguinis, Vulnera-
tus debet oculos claudere, ne proprium san-
guinem inspicere queat, & subinde spe fo-
vendus inter suppressionem, sanguinem jam-
jam sisti.

7. Si parum sanguinis è vulnere effluxit,
& corpus sit plethoricum, aut pars vulnerata
sit inflammata, aut febris agrum affligat,
vires autem adhuc consent, venam incidere
oportet. Si vulnus est in capite, aut collo, Ce-
phalicam ejusdem lateris; Vulnere autem in
Thorace,

Thorace, à collo usque ad Diaphragma existente, Vena Mediana brachii oppositi, sed si vulnus inflitum sit partibus sub Diaphragmate, & sub renibus, vena poplitis, aut Talaris ejusdem lateris incidi debet.

1. Est contractio labiorum vulneris valida deligatione, & fasciis ter quaterque circumvolutis contrahuntur labia, & erumpens sanguis sistitur.

9. Post deligationem per totum tempus curationis pars vulnerata secundum situm ita configurari & collocari debet, ut parum sanguinis ad vulnus confluat, & minimum doloris exciter. His in suppressione sanguinis observatis, Topica remedia sanguinis fluorem sistentia, quæ supra in remediis vulneratorum catalogo sunt commemorata, adhibenda erunt. Hoc loco pauca nobiliora subicere placuit:

Ex app. simplicia. Ex simplicibus sanguinem probe sistunt, Tela araneorum ex molis collecta. Crocus Martis, Arsenicum sublimatum, Calx viva, & albumina ovorum, aut etiam lutea cum aqua rosa. aut vino rub. concussa. & linamentis aut stuppis excepta, ac vulnere imposita.

Composita. Composita probatiora præter superius commemorata, sunt.

Galen. R. Thuris 3. j. Aloës 3. j. s. tenuiss. pulverisatæ commisce. & cum ovi candido in crassitiem mellis redacta, & mollibus pilis leporinis excepta, & imposita sanguinis eruptionem sistunt; supra quæ aut stuppa aut linteola complicata, vel in Oxycrato, i. e. aceto, & aqua mixtis imbuta, imponantur & fasciis deligentur.

Avicennæ. R. Boli Arme. Sang. Draco. Thur. Aloës citrini ana 3. s. Tenuiss. pulverisatæ commisce. & vel per se vulnere inspergantur, vel cum ovi albumine mixta, ut jam dictum, imponantur. Aut

R. Calcis vivæ. Vitrioli Roma. Sang. Drac. Gypsi. h. e. Marigen Gypsi / Aloës; Thur. ana p. a. tenuiss. pulverisatæ misce, & jam commemorato modo imponantur.

Aliud remedium nostrum. R. Gallam densam, quæ in prunis torrefiat, & igne-

scat, & tandem in aceto vini bis ter vè super reiterata tostione extinguatur, & confracta in eodem aceto, per noctem maceretur, & exiccata tenuissimè pulverifetur, cui tantundem tela araneorum ex molendinis collecta, & cineris chartarum lusoriarum commisce, ac per se, aut cum ovi luteo vulnere imponantur.

Magica sanguinis fluentis suppressionem gregi Paracelsitarum dignam ex Cardano subiciam, non quod efficacem esse existimem, sed ut fatua illorum superstitio manifesta fiat; si ter, inquit Cardanus, super vulnus recitentur hæc verba, statim compescitur sanguinis eruptio:

Sanguis mane in te, sicut Christus fecit in se.

Sanguis mane in tua vena, sicut Christus in sua pœna.

Sanguis mane fixus, sicut Christus, cum fuit Crucifixus.

Labiorum Vulneris coaptatio, sive unio, quomodo peragenda, & quæ circa eam observanda?

Tertia operatio Chirurgica post sanguinis suppressionem, est labiorum vulneris coaptatio, unio & conjunctio, quæ debet esse artificiosa & plenissima. In minoribus vulneribus ora debilescentia sola fasciarum deligatione & circumvolutione conglutinari & conservari possunt. In majoribus autem & latè patentibus vulneribus, necessariò labia vulneris unita & contracta, aut consuitione, aut laqueatione, aut fibulo constringenda, coaptanda, & conservanda erunt, donec labia coalescant, subinde impositis: itaque in coaptatione quatuor potissimum regulæ sunt observandæ:

I. In coaptatione labiorum sive ea consuantur, sive fibulentur, sive laqueis constringantur, accurata adhibenda est industria, ut utraque pars vulneris aequaliter, caro cum carne, & cutis cum cute contrahatur, neve alterius partis cutis magis emineat altera, neque distorta sint labia, sed plana & equalia, alias enim scabram & deformem cicatricem relinquunt.

Hb 2

II. Stu-

II. Studiosè cavendum ne semel conjuncta vulneris labia denud ab invicem distrahantur, id quod decenti deligatione, apta consuetudine, & vulnerata partis proba configuratione collocationeque facile provideri potest.

III. Vbi in vulnere alterum labium molle & tractabile est, alterum verò durum, & ossi adhaerens, placidè & sensim est attrahendum.

IV. Ita rite coaptata Vulneris labia, si sinitione non sit opus, tum decenti colligatione & fasciis ad triduum, donec vulnus coalescit, retinenda erunt, antequam nova fiat deligatio, nisi forte aliquod Symptoma novam requirat deligationem.

Sutura, Fibulatio & laqueatio vulneris quid, quomodo peragenda, & quæ circa eas observanda?

Quarta manualis Chirurgi operatio est consuetio, sive labiorum vulneris unitorum conservatio. Quatuor hæ operationes Chirurgica, Sutura, Fibulatio, Laqueatio & Deligatio inter se cognata sunt, & ad unum finem tendentes, videlicet vulneris coaptati & contracti in eodem situ, donec natura vulneris partes conglutinet, retentionem. De deligatione statim in sequentibus dicemus. Nunc de Sutura, fibulatione & laqueatione breviter differemus, ac primò de sinitione.

Est itaque Sinitio, sive sutura, compaginatio quadam partium in vulnere ab invicem distantium mediante acu & filo.

Vulnus consuiturus Chirurgus debet in promptu habere acumen, fila convenientia, & acus quidem habere debet plures, alias duras ex chalybe, alias molliores, & flexibiles ex ferro, & omnes lenes & expolitas, mundasque, cuspidè triquetras, quales sunt Pellionum, longitudinis trium aut quatuor digitorum transversalium, quarum cauda foraminata utriusque excavata esse debet, ut filum transactum intra se recondere queat.

Filum ad suenda vulnera, aptissimum est sericum rubrum, non ultra modum crassum, robustum tamen & planum, omnique nodo carens.

Tonfores nostri utuntur filo communi incarato, sed perperam.

Suturæ species sive forma communiores sunt duæ:

Vna recta & continuata, sartorum sutorumque similis, qua fit ab uno termino vulneris ad alterum, acu cum filo per labia vulneris trajiciendo, & circumvolvendo, cujus usus est potissimum in intestinis, in membranosis partibus, & cutis solius consuetione, ubi suppressione sanguinis opus est.

Alteræ species suturæ Punctatio jure nominari potest, quia punctando fieri solet, in qua vul. labiis acu & filo punctim trajectis & contractis filum in utraque vul. parte convolvitur, & in nodum colligatur. Hæc species non, ut prior, in vulneris termino incipienda est, sed in medio, atque inde in utrumque vulneris terminum procedendum. Nodi autem fili, sive punctationes in vulnere ab invicem distare debent ad digiti transversæ latitudinem. Ea in carnosiss partibus & cutis consuetione utimur, nostratibus Der wunden zusamenknüpfung dicitur. Hanc speciem suturæ Fallopius veram fibulationem esse existimat; sed alii Medici de fibulatione secus sentiunt; idè quid sit fibulum, & quid fibulatio, & quid differat à laqueatione, brevissimè explicabimus.

Fibuli vocabulum non eodem modo usurpatur à Poëtis & Medicis.

Poëtæ enim per fibulationem intelligunt castrationis quandam speciem in adolescentibus, qua à re Venerea arcenda utebantur Veteres, qui fibulum, h. e. aneum anulum imponebant perpetuò, cujus Martialis meminit, & Celsus.

Medici verò & recentiores, & Veteres, per fibulationem intelligunt labiorum vulneris, ubi sutura locum habere nequit, & in corporibus qua suturam ferre nequeunt, per ferrea aut anea instrumenta contractionem & conservationem.

Sunt itaque Medicis fibula anea aut ferrea instrumenta, in utraque sua extremitate uncus sive hamus habentia, similia hamis illis, quibus pannorum tonfores pannos mensa

mensa connectunt, cuii widerhastich angel-
Taliū fibularum unci non ipsi vulneris cuti
infiguntur, id enim duplicaret molestias vul-
neris, sed duplicatis linteulis, ad longitudinem
vulneri adaptatis, & ad ducum digitorum
latitudinem, utrinque sanis partibus vulneris
glutine applicatis, & firmissimè adglutinati
contracto vul. infigunt & continent, der
wunden Zusammenhafunge.

Laquea-
tio.

Laqueatio eodem ferè modo fit ut fibula-
tio, nimirum per pannos utrique parti vul-
neris agglutinatos; quorum parti proxima
vulneri per intervalla ad spatium crassi di-
giti vincula latius sunt alligata, quibus con-
tracto vulnere & circa alteram sanam par-
tem colligatis, vulnus in eodem statu conser-
vatur. Der wund mit bend Zusammen-
zihung.

Fibula-
tionis &
laquea-
tionis u-
sus in
facie.

Nunc satis apparet qua sit differentia inter
fibulationem & laqueationem, ex qua-
rum usu in cicatrice minor scabrities & pun-
ctationis deformitas relinquitur, quam ex
suiitione. idèd prestat eis, pro futuris, uti
in vulneribus faciei, genarum & fron-
tis.

Ad applicationem verò linteorum,
quibus utimur ad fibulationem laquea-
tionemque, gluten singulare requiritur, cu-
jus unicam parandi formulam subi-
ciam:

Gluten
ad fibula-
tionem
& laque-
ationem.
Canones
in fuen-
dis vul-
neribus
tenendi.

R. Sang. Dra. Thur. Mastich. Sar-
cocoll. Picis, farina volatilis ana ʒ. j. in te-
nuiss. pul. redacta, aut cum albu. Ovorum,
aut cum glutine piscium, in Linimenti for-
mam reducantur, eoquè lintea ex una parte
imbuantur, & partibus sanis utrinque vul-
neri applicentur.

Porro in vul. consuitione hæc quinque re-
gule sunt observanda:

1. Nullum Vulnus consuendum, aut fi-
bulis laqueisque constringendum, nisi prius
ab omni impuritate vulnere inbarente sit ex-
purgatum. Quæque enim aut alia impuritas
in vulnere relicta, purefcit, & inflamma-
tionem adfert, Naturaque operationes remo-
ratur.

2. Sola vulnera recentia & adhuc san-

guine madentia per consuitionem, fibulatio-
nem & laqueationem à natura conglutinari
possunt. Nam sanguine carentia vulnera, &
qua pelliculam contraxerunt, frustra ten-
tantur aut fibulo aut sutura conglutinari.
Ideo in siccis vulneribus detrahenda est pri-
mum adnata pellicula, aut scarificanda sunt
paries vul. ut sanguine madescant. Hac ra-
tione conglutinantur labia oris scissa, qua no-
stratibus hasenmundt dicuntur.

3. Suiitio omnis à Chirurgo blandè, &
quam maximè fieri potest sine dolore, peragi
debet, & vulnere labia ita constringi filo,
ne denuo resolvi queant.

4. Nervi aut ligamenta, si in vulnere
præcisa sunt, nulla consuitione coalescunt;
satis itaque erit ea in vulneris cute obducere,
& carnem cum cute constringere.

5. Vbi vulnus conglutinari cæpit, quod
ut plurimum quarto die fieri solet, fila ex
sutura cultello scriptorio descendenda erunt,
& artificiosè eximenda, ne deformitatem &
scabritiem cicatrici inducant.

Medicamenta Vulneraria ipsis vulneribus
quomodo imponenda, & quæ circa
ea consideranda;

Quinta operatio Chirurgica est medica-
mentorū natura operationes adjuvantium
applicatio & impositio. Medicamentorum
enim, ut diximus, impositione in vulneribus
adjuvantur operationes Naturæ; Subinde
itaque varianda sunt remedia, quæ vulneri-
bus imponuntur, pro ratione operationum
naturæ & constitutione Vulneris. At primum
imponi debent sanguinem cohibentia, deinde
Symptomatum occasionem prohibentia, post-
eà conglutinantia, tandem carnem genera-
ntia; postremò cicatricem inducentia. Etsi
autem in omnibus vulneribus aliena & præ-
ternaturalis humiditas vulnere sit aduersissi-
ma, ut qua facile putrefactionem inferre
queat, idèd vulneraria remedia omnia
debent esse exiccantia. Cavendum tamen
sedulo ne per imposita remedia, temperies,
h. e. inculcata constitutio partis vulnerata
labefactetur, sed potius per ea conserve-
tur.

Vulnera-
ria medi-
camenta
quo or-
dine ad-
plicanda.

tur. In genere itaque Medicamenta conglutinantia debent esse desiccantia & constringentia. Sarcotica verò oportet esse moderate siccantia, aperiencia tamen, ut adfluenti sanguini via aperiatur. Verum cum de medicamentis vulnerariis & quæ in quibus formis sint usurpanda, supra abunde dixerimus, eò recurrendum suademus.

Porro circa medicamentorum impositionem sequentes regulae sunt observandae:

Canones
in medi-
camen-
torum
adpli-
catione
tenendi.

I. Si in siccioribus Vulneribus nullum metuatur futurum Symptoma, satis erit remedium impositum alternis diebus immutare. Ubi verò vulnus sordidius humidiusque conspiciatur, tum singulis diebus immutandum; Si verò Ichores ex Vulnere largius profuant, singulis diebus bis ea colluvies abstergenda, & Emplastrum renovandum erit.

II. Primis septem diebus post consuetudinem & medicamentorum impositionem summa est adhibenda diligentia, ne ulla Symptomata, in primis autem dolor, inflammatio, & tumor incendant.

Si dolor in Vulnere ex medicamento excitetur, statim aliud remedium mutato priore imponendum.

Inflammationem verò arceat & simul tumorem, ovi albumen concussum stupisque exceptum, & circumjacentibus partibus impositum.

Tumorem vero prohibet, si partes circa Vulnus vino styptico tepido, aut aceto roseo abluantur, aut ea stuppis excepta imponantur.

III. Post remediorum convenientium impositionem Emplastro imposito superimponatur pulvillus, qui aut ex stappa, aut ex linteolis convolutis, aut linamentis conformatur, & simul cum Emplastro deligatur, cum ut Emplastrum tenacius vulnere adhaereat, tum ut natus calor in parte vulnerata foveatur ac conservetur.

Deligatio Vulnerum quomodo peragenda, & quæ circa deligationem observanda?

Sexta necessaria manualis operatio Chirurgica in Vulneris curatione, post sanguinis suppressionem, labiorum vul. contractionem, consuetudinem & medicamentorum impositionem, est artificiosa deligatio. Die wunde zu verbinden.

Deligatio
Vulne-
rum.

Est autem deligatio apta vulneris contractio & compressio, circumvolutioque cum pannis lineis, sive fasciis. Instrumenta enim deligationis vulneris, fasciae sunt, quæ pro varietate vulneris, & crassitie partium vulneratarum diversam sortiuntur & latitudinem, & longitudinem; debentque tamen esse ut plurimum quatuor digitorum transversorum latitudinis; longitudinis verò duorum triumve cubitorum. Excindi autem debent fasciae ex linteis attritis mollibus, & quantum fieri potest mundissimis.

Fasciarum secundum longitudinem, extremitates Chirurgi capita, aliis cauda appellantur, nos extremitates vocabimus. Tres sunt causa deligationis vulnerum, idè tres species sive forma deligationis nobis relinquuntur;

Prima causa est ut labia vulneris dehiscentia per colligationem contrahantur, & contracta contineantur, eam nos constrictoriam vocamus, vocent alii ut volent.

Deliga-
tionis
triplex
modus
pro causa
triplici.

Deligatio constrictiva autem fit in vulnere carnosarum partium, ubi labia plurima distant, in aqua primum duplicatum linteum vulnere imponetur, & ex adversa parte consuitur, ac tandem fasciae quæ ejus latitudinis esse debet, ut, si fieri queat, non tantum vulnus ipsum, sed & utramque partem aliquo modo contegat. Ejus fasciae medietas vulnere imponatur, & altera ejus extremitas sursum, altera deorsum parti affecta circumvolvatur, ac tandem utraque pars aut adsuatur, ita tamen ut ligatura in ipso vulnere paulo arctior sit quam in sanis partibus.

Secunda forma, sive modus deligationis retentiva, cum qua remedia vulnere imposita,

sita, ne defluant, aut decedant, constringuntur & continentur. Fit autem deligatio retentiva, ubi fascia extremitas altera vulnere imponitur, & circumvolvitur sursum vel deorsum, ut vulnerata constitutio effragitat, & ejus fascia terminus adsuitur. Oportet autem hac deligatione leniorem constrictionem fieri, quam in prima forma sive constri-
ctiva.

Tertia forma sive modus deligationis est Deligatio expulso-
ria, qua purulentis ulceribus aptior est quam recentibus vulneribus. Ejus usus est ut per eam à fundo Vul. seu ulc. collecta excrementa & purulenta colluvies extrudatur, & ad orificium Vulneris propellatur, ne amplius aliqua colluvies adfluere queat. Fit autem expulso-
ria deligatio, ubi fascia altera extremitas, aut superiori, aut inferiori parti Vulneris, ubi colluviei collecta suspicio est, (quod ut plurimum propter materia gravitatem in infima parte accidere solet) injicitur, & initio arctissime circumvolvendo constringitur, sensimque laxius circumvolvitur usque ad os vulneris, atque ubi ad orificium vulneris est deventum, fascia alia linteolo subligatur, eaque vulnus transponitur, & ea quoque pars, ut ne quid amplius influat, circumvolvendo constringitur, & assuitur.

Canones
in deli-
gatione
vulne-
rum re-
nendi.

Circa vulneris deligationem hæc regula observanda sunt:

I. Omnis deligatio debet fieri cito, expedite & sine doloris molestia, sed ut ager tolerare queat.

II. In omni deligatione cavendum est ne vel nimis arcta, vel justo laxior sit deligatio; Laxior enim, nec labia vulneris constringit, nec Emplastrum imposita continet, nec excrementum è vulnere exprimere potest; arctior vero dolorem & inflammationem excitat.

Fascia vulnere involuta, si tenacius propter adfluxum puris adhæreat, violenter non est detrahenda, sed cum Vino aut Hydromel. aut alio liquore tepido tantisper irrigetur & madescat, donec sine molestia separari queat.

Excrementorum purulentorum
è Vulnere remotio & ab-
tersio quomodo
peragenda?

Septima Chirurgi operatio in curatione vulnerum est puris & aliorum excrementorum in vulnere ex impuritate sanguinis adfluentis generatorum, & ad superficiem vulneris propulso-
rum remotio, emundatio & ab-
tersio, Die wunde van etter vnd allerlei wuster feuchticheit zu sauberen. Generantur enim quotidie in vulneris cavitate excrementa quadam, aut laudabilia, & facilem curationem pollicitantia, ut est pus inculpatum; quod debet esse album, leve, a-
quale & minime foetidum. Aut ingeneratur sordidum & praternaturale pus, foetens & alieno colore tinctum, quod sordes dicitur, & indicium est corrupti sanguinis, & nova carnis, in vulnere generata, corruptionis. Aut confluit in cavitate vulneris, per osque ejus profluit aquosa colluvies, h. e. sanies, Das glidewasser. De his excrementorum speciebus supra in curatione vulneris abunde tractavimus, ac deinceps inter Symptomata Vulnerum quadam dicturi sumus. Hoc loco satis erit in genere de cujuslibet colluviei specie in vulneribus generata abstersione, remotione, emundationeque dicere, de qua sequentes regula sunt observanda:

Mundifi-
catio vul-
nerum.

Excre-
menta in
vulnere
triplicia,
pus, sor-
des, sa-
nies.

I. Pus, etiam laudabile & secundum naturam se habens, si diutius in vulnere hæreat, operationes naturæ in conglutinando & carne nova generanda remoratur, & vulneris temperiem corrumpit. Magis autem si pus sit sordidum, vel saniosum, ubi diutius in vulnere permanceat. Ideo accuratissime omne pus & sordes, omniaque excrementa tempestive, ubi vulneris remedia nova imponuntur, & nova fit deligatio, semper abstergi & remove-
ri, elui & exiccari debent.

II. Absterguntur autem è Vulnere excrementa, aut mollissima spongia, aut molli linteolo, aut linamentis, ac si ulcus profundum sit, ea apici specilli alligari debent, & vulnere inferi, omnisque colluvies emundari.

Elotione

Elotione verò ubi opus sit, utere Vino stiptico tepido, cui nonnihil Sarmenti Indici, & Mastichis sit incoctum.

III. In vulneribus profundis, si largius habeat excrementum, in infima ejus parte foramen faciendum est, aut scalpello aut causticis remediis, ut omnis purulentia liberè profluere queat.

Symptomata
vulnecurum.

Symptomata, quæ Vulneri incidere possunt, quomodo curanda?

Octava operatio studiumque Chirurgi debet esse ne Symptomata in Vulnus incidant; & si qua in eo excitentur, ut ea remediis aptis & exquisitis tollere & lenire queat. Cum autem varia Symptomatum genera non tantum in vulnus ipsum, verum in totum corpus vulneratum incidere soleant, ut sunt, dolor, inflammatio, tumor, putrefactio, sordities, profluvium aquosi excrementi; item Syncope, Vomitus, alvi suppressio, febris, vigilia, delirium, spasmus, & Paralysis, vulnerataque partis tabes sive extenuatio. De horum omnium Symptomatum curatione paulo post brevissimè tractaturi sumus, ubi primum Vulneris precipuarum partium curationes breviter proposuerimus; non enim omnium partium Vulnera eadem methodo & iisdem remediis persanari debent, aut possunt. Hac de generali curatione vulnecurum Chirurgia Studiosos observasse satis esto; quibus probe cognitis, facile quilibet poterit omnia vulnera feliciter curare; nunc ad particularia vulnera accedemus.

Quarum partium Vulnera peculiarem requirunt curandi rationem?

Vulnera
partium
quæ
peculiarem
curam
requi-
runt.

Esti omnium ferè partium Corporis Vulnerum generali jam à nobis proposita methodo, commemoratisque remediis Vulnerariis, habita tantum ratione natura partium, commodè curari possunt; sunt tamen cum ex Simplicibus sive similibus, tum ex compositis seu Organicis membris, quadam quæ si vulnerentur, peculiarem curationem, & sua natura convenientia medicamenta desiderant. Quales inter similes partes sunt, Caro, Nervi, Ligamenta & ossa.

Inter verò organica membra, sunt Caput,

Oculi, Nasus, Collum, Gula, Guttur, Pulmo, Cor, Spina dorsæ, manus pedesque, Diaphragma, Renes, Epar, Lien, Venter, Intestina, Vesica, Testes &c. De quarum singularum Vulneribus post generalem methodum, quæ sint observanda; nunc brevissimè differemus.

I. Carnis, sive Carnosarum partium Vulnera, quomodo curanda?

De carnis, sive carnosarum partium vulneribus.

Caro simplex in Universo corpore nusquam reperitur, sed semper adnata est venis, arteriis, nervis & membranis eisdem intertexta, quorum constructio Musculus dicitur; & sola caro per se nunquam vulneratur, sed semper cum ipsa una vulnerantur & Cutis & Vena, & arteria, & nervi, & membrana, & simul una quoque curantur.

Caro nusquam sola vulneratur.

CVRATIO Vul. in Carnosis sive musculosis partibus facillima est, Caro enim est concretio quadam elaboratissimi sanguinis, & cum sanguis subinde affluat in vulnus, ex eo caro generatur, quæ vulnus conglutinat; adhibitis tamen remediis & operatione manuali, quæ in generali curatione proposita est: nisi forè musculi aut caput aut cauda, h. e. Tendines & ligamenta sunt præcisa, aut vehementer læsa: Eorum enim vulnus aut prorsus aufert, aut vitiat motum. Et nisi musculi aliqua pars casim prorsus est amputata, ex qua vulnus excavatum efficitur, in iis Vul. carnosus, peculiaris requiritur medicatio. Verùm de præcorum ligamentorum tendinumque curatione paulo post differemus: nunc satis erit brevissimè generalem curationem musculorum repetiisse.

Musculorum vulnera curatu difficiliora.

Est itaque carnosarum partium curationi juxta regulas supra traditas, ut primum profluens sanguis sistatur inperfo pul. rubeo, sive conglutinatorio supra commemorato.

Curatio vulnerati musculi.

Deinde si Vulnus est magnum & patens, ut labia coaptentur, consuanturque.

Tertio, ut arcendorum Symptomatum causa ovi candidum concessum, & supra exceptum, Vulneri per triduum imponatur, tandemque Vulnus vino tepido crebrius abluatur. Vinum enim, teste Hipp. omnibus Vulneribus aptissimum est. Postremò imponantur

nantur Emplastra, primum quidem conglutinantia, deinde Sarcotica, postremò Cicatricem inducentia, semper adhibita artificiosa deligatione, de quibus Chirurgi operationibus paulo ante à nobis abunde dictum est.

Vulnus Cavum Porro ubi in aliquo Vul. non tantum divisa est substantia carnis & cutis, sed etiam amputata & amissa: tum Vulnus cavum efficitur, cavamque efficit cicatricem; non enim facile labia vulneris coaptari conglutinarique possunt. Annitendum tamen est, ut quatenus fieri queat, nova carne cavitas Vulneris repleatur.

Caro autem cum ex sanguine, Natura beneficio solo, generetur (per Naturam autem hoc loco intelligimus partis affecta Evaporationem & calorem nativum) Vbi sanguis in corpore inculpatus est, & partes sana, & temperata, ibi caro amissa deperditaque, etiam nullis adhibitis remediis, sed solo folio Brassicae, Vulneri imposito, regeneratur, modò pus excrementitium tempestive à Chirurgo removeatur.

Remediorum delectus pro in-temperie partis. Satis itaque erit cavo vulnere persanando, in temperatis Corporibus imponere remedia, quae vel ejus aquosa excrementa (si adsint) exiccent; aut, si sordida existant, expurgent. Quae autem remedia & exiccent & expurgent Vulnera, supra & in curatione Ulcerum & in enumeratione Remediorum, abunde proposuimus.

In eis autem applicandis natura & temperies Vulnerata partis unicè est observanda, ut calidis frigida, frigidis calida, humidis sicca, & valde siccis particulis moderate humectantia admoveantur. Ex his autem remediis quae supra sunt commemorata, semper ea sunt deligenda, quae plurimum juvent, & nullum inferant dolorem; & si quae noxam inferunt, statim immutanda erunt. Praeterea si Carnosis Vulneribus aliqua sunt Symptomata copulata, ea semper prius sunt removenda, & discutienda, quam Carnis generatio molienda: alias siquidem praesentibus Symptomatibus nec caro generari exoptata, nec Vulneris cavitas expleri commode poterit. De Symptomatibus verò, Vulneribus co-

pulatis, & quomodo singula sint curanda, paulò post tractabimus.

Nervorum, tendinum, & ligamentorum vulnera, quomodo curanda?

De vulnere Nervi, Tendinis, & Ligamenti.

Nervi, Tendines & Ligamenta exsangues sunt, & ex semine originem ducentes partes, & simul omnes nervosae partes nominantur, quarum vulnera inter se similem ferè, diversam tamen ab aliarum partium Vulneribus requirunt curandi methodum, & peculiaria remedia.

Nervi, νεῦροι, Sebn / oder sebnaderu / sunt organa immediata sensus & motus voluntarii, & ex cerebro & Spinali medulla progenerata.

Nervi quid?

Tendines sive chordae, Τένοντες, grosse seben oder flachs aderen / sunt musculorum extremitates ex concursu fibrarum filamentorumque, nervorum & ligamentorum per musculos dispersorum generata; quae substantiam habent nervis duriorè & albam: iis musculi ossium articulis alligati sunt, quò ossa robustius moveri queant; in motu enim & tendines contrahuntur & dilatantur.

Tendines quid?

Ligamenta sive Vincula, οὐδὲτοι, Gliederbende / Substantia eorum Propius accedit ad naturam Cartilaginum, quàm nervorum; mollior tamen est, quàm Cartilagines: Ortum ducunt ex termino unius ossis, & in alterius terminum implantantur, & in ossium coarticulatione duò ossa colligant firmissime. Ligamenta per se carent sensu, sed ratione membrana, qua vestiuntur, sensum obtusum habent.

Ligamenta quid?

Vulnerantur nervi, nervosaeque partes, aut punctim, aut casim; & casim, rursus partes aut in totum praeiduntur, aut cute carneque, quibus teguntur amputatis nudantur atque deteguntur. Sapè quoque nervosa partes per contagionem laeduntur atque vulnerantur. In his vero peiora sunt & difficilius curationis Vulnera, quae punctim, sive transfodiendo insiguntur. Vulnera porò nervorum ac tendinum peculiarem curandi methodum, & propria requirunt remedia.

Nervosae partes quot modis vulnerantur?

Signa
diagno-
stica.

Signa vulneratorum nervorum ac Tendinum. In nervorum vulneribus intolerabilis dolor (sunt enim nervi exquisitissimi sensus) crebra convulsiones, aliaque laboriosa Symptomata. Cum enim nervi omnes ex cerebro, aut ex ejus rivulo spina medulla generentur & exoriantur, magnam habent cum cerebro sympathiam, & gravissima excitant accidentia, ut sunt febres, vigiliae, vulneris putrefactio ex aquosa sanie, & motus atque sensus aut amissio, aut debilitas.

In vulneribus nervosarum partium, in primis autem in nervorum substantia, hi Aphorismi & signa praesagientia, tanquam regula in curatione sunt observanda.

I. Nervosarum partium curatio ceteris vulneribus magis est contumax, tarda & difficilis, cum quia partes sunt exsanguae, tum quia ob exquisitum sensum non valida ferunt qualibet remedia.

II. Nervosae partes solae nunquam vulnerantur; sed semper simul & Cutis & Caro eisdem incumbens, convulserantur.

III. Nervosarum partium vulnera maligniora sunt in ipsis articulis, ubi nervi, tendines & Ligamenta concurrunt.

IV. Praecisi per transversum dissectique nervi; & tendines, non tam saeva inferunt Symptomata, & tuti sunt à convulsione, quam si eorum vulnus ad remedium usque penetret, sed vulnerata ejus partis motum sensumque vel auferunt, vel vitiant.

V. Transversum secti nervi, non tamen in totum praecisi, saevas inferunt convulsiones; praestat itaque eos statim praecidere; satius enim est motu quam vita privari: cum convulsiones in Vulnere maxima ex parte lethales sint.

VI. Praecisi nervi ac tendines nullis remediis iterum conglutinari possunt, nec ferunt consusionem. Eorum tamen termini & extremitates indurantur, & carne cuteque obduci possunt; sed, ut dictum est, motu sensuque partis, vel amisso vel vitiato.

VII. Si in nervorum vulneribus tumor

apparuerit, & paulo post differeat, convulsio metuenda est.

VIII. In Vulneratis nervosis partibus, si vulneris orificium in cute & carne nervo incumbens exilius, & angustius sit, quam ut nervus conspici queat vulneratus, vel ut sanies profluere queat (in nervis enim vulneratis aquosa sanies progeneratio familiaris est) qua nisi subinde expurgetur exiceturque, convulsionem & inflammationem in Vulnere excitat, & saepe mortem inferit. Idem statim in initio angustum orificium usque ad nervum vulneratum, cultro rasorio aperendum ac dilatandum erit; ut & nervus vulneratus in conspectum veniat, & sanies omnis exprimi queat.

CURATIO Vulneratarum nervosarum partium, prater generalem supra traditam vulnerum curationem, consistit in debita victus ratione, vena sectione, Symptomatum praesentium sublatione, vel saltem mitigatione, & remedium vulneribus nervorum dicatorem applicatione. Victus ratio tenuis & parca esse debet; Vino prorsus est interdendum, & Hydrom. concedendum; ager quoque in tepido loco quietus detinendus. Post victus rationem considerandum erit utrum corpus vulneratum sit plethoricum & robustum, aut sit *νεκρὸς χυμὸς*, vitiosoque humore repletum; & in plethorico quidem atque robusto corpore, si atas & vires ferant, Vena ejusdem lateris, vel in cubito, si vulnus est supra umbilicum; vel sub poplite, aut malleolis, si vulnus sit infra Umbilicum, incidenda erit. At si corpus sit *νεκρὸς χυμὸς*, vel alvus sit suppressa, convenienti cathartico remedio succi vitiosi subducendi sunt, & alvus lenienda.

Tandem totum consilium curaque Chirurgi ad saevissimorum Symptomatum, doloris nimirum, & convulsionis sedationem, inflammationisque mitigationem, & Ichoris expurgationem exiccationemque convertenda erit. De quorum omnium Symptomatum artificiosa curatione paulo post inter Symptomata vulnerum fusius acturi sumus.

Porro remedia in nervosarum partium punctum

Vulnera
angusta
amplian-
da.

Curatio
vulneris
in nervo-
sa parte.

punctum aut casum illatis vulneribus saluberrima ac precipua sunt ;

Ex Simplicibus quidem Lumbrici terrestres contusi & vulnere imposti, Succus centaur. min. illitus, & pul. ejusdem inspersus, flos Sulph. inspersus, Pix liquida, qua commodissime nervis denudatis illinitur.

Item Ol. vetus in quo bulbi lil. alb. sunt incoccti, Ol. de Lumb. de strobillis picea, de luteis ovorum, Ol. ex Euphorb. Ol. lil. albo. & petroleum.

Etsi autem prescripta olea nervis sunt amica & familiaria, tamen in Vulneribus cutis & carnosarum partium omnia Olea, teste Hipp. inimicissima sunt, putrefactionem enim excitant, ideo prescripta olea in nervosarum partium vulneribus non sunt inserenda aut instillanda, sed foris tantum coniecto prius vulnere aliquo Empl. lineis molliss. aut lana excepta probeque calefacta imponi debent, & non tantum partes vulnere adjacentes eis fovenda, sed & spina dorsii & cervix, ubi nervi exoritur, eisdem inungi & confricari debent.

Ex compositis vero nervorum Vulneribus dicatis remediis prestantiora sunt, Ol. Hyperic. quod ita parari consuevit: R. Terebint. 3. j. Ol. Tereb. prima destillatione producti 3. iij. Ol. rosa. 3. ij. Lumb. terrest. in Vino generoso lotorum & nonnihil confusorum 3. vj. Rubea tinctorum 3. j. fol. Rorisma. Centaur. mi. Millefolii, omnium virescentium & confusorum P. j. Sulph. vivi pulveris. 3. ij. Vini Malvat. q. s. ut duorum digitorum latitudine reliquis emineat, commixta & in balneo Maria per 24. horas macerata, concoquantur ad Vini evaporationem, deinde fortiter expressa colentur, Colatus liquor pinguis in Vitrum augusti orificii infundatur, & Vitri vacua capacitatis floribus & seminibus virescentibus Hyperic. compleatur, & per astatem ardentis Soli exponatur, ter quaterve flores & semina permutando, & fiat salubre Oleum ad omnia nervorum vitia: quod tuto non tantum foris illini, sed & nudatis confusisque nervis imponi potest. Prescriptis autem omnibus nobiliss. esse in vulneribus

nervosarum partium deprehenditur sequens Unguentum. R. fol. Centaur. min. Cynogloss. Arnogloss. Pilosella, Consol. ma. Veron. omnium viresc. M. j. Lumb. terrest. generoso Vino lotorum 1b. s. Ol. veteris, vel, si haberi nequit, Ol. lil. alb. 1b. j. Vini Malva. 1b. j. Subigantur, ac commisc. atque per ostium vel in ardenti Sole, vel in tepido balneo Maria macerentur, ac tandem eisdem admisc. sevi hircini liquefacti, Picis nigra liquefacta, Resina ana 3. iij. Gum. Ammon. Oppopa. Galbani, omnium in aceto maceratorum dissolutorumque ana 3. v. quibus simul probe commixtis decoquantur lento igne ad Vini & aceti evaporationem; colentur & admisc. Tereb. 3. ij. Thur. Mastich. Sarcoc. ana 3. iij. Croci 3. ij. fiat Unguentum, imponaturque vulnere nervosarum partium tam earum qua confusione, incisione & confossione sunt vulnerata ac denudata, aut

R. Sulph. vivi 3. j. Ol. veteris in quo prius fol. Sambuci sunt incoccti q. s. Subigantur in mortario diutissime & in formam Linimenti redigantur, vulnereque nervorum illinantur.

Post illinitionem sequens Emplastrum nervosis partibus vulneratis imponi potest:

R. Alæ foetidæ 3. ij. Cera Ol. ver. Picis navalis ana 3. s. liquefacta commisc. fiat Empl. Aut imponatur Empl. nostrum de Vernice pictorum, aut Empl. propositum. Mirum in modum quoque inflammationes & alia Symptomata in Vulneribus nervosarum partium arcet, doloremque mitigat sequens Catapl. calidum impositum:

R. Farinæ fabarum, Erui ana 3. j. Coquantur cum lixivio acri, & addita q. s. Oxymel. fiat Catapl. Porro supra Empl. & Catapl. ne nervosa partes refrigerentur, mollis lana Ol. lil. calido imbuta imponatur ac deligatur. In Nervorum confusione omnium primum dolor mitigari debet ol. rosa. tepido, cui ovi candidum & far. faba. est commixta, impositio. Denudatis nervis non sunt acria remedia admovenda, neque ol. perfundendum, sed calx probe lota, & cum Ol.

Oleorum
usus in
nervo-
rum vul-
neribus.

Compo-
sita.

Chimici
com-
mendant
Ol Ma-
stichin.
There-
biat. ex
pin-
gued.
taxi, vul-
pis, ma-
gister.
Pompho-
lig.
Plumb.
Aristo-
loch. &
Irid. Flor.
Ol. Ca-
stor. Ef-
fent. Eu-
phorbi
Ol. lum-
bucor.

rofa. mixta commodè imponi potest. Ego magis laudo aq. Arnoglos. aut Centau. min. vi-
va Calci infusam probèque commixtam, &
ubi calx subsidit aq. per simbriam panni va-
sculo impostam, cujus extremitas in aliud
vas subiectum pendeat, destillatam & linteo-
lis impostam.

Vulnera Venarum & Arteriarum quo-
modo curanda?

De vul-
nere
Venæ &
Arteriæ.

Φλέβες, Vena, Die blutaderen / ἀρτη-
ριαι, Arteria, die Pulsaderen. Hi canales
humani corporis, Medicis vasa dicuntur. Ve-
næ enim continent sanguinem, Arteriæ verò
spiritum vitalem, una cum tenuissimo san-
guine. Exiliores rami Venarum & Arteria-
rum in Vulneribus carnosarum partium dis-
secti, post sanguinis suppressionem, facillime
per generalem curandi methodum & medi-
camenta enumerata, per sanari possunt. Ve-
rùm ubi Trunci ac majores rami earum pra-
cidantur, tum sanguinis eruptio difficillimè
fisti potest; nec conglutinari faciliè. Opus
itaque erit earum extremitates à carnosis
partibus nonnihil liberare, & filo serico com-
vincere, quo factò, & earum per sanatio ge-
nerali methodo & remediis recitatis perfici

potest. Inter majores Venas & Arterias, si
Vena Cava & Arteria aorta, & Vena jugu-
lares pracidantur, ut plurimum lethales
sunt.

Ossium Vulnera quomodo
curanda?

De Of-
sium vul-
neribus.

Ossa sunt partes similes, ex sanguine &
omnium durissima, ex terrestriori parte semi-
nis generata, quorum usus est ut molem cor-
poris tanquam pali in tentoriis sustineant;
verum cum nos de ossium fracturis paulo
post seorsim tractaturi simus, hoc loco brevior-
es in vulneribus ossium erimus. Vulnera
ossium reipsa non differunt ab eorum fractu-
ris; alii verò Fracturam vocant eam Ossis
solutionem & comminutionem, quæ sine inci-
sione ab externa violenta causa ossibus acci-
dit; Vulnerus autem Ossis esse dicunt eam di-
visionem, quæ cum incisione cutis & Carnis
ossi incumbens infligitur. De Ossium vul-
nere hæc regula sunt observanda.

Vulnus,
& fra-
ctura Os-
sis quid
differant.

I. Ossis continuitas ubi semel est divi-
sa, rupta, vulnerata, vel amputata, nun-
quam per se iterum restaurari, & in pristi-
nam unionem reduci potest; coalescunt ta-
men ossa confracta, & conglutinantur inter-
ventu alicuius materie ex alimentario humo-
re in vulnus delata, quemadmodum asseres
in tabulatis conglutinari solent, quam gluten
ossium Græci πωποταγεγεῖδον, Latini callum
nominant.

II. Ex majoribus ossibus medullam
continentibus, si aliquod in totum dissecetur
ut medulla profuatur, ea tota pars necessario
exarescit.

III. Ossis vulnerati fragmenta in Vul-
nere hærentia non statim in initio, nec subito,
ac violenter, è Vulnere protrahantur; into-
lerabilem enim dolorem, convulsionem, fe-
bres, & fistulosum ulcus excitant. Prestat
itaque in Vulnere aliquamdiu relinquere ea,
donec vel natura foras propellat, vel attracto-
rio remedio sensim eliciantur.

Fra-
gmenta
ossium
quomo-
do exi-
menda.

CURATIO Ossium vulneratorum ma-
xima ex parte consistit in comminutorum os-
sium coaptatione, & artificiosa deligatione,
callique conglutinatorii generatione, de qui-
bus, & tota ossium curandi methodo, paulo
post dicturi sumus.

Curatio
vulnera-
torum
ossium.

Vulnera Articulorum quomodo
curanda?

Vulnera articulorum difficilis sunt curatio-
nis, & si negligenter tractentur, in ulcus re-
gredies, sive malignum degenerant. In arti-
culis enim concurrunt Vena, Arteria, Nervi,
Tendines & Ligamenta, quibus vulneratis,
& non tempestivè procuratis, Ichores subse-
quuntur; ex quarum contaminatione pu-
rescunt carnosæ adjacentes partes, denudan-
tur nervi & ligamenta, & acerbissimos ex-
citant dolores, in malignumque, ut diximus,
ulcus degenerant. Vix itaque aliqua pars
vulnerata majorem desiderat diligentiam in
curando quam articuli. Observata itaque
generali curationis methodo superius tradita,
ea adhibeantur præsidia, quæ paulo ante in
nervorum & tendinum curationibus propo-
suimus.

De Arti-
culorum
vulneri-
bus.

Eorum
Curatio.

I. Omnium

I. Omnium autem primum mitigetur acerbitas doloris, & exsiccat sanies aquosa per ea remedia quæ post in curatione singulorum Symptomatum vulnerariorum recensuimus. Vbi vero in articulis denudati sunt Nervi, & Ichores supra modum in vulneribus redundant, vulnusque putrescat, consultissimum ego iudico, ut præter remedia foris applicanda, ad usum potionis ex sarmento Indico parata confugiat, cuius coquendi utendique rationem in superioribus, ac potissimum in curatione morbi Gallici, edocuimus. Hac de Vulneribus partium simularum peculiarium curationem efflagitantibus dixisse satis est; nunc de organicarum partium vulneribus curandis sermonem instituemus.

Vulnera Capitis quot modis fiunt, & quæ circa ea observanda?

De Vulneribus Capitis. Quot modis vulneretur Caput.

Inter organicas partes propter sedem rationis facile principem locum obtinet Caput. Vulneratur Caput variis modis, variisque armorum generibus, feriendo casum, aut punctum, acie armorum aut contundendo, verberandoque armis obtusis, aut decidendo gravi lapsu ex loco sublimi, incidendo in gravia & dura corpora, quæ omnia in Vulneribus Capitis necessaria cogniti sunt Chirurgo.

Vulnera in tempore Capite vulnerato duo sunt consideranda, primum, in qua regione Capitis sit vulnus inflictum, in Syncipite, Occipite, vel in Temporibus; vulnera namque in Syncipite & Temporibus inflicta, etiam si sint exigua & leniora, plerumque periculosa sunt quam in Occipite, aut Vertice; vulnera etiam majuscula. In Temporibus quidem perniciofa sunt vulnera propter debilitatem, tenuitatemque & raritatem ossium, & musculorum nobilitatem, per quos vena & arteria soprales sanguinem & spiritum vitalem Cerebro deferentes, perreptant, & in cerebrum provehantur.

Quibus laxis læditur ipsa vita, & citissime extinguitur animal. In Syncipite periculosa sunt vulnera ob ossis Calvæ tenuitatem, sutura coronalis raritatem, & propter thalamos anteriores Cerebri, qui domicilium sunt spirituum

animalium & sensus communis. 2. studiosè observandum est, quam partem, una ne, aut plures, aut pauciores, aut omnes sint in Capite vulnerata.

Sunt autem hæc Capitis partes: cutis carnosa cum pericranio, Cranium seu Calva, membranæ duæ cerebrum involventes, & ipsa cerebri substantia; quibus partibus Capitis vulneratis, singulis peculiaris debetur curatio; de quibus ordine breviter disseremus.

Cutis Carnosæ, & Periosteï Vulnera, quomodo curanda?

Vbi Capitis cutis carnosa, & simul periosteum seu membrana Calvæ foris ambiens, citra ossis Calvæ lationem est vulnerata, generali methodo & supra commemoratis remediis facillime, & citra omne periculum per sanari potest. Verum in Temporibus propter recitatam causas inflicto vulnere, etiam levius, non minimam habet difficultatem; in iis itaque omnium primum sanguis est suppressendus; deinde methodo generali, & remediis supra traditis, in Curatione procedendum erit.

Calvæ, sive Ossis Capitis Vulnerum quot sunt species, quibus modis dignoscendæ, & quomodo curandæ?

Contingit scire ut cute Capitis integra permanente, ipsa Calva, sive os capitis vulneretur, ut sit in violentis ictibus ex obtusorum armorum genere inflicto, crebrius tamen acie prædita arma capiti inflicta cum Vul. cutis simul & ipsam calvæ vulnerant & incidunt.

Accuratè itaque in vulneribus capitis considerandum est utrum calva simul sit convulnerata, & ad quam speciem vulnerati ossis calvæ fractura sit referenda: Porro species vulnerum Ossis Cap. sive fractura quatuor habentur;

Dissectio, Rima sive fissura, Comminutio sive contusio, & depressio.

I. Dissectio sive Incisio Calvæ, Eine Incisio, Vorwundung der Hirnschale, est qua Calvæ casum, ense, aut gladio, violento ictu impresso inferiur.

Curatio Cutis capitis, & pericranii.

De vulneribus ipsius Calvæ.

Species quatuor.

infertur, & in qua non tantum ossis continuitas solvitur, sed & sæpe particula ejus amittitur.

Rima five
scissura.

II. Rima five scissura, eine Ritze / est Calva tenuis & oblonga perruptio, quamquam instar pili exilis, nonnunquam paulo latior, similis fracturis seu scissuris virorum, ollarum & testarum; fit autem rima ex violenta contusione, & ubi arma obtusa, ut sunt saxa & fustes, Capiti valde impelluntur & incutuntur. Rima contingit sæpe Calvæ etiam non vulnerata cute; contingit denique crebro non in loco percusso, sed vel in opposito, vel alio aliquo: qua quia desitescit, eo est perniciosa. Id quod usu quoque venit non tantum in Calva, verum etiam in vitro, olla, testa & Campana, ex violenta incussione, ut opposita pars frangatur, & rimam acquirat.

Contusio.

Comminutio five contusio, ein Zerknirschung der Hirnschale / est ubi calva in plures paucioresve partes, ex violenta impulsione armorum obtusorum, confringitur, & comminuitur, ut videmus ubi ovum fortuito è manibus in mensam prolabitur, cujus testa in minutas partes confringitur. Talis quoque comminutio calvæ fit ex obtusis armis capiti incidentibus, & sæpe quidem sine vulnere Cutis.

Depressio.

Depressio Calvæ, Ein Indruckung der Hirnschale / est ubi dua partes Calvæ, siue id contingat in integro osse, siue suturis, ab invicem separantur, quarum altera sursum, altera deorsum remouetur: contingit talis depressio ex violenta concussionione, aut casu aliquo in corpus durum.

Signa
harum
specie-
rum dia-
gnostica.

Et hæc quidem species fracturarum calvæ, & in solidis ossibus & in suturis, tum cum Vulnere cutis, tum citra Vul. possunt accidere. Ex quibus dissectio quidem, & depressio visu tactuque deprehenduntur.

Rima verò & Comminutio, sensus sæpe effugiunt, nisi in detecta cute; idè prædenti ratiocinatione & conjecturâ artificiosa dignosci debent; & dissectio & inspectio vulneris & Visu, & specillo explorari possunt.

Depressio verò & comminutio ex loci

inaqualitate & aliis signis deprehenduntur. Fit tamen sæpe ut & rima, & comminutio in amplioribus Vul. si magna sunt, visu tactuque dignosci queant; sed ubi sub cute illas desitescunt, nec visu deprehendi possunt nec tactu, ex sequentibus signis artificiosa conjectura agnoscenda sunt.

Signorum itaque fracturæ Calvæ primum genus sumi debet ex relatione agri: Inquirendus itaque ager est quomodo se habuerit eo tempore, cum capiti vulnus sit inflictum; quis responderit visum sibi esse quasi testaceum caput confractum habuisse, aut ubi responderit se statim post incussionem caligine oculorum, capitis vertigine, diutinoque aurium tinnitu laborasse, suspicio erit rimam Calvæ vulnere subesse.

Signa
quæ do-
cent cal-
vam esse
fractam.

Secundum genus signorum sumi potest à Symptomatibus immediatè post inflictum vulnus excitatis, ut sunt Sopor, Vertigo, Epilepsia, & ossis Calvæ confractæ post paucos dies aut denigratio, aut nimia dealbatio, & albis maculis conspersio, Illa enim os emortuum esse & fractum ostendunt. Et si fatetur ager in ipso ictu non in percussa parte, sed in opposita fractionis, dolores & notas se persequisse, eo in loco rimam in calva abortam esse, conjectandum est.

3. Signa sumi possunt ab ictu violentia, ut si lapis grandis è sublimi in caput incidat, aut ubi sclopetum inter explodendum dirumpatur, & particula caput ipsum feriat, certa conjectura prædici potest Calvam ibidem esse confractam.

4. Fracturam Calvæ quoque ostendit, si vulneratus commassificato aliquo prædure corpore, in capitis aliqua parte strepitum sentiat.

5. Dignosci potest Calvæ fractura ex cohibitione spiritus, subflationeque buccæ, obstructo ore & naribus. Ex illo enim conatu & vehementi inflatione in loco affecto extenduntur vena & Arteria, & è vulnere excutitur vel saniosa, vel cruenta colluvies.

6. Si rima in Vulnere existens propter exilitatem visu deprehendi nequeat, atri-
mentum

mentum scriptorium Calva apparenti illinatur, ac post paucas horas rursum abstergetur, tum enim in rima ipsa atramenti vestigium relinquitur. Porro ubi fractura aut rima Calva non in percussa parte, sed in altera vel opposita delitescat, tum pili capitis abradantur, & sequens Empl. Capiti instar mitra imponatur: *R. Cera, Thuris, Ladani ana ℥. ij. Terebinth. far. faba. acceti ana ℥. j. ex quibus fiat Empl. quod per lintecolum extendatur, & capiti per noctem imponatur; atque altero die studiosè consideretur in Empl. qua in parte absumptum, aut à linteo delapsum sit; eo enim in loco fracturam subesse ostendit.*

Signa
prognostica.

Prognostica signa in fractura Calva hæc potissimum sunt observanda: Nulla cranii fractura vacat periculo, etiamsi non omnis sit lethalis.

Fractam esse Calvam in Capite, si nigrescat, aut nimium albescat os, ostendit. Fracturas Calva, si graviora sunt Symptomata, ut febris, vigilia, delirium, sopor & laborum vul. depressio, lethales esse indicat.

Curatio
vulnerati
cranii.

Curatio fracturarum Calva pro fracturarum specie varianda erit; Consistit autem omnis fractura cranii curatio in manu industria operatione; victus ratione, & concoquentium vulnerariorum remedium applicatione.

Manuales operationes circa fracturas ossis præcipua sunt, cuius cum Pericranio circa fracturas apertio, & dilatio, Ossis contrafracti abrasio, apertio, & dilatio.

Amissa
salva par-
ticula
quid faci-
endum.

In dissectione itaque Calva hæc sunt observanda; si ossis Calva particula in totum est amputata, frustra tentatur ejus agglutinatione. Itaque si particula ossis est amissa, vel descissa sine læsione Meningum, Calva cavitas diligenter expurgata impositis Sarcoticis remediis, nova carne repleatur, & cute obducatur tegaturque; sunt tamen qui loco amissa Calva, vel laminulam auream, vel in plebeiis hominibus testam cucurbita arida configurant, & adaptant; vulncrique imponunt, eamque processu temporis carnosa cute obducunt & consolidant.

Verum si dissecta Calva una cum cute capiti adhuc adhareat, nondumque sit aut emortua, aut corrupta, id quod ex offis candore & nigredine deprehendi potest, tum absterfo vul. dissectum os iterum artificiosè coaptetur, cutisque quantum fieri queat consuetur, ac convenientibus remediis conglutinetur, deligetur & consolidetur. Porro ubi fractura Cranii species sit Rima, aut comminutionis confusionisque, & ea sub cute vel ipso vulnere vel in adversa aliqua parte Calva delitescat, os radendum. aut si Vulnus angustius sit quam ut rima aut comminutio ossis conspici contrectarique queat, statim vulnus ipsum aut novacula, aut scalpello aperiendum dilatandumque erit, aut cutis ipsa, sub qua fractura latitat, iisdem instrumentis incidenda, & ab osse laeso liberanda venit, & ita detectum os si deprehendatur visum esse vel corruptum, vel emortuum, protinus omne illud, aut penitus auferendum, aut usque ad sanam partem, quousque rubedo aut sanguinolentia in eodem esse appareat, abradendum erit, & ita abrasum os Balsamis vulnerariis supra commemoratis obliniendum, & sarcoticis remediis carne cuteque contegendum erit; Verum talis operatio Chirurgica, incisio videlicet & apertio cutis, & ossis corrupti, aut emortui abrasio, non in quavis parte cranii locum habet; nam si rima aut ossis comminutio accadat in Temporibus, ibidem nec cutis musculosa incisio, nec pericranii aut ossis derasio, sine vita extinctione tentari potest. Ejus itaque curatio Deo est commendanda. Ita nec in suturarum fracturis sine periculo pericranium membrana deradi potest. Ibi enim membrana Calvam tegens ligamentis per suturam prodeuntibus Calvam cum Meningibus, h. e. internis tunicis Cerebri conjungit, quando nec in fractis ossibus frontis, in fronte musculosa cutis sine oculorum distortione secundum latitudinem incidi potest. Si itaque frontis ruptura cutis incisionem efflagitet, ea incidenda erit secundum rectitudinem ab inferiori parte ad superiorem, aut per transversum decussatim. Ita enim minus distortentur oculi, minisque torvum aspectum efficiunt.

Vulnus
quando
amplian-
dum &c
os radendum.

post

post vulneris apertionem & dilatationem pericranieque & ossis emortui, aut corrupti abrasionem, si confractum os in totum fuerit emortuum aut corruptum, nisi artificiosè citra lationem Menyngum à sanis partibus liberetur, Calvaeque aperiatur, & pracidatur, auferaturque, non admittit vulneris curationem aut per sanationem. Nunc itaque quæ circa emortui aut corrupti ossis Calvæ apertionem & ablationem sint observanda, brevissimè declarabimus. Duobus modis os Calvæ confractum si periculosum est, ut plerumque est, aut corruptum emortuum existat, auferri debet Deraſione. Deraſione auferendum est, ubi os confractum aut est corruptum, quod ex nigritie, aut ubi emortuum & arefactum est, quod ex albedine deprehenditur, ita & in rima Os abrasione, si rima totam calvæ non penetravit, est auferendum. Excisione verò sive apertione Calvæ utimur in aliis speciebus Fracturæ.

Os corruptum auferendum deraſione vel excisione.

Modus abraderis.

In deraſione autem ossis ita procedendum erit; si os Calvæ confractum, corruptum, aut arefactum est, aut si rima fracturæ non totam Calvæ penetret, primum circa fracturam, cutis pro quantitate corrupti ossis, aut rima longitudine, incidatur ac dilatetur, & in margine Vul. carnosæ cutis undique linamentis sive carptis linteolis muniatur, ne attactu Instrumenti rasorii dolor excitetur. Deinde Calvæ particula auferenda intra vulnus ab omni colluvie abstergetur, & ol. rosa. mungatur; quo & rasorium Instrumentum illiniatur. Tale autem instrumentum Scalprum dicitur, & ligonis parvi formam refert, cujus duæ sunt species, una est acutissima, quæ aut plana est, aut incurva: Altera ejus species est aspera & scabra, similis raspatorio aurificum instrumento. His instrumentis os corruptum emortuum & rimosum, modo rima usque ad Menynges non penetrat, artificiosè abradata, eo usque donec subjecta ossis pars sanguinea aut rubicunda appareat, aut donec rima disparcat: sed quia rima Capillaris sæpè visum effugiat, utrum ea alius penetrat, Calvæ atramento scriptorio per noctem ossi illinito, ac postea spongia absterſo, facile depre-

Instrumenta rasoria.

hendi potest. Abrasa hac ratione omni corrupta aut arefacta particula, Calvæ reliqua pars florida, balsamo vulnerario in superioribus descripto compleatur, & Empl. vulnerarium Conveniens imponatur, vulnusque contegatur & deligetur. Quæ autem remedia Ossium fracturis sint accommodata, paulo indicabimus. In fracturis Calvæ sæpè necessitas cogit Calvæ ipsam detegere, aperire, & ossis particulam excindere, ac demere. Verum cum omnis Calvæ apertio periculosa sit, & lethalia ut plurimum inferat Symptomata, in quibus casibus Calvæ est detegenda, sed in hisce quinque tantum casibus: in quibus casibus aperienda.

1. Ubi per rimam usque ad Menynges penetrantem sanguis, aut sanies confluxit, quæ nullis remediis foris capiti applicatis elici aut discuti queat, cum enim aperienda est Calvæ, & sanies omnis extergenda, ne Menynges inflammentur, & febres furorem ac mortem inferant, tentandum tamen est antequam fiat apertio Calvæ, utrum elicientibus remediis, aut discutientibus, sanguis saniosus sub Calvæ collectus propelli queat; id enim nonnunquam fieri potest. Ego anno Christi 1, 67, cum Christianus Tesken in Templo Mariano Minister, ab adolescente furioso Mepböhmi vocato, baculo in caput esset percussus, concidit attonitus sine sensu & ratione, & cum per triduum jacuisset, vocatus ad ipsum, capiti imposui sacculos ex fol. Beitho. Serpilli, Major. & flo. Chama. confectos, & in Vino diluto coctos, quos cum sapius reiterassem, grumi sanguinis saniosi sub Calvæ collecti, à tempore sacculorum resoluti sunt, & magna copia sanguinis ex maribus profluxit, & paulo post corroborantibus remediis sanitati est restitutus.

2. Necessario aperienda est Calvæ, ubi particula confractorum ossium Menyngibus incumbunt, eosque pungunt; quæ nisi tempestivè eximantur, citam inferunt mortem.

3. In Calvæ depressione si os suppressum Menyngibus incumbat, easque deprimat, statim aperta Calvæ, pars depressa sublevanda

da erit, alias Apoplexiam, soporem, & mortem inferit.

4. Aperienda est Calva ubi armorum fragmenta ossi inhaerent penetrantia Calvæ, & Meninges pungentia, propter causas jam dictas.

5. In comminutione contritioneque Calvæ, ubi non possunt particula coaptari, comminuta ossa necessario eximenda. Etsi enim non omnes comminutiones ossis Calvæ lethales sint, tamen perniciofa ut plurimum inferunt Symptomata, nisi eximantur.

Præterea circa apertionem Calvæ sequentes regulae sunt diligenter observandæ.

Cautio-
nes in
apertione
Calvæ.
Prima. Calva confracta non nisi cum protestatione prædictioneque de periculo, est aperienda. Aperienda autem est Calva primo quoque tempore, antequam sub Cranio vel sanguis putrescat, vel sanies coaceruetur.

2. Secundo itaque, aut tertio die à fractura, molienda est apertio.

3. In apertione Calvæ studio: est cavendum, ne Meninges inter detegendum ladan-
tur, aut lacerentur.

4. Cavendum etiam ne aperta Calva nudatisque Meningibus ipsa ab aëre incidente, vel impensius refrigerentur, vel nimium incalificent, sed protinus convenientia imponantur remedia, & calidis moderatè linteolis cooperiantur.

5. In detectione calvæ omnia confracta, comminuta, corrupta & emortua ossa, & quæcunque à sanis partibus liberata sunt, removeantur, citra tamen membranarum subjectionem lesionem. Nunc breviter dicam de quarto genere fracturæ: Depressione videlicet ossis Calvæ.

De De-
pressione
Calvæ:
quomo-
do fiat.
Depressio Calvæ est fractura, ubi Calva pars introrsum versus Cerebrum protruditur; quod dupliciter fit, cum fractura Calvæ in adultis, & sine fractura in puerulis, qui Calvæ & mollem & flexibilem habent, cujus depressio similis est Conusioni & cavitationibus, quales fieri solent in stanneis vasis; hanc Calvæ depressionem recentiores Chirurgi placenturam cranii vocant. Depressionis fractura

calvæ historiola talis mihi oblata fuit Anno Christi 1577.

Rustico adolescenti, Hyldæ, tegula tectoria in caput inciderat, & Calva sinistram partem obliquè introrsum depresserat, ita ut infra superius os Calvæ scriptorium calamus inserere possem: Vocatus ego à tonsore, pia memoria, viro probo, Ilensfeldio, ut in hoc casu meum communicarem consilium, quamnam ratione suppressum Calvæ os sublevare, & in pristinum locum restitui posset: Ego statim jussi ut curaret confici terebellum ferreum, satis firmum, & ossi impresso usque ad medullium ossis perforando insingeret, cum eoque os depressum valida attractione sursum traheret, emundato prius ex vul. omni impuritate; quod meum Consilium feliciter cessit, restituta enim depressa Calva, adhibitis remediis & Empl. convenientibus, brevi convaleuit. Verum alia ratione sunt sublevanda ossa quæ suæ fractura & Vul. cutis in puerorum capitibus sunt impressa, nimirum adhibitis externis remediis valide attrahentibus, inflammationemque & suppurationem prohibentibus, quo in casu utilissimum erit locum impressum quotidie bis terve sequenti decocto fovere ac fomentare: R. Strobilorum Cupressi contusorum No. X. Myrtill. ʒ. j. Rosa. rub. flo. Absinth. ana M. s. Cimini, Calami Arom. ana ʒ. ij. Betho. Maris. Rorisma. ana M. j. Alum. ʒ. iij. vini rubei lb. iij. Lixivii acris lb. j. s. Concoquantur ad tertias, & colentur; spongique exceptus liquor moderatè calidus Calvæ depressæ imponatur, atque foveatur. Tandem exiccato capite inungatur depressus locus Ol. rosa. Mastich. & Absinth. simul mistis. Postea post quartum diem imponatur depresso loco sequens Empl. quod potenter protrahit omnem Calvæ depressionem. R. Mastich. ʒ. j. Gummi Elemi ʒ. x. Colophon. resina pini ana ʒ. v. Ammon. ʒ. ij. Suc. Bethon. Succ. Consol. ma. ana ʒ. j. Suc. Apii palustris ʒ. s. vini rub. lb. s. Resolvantur & simul ebulliant, continudè agitando, donec succi & vinum evaporent, colentur, & admisc. Tereb. ʒ. j. Cera alba q. s. fiat Empl. quod extensum per alu-

Historia
Calvæ
fractæ &
depressæ.

Calva
depressa
quomo-
do sub-
levanda
in adul-
tis;

in pue-
ris;

Instru-
menta
chirurgi-
ca ad cu-
randa
Calvæ
vulnera.

tam Calva depressa imponatur. Restat nunc pauca dicere de Instrumentis quibus confracta Calva ossa abradi, excindi, confringi, comminuique & eximi debent, quorum usitatio-
riora sunt Scalprum sive scalpellum dera-
sorium, ein schabeisern oder Wundtseile / de
quo paulo ante.

Serrula dentata acutissima, qua ossa præci-
duntur, ein Knakenzange.

Terebellum, eine Schruve / varias ha-
bet species, quibus ossa corrupta perforando
excinduntur, aut ossa depressa sublevan-
tur.

Forceps, ein Zanglin / cujus species sunt,
Acuta forceps, ein Knipzange / qua ossa
præciduntur;

Obtusa forceps, ein Gruszange / qua ossa
franguntur & comminuntur.

Forceps rostrata, ein Schnablich zange/
qua ossa protrahuntur eximunturque.

Cultor incisorius, ein Schutze / quo ex-
cavantur fissura superficiales.

Vestis, ein auffbeber / quibus ossa depressa
sublevantur.

Menyngophylax est specillum cujus ex-
tremitas in tenuem laminam extensa est, quo
in avellendo osse fracto membrana cerebri
supprimuntur, & à laceratione prohibentur.
Hac omnia ossium fracturis dicata instrumen-
ta in eorum usurpatione, oleo rosa. sunt inun-
genda; & hac de actionibus Chirurgicis
circa Calvam fractam novisse sit satis.

Victus
ratio in
Calvæ
vulne-
ribus.

Secundus curationis fracturarum Calva
scopus erat victus ratio, sicuti enim in omni
capitis vulnere, ita in Cranii fractura victus
ratio ac potissimum in cibo & potu, primis
quatuordecim diebus parca & tenuis esse de-
bet, & talia administranda que crassum san-
guinem & parcum generant. In primis au-
tem vinum & ova sordilia omnino prohiben-
da erunt: Conveniunt autem panis lotus,
h. e. Weggen; oryza, caro hinnulorum,
capreolorum. In potu aq. hord. Atque post
assumptum cibum ventriculus semper est
claudendus pyris assis conditis, aut Cops. Ro-
sa. Aer omnis moderatè temperatus in calid.
& frig. debet esse; Alvus semper lenis esto,

& obstructa Clystere emolliatur, & si corpus
sit plethoricum & vires ferant, post dies qua-
tuordecim incisa vena Cephalica, sanguis est
detrahendus; si cacochymia, benigno reme-
dio, ut est infusio Rhab. & Mirob. Syr. Rosa.
aut Manna evacuetur. In victus ratione sin-
gulari vigilantia est adnitendum Chirurgo, ne
in primis septem diebus graviora incidant
Symptomata, maxime verò inflammatio, fe-
bris & convulsio. Abstinebit igitur ager à
vini potione, à durioribus alimentis, & multa
masticatione indigentibus, & ab oscitatione.

Tertium curationis Calva confracta sco-
pum diximus esse in remediis vulnerario-
rum fracturis convenientium applicatione;
ejus generis sunt pul. Balsama vulneraria,
unguenta & Empl. qua omnia in descriptione
remed. vulnerariorum antea sunt commemo-
rata, & in curatione fracturarum proponen-
tur; satis itaque hoc loco erit pauca, sed ex-
quisitiora, & magis salutaria, adscribere.
Cum autem fractura Calva detersionem im-
puritatum requirant, seqq. pul. tenuissimi fra-
cturis inspersi probe abstergunt, videlicet pul.
Aristo. utr. Rad. peucedani, farina Erui &
lupinorum. Qua singulatim, sive inter se
mixta, inspergi poterunt. Deinceps impleatur
vulnus Cranii Balsamo vulnerario, & super-
imponatur Empl. aut Barbarum Galeni, quod
in superioribus est descriptum: aut Empl. de
Gumm. Elemi, quod ita concinnari potest:
R. Gum. Elemi Oppopa. ana ʒ. j. s. Bdellii
ʒ. ij. resina pini ʒ. s. Terebinth. ʒ. ij. Thur.
Mastich. ana ʒ. j. s. cera & ol. rosa. ana lb. s.
fiat artificiosum Empl. quo omnia fractura-
rum genera conglutinari possunt; aut impo-
natur sequens Empl. ex Rorema. R. ol. rosa.
lb. s. Ol. Mastich. Hyperico. ana ʒ. ij. Ping.
porcina, vitulina ana ʒ. iij. liquefiant si-
mul, eisdemque admisc. fol. rorisma. Be-
thon. plantag. cum rad. Matris sylva, pimpi-
nella, pilosella, Veronica, omnium virecea-
tium ana M. s. Rad. Consol. ma. ʒ. ij. quibus
probe confusis & subactis, addantur vini
Rhen. rubei lb. ij. & macerentur simul in
olla vitreata in Sole, aut in tepido loco per
octiduum: Deinde leni igne continuè agi-
tando.

Vena
sectio &
purgatio.

Topica
remedia.

tando suaviter coquantur ad vini evaporationem, & fortiter expressa percolentur, colata pinguedini admisc. tenuiss. pul. Mastich. Gummi Elemi, Resina pini ana ℥.j. Litarg. ℥.ij. Minii pictorei ℥.j. Iterum simul coquantur lenissimo igne, donec fuscum acquirat colorem, continuè agitando, postremo refrigerascens admisc. Tereb. ℥.iv. & cera dissoluta q.s. fiat Empl. artificiosum, quod mirabilis est efficacia, & in Calva, & in omnibus vuln. Capitis. Reliqua remedia fracturis Calva convenientia cum ex superioribus, tum ex curatione fracturarum ossium peti possunt.

Vulnera Menyngum, sive membranarum Cerebri, quomodo curanda?

De Menyngibus vulneratis. Menynges, membrana Cerebri, die Hinc bregen veltin / sunt duæ pellicula sub Cranio totum Cerebrum involventes, & ejus cavitates vestientes, omnibus nervis & capacitibus capitis tunicam præbentes, ideo quibusdam etiam matres hæ appellatur membrana, & exterior quidem Calvaque propinquior, crassiorque, fibris quibusdam cerebrum Calva alligat, & dura mater à Tensoribus nominatur; interna verò Cerebrum completens, ipsum, ne desuat, continet, & Pia mater, propter tenuitatem, ab iisdem dicitur: utraque verò membrana, & venarum, & Arteriarum surculis repleta & conspersa est, quæ in aperta Calva propter arterias continuè ad motum cordis pulsant, & moventur.

Menynges quid.

Menyngum de te Starum Symptomata.

Remedia ab iis præferantia.

Ha duæ membrana detecta à Calva, nondum tamen vulnerata, tribus periculosis Symptomatibus obnoxia sunt, corruptioni sive denigritationi, inflammationi & Apostemati. Proinde nuda ab hisce malis summa diligentia præservari debent remediis lenientibus, simulque exiccantibus, & nonnihil detergentibus; commode itaque illiniri debent Ol. rosa. cum unguento Isidis mixto, quod à Galeno describitur, & quod Fallopius magnopere commendat; aut illiniatur Linamentum ex tenuissimo pul. Erui, Thuris, & rad. Brionia cum Ol. Rosa. diu multumque contritis confectum, cui mundificationis causa admisceri potest momentum mellis rosa. excellentissimum quo-

que remedium membranis Cerebri denudatis est Ol. Terebinth. aquosum, & prima destillatione Chimica arte productum, quod cum Ol. rosa. commisceri potest; lenit enim & mitigat, & simul exiccat egregie; supra hæc tepida Linamenta aut mundissima linolea imponenda sunt, & applicandum Empl. Isidis aut de vernice nostrum. At vero si detecta cerebri membrana vel ex contusione, vel ex frigidityte ambientis aeris, jam corrumpi, & nigrescere incipiat, imponatur per noctem Oxymel linamentis exceptum, ac tandem mollesimo linoleo madefactio, ac tepido abstergatur, & sanguis columba tepidus instilletur, linamentisque exceptus imponatur; atque si per triduum non remittat nigredo, Oxymelii admisc. Ol. Terebinth. aliquot guttis & membranis imponatur. Vbi verò ab his non alteratur rubedo, rumpitur membrana, & mortem adfert. Inflammatis verò Menyngibus, id quod ex turgidis & rubentibus venulis per membranas sparsis, adeoque per intumescentiam membranula dura, & pulsus ejus intermissione, dignosci potest, id si contingat statim & quam primum inflammatio resingueda erit instillato Ol. rosa. cum succo lentium palust. aut semper virva mixto, aut unguento populi. cum Linamentis imposito. Vbi autem supurationis & Apostematis signa apparuerint, statim & antequam purulentia tenuem Menyngem erodat, dura illa suppurata membrana scalpello est aperienda, & ab omni purulentia abstergenda lenissimis linamentis, eisque imponenda ea qua de nigredine & corruptione ejus commemoravimus. Vulnerata siquidem dura Menynges, integra autem & salva manente tenui, potissimum si absunt Symptomata periculosa, spes non parva est relicta salutis. Verum ubi utraque Menynges vulnerata est, & ex eorum vulnere sanguis, aut sanies in Cerebrum destillet, aut profluit, cerebrumque comprimatur, certissimum exitium infert; & tamen nec ita omnis spes Chirurgus est abjicienda, & vulneratus pro deplorato relinquendus: sed cum periculi protestatione, & prædictione adstantes, hac sequentia præsidia tentanda erunt: si fortè lethalia Symptomata

Remedia iis curandis.

De vulneratis menyngibus prognostica.

amoliri, vel saltem mitigari, & membranula vulnerata ipsi substantia Cerebri adnasci, vel cuti vulneris conglutinari possit.

Remedia
pro vul-
neratis
menyn-
gibus.

Confert
hic Ol.
Myrrh.
Thur.
Ovor.
Mastich.
Essentia
Confoli-
dæ. Un-
guent.
stillat. Ol.
tartari
nigri cum
Ol. hype-
riconis.

Primum itaque, quia, ut jam diximus, membrana cerebri venarum & Arteriarum furculis sunt referta, ex quarum vulneratione sanguis statim effluit, & in Cerebrum prolabitur, ibidemque in grumos concrevit, Cerebrum comprimit, & citam mortem infert, idè statim sine mora sanguinis fluxio est cohibenda, & grumi, si qui cerebri substantia incumbunt, mollissimis Linteolis extergendi, & excimendi erunt, denique ipsis vulneratis Menyn-
gibus sequens Linimentum mollissimum Linamentis exceptum, imponi debet: R. Colophon. ʒ. j. Myrrha, Aloës, Mastichis ana ʒ. s. Sarcocolla, Croci ana ʒ. j. quæ tenuissimè pulverisata, cum q. s. Ol. rosa. per durissimum Lapidem politum, diu multumque conterantur, & fiat mollissimum Linimentum, quo indito vulnere, imponatur Empl. Isidis à Galeno, ut dixi, descriptum; aut aliquod aliud ex supra commemoratis vulnerariis & Emplastris; eidemque arcenda inflammationis causa imponatur Album. ovor. cum pau-
xillo aq. rosar. concussa.

Cerebrum incisum seu Vulneratum, quomodo curandum?

De Cere-
bro vul-
nerato.

Cerebri
vulnus
lethale ut
pluri-
mum.

Cerebrum est medulla Calva, Das Gehirn oder bregen / quod simile est lacti concreto, vel caseo recenter compresso, cujus substantia ut plurimum cum vulneratis Menyn-
gibus una inciditur; & ut plurimum, & ferè semper tale vulnus lethale est, præsertim, si vulnus circa oppositionem O & D. siue in plenilunio insigatur; solet enim Cerebrum, ut omnia ostratia, in Plenilunio in ipsa Calva turgere, & exundare; circa Novilunium sub-
sidere, & diminui.

Contingit tamen nonnunquam, licet perra-
ro, ut quidam Cerebro vulnerati, divinitus, ut equidem puto, & miraculosè conservati sint, præsertim ob hanc causam, quod primis tribus diebus in optimè temperato Cerebro à nativo calore per superficiem Cerebri, tenuis quedam concretio perficiatur, quemadmodum in lacte recenter mulsio per triduum contingere solet,

qua vulnus oblinat, ut minus sit periculosum; sed id rarissimè contingit. Exempla eorum qui vulnerati cerebro Conservati sunt, & Ga-
lenus & recentiores Chirurghi varia recitant, ac idè Cerebro vulnerati, præsertim circa Novilunium, pro deploratis minimè sunt relin-
quendi, sed, cum seria protestatione de perniciæ vulnerum, hac sequentia sunt tentanda, nisi forsàn lethalia Symptomata incidant, & signa præsentis mortis appareant; tum enim præstat manum Vulneri non admove-
re, quàm artem calumniis objicere.

Signa verò lethalia in vulnere Cerebri Sigm præcipua hæc sunt: Brevis pereunt hi, quibus lethalia. vulneris labia in cute capitis arida & livida conspiciuntur: item quibus turbata est ratio; item quibus ardens febris incidit, denique quibus convulsio & resolutio partium adest; item quibus oculi rubent sanguinolenti; item qui continuo vomitu infestantur; item qui alvum habent suppressam, & quibus lingua nigricat, & qui remedia capiti imposita subinde revellunt, & abstrahunt: qua quidem infelicia signa non tantum in Cerebri, sed in omnibus Capitis vulneribus, & fracturis Calva studiosè observanda erunt. Hac si non adsunt, in curatione vulnerum Cerebri, hac methodo procedi debet:

Primum si Vulnus Cerebri profuso sanguine Curatio. madeat, aut in eo sanguis in grumos concrevit, mollissime, linteolis, aut lana Xylina extergendus, ac si fragmenta ossium vulnere in-
hareant, leniter excimenda, statimque ol. rosa. repido, in quo pul. Thu. tenuiss. multum diu-
que est concretum, alliniatur, tandemque bysso seu Syndone Vulnus contegatur, quod tamen prius recenti lardo non salito, aut ol. rosa. ne vulnus accrescat, probè inungi debet, ut ter-
tio tandem die rursus removeri queat; supra vero Syndonem imponatur Empl. Vulne. quod non impensè attrahat, quorum formula supra sunt commemorata. In tali curatione si vulneratum Cerebrum intra quatuor dies lividum foetidumque evadat, vel alia lethalia incidant Symptomata, lethale erit signum; si verò post septimum diem è vulnere prodeant excrementa laudabilia, qua
similia

similia sunt pruina alba, & Empl. adhaereant, non exiguum spem salutis ostendunt; tum enim Natura operatur, & Vulnus nova concretionem coalescere videtur; & tum quidem præter commemorata remedia Vulneri tenuiss. pul. vel. Thu. vel Pompholy. inspergi potest. Si quid deinceps puris ex vulnere Cerebri prodit, subinde mollissimis Linamentis abstergatur, & cum mell. rosac. in aq. cal. resoluto crebro eluatur: hisque remediis adhibitis, auxilii eventus Deo est committendus.

Ager nihil ma-
sticet.

In Visu vitet ager omnia quæ masticando deglutienda sunt; sed pulmentis & iusculis sit contentus. Symptomata quæ vulnere Menyn- gum & Cerebri comitantur, quomodo sint curanda, paulo post indicabimus.

De Ocu-
lorum
vulneri-
bus.

Oculorum Vulnera quomodo curanda?

Ὁφθαλμοὶ sunt organum Visus, & fenestra mentis; Qualis enim, ut Galenus lib. 3. de usu part. inquit, est Sol in caelo, tales sunt oculi in capite; & Plato in Timæo dicit, Oculos nos manus ducere ad cognitionem Dei; eorumque beneficio nobis universam naturalem Philosophiam à Diis concessam esse. Oculorum fabrica & constitutio valde est mirabilis; constant enim, juxta Vesaliū, Oculi ex septem tunicis, involucris eparum mutuo sese completentibus similibus, quarum exterior adnata dicitur; secunda cornea, tertia uvea, quarta Aranearum telis similis; quinta Dura, sexta Secundinæ similis; septima Retiformis: de quibus nos in lib. de Anima, & supra in Physiologia abundè diximus. Inter has tunicas continentur humores Albugineus, Vitreus & Crystallinus; quorum quidem albugineus, sive aqueus, inter Corneam & Uveam continetur, & in vulneratis Oculis omnium primum profluit, & visum potentiam adimit; Vitreus retiformi tunica insidet. In ipso vitreo innatæ humor Crystallinus, reliquis humoribus durior, & magis concretus.

Quot
modis
vulne-
rentur
oculi.

Vulnerantur oculi aut incisione armorum, aut incussione Virgarum, aut illapsu fragmen-
torum duriorum corporum, ut festucarum
& Viri, etiam per imprudentiam, aut

acu, aut culiro, &c. Vulnerantur quoque sa-
pissimè una cum oculis & palpebræ, quæ
quia carnosæ sunt, generali methodo & com-
munibus remediis facillimè curari possunt.

Vbi verò Cornea tunica, aut uvea sunt vul-
nerata, effluit humor albugineus primum,
deinde & vitreus, statimque flaccescunt, col-
labuntur & corrugantur omnes tunica, &
amittitur visus, qui amplius humano præfidi-
o restaurari non potest. Sed satis erit, si
vulnus probe curetur; Symptomata, quæ ta-
lia comitantur vulnera, ut sunt dolor, tumor
& inflammatio, auferantur, vulnusque ci-
catrice obducatur. In palpebrarum solarum,
h. e. cutis carnosæ oculum utrinque inter dor-
miendum claudentis, in qua hærent cilia,
vulnere, primum abstergatur sanies, labiaque
vulneris artificiosè consuantur, & Empl.
conglutinans, ut in superioribus descripsimus,
aut Barbarum Galeni, Vulneri imponatur,
& supra Empl. arcendorum Symp. causa,
albumina Ovorum cum aq. rosæ in spumam
contusa; stupaque excepta superponatur, aut
linolea duplicata Vino austero imbuta, cui
nonnihil ol. Mastich. est admixtum, obte-
gantur, & deligentur. Porro si sola cornea
est laesa, & non totus profluxit albugineus
humor, absterfo ex oculis sanguine, Vulneri
ipsi, & toti oculo triplicatum aut quadrupli-
catum fol. auri puri, quo Pictores utuntur,
imponatur: ut quatenus fieri queat, humo-
ris profluvium compescatur; fieri enim potest
ut membrana coalescat, & humor aqueus
processu temporis restauretur, visusque reti-
neatur; quamvis id propter imprudentiam
Chirurgorum raro contingat; si autem hu-
moris albuginei fluxus cohiberi non potest, nec
visus ipse retinetur, propterea statim si quid
fragmentorum Lapidis, Spina, Viri &c. vul-
nerata membrana inhæreat, quam fieri potest
mollissimè aut unguibus, aut rostrato forcipe
eximatur, Oculusque vulneratus lacte tepido,
vel muliebri, vel caprillo, probe abluatur
& abstergatur, statimque Symptomati magis
urgenti convenientibus remediis succurratur: matum
Ac primum cum vulnus oculorum acerbos cura.
excitet dolores, mitigandi hi erunt; in quem

Eorum
curatio.

Sympto-
marum

usum sequens collyrium, dolorem leniens, illi-
niatur: *R.* Sief albi cum opio \mathfrak{z} . j. Tutia
Alex. prap. Pompholig. lota Lap. Hematid.
Gum. Arabici. Tragacanti ana \mathfrak{d} . j. Qua
omnia tenuiss. pulverisata diu multumque
contrita cum q. s. aq. rosa. fiat Collyrium.
sive aqua ocularis. Sief autem oculare est
remedium compositum, cujus varia descri-
ptiones extant in lib. Pharmacop. Quin solum
illud Sief tenuiss. pul. & oculis dolentibus in-
spersum, aut cum lacte muliebri in Linimenti
formam redactum, & illitum, omnes oculo-
rum dolores tollere potest; sedato dolore, si
adeest intumescencia, & inflammatio in oculis,
sequenti decocto spongia munda excepto, ac
tepidè crebrò fomentetur & eluatur: *R.* Plantag.
rosa. Meliloti ana M. s. Aloes, Myrrha,
Thuris, ana \mathfrak{z} . j. Fœnu grati abluti & con-
tusi \mathfrak{z} . s. Tutia, prap. Pompholigos ana \mathfrak{d} . ij.
Sief cum Opio \mathfrak{z} . j. Aq. rosa. aq. fœnic. ana
℔. j. contusa coquantur ad medias, quod &
dolorem mitigat, & inflammationem sedat,
tumoremque aufert. Aut *R.* rosa. Mirebal.
Citrin. Myrtill. Sumach. ana \mathfrak{z} . s. Aloes E-
patica, Thur. Mastich. ana \mathfrak{z} . s. Aq. plantag.
rosar. ana ℔. s. Contusa coquantur ad ter-
tias, & colentur, in eoque dissolvatur Sief
sine opio \mathfrak{z} . j. s. fiat Collyr. quod oculis te-
pidum instilletur. Aut imponatur oculis sequens
Epiib. *R.* album. trium ovorum cum lacte
muliebri & pauxillo aq. rosa. diu multum-
que concussa, & in spumam redacta, qua lin-
teis aut molli stupa excipiantur, & oculo vul-
nerato imponantur; cui si ol. rosa. quippiam
admisceatur, præstantius fiet medicamentum,
& non tam facile arefiet, plurimum quoque
conducit vulneratos oculos, & circumjacen-
tes partes crebrò fovere ac abluere vino auste-
ro tepido, posteaque sequens Catapl. imponere:
R. carminum malorum assatorum ℔. s. Sacch.
albi \mathfrak{z} . j. Croci \mathfrak{d} . j. Ol. rosa. q. s. fiat Ca-
topl. quod tepidum imponatur; præstantius
quoque est ad inflammationem & tumorem
oculorum sedandum sequens Catapl. *R.* fol.
papa. albi. fol. Hyosch. cum rad. virescentium
& sub ferventibus cineribus coctorum sive
assatorum, & probe contusorum ana \mathfrak{z} . ij.

farine scœnu grati \mathfrak{z} . j. Lactis muliebris, Ol.
rosa. ana q. s. Commisc. fiat Catapl. aut
R. Far. fœnu grati \mathfrak{z} . j. pul. Sarcocolla,
Myrrha Oliboni ana \mathfrak{z} . j. Aq. fœnic. q. s. co-
quantur simul ad Catapl. formam; præter
hac omnia oculorum vulnera & ulcera per-
sanat egregiè sequens Collyr. oculis singulis
diebus bis illitum: *R.* pul. tenuiss. Myrrha,
Thuris, Aloes, Sarcocolla ana \mathfrak{z} . j. Gum.
Arab. \mathfrak{d} . ij. Sem. papa. albi. \mathfrak{z} . s. Tutia alex.
prap. pompholig. lota, Cerussa. ana \mathfrak{d} . ij. Croci
 \mathfrak{d} . s. omnibus simul commixtis ponantur in
album. ovorum ad auritiem coctorum, & per
medium scissorum exemptis luteis, quibus pul.
prædicto repletis colliguntur, & in vitream
cucurbitam amplioris orificii imponantur, &
in balneo Maria eo usque macerentur, donec
pulvis omnis in album. ovorum in liquorem
resolvatur, qui collectus præstantissimum erit
Collyrium ad omnia ferè Oculorum vitia.
Postremò vulnus oculi cicatrice obducatur,
quam fieri potest, tenuissima, ne videlicet ex-
crescens Cicatrix deformitatem inferat, id
quod sequenti Collyrio crebrò illito obtineri po-
test: *R.* Suc. Anagall. Ruta. fœnic. Euphorb.
Chelidon. ana \mathfrak{z} . j. Mellis virgin. \mathfrak{z} . ij. ebul-
liant, & colentur, fiat Collyrium. Id quoque
observandum est in Oculi vulnere, ut ager in
conclavi obscuro versetur, & moderatè cali-
do, omnibus enim splendor extensaque calidi-
tas & frigiditas oculis sunt inimica.

Nasi & Aurium Vulnera quomodo
curanda?

Nasus & aures, sicuti & relique partes De Nasi
omnes, ubi in totum abscissa & amputata & Au-
sunt, humano præsidio nunquam iterum ag- rium vul-
glutinari possunt; id enim solus Filius Dei in nere.
Malcho nebulone miraculose præstitit; neque Prognos-
etiam agglutinari possunt, etiamsi toti adhuc tica.
pendentes adhæreant, si prorsus sunt refrigera-
ta, emortua & denigrata, quas præstat statim
abscindere ac rejicere. At verò si recenter
sunt vulnerata, & interventu tantum cutis
capiti adhuc adhæreant, nondum extincto in
illis calore, sed sanguine madentes, si con-
festim capiti coaptata debitoque modo confi-
gurata consuantur, generali curandi metho-
do &

do & apta deligatione, remediisque convenientibus facile agglutinari possunt. Circa nasi itaque & aurium curationes hac sunt observanda.

Curatio.

1. Si particula descissa capiti adhuc dependens plus justo refrigerata est, antequam consueatur, vino calido austero spongia aut linteolis excepto, rursum calefieri, & fomentari debet; vel in vini penuria Urina tepida in tali casu usurpari potest.

2. Si sanguis omnis ex vulnerata particula prorsus stillavit, fluxioque subsiit, utraque pars scalpello est scarificanda, & intervenit recentis sanguinis adjuvenda, & deliganda; ita enim promptius coalescit.

3. Ubi nasus vel aures capiti sunt adfusa, quantum fieri potest aptissime configurantur, in eaque configuratione deligentur, ne distorta deformitatem inferant.

4. Ante deligationem vulnus pulveres conglutinantantes inspergantur, & vulneraria Empl. inter qua praestantissimum censetur Barbarum Galeni, applicentur, insuperque ponatur Epith. ex albu. ovorum cum pauillo aq. rosa. concussis, & stupra mundissima exceptis, & talis methodus usque ad cicatricis inductionem observetur.

5. Ne autem intrā nares ejusmodi fiat conglutinatio, qua respirationem intercepte, & metum suffocationis inferre queat, Canalis sive fistula argentea, aut plumbea, foris lana Xylina obvoluta, & ol. rosa. imbuta, subinde naribus inferenda erit, per quam & respiratio liberior, & excrementorum Cerebri evacuatio commoda fieri queat.

6. Vbi in totum præcisa sunt aures & nasus, consultissimum erit generali methodo, & vulnerariis præscriptis remediis vestigium ejus persanare; ac ut deformitatis vitium evitetur, aures quidem ex corio aut membranis conglutinatæ quàm aptissime conformari, & virido colore imbuti debent. Nasus verò ex terra cretacea, aut ligno eadem ratione fabricari, & nasi vestigio, loco veri nasi aliquo gummate tenaci resolutio, aut sequenti Lini-mento agglutinari potest: R. Terebinth. Gum. Elemi, Picis, Colophon. ana ʒ. j. lique-

facta resolvantur, ex quibus tenacissimum efficitur gluten, cui color floribus faciei similis admisceri potest.

Colli Vulnere quomodo curanda?

Collum dicimus esse totum ambitum sub Capite, Caput ipsum sustentantem & circumflectentem, cujus postica pars Cervix, antica Guttur dicitur, cujus interna cavitas receptaculum est duorum nobilissimorum canalium, Gulæ, qua cibi potusque est via, Asperæ arteriæ; qua fistula est respirationis & vocis. Gula posticam, Aspera arteria anticam Colli partem occupat: Externa colli pars subcutanea ex variis particulis, Cervicis Vertebra, Musculis, venis & arteriis grandioribus, nervis & Tendinibus est exstructa. Ideo colli Vulnere profundiora non carent periculo, præsertim ubi cervicis Vertebra, aut vena & Arteria, aut Gula, & Aspera arteria sunt nimium læsa; Verùm de curatione Vertebrarum Cervicis & spinalis medullæ, Aspera arteria, & Gula, seorsim brevissime dicam, ubi prius carnosarum colli partium vulnere absolverim. In vulnerato Collo, ubi vasa majora, h. e. vena & Arteria sunt incisa, ac vulnerata, statim juxta generalem methodum superius traditam, sanguis supprimatur, cujus suppressio non exiguum habet difficultatem.

Si itaque fisti nequeat sanguis præscripta methodo, vulnus vena aut arteria imposito digito comprimatur, & sectioni earum statim inserantur tela araneæ cum farina volatili commixta, ac tandem ipsum vulnus pulvis constringente conspergatur, Vulnusque linamentis sive lana Xylina, aut albis pilis leporinis unguento ex ovi albumine & pul. Thur. & Aloes multum commixtis contritisque confecto imbutis, compleatur. Sed si hæc ratio subsistat sanguis, vena, vel Arteria ipsa, si nondum est dissecta, præcidatur, & uterque ejus terminus à carne liberatus, duplicato filo serico, & moderata constrictione convinciatur, & præscriptis remediis vulnus impleatur.

Tandem sopita effusione sanguinis linamen-

De colli vulneribus.

Colli partes.

Prognostica.

Sanguis ut sistendus.

Reliqua curatio.

ta vulnere eximantur, & inperso vulnerario pulvere, aut solius Thuris & Aloës labia vulneris consuantur, per qua pus profluere queat, & ita per quatuor dies, aut donec pus compareat, Catapl. commixtis imponatur, ritèque deligetur; & ubi jam pus in vulnere compareat, remoto Catapl. subinde pus auferatur, vulnusque ipsum mundificetur inserto lincio in Linimento ex Terebinth. & melle Rosa. facto imbuto, cui semper pul. Thuris, Myrrha, & Sarcocolla inspergi potest, ac tandem, Empl. de Vernice vel de succino, vel Barbaro Galeni artificiosè ad cicatricem deducatur.

Vbi autem & Tendines nervique Cervicis simul sunt convulnerati, eorum curandi rationem & remedia convenientia paulo ante in nervosorum partium & articularum vulneratorum curatione cumulatissimè proposuimus.

Vulnus Gulæ & Asperæ Arteriæ quomodo curandum?

De vulnere gulæ & asperæ arteriæ. Prognostica.

Curatio.

Gula, Der Schluck oder Speiserhor / Aspera Arteria, Das lufftsthor / Vbi hi duo canales in collo convulnerantur, difficilima sunt curationis, & non carent insigni periculo: tum quod cibo ac potu nullum animal diu carere potest, multò minus absque respiratione supervivere; nam si vulneretur Gula, & intumescat, alimentum deglutiri nequit, sed per vulnus effluit: Sic aspera Arteria vulnerata & tumore affecta intercipit respirationem, & suffocatur homo. Etsi autem rarissimè evadant, quibus Gula, aut aspera arteria Chirurgum, cum protestatione periculi, curationem tentare tali methodo, hisque præsidiis: Initio sistatur sanguis, cujus suppressio nis ratio in superioribus est ostensa, deinde consuantur Vulneris labia cum cutis tum musculorum quàm diligentissimè: ac si dolor & tumor urgeat, primum vulnere seq. Catapl. imponatur: R. Rad. Alth. concisarum, & in vini aquave q. s. coctarum, & ubi in molliem sunt redacta, contundantur in pulmenti formam, cujus accipiat R. s. Ol. Rosar. Ping. Gallina ana ʒ. j. Servi vitulini

Caprini ana ʒ. s. Tereb. ʒ. ij. Farina Orobi q. s. Croci ʒ. j. simul ebulliant, fiat Catapl. quod tepidum bis in die imponatur; lenit enim dolorem, mundificat vulnus, & tumorem sedat. Tandem ubi pus è vulnere prodit, omisso Catapl. abluatur Vino austero cum pauillo Ol. rosa. mixto, & imponantur Empl. vul. in superioribus descripta, inter qua Barbarum Galeni, & Empl. de vernice nobiliora sunt. Super Empl. autem imponantur lintea triplicata vino austero cum Ol. Hyperic. commixto imbuta. Quin & intrà fauces cavitas Colli & vulnerati canales subinde elutionibus & Gargarismatibus mundificari, & forveri debent. Inter Gargarismata optimum habetur hoc sequens: R. Rad. Consol. ma. ʒ. j. Tormentil. Peniaphyll. ana ʒ. s. Sarmenti Indici ʒ. vj. Rosa. rub. Veronica, Sanicula ana M. s. Gummi Tragacanti ʒ. s. aq. in qua chalybs extincta lb. iij. contusa & concisa coquantur ad tertias, colato juri admisc. mellis rosa. ʒ. iv. fiat Gargarisma.

Vtilissimum quoque erit subinde lambendo, sive sugendo, deglutire, in oreque detinere, ut per fauces in Vulnus restuere queat, sequens Elect. R. Rad. Consol. major. coctarum & in pulvis formam per cribrum trajectarum ʒ. ij. pul. Tragacanthi, Gummi Arabi. ana ʒ. j. Boli Arme. veri ʒ. s. Spec Diatrag. frig. ʒ. j. s. Syr. de Symphito, à Fernelio descripti q. s. fiat Elect. lambile. Porro cum ut plurimum in vulneribus gula asperaque arteria deglutitio alimenti (ut dictum est) fieri nequeat, & metuendum sit ne fame conficiatur ager, alendus erit per inferiora, infuso quotidie per Clysterem, pro alimento, aut lacte Caprillo, in quo vitella ovorum sunt dissoluta & concussa, aut lacte amygdal. juscule pullorum coctarum, & similibus: Epar enim per suctionem Venarum Mesaraicarum, qua per intestina sunt sparsa, alimentum alliciat & arripit, in sanguinem convertit, & in nutrimentum totius corporis distribuit.

Ager nutriendus per clysterem.

Vulnera

Vulnera Spinalis Medullæ ut curanda?

De vulnere medullæ spinalis. Medulla Spinalis, Das ruggenmark/ est rivulus Cerebri, eandem cum Cerebro substantiam, sed paulo duriores, obtinens, & per totam spinam defluens, ex singulisque Vertebrae spina nervos producens. Est autem spinalis medulla tunicis à Meningibus Cerebri sumptis vestita. Vbiunque autem locorum spina sive dorsi vulneretur hac medulla, ut plurimum lethalis est; & si transversim præcisa sit spinalis medulla, statim quicquid partium corporis infra vulnus subiectum est, id omne protinus motum & sensum amittit; quia destituuntur Spiritus animali ex cerebro per nervos defluente. Præterea vulnus spinalis medulla perniciosissimas infert convulsiones & resolutiones, idem præcisio ejus simpliciter deplorata & lethalis est. Non itaque erunt huic vulnere manus temerè admo-venda; nec potest actio Chirurgi feliciter procedere; sicuti in cerebri vuln. propter impedimentum Vertebrae. Si quis tamen cum protestatione periculi pro consolidatio-ne agri curationem tentare velit: illinat vulnere Ol. Rosa. tepidum & Ol. Hyperic. cum suc. rosa. simul mixtum & leniter desillatum, imponatque Empl. de succino, & totam spinam inungat Ol. lumbricorum, & procedat curando ut in vuln. Cerebri docuimus.

De Artuum vulnera, sive Manuum ac pedum, quomodo curanda?

Cura. Antequam ad curationem vul. Thoracis accedam, vulnera manuum ac pedum attingere placet; & quia similitudinem inter se habent & similem curandi rationem obtinent, nobis conjungere placuit. Manus ac pedum vocabulo hoc loco nos integra membra ex humero, brachio, & extrema manu, item ex crure, tibia & extremo pede coarticulata & exstructa intelligimus, quæ si vulnerentur, quia musculosa sive carnosæ sunt partes, generali methòdo & vulnerariis remediis generalibus artificiosè adhibitis facile curari possunt, nisi nervi aut articuli ligamentaque in eis sint sauciata, vel ossa con-

fracta, quorum curationem in superiorib. proposuimus, quæ hic repeti debent. Ossium verò fractura, quæ ratione curanda sunt, paulo post in fracturarum curatione prosequemur.

Thoracis Vulnus quomodo curandum.

Ὁσέζ. der rumpff des Leibes oder der Brust / est quicquid in corpore à jugulis ad Diaph. usque costis circumsepitur. In Thoracis cavitate continentur πλεῦρες. h. e. costæ, membrana costas vestientes, Membrana cavitatem Thoracis secundum longitudinem dividentes, Cor, pulmones, vena Cava, Aorta & Diaphragma.

Vulnus omne in Thorace aut est externum, tantum cutem, musculos & costas dividendens; aut est internum, ad cavitatem Thoracis penetrans, membranamque costas succingentem perumpens. Internum vulnus rursum est aut sine, aut cum læsione interiorum viscerum in thorace contentorum. Vulnus externum, quod solis musculis & costis Thoracis est inscriptum, visio tactuque deprehendi potest, & in carnosissimis quidem partibus generali methòdo, sanguinis videlicet suppressione, consuetudine & remedium vulnerariorum applicatione aptaque deligatione facile persanari potest. Vbi autem simul & costæ sunt fractæ & vulneratæ, de earum curatione in ossium fracturis differemus. Hoc loco satis erit de costis observasse, quod si costæ confractæ corrumpi denigrarique incipiat, pars corrupta deradi debet usque eo donec floridus & rubens color in ea appareat, & præter conglutinantia remedia supra proposita sequens salutare Catapl. imponi potest. R. Rad. Consolida. pro arbitrio, quæ mundatæ & concisæ in austero vino decoquantur, effusoque vino radices instar pulvis conterantur, ac cum. q. s. Oxym. in Catapl. formam redigantur.

Porrò ubi vulnus Thoracis perrupta membrana costarum in cavitatem Thoracis penetret, id, cum propter continuum motum Thoracis, tum propter sanguinis è vulnere intro defluxionem, curationem & difficilem, &

De Thoracis vulnere. Partes in thorace contentæ.

Vulnus thoracis quatuorplex.

Curatio vulneris externi.

Chimicis in usu balsam. vulnerar. Crolii, Emplast. stiptic. lap. me. dicament. ejusdem.

De interno vulnere prognostica.

Vulneris
in thora-
cis cavi-
tatem pe-
netrantis
dignotio.

periculosiorem habebit; omnia enim vuln-
era ad sui curationem quietem desiderant, &
sanguis in capacitatem Thoracis illapsus sta-
tim in grumos concrevit, ac deinde putre-
scere incipit, &, nisi tempestivè eliciatur,
gravissima infert Symptomata. Vulnere au-
tem penetrantia ut plurimum cum pugione,
cultris & mucronatis armis inferuntur, &
violentius inflata in cavitationem Thoracis pe-
netrant. Penetrantia igitur vulnere Thora-
cis hisce signis deprehenduntur. Aer inter
respirandum è vulnere manifestè erumpit,
expiratur & inspiratur, & eo magis, si
os & nares occludantur. Tum enim adèd
validè Spiritus è vulnere erumpit, ut etiam
admota candela lumen extinguat, & lina-
menta vulnere imposita elidat ac propellat:
subsequitur tandem & respirationis difficul-
tas, præsertim si sanguis è vulnere intrò de-
lapsus Diaphragma gravet ac comprimat.
Quin & specillo instrumento penetrans in
Thoracem vulnus non difficulter explorari
potest; sed tamen fallunt hac indicia, ubi
vulnus non rectè inter costas est inflatum,
sed obliquè alio in loco subcutaneo intrusum.
Id autem crebro contingit, ubi pugionis aut
cultri apex in costas incidat, & ab ejus duritie
vel sursum vel deorsum detorqueatur, quo
in casu necessarium est statim vulnus exter-
num incidendo dilatare, donec penetrans
vulnus in conspectum veniat. In curatione
Thoracis vulnere penetrantium hac me-
thodo procedendum erit. Sunt qui in vulnere
Thoracis penetrante, ne ab aëre ambiente
per vulnus attracto interna viscera refrige-
rentur, statim vulneris externa labia con-
sueunda suadeant: id quod ego probare non
possum, cum Emplastro tenaci imposito aeris
attractio per vulnus cohiberi possit, cumque
nulla ferè vulnera exactiori crebriorique ex-
purgatione & mundificatione egeant, quam
vulnera thoracis, collecta enim sanies & col-
luctus in capacitatem Thoracis putrescit &
Empyema h. e. suppurationem aliaque peri-
culosa Symptomata, ac postremo inevitabilem
perniciem infert.

Quam primum igitur quispiam in Thorace

vulnere penetrante perfoctus est, statim pa-
tiens ad latus vulneratum converti debet, ac,
si vulnus penetrans sit occultum & sub cute
delitescens, exterius vulnus incidendum di-
latandumque erit, ut sanguis liberè profluere
queat, & quam minimum intra cavitationem
instillet, ac, si fortè, quod crebro accidere so-
let, multum sanguinis intrò defluxit ibidem-
que concrevit, id quod ex difficultate respira-
tionis & gravitate circa Hypochondria, ut di-
ximus, animadverti potest, summa intentio-
ne aditendum erit, ut omnis coagulatus con-
cretusque sanguis, antequam putrescat, resol-
vatur, & è Thorace proluatur emundeturque.
Sunt qui statim accepto in Thorace vulnere,
præsertim ubi suspicia est viscera quoque Thora-
cis lassa esse, jubeant sanguinem è vulnere
exsugere ore; à qua Chirurgica operatione &
si Chirurgi ipsi abhorreant, tamen salutare
est consilium; quamvis nemo libenter hanc
actionem suscipiat, nisi qui sororis Quorvis
erga saucium habet, ut scilicet parentes erga
liberos, & contra, conjuges ad invicem, &
vera amicorum paria. Verum ubi sanguis in
cavitationem Thoracis profusus est ex vulnere,
& nec per declivitatem vulneris effluere, nec,
ut diximus, sugendo elici liceat, si vulnus
ipsum amplum est, statim consui debet, relicto
tamen in eo satis magno orificio per quod pus
profluere valeat, eique imponatur Licinium
satis crassum, molle tamen ac breve cum ap-
penso filo ut quovis tempore extrahi queat,
vulnerique tandem superponatur Empl. ali-
quod vulnerarium, superque Emplastrum ar-
cenda inflammationis & tumoris gratia im-
ponantur album. Ovior. cum paux. vini au-
steri & Ol. Rosa. concussa. Et, si per illud
vulnus sanguis omnino evacuari nequeat,
antequam in Thorace concrevat, putrescat &
in saniem convertatur, indeque Febres aliq;
graviss. excitentur Symptomata, sine omni
hesitatione novum vulnus penetrans paulò
supra Diaph. incidatur. Oportet autem hoc
Vulnus inferre inter costam secundam &
tertiam, vel inter tertiam, & quartam ab
infima Costa sursum numerando, quemad-
modum Amatus Lusitanus docet, ita enim
septum

septum transversum minimè ladi potest. Primum autem novacula incidenda est curis & Musculus; deinde scalpello & membrana costas succingens, & ex eo subinde eliciendus est sanguis, pus & omnis impura colluvies; ne autem illud facile coalescat, utile est imponere brevem Canalem ex auro & argento confectum, per quem exstillabit colluvies.

Singulis autem diebus vulnus ipsum & Thoracis cavitas bis eluatur converienti liquore per Siphonem propulsorium tepide injecto ad mensuram novem unciarum aut unius quoque libra, quo infuso ager corpus ab uno latere in alterum convolveret, & liquorem intus continebis per dimidium diem, & tali elotione procedendum erit donec omnis concretus sanguis dissolvatur, omnisque impuritas profluat, nihilque sordium aut puris amplius conspiciatur. Liquores injiciendi convenientiss. sunt Hydrom. aq. hord. & aq. Plantag. in quibus remedia absterg. astring. & conglutinantia incogui possunt, ut exempli causa, R. Hydrom. ℥. iij. Furfur. tritic. M. ij. Macerentur per noctem, colentur & infundantur, praelare enim abstergit. Aut R. Hord. rosa. rub. ana M. s. Hippu. M. j. Rad. Torment. ʒ. j. coquantur in lib. iij. aq. Plantag. aut pluvialis ad mediam, colentur, quibus admisce Mell. rosa. ʒ. iij. fiat lavamentum; Aut Rad. Consol. ma. ʒ. j. Balaust. Hypocist. Sumach. ana ʒ. s. Hyppur. Veron. sanicula ana M. s. Hydrom. ℥. iij. Coquantur ad tertias, fiat Lavamentum. Interea vero & convenientia alimenta qua concoctu facilia esse debent, & conglutin. remed. intra Corpus per os assumenda minimè negligenda erunt. Praestat itaque singulis diebus sequentis Vulneraria potionis mane ac Vespri ʒ. v. exhibere. Rad. Consol. ma. Rad. Caryoph. ana ʒ. j. Glyxir. Sem. Anisi ana ʒ. s. Rhob. ʒ. s. Sarmeniti. Indi. ʒ. j. Veron. sanicula, ana M. j. Concisa & confusa coquantur in duplici vase cum ℥. iij. aq. per duas horas percolentur & colato juri admisc. Syr. è Symp. Fernel. ℥. s. fiat potio.

Postremo ubi Vulnus ab omni sorde, & ca-

vitas Thoracis ab omni colluvie probe est expurgata, si vulnus in fistulam non degeneravit, quod crebrò contingit, Vulnus ipsum generali methodo & Empl. vul. quale est Barbarum Gale. & de Vernice aut succino nostrum impositis ad cicatricem deducatur. Sed rariss. contingit quod Vulnus Thoracis ita feliciter curari queat, ut non suppurationem aut phlogist. post se relinquat.

In Thoracis Vulnere, si Viscera ut Pulmo, Cor, Aorta Arteria, Vena Cava aut Diaphragma sunt convulnerata, quomodo dignoscendum & quid agendum?

Vulnerato Corde pauca gutta sanguinis subnigra profluunt; statim enim omnis sanguis ad Cor irruit cordi opitulaturus, & si quid ex Vulnere Cordis erumpit, in Capsula cordis colligitur & extinguuntur animal.

Similiter Vulnerata Aorta sive Arteria Aortæ magna, confestim cum impetu sanguis subflavus & tenuis erumpit, & concidit animal.

Vulnerata Cava Vena largissimè profluit sanguis subniger, & paulatim deficit vita.

Vulnerato Diaphragmate cessat respiratio & suffocatur homo.

Proinde cum horum Viscerum Vul. omnia lethalia sint, manus Chirurgicas admove, insipientis est.

Porro Pulmonem vulneratum esse arguit subflavus & spumosus sanguis è Vulnere cum tussi & respirationis difficultate profluens. Eisi autem ex Pulmonum vulnere tam repentinum exitium non sequatur, quam ex Vulnere reliquarum partium in Thorace contentarum; tamen vulneratus pulmo cum propter motum continuum, tum propter cordis vicinitatem facile inflammatur, & febri, peripneumoniæque & Empyema aliæque exitiosa Symptomata infert, & nunquam aut rariss. persanari potest, sed aut phlogist. aut perpetuum Empyema comites habet.

Sunt tamen quidam tum ex Veteribus tum recentioribus Chirurgis qui gloriantur non tantum vulneratum pulmonem, sed praticam ejus particulam se feliciter curasse. Si itaque

Signa vulnerati cordis.

Venæ cavæ.

Diaphragmatis.

Pulmonis.

Prognostica de pulmonis vulnere.

Curatio.

quispiam pulmonis vulnus conglutinare tentare velit, quod, ut dixi, propter continuum motum, difficillimum est, sanguinem prius effluentem linamentis excitet, in ipsum autem vulnus aureum aut argenteum canalem imponat, per quem pus & colluvies ex pulmonibus continue profuere queat, Emplastroque vulnerario communi, quod supra attractivum nominavimus, vulnus ipsum contegat, supraque Vulnus albumina Ovorum cum Vini & Ol. rosa. pauxillo concussa stupaque excepta imponat: per os vero subinde potionem vulnerariam ex rad. Consol. ma. & Glycyrr. quam jam paulo ante descripsimus, exhibeat, & Syr. de Symphyt. subinde lambendum offerat. Ita forsan misera vita aliquamdiu protrahi poterit, non sine tamen enumeratis Symptomatibus.

De vulnere infimi ventris. Viscera infimo ventre conclusa.

Vulnus infimi ventris quomodo curandum; & quot præcipue viscera in infimo ventre continentur?

Venter infimus nobis dicitur quicquid infra Diaph. usque ad pubem protenditur. Externa pars ex cute, musculis & subducta membrana, quam peritonæum vocant, compacta est. Est autem peritonæum membrana tenuis, quæ Capacitatem infimi ventris quasi saccus complectitur ac continet, nostris Das neß dicitur. Infimus venter Græcis ἐπὶ τῷ εὐρέει, Latinis Abdomen, nostris Der Bauch. Continentur autem in Capacitate abdominis hæ præcipue partes, Omentum h. e. Das smebr/Intestina, Mesenterium Das schedelvedt/Ventriculus, Matrix, Vesica: Et in postica parte dorso vel lumbis adhaerent Renes: in dextra vero lecur; in sinistra Lien.

Abdominis vulnere multiplicia.

Vulnus infimi Ventris, ut & Thoracis, aut est externum tantum, ubi sola cutis & Musculi abdominis sunt vulnerati, aut est internum, ubi perrupto peritonæo vulnus intra Capacitatem abdominis penetrat, quod rursum aut est sine, aut cum vulneratione internorum viscerum jam commemoratorum.

Curatio.

Vulnus externum Abdominis, cutis videlicet & Musculorum, generali methodo & re-

mediis vulnerariis supra enumeratis, linamentis, pul. & Empl. Barbaro aut alio facile per sanari potest. Vulnus vero penetrans, ubi perruptum est peritonæum, & tamen viscera nondum sunt convulnerata, id quod ex prolapsu vel omenti vel intestinorum è Vul. dignosci potest, absterfo sanguine statim omenti prolapsa pars, vel intestinum prolapsum, antequam refrigeretur aut intumescat, artificiosè reponendum est: ac, si propter angustiam vul. reponi nequeat, vulnus ipsum dilatandum erit; moxque cum peritonæum ipsum, tum eutem musculosam artificiosè consuere oportet, Confectione ejusmodi, ut puncta acus ab invicem distent ad minimi digiti latitudinem, ac ita tandem impositis vulneribus remediis vulnerariis, pul. Unguentis, & Empl. supra propositis, observataque generali methodo, conglutinanda & per sananda erunt. Vbi vero ex visceribus in Abdomine contentis aliquid simul est convulneratum, eorum sane singula peculiarem requirunt curandi rationem, ut nunc ordine edocebo. In universum autem in vulneratis visceribus omnibus in Abdomine contentis, loco præfagii, id observandum erit, omnia difficilis & periculosa curationis esse, excepto omento seu pinguedine ventris.

Prognosticon de visceribus vulneratis.

Vulnus Omenti quomodo curandum?

Omentum, quod supine jacentibus aliis visceribus innatat, pinguedo sive Adeps est ventris. Quod si itaque per vulnus peritonæi prolabatur Omentum, sive vulneratum sit, sive non, illiniatur unguento vulnerario, & conspergatur pulv. conglutinatorio, rursumque in locum suum reponatur, & vulnus Abdominis consueatur, generalique methodo Empl. convenientibus conglutinetur. Verum si prolapsum Omentum refrigeratum intumuit, & jam livescat aut nigrescat, ea pars corrupta omnis præscindatur, amputeturque, pars autem sana inuncta & conspersa, & vinculo serico colligata, intro reponatur, & ut diximus, Barbaro aut alio Empl. vulnus Abdominis consolidetur.

De omenti vulnere.

Inte-

Intestinorum Vulnera quomodo perferenda?

De intestinorum vulneribus.

In Abdominis vulneribus si intestina illa prolabantur, antequam vulnus intumescat, intestina vel calido vino, vel tepido lotio abluantur & reponantur, juxta eorum consecutionem & ordinem: & si vulnus Abdominis angustum sit, ut intestina reponi nequeant, id dilatare oportet. At vero si intestina simul convulnerata sunt, eorum vulnera valde sunt periculosa, & ut plurimum lethalia, nisi scilicet & artificiose tractentur, praesertim Intestinorum gracilium. Virum autem crassa aut tenuia intestina sint vulnerata, ex situ vulneris dignosci potest. Gracilia enim intestina circa & supra umbil. sita sunt; Crassa autem inferiori Abdominis parte haerent. Praeterea ex vulnere gracilium Intestinorum ut plurimum Chylus, h. e. succus pulii avenacea similis profluit; ex crassiorum autem vulnere sterqus foetidum progreditur. In curatione vul. Intestinorum, quae etsi periculosa sint, hac tamen methodo curatio tentari potest. Initio, si Abdominis vulnus angustius sit, novacula dilatandum erit, cavendo tamen, ne inter incidendum ipsa intestina magis ladanentur, ac tandem vulnerata intestina leniter protrahantur, ut eorum vul. conspici & correctari queant, moxque materia in Intestinis contenta comprimendo digitis à vulnere foveatur, vulnusque & exteriores sordes intestino adhaerentes vino tepido spongia excepto abstergantur, moxque vulnus ipsum filo serico, ea consuetudine, qua utuntur pelliones, consueatur. Vbi vero intestinum per transversum sit praeissum, omninoque amputatum, & si exigua spes sit illud conglutinandi; tamen misera vita per plures menses & annos produci poterit, si utrique parti praeicis intestini imponatur vel argentea fistula, vel ex baculo sambuci pro magnitudine Intestini praeicis conformata: debet autem fistula prius circumvolvi pilis virginum, deinde extremitatibus fistula utraque pars intestini cum fasciculis crinium virginum leniter alligari, moderateque constringi, ne nimium constringendo alimentum substantia Intestinorum in-

tercipi queat, & membrana intestini putrescat, pili enim non facile corrumpuntur, sicuti alia deligationis materia; tandem vulnus conspergatur pul. conglutinatorio & una cum fistula rursum imponantur intestina, vulnusque abdominis consutum generali methodo curetur ac conglutinetur, & quantum fieri potest, in tota curatione arceantur Symptomata, inflammatio videlicet & tumor. Et quia ut plurimum ex vulnerata intestina ex Abdomine prolapsa aut excepta, praesertim ubi senserint refrigerationem flatibus repleri, & intumescere soleant, ac non facile intro reponi queant; si tale quid contingat, tumentia intestina vino Cretico aut alio generoso, in quo decocta sunt Absinth. Chamam. ciminum & foenugracum, fovenda & ablucenda erunt, donec detumescant, & ita imponenda. Interim in tota curatione Intestinorum sauciatorum minimè negligenda erunt potiones vulnerariae in superioribus à nobis praescripta; mirificam enim vim habent conglutinandi intestina, ac imprimis decoctum sarmentum Indici, praesertim si per Clysterem in intestina crebrè infundantur. Non autem Abdominis vulnus in intestinis vulneratis temerè est consueundum, & prius conglutinandum, donec certum sit vul. Intestinorum esse consolidatum. Sed observandum vulnera Intestinorum gracilium, praesertim jejuni, ut plurimum lethalia esse, juxta decretum Hipp. 6. Aph. & frustra curationem suscipi, nisi fortè miraculosa natura operatione proprio Balsamo aliquando perferantur. Semper itaque in Intestinorum vulneribus de periculi magnitudine protestari debet Chirurgus.

Vulnus Mesenterii quomodo curandum.

Mesenterium est membrana crassa pinguedine multa obducta, circa quam convoluta sunt intestina & inter se connexa, eaque dorso alligata, nostris Das schedel bedt. In Mesenterio conspersae & distributae sunt venae nobiliss. & Arteriae ex vena portae prodeuntiores, & intestinis implantatae; quae venae Mesaraicae dicuntur, per quas Epar succum alimentarium ex intestinis adsugit, & in san-

De vulnere Mesenterii.

De usu vasorum Mesenterii consulantur Academiici recentiores, qui diversum ab auctore sentiunt.

guinem convertit. Mesenterium solum ab extrinsecis causis vulnerari impossibile est sine convulsionatione intestinorum; Ubi itaque cum intestinis Mesenterium vulneratum fuerit, id quod ex intolerabili dolore per totum intestinorum spacium & nervorum contractione, circa spinam dorsi & cervicis dignosci potest, tum augetur periculum vulneris intestinorum, sed tamen vuln. intestinorum persanato facile & vuln. Mesenterii coalescit, cui tamen nulla alia remedia applicari possunt, præterq. potiones vuln. quæ nobis in superioribus sunt propositæ.

Vulnus Ventriculi ut curandum.

De vulnere ventriculi.

Prognostica.

Curatio.

Ventriculus est receptaculum & culina alimentum assumpti, dicitur Magi (Excepta communis externa à peritoneo prominens quæ tertiam tunicam ventriculi constituit.) Cujus substantia constat tunicam duabus crassis & validis tunicis. Vulnerata abdominis superiori parte ut plurimum convulsetur & ventriculus, cujus quidem vulnus aut intrò penetrat ad ejus cavitatem, aut hæret tantum in superficie & externa ejus tunica, id quod minus est periculosum; si verò intra cavitatem vulnus penetret, non caret periculo & difficultate. Vulnus ventriculi quod inscriptum est circa stomachum h. e. orificium ventriculi longè est perniciosius, quam quod ejus fundo est illatum, cum propter cognationem quam habet cum Cerebro, tum propter exquisitiorem sensum & vicinitatem Diaphragmatis quod in vuln. stomachi intumescit, & difficultatem respirationis, aliæque gravissima Symptomata infert, quæ postea mortem sequi necesse est. Ubi itaque ventriculi externa tunica tantum est læsa, statim filo serico consuenda erit, & pul. vulnerarius inspergendus, aut Ol. Balsamumque vulnerarium illiniendum, & applicatis remediis vulnere Abdominis, quæ Symptomata, inflammationem & similia arcere queant, facile beneficio naturæ & brevi convalescet. At si vulnus penetret intra ventriculi capacitatem, id quod ex crebra & violenta vomitione, & Chyli sive alimenti per vulnus profluvio & frequenti animi deliquio facile dignoscitur, tum etiam si talia vulnera-

ria ut plurimum lethalia sunt, præsertim circa stomachum, ac si incidat inflammatio, tamen, ut paulò ante diximus, cum naturæ sæpè suo Balsamo, h. e. humido primogenio, quod divinum quoddam est, ea præstare queat, quæ nec ars nec remedia præstant, cum protestatione consui potest & pul. vulnerarius inspergi. In vul. autem Abdominis semper foramen est relinquendum in consuitione, ut purulenta colluvies liberè profluere queat, deinde vul. imponenda sunt, quæ ventriculum corroborent & inflammationem arceant, ut sunt albus. ovorum cum ol. rosa. & Masti. concussa & stupis excepta; intra verò corpus subinde exhibendi sunt Syrupi de Symphito Fernelii, Syr. Myrtinus & Syr. de Papa. ac tandem vulneri imponi debent ea quæ in thoracis Vulneribus sunt proposita. Quin & fercula tenuia & pauca, sæpè tamen, sunt exhibenda, quæ cum decocto Symphiti & sarmenti Indici & pauxillo Masti. & Charioph. sunt præparata. Verum si alimentum per vulnus effluat, aut ventriculus tolerare nequeat, præstat liquidiora alimenta, ut sunt juscula pullorum, Lac amygdal. & ovorum juscula per Clysteres in intestinum profundere. Foris verò ubi renovantur remedia imposita, præstat vulnus subinde vino ablueri, in quo Mastich. Consol. ma. & Sarm. Indici sunt incocta. Totæ autem regio externa ventriculi inungenda erit. Ol. Hyperico. aut ol. à Masti. arte Chimica destillato, & vulnere conglutinatorium Empl. quale est Barba. aut è Vernice pictorum, imponendum erit.

Vulnus Epatis quomodo curandum?

Epar sive lecur est promptuarium vel officina sanguinis & radix omnium venarum. Sua enim natura Epar alimenti assumpti & in Ventriculo elaborati benigniorem partem per venas Mesaraicas ex intestinis assugit, in se recipit & in sanguinem convertit, deinde purificatum ab universi corporis partibus per venas in nutrimentum distribuit. situm habet Epar paulò infra Diaph. sub dextro Hypoch. & Ventrículum in dextra parte, tanquam manu, complectitur, ejus calorem fovet & auget. Vulnerato itaque abdomine sub dextro

Vitus ratio.

De vulnere Epatis descriptio. Videa- tur hac de re diversæ Anatomicorum sententiæ.

Epatis vulnerati diguotio.

dextro Hypoch. simul facile convulneratur & ipsum Epar. cuius vulnus dignosci potest ex sanguinis immoderata profusione & subsequentibus perniciosis Symptomatibus.

Vulnerato enim Epate statim omnis sanguis in eo contentus profunditur, ipsum refrigeratur, calor ejus extinguitur, & sanguificandi facultas prostermitur, moxque Atrophia sive macilentia & Cachexia comitantur, neque ut alia viscera propter substantiæ tenuitatem, (est enim similis sanguini coagulato) commodè consui potest: Si quis tamen consolidationis ergo curationem tentare velit, cum periculi prædictione vulnus decocto constringentium & conglutinantium rerum cum Vino, ut sunt Consol. ma. Agrimon. Veronica, Rosa, Acatia & similibus abluat tepido, statimque in spargat tenuiss. pul. vulnerarios, quales in superioribus proposuimus, moxque rite consueto Abdomine imponatur Empl. Vul. & subinde portiones Vul. in quibus Rhab. Sarmentum Indicum & Veronica sunt incocta, exhibeantur, & eventus curationis Deo & naturæ committatur.

Curatio.

De Lienis Vulnere.

Vulnus lienis quomodo curandum?

Lienem Splen sive Lien est receptaculum fecis sanguineæ; Ex splene enim canalis conspicuus ad infimum ventriculi orificium, ubi duodenum intestinum est ventriculo implantatum, protenditur, per quam sex sanguinis, quem simile melancholicum succum vocant, excitanda famis gratia exoneratur & profunditur, indeque rursum per alvum cum excrementis excernitur. Vulnerato abdomine in sinistra parte sub Hypoch. ibi enim Splen ventriculum complectitur, vulneratur & Splen, id quod dignosci potest ex nigri & seculenti sanguinis è vul. profusione. Vulnus Lienis aque periculo sum est atque Epatis, nec alia curandi ratio adhiberi commodè potest: ea itaque methodo & iisdem remediis procedendum erit: Vulnus initio decocto abluendum, Pul. vulnerarium inspergendo, Vulnus abdominis contritum acidum, sc. partem sanguinis acidam à Corde communicatam perficere; qui humor acidus postea sanguini in vasis, & chyle in ventriculo permiscetur; ut tam hunc, quam illum reddat tenuiorem.

suendo, & Empl. conglutinantia imponendo; intus verò vulneris potionem quotidie exhibendo, in qua tamen præter commemorata optimum est decoquere Cetrach. sive Asplenium, Rad. Capparis & Tamarisci.

Vulnerarenum ut curanda?

Renes in sanguinis purificatione ex Epate per Venas emulgentes sanguinis aquosorem partem assugunt & per membraneum interstitium, quod in cavernulis Renum habetur, percolant, ac per ureteres meatus in Vescicam destillando propellunt. Siti autem sunt Renes utrinque circa Lumborum vertebra paulo infra Epar. Vulneratis renibus vulnere penetrante ut plurimum exitiosa sunt, præsertim si intra in Cavernas Renum vulnera penetrant, in superficie autem curari possunt sed non sine difficultate. Renes vulneratos esse dignoscitur ex loci gravitate, ponderoso dolore, urina suppressione, lotique nigredine. Et si penetrans est vulnus, urina sanguinolenta per vulnus effluit: Vulnus renum superficiale curandum est crebra elutione cum Hydromel. in quo decocta sunt herba ac rad. Vulneraria, deinde exiccato illiniatur Balsamum aut Ol. vulnerarium, ut est Ol. Terebinth. prima destillatione extractum, tandem consuatur vulnus cutis, & imponatur Empl. conglutinans, superque Empl. Catapl. aut Epith. inflammationem arcens, tumorem mitigans. Verum si renum vulnus ad ipsam cavernulam penetret, illud quoque Hydrom. medicamentis vulnerariis imbuto crebro eluatur, ac tandem spongia molli aut linamenti exiccetur, & Ol. Terebinth. crudum seu semel tantum destillatum atque cum succo ex vesiculis ulni collecto mixtum cum liniciniis imponatur, ac tandem Empl. Barbarum vel de succino imponatur.

Per os verò potio vulneraria in qua rad. consol. ma. Glycy. & Alth. & Sarmenti Indi. sunt incocta crebro propinetur, subindeque Syr. de Alth. Fernelii lambendus exhibeatur: ac si inflammatio metuatur, Lac ex 4 sem. frig. ma. cum aq. Alkek. emulsum bibendum offeratur, aut pul. Troch. de Alkek. cum eodem lacte propinetur.

Vulnus.

De Renum Vulnere.

Signa prognostica.

Diagnostica.

Curatio.

Vulnus Vesicæ ut curandum?

De Vulnere vesicæ. Vesica est receptaculum Urina ex renibus per urcteres in ipsam vesicam destillata. Sita est vesica in Hypogast. sive in infima parte Ventris paulo infra umbil. cuius cervix in pendendum terminatur. Vulnere Hypogastrio h. e. abdominis infima parte, & ipsa vesica ut plurimum convulneratur.

Signa vulneratæ vesicæ diagnostica. Signa vulneratæ vesicæ sunt, profunditas Vul. in Hypogast. qua specillo explorari potest, & urina suppressio, aut ejusdem per vul. profusio. Vulnus Vesicæ juxta decretum Hipp. 6.

Prognostica. Apho. perpetuò lethale est, qui Hippocratis Aphorismus de vulnere vesicæ est intelligendus, quod fundo vesicæ aut capacitati infligitur, id enim impossibile est conglutinari, cum quia ex sanguis est membrana vesicæ, & conlui nequeat, tum quia lotii acrimonia conglutinationem impedit: Vbi verò cervix sive collum vesicæ, quod carnosum est, vulneretur, & facile & feliciter curari potest: quemadmodum in Lithotomorum artificiosa operatione videre licet, qui vesicæ collum secant & incidunt, & insignis magnitudinis calculos, qui aliis remediis propelli nequeunt, excimunt, & vulnus ipsum iterum ac cito conglutinant. Vbi itaque collum vesicæ est vulneratum, audacter curatio est inchoanda, & tali methodo procedendum:

Curatio. I. Pubis seu inguinis vulnus externum & ipsius colli vesicæ vino tepido, in quo herba & rad. vulneraria conglutinantes sunt decocta, probè & crebro eluatur, moxque molli Spongia aut linamentis detergeatur sicceturque, ac generali methodo superius enumeratis oleis, Balsa. & Empl. vulnerariis conglutinetur, & ad sanitatem producat. Procedet autem felicius curatio, si potiones vulneraria, quæ in Renum vulneribus præscripta sunt, subinde exhibeantur, & collectum in vesicæ lotium, si natura propellere nequeat, instrumentis Vrinatoriis singulis diebus evacuetur, quin & liquida conglutinantia remedia ex Consol. ma. & Hyppuride cocta crebrò per siphonem in vesicam propellere, proderit.

Vulnus Matricis ut curandum?

De vulnere matricis. Matrix in foemellis est humana propagatæ hortalus, constans ex duabus validiss. tunis, ut & ventriculus. Est præterea Matrix sentina impura colluviei sanguinis. In ejus enim interna capacitate infinitarum venarum & arteriarum orificia terminantur, quæ Græcis ὑγρόλινδες dicuntur, per quæ singulis mensibus aperta sanguinis colluvies, quæ menstruum dicitur, ita providente Deo, à natura propellitur. Sita est Matrix in infima parte ventris inter vesicam & rectum intestinum. Vbi itaque vulneratur Hypogast. insigniter, contingit ut & vesica & uterus convulnerentur, cujus sanè vulnus in capacitatem Matricis penetrans, ut plurimum lethale. Curatio tamen consolidationis causa cum periculi prædictione à Chirurgo tentari potest talis: I. Vi eluatur vulnus cum decocto Melissa, Rosa, & reliquarum vulnerariarum herbarum, deinde instilletur in vulnus succus ex vesiculis ulmi collectus, tandem consuetur, & Empl. aliquod vulnerarium imponatur, & instar vulneris ventriculi & vesicæ curetur.

Vulnus pudendi seu Virgæ virilis ut curandum?

De penis vulnere. Virga valde nervosa est corporis partícula, curari tamen potest facile observata methodo generali, & adhibitis elutionibus pul. Ol. & Empl. vulnerariis supra in curatione nervorum vulnere descriptis.

Vulnus Testiculorum quomodo curandum?

De Testiculorum vulnere. Etsi in castratione testiculi sine periculo præcidi possunt artificiosa adhibita sectione, eorum tamen vulnera propter graviora Symptomata non prorsus carent periculo, ideoque testes ad sui curationem industriam ac diligentem requirunt Chirurgum: Curatio autem generalis est adhibenda, observata videlicet generali methodo, nimirum ut testes fomententur, expurgentur, consuantur & conglutinentur adhibitis Epith. Catapl. Ol. pul. & Empl. conglutinantibus, & Symptomata arcentibus.

Femorum

Fœmorum & Tibiarum Vulnere
quomodo curanda?

Fœmora cum humeris, & Tibia siue crura cum brachiis magnam habent cognationem ac similitudinem, earum itaque partium vulnera eadem methodo & iisdem remediis curari possunt. Vulnerum autem manuum curatio nobis paulo ante est proposita, qua consuli poterit.

Sunt ne alia præterea, quæ ab armis
infecta sunt vulnera peculiarem
curandi rationem
requirunt?

Vuln-
rum
quatuor
genera
peculia-
rem cu-
rationem
postulan-
tia.

Præter commemoratorum vulnere
curaciones, quatuor adhuc restant vulnere
Species, quarum singula proprias efflagitant
medicationes, nimirum
Vulnus ab armis venenatis infectum;
Vulnus ab animalium venenatorum mor-
sibus infectumque illatum,
Vulnus ab adustione excitatum,
Et vulnus à gelu seu extensissimo frigore
impressum.

De quorum curandi ratione jam breviss.
dicam.

Vulnus ab armis Venenatis infectum
quomodo curandum?

Curatio
vulne-
rum ab
armis ve-
nenatis
infecto-
rum.

In vulnere venenatorum omnium siue
ab armis toxico illitis, siue animalium vene-
natorum morsibus infectis infectumque
ratione, antequam ad vulnere medicatio-
nem perveniatur, oportet venenum incussum
quam celerrimè aut per extrahentia remedia,
aut per instrumentorum attrahentium, qua-
lia sunt Cucurbitula, Hirudines, podices gal-
linarum virvarum deplumata applicationem
prolicere & extrahere, sudatoriique potioni-
bus & Alexipharmacis propellere, & cor-
ipsum corroborare. Tota autem venenatorum
armorum vul. curandi methodus, & eorum
alexiteria supra in Tractatione de Venenis in
quaestione (Enses sagittæque veneno imbuta
qua inferunt Symptomata, & quomodo cu-
randa,) luculenter proposita sunt, qua huc
transponi queunt.

Vulnera ab animalibus venenatis mordendo,
pungendoque illata, quomodo curanda?

Creberrimè mordendo pungendoque per-
ciosa vulnera inferunt animantia quadam,
qualia sunt serpentes, canes rabiosi, homines
jejuni, vel rabie furoreque perciti, Scorpiones
&c. Quorum venenatorum vulnere cura-
tiones sigillatim pro natura cujuslibet ani-
mantis supra in tractatione de venenis abun-
dè docuimus.

Curatio
morsus
venenati.

Vulnera ex adustione rerum ignitarum
excitata, ut curanda?

Vulnera ex adustione cuti & subjectis par-
tibus illata, fiunt aut ab igne, rebusque igni-
tis, aut à liquore aliquo ferventi, aut à me-
tallis liquefactis. Et quidem ea vulnera qua
à metallis vel mineralibus ignitis aut liquefa-
ctis inferuntur, longè sunt difficilius curatio-
nis, quam qua ex flamma aut ferventi liquo-
re excitata; itaque pro materia inferentis
vulnus varietate varianda erit & curatio.
Duplici autem ratione persanantur ejusmodi
vulnera, nimirum extractione ignea qualita-
tis, aut extinctione incendii; sed cavendum
in principione calorem extinguentia h. e. fri-
gida & humida vulnere imponantur, repel-
lunt enim ad interiora fervorem, & graviora
excitant Symptomata. Primum itaque tentan-
da est curatio fervorem extrahentibus, qualia
sunt hæc sequentia:

Curatio
ambusto-
rum.

R. Butyri aut lardi liquefacti q.s. pro ar-
bitrio, sinantur fervere & in frigidiss. aquam
infundantur, in eaque diu multumque concu-
tiantur donec albescant; Deinde refrigerata
& congelata ab aqua eximantur; fiat un-
guentum, quod per linteolum extensum instar
Empl. vulnere imponatur, quod præstantiss. est
in adustionibus ab igne, aqua & oleo ferven-
tibus illatis. Aut R. Ol. nucis jugland. &
savi hircini ana p.a. liquefiant & frigida aq.
infundantur, concutiantur, eximantur, fiat
unguentum; id persanat adustionis ex metal-
lis aut mineralibus ignitis, aut liquefactis, vul-
nera.

Quæ fer-
vorem
extra-
hant.

Ad omnia autem in genere ex adustione
illata Vulnera præstantissima sunt, & paratissima
faciliora, hæc sequentia;

M m

Accipe

Accipe Muriam sive saluginem ex Butyro promanantem, quam linteolis exceptam imponito; aut conficiatur salsugo ex aq. marina & sale, & eadem ratione imponatur. Aut R. Mellis, Butyri & saponis nigri aquas portiones, commisce. & adustis partibus imponantur, aut imponatur aq. tepida in qua rapa ad mollitiem sunt decocta: & hac quidem omnia fervorem urentem ex vulnere eliciunt, dolorem sopiunt, vuln. exsiccant ac persanant. Verum si cruciatus à fervore intolerabilis in vulnere hareat, qualis contingit ubi pul. Bombardicus aut frusta laridi incensi vulnere sunt implosa, tum statim fervorem extinguentia & refrigerantia sunt imponenda & illinienda, ut sunt, Succus semper-viridis cum cancris virventibus contusa, aut lentes palustres contusa & imposita, vel eorum omnium succus per siphonem implosus. Reliqua & totam methodum curandi ambusta in superioribus de Cutis vitiiis curandis prolixè proposuimus.

Vulnus ex gelu aut intenso Frigore aquæ vel aëris quomodo curandum?

De vulnere ex Gelu.

In frigidis regionibus & Alpibus sæpè iter facientium aures, nasus, manus ac pedes ex frigoris sævitia congelantur, corrumpuntur, sensum ac motum amittunt, & in Sphacelum degenerant, h. e. emoriuntur, & amputatione sola curari possunt. In emortua itaque partis curatione per omnia procedendum est ut in curationibus Gangrenæ & Sphaceli in tractatione Tumorum docuimus.

Cum autem membra per frigoris sævitiam corrupta & extincta, nisi à sanis partibus removeantur, eas secum corrumpant, primum sequenti decocto corrupta à sanis separari debent: R. piperis longi, Cardamo. Gran. paradyf. ana ℥. j. Euph. ℥. s. Mastich. ℥. vj. pulverisatâ Coquantur in lb. ij. urina infantis aut hominis sani cholericis, aut potius vini stillatitii ad tertias, & membro corrupto instar Epithematis imponatur. Deinde emortua partes novacula præcidantur, & reliqua sana pars in vul. Ol. urina, quod ex Sale Urina fit, crebrè innungatur, & impositis

Empl. è vernice vel alio quovis vulnerario conglutinetur. In ejusmodi casu ubi nondum prorsus corrupta est pars refrigerata, statim ea in aquam frigidam demergatur: frigida enim aqua extrahit è partibus omne gelu intensumque frigus, sicuti & ex pomis gelu corruptis; nam si congelata partes calore foveantur, intolerabiles per ætatem excitant dolores. Sæpe ex partibus gelu corruptis extensiss. frigus per arterias ac principalia membra perreptat, & mortem infert; ideo præstat intra corpus exhibere Theriacam cum aqua Juniperi aut vino stillaticio bibendam.

Quæ præcipua Symptomata incidere solent Vulneratis, & quomodo singula curanda?

Non possunt persanari vulnera nisi prius, Vuln. si qua accesserunt, Symptomata tollantur, aut saltem mitigentur. Solent autem vulnerati his potiss. Symptomatibus, ut in superioribus quoque recensuimus, infestari: Sanguinis implacabili eruptione, Animi deliquio, Dolore, Inflammatione, Aquosi humoris è Vul. profluxione, Febris, Vigilia, delirio, Spasmo sive convulsione, Paralyti, Vomitione, partis vulnerata pruritu, & extenuatione seu macilentia. De quorum curatione nunc ordine quàm possumus brevissimè docuimus.

Sanguinis implacabile Profluvium quomodo curandum?

Primum Symptoma vulneratorum est Hæmorrhagis sanguinis profusio, sed hac ipsa quæstio pariter ante in superioribus in secunda manuali operatione Chirurgia est absoluta, ubi & methodum & remedia fluorem sanguinis compescentia uberrimè tradidimus, quem locum repetere possunt studiosi Chirurgia.

Animi Deliquium Vulneratorum quomodo curandum?

Animi deliquium.

Secundum Symptoma ex Vul. profluens est Syncope, qua ut plurimum profundè vulneratis & in hominibus pusillanimitibus, & in vulneribus venenatis accidere solet. Quomodo autem animus contractus sit recreandus, supra in Cordis affectione & curatione

tione Syncope abunde tradidimus; Hoc loco tamen hac adjici possunt, ubi vulneratus in deliquium animi incidit, confestim frigidus aëris adflatu admittatur, ligamenta vestium constricta laxentur, artus vinculis dolorificis, si vulnus in superioribus partibus inflictum est, manuum; si in inferiorib. pedum facile confringantur; naribus odorata refrigerantia, ut est Acetum rosa. cum aq. rosa. admoveantur. & cum eodem liquore Tempora, Carpi manuum & Cordis regio confringantur; Facies aq. frig. conspergatur, orique Sal illiniatur; & reviviscenti vulnerato frustulum panis in vino Malvatico aut alio generoso maceratum, comedendum exhibeatur, & haustus ejusdem vini bibendus prabeatur, & si animi deliquium à Venenata qualitate vulneris excitatum esse suspicio sit, statim pulvis Ruta aut Scordii, aut Theriaca Androm. cum vino offeratur.

Dolor Vulneratorum quomodo sedandus?

Dolor.

Dolor in Vul. accidit aut ab intemperie, aut unionis vulnerata partis solutione, & è proprio loco distractione, aut remediorum vulnere minus convenientium applicatione, ineptaque deligatione, quæ efficientes doloris causa statim tollenda sunt. Dolor vehemens in vulneratis alia graviora Symptomata excitare solet; ut affluxionem humoris vitiosi in ipsum vulnus, vigilias, animi deliquium, viriumque prostrationem, nec admittit sanationem Vulnus, nisi tollatur dolor, aut mitigetur; Tollendi autem doloris ratio pro efficientis causa diversitate variari debet; Si itaque dolor excitatus sit ab inepta deligatione, ea erit alteranda & constricta laxanda; si remedia inconvenientia dolorem excitaverunt, statim abjicienda & immutanda erunt. Si ossium aut armorum fragmenta dolorem in vul. excitant, ea tempestive eximenda veniunt; si ab aliqua intemperie dolor obortus est in Vul. eidem contrariis remediis ut caliditati frigidis, Frig. siccis, humidis, siccis succurrendum erit. Verum cum totam methodum & exquisitorum remedia compescendi mitigandique doloris supra circa finem curationum morborum particularium

prolixè proposuerimus, ad ea recurrant Chirurgia studiosi. Inter remedia autem dolorem leniendo mitigantia in Vulneribus sunt Catapl. ex rad. Alb. Lil. albo. cum ol. rosa. aut Chama. confecta; Quæ autem sopiendo mitigant sunt Catapl. ex fol. Hyosci. & solani viridibus sub cinere concoctis contusis, additisque ovi candidis & Ol. rosa. In genere dolores in vul. sedat, medulla Panis Triticini in lacte concocta: Stupefaciendo tollit dolorem, Linimentum ex Ol. Nenuphar h. e. Nymph. cum pauxillo cera alba confectum, cui momentum opii in aceto rosa. soluti & parum Moschi est admixtum.

Inflammatiō Vulneratæ partis quomodo extinguenda?

Dolor, ut diximus, attrahit in vulnus sanguinem impurum, sanguis concipit in vulnere calorem praternaturalem, & inflammatio inciditque partem vulneratam. In inflammatione itaque vulneris, quod ut plurimum contingit ubi in vulnere vel nervus est latus, vel ossis fragmentum inhæret, aut caput musculi est incisum, si nihil obstat, vena sectio ex membro vulnere proximo, & vitiosorum humorum expurgatio primum molienda sunt, & ita tandem Catapl. Empl. & Epithem. refrigeratoria imponenda erunt, inter quæ Catapl. ex medulla panis Triticini & farina hord. in lacte concoctis convenientiss. est, cui & aq. rosa. & Ol. rosa. pro libitu admisceri potest, & illud Catapl. quod in doloris mitigatione ex fol. Hyosci. & Solani parare docui, & Catapl. ex lentibus palustribus confectum, & Epithe. ex aq. rosa. plantag. & solani. Reliqua ex curatione Phlegmones, inter Tumores tradita, huc referri possunt.

Tumor Vulneratarum partium quomodo sedandus?

Tumor.

Vbi vulnerata pars intumuerit, videndum est ad quod genus Tumoris referri debeat, Phlegmonem, Oedema, Erysipelas aut Scyrrhum; & ita debita curatio vitiosum humorem expurgando, & Topica applicando, pro qualibet specie Tumoris adhibenda erit, ut in superioribus de Tumorum curatione abundè docuimus. In genere autem optimum

est supra impositum Empl. imponere acetum
Rosa. tepidum duplicatis Linteolis exce-
ptum.

Durities labiorum Vulneris ut
mollienda?

Durities
labiorum
vulneris.

Durities est comes siccitatis, & ex utraque
Qualitate calida & frig. generari potest.

Durities ex vehementi caliditate dignosci-
tur ex rubore & doloris acredine.

Ex frigiditate autem orta durities depre-
henditur ex stupore & lividitate.

Curatio durities labiorum vulneris per re-
media emollientia est instituenda, qua tamen
pro causarum sive qualitatum diversitate
variari debet. Emollientium autem copiam
& genera supra in curatione ulcerum cum
duritie labiorum complicata, & in curatione
Seyrhi enumeravimus. In genere optimum
emolliens est Empl. Diachyl. & simplex, &
cum gummatibus, cujus descriptio extat in li-
bris Pharmacopœorum.

Carnis superfluae succrescentia in vulne-
ribus quomodo curanda?

In vulneribus crebro ex redundantia san-
guinis caro spongiosa ultra modum excrescit
& luxuriat, qua nisi removeatur, ineptam
curationem & deformem cicatricam relin-
quit, & Græcis *ὕπερφυτος*, Germanis
Wiltfleisch dicitur. In curatione ejus su-
perfluus sanguis vena sectione detrahatur, &
caro in vul. luxurians scarificetur, sanguis-
que ex ea fortiter exprimatur, tandemque
alumenustum pulverisatum, aut salis nitri
adusti pauxillum inspergatur, quod sine dolo-
re extirpat superfluam carnem. Idem præstat
& pul. arug. & Mercu. præcipitatus & un-
guentum Egyptiac. & alia quæ à nobis supra
in curatione ulc. cum carne superflua excre-
scenti proposita sunt.

Aquosum
excre-
mentum
vulnere
proflu-
xio.
Wilt-
wasser.

Aquosum excrementum è vulnere pro-
fluens, quomodo curandum?

Aquosa sanies, *ixoræ*. Das Wiltwasser/
obscurum autem & barbaro vocabulo Paracel-
so Sinovia & aqua Glacialis dicitur; In
vulnere ut plurimum generatur articulorum
nervosarumque partium, vel ex effluxu serosi
sanguinis, vel ex inconvenientium remedio-

rum applicatione, vel ex inepta deligatione, ut
supra quoque in ulceris virulentis curatione,
& in quaestione, Quomodo excrementa vul-
nerum sunt abstergenda, docuimus. *ixoræ*
enim nisi tempestive sistatur exiccaturque,
acerbos dolores, vulneris corruptionem & sa-
nationis impeditionem infert. Ad affluens
aquosi humoris sanationem in vul. præstantiss.
remed. est crocus Martis, si vulnere madenti
Ichore inspergatur: vel R. Thuris, Aloepatic.
ana p. a. qua tenuiss. pulverisata, & ovi albu-
mine in Linimenti formam redacta vulnere
imponantur, & acetum rosa. linteaminibus
exceptum, calefactumque superimponatur;
interim & serosi humores convenientibus re-
mediis evacuandis per alvum subducantur.

Febris Vulneratorum ut
profliganda?

Febris vulneratis sæpe accidunt tum ex Febreis.
inflammatione & vehementi dolore vulne-
ratarum partium, & omnium maxime in
vulneribus capitis & interiorum viscerum
penetrantibus; & tales quidem febres ut plu-
rimum lethales sunt; sed, si in externarum
partium & levioribus vulneribus febres su-
perveniant, commodius curari possunt. In
curatione febris, an quotidiana, an vero tertio
vel quarto die recurrat, diligenter pendend-
um est, & si corpus sit plethoricum, vena
secetur, si cacochymum corpus, vitiosus hu-
mor redundans pharmacis expurgantibus
convenientibus subrahatur, & calor febrilis
cum Syr. de Citro cui aq. Card. Bened. aut
aq. Cichor. est admixta, alteretur; Foris Hy-
pochondria & spina dorsi cum Ol. rosa. cui
pauxillum aceti rosa. sit admixtum, inungatur.
Et quia ex calore febrili ut plurimum gene-
rantur in corpore pituitosi & biliosi humores,
ii per intervalla sequenti haustu commodissi-
me expurgari possunt: R. Rhab. sol. sena ana
ʒ. j. s. sem. Anisi ʒ. j. Contusa in Sydone
colligantur, fiat Nodulus, qui per noctem in aq.
Card. Bened. ʒ. iij. in tepido loco maceretur
in poculo argenteo, & sequenti die poculum
una cum Nodulo in ferventem aquam collo-
cetur, & per semiquadrantem horæ simul
ferveant, & tandem Nodulus fortiter expri-
matur,

Optime
facit Ma-
gister.
cortic.
Over.
Bolus
Armenus
Essentia-
catus;
Calx pu-
raminum
interior.
jugland.
Ol. Gua-
jac. Corn.
C. Philof.

matur, cui liquori admisc. Syr. rosa. solu.
 ℞. ij. fiat haustus, qui tepidus quinque horis ante prand. ebibatur. Reliqua huc pertinentia ex doctrina de curatione febrium superius tradita peti possunt.

Vigilia immoderate ut
sopienda?

Vigilia. Somnus & Vigilia non tantum in Vul. aliisque morbis, sed & in sanis corporibus, si modum excedant, noxia sunt. In vulneratis autem immoderata vigilia vires prosternunt, Spiritum animale defatigant, & vulneris perorationem mirifice impediunt. Excitantur autem vigilia in vulneratis aut à doloris acerbitate, aut à vaporibus febrilibus Cerebrum ferientibus, aut ab animi moerore & sollicitudine. In curatione itaque vigiliarum continuarum causis primum est consulendum, ut ha tollantur, aut saltem mitigentur, ac tandem Soporifera medicamina & intro exhibenda, & foris applicanda. Intra corpus circa vespertam exhiberi feliciter potest haustus lactis ex semine Papa. Contusi, & aq. Lactuca confecti: foris verò Syncipiti circa suturam coronalem & Temporibus sequens Epith. duplicatis linteolis exceptum imponatur: *℞. Sem. Papa. albi ℞. j. Nucleorum persicorum ℞. s. diu mulsumque in mortario conterantur, & admisc. albu. unius ovi & aq. rosa. aq. solutri, Lactuca & aceti rosa. ana ℞. j. fiat Epith.* De reliquis soporiferis remediis consulatur curatio Vigiliarum in febribus.

Delirium Vulneratorum quomodo
tollendum?

Delirium.

Delirium vulneratorum seu mentis alienatio vulneratis ut plurimum exitialis est, praesertim si vulnus capiti sit inflictum, aut si adsit virium debilitas; tum enim certissimum est indicium mortis. Ex reliquis autem Symptomatibus si sit ortum delirium, curatio tentari potest: Et statim in initio curationis considerandum est, utrum delirio adjuncta sit qualitas aliqua, pro cuius ratione & curandi methodus ac remedia excellentiori qualitati convenientia exhibenda erunt, quorum copia ex curatione Phrenitidos, praesertim ex de-

lirio cum caliditate conjuncto, peti possunt. Si verò frigida intemperies delirio sit copulata, remedia ex melancholica insania curatione huc transponi debent.

Spasmus Vulneratorum quomodo
curandus?

Spasmus vulneratas partes contrahens, b. Spasmus.
 e. convulsio, *Der Krampff* est nervosarum & musculosarum partium dolorifica praeter voluntatem convulsio, qua infestare solet vulneratos ubi nervi aut musculorum capita sunt laesa. Convulsio in Capitis vul. ut plurimum lethalis est. Omnis convulsio generatur aut ex plenitudine nervos distendente, aut ex evacuatione eos contrahente. Non repente, sed paulatim incidit; quam ut plurimum immoderata antecedit evacuatio, aut diuturna inedia, aut febrilis calor exiccans.

Convulsio ex repletionem distendente nervos repente fit, quam praecessit vel temulentia, vel oetium, vel defluxio pituitosi humoris in nervos. Minus periculosa est convulsio ex repletionem, quam ex inanitionem, aut ariditate.

Curatio generalis Convulsionis in Vulneratis consistit in victus ratione, & remediorum usurpatione. In victu conveniunt pulmenta hordeacea & avenacea, & in quo Salvia est macerata. Remedia convulsionis sunt inunctiones totius spinae dorsae (ex cuius vertebrae praeceunt nervi & totius partis convulsa) cum ol. lil. alb. & ex Lumbricis terrestribus confecta. In specie vero convulsio ex evacuatione curanda est lavacris tepida aq. in qua sol. Malv. Rad. Althe. & sem. Lini sunt incocta; Post balneum iniungi possunt spinae dorsae, & pars convulsa ol. viola. Amygd. dulc. & pinguedine Gallinae, aut sequenti Linimento: *℞. Ol. Viola. ℞. j. Amygd. dulc. Ping. gallinae, Medulla crurum vituli ana ℞. ij. Servi vituli. ℞. s. Cera alba q. s. fiat Unguentum;* cui admisceatur Mucag. ex rad. Althe. & sem. citon. contusi cum aq. Salvia ℞. s. fiat Unguentum.

Convulsionis ex plenitudine curatio est superflui humoris evacuatio, qua fieri debet praesertim in plethor. corporibus per vena-

sectionem; In cacochymicis per pituitosi humoris subductionem. Præterea spina dorsi & pars convulsa, maxime autem cervix, inungatur oleo lil. albo. de lumbricis, è Castor. è Terebinth. aut sequenti unguento: *℞.* Ol. è lumbr. *℥.* j. è Castor. *℥.* s. ex gran. Iunip. & Terebinth. ana *℥.* ij. Cera q. s. fiat Unguentum. Sed felicissime convulsio ex plenitudine curari potest inedia & potione sudorifica ex Sarmiento Indico confecta; cuius & præparandi & utendi rationem in superioribus docuimus. Post sudorem sequenti Oleo & Cervix, & tota spina, & pars convulsa inungi poterit: *℞.* Castor. contusi *℥.* ij. Euphor. *℥.* j. piperis longi *℥.* iij. Sulph. *℥.* v. Pyretri *℥.* s. confusa coquantur in Ol. Chamam. *℥.* iv. & aq. Iunip. *℥.* ij. ad evaporationem aq. Deinde colentur, & oleo admisc. Ol. Vitriol. *℥.* ij.

Porro in omni convulsione cerebrum corroborandum erit exhibendo quotidie Conf. Rorism. *℥.* ij. cui Ther. Andro. *℥.* s. est admista, aut duabus rotulis Diamosci devoratis. Plura ex curatione Spasmi, supra inter vitia Cerebri tradita, huc referri possunt.

Paralyfis Vulneratorum quomodo sananda?

Paralyfis. Paralyfis, h. e. nervorum resolutio, verlemnuß der Glieder/ est mollities & laxitas nervorum in alterutro latere sensu motuque amisso. Resolutio in vulneratis, præsertim capite, lethalis est. Methodus curanda Paralyseos ex vulnere accepto est, ut corpore plethorico existente vena secetur, Cacochymico vero existente redundans vitiosus humor convenienti remedio subtrahatur, & Victus ratio conveniens præscribatur, remediaque intra corpus & extra exhibeantur. De quibus omnibus supra in Curatione Paralyseos inter affectiones Cerebri abunde nobis dictum est. Hoc loco satis erit unicuique liquorem arte Chymica confectum, & à Mesue descriptum, subungere: *℞.* Myrrha el. Aloës Epati. Spica nardi. Sang. Dra. Thur. Mumia. Bdel. Gumm. Ammoniaci, Sarcocoll. Mastich. Gumm. Arabi. Styra. Liquid. Croci & Carpopalsami ana *℥.* ij. Ladani, Castorei mollioris ana *℥.* ij. s. Moschi *℥.* s. Terebinth. ad

pondus omnium reliquorum. Pulverisanda redigantur in pulverem, & cum styrate & Terebinth. commisc. & in cucurbitam vitream indantur, atque in balneo Maria calido per novem dies macerentur; deinde in ferventi arena lenissime destillantur; qui liquor facultate proximè accedit ad Balsami veri liquorem, & plane divinus est, quo inungantur Cervix, spina dorsi, & partes resoluta.

Vomitum Vulneratorum quomodo compescendus?

Vomit.
tus.

Interdum & vomitionibus infestantur vulnerati, præsertim in vulneribus Capitis & latione Menyngum & ventriculi. Vomitio vulneratorum in initio non est compescenda, præsertim si ventriculus vitiosus & corruptis humoribus sit infarctus, sed vel haustu repida aq. aut haustu aq. ex gran. Iunip. per descensum cum pelvi destillata, quod nobilissimum est vomitorium, Vomitus excitetur, & omnis colluvies evacuetur. Postquam sponte non cessat vomitio, duo Cochlearia vini rubei in quo incossa sunt Chariph. concisi, Mastich. & Rosa assumto cibo exhibenda erunt: Foris autem orificio ventriculi imponatur Catapl. ex Fermento cum succo Meniha & pauxillo aceti rosa. simul subactis & calefactis, quod tamen subinde ubi refrigerari cepit, removeatur, & rursum calidum imponatur. Plura vomitionem sistentia remedia, & ventriculum roborantia in superioribus ex curatione vitiorum Ventriculi peti possunt.

Alvi urinæque suppressio in vulneratis ut promovenda?

Alvi urinaeque suppressio.

Et alvi & urinae suppressione creberrimè vulnerati infestantur; Cuius causa sunt facultatis expulsiva ex nimia profusione sanguinis prostratio, vel partium expulsionem excrementorum servientium læsio, quibus accedit & corporis praternaturalis caliditas, & inde orta sitis & continua quies. Vbi itaque in vulneratis suppressa est alvus, & vires agrotantis aliaque circumstantia permittant, leni Clystere emolliatur, & subducatur alvus: Aut inseratur recto intestino glans suppositoria ex melle, sale & pul. Troch. Albandali facta,

facta, & si quid vitiosi humoris in ventriculo, venis Mesaraicis & intestinis habere suspicio sit, exhibeatur patienti quadrante hora ante prandium Pulpa Cassia ꝑ. j. s. aut Manna ꝑ. ij. in jusculo pullorum resoluta, aut exhibeatur potiuncula ex nodulo Rhab. fol. sena, & Syr. rosa. solu. confecta, quam paulo ante in febris vulneratorum curatione preparare docui. Quin & ad validiora purgantia remedia transire licebit, si vires permittant pro ratione redundantis vitiosi humoris. In Urina suppressione intra corpus exhibeatur Syr. de Alib. Fernelii, & pul. lapill. cancror. & ea quae supra in curatione Dysuriae siue suppressionis urinae tradita sunt.

Pruritus Vulneratarum partium ut compescendus?

Pruritus partis vulneratae. In partibus vulneratis, praesertim circa finem curationis, si adfluens sanguis, vel salsa pituita vel acriori sero est commixtus, in tenera carne vulneris & adjacentibus partibus molestum excitat pruritus: qui mitigari potest partis prurientis inunctione, cum unguento de cerussa aut ung. populino, aut imposto Epith. ex aquis Rosa. & plantag. in quibus Lythargy. pul. est decoctus, quae si non conferant, & redeat prurigo, tum Epith. instar salisugo aut aq. marina tepida imponatur, vel ea calida diu perfundatur, aut oleo siue liquore vitrioli obliniatur.

Extenuatio, siue Marcor, vulneratae partis quomodo restauranda?

Extenuatio partis vulneratae. Marcor siue extenuatio membri provenit ex ἀρεσφία siue frustratione Nutritionis, in vulneribus autem accidit ubi ἵζαε siue aquosum excrementum diutius de vulnere profluxit, aut male & perperam pars vulnerata deligata est.

Curatio emaciatorum membrorum consistit in partis extenuatae sedula inunctione, & artificiosa deligatione. Inunctio crebra fieri debet aut cum oleo Hyperic. aut cum sequenti ex lumbricis terrest. oleo. R. Lumbric. terr. pro arbitrio, qui cum vino generoso eluantur, & in vitrum constricti orificii reponantur, quod tandem in massam farina-

ream subactum ex qua panes coquuntur, probe involvatur, & in furnum siue Clibanum cum aliis panibus imponatur, & ad perfectionem coquatur; ex refrigerato pane vitrum excimatur, in quo liquor subsidens ex Lumbricis in aliud vitrum refundatur, quo fiat inunctio & quidem quotidie bis, post inunctionem parti marcescenti & inuncta imponatur Empl. oxycroc. cuius descriptio in lib. Pharma. extat, ac tandem deligetur. Deligatio verò ejusmodi esse debet, quae sanguinem nutriendum à sanis partibus ad macram confluere cogat, ut marcescente tibia femur ab Inguine deorsum ad genu usque fascia circumvolutione deligetur, initio quidem arctiori, paulatim autem laxiori constrictione, quo sanguis omnis deorsum supprimatur. Femore vero alterutro, aut toto crure contabescente, femori alteri sano & non vulnerato fascia sunt injicienda à genu sursum circumvolvendo, ut sanguis ex sano femore in agrum divertatur & comprimitur. Talis autem deligatio moderata debet esse, ne dolorem aut inflammationem excitet. Eadem deligandi ratio & in humeris brachiisque marcescentibus retineri debet.

SECTIO V

Curationum Chirurgicarum DE OSSIIUM FRACTURIS.

Fractura quid, & quot earum differentiae?

De Fracturis.
Fractura quid.

Κατάγυγς ἰσχυρῶς, Fractura ossis; est Weinbruch / est continuitatis in ossibus solutio siue divisio, seu disruptio, non obstante utrum ea ex violenta contusione, gravi lapsu, distractione aut incisione contingat. Porro differentiae fracturarum in ossibus & à Gracis & Latinis plures enumerantur. Nos verò duas tantum ad earum curationem sciri necessarias constituimus. Prima qua sumitur à situ partis fracta, cuius species sunt, Fractura recta secundum longitudi-

Fracturarum differentia.

gitudinem partis, Fractura transversa per latitudinem, & fractura obliqua per membri obliquitatem, ad quam refertur & ea in qua os minutim confringitur. Secunda differentia sumitur ab apparentia fracturae, cujus species sunt, fractura sine vul. sub cute sana delitescens, & fractura cum vulnere carnis ac cutis. Alias differentias à Græcis proditas ut fracturam rapiformem παρὰ τοὺς ὀστέων, cauliformem, cucumeriformem, unguiformem, Farinaformem, &c. nos ut parum ad curationem conferentes consilio praterimus.

Fracturarum in ossibus causæ quæ, quæ signa, & quæ circa fracturas præsigna observanda?

Causa
fractura-
rum.

Ex πόνος καὶ πόνος, causis nullum confringitur os, etiamsi magni nominis Medici scribant, aliquando tam violentam posse esse cordis palpitationem, ut costas ipsas confringat, quod videre mihi non licuit. Semper itaque ossa franguntur ex causis πόνος. ut sunt durorum & ponderosorum corporum armorumque penetrantium violenta incussiones, graves lapsus, casus è sublimi, item membri aliqujus violenta circumactiones, detorsiones ac detritiones.

Signa
diagno-
stica.

Signa fracturæ ossis quæ cum cutis carnisque vulnere accidunt, & visu & tactu deprehendi possunt.

Fractura verò delitescens sub integra cute primum ex fracti membri inæqualitate & per manuum contrectationem facile dignosci possunt. Pars siquidem fracta ad manuum contactum vehementius dolet, & fractura, si membrum incurvatum, inflecti nequit. Deinde ex inflectione membri fracti collisa ossa non obscurum strepitum edunt, & membrum confractum statim propria functione prorsus destituitur. Præsigna porro signa in ossium fracturis hæc sequentia studiosè observanda Chirurgo.

Progn-
ostica.

1. Tolerabiles sunt ossium fractura, & non difficulter curantur quæ simplices per transversum accidunt; quæ vero per ossis longitudinem aut obliquum contingunt, magis sunt doloribus obnoxia, & curatu difficiliore.

Omnium autem pessima sunt ubi fracti ossis particula longiusculè à cute per carnem extuberant, eamque continuè pungunt.

2. Pessimæ quoque habentur fractura quibus statim incidit inflammatio, & processu temporis in Gangrænam degenerant.

3. Fracturæ ossium humeri & brachii, item femoris & tibiae atque digitorum per eorum medietatem contingentes, minus sunt periculosa; sed quando fractura eorum propinquior est capitibus sive coarticulationibus ossium, eo sunt periculosiores & curatu difficiliore.

4. In brachio sive Vlna & Tibia, quæ duæ partes ex binis constant oblongis ossibus, si unum tantum est os confractum, minus adfert periculi: Altero enim integro existente, confractio subsidium adfert; Sed si utrumque os est confractum, & periculo non vacat, & difficilem efficit curationem, & sæpe membrum fractum propria functione privatur.

5. Costæ perfractæ ut plurimum comites habent inflammationem, suppurationem & febres, eoque nomine sunt periculosiores.

Curatio generalis fracturarum quæ methodo absolvenda?

Quatuor sunt scopi circa curationem ossium fracturæ observandi. Per quatuor enim operationes universa fracturarum curatio perficitur.

Indica-
tiones
curandi
fractura-
ram.

1. Per ossium confracturæ & ab invicem distantium artificiosam coaptationem, conjunctionem & in naturalem situm propriumque locum restitutionem. Quæ operatio solius Chirurgi est, quam nec natura nec medicamenta perficere possunt. Ad hanc naturæ operationem manuum industria & validiora vincula sive mantica requiruntur.

2. Per ossium rite coaptatorum & prudenter conformatorum continuè in quiete conservationem, & artificiosam, ne iterum ab invicem discedant, deligationem. Et hæc quoque operationes sunt solius Chirurgi, ad quas perficiendas fascia plures & aptissima, & ferule & pulvini sive splenia requiruntur.

3. Per

3. Per ossium coaptatorum interventu calli conglutinationem, qua operatio est solius natura; in calli tamen generatione, qua Græci πῶς dicitur, & nil aliud est, quam glutinosa & tenax sanguinis pars à natura ossibus alendis destinata, qua natura ossium interstitia conglutinat, adjuvari potest & debet, & convenienti victus ratione & remediis conglutinantibus foris introque adhibitis; In hunc usum præter alimenta & Ol. & Vng. & Empl. & Catapl. vulneraria requiruntur.

4. Per Symptomatum præcautionem, ac, si jam inciderunt, eorum remotionem, ad quam manuum industria & remedium impositiones requiruntur.

Quibus instrumentis instructus esse debet Chirurgus in curatione Fracturarum?

Instru-
menta
chirurgica ad
fracturas.

Chirurgus ad fracti ossis curationem ascitus, hisce instrumentis præcipuis instructus esse debet:

1. Cultro rasorio sive novacula, qua, si necessitas urget, ut in pungentibus fragmentis cutem carnemque super os fractum incidere queat.

2. Volsella, qua ossium fragmenta à suo continuo remota & liberata eximat & evellat.

3. Forcipe, quo ossa aculeata extuberantia, & carnem pungentia post cutis incisionem confringat & præcidat.

4. Scalpello, quo, si necessitas urget, confractum os à carne liberari possit.

5. Fasciis tenuibus & mundiss. & pluribus, quarum longitudo & latitudo pro membri crassitie & fractura amplitudine & longitudine mensuranda erit. In genere tamen, ut Hippocrati placet, quinque aut sex cubitorum longitudinem & totidem digitorum transversalium latitudinem habere debent, quibus apta deligatio perfici queat.

6. Lintheamina tenui quadrata & satis lata, quibus triplicatis aut quadruplicatis membrum fractum contegi queat, & quibus medicamina excepta fractura imponi possint, talia lintheamina complicata Græci σάλυνια i. e. Aussenchen dicuntur.

7. Stupa munda linea & pedlinata, cuius idem est usus ac lintheaminum ad excipienda remedia, & fracto membro imponenda.

8. Ferulis, qua ex pluribus & politis oblongis asserculis inter se contextis & colligatis conficiuntur. Ha supra deligationem fasciarum membro fracto circumponuntur, cum eisque deligatio constringitur, ne videlicet ossa sub fasciis laxatis iterum dissolvantur.

9. Vinculis, quibus ferula constringuntur & convinciuntur.

Quibus Medicamentis debet Chirurgus esse instructus?

Remedia vulneraria superius descripta, Medica-
qualia sunt Ol. Vng. Empl. & Catapl. sem-
per in promptu habere debet Chirurgus. In
curandis autem fracturis ea potissimum ad
manum habebis, qua Symptomata, ut sunt

Dolor, inflammatio, tumor & pruritus, arce-
re & coaptata ossa conglutinare queant. Ex
quorum numero præcipua hæc sunt: Epithema
ex ovi candido quod ita paratur: R. Albu.
ovor. No. iv. Aq. rosa. ℥. j. Ol. rosa. ℥. ij.

diu multrumque virgulis agitentur & con-
cutiantur, & in spumam redigantur, qua
stupa aut lintheolis excepta membro confracto
imponatur septem diebus continuis. Hoc enim
medicamentum dolorem lenit, & inflamma-
tionem arceat. Aut imponatur hoc Catapl.

ad arcenda Symptomata: R. Albu. Ovo.
No. iij. Ol. rosa. ℥. j. Myrthini Ol. ℥. vj.
Farina volatilis, Far. hord. ana ℥. vj. Boli
Arme. Sang. Draco ana ℥. iij. tenuiss. pul-
verisata commisc. fiat Catapl. quod lintheis
extensum septem diebus membro confracto
imponatur: Arcet enim inflammationem &
lenit dolores. Aut imponatur cerotum molle
ex sola cera candida & Ol. rosa. factum.

Tandem post septimum diem, ubi membrum
immune & tutum est à Symptomatibus, tum
quotidie Oleo vulnerario, qualia sunt Ol.
Hyperico. & Ol. Lumbricorum inungatur,
& semper sequens Catapl. ex polygonato im-
ponatur. R. Rad. Polygonati sive sigilli Salo.
℥. iv. Rad. Althe. ℥. s. Plantag. cum rad.
℥. iij. omnibus pulverisatis concoquantur

cum

N n

cum q. s. aq. ad pulvis formam, quibus hac sequentia admisceantur Ol. rosa. Ol. Myrtill. ana ℥. iij. Terebinth. ℥. j. s. ung. Dialth. ung. Agripa ana ℥. j. Cera alba q. s. quibus probe commixtis fiat Catapl. Hoc enim conglutinat & Symptomata arcet presentiaque lenit, praesertim si pul. Boli Arme. ℥. vj. Sang. Dra. ℥. s. Thuris ℥. ij. Sandalo. omnium ana ℥. j. admisc. Aut imponatur Empl. de succino aut de Vernice supra inter vulneraria remedia descripta.

Cerotum Cerotum nobiliss. Vigonis quo fracta ossa
Vigonis. & conglutinari & Symptomata eorum arce-
ri possunt.

℞. Rad. Alibe. ℔. j. decoquantur & earum mucilago exprimatur, cuius ℔. j. s. admisc. ol. rosa. Myrtill. ana ℔. s. in quibus decoquantur rad. & fol. Fraxi. rad. & fol. consol. ma. & plantag. fol. Salicis, omnium viridium ana ℥. j. quae prius per noctem in vini rubei styptici ℔. ij. sunt macerata, admisceatur quoque Thuris ℥. s. sevi hircini ℥. iv. Terebinth. ℥. j. Mastich. ℥. j. s. coquantur leniter ad succorum & vini evaporationem & percolentur fortiter expressa: pinguiori autem liquori admisc. cera q. s. fiat cerotum, quod ubi refrigerari & incrassescere incipit, admisc. tenuiss. pul. Lithar. ℥. ij. Boli Arme. Terra Sigill. ana ℥. j. Minii. ℥. x. & redigantur manibus diu multumque tractata in aq. frig. in formam Empl. Paracelsus etsi in aliis suis scriptis praestigiosa obscuritate ludat homines, in sua tamen parva Chirurgia ad fracturas sequens Catapl. non immerito mirifice commendat: Nec enim rationi repugnat, & experientia comprobatum feliciter succedit.

Primum autem docet confractio osse debere potum exhiberi lactis, in quo decocta est herba Sophia, quam ego Veronicam esse iudico. Deinde docet membrum confractum aliquo vulnerario Oleo quotidie bis inungere & seq. Catapl. deligare. ℞. Rad. Consol. ma. Rad. Arist. rot. ana p. a. confusa coquantur in q. s. vini rubei styptici ad vini evaporationem: Deinde in mortario probe contundantur, & in pulvis vel pulmenti for-

mam redigantur eisque admisc. Vernicis pictorum q. s. f. Catapl. Vinum quoque rubrum in quo Consol. & Veronica sunt decocta instar Epith. imposita, Item lamina plumbea fracturas conglutinant, & Symptomata corrigunt, ut in processu methodi indicabitur.

Ossa confracta & è loco proprio turbata quomodo sunt coaptanda & restituenda?

Ossium
confractorum
coaptatio
& restitutio.

Primum curationis confractorum ossium scopum diximus esse, quamque partem ossis fracti in proprium locum restituere, & tali methodo peragitur: 1. Accurate considerandum utrum ossis fracti partes adhuc in naturali & propria sede habeant, an ab invicem disjuncta, & à proprio loco dimota sint. Item utrum ossa fracta antrosum, retrorsum, ad latera vel sursum aut deorsum sint distorta, id quod artifex & visu & tactu, & ex agri querimonia facile cognoscere poterit. Nam si ipsa fracta ossa adhuc in proprio loco consistent, in membro fracto parum doloris, & exigua inaequalitas deprehenditur, nec putationis sensus.

At ubi fragmenta è nativo loco secesserunt, in membro manifesta inaequalitas cavitasque & visu tactuque percipitur, & punctiones graves circa fracturam sentiuntur. Si itaque particula ossis fracti ab invicem distorta sunt, statim in initio maturè, & antequam membrum inflammetur aut intumescat, industria manuum agilitate omnia fragmenta coaptentur, in pristinum locum reponantur, & proprium situm restituantur ac configurantur. At si in membro confractio inaequalitas & extuberantia deprehendatur, vola manus leniter supprimatur, & ad aequalitatem reducatur. Verum ubi ossis fracti pars altera supra alteram extuberet, aut altera sursum altera deorsum sit depressa, ita ut coaptari nequeant, tum ossa fracta ab invicem sejungere oportet, & membrum distendere injectis manicis, sive robustioribus linteois ac vinculis utrique parti fractura, quibus duo ministri unus sursum, alter deorsum membrum trahant, donec utraque pars fra-

cti

Cataplasma
Theophrasti.

Et ossis per Chirurgum ad amissum coaptari queat, depressam elevando & extuberantem supprimendo, manuque dirigendo, donec in aequalitatem & pristinum locum redeat. Porro scita restorationis & coaptationis ossis indicium est, doloris remissio & aequalitas membri confracti. At si fragmentum aliquod in totum à reliquis resolutum sit, ita ut non amplius illis agglutinari queat, illud carne vulnerata eximendum est, ne punctiones & labores faciat. Id si non fiat ab initio, tamen processu temporis adjacens ossiculo caro puiret, & per abscessum cum pure à natura excutitur. Vbi itaque ossa confracta rite coaptata, & in proprium locum restituta sunt, & membrum fractum rectè configuratum est, antequam ad deligationem accedatur, ex praescriptis remediis Symptomata fracturarum arcentibus unum, puta, aut Epithem. ex albu. ovorum aut Catapl. aut cerotum ex ol. rosa. aut Catapl. Paracelsi stupamunda aut complicatis linteolis exceptum, membro fracto circumponatur per plures horas, ut Symptomata conquiescant.

Ossa confracta iterumque coaptata & in proprium locum restituta, quomodo in eadem figura & restitutione sunt retinenda?

Offium
repositio-
rum de-
ligatio.

Secundus scopus est, ut fracta ossa rite in proprium locum restituta, usque ad eorum conglutinationem conjuncta retineantur. Facile enim ossa coaptata rursus dimoveri & ab invicem distorqueri possunt, praesertim in immoderato corporis motu: Nisi enim patiens & vigilans & dormiens ab omni inordinata agitatione ac motu membrorum fractorum se contineat, eaque in quiete conservet, tota coaptatio dissolvitur. Ad hunc scopum consequendum tres potissimum operationes manuales requiruntur: Artificiosa nimirum fasciis convenientibus deligatio, ferularum impositio, & naturæ membri confracti conveniens configuratio, ac dispositio, in qua configuratione quietum & immobile membrum conservari & retineri sine molestia queat. Deligationem talem oportet esse qua ossa coaptata moderate confir-

gat & contineat, & ut non sit nimium coarctata, nec nimium laxa deligatio; per laxam enim deligationem facile ossa conjuncta dissolvi possunt, per arctiorem verò ut plurimum dolor & inflammatio excitatur, & affluens sanguis, qui in membrum alendum & fracturas conglutinandas confluit, intercipitur. Debet itaque in deligatione & fasciarum circumvolutione mediocritas observari, ut sit & judicio Chirurgi, & ad sensum patientis tolerabilis, & minimè molesta. Quin etiam in deligatione fractorum membrorum regulae sunt observandae:

1. Si membri fracti crassities undique sit aequalis, ut in tibiis & brachiis, tunc fascia debent esse paulo latiores, quia totum membrum quam aptissime & aequaliter complectantur. Si verò membrum fractum inaequale existat, ut in femoribus, ea inaequalitas in tenuiori membri parte crebrioribus fasciarum circumvolutionibus complenda & aequanda erit. Verum in articulis & membri incurvationibus, ut in digitis, genu, & cubito, angustioribus fasciis, & crebrioribus plicaturis utendum erit.

2. In fracturis ossium quae in medietate humeri, brachii, femoris & tibiae accidunt, in earum partium deligatione semper duabus fasciis est utendum, quarum primæ initium supra fracturam imponendum est, & circa eam ter quaterve circumvolvendum, ac inde sursum versus secundam partis longitudinem instar Cochleae procedendum, & sana quoque pars membri fracti satis late cum fasciis complectenda. Deinde & alterius fascia, quæ priori duplo debet esse longior, initium in fracturam imponendum, & semel tantum per fracturam circumvolvendum, & inde non ut cum priore sursum sed deorsum circumvolvendo, procedendum usque ad satis amplam sanae partis portionem, & ita tandem iterum sursum per fracturam circumvolvendo procedendum usque ad finem prioris fasciae, ibidem utriusque fasciae termini consueendi.

3. Deligatum ita membrum Chirurgo quam aptissime configurandum est, & in

naturalem situm dirigendum ac collocandum. Is autem est naturalis situs singulorum membrorum, in quo sanum convenit sine molestia & dolore constitutum esse, & ejusmodi quidem situs, & configuratio secundum Naturam rectarum partium, recta, curvarum incurva, & pendentium pendens est convenientiss. Femora & tibia rectum situm, Brachium, & cubitus & digiti incurvum situm magis amant. Ita tandem rite configuratis membris supra ipsas fascias singulis diebus Epithema ex candidis ovorum & Ol. rosa. ut paulo ante docuimus, stupa exceptum imponatur fracturaeque circumdetur, ut mirum mador Epithe. per fasciam ad membrum fractum penetrare queat, illudque à Sympto. praeservare. Ne autem stupa madida delabatur fascia tertia lata unica circumvolutione alligetur.

4. Si fractura insignis, aut ossa ultra modum comminuta, (levis enim fractura eis non indiget,) si membrum est immune ab inflammatione & vehementiori tumore, ut commodius coaptata ossa contineri queant, & in sua configuratione conservari, supra stupam alligatam ferula lenes, politae, aequales & oblonga inter seque connexa membro circumdantur & vinculis constringantur pro sensus membri toleratione. Verum si fractura accessit inflammatio ferule, omitti prorsus debent, donec extinguatur inflammatio & tumor subsidat. Porro si fractura vulnus quoque copulatum sit, in tali fractura, ubi vulnus est, minimè imponi debent Epithemata aut Catapl. ex albu. ovo. & Ol. rosa. ne videlicet sub iis vulnus putredinem concipiat, sed potius plumeoli seu complicata linteamina vino rub. in quo rad. Consol. ma. & Veronica sunt incocta, imbuta imponantur. Et si fieri posset commodissime eo artificio deberet fieri deligatio fracturae, ut per fascias circumvolutas ad vulnus foramen relinqueretur, per quod pus profluere & vulneraria Empl. imponi possent.

5. Hæc prima deligatio membrorum fractorum, nisi vehemens dolor, aut inflammatio, aut intumescencia, aut intolerabilis

pruritus urgeat, usq; ad diem decimum quintum minimè solvenda erit. At si prædicta Symptomata inciderint, tertio quolibet die fascia solvenda & Symptomati præsentis consulendum, propriaque remedia adhibenda erunt. Paracelsus ab hac usitata deligandi fracturarum norma prorsus dissentit, & dicit ossa fracta quotidie bis esse deliganda, & Empl. ipsius Paracelsi de consolidanda. factum (cujus parandi rationem paulo ante tradidimus) imponendum, quo faciliè omnia fragmenta conglutinentur. Hic sanè Paracelsus à ratione minimè dissentit; eo enim modo omnia Symptomata quæ sub diuturna deligatione incidere possunt, commodissime & arceri & propulsari possunt, præsertim in fracturis non adeo magnis. Verum in comminutione ossium & excellenter magnis fracturis, ad sui conglutinationem cerè diuturnum requirunt & usitatum deligationis modum.

Conglutinatio ossium confractorum quomodo adjuvanda?

Tertius Scopus solius Naturæ est operatio. Verum cum omnia ossa aridiora sint, quam ut per se conglutinari queant, sine interventu alicujus humida & tenacis materie, in eorum conglutinatione utitur natura callo tanquam glutine, qui nihil aliud est, quam tenacior & glutinosior pars sanguinis ossium nutritioni à natura destinata, quæ, ubi in interstitia fractorum ossium defluxit, ibidem paulatim induratur, & fracta ossa firmissimè inter se conglutinat. In calli autem generatione natura adjuvari potest pleniori multumque alente nutrimento, ex quo crassus glutinosusque sanguis generari queat, ut sunt panis similagineus recens, Caro suilla, Caro porcellorum, Caro hædina, vitulina, pulmentum ex Oriza & amilo. Verum ejusmodi victus ratio non nisi post nonum diem est instituenda: quin & Catapl. Paracelsi ex Consol. ma. & Empl. vulnerarium de Veronica fractura impositum callum generat, & ossa confracta conglutinat. Ut plurimum autem callus ossa conglutinare incipit circa nonum diem. Conglutinationis autem signa hæc sunt:

Dolor

Dolor qui prius in fracto membro percipiebatur, molestare cessat, & tum nec inflammatio, nec tumor membri metuendus est, membrum fractum nativo suo calore efflorescit, & per fasciolas fractura circumvolutas cruenta macula conspiciuntur, etiam si nulum adsit vulnus.

Fracturas ossium quæ symptomata comitantur?

**Fractura-
rum
Sympto-
mata, eo-
rumque
curatio.** Quartus scopus est Symptomatum quæ in membra confracta incidere consueverunt, præcautio, & si qua jam inciderunt, propulsio, ac sublatio. Porro excitantur Symptomata in membro fracto, aut à naturæ partis imbecillitate, aut ab imperitia Chirurgi in suis operationibus circa fracturas. Sunt autem præcipua Symptomata quibus fracta membra infestari solent, dolor & inflammatio, pruritus & exulceratio, vulneris cum fractura copulatio, Calli penuria & redundantia, ejusque induratio, membri confracti Gangrana, distorta conglutinatio functiones membri ledens: quorum Symptomatum curationes quàm brevissimè absolvemus.

Dolor, Tumor & inflammatio, in membro fracto, ut compscenda?

Dolor, Tumor & inflammatio. Dolor, Tumor, & inflammatio ut plurimum conjuncta sunt in fracturis ossium, & excitantur aut ab affluxu humorum, aut ab ætiori deligatione, aut ab acumine fragmenti alicujus ossis carnem pungentis; in hisce Symptomatibus fascia & deligatio statim solvi debet, & consideranda causa, eaque protinus removenda, in quem usum convenientiss. est Ol. Rosa. tepidum cui parum aceti rosa. sit admixtum; stupa aut lana carpta exceptum, & fractura circumpositum. Prodest quoque membrum inflammatum Unguento populeonis inungere, & Catapl. ex fol. Hyosch. quod supra in vul. curatione docuimus consiciendum imponere, & simplici fascia, donec Symptomata sint sopita, leni restrictione deligare. Sublatis tandem Symptomatibus ad præscriptam deligandi formam & ferularum circumpositionem redire. Tu-

morem egregie discutit, & simul dolorem inflammationemque mitigat, si membrum fractum singulis diebus bis cum aq. temperate calida perfundatur ac fomentetur.

Pruritus & exulceratio in fracto membro ut tollenda?

Ex seroso & bilioso humore ad membrum confractum defluente sæpè intolerabilis & exulcerans pruritus excitatur. Id ubi contingat, deligatio & fascia resolvenda erunt, & membrum confractum bis, ut diximus, in die aqua temperate calida diu mulumque perfundendum ac fovendum erit, donec acris humor per poros cutis eliciatur; sedat quoque pruriginem & longè citius quam aq. calida, si membrum sanguine sive aq. salsa tepida perfundatur, prurientes partes cum unguento de cerussa aut ung. popul. inungantur, aut aq. rosa. linteolis excepta instar Epith. imponatur. Sedato pruritu ad fractura propriam deligationem superius traditam revertendum erit.

Vulnus cum fracto membro copulatum, & inde orta Symptomata, quomodo curanda?

In ossium fracturis sæpè membri cutis & Vulnus, caro vulneratur, aut ex acumine fragmenti ossis per carnem cutemque erumpentis & extuberantis, aut per Chirurgi consultam incisionem, quo per vulnus pungentia fragmenta commodius eximi queant. In ejusmodi casu omnium primum sanguis profluens suppressendus est, quemadmodum in vulnorum curatione docuimus, similiter si vuln. accessit tumor & inflammatio; ea quoque Symptomata propriis præsidii supra in curatione Symptomatum vulneratorum traditis tollenda & mitiganda erunt. Ita si confracti membri caro sit contusa, & putrefactionem minuetur, scarificatione sanguis corruptus est prohibendus, eaque remedia adhibenda quæ supra in tumorum putrescentium & in vul. contusorum concisione sunt commemorata. At si horum nihil adsit, neque ossis aliqua pars è vul. nuda protube-

Pruritus
& exul-
ceratio.

ret, & fragmenta ossium resoluta è vul. sunt evulsa, ipsum vulnus, si consuitione egeat, consuendum erit, & remedia vulneraria in superioribus descripta, imponenda, ac simul & vul. & fractura ejusmodi instituenda est deligatio; fascia latiuscula ex utraque parte vul. decussatim instar obliqua crucis imponantur, ita ut totum vulnus ab iis contegi queat, ac tandem fascia extremitates superioris quidem sursum versus, inferioris vero deorsum moderata circumvolutione & constrictione circumvolvatur: Deinde supra fascias imponatur Ol. Rosa. stupa exceptum, aut Cerotum ex Ol. Rosa. confectum, aut imponatur stupa mundissima in vino rub. austero, in quo rosa & consel. ma. rad. sunt incocta, madefacta, quæ nova fascia deligetur, donec in vul. caro inculpata succrescere incipiat. Porro in fracturis cum vul. complicatis, si fractura secundum membri longitudinem protensa sit, statim in initio supra deligationem ferule sunt imponenda, & paulo artius quam in fractura per transversum facta constringenda; verum si vulnus per transversum fascia constringenda; sin autem vulnus per transversum membri sit illatum, & fractura quoque sit transversalis, ferule in initio non sunt circumponenda, donec caro in vul. sit regenerata, sed per totum curationis tempus vulnere sunt imponenda quæ inflammationem & tumorem arceant; si præterea acutum & pungens aliquod officulum è vul. promineat, nec commode in proprium locum restitui queat, id forcipe præcidi, comminui & eximi debet.

Calli in fractis ossibus penuria aut superfluitas, duritiesque, quomodo corrigenda?

Calli vitia.

Sive calli penuria, sive ejusdem redundantia laborant ossa confracta, utroque modo impediunt conglutinationem; ejusdem quoque concretio & induratio supra fracta ossa, dolorem & inaequalitatem membri secum affert. Calli penuria corrigi debet per victus rationem pleniorum, & alimenta copiosum sanguinem, crassumque & glutinosum generantia, qualia paulo ante commemoravi-

mus, & per fomentationem seu perfusionem crebram aq. moderate tepida, & per applicationem Empl. atrabentinum & conglutinantium, qualia sunt Empl. de pice & Empl. Oxy-cro. Redundantia calli sua copia disjungit ossa coaptata, conglutinationemque prohibet. Ejus itaque nimia luxuries diminuenda erit tenui victus ratione, vena sectione & salsa aq. tepida crebra perfusione & Empl. excantibus aut laminarum plumbi fracto membro impositione, & artiori deligatione; ubi autem callus superfluum super os confractum concreascit, & in duritiem coëat, in carne adjacenti dolorem excitat. Præstat itaque factio per carnem usque ad ossa vulnere, superfluum callum scalpello aut alio instrumento abradere.

Gangræna ossium fracturæ copulata quomodo curanda?

Chimici utuntur oleo petroleo, Ol. sal. commun. nitri, vitrioli, Cario-phyllor. balsam. sulph.

Gangræna quid sit, & ex quibus causis excitetur, & qua ratione curanda, supra inter Vl. curationes prolixè demonstratum est, quæ hoc loco repetere, supervacaneum esse arbitramur.

Gangræna.

Chimici in usu est, unguent. stellat. Paracel.

Ossa fracta perperam conglutinata, & membri actiones lædentia, ut curanda?

In curatione fracturæ ossium à prava coaptatione & imperita configuratione membri fracti, præsertim cum vul. copulati, diversa partes & ad unionem non pertinentes crebro conglutinantur, & membri fracti functiones aut omnino tollunt, aut insigniter viriant. Id si contingat, nisi tempestive dum adhuc callus est recens & tener, & non ultra sex menses duravit conglutinatio, iterum confringatur, perpetua manet perversa conglutinatio, partis configuratio, & actionum membri læsio.

Vitiosa fracturæ conglutinatio.

Statim itaque in initio, etiam si id fieri sine singulari molestia ac dolore nequeat, conglutinata membra rursus confringantur, detellanturque, & fractum membrum in naturalem locum situmque proprium deducatur & configuretur; imprimis in ejusmodi fracturis ubi ossa conglutinata functionum difficultatem in membro relinquunt. Debet autem

autem

autem Chirurgus antequam confringere membra conglutinata tentare velit, per dies quatuordecim quotidie bis diu multumque membrum fovere ac perfundere aq. in qua decocta sunt rad. Alib. Chama. Malva. Sem. Lini & fœnugraci. Hac enim emolliunt cal- lum.

Post fomentationem quæque totum mem- brum est inungendum Ol. chamem. & Vng. Dialib. atque semper Catapl. ex rad. Aliba. ficub. & sem. lini confectum supra membrum malè conglutinatum gestandum; Ita tandem callo probè emolliuo ac resolutio, si membri na- tura & figura patitur, membrum genu impo- sito violenta distorsione aut impressione denudè confringatur & ab invicem divellatur. Aut si genu confringi nequeat, per duos administros violenta fractione in diversum trahatur ac distendatur, & ad propriam ac vsuata figuram dirigatur, statimque nova curatio se- cundum præscriptam methodum rectè coa- ptando, configurando, delgando, congluti- nando, & Symptomata a studiosè arcendo in- stituatur. Sciendum tamen est in denuo con- glutinati ossis confractione, præsertim in vete- rati, ut plurimum ossa non ubi callo concre- verunt, sed alio in integro loco confringi sole- re, quare nova confractio ossis insigni periculo non caret. Nam ut plurimum acerbiss. Sym- ptomata in ea excitantur, dolor, tumor, in- flammatio atque febres, & in Vita discrimen ager conicitur. Quare nisi extrema urgeat necessitas, nec ager novam subeat toriuram, nec Chirurgus temerè periculosam suscipiat curationem, nisi coactus, idque cum protesta- tione & prædictione periculi.

Sunt ne fracturæ quarundam par- tium, quæ peculiarem requi- runt curandi rationem?

Ossium omnium cujuscunque membri fra- ctura præscripta methodo & supra annotatis remediis à perito Chirurgo curari possunt, ex- ceptis ossib. Capitis, quorum propriam curandi rationem supra in curatione Vul. Capitis ab- undè proposuimus. Inde itaque quæ hic proli- xitatis vitanda causa omittuntur, peti, & huc transferri possunt.

SECTIO VI

Chirurgicarum Curationum

DE

LUXATIONIBUS.

Luxatio quid, quot ejus differen- tiæ, quibus partibus frequen- tius & periculosius, & quot modis accidit?

Luxatio quid.

Eξarthrosis Exarticulationes Latinis, Medico vocabulo Luxatio & osium dislocatio, nostratibus, ein verrückung der glider. Est autem luxatio osium inter se coarticulatorum, intervenientique ligamenti connexorum è loco nativo & propria sede in alienam excussio sive prolapsio, in qua motus voluntarius & functio membri impediuntur atque vitantur.

Sunt autem articuli in corpore, ubi duorum osium extremitates alterius quidem tuber si- ve caput alterius cavitati sive sinui, qui Græcis ὑγῶν, i.e. acetabulum dicitur, inse- riuntur, & firmissimo nerveo vinculo connecti- tur. Id autem vinculum generatur ex in- trinsecis ossis Cartilaginibus, quibus osium extremitates sunt oblinita. Vbi itaque ex vio- lenta commotione, laxato eo vinculo, ossis tu- berculum ex suo acetabulo detorqueatur, & aut in totum, aut secundum partem prolabi- tur, luxatio & dislocatio est.

Differentia luxationis nulla sunt aliæ, nisi qua à magnitudine desumuntur; & ita alia luxatio dicitur perfecta & totalis, alia imper- fecta & secundum ossis particulam. Perfecta sive totalis est, ubi totum caput ossis ex suo si- nu proprio in alienum locum prolapsum est, quæ Græcis simpliciter Εξάρθρωσις, exarticula- tio, dicitur. Imperfecta est, ubi media tantum vel aliqua pars tuberosi ossis ex sua cavitate supra marginem sui articuli est sublata ac de- pulsa, quæ Græcis ὑπερθρῶσις, h.e. subluxa- tio, dicitur.

Accidere potest luxatio in omnibus os- sium coarticulationibus motui voluntario Quibus articulis accidit luxatio: servien-

servientibus; sed in aliis facilius, in aliis difficilius, item in aliis periculosius, in aliis minus periculosius. Crebrius & facile luxatur coarticulatio humeri cum scapula & coarticulatio cubiti, ubi humerus & brachium connexa sunt, & coarticulatio in carpo, ubi brachii & summa manus ossa connexa sunt, & coarticulationes digitorum. Ita quoque facile luxantur coarticulationes circa Inguina, Coxa & femoris. In genu femoris & tibia; Rarius autem & difficilius luxationem patiuntur coarticulationes circa malleolos tali & ossis Calcis, Maxilla inferioris, ossium pectoris atque vertebrarum Spina dorsæ, quorum luxatio sigillatim Latinis perversio & detorsio spondyli dicitur. Inter luxationes periculosa sunt vertebrarum spina, maxime autem cervicis, qua subitam mortem inferunt. Quin & alia quoque Vertebrarum luxationes propter convulsionem, quam semper habent comitem, ut plurimum ultra quartum diem supervivere non patiuntur, sed miserabilem cum acerbo dolore inferunt mortem.

Ex levi autem Vertebrarum detorsione aut commotione, similiter & ossium pectoris, ut plurimum gibbus pronascitur. Non carent quoque periculo luxationes femoris & coxa, humeri & scapula propter difficultatem repositionis & gravia Symptomata, & in summa, omnes luxationes quanto sunt propinquiores principalioribus membris, tanto sunt periculosiores.

Modi autem siue forma luxationum quinque recitantur: in omni enim luxatione caput siue processus tuberosus ossis ex acetabulo suo depulsus prolabitur, aut antrorsum aut retrorsum, aut extrorsum h. e. ad latus externum, aut introrsum, aut sursum versus, ut exempli gratia, Maxilla luxata semper antrorsum dimovetur. Vertebra autem luxata nunquam introrsum, quandoque extrorsum detorquentur. Humeri caput excussum detruditur aut antrorsum, aut sursum, aut deorsum in alas. Luxatio in genu propter patellam nunquam antrorsum, sed ferè semper retrorsum prolabitur. Sape quoque vel

introrsum vel extrorsum, sic & de aliis coarticulationibus contingere consuevit. Modum autem luxationis ossis extuberantia facile indicabit.

Causæ luxationum quæ?

Luxationum causas sunt articuli alicujus violenta distentio, incussio, & distortio. πονος. est viscosus pituitosusque humor aut ex Capite, aut ex toto corpore ad imbecillum articulum confluent, & intra acetabulum collectus, qui primum ligamenta ossium madefacit & laxat; deinde & caput ossis è suo loco deturbat.

Signa luxationis quæ, & quæ præsignificientia signa præceptaque Aphoristica in Luxationis curatione sunt observanda?

Signa luxationis manifesta sunt, & visus & tactu in quibuscunque articulis facile deprehendi possunt. Caput enim ossis circa articulum præter naturalem membri figuram, & consuetam constitutionem in alieno loco cum dolore protuberat, & motum articuli vitiat, aut prorsus tollit. Ex signis prognosticis & Aphoristicis præceptis in curatione luxatorum articulorum hæc præcipue sunt observanda. Luxata ossa rectè & perfectè in proprium locum reposita esse arguunt, strepitus ossium inter reponendum, & membri seu articuli naturalis & consuetæ configurationis ratio.

Luxati articuli quàm fieri potest celerimè & statim reponendi erunt antequam accedat tumor & inflammatio, qua si adsint, non prius sunt reponendi donec ea Symptomata conquieverint. Sedatur autem inflammatio, tumor & dolor, si rectè tractentur circa septimum aut nonum diem. Si in luxationibus perfectis ingens dolor & inflammatio, aut vulnus accesserit, difficillimè reponi possunt, & si reponantur, Symptomata magis exacerbantur. Inveterata Luxationes, qua callo obdurnuerunt, rarissimè aut nunquam per sanari possunt, sed claudicationes post se relinquunt mancosque efficiunt: Luxationes in quibus acetabuli libra seu margines sunt confracti, capita ossium etiamsi repon-

Signa prognostica de luxatis.

Causæ luxationum.

Signa luxationum diagnostica.

Signa prognostica de curatione luxationum.

Modi luxationum quinque.

reponantur, statim excidunt & prolabantur: Genuum & digitorum coarticulatio ut facile luxatur, ita non difficulter reponi potest: (Vbi enim coarticulatio non facile dislocatur, ibi etiam egrè reponi potest.) Humeri verò luxatio & restitutio medio modo se habet.

Quibuscumque teste Hippocr. à coxendicum dolore molestatis caput femoris excidit, iis crus & tibia contabescunt, & claudi fiunt.

Curatio luxatorum ossium quomodo peragenda?

Carnifices luxata reponunt.

Dolendum est luxatorum articularum curationem hac tempestate, & in hisce Boreali-bus regionibus, à Chirurgis imperitiis & tonsoribus indoctis ad carnifices esse ablogatam; illi enim soli putantur esse excellentes & in luxandis articulis & in luxatarum partium repositione, à quibus utinam nostri tonsores artem reponendi luxata discere non puduisset, ita sane pauciores claudos & mancos ex sua luxatorum curatione reliquissent, & nobilem hanc Chirurgia partem non in fœdam carnificiam detrussissent, carnificibusque servire coëgissent. Porro felix luxationis curatio per tres potissimum scopos perfici debet: 1. Per ossium luxatorum sive dislocatorum in propriam sedem repositionem. 2. Per repositi ossis in propria sede ne rursus prolaba-tur, conservationem. 3. Symptomatum qua luxatis membris contingere consueverunt, ne incidant, præcautionem, aut si acciderunt, propulsio-nem.

Indica-tiones curandi luxata.

Circa luxatorum ossium repositionem quæ sunt ob-servanda?

Luxa-torum repositio.

Primus scopus sive intentio Chirurgi in luxatorum curatione est ossis dislocati in propriam sedem artificiosa repositio, qua operatio Chirurgica ita consicienda erit: Membrum luxatum manibus apprehendat Chirurgus, non quidem more Carnificum torquendo, sed quam fieri potest suaviter & sine dolore, il-ludque in diversas partes decenter distendat ac disfrabat, donec spaciū inter caput ossis dislocati ejusque acetabula liberum sit, tan-demque ossis prolapsi caput ab ea parte in

quam prolapsum est, in contrariam propellat, & in acetabulum suum dirigat & detrudat; quod ubi cum strepitu in suam cavitatem in-cidit, salva res est. Cavitas enim sive acetabulum iterum repletur, membrumque luxa-tum consuetam recipit figuram & propriam functionem, nullamque relinquit vel extu-berantiam vel cavitatem in membro luxato. Verum contingit non rarò, ut tam gravis sit ossium luxatio, ut solis manibus membra lu-xata extendi & coaptari, riteque reponi ne-quaquam possint; tum sane robustiores fascia sive mantica utrinque membro luxato sunt injicienda, & ita validius in diversa trahere, luxatumque os in propriam sedem reponere oportet; aut sanè machina repositioni ossium, à peritis Chirurgis excogitata, usurpanda erit, donec repositio felicem successum nan-ciscatur. Repositio verò luxati ossis statim in initio molienda est, antequam luxatum membrum vel intumescat, vel inflammetur: hac enim Symptomata laboriosam & pericu-li plenam reddunt repositionem.

Circa repositum ossium, nerursum è proprio loco prolabantur, retentionem, quæ sunt peragenda?

Secundus scopus Chirurgi in luxatorum articularum curatione est, ossis in proprium locum rectè repositi retentio & conservatio, ne videlicet rursus è sede sua excidat denuo-que prolabatur. Hanc operationem dextre perficiet Chirurgus, si primum membrum lu-xatum ac rursus restitutum, Ol. rosa. cal. cui paucillum aceti rosa. est admixtum, probe inunxerit, moxque linteolum membro adaptatum Ol. acetoque rosa. simul mixtis & calefactis imbutum, instar Epith. impo-suerit, ac supra illud stupam mundiss. sorborum candido cum aceto rosa. concusso & in spumam redactò madesactam decenter applica-bit; qua quidem in hunc finem imponitur, ut arceant inflammationem, & tumorem do-loremque mitigent. Ita enim tandem munim tum remediis membrum artificiosè fasciis in Oxycrato h. e. aceto & aq. rosa. commixtis madesactis iterumque expressis deligaverit.

Ossium reposito-rum in sua sede confer-vatio.

Prodest tamen plurimum ad retentionem ossis in sua cavitate & membri corroborationem sequens Catapl. tepidum imponere :

℞. Ol. rosa. Myrril. ana ℥. ij. Alb. Ovo. No. iv. Suc. Plantag. consol. ma. ana ℥. j. farina volatilis, bordeacea ana ℥. x. Terra sigillata, Boli Armie. Rosa. ana ℥. li. pul. rub. adstringentis supra in vul. curatione propositi ℥. j. s. Terebinth. mell. rosa. ana ℥. vi. commisc. repida fiat, Catapl. quoposito fascia deligetur tali constrictione, qua nec dolorem exciet, nec inflammationem conciet, qualem in curatione fracturorum ossium proposuimus. Postremo, ut commodius in cavitate sua os repositum detineri queat loco, ferularum, corium mundum sive alutam aut linteum cera liquefacta imbutum imponatur & alligetur, luxatumque membrum in aptiss. figuram dirigatur, & ad quietem disponatur, nec ante septimum diem vel nonum hac prima deligatio resolvatur, aut nova remedia applicentur, nisi grave ac molestum aliquod Symptoma inciderit, fasciarumque solutionem urserit. Symptomatum porro propulsionem mitigationemque nunc in tertio scopo docuimus.

Luxa-
torum
Sympto-
mata,
eorum-
que cu-
ratio.

Quæ Symptomata luxationes ossium comitari solent, & quomodo singula depellenda?

Tertius scopus curationis luxatorum articulorum est Symptomatum precautio & sublatio. Nisi enim Symptomata presentia prius tollantur aut saltem mitigentur, frustra tentatur & ossis luxati repositio, & in suo loco detentio. Irrita & periculosa est universa luxatorum curatio presentibus Symptomatibus. Iisdem autem ferè Symptomatibus, luxata membra infestari solent, quæ supra in ossium fracturis sunt commemorata, videlicet humorum vitiosorum adfluxu in luxata membra, dolore, tumore, inflammatione, febre, vuln. & fractura luxationi copulata, induratione & convulsione.

Affluxus
humo-
rum.

Affluxio humorum in luxatione articulorum quomodo amovenda tollendaque?

Humorum sive sanguinis impurioris afflu-

xio in luxatos articulos, præsertim in plethoricis & Catochymis corporibus, statim reprimenda, sistenda & detrahenda erit: ea enim & tumoris & doloris & inflammationis in luxatis membris est effectrix causa. Si itaque atas & alia circumstantia non impediant, & corpus sit plethoricum, sanguinis redundantia venasectione detrahenda & cucurbitularum impositione avertenda, atque tenui victus ratione diminuenda erit. Ita, si corpus sit Catochymum, remediis convenientibus humores redundantes vitiosi subducantur, adeoque tota defluxio Empl. & Epith. adstringentibus superiori parti luxati membri impositis interceptiatur, ac cohibeatur. Constringit autem & fluxionem intercepti Catapl. ex farina volatili & pul. rubeo inter remedia vulneraria descripto confectum, quam jam statim descripturi sumus.

Dolor, inflammatio & tumor in luxato membro quomodo compescenda?

Dolor
inflam-
matio
& Tu-
mor.

Horum Symptomatum accuratiss. habenda est ratio in luxatis articulis, & omni studio, ne accendant, arceant, & si accesserunt, quam primum tollenda, his enim presentibus, nec potest nec debet luxatum os proprium in locum reponi, nisi hæc Symptomata primum sint sublata. Ita, jubente Celso, qui inquit, quicquid loco suo motum est, ante inflammationem reponendum erit, & si illa jam occupavit, donec conquiescat, haudquaquam reponendum; magis enim lacebitur. Si itaque egram partem unum ex his aut simul omnia molestant Symptomata, confestim solvenda est deligatio, & membrum luxatum aqua temperate calida perfundendum & diu multumque fovendum, ex ea enim perfusione & dolor mitigabitur & inflammatio lenietur, & tumor subsidebit, & vitiosi humores in membro collecti probe digerentur. Tandem perfusione ac fomentatione ejusmodi peracta, membro luxato sequens Catapl. imponatur. ℞. Farina volatilis ex molarum parietibus collecta; pul. rub. constringentis, pul. consol. ma. ana p. a. qua commixta & temperata cum q. s. alb. ovorum in catapl. formam redi-

redigantur, luxatoque membro imponentur, atque fasciis paulo arctius, dolorem tamen minime excitantibus, deligentur. Præter id probè quoque inflammationem & dolorem mitigant, tumoremque sedant ol. rosa, vel sigillatim vel simul mixta calefactaque, sive molli lana sive stupa sive complicatis linteolis excepta & imposita.

Luxationi febris copulata quomodo curanda?

Febris.

Vbi luxationi febris copulatur, minimè caret periculo, & tum sanè tenuis victus ratio, & ea omnia remedium genera febrì aduersantia, & qualitatem febrilem alterantia, quæ supra à nobis in Februm curatione sunt commemorata, adhibenda applicandaque erunt. Februm itaque tractatio pro specie febris cuiuslibet consuli potest.

Vulnus aut fractura luxationi copulata, quomodo curanda?

Vulnus & fractura.

Vbi luxationi accedat vel vulnus vel ossis luxati fractura, ea sane minimè caret insigni periculo, & quidem eò majori quàm vel vulnus, vel fractura luxatio articulo est propinquior, quanto ve membrum luxatum majus est, idèò hac accidentia luxationis singularem requirunt Chirurgi industriam, prudentiam & diligentiam. Semper autem statim in initio, si ulla ratione fieri potest, luxationis repositio tentanda est, & debet curatio luxationem vulneris aut fracturæ curationem præcedere, & fracturæ prior debet esse curatio quàm vulneris. Si autem propter fracturæ magnitudinem, & vulneris incommoditatem in principio luxatum os reponi nequeat, tum fracturæ, ut in superioribus docuimus, coaptando & colligando curanda erit, & Symptomata, præsertim inflammatio & tumor, studiosè præcavenda atque arcenda erunt. Verùm vix fieri poterit, quin neglecta in initio repositione interea temporis in luxatam partem callus & durities incidat, id si contingat post curationem fracturæ, emollientibus decoctis fovendum erit membrum luxatum, & sequens Catapl. per quatuordecim dies imponendum. R. Rad. Alb. Consolida. ana lb. s. Sem. Lini. fœnugraci ana

℥. iij. Contusa coquantur in aqua q. s. ad molliem. F. Cataplasma. Aut imponentur luxato membro Empl. Diachyl. mag. quod in Myropolii prostat, & pars affecta subinde unguento Dialthe. inungatur, tandemque nullo præsentè Symptomate, luxati repositio superiori methodo manibus aut instrumentis tentetur. Postremo sublati Symptom. & confirmato osse in suo acetabulo, tum plenior & bona victus ratione corroboretur ager, & pars affecta confirmetur, subinde persudando seq. decocto cum vini & aq. a. p. R. Rosa. Callus & durities. absynth. & Musci quercini ana M. ij. concendantur & concoquantur. Post fomentum verò imponentur luxato membro pro conservatione in proprio loco Empl. Oxyero. cuius descriptio extat in Pharmacopæorum libris, & ita tandem sensim rursum assuescat membrum ad solitas actiones.

Gibbus seu gibbositas quid? Quid ejus causæ, & ut tractanda?

Κύρσις vel κνέσις, Latinis Gibbositas, Gibbus. der Hovel / est soboles imperfecta luxationis vertebrarum dorsì aut ossis pectoris, quæ in puerulis neglecta, magis magisque adaugetur, & dorsum aut pectus extuberans & convexum reddit.

Causæ gibbositatis πῶσις. sunt eadem ferè quæ & luxationis, videlicet casus & percussio dimovens vel vertebras dorsì, vel ossa pectoris. πῶσις. sunt in puerulis vehemens tussis & Asthma, & tuberculum in dorso aut circa pectus. Hipp. inquit, qui ante pubertatem gibbosi fiunt, ex Asthmate aut tussi, illi brevi moriuntur. Adjuvans causa est adfluxio superflui alimentarii humoris ad læsam partem, adaugens tuberculum, & in callum excrecens. Sicut enim in arboribus ex redundantia succi extuberantia fiunt, ita gibbi ex humore affluente ad distractas vertebras. Crescit autem gibbus usque ad ἀκμὴν.

Signa in pueritia est tuberculum durum circa vertebras aut στήθων, quod primum instar avellanae, deinde instar nucis Juglandis tactu deprehendi potest.

Curatio Gibbi inveterati & ultra modum protuberantis, impossibilis est. In princi-

Causæ gibbositatis.

pio verò exortus gibbi tuberculo adhuc existente, per desiccantia & absorbentia remedia discuti, & ejus incrementum prohiberi potest, ex quibus remediis unum & alterum exquisitius hic subungere satis erit. Si tuberculum quotidie bis inungatur Chemicis oleis, videlicet Saturni h. e. plumbi, & Martis h. e. ferri, prohibent incrementum gibbositatis. Idem faciunt lamina plumbi tenuissima tuberculo alligata. Similiter utilis erit locum affectum quotidie inungere Oleo è strobillis cupressi destillatis, & quotidie imponere Catapl. ex fol. Sabina, aut fol. Oleandri contusis & cum Ol. rutaceo mixtis confectum. Qualis autem sit arbor Oleandri supra in venenatorum tractatione docui.

SECTIO VII. ET VLTIMA

Chirurgicarum Curationum.

DE

MEMBRANARUM RUPTURA.

Membranæ quid, & quotuplices.

Υμενός & χλωρίς, Membrana & Tunica, sunt tegumenta nervæ cujusdam substantia in latum expansa, pro figura partium contentarum, exquisitiss. sensus. Tanta autem est varietas membranarum in corpore, ut nulla fere particula sit qua non membrana sit vestita.

Earum enim alia tegunt & continent partes, alia fulciunt ac sustinent, alia distinguunt & determinant. Item alia earum sunt duplicata, alia simplices, alia tenues, alia crassa. Inter eas autem principales sunt tunica cerebri quas Meninges vocant, tunica oculorum, tunica costas vestientes, tunica thoracem intersepientes & costas succingentes, tunica viscerum Epatis, Pulmonis, Ventriculi, Matricis, Venarum, Arteriarum, Nervorum & Ossium, & postremo Tunica Peritonæi, qua omnium maximè ruptioni est obnoxia. Tunica Peritonæi duplicata est figuram referens marisupii, & completitur in se omnia viscera in-

ferioris ventris. De reliquarum membranarum ruptionibus & vulnerationibus suis in locis abunde diximus, ut Menyngum in Capitis vulneribus, Pleuræ seu costas succingentis membrana in vuln. Thoracis; Sic & de reliquarum membranarum ruptionibus suis in locis disseruimus. Quin & de Peritonæi ruptione qua Græcis κήλη, Latinis Ramex dicitur, quid sit, quæ sint ejus species, & quomodo per remedia & interna & externa curari debeat, supra in Inguinum & Scroti vitiiis curandis disseruimus. Hoc itaque loco satis fuerit de ejusdem membrana ruptione Chirurgica præcissione pauca perstrinxisse.

Ruptura peritonæi quid, & quomodo per præcissionem Chirurgicam curanda?

Κήλη, Ramex vel Hernia, Barbaris Ruptura & Crepatura, cū Bruch. Plures sunt quid? & Hernia species pro materia in scroto aut Inguine illapsa diversitate, ut ἐντεροκήλη. Intestini Ramex, ἐπιπλοκήλη, Omenti Ramex, σπληνικήλη, Carnosa Ramex, & ὑδρωκήλη aquosa hernia: qua materia, si in scrotum devolvantur, simpliciter κήλη; si verò in Inguine tantum prolabantur, βιβαστικήλη dicuntur.

Causæ Herniæ sive rupturæ sunt aut laxatio peritonæi, aut ejusdem rupturæ, quæ ut plurimum sunt ex violento casu, saltu aut grandis ac ponderosi corporis violenta sublatione.

Signa sunt satis manifesta.

Curationem rupturæ per medicationem & Curatio difficilior & sæpe frustraneam esse in superioribus tradidimus, præsertim in inveteratis Herniis. Quæ autem curatio per sectionem industria Chirurgica administratur, & faciliior est, & feliciorē habet successum, modo adsit peritus κηλητοπος, quæ hac methodo perfici solet; observata hac regula: in senilitate & in infantia periculosam esse sectionem Herniæ, præsertim iis, qui sexagesimum annum superarunt; Commodissima vero est in pueris & adolescentibus. Initio itaque in præcidenda Hernia intestina per Clysterem evacuentur, deinde eger supinus per scammum adaptatum extendatur, diductis quoque pedibus

& cru-

& cruribus expansis, manticis idoneis sive
vinculis & pedibus & manibus & pectore
circa axillas probe convinciatur & ligetur,
& pili inguinum abradantur. Postea si com-
modè fieri potest, intestina, aut Omenti pars
prolapsa manibus sursum in locum proprium
rite reponatur. Deinde apprehensis complica-
tisque inter digitos musculus Inguinum per
transversum, eiusque à Peritoneo sursum at-
tractis, cutis & musculus per rectitudinem
sive longitudinem corporis novacula aut cul-
tro rasorio incidatur, ad trium digitorum la-
titudinem vulnere facto: statim enim per
vulnus peritoneum erumpit, quo apprehenso
laxatum peritoneum protrahatur, & ab In-
guine & Scroto intestina separentur, ac sursum
protrudantur. Reliqua autem pars rupta Pe-
ritonai & extra vulnus protracta, & quic-
quid in eo superfluum est, vinculo robusto ex
filis sericis facto intercipiatur & probe con-
stringatur, moxque illa pars peritonai ad u-
nium digiti latitudinem supra subligationem
abscindatur, & nodus deligationis rursum per
vulnus suo loco restituatur, vulnere aperto
relieto, donec Peritoneum colligatum coalescat
& conglutinetur, sili extrinsecus extra vul-

nus relicta, donec modus deligationis corru-
ptus sponte una cum vinculo prolabatur;
Conglutinatur enim facile Peritoneum, pro-
pterea quod multas venas & Arterias spar-
sas in se habeat. Sunt qui post superflui ampu-
tationem peritonai, vulnus instar aliorum
vulnorum consuant, sed subligatio faciliorem
habet successum. Vulnere cutis & musculo-
rum per quod pus profuit, sola mundificatio
& moderata dilatio ne citius coalescat, do-
nec nodus subligationis procidat, duntaxat
debetur, quo prolapsio facillime vuln. sponte
sua persanatur leviori Emplastro vulnerario
adhibito. Vulneraria tamen potiones commo-
dè per totum curationis tempus ad persana-
tionem & vulnorum Peritonai & Musculo-
rum exhiberi possunt. Symptomata qua in
præcisione Ramicis subsequi solent, quibus
sunt arcenda remediis, paulo ante in curatio-
nibus vul: proposuimus; inter quæ vel præ-
cipuum est sanguinis profusio, qua statim est
compescenda, id quod commodissime fieri po-
terit, si Orificium Venarum consueatur &
Vinculo constringatur, & remedia quadam,
inprimis Crocus Martis, inspergantur.

Chimici
in usu
habent
Mumiam
alcohol.
Magister,
Bede-
guar, vel
sarcocoll.
Ol. sal-
gemm.
Ol. tar-
tar. ef-
fent. con-
solid. re-
gal.




INDEX

IN

FRANCISCI JOELIS

OPERUM MEDICORUM

TOMUM QUINTUM ET SEXTUM.

A.		
	Bdomen.	158
	Abscessus vide Tumor.	
	Abstergentia medicamen- ta.	164
	Aceti acidorumque usus in quartanâ an conferat.	28
	Aconitum. 88. Ejus species, vires, sympto- mata. & curatio.	<i>ibid.</i>
	Adder.	135
	Adurentia medicamenta.	164
	Aduſtionis curatio.	275
	Æs quid denotet.	102
	Æs uſtum.	106
	Æris squama.	106
	Æſtus febrilis quomodo curandus.	73
	Aër peſtilens quomodo corrigendus.	46
	Aër principale Peſtis receptaculum.	46
	Aërem contagioſum evitandi media.	46
	Agaricus quid, 95. Quæ boni notæ. <i>ib.</i>	
	Ejus vires, noxæ, Curatio.	<i>ib.</i>
	Αἰματική Medicamenta.	164
	Alexipharmaca.	60 &c.
	Alexiteria in peſte ſtatim in principio exhi- benda, niſi venæſ. præmittenda.	62
	Alexiteriorum Catalogus.	83
	Alimentum quid.	81
	Alumen 123. ejus ſpecies, uſus, noxa, cura- tio.	<i>ibid.</i>
	Alſtrūn.	97
	Alter ſchaade.	154
	Album Græcum quid, & quas vires habeat.	142
	Alvi obſtructio in febris ut curanda. flu- xus ut curandus.	78
	Ambuſtionis curatio.	275
	Amorita quid, quidque mali inferat.	136
	Anacardus quid, 93. Ejus uſus, quæ in- ferat ſymptom. & quomodo hæc curan- da.	<i>ibid.</i>
	Αναισθητικός quid.	227
	Angina, ejusque curatio.	196
	Anguis vide Serpens.	
	Ani tumor.	197
	Animi deliquium in febris ut curandum.	55
	Animi affectus boni malivè quantum in Peſte efficere valeant.	56
	Anodyna medicamenta.	162
	Anticipationis & poſtpoſitionis in febris cauſa.	6
	Αντιπνέον, ejusque cauſæ, ſigna, curatio.	176
	Anthrax. 69. ut curandus. <i>ibid.</i>	177
	Antimonium quid, 116. quæ ex eo parentur remedia, ejus uſus noxius, 119. Cura- tio.	120
	Antimonii oleum. 119. Ejus præpara- tio, uſus, &c.	<i>ibid.</i>
	Antimonii tinctura, 118. Ejus præpara- tio, uſus.	<i>ibid.</i>
	Antimonii vinum.	118
	Antimonii vitrum. 117. Ejus præpara- tio vera, doſis, uſus.	118
	Antidota in Peſte.	49. & 60
	Ανθραξ.	133
	Ανθραξ.	160
	Apes quid 133. earum commoda, <i>ibid.</i>	
	quæ mala inferant, & quomodo hæc curanda.	134
	Απορροήσεις.	160
	Αποφύματα, vide Tumor.	
	Αποσπασμα.	227
	Aphronitron.	124
	Apium	

I N D E X.

Apium risus. 91
Appetitus prostratus in febribus ut corrigendus. 77
Aqua anguillarum. 39. cancrorum fluviat. *ibid.* Limacum. *ibid.*
Aqua fortis. 112. Ejus præparatio, 113. usus, noxæ, & curatio. *ibid.*
Aquæ usus conveniens. 54
Aquosus humor. 135
Araneus, 132. Species, usus, vires, noxa curatio. *ibid.* 133
Argentum quid, 101. quotuplex, *ibid.* Ejus usus, 102
Argentum vivum, 103. Duplex est nativum & factitium. *ibid.* Ejus virtutes. *ibid.* Quæ inferat corpori symptomata; & quomodo curanda. 104
Argentum vivum sublimatum; vide Mercurius Sublimatus.
Arma è vulnere ut extrahenda. 241
Arma venenata quæ inferant mala, & ut curanda. 129
Ardor febrilis ut curandus. 73
Arsenicum. 122. Ejus species, noxæ, curatio. 123
Arteriæ earumque historia & usus. 159
Arteriæ aortæ vulnera. 269
Arteria Aspera, ejusque historia & usus. 156
Arteriæ vulnera. 254
Αρτηρια. 101
Arthanita. vide Cyclamen.
Articulus quid, ejusque usus. 160
Articulorum vulnera. 254
Artuum vulnera. 267
Αρτηρια. 125
Asperæ arteriæ vulnera. 229. 266
Aspis quid, quidque mali inferat. 136
Astra an & quomodo pestem producant. 43
Attractiva medicamenta. 167
Ausheber. 260
Aurichalcum. 102. Quæ mala corpori inferat, & quomodo ea curanda. *ibid.*
Auripigmentum, vide arsenicum.
Aurum tumor. 195. Vulnera. 264
Aurum quid. 101. Quotuplex. *ib.* Cur metallorum præcipuum. *ibid.* Cum

argento vivo sympathiam habet. *ibid.*
 Ejus virtutes. *ibid.*
Aurum per accidens venenatum. 105
Aurum potabile quid; & quæ ejus virtutes. 101
Aurum potabile Paracelsistarum. 40

B.

Basiliscus quid, quid mali corpori inferat, & quale ipsi antidotum. 141
Bauras. 124
Bdellæ. 140
Beinbruch. 154. 281
Befoar lapidis vires. 148
Billeren. 5. **Billerfaamen.** 96
Bleyerg. 103
Bleyfarb. 102
Bleygelb. 110
Bolestum, vide fungus.
Bombyx. 132
Borax. 124. Ejus species. *ibid.* Præparatio, usus, noxa, curatio. *ibid.* 125
Borax. 124
Branfraut. 92
Βρογχοειδής, vide hernia gutturis.
Bromsen. 133
Bruch der vesse. 154
Bubo quid, ejus genera, & curatio. 176
Bubo pestilens. 65. ut curandus. *ib.*
Bubones vel anthraces in peste non erumpentes cur eam periculosiorem denotent. 45
Bubones puerorum unde, & ubi excidentur. 8
Bufones quid. 139. Earum usus. *ib.* Quæ mala inferant, & ut curanda. 139. 140
Buprestes quid, ejusvè species, quæ mala inferat, & quo modo ea curanda. 131

C.

Calor in viventibus duplex. 1. **Æthereus** quis. 1. an ab elementari frigido exstingui possit. *ibid.* innatus, congenitus & seminalis cur dicatur. *ib.*
Elementaris quid. *ibid.* Cur naturalis, vitalis, & influens dicatur. *ibid.* Ejus subjectum. 2
Calor

I N D E X.

Calor qualis vivencia producat ex semine, vegetet & conservet. 1. qualis vivificet & nutriat. <i>ibid.</i>	Cerebellum. 156
Calvæ vulnera. 255	Cerba Arabum quid. 91
Dissectio. 255	Cerussa. 109. ejus usus, noxæ & curatio.
Incisio. 255	Cervi usus in medicinâ. 148
Rima. 255	Χάλασιν. 120
Scissura. 256	Χάλας. 102
Comminutio. 256	Chalcitis. 120
Contusio. 256	Chalybs. vide Ferrum.
Depressio. 256	Χαμελαῖα. vide Mesereon.
Calx quid. 125. ejus vires & usus. <i>ib.</i> quæ mala corpori inferat. <i>ibid.</i> & quo modo curanda. 126	Χονδροί. 160
Campanarum frequentior pulsus in pestes quid mali inducat. 56	Chymix encomium. 100
Cancer quid, ejus causæ, signa, curatio. 191	Chymica medicamenta cum venenatis convertuntur. 62
Cancer exulceratus. 223. ejus causæ, signa, curatio. <i>ibid.</i>	Christwurß. 89
Capitis dolor in febribus ut curandus. 73	Χρύσος. 101
Capitis vulnera. 255	Χρυσόκελλα. 125
Carbunculus quid, ejus causæ, signa, prognosis, cura. 177	Chirurgia quid. 154
Carbunculus. 69. ut curandus. <i>ib.</i>	Chirurgia ex libris perfectè disci non potest. 153. quam latè pateat. <i>ib.</i>
Carbunculi sectio in Peste est periculosa.	Chirurgiæ necessitas. 153
Carbunculi sanabilis aut lethalis proba. 69	Chirurgiæ qui morbi subiecti. 154
Canis rabiosus. 142. quæ mala inferat, & ut curanda. 143	Chirurgus quibus medicamentis debeat esse instructus. 161. &c. quibus instrumentis. 167
Cantharides quid. 130. eorum unus, noxa, & curatio. 131	Cicuta quid. 96. quæ symptomata inducat, & ut hæc curanda. <i>ibid.</i>
Κάμπαι. 191	Cinabaris, sive cinabrium. 113. ejus species, præparatio, usus, noxæ, curatio. <i>ib.</i>
Κάρκινος. 191	Cicatrizantia medicamenta. 166
Καρκινώμα. 191	Circuituum febriliū causæ. 6
Καρχα. 156	Cocognidium. vide Mesereon.
Caro, ejusque diversitas & usus. 159	Colli vulnera. 265
Carnosarum partium vulnera. 250	Κολλητικὰ medicamenta. 165
Carnem generantia medicamenta. 166	Collisio. 227
Καπίδες. 102	Colocynthis. 90. ejus effecta, curatio. <i>ib.</i>
Cartilaginee, earumque historia & usus. 160	Coluber quid. 136. quæ mala inferat, & ut curantur. 137
Canum usus in medicina. 142	Color lasurinus. 105
Κάταγμα. 154	Confortantia medicamenta. 166
Κάταγμα τῶν ὀστέων. 154	Confortantia in peste. 63
Cataputia. 91. ejus species. curatio.	Consuetudo tutius usurpanda. 53
Catus. vide Felis.	Contagium quid. 41. 42. quotuplex. 42
Causus. vide Febris.	Continui solutio quid, quorū modis accidat, quibus instrumentis, & quæ continuitatis solutæ species. 226
Καυσχά. 264	Cor, ejusque historia & usus. 156
Cerebrum, ejusque historia & usus. 156	Cordis vulnera. 269. 229
Cerebri vulnera. 262. 229	Coriandrum. 97. ejus vires, & incommoda

I N D E X.

modi, quæ ratione hæc emendanda.		Eysern.	106
Cornu cervi vires.	148	Eysen blumen.	108
Corporum qualis debeat esse dispositio ad pestem.	43	Eysenrust.	108
Corroborantia medicamenta.	166	Elect. angel. Joëlis. 50. de Scord. Joëlis. 61	
Corrumpentia medicamenta.	164	Elementa peripatetica. 200. chymica. ib.	
Cervus. 148. quas partes venenatas habeat, adeoque quæ mala inferat, & quibus ea mediis curanda.	ibid.	E'λαφος.	148
Crabrones quid. 133. quæ mala inferant, & ut curanda.	134	E'ληος.	154. 200
Cranii vulnera. vide Calva.		Ελκκη medicamenta.	263
Crustam inducentia medicamenta.	164	Εμωδασκη medicamenta.	262
Crocus Martis. 108. ejus præparatio. 109		Emplastra vulneraria.	237
usuf.	ibid.	Emplastrum tripharmacum.	106
Crocus Veneris. 106. ut conficiatur. ibid.		Emollientia medicamenta.	263
ejus usuf, noxæ, & curatio.		E'γχιφαλλο.	156
Culter rasorius quid.	167	Enteroccele.	198
Κυνάγχη.	196	Epatis vulnera.	272. 229
Cuprum quid. 102. an in aurum vel argentum mutari possit. ib. quæ corpori mala inferat, & quomodo hæc curanda.	ibid.	Ephemera. vide Febris.	
Κύσος χοληδοχος.	158	Epiala. vide Febris.	
Curaciones chirurgicæ per quas operationes perficiantur.	161	Epiplocele.	298
Curatio liberativa venenatæ infectionis qua methodo peragenda.	86	Επισπασκη medicamenta.	263
Cutem rumpentia medicamenta.	164	E'πυλωπηκ medicamenta.	268
Cyclamen. 90. ejus usuf & noxæ, cum curatione.	91	Erp.	99
		Etentinfster.	95
D.		Eruca quid, earumq; species. 131. usuf, quæ mala inferant, & ut ea curanda.	132
D Anien swammen.	95	E'ρσιπικος. 180. ejus causæ. ibid. signa, prognosif, subiectum, curatio.	181
Delirium febricitantium ut curand.	75	Esula. 88. ejus species, vires & symptomata, curatio.	ibid.
Detergentia medicamenta.	164	E'ζαρωπηκ medicamenta.	164
Diagridium.	91	Etter.	201
Διαπήδησις.	227	Etterich sweer.	200
Diaphragma.	157	Euphorbium. 92. ejus usuf, quæ inferat symptomata, hæc ut curanda.	
Diaphragmatis vulnera.	229. 269	E'ζάρβουμ.	154
Diaphoretica medicamenta.	163	Excoriatio quid.	227
Diaria. vide Febris.		Exitura. vide Tumor.	
Dipsas quid, quidque mali inferat.	136	Excrefcenciæ pituitosæ.	186
Discutientia medicamenta.	163	Exuvia serpentum. 135. earum usuf. ib.	
Divulſio.	227	F.	
Dolorem sedantia medicamenta.	162	F Aucium tumor.	196
Dodts glied.	179	Febris definitio.	1
Durre.	3	Differentiæ. 2. quæ subjecta.	ibid.
E ybenbaum.	94	Febris ex quali calore excitetur.	1. 2
		Febrilium circuituum causæ.	6
		In Febrif. qui aphorifmi maximè observ.	7
		Febres quâ methodo curandæ.	7
		Febris ardens.	3. 29
		Continens.	3
		Pp	Febris

I N D E X.

Febris continua.	2	Complicatae. five composita.	4
Causus.	3. 19	Biliofa.	18
Diaria. 2. ejus caufa, &c.	8	Acres.	5
Epiala. 3. ejus caufa, &c.	15	Arida.	5
Ephamera. 2. in quam febrem mu- tet.	ibid. 8	Vaporoſa.	5
Hectica. 3. cur habitualis dicatur.	ib.	Mites.	5
Hectica univerſalis & partialis.	4	Fumoſa.	5
Haemitraxus.	3. 24	Febrilia ſymptomata quæ, & quomodo cu- randa.	72. &c.
Humoralis.	2	Fel vitri.	12. 124
Lipyria, ejusque caufa, &c.	17	Felis. 146. quæ inferat ſymptomata, & ut curanda.	146. 147
Madida.	3. 5	Felium ſpecies. 146. Libido.	ibid.
Marafmus.	3	Femorum vulnera.	275
Putrida. 2. ejus ſpecies quatuor.	2	Ferrum. 107. ejus ſpecies, ſquama. ib. excrementum.	ibid.
Quartana, continua & intermittens.	3. 27	Ferrum crudum aperit magis quam calcina- tum.	107
Quintana, ſextana, &c.	3	Ferri ſſos. 108. Rubigo.	ibid.
Quotidiana continua, & intermittens.	3. 12	Ferrugo.	108
Peftilentialis.	41	Fibulum & fibulatio quid.	246
Peftilens.	4	Fiftula quid, ejus differentia, caufa, ſi- gna. 217. curatio.	218
Spirituofa.	2. 8	Flammula. vide Ranunculus.	
Semitertiana.	3. 24	Gleſten.	108. 182
Synochus putrida. 3. ejus caufa, &c.	10	Glederbaum.	94
Synochus non putrida. 9. continua & interpolata.	10	Gledermaus.	149
Tertiana duplex.	24	Gloſſamen.	96
Tertiana pura. 5. exquiſita intermit- tens.	4. 22	Flos ferri. vide Ferrugo nitri.	124
Τυφώδης.	3	Sulphuris. vide Sulphur.	
Febres ὁμότονοι. five ejusdem tenoris.	2	Fractura quid. 154. 227. 281. ejus differentia.	ibid.
Επιμμετικοί. five increſcentes.	2	Fractura cranii. vide Calva.	
Παταμμετικοί. five decreſcentes.	2	Fractura ſymptomata ut curanda, nempe dolor, tumor, inflammatio, pruritus, exul- ceratio, gangræna, &c.	287
Intermittentes quæ.	2	Fraxinus arbor ſerpentifuga.	136
Continuæ quæ.	2	Frigus, ſeu perfrigeratio quid.	5
Sanguinea quæ.	3. 9. 10	Frigus febrile ut curandum.	73
Αμφοτεροει.	3	Grifche wunde.	154
Pituitofa.	3. 10	Groſche.	138
Complicata.	3	Fungi. 99. quæ mala inferant, & ut hæc curanda.	ibid.
Melancholica.	3		
Alia morbi, alia ſymptomata.	4		
Symptomatica.	4		
Typica.	4		
Erratica.	4		
Simplices.	4		
Pura.	4		

G.

G Alena. 102
 Galen. 146
 Galen.

INDEX.

<i>Γαγγραι.</i>	186	Flatulenta, ejusque cura.	198
Gangræna quid, ejus causæ, signa, prognos, curatio.	179	Intestinalis, ejusque cura.	198
Gebrandt Kupffer.	106	Omentalis, ejusque cura.	198
Gedngen golt.	101	gutturis. 187. ejus causæ, signa, curatio. &c.	<i>ibid.</i>
Gedngen silber.	102	Herpes, ejusque causa, & curatio.	182
Gebirn.	156	Hersgröblein.	157
Glasgal.	126	Hirudo quid. 140. earum in medicina usus; quæ mala corpori adferant, & hæc ut curanda.	<i>ibid.</i> 141
Glist.	160	Hispanische vliegen.	131
Glistwasser.	155. 161. 201	Hitziges blutsweer.	167
Glieder bende.	160	Holdersbaum.	94
Gewechse.	186	Homo. 150. ejus usus in medicina.	<i>ibid.</i>
Glis. 149. quæ mala inferat, & ut curanda.	<i>ibid.</i>	quæ mala inferat, & ut curanda.	151
Glutinantia medicamenta.	165	Homines multis miseriis obnoxii.	81
Golterg.	99	Horror, seu Horripilatio quid.	5
Goltegis.	99	Hummelen.	133
Giesstein.	99	Hydrargyros.	103
Golzwurme.	131	Hydrocele.	198
Granum Gnidium. vide Mesereon.		Hydrophobia quale malum, 143. ut curandum.	143. &c.
Gulæ vulnera.	266. 299	Υπνωτικά medicamenta.	162
Gyps.	123	Υμεν.	159
Gypsum, ejusque usus, noxa, & curatio.	123	Hyoscyamus quid. 96. ejus vires, quæ symptomata inferat, & ut hæc curanda.	<i>ibid.</i>
H.		Hypercatharsis ut sistenda.	92
Hæmitæus. vide Febris.		Hyperfarcôsis.	210
Hæmorrhagia in febris ut sistenda.	75	I.	
Hagedros.	176	Icterus in febris ut curandus.	77
Hammerflagh.	106	Ι ^χ ερ.	201
Hanensis.	92	Iecur, ejusque historia & usus.	156
Haarsenen.	260	Ignis quantum valeat ad aërem pestilentem corrigendum.	46
Hastpulvers.	235	Ignis sacer, vide Erysipelas.	
Hæctica. vide Febris.		Ignis Sancti Antonii, vide Gangræna.	
Hæctica febris tempora tria.	34	Immen.	133
Hæctica senilis.	40	Incarnativa medicamenta.	166
Hæctici cur febre se laborare non sentiant.	34	Infectis nullæ dandæ induciæ.	57
Heilspulvers.	235	Infectos curandi methodus. 58. observari nequit.	<i>ibid.</i>
Heilige dinck.	180	Inflatio.	292
Helleborus. 89. ejus species, symptom. curatio.	<i>ibid.</i> 90	Inflammatiō. vide Phlegmone.	
Hepar.	156	Instrumenta, quibus debet esse instructus Chirurgus.	167
Herba Paris. vide Aconitum.		<i>Pp</i> 2 Instru-	
Herba pedicularis. vide Staphisagria.			
Hernia carnosæ, ejusque cura.	298		
Aquosæ, ejusque cura.	198		

I N D E X.

Instrumenta quibus chirurgus indiget ad fracturam.	13. 28
Instrumenta vulneraria.	231
Intestina eorumque historia & usus.	157
Intestinorum vulnera.	229. 270
Juglans. 94. ejus vires. <i>ibid.</i> cur inter venenata referatur.	95
Iuniperi virtus.	52
Iupiter chymicis quid.	102

K.

K Attemor.	279
Kage.	146
Kellersfalt.	88
Keser.	131
Kinster.	95
Klapholz.	176
Koriander.	97
Knispange.	260
Knolster.	131
Kranseugleyn.	94
Kropf.	186. 187
Kroten.	139
Krotenstein.	139
Kupffer erz.	102
Kupffer slag.	106

L.

L Achrymæ cervi quid sint.	84
Lactis usus in Hæctica.	36
Lapis armenius. 127. ut à lapide lazuli differat. <i>ibid.</i> ejus usus, &c.	148
Lapidis Besoar vires.	84
Lapis Besoar quid veteribus.	127. ejus optimi nota, usus, vires, noxa, curatio. <i>ibid.</i>
Lapis bufonum.	139
Lapis magnes. 127. ejus ortus, usus. <i>ibid.</i>	128
noxa, curatio.	138
Lapis in capite colubri.	100. 101
Lapides venenati qui.	247
Laqueatio quid.	105
Lasürblauw.	127
Lasürsteyn.	105. ut præparetur. <i>ib.</i>
Lasurinus color.	ejus noxæ. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i>
Lathyrus, vide catapucia.	

Laureola quid. 89. ejus symptomata & curatio.	182
Laurus humilis, vide Laureola.	158
Laurus rosas ferens, vide Oleander.	229. 273
Licinium quid.	160
Lichenes.	251
Lien, ejusque historia & usus.	167
Lienis vulnera.	74
Ligamenta, eorumque historia & usus.	79
Ligamentorum vulnera.	41
Linamenta quid.	147
Lingux ariditas, &c. in Febribus ut curanda.	156
Lipothymia febrilis ut curanda.	157
Liquor quid.	
Luna chymicorum, vide Luna.	
Λύκος.	
Lustrohr.	
Lunge.	
Lupus. 147. rabiosus quæ mala inferat. <i>ib.</i>	
ut curanda.	
Lupi usus in medicina.	
Lupus quale ulcus.	
Luxatio quid. 289. ejus differ. <i>ibid.</i> signa, causa, prognosis.	
Lypiria, vide Febris.	
Lythargyrium. 105. ejus species, origo, usus. <i>ibid.</i> noxæ, curatio.	

M.

M Aan oder Maansaet.	98
Magneet.	127
Μαλακία medicamenta.	163
Mammæarum tumores.	196
Mandragora. 97. Impostura ex hac radice. <i>ibid.</i> ejus noxæ, quove medio hæ succurrendum.	98
Μαράσμος, vide Febris.	
Marcasita.	99
Marcor senilis.	40
Mars chymicis quid denoret.	102
Μαριένεψ.	123
Matrix.	158
Maturantia medicamenta.	163
Μαυλwort.	149
Μήτρα.	158

Meco-

INDEX.

Meconium. vide Opium.		Incarnativa.	166
Medicamenta quibus debet esse instructus chirurgus.	161. &c.	Corroborantia.	166
Medicamentum quid.	81	Confortantia.	166
Medicamenta vulneraria.	233	Cicatrifiantia.	166
Repellentia.	161	Ε'πυλοπικα.	166
Stupefacientia.	262	Medulla spinalis, ejusque usus.	156
Somnifera.	162	Μελιδευ.	133
Soporifera.	162	Melanacardium quid.	93
Anodyna.	162	Membranæ earumque historia & usus.	159
Dolorem sedantia.	162	Meninges cerebri.	156
Hypnotica.	162	Meningum vulnera.	229. 261
Emplastica.	162	Menyngophylax.	260
Narcotica.	162	Mening.	110
Obturantia.	162	Mercurius chymicis quid.	102
Α'ποκρητικά.	161	Mercurius præcipitatus. 111. ejus præparatio, usus, noxæ, medela.	
Attractiva.	163	Mercurius sublimatus. 110. ejus præparatio, usus. 111. mala quæ corpori infert, & quomodo hæc curandâ.	ibid.
Discutientia.	163	Mesenterii vulnera.	271
Διαφορητικά.	163	Mesercon Arabum. 88. ejus symptomata, & curatio.	ibid.
Μυλακτικά.	163	Messineæ.	102
Resolventia.	163	Metalla quid sint. 99. quot. ibid. quibus nominibus apud chymicos veniant. ib. quæ ex iis fiant venenata.	103
Emollientia.	163	Metalla & mineralia ut differant.	114
Mollificantia.	163	Mineralia quid sint. 100. Eorum species primariae.	ibid.
Suppurantia.	163	Mineralia & metalla ut differant.	114
Maturantia.	163	Minium. 110. ut paratur, ejus vires, noxæ, emendatio. ibid. flavum ut paratur.	ibid.
Πωπικά.	167	Miseria humana.	81
Εκπνικα.	163	Mithridatium plura continet alimenta quam medicamenta, adeoque haud magnarum virium.	84
Επισπαστικά.	163	Μυογάλη.	149
Cutem rumpentia.	164	Mollificantia medicamenta.	163
Καυσικά.	264	Monitischappen.	88
Adurentia.	164	Morbi contagiosi.	42
Ε'σχερωτικά.	164	Morbi quinam chirurgiæ subjecti.	154
Crustam inducentia.	164	Morbi venenati cur inter universales morbos numerentur.	81
Σεωτικά.	164	Morsuli antipest. Joëlis.	51
Corrumpentia.	164	Mortificatio partis.	171
Detergentia.	164	Mundificantia medicamenta.	164
Mundificantia.	164		
Abstergentia.	164		
Ρυθπικά.	164		
Σημωτικά.	164		
Sanguinis fluxum inhibentia.	164		
Glutinantia.	165		
Συμφυτικά.	195		
Κολλήτικά.	165		
Carnem generantia.	166		
Σαρκωτικά.	166		

I N D E X.

Mumia. 150. ejus usus.	<i>ibid.</i>
Musculus; ejusque historia & usus.	159
<i>Mūs.</i>	159
<i>Mūs ἀράχνης.</i>	149
Mus araneus. vide Vespertilio.	
Mus volans. vide Vespertilio.	
Mustela.	149

N.

N Apellus. vide Aconitum.	
Narcotica medicamenta.	162
Narium tumores.	195
<i>Νάρκη.</i>	141
<i>Νέκρωσις.</i> vide Gangræna.	
Nervi, eorumque historia, & usus.	158
Nervorum vulnera.	251
<i>Nieswurzel.</i>	89
Nitrum. 124. ejus usus, noxa, curatio. <i>ib.</i>	
flos sive Spuma.	<i>ibid.</i>
Nome quale ulcus.	221
Novacula quid.	167
Nux regia. vide Juglans.	
Nux vomica quid. 93. dupliciter exitiosa. <i>ibid.</i> quæ mala producat, & ut hæc curanda.	94

O.

O Bturantia remedia.	262
Oculorum vulnera.	263
Oedema aquosum, ejusque subjectum, causæ, signa, prognosis, cura.	185
<i>Οἰδημα.</i> 183. ejus causæ, signa, prognosis, curatio.	<i>ibid.</i>
<i>Οισφάγος.</i>	157
Oleander. 94. quæ mala producat, & ut hæc curanda.	95
Olei vitrioli vires.	55
Oleum antimonii. vide Antimon.	
Oleum sulphuris. vide Sulphur.	
Olea vulneraria.	236
Omenti vulnera.	270
Operationes chirurgicæ quot.	161
Operimendæ.	122
<i>Οἶφις.</i>	134
Opium quid. 98. ut paratur; <i>ibid.</i> ejus vires, & usus; <i>ibid.</i> quæ producat symptomata, & ut hæc sint emendanda. <i>ib.</i>	

<i>Ορχήλιον.</i>	102
<i>Οἷον.</i>	157
Oscitatio quid.	5
Ossa, eorumque historia & usus.	160
Ossagra quale instrumentum.	167
Ossium vulnera.	251
<i>Οὔρα.</i>	160
Ovum aureum exploditur.	62

P.

P Andiculatio quid.	5
Panis porcinus, vide cyclamen.	
Papaver quid. 98. ejus species. <i>ib.</i> usus, noxa.	
Papiliones quid, quæ mala inferant, & ut hæc curanda.	132
Paracelsi scripta curavellenda.	117
<i>Παρῶσις.</i> 195. ejus curatio.	<i>ibid.</i>
Paroxysmus febrilis quid.	5
Partes corporis principales, postprincipales, similes.	155
Partium quarum vulnera sint lethalia	156. &c.
Pastinaca marina quid. 142. ejus ex punctura quæ symptomata oriantur, & ut hæc curanda.	<i>ibid.</i>
Periostei vulnera.	255
Peritonæum, ejusque historia & usus.	158
Pestis.	41
Pestis causæ.	43
Pestis remedia tria, cito, longè, tardè, ce- de, recede, redi.	46
Pestis quot modis communicari corpori possit.	42
Peste cur non omnia corpora corripiantur.	43
In Peste an vena secanda. 58. an pur- gandum.	58
Pesti adversantia qualia & quando usurpan- da.	49. &c.
Peste infectos adituri quibus remediis se munire debeant.	52
Pestis symptomata quæ, & qua ratione cu- randa.	65
Pestilentz blatter.	69. 176
Pestilentz geswel.	176
Pfifferlinge.	29

Pfri-

I N D E X.

Ψιττίσκη.	99	Pus quid, & quale optimum.	201
Φαίσις.	159	Putrefactionis causa.	215
Phagedæna quale ulcus. 221	à Nomen ut differat.	Pyrites.	99
	<i>ibid.</i>	Πυρετός.	1
Phalangia.	132	Πυρετός λοιμώδης.	41
Φλεβοτόμον.	167		
Φλεγμονή qualis tumor. 169. 172.	ejus causa, signa, curatio. <i>ibid.</i> symptomata, & quomodo ea curanda. 175. species. 172. 175	Q	
Pituitæ quot species.	11	Quartana. vide Febris.	131
Pituitosæ excrementi.	186	Quæctilber.	103
Πληγή.	154	Quinta, essentia antimoni.	118
Plumaceolum quid.	168	Quotidiana. vide Febris.	
Plumbago.	102		
Plumbum album.	102	R.	
Plumbum nigrum. 103.	ejus vires. <i>ib.</i>	R Abies canum quas causas habeat. 142	
Plumbum ustum 109.	ut paratur, ejus usus, noxæ & curatio.	ut cognoscenda. 143.	curanda. <i>ibid.</i>
Πνεύμονες.	157	Ramex. vide Hernia.	
Poderis.	102	Rana, ejusque species. 138.	utilitas. 139.
Poggensteyn.	139		140
Poggenstole.	99	Ranunculus. 92.	quæ inferat symptom. eorum curatio.
Πόλυνος, ejusque curatio.	195	Ratæ.	149
Portiones vulnerariæ.	234	Recidiva febris ut curanda.	80
Præcautio venenatæ infectionis quibus in rebus consistat.	84	Recrementum ferri.	108
Præcordium.	157	Realgar.	122
Principia Chymica tria, vel quatuor.	200	Regulus. vide Basiliscus.	
Prophylactica curatio quid.	48. 84	Remedia chirurgica, eorumque vires.	161
Psyllium quid. 96.	ejus, & maximè mucilaginis vires. <i>ibid.</i> quæ symptomata assumptum inferat, & ut hæc curanda.	Renes, eorumque historia & usus.	158
	97	Renum vulnera.	270. 279
Ψυλθεντραut.	96	Repellentia medicamenta.	261.
Pudendi vulnera.	274	Resolventia medicamenta.	163
Tumores.	199	Respirationis difficultas in febribus ut removenda.	76
Pulmones, eorumque historia & usus.	157	Rhycinus. vide Cataputia.	
Pulmonum vulnera.	269. 229. 231.	Rigor quid.	5
Pulvis aureus Joëlis.	61	Rigor febrilis quomodo curandus.	73
Pulveres vulnerarii.	234	Roche.	142
Pulverleyen.	168	Roofe.	180
Punctio quid.	227	Rottentraut.	110. 122.
Purgantia sine consilio Medici non usurpanda.	55	Rubigo ferri. vide Ferrugo.	
Purgationes an, & quales in Peste instituenda.	58	Rupen.	131
		Ruptura quid.	154. 227
		Ρυπλην medicamenta.	164.
		Ρύπης.	201
		S. Sabi-	

I N D E X.

S.		Sideratio. vide Sphacelus.	
S abinus Poëta veneno interiit.	85	Sigellsteyn.	1127
Salivæ canis rabidi virulentia.	145	Signa præsentia veneni. 88. assumpti vel	
Sal ammoniacum. 124. ejus usus. <i>ib.</i> quæ		concepti veneni.	<i>ibid.</i>
mala corpori inferat, & qua ratione hæc		Naturæ veneni.	<i>ibid.</i>
curanda.	<i>ibid.</i>	Silbererg.	102
Sal Hammoniacum. vide Sal ammoniacum.		Silberglieb.	105
Salegnar.	124	Similares corporis partes.	155
Sal nitri, & petræ.	124	Sitis in febribus ut mitiganda,	74
Sambucus. 94. ejus vires. 95. cur in-		Slange.	134
ter venenata referatur.	<i>ibid.</i>	Slangenbaut.	134
Sambuci spiritus quas vires habeat.	95	Slunck.	157
Sandaraca. vide Arsenicum.		Sol chemicorum, vide Aurum.	
Sanguis quot partes habeat.	9	Solutio continui. vide Continui solutio.	
Sanguinis fluxum inhibentia.	164	Somnus longior in febribus ut curandus. 74	
Sanguisuga. vide Hirudo.	201	Somnus inter sudandum in peste noxius. 63	
Sanies quid.	201	Somnifera medicamenta.	162
<i>Sedg.</i>	159	Soporifera medicamenta.	162
Sarcocele.	198	Sordes quid, earum causæ, &c.	201
<i>Σαρκοκελ</i> medicamenta.	166	Sorex.	149
Saturnus chymicis quid denotet.	102	Spansgum.	106
Saumbroot.	91	Speculum oris quid.	167
Scalpellum.	167	Sphacelus quid, ejus causæ, signa, prognosis,	
Scammonium. 91. ejus optimi notæ. <i>ib.</i>		curatio.	179
noxæ, curatio.	92	Spiesglas.	116
Scarabæus.	130	<i>Σφίγξ.</i>	133
Scheidwasser.	112	Spinalis medulla.	155
Schiffsteyn.	102	Spinalis medullæ vulnera.	267
Schiltpogge.	139	Spinne.	132
Schislunck.	96	Splen.	158
Scoria ferri.	108	Sprinkbner.	91
Schlafen.	108	Spuma argenti. vide Lithargyr.	
Schaffonic.	89	Spuma nitri.	124
Scorpio quid. 138. ejus usus, noxa, cu-		Squama æris. 106. ejus usus.	<i>ibid.</i>
ratio.		Squamma ferri. 107. ejus præparatio. <i>ib.</i>	
Scrophulæ, earumque causæ, signa, cura-		quæ mala inferat, & ut hæc curanda.	
tio.	187	Staal.	106
Scyrrhus quid. 190. ejus causæ, signa,		Staphysagria quid. 93. ejus usus, noxa	
prognosis, curatio.	<i>ibid.</i>	& curatio.	
Schnube.	260	Stannum quid. 102. ejus species. <i>ibid.</i>	
Seidenwurm.	131	ejus vires.	102
<i>Σειδων</i> medicamenta.	164	Stibium. vide Antimonium.	
Septum transversum.	157	Stichpleister.	237
Serpens. 124. quot modis homini no-		Stinckender etter.	201
xius. <i>ibid.</i> ejus species.	135	Strumæ quid. 187. earum species, cau-	
Serpigo.	182	sæ, signa, prognosis, & curatio.	<i>ib.</i>
<i>Σιδίγες.</i>	103	Stupefacientia medicamenta.	162

Στυπτική

I N D E X.

Συνήθεια. 123
 Sudor nimius in febris ut curandus. 70
 Sulphur quid. 114. ejus species, nativum sive vivum, coctum, nigrum sive caballinum, vires, usus, noxæ, curatio. 115
 Sulphuris aqua. 115. ejus præparatio, usus, vires, dosis. *ibid.*
 Sulphuris flores. 115. eorum præparatio. *ib.* usus, vires, dosis, ut curatio. *ib.*
 Sulphuris oleum. 115. ejus præparatio varia, vires, usus, noxæ, curatio. 116
 Suppurantia medicamenta. 163
Swindsucht. 3
Swulst. 154
 Symptomata pestis. 65
 Febrium. 72
 Συμψηκτα medicamenta. 165
 Σύνδομοι. 160
 Synochus. vide Febris.

T.

TAlpa. 149
 Tarantula quid. 133. quæ mala corpori inferat, & quomodo ea curanda. 133
 Taxus quid. 94. quam venenata, quæ ratione curatio peragenda.
 Tendines eorumque historia & usus. 160
 Tendinum vulnera. 251
 Τένοντες. 160
 Terebra. 169
 Tertiana. vide Febris.
 Testes, eorumque historia & usus. 156
 Testium tumores. 297
 Testiculorum vulnera. 274
Tenselsmitch.
 Theriacæ cur ad præcautionem pestis non debeamus uti. 51
 Theriaca optima qualis. 60
 Theriaca Saxonica. 52
 Thoracis vulnera. 168. 229
 Tibiarum vulnera. 275
 Tithymalus, vide Esula.
 Toller hund. 242
 Torpedo quis piscis, ejus usus medicus. 141
 quæ mala inferat, & ut hæc curanda. 142

Τραχεία νεφελία. 156
Τραύμα. 154
Τρυγών παλασία. 142
 Tumor quid. 168. 154. ejus genera & species. 169
 Tumor sanguineus. vide Phlegmone.
 Piuitosus. vide Oedema.
 Aquosus vide oedema.
 Aquosum iliosus. vide Erysipelas.
 Melancholicus. vide Scyrrhus.
 Cancerosus. 191
 Durus. 189
 Flatusus. 192. ejus causæ &c. *ibid.*
 Tumor narium. 195
 Aurium. 195
 Faucium. 196
 Mammæ. 296
 Ani. 297
 Testiculorum. 197
 Uteri. 199
 Pudendi. 199
 Tumores inguinum. 65
 Pestilentes. 65
 Venenati. 194
 Tumor pedum in febris ut curandus. 80
 Tumorum causæ generales, signa & tempora. 170. Curatio. 171
 Turbith, ejus vires, curatio. 91
 Turbith minerale. 111. ejus præparatio. 112. usus, noxæ, curatio. *ibid.*
 Turpethum, vide turbith.

V.

Valerius Cordus Romæ veneno interit. 85
 Vapores venenati in montium cavernis & speculis, quæ inferant mala, & ut hæc curanda. 128
 Venæ earumque historia & usus. 159
 Venæ cavæ vulnera. 269
 Venarum vulnera. 254
 Venenum quid. 87. 82
 Qua ratione à medicamento, & alimento differat. *ibid.*
 Cur Græcis pharmacum dicatur. 82
 Ut ex vulneribus eliciendum. 129
 Quot modis noceat. 82

I N D E X.

- Venenata quænam ex metallis per præparationem fiant. 200. quæ ex mineralibus. *ibid.* 101
- Venenati morbi cur inter universales morbos numerentur. 81
- Venenatarum rerum genera & species. 82
- Venenatæ infectionis signa. 85
- Venenorum curatio quoduplex. 84. quæ prophylactica, sive præservativa. *ib.* quæ curativa, sive therapeutica, & liberativa. *ibid.*
- In quibus consistant. 84. 86
- Venæsectio an in peste admittenda. 58
- Venus quam perniciofa in peste. 54
- Ventriculus ejusque historia & usus. 157
- Ventriculi dolor in febribus ut mitigandus. 76
- Ventriculi vulnera. 272
- Ventris imi vulnera. 270
- Veratrum, vide Helleborus.
- Verrenkung. 154
- Vesica urinaria, ejus historia & usus. 158
- Vesicæ vulnera. 274. 229
- Vesica fellis, ejusque historia & usus. 158
- Vespræ quid. 133. quæ mala corpori inferant, & ut curanda. 134
- Vespertilio. 149. ejus usus in medicina. *ibid.* quæ mala inferat, & ut curanda. 150
- Veteres nil laudabile de peste scripserunt. 45
- Vigiliæ nimix in febribus ut curandæ. 75
- Vinum an in quartanâ conferat. 32
- Vipera quid. 135. ejus partus, caro, hujusque usus. *ibid.* ictus quid mali inferat. *ibid.* hoc ut curandum. 136
- Viride æris quid. 106. ejus confectio, usus, noxæ, curatio. 107
- Virus quid. 201. 220
- Vix sine febre mori, quale proverbium. 71
- Viscus quid. 95. ejus vires, quæ symptomata producat, & ut hæc curanda.
- Vitriolum quid, & quæ ex eo parentur remedia. 120. ejus species, vires, usus. *ibid.* &c. noxæ. 122
- Vitrioli aqua, oleum, ut præparantur, & usurpantur. 120. &c.
- Vitrum quid. 126. ejus præparatio, inventio, usus, noxa. *ib.* curatio. 127
- Vitrum antimonii. vide Antimon.
- Ulcus quid. 154. 227. 200
- Ulcus & vulnus ut differant. 200. 227
- Ulcus differentia. 201. 202. causæ. 202. signa generalia. 203. prognosis. *ib.* curatio generalis. *ibid.*
- Ulcus excrementaria, sanies, pus, sordes. 200. 201
- Ulcus Apothematicum. 201. ejus curatio. 208
- Cum contusione carnis subjectæ quid & quomodo curandum. 209
- Κανγκρῆς. 213
- Cancrosum. 223
- Cuniculosum, ejus causæ, curatio, signa. 217. 218
- Cum corruptione ossis. 211. ejus causæ, signa, curatio. *ibid.*
- Denuò disruptum. 211. ejus causæ, curatio, &c.
- Depascens, vide ulcus Nomodes.
- Dolorosum quid. 202. ejus causæ, & curatio. 205
- Exedens. 221
- Fistulosum. 217. ejus causæ, signa. *ib.* curatio. *ibid.*
- Fœtidum, ejus species, &c. 214
- Cum hyperfarcosi. 200. ejus causa & curatio. *ibid.*
- Intemperatum sive dyscratum quid. 201
- ejus causæ, signa, curatio. 206
- Cum labiorum duritie, ejusque curatio. 201
- Malignum, ferox, rebelle. 213. ejus causæ, differentia, curatio. *ibid.*
- Nomodes. 221
- Profundum. 217
- Putridum. 215. ejus curatio. *ib.*
- Renovatum. 210
- Rheumaticum sive cum fluxione. 201. ejus causa, curatio. 207
- Sordidum. 214. ejus curatio. 215
- Verminosum. 212. ejus causæ & curatio, *ibid.*
- Viru-

I N D E X.

Virulentum. 220. ejus species.	221	Pulmonum.	269. 229. 230
Vlcera chironia. 213. telephia.	213	Cordis.	269. 229
Vnguenta vulneraria.	237	Arteriæ Aortæ.	269
Vnicornu hercinum quid sit.	60	Venæ cavæ.	269
Vogelleym.	95	Diaphragmatis.	269. 229
Volsella quid.	167	Ventris infimi.	270
Vomitum immodicus in febribus ut corrigendus.	77	Intestinorum.	270. 229
In quartanâ an conferat.	29	Mesenterii.	271
In peste an & qualis conducatur.	54	Omenti.	270
Vrina nigra quando bonum vel malum signum.	27	Ventriculi.	272
Vterus, ejusque historia & usus.	158	Epatis.	272. 229
Vteri tumores.	199	Lienis.	273. 229
Vva lupina. vide Aconitum.		Renum.	273. 229
Vulnus & ulcus ut differunt.	200. 227	Vesicæ.	274. 229
Vulnerum differentia & species. ib.	228.	Testiculorum.	274
symptoma.	228	Matricis.	274
Vulneri inhærentia ut extrahenda.	240	Penis.	284
Vulnera quænam lethalia.	157. &c.	Vulnerum Symptomata ut curanda, nempe.	
Vulnera carnosarum partium.	250	Inflammatio.	277
Nervorum.	251. 229	Tumor.	ibid.
Tendinum.	251. 229	Durities labiorum.	278
Ligamentorum.	251. 229	Hyperfarcosis.	278
Venarum.	254. 220	Aquosi excrementi profluxio.	ibid.
Arteriarum.	254. 229	Febris.	ibid.
Ossium.	254. 229	Sanguinis fluxio.	276
Articulorum.	254	Animi deliquium.	ibid.
Periostei.	255	Delirium.	272
Capitis.	245	Vigiliæ.	279
Ossium cranii.	255	Spasmus.	279
Femorum.	275	Paralysis.	280
Tibiarum.	275	Vomitum.	ibid.
Ab armis venenatis.	275	Alvi urinæque suppressio.	ibid.
Ab animalibus venenatis.	275	Pruritus.	281
Ex gelu aut frigore.	276	Extenuatio.	281
Meningum.	261. 229.	Vulneraria medicamenta.	233
Cerebri.	262. 229	Instrumenta chirurgica.	23
Oculorum.	263		
Nasi.	264		
Aurium.	264		
Colli.	265		
Gulæ.	266. 229		
Asperæ arteriæ.	266. 229		
Spinalis medullæ.	267		
Thoracis.	268. 229		
Artuum.	270		

W.

W Alnusbaum.	94
W Benne.	186. 187
W Blut fleisch in wunden/ &c.	210
W Wolf.	147
W Botumck.	26
W Biesel.	149
W Windigh gestwel.	192

INDEX.

Wolfszurg.	88	Wunderbaum.	92
Wundarzte.	154	Wuterich.	96
Wundarzney.	154		
Wundpulvers.	234	Z.	
Wundercranken.	234	Zinn.	102
Wulfsmilch.	88	Zinerg.	102



98
96

100
100

